



CATÁLOGO DE PRUEBAS EUROFINS MEGALAB

Edición: 16/09/2026

**Catálogo actualizado semanalmente.
Consulte siempre la versión más reciente.**



Esperamos que nuestro catálogo de pruebas le resulte útil, en él encontrará las pruebas solicitadas con mayor frecuencia, no obstante, si no encontrase alguna prueba o tuviese alguna duda póngase en contacto con nosotros:

91 429 62 87

Los plazos de entrega indicados en este catálogo (días laborables) se establecen desde la llegada de la muestra al laboratorio hasta la validación de los resultados (disponibles mediante acceso online^{^*}).

**Los centros que soliciten los análisis impresos deben sumar 24 horas a estos plazos de entrega.*

CATÁLOGO DE PRUEBAS ED 16_09_2026

Descripción:	21-HIDROXILASA ANTICUERPOS
Código:	HIDROXILA
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	U/mL
Plazo:	17 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 ml Suero congelado Separar y congelar inmediatamente. Tubo suero con separador.
Valores de referencia:	(Inf. 0.40)
Descripción:	ADAMTS-13 actividad en plasma
Código:	ADAMTS13
Técnica:	Electroforesis en Agarosa
Unidades:	%
Plazo:	19 días
Tubo:	Plasma de Citrato congelado
Comentario adicional:	1 mL de plasma de citrato. Congelar
Valores de referencia:	(11 - 100) Valores de referencia indicativos
Descripción:	ANTICUERPOS ANTI RECEPTORES DE GLICINA EN MUESTRA
Código:	GLICINACLC
Técnica:	Cell Binding Assay Inmunofluorescencia indirecta
Unidades:	
Plazo:	46 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 ml de muestra
Valores de referencia:	
Descripción:	Detección de la expansión (CAG) del gen ATXN2
Código:	SCA2_EXPA
Técnica:	PCR, TP-PCR, y análisis de fragmentos
Unidades:	
Plazo:	20 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:	
Descripción:	ESTUDIO BASICO TIPAJE LINFOCITARIO ILM
Código:	ILMIBASICO
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Tubo Especial
Comentario adicional:	3 EDTAS Y 1 SUERO CONGELADO

Descripción: ESTUDIO BASICO TIPAJE LINFOCITARIO ILMI

Valores de referencia:

Descripción: ESTUDIO COMPLETO MICROINMUNOTERAPIA

Código: ILMICOMPLE

Técnica:

Unidades:

Plazo: 7 días

Tubo: Tubo Especial

Comentario adicional: 3 tubos de EDTA, 1 SUERO refrigerado y 1 SUERO CONGELADO

Valores de referencia:

Descripción: Gardnerella vaginalis DNA PCR Cualitativa

Código: GARDNELPCR

Técnica: PCR

Unidades:

Plazo: 10 días

Tubo: Muestra Biología Molecular

Comentario adicional: Muestra exclusiva para esta determinación: torunda sin medio y rotulada con BM.
Otras muestras: orina, torunda genital (Glande, uretra),cérvix (torunda), semen, etc.

Valores de referencia: Valor de referencia: No se detecta

Descripción: INMUNOFENOTIPO LAVADO BRONCOALVEOLAR / BAL

Código: TIPAJE_BAL

Técnica:

Unidades:

Plazo: 4 días

Tubo: Líquidos Biológicos

Comentario adicional: 1 tubo seco

Valores de referencia:

Descripción: INTOLERANCIA ALIMENTARIA + MICROBIOTA

Código: B200N

Técnica:

Unidades:

Plazo: 22 días

Tubo: Muestra envios externos

Comentario adicional: Heces refrigeradas recogidas en kit especial (550000528)
Suero refrigerado
Plasma de EDTA

Valores de referencia:

Descripción: Muestra adicional compleja

Código: MUESTRCMPL

Técnica:

Unidades:

Plazo: 10 días

Tubo: Muestra Biología Molecular

Comentario adicional: Prueba para complementar precio de las paternidades/paresntescos en muestras biológicas complejas como son uñas, colillas, cepillos, ropa...

Valores de referencia:

Código: BAMILOIDE
Descripción: PERFIL BETA AMILOIDE 1-42/1-40, LCR
Técnica: EIA
Comentario adicional: 1 mL LCR. Congelar la muestra inmediatamente.
 Se requiere recoger la muestra de LCR en tubo de polipropileno.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	PEPBETA140	70072-4		Perfil Péptido Beta-Amiloide(1-40), LCR	pg/mL	(7755 - 16715)
Prueba	PEPBETAMIL	33203-1		PERFIL PEPTIDO BETA-AMILOIDE(1-42), LCR	pg/mL	(Sup. 600)
Prueba	INDICEAMIL			Perfil Indice Amiloide (Peptido 1-42/Peptido 1-40)		(Sup. 0.07)

Descripción: PERFIL ENDOXIFENO
Código: ENDOXIFENO
Técnica: HPLC-Espectrometría de masas
Unidades: µg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional:
Valores de referencia: (5.10 - 12.4)

Descripción: Perfil T4 Reguladores (CD4+CD25+CD127 low) %
Código: T4REGULADO
Técnica: Citometría de flujo
Unidades: %
Plazo: 7 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 5 ml de EDTA a Tª ambiente
Valores de referencia: (1 - 3) sobre población linfoide

Descripción: PERFIL TAMOXIFENO
Código: TAMOXI
Técnica: HPLC-Espectrometría de masas
Unidades: µg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional:
Valores de referencia: (100 - 200)

Descripción: Test genético de riesgo de diabetes tipo II
Código: RIESGDIABE
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: Muestra EDTA rotulada con BM y hoja de petición especial (wellness)

Descripción: Test genético de riesgo de diabetes tipo II

Valores de referencia:

Descripción: Yo Ac. LCR

Código: ACYO.LCR

Técnica: Técnica Inmunoblot

Unidades:

Plazo: 15 días

Tubo: LIQUIDO LCR INMUNO

Comentario adicional: 1mL LCR

Valores de referencia:

Descripción: 1,2-DICLOROBENCENO

Código: DICLOROBEN

Técnica: Cromatografía de gases-head space

Unidades: mcg/L

Plazo: 17 días

Tubo: EDTA sangre total Referencia

Comentario adicional:

Valores de referencia: (Inf. 140) Personas expuestas. Valor límite biológico (BAT-DFG). Al final de la jornada laboral

Descripción: 11-DESOXICORTISOL SUERO

Código: DESOX11

Técnica: RIA

Unidades: ng/mL

Plazo: 8 días

Tubo: Suero Congelado

Comentario adicional: Volumen 1.0 mL (mínimo 0.20 mL). Suero congelado

Valores de referencia: (0.43 - 7.56) Sin estímulo
(Sup. 69.3) Después de metopirona

Descripción: 14 DROGAS EN PELO

Código: PELODAO14

Técnica:

Unidades:

Plazo: 17 días

Tubo:

Comentario adicional:

Valores de referencia:

Descripción: 17 BETA ESTRADIOL ULTRASENSIBLE, SUERO

Código: BE2US

Técnica: EIA

Unidades: pg/mL

Plazo: 9 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: Suero refrigerado.

Descripción: 17 BETA ESTRADIOL ULTRASENSIBLE, SUERO

Valores de referencia: (Inf. 27.60) Mujer Fase folicular
(27.90 - 239.30) Mujer Fase ovulatoria
(44.60 - 282.30) Mujer Fase luteal
(14.40 - 126.30) Mujer Postmenopausia
(1112.00 - 22997.00) Mujer Embarazadas (segundo trimestre)
(3551.00 - 25039.00) Mujer Embarazadas (tercer trimestre)
(14.30 - 119.50) Hombre

Código: CETO17.F2

Descripción: 17-CETOSTEROIDES FRACCCIONADOS ORINA

Técnica: Cromatografía de gases

Comentario adicional: 30 ml orina 24 h.(alícuota).Indicar diuresis

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	ANDROST2			PERFIL 17-CETOESTEROIDES (ANDROSTERONA) ORINA24H	mg/24 h	(3.20 - 5.87) Hombre (1.60 - 3.20) Mujer
Prueba	ETIOCOL2	2268-1		PERFIL 17-CETOESTEROIDES (ETIOCOLANOLONA) ORINA24H	mg/24 h	(2.50 - 5.00) Hombre (1.50 - 3.50) Mujer
Prueba	H2EPIAND2			PERFIL 17-CETOESTEROIDES (DEHIDROEPIANDROSTERONA) ORINA24H	mg/24 h	(Inf. 0.09) < 5 años (Inf. 0.20) 6 años - 9 años (Inf. 0.40) 10 años - 15 años (1.00 - 3.11) Hombre > 16 años (0.50 - 1.43) Mujer > 16 años

Código: HIDRO17.F

Descripción: 17-HIDROXICORTICOIDES FRACCIONADOS (cromatografía capa fina)

Técnica: Cromatografía capa fina

Comentario adicional: 10 mL Orina 24h. (alícuota) (Refrigerado).Se requiere la diuresis.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	CORTISONA	14044-2		PERFIL 17-HIDROXICORTICOIDES FRACCIONADOS CORTISONA	mcg/24 h	(15.99 - 128.16)
Prueba	CORT	14158-0		PERFIL 17-HIDROXICORTICOSTEROIDES FRACC. CORTISOL	mcg/24 h	(9.80 - 90.90)

Descripción: 17-HIDROXICORTICOIDES TOTALES

Código: HIDRO17.T

Técnica: Cromatografía de Intercambio Iónico / Espectrometría.

Unidades: mg/24 h

Plazo: 6 días

Tubo: Orina 24 Horas

Descripción:	17-HIDROXICORTICOIDES TOTALES
Comentario adicional:	10 mL orina 24 h. Indicar volumen 24 h Para su conservación se debe acidificar con HCl concentrado hasta pH =3 - 6.
Valores de referencia:	(3 - 10) Hombre (2 - 8) Mujer

Descripción:	17-HIDROXIPREGNENOLONA EN SUERO
Código:	PREGNENO
Técnica:	Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectrometría de masas.
Unidades:	ng/mL
Plazo:	12 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	2 mL Suero SUEROCONG
Valores de referencia:	(2.29 - 31.04) Hombre 1 mes - 5 meses (2.11 - 19.81) Hombre 5 meses - 1 año (0.35 - 7.12) Hombre 1 año - 2 años (0.16 - 2.76) Hombre 2 años - 6 años (Inf. 1.87) Hombre 6 años - 9 años (Inf. 3.92) Hombre 9 años - 12 años (0.32 - 4.78) Hombre 12 años - 17 años (2.29 - 31.04) Mujer 1 mes - 5 meses (2.11 - 19.81) Mujer 5 meses - 1 año (0.35 - 7.12) Mujer 1 año - 2 años (0.16 - 2.76) Mujer 2 años - 6 años (Inf. 2.12) Mujer 6 años - 9 años (Inf. 3.98) Mujer 9 años - 12 años (Inf. 4.23) Mujer 12 años - 17 años (Inf. 4.55) Hombre > 17 años (Inf. 4.55) Mujer > 17 años

Descripción:	18-OH CORTICOSTERONA
Código:	OHCORTI
Técnica:	Téc. Cromatografía líquida/Tándem Masas
Unidades:	ng/dL
Plazo:	34 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	3 mL suero. Separar y congelar.
Valores de referencia:	(12 - 55)

Descripción:	2-FENIL-2PROPANOL EN ORINA (CUMENO-ISOPROPIL BENCENO)
Código:	CUMENO
Técnica:	Espectroscopía de RMN de protón
Unidades:	mg/g creatin.
Plazo:	20 días
Tubo:	Orina congelada
Comentario adicional:	2 tubos de Orina aislada recogida al final de la jornada laboral congelada
Valores de referencia:	(Inf. 7) VLB (valor límite biológico) al final de la jornada laboral. Indicador biológico de exposición al Cumeno

Descripción:	3-METILHISTIDINA SUERO
Código:	METILHISTI
Técnica:	Cromatografía líquida-Tándem masas
Unidades:	mcmol/L

Descripción: 3-METILHISTIDINA SUERO
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 3 mL suero.
Valores de referencia: (Inf. 10)

Descripción: 3-METOXITIRAMINA EN ORINA
Código: METOXITIRA
Técnica: Cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) acoplada a detector electroquímico
Unidades: µg/24h
Plazo: 8 días
Tubo: Orina 24 Horas
Comentario adicional: Alícuota acidificada de orina de 24 horas. Identificar diuresis en el tubo (imprescindible).
No ingerir 5 días antes de la recolección de la orina; té, café, plátano, chocolate, vainilla, queso, bebidas carbonatadas ni ningún tipo de medicamento especialmente de salicilatos, medicación hipotensora y contrastes con yodo.
Preservar la orina con HCl 6N (30 mL) pH=1
Suspender toda la medicación. Evitar cualquier tipo de ejercicio físico no habitual. Evitar el estrés. (3 días antes de la toma de muestra)
Valores de referencia: (Inf. 460) 18 años - 40 años Límite de cuantificación: 37.0 µg/L
 (Inf. 426) 41 años - 60 años Límite de cuantificación: 37.0 µg/L
 (Inf. 385) > 60 años Límite de cuantificación: 37.0 µg/L

Descripción: 3-NITROTIROSINA (3NT), SANGRE TOTAL
Código: NTL
Técnica:
Unidades: µg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: Sangre total EDTA. refrigerar.
Valores de referencia: (Inf. 1)

Descripción: 4-CLOROCATECOL EN ORINA
Código: CLOROCAT
Técnica:
Unidades: mg/g creatinina
Plazo: 23 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 10 mL orina (micción aislada) al final de la semana laboral
Valores de referencia: (Inf. 100) Final jornada laboral (exposición Clorobenceno); VLB (BEI-ACGIH)

Descripción: 5 DROGAS EN PELO
Código: PELODAO5
Técnica:
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo:
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: 5-ALA DEHIDRATASA ERITROCITARIA
Código: ALADEHID
Técnica: Espectrofotometría de absorción molecular

Descripción:	5-ALA DEHIDRATASA ERITROCITARIA
Unidades:	UE/L
Plazo:	10 días
Tubo:	Sang T. Heparina Congelada
Comentario adicional:	5 ml de sangre total de Heparina Litio.CONGELADA Tubo de EDTA interfiere en la técnica.
Valores de referencia:	(Sup. 20.0) (Sup. 6.0) V.L.B. (Personas expuestas a Plomo)
Descripción:	5-HIDROXI-N-METIL-2-PIRROLIDONA ORINA
Código:	OHPIRROL
Técnica:	Cromatografía líquida-tandem masas (LC-MS/MS)
Unidades:	mg/g creatinina
Plazo:	17 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	10 mL de una orina recogida entre 2 y 4 horas después del final de la exposición
Valores de referencia:	(Inf. 70) Entre 2 y 4 horas después del final de la exposición.Exposición a N-METIL-2-PIRROLIDONA(NMP)(VLB-INSHT)
Descripción:	5-METILENTETRAHIDROFOLATO EN LCR
Código:	MTHFLCR
Técnica:	Cromatografía líquida/Tándem masas (LC-MS/MS)
Unidades:	nmol/L
Plazo:	17 días
Tubo:	Líquido cefalorraquídeo congelado
Comentario adicional:	1 mL LCR. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO. Proteger de la luz con papel de aluminio.
Valores de referencia:	(59 - 205) < 3 meses (44 - 171) 3 meses - 2 años (27 - 107) 2 años - 18 años
Descripción:	5'NUCLEOTIDASA
Código:	NUCLEO5
Técnica:	Espectrometría
Unidades:	U/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero. Volumen mínimo: 0.5 mL
Valores de referencia:	(Inf. 10)
Descripción:	6 DROGAS EN PELO
Código:	PELODAO6
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	17 días
Tubo:	
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	
Código:	TGNMMP
Descripción:	6-TIOGUANINA NUCLEOTIDO+6-METILMERCAPTOPURINA EN SANGRE

Código: TGNMMP
Técnica: Cromatografía líquida de alta resolución.
Comentario adicional: 3 mL Sangre Total (EDTA)

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	TIOGUANIN			PERFIL TGNMMP (6-TIOGUANINA NUCLEOTIDO EN SANGRE)		(235 - 450) pmol/8x10(8) eritrocitos
Prueba	METILMERP			PERFIL TGNMMP (6-MERCAPTOPURINA EN SANGRE)		< 5700 pmol/8x10(8) eritrocitos

Descripción: 8-Hidroxi-2-Deoxiguanosina en orina
Código: DEOXYGUAN
Técnica: Enzimoimmunoanálisis
Unidades: µg/g creatinina
Plazo: 13 días
Tubo: ORINAS ENVIOS EXTERNOS
Comentario adicional: 1 mL orina (micción aislada). Refrigerado.
 Para su conservacion, la orina se debe acidificar hasta ph 6-8
Valores de referencia: (6 - 14)

Descripción: 9 DROGAS EN PELO
Código: PELODAO9
Técnica:
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo:
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Abetalipoproteinemia. Sec Gen: MTTP
Código: GEN_000001
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: AC ANTI MOG (MIELINA OLIGODENDROCITO) LCR
Código: MOGLCR
Técnica: Cell Binding Assay IFI
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: LIQUIDO LCR INMUNO
Comentario adicional: 1 mL LCR

Descripción:	AC ANTI MOG (MIELINA OLIGODENDROCITO) LCR
Valores de referencia:	Se recomienda efectuar análisis simultaneo en suero y LCR
Descripción:	AC METOXIACETICO (EXP. 2-METOXIETANOL/ACETATO 2-METOXIETILO
Código:	METOXIACE
Técnica:	Cromatografía de gases ionizacion de llama
Unidades:	mg/g creatinina
Plazo:	12 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	5 mL orina (micción aislada) al final de la semana laboral después de al menos 2 semanas de trabajo. (Para conservación añadir 0.1mL de ac. clorhídrico conc.)
Valores de referencia:	(Inf. 8) Final de la semana laboral (exposición 2-METOXIETANOL y/o ACETATO DE 2-METOXIETILO) VLB-INSHT
Descripción:	AC. ANTI CAPSULAS SUPRARRENALES
Código:	SUPRARREAC
Técnica:	IFI
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. Alternativa: plasma con EDTA, heparina o citrato.
Valores de referencia:	Títulos significativos a partir de 1:10
Descripción:	AC. ANTI CASPR2 SUERO
Código:	CASPR2
Técnica:	Inmunocitoquímica (Cell Based Assay)
Unidades:	
Plazo:	17 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	Negativo: Título <1/100
Descripción:	AC. ANTI CELULAS PARIETALES (MUCOSA GASTRICA)
Código:	CELPARIEAC
Técnica:	IFI
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	Negativo <1/40 Positivo >1/40
Descripción:	AC. ANTI CENTROMERO
Código:	CENTROAC
Técnica:	Técnica IFI
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	Negativo

Descripción: AC. ANTI GAD 64/65K EN LCR
Código: GADACLCR
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: LIQUIDO LCR INMUNO
Comentario adicional: 1 ml de LCR
Valores de referencia:

Descripción: AC. IGG ANTI NEUROMIELITIS OPTICA (ACUAPORINA/NMO) EN LCR
Código: ANTINMOLCR
Técnica: Cell Binding Assay Inmunofluorescencia indirecta
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: LIQUIDO LCR INMUNO
Comentario adicional: 1 mL LCR
Valores de referencia: Se recomienda efectuar análisis simultaneo en suero y LCR

Descripción: AC. IGG HUMAN ANTI-MOUSE ANTIBODY (ANTI RATÓN)
Código: HAMA
Técnica: ENZIMOINMUNOANÁLISIS
Unidades:
Plazo: 32 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero.
Valores de referencia: (Inf. 1.0) Negativo

Descripción: AC. RECEPTOR 3 FGF (FGFR3) SUERO
Código: ACR3FGF
Técnica: EIA
Unidades: U/mL
Plazo: 11 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero refrigerado
Valores de referencia: (Inf. 12)

Descripción: ACANTHAMOEBA Y AMEBAS LIBRE (ENVIO MICROBIOL ESPECIAL)
Código: ACANTCULT
Técnica: Cultivo
Unidades:
Plazo: 45 días
Tubo: Microbiología
Comentario adicional: Muestra ocular a Temperatura ambiente. En caso de agujas o bisturis dejar un tiempo en suero fisiológico o agua estéril retirándolo antes de que desprenda herrumbre
Valores de referencia:

Descripción: ACANTHAMOEBA, NAEGLERIA ,BALAMUTHIA (ENVIO MICROBIO ESPECIAL)
Código: ACANTPCR
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 20 días

Descripción:	ACANTHAMOEBA, NAEGLERIA ,BALAMUTHIA (ENVIO MICROBIO ESPECIAL
Tubo:	Microbiología
Comentario adicional:	Muestra ocular a Temperatura ambiente. En caso de agujas o bisturís dejar un tiempo en suero fisiológico o agua esteril retirandolo antes de que desprenda herrumbre
Valores de referencia:	

Descripción:	Acetilcolinesterasa, líquido amniótico
Código:	COLINESLA
Técnica:	Electroforesis
Unidades:	
Plazo:	14 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 mL líquido amniótico.
Valores de referencia:	

Descripción:	ACETOACETATO SUERO
Código:	ACETOASUER
Técnica:	Espectrofotometría
Unidades:	mmol/L
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 ml suero congelado
Valores de referencia:	(0.01 - 0.20)

Descripción:	ACETONA en orina (exposición a ACETONA)
Código:	ACETONA
Técnica:	Cromatografía de Gases / Ionización de Llama.
Unidades:	mg/L
Plazo:	7 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	Orinal Final de Jornada. Refrigerar Volumen: 10.0 mL Volumen mínimo: 5 mL
Valores de referencia:	(Inf. 50) Final de la jornada laboral (exposición a ACETONA) VLB-INSHT (Inf. 40) Final de la semana laboral (exposición a ISOPROPANOL) VLB-INSHT

Descripción:	ACETONA EN SANGRE TOTAL
Código:	ACETOSAN
Técnica:	Cromatografía de gases-Ionización de Llama
Unidades:	mg/L
Plazo:	7 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	1 mL sangre total tubo EDTA
Valores de referencia:	(Inf. 25) VLB final jornada laboral-BAT (MAK&BAT)

Descripción:	Acidemia glutárica tipo 2. Panel
Código:	GEN_000004
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días

Descripción: Acidemia glutárica tipo 2. Panel
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Acidemia glutárica. Panel
Código: GEN_000005
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Acidemia isovalérica. Sec Gen: IVD.
Código: GEN_000006
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Acidemia metilmalónica. Panel
Código: GEN_000007
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Acidemia propiónica. Panel
Código: GEN_000008
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Acidemia propiónica. Sec Gen: PCCA.
Código: GEN_000009
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción:	Acidemia propiónica. Sec Gen: PCCB.
Código:	GEN_000010
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	
Descripción:	Acidemia y aciduria metilmalónica. Panel
Código:	GEN_000011
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	
Descripción:	Acidez titulable, orina
Código:	ACIDEZ2
Técnica:	Volumetría
Unidades:	mmol/24 h
Plazo:	3 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	10 mL Orina 24h. (alícuota). Se requiere la diuresis (Volumen 24 horas)
Valores de referencia:	(20 - 50) Acidez titulable.
Descripción:	ACIDO 1,2 DIHIDROXI BUTILMERCAPTURICO ORINA
Código:	BUTILMERCA
Técnica:	Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectrometría de masas
Unidades:	mg/g creatin.
Plazo:	17 días
Tubo:	ORINA OFJ CONGELADA
Comentario adicional:	10 mL orina final de jornada laboral CONGELADA.
Valores de referencia:	(Inf. 1.6) Final de la jornada laboral (exposición a 1,3 Butadieno); VLB-INSST Límite de cuantificación: 0.6 mg/L
Descripción:	ACIDO 2-ETOXIACETICO EN ORINA
Código:	ETOXIACE
Técnica:	Cromatografía de gases/ionización en llama
Unidades:	mg/L
Plazo:	12 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	Volumen 1.0 mL Orina (micción aislada) al final de la jornada laboral.
Valores de referencia:	(Inf. 50) Valor Límite Biológico-VLB® (INSHT)
Descripción:	ACIDO 5-HIDROXINDOLACETICO 24H ORINA
Código:	OHINDOLACE

Descripción: ACIDO 5-HIDROXINDOLACETICO 24H ORINA
Técnica: HPLC/Electroquímica
Unidades: mg/24 h
Plazo: 8 días
Tubo: Orina 24 Horas
Comentario adicional: 10 ml orina 24 horas acidificada con 0.1 ml HCl 6N (pH= 2 - 3). Volumen mínimo: 5mL
 Indicar volumen de 24 horas.

No ingerir alimentos que contengan serotonina (ciruelas, piñas, bananas, berenjenas, tomates, aguacates, nueces) durante tres días antes de la prueba.

Ver instrucciones de dieta en ficha de preparación del paciente

Valores de referencia: (2.00 - 8.00)
 (Inf. 2) Límite de cuantificación

Descripción: ACIDO ACETILASPARTICO ORINA (ENF. CANAVAN)
Código: ACETILASPA
Técnica: CROMATOGRAFIA DE GASES- ESPECTROMETRÍA MASAS CON MONITORIZACION DE IONES
Unidades: mmol/molcrea
Plazo: 17 días
Tubo: Orina congelada
Comentario adicional: 10 mL orina. Congelar y enviar congelado. Se recomienda que la muestra corresponda a una fase de crisis. Indicar información clínica.
Valores de referencia: (4.0 - 25.0)

Descripción: ACIDO BUTOXIACÉTICO TOTAL EN ORINA
Código: BUTOXIACET
Técnica: Cromatografía de Gases / Ionización de Llama.
Unidades: mg/g creat
Plazo: 12 días
Tubo: Orina Final de Jornada
Comentario adicional: 3 mL de orina (micción aislada) al final de la jornada laboral.
 Refrigerar.
 Volumen mínimo: 0.5 mL
Valores de referencia: (Inf. 200) Final jornada de la semana laboral (exposición a 2-Butoxietanol); VLB-INSSST
 Límite de cuantificación: 10 mg/L

Descripción: ACIDO CITRICO (CITRATO) EN ORINA
Código: CITRICO24
Técnica: Espectrofotometria
Unidades: mg/24 h
Plazo: 6 días
Tubo: Orina citrico
Comentario adicional: 2 ml de orina
Valores de referencia: (116 - 924) Hombre
 (250 - 1160) Mujer

Descripción: ACIDO CITRICO (CITRATO) PLASMA SEMINAL
Código: CITRICOSEM
Técnica: Enzimática
Unidades: mg/dL

Descripción: ACIDO CITRICO (CITRATO) PLASMA SEMINAL
Plazo: 4 días
Tubo: SEMEN CONGELADO
Comentario adicional: 1 mL plasma seminal. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.
Valores de referencia: (200 - 600)

Descripción: ACIDO CITRICO (CITRATO) SUERO
Código: CITRICO
Técnica: Cromatografía gases-Espectrometría masas
Unidades: mg/dL
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1mL de suero. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO
Valores de referencia: (1.3 - 3.7)

Descripción: ACIDO DELTA-AMINOLEVULINICO ORINA (ALA)
Código: DELTAALA
Técnica: Espectrometría de absorción molecular
Unidades: mg/g creatin.
Plazo: 7 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 5 mL de orina (micción aislada)
Valores de referencia: (Inf. 5)
 (Inf. 20) Exposición a Plomo. Valor límite químico (B.O.E. 24 abril 1986)

Descripción: ACIDO FITANICO SUERO
Código: FITANICO
Técnica: Cromatografía de gases
Unidades: mcg/mL
Plazo: 23 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 3 mL suero. Separar y congelar lo antes posible.
Valores de referencia: (Inf. 5)

Descripción: ACIDO FOLICO B9
Código: FOLICO
Técnica: Téc. ICMA
Unidades: ng/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL suero.
Valores de referencia: (3 - 20)

Descripción: ACIDO FOLICO ERITROCITARIO
Código: FOLICOERI
Técnica: Quimioluminiscencia
Unidades: ng/mL
Plazo: 5 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia

Descripción:	ACIDO FOLICO ERITROCITARIO
Comentario adicional:	1.5 ml de sangre total EDTA. Refrigerado
Valores de referencia:	(126.00 - 651.10) Valores de referencia indicativos
Descripción:	ACIDO FORMICO (METABOLITO DE METANOL) EN ORINA
Código:	FORMICO
Técnica:	Cromatografía de Gases / Ionización de Llama
Unidades:	mg/g creatinina
Plazo:	9 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	Orina final jornada. Refrigerar Volumen: 5mL Volumen mínimo: 2mL
Valores de referencia:	(Inf. 80) Personas expuestas (Metanol); Biological Exposure Indices (BEI) ACGIH® (Inf. 50) Personas no expuestas
Descripción:	ACIDO FUROICO ORINA
Código:	FUROICO
Técnica:	GC/ionización de llama
Unidades:	mg/L
Plazo:	12 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	10 ml de orina (micción aislada) al final de la jornada laboral. refrigerar.
Valores de referencia:	(Inf. 200) VLB final de jornada (exposición a Furfural)
Descripción:	ACIDO GAMMA AMINOBUTIRICO ORINA
Código:	GABA2
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	µg/g creatinina
Plazo:	17 días
Tubo:	Orina congelada
Comentario adicional:	10 ml orina. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADA
Valores de referencia:	(206 - 1548)
Descripción:	ACIDO GLICOLICO EN ORINA
Código:	GLICOLICO2
Técnica:	Cromatografía de gases
Unidades:	mg/g creatinina
Plazo:	23 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	10 mL Orina (micción aislada)
Valores de referencia:	(Inf. 60)
Descripción:	ACIDO HIALURONICO
Código:	HIALURAC
Técnica:	EIA
Unidades:	µg/L
Plazo:	36 días
Tubo:	Suero Basal

Descripción: ACIDO HIALURONICO

Comentario adicional: 1 mL de suero

Valores de referencia: (2.50 - 80)

Descripción: ACIDO HIALURONICO LIQUIDO PLEURAL

Código: HIALURONIC

Técnica: EIA

Unidades: mg/L

Plazo: 32 días

Tubo: Líquidos Biológicos

Comentario adicional:

Valores de referencia: (Inf. 10.0)

Descripción: ACIDO HIALURONICO LIQUIDO SINOVIAL

Código: LIQSIHIALU

Técnica: ENZIMOINMUNOANÁLISIS

Unidades: mg/L

Plazo: 32 días

Tubo: Líquidos Biológicos

Comentario adicional: 1 mL Líquido Sinovial.

Valores de referencia: De manera orientativa, superior a 350.0 mg/dL.

Descripción: ACIDO HIPURICO ORINA

Código: HIPURICO

Técnica: Cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) acoplada a detector UV

Unidades: g/g creatinina

Plazo: 8 días

Tubo: Orina Final de Jornada

Comentario adicional: 10 mL de orina final de jornada (OFJ).

Identificar tubo con etiqueta pequeña sin código de barras, con el tapón marcado y con la palabra OFJ en el lateral del tubo.

Valores de referencia: (Inf. 1.6) al final de la jornada laboral. **VLB** publicado por el **INSHT (2016) hasta 2018. Desde 2018, para la exposición a TOLUENO, el INSST recomienda la valoración del o-Cresol en orina, Tolueno en orina o Tolueno en sangre (INSST 2018).**

Descripción: ACIDO HOMOGENTISICO ORINA (ALCAPTONURIA)

Código: HOMOGEN

Técnica: HPLC

Unidades: mg/24 h

Plazo: 26 días

Tubo: Orina 24 Horas

Comentario adicional: 10 mL orina 24 h REFRIGERAR.

Añadir 0.5 mL de ácido clorhídrico concentrado

Valores de referencia: (Inf. 10)

Descripción: ACIDO HOMO VANILICO ORINA (HVA)

Código: HOMO VANI

Técnica: HPLC - Electroquímica

Unidades: mg/24 h

Plazo: 8 días

Tubo: Orina 24 Horas

Descripción:	ACIDO HOMOVANILICO ORINA (HVA)
Comentario adicional:	10 mL orina 24 h Volumen mínimo 5 mL Preservar la orina con HCl 6N (20 ml), pH = 1 - 3 Indicar volumen 24 h No ingerir 5 días antes de la recolección de la orina; té, café, plátano, chocolate, vainilla, queso, bebidas carbonatadas ni ningún tipo de medicamento especialmente de salicilatos, medicación hipotensora y contrastes con yodo. Evitar cualquier tipo de ejercicio físico no habitual . Evitar el estrés. (3 días antes de la toma de muestra)
Valores de referencia:	(1.8 - 6.9) > 16 años
Descripción:	ACIDO LACTICO (LACTATO) PLASMA
Código:	LACTICO
Técnica:	Téc. enzimática UV
Unidades:	mg/dL
Plazo:	4 días
Tubo:	Tubo fluoruro
Comentario adicional:	Plasma de tubo de Fluoruro oxalato, separado y refrigerado (El tubo de GLUCOSA). Rellenar mínimo la mitad del tubo fr Fluoruro de sangre total. Alternativa: 1 mL plasma EDTA. Separar inmediatamente y enviar congelado.
Valores de referencia:	(5.7 - 22)
Descripción:	Acido lactico(lactato), líquido sinovial
Código:	LACTICOSIN
Técnica:	Téc. enzimática UV
Unidades:	mg/dL
Plazo:	4 días
Tubo:	Tubo fluoruro
Comentario adicional:	1 mL.Fluoruro/EDTA.
Valores de referencia:	(Inf. 25)
Descripción:	ACIDO MANDELICO + FENIL GLIOXILICO EN 2ª ORINA
Código:	MANDELI2M
Técnica:	Cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) acoplada a detector UV
Unidades:	mg/g creatinina
Plazo:	6 días
Tubo:	OFJ HPLC
Comentario adicional:	10 mL de orina final de jornada (OFJ) para personas expuestas a ESTIRENO y 10 ml de orina al final de la semana laboral para personas expuestas a etilbenceno. Identificar tubo con etiqueta pequeña sin código de barras, con el tapón marcado y con la palabra OFJ en el lateral del tubo.
Valores de referencia:	(Inf. 400) al final de la jornada laboral (exposición a ESTIRENO) VLB-INSHT (Inf. 700) al final de la jornada laboral (exposición a ETILBENCENO) VLB-INSHT
Descripción:	ACIDO MANDELICO+FENIL GLIOXILICO EN ORINA
Código:	MANDELI2
Técnica:	Cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) acoplada a detector UV
Unidades:	mg/g creatinina
Plazo:	7 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	10 mL de orina final de jornada (OFJ) para personas expuestas a ESTIRENO y 10 ml de orina al final de la semana laboral para personas expuestas a etilbenceno. Identificar tubo con etiqueta pequeña sin código de barras, con el tapón marcado y con la palabra OFJ en el lateral del tubo.

Descripción: ACIDO MANDELICO+FENIL GLIOXILICO EN ORINA
Valores de referencia: (Inf. 400) al final de la jornada laboral (exposición a ESTIRENO)
 VLB-INSHT
 (Inf. 700) al final de la semana laboral (exposición a ETILBENCENO)
 VLB-INSHT

Descripción: ACIDO METIL MALONICO EN SUERO
Código: METILMALO
Técnica: Cromatografía líquida/Espectrometría de masas tandem (LC-MS/MS)
Unidades: µmol/L
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: Tubo Suero CON gel separador
 Volumen: 1mL suero congelado
 Volumen mínimo: 0.3mL
Valores de referencia: (0.10 - 0.30) 1 año - 12 años
 (0.10 - 0.35) 12 años - 18 años
 (0.10 - 0.40) 18 años - 65 años
 (0.12 - 0.46) > 65 años

Descripción: ACIDO METILHIPURICO ORINA (metabolito del Xileno)
Código: METILHIP
Técnica: Cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) acoplada a detector UV
Unidades: g/g creatinina
Plazo: 8 días
Tubo: Orina Final de Jornada
Comentario adicional: 10 mL de orina final de jornada (OFJ).
 Identificar tubo con etiqueta pequeña sin código de barras, con el tapón marcado y con la palabra OFJ en el lateral del tubo.
Valores de referencia: (Inf. 1.0) al final de la jornada laboral (exposición a XILENO)
 VLB-INSHT

Descripción: ACIDO METILIMIDAZOLACÉTICO
Código: METILIMI
Técnica: Cromatografía de Gases-Espectrometría de Masas
Unidades: mg/24 h
Plazo: 17 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 10 mL orina 24 h.
Valores de referencia: (Inf. 4.5)

Descripción: ACIDO METILMALONICO EN ORINA
Código: METILMALOO
Técnica: LC-MS/MS
Unidades: µmol/g creat
Plazo: 9 días
Tubo: Orina congelada
Comentario adicional: 1 mL orina micción aislada. Congelar. Preferible orina primera de la mañana
Valores de referencia: (1.80 - 26.50)

Descripción: ACIDO MEVALONICO, ORINA
Código: ACMEVALON
Técnica: Cromatografía de gases - Espectrometría de masas.

Descripción: ACIDO MEVALONICO, ORINA
Unidades: mmol/mol crea
Plazo: 17 días
Tubo: Orina congelada
Comentario adicional: 10-20 mL Orina (-8 °C - Congelar)
Valores de referencia: (0.1 - 11.4)

Descripción: ACIDO MICOFENOLICO
Código: MICOFENOLI
Técnica: LC-MS/MS
Unidades: mg/L
Plazo: 6 días
Tubo: Plasma EDTA Pruebas Especiales
Comentario adicional: 1 ml plasma de EDTA refrigerado.
Se recomienda obtener la muestra previamente a la administracion del farmaco. Usualmente se determina la concentración del inmunosupresor en periodos matinal y en ayunas
Valores de referencia: volumen mínimo: 0.6 mL
 (Sup. 1.3) > 12 años Transplante renal. MPA con medicación de Ciclosporina A
 (Sup. 1.9) > 12 años Transplante renal. MPA con medicación de Tacrolimus
 (Sup. 1.3) < 12 años Transplante renal.
 (1.0 - 3.5) Transplante hígado
 (Sup. 2.0) Transplante de corazón. MPA con medicación con inhibidores de la Calcineurina y Glucocorticoides
 Límite de cuantificación: 0.4 mg/L

Descripción: ACIDO OROTICO ORINA
Código: OROTICO
Técnica: Cromatografía de gases - Espectrometría de masas
Unidades: mg/g creatinina
Plazo: 23 días
Tubo: Orina congelada
Comentario adicional: 10 mL de orina (micción aislada)
 Congelar
Valores de referencia: (Inf. 8)

Descripción: ACIDO OXALICO (CONCENTRACION EN ORINA)
Código: OXAL2_MG
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: mg/dL
Plazo: 5 días
Tubo: orina oxalico
Comentario adicional: 3 ml de orina

Es recomendable que el paciente no tome alimentos ricos en Vitamina C durante al menos 48 horas, pues el exceso de ácido ascórbico pudiera interferir de manera "negativa", es decir infravalorando los resultados de oxalato.

Valores de referencia:

Descripción: ACIDO OXALICO EN SUERO
Código: OXAL
Técnica: EIA
Unidades: µmol/L
Plazo: 12 días

Descripción: ACIDO OXALICO EN SUERO
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 2 mL suero congelado (mínimo 1 mL)
Valores de referencia: (Inf. 2)

Código: OXALICO2
Descripción: ACIDO OXALICO ORINA (OXALATO)
Técnica: Enzimática
Comentario adicional: 3 ml de orina.
 Se debe restringir de la dieta alimentos ricos en vitamina C o suplementos las 48h previas a la toma de la muestra

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	OXAL2_MG	2700-3		ACIDO OXALICO (CONCENTRACION EN ORINA)	mg/dL	
Prueba	OXALICO24	27222-9		ACIDO OXALICO ORINA (OXALATO)	mg/24 h	(17.5 - 35.1)

Descripción: ÁCIDO PIPECÓLICO EN SUERO
Código: PIPECOLSUE
Técnica: Cromatografía Líquida-Tándem Masas(LC-MS/MS)
Unidades: mcmol/L
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 2 mL de suero. Congelar y enviar congelado
Valores de referencia: (0 - 6) 0-6 meses
 (0 - 5.9) 6 meses-12 meses
 (0 - 4.3) 1 año-17 años
 (0 - 7.4) Más de 17 años

Descripción: ÁCIDO PIRÚVICO (PIRUVATO) EN LCR
Código: PIRULCR
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: mg/dL
Plazo: 6 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 2 mL LCR
Valores de referencia: (0.50 - 1.70)

Descripción: ACIDO PIRUVICO (PIRUVATO) SANGRE
Código: PIRUVICO
Técnica: Cinética enzimática
Unidades: mg/dL
Plazo: 6 días
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional: EXTRACCIÓN DE LAS MUESTRAS: -Al tubo que contiene 4 mL de ácido perclórico al 6N, añadir 2 mL de suero directamente de la jeringa de extracción. -Vortex 30 segundos -Incubar en frío durante 10 min -Centrifugar 10 min a 2000 g -Separar sobrenadante (1)
 -Conservar refrigerado por 8 días, si por tiempo superior congelar.
 Preferible en ayunas y en reposo.
 Mantener refrigerado y enviar REFRIGERADO.

Descripción: ACIDO PIRUVICO (PIRUVATO) SANGRE

Valores de referencia: (0.3 - 0.7)

Descripción: ACIDO PRISTANICO

Código: PRISTANICO

Técnica: Cromatografía de Gases-Espectrometría de Masas

Unidades: mcg/ml

Plazo: 23 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 3 mL suero, Congelar y enviar congelado

Valores de referencia: (Inf. 0.8)

Descripción: ACIDO SALICILICO (SALICILATO)

Código: SALICILICO

Técnica: Inmunoanálisis

Unidades: mg/dL

Plazo: 4 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 1 mL suero

Valores de referencia: (15 - 30) Rango terapéutico
(Sup. 30) Nivel tóxico

Descripción: ÁCIDO TIOIAZOLIDIN CARBOXILICO (DISULFURO DE CARBONO) TTCA

Código: DISULCARB

Técnica: HPLC

Unidades: mg/g creatinina

Plazo: 13 días

Tubo: Orina Final de Jornada

Comentario adicional: 10 mL orina OFJ. Refrigerar
Toma de muestra final de la jornada laboral

Valores de referencia: (Inf. 1.5) Final de jornada (exposición a DISULFURO DE CARBONO)

Descripción: ACIDO TRICLOROACETICO EN ORINA

Código: TRICLOAC

Técnica: Cromatografía de Gases / Captura Electrónica

Unidades: mg/L

Plazo: 9 días

Tubo: Orina pruebas referencia

Comentario adicional: Volumen: 5.0 mL
Volumen mínimo: 50 uL
Conservación: Refrigerar

Valores de referencia: (Inf. 15) Personas expuestas (Tricloroetileno); Final de la semana laboral (BEI /ACGIH)
(Inf. 15) Personas expuestas (Tricloroetileno); Final de la semana laboral (VLB/INHST)

Descripción: ACIDO TTMUCONICO

Código: MUCONICO

Técnica: Cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) acoplada a detector UV

Unidades: mg/L

Plazo: 12 días

Descripción:	ACIDO TTMUCONICO
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	10 mL de orina final de jornada (OFJ). Identificar tubo con etiqueta pequeña sin código de barras, con el tapón marcado y con la palabra OFJ en el lateral del tubo.
Valores de referencia:	(Inf. 2.0) al final de la jornada laboral.VLB publicado por el INSHT (2017) hasta Marzo 2025. Desde Marzo 2025, para la exposición a BENCENO, el INSST recomienda la valoración del S-Fenilmercaptúrico en orina (INSST 2025).

Descripción:	ACIDO URICO
Código:	URI
Técnica:	
Unidades:	mg/dL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(2.6 - 6.0) Mujer (3.5 - 7.2) Hombre

Descripción:	ACIDO URICO ORINA
Código:	URI2
Técnica:	Espectrofotometría
Unidades:	g/24h
Plazo:	3 días
Tubo:	Orina 24 Horas
Comentario adicional:	10 mL orina Toma de muestra final de la jornada laboral
Valores de referencia:	(0.25 - 0.75)

Descripción:	ACIDO VALPROICO
Código:	VALPROICO
Técnica:	EIA
Unidades:	µg/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(50 - 100) Rango Terapéutico

Descripción:	ACIDO VALPROICO LIBRE
Código:	VALPROICOL
Técnica:	EIA
Unidades:	mg/L
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. Refrigerar.
Valores de referencia:	(5 - 20) Intervalo terapéutico

Descripción:	ACIDO VANILMANDELICO EN ORINA BASAL
Código:	VANILMBASA
Técnica:	HPLC
Unidades:	mg/g creatinina

Descripción: ACIDO VANILMANDELICO EN ORINA BASAL
Plazo: 8 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 5 ml orina (micción aislada), con 0.1 ml HCL conc.

Suspender toda la medicación. Evitar cualquier tipo de ejercicio físico no habitual . Evitar el estrés. (3 días antes de la toma de muestra)

No ingerir 5 días antes de la recolección de la orina; té, café, plátano, chocolate, vainilla, queso, bebidas carbonatadas ni ningún tipo de medicamento especialmente de salicilatos, medicación hipotensora y contrastes con yodo.

Valores de referencia: (2.10 - 21.8) < 1 año
 (2.50 - 15.5) 1 año - 2 años
 (2.10 - 10.3) 2 años - 5 años
 (Inf. 7.60) 5 años - 10 años
 (Inf. 5.60) 10 años - 15 años
 (Inf. 4.60) > 15 años

Descripción: ACIDO VANILMANDELICO ORINA (VMA) EN ORINA DE 24H
Código: VANILMAN
Técnica: HPLC
Unidades: mg/24 h
Plazo: 8 días
Tubo: Orina 24 Horas
Comentario adicional: 10 ml orina 24 horas acidificada con 0.1 ml HCl 6N (pH=1 - 3). Volumen mínimo: 5mL
 Indicar volumen de 24 horas.

Evitar cualquier tipo de ejercicio físico no habitual . Evitar el estrés (3 días antes de la toma de muestra).

No ingerir 5 días antes de la recolección de la orina; té, café, plátano, chocolate, vainilla, queso, bebidas carbonatadas ni ningún tipo de medicamento (consultar con su médico) especialmente de salicilatos, medicación hipotensora y contrastes con yodo.

Valores de referencia: (1.60 - 7.30)
 (Inf. 2) Límite de cuantificación

Descripción: ACIDOS BILIARES EN HECES
Código: BILIAHECES
Técnica: Espectrometría
Unidades: µmol/100g heces
Plazo: 11 días
Tubo: heces especiales
Comentario adicional: Heces refrigeradas
Valores de referencia: (84 - 655)

Descripción: ACIDOS BILIARES TOTALES
Código: BILIARES
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: mcmol/L
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL suero
 Alt. Plasma EDTA Tripotásico
Valores de referencia: (Inf. 10)

Código: ACGRASOSCL
Descripción: Acidos Grasos de cadena larga, Suero
Técnica: Cromatografía de gases

Código:

ACGRASOSCL

3 ml de SUERO CONGELADO. Evitar hemólisis

Comentario adicional:

Separar el suero lo antes posible.
Congelar la muestra inmediatamente.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	ACGRAC22	53859-5		Perfil ácido graso de cadena larga (C22)	mcg/mL	(Inf. 32.8)
Prueba	ACGRAC24	53860-3		Perfil ácido graso de cadena larga (C24)	mcg/mL	(Inf. 33.7)
Prueba	ACGRAC26	33403-7		Perfil ácido graso de cadena larga (C26)	mcg/mL	(0.09 - 0.35)
Prueba	ACGRC24	1773-1		Perfil ácido graso de cadena larga indice (C24/22)		(0.55 - 0.89)
Prueba	ACGRC26	1774-9		Perfil ácido graso de cadena larga indice (C26/22)		(Inf. 0.02)
Prueba	ACGRACOM	33478-9		Comentario acidos grasos de cadena muy larga		

Código:

ACGRASFRA

Descripción:

ACIDOS GRASOS FRACCIONES (OMEGA3Y6), SUERO

Técnica:

GC-FID

Comentario adicional:

2 mL de suero.(vol. mínimo: 0.25 ml) Proteger de la luz. Refrigerar.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	MIRISTICO	35157-7		Perfil Acidos grasos fracciones: AC. MIRISTICO	µg/mL	(15.00 - 60.00)
Prueba	PALMITICO	2719-3		Perfil Acidos grasos fracciones: AC. PALMITICO	µg/mL	(320.00 - 1075.00)
Prueba	ESTEARICO	35149-4		Perfil Acidos grasos fracciones: AC. ESTEARICO	µg/mL	(127.00 - 305.00)
Prueba	PALMITOLEI	5006440		Perfil Acidos grasos fracciones: AC. PALMITOLEICO	µg/mL	(33.00 - 125.00)
Prueba	OLEICO	2673-2		Perfil Acidos grasos fracciones: AC. OLEICO	µg/mL	(260.00 - 1250.00)
Prueba	LINOLEICO	2564-3		Perfil Acidos grasos fracciones: AC. LINOLEICO	µg/mL	(576.00 - 1300.00)
Prueba	DHGAMALINO	5006534		Perfil Acidos grasos fracciones: AC. DH-GAMA-LINOLENICO	µg/mL	(38.00 - 105.00)
Prueba	ARAQUIDONI	1889-5		Perfil Acidos grasos fracciones: AC. ARAQUIDONICO	µg/mL	(108.00 - 422.00)
Prueba	GAMALINOLE	5009409		Perfil Acidos grasos fracciones: AC. GAMA-LINOLENICO	µg/mL	(4.00 - 42.00)
Prueba	ALFALINOLE	5006442		Perfil Acidos grasos fracciones AC. ALFA-LINOLENICO	µg/mL	(3.00 - 21.00)
Prueba	EICOSAPENT	5006443		Perfil Acidos grasos fracciones: AC. EICOSAPENTANOICO	µg/mL	(5.00 - 73.00)
Prueba	DOCOSAHEXA	5006444		Perfil Acidos grasos fracciones: AC. DOCOSAHEXAENOICO	µg/mL	(35.00 - 160.00)

Componentes						
Prueba	ELAIDICO			Perfil ácidos grasos fraccionados: AC. ELAIDICO	µg/mL	(Inf. 10)
Prueba	COCN3N6			Perfil ácidos grasos fraccionados Cociente n6/n3 en suero		(5 - 10)

Descripción: ACIDOS GRASOS LIBRES (NEFA)
Código: NEFA
Técnica: Colorimetría
Unidades: mmol/L
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 ml suero congelado
Valores de referencia: (0.1 - 0.6) (ayunas)
 (Inf. 0.3) (dos horas post-prandial)

Código: ACGERITRO
Descripción: ACIDOS GRASOS, ERITROCITOS (CUANTIFICACIÓN)
Técnica: Cromatografía de gases
 10 mL Sangre total EDTA (2-8 °C - Refrigerar)
Comentario adicional: Proteger de la luz.
 12 horas de ayuno

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	AGE.PALMIT			Perfil AG eritrocitarios: Acido Palmitoleico (C16:1n7)	%	(0.10 - 0.30)
Prueba	AGE.OLEICO			Perfil AG eritrocitarios: Acido Oleico (C18:1n9)	%	(14.70 - 19.80)
Prueba	AGE.ALINOL			Perfil AG eritrocitarios: Acido alfa-Linolenico (C18:3n3)	%	(0.04 - 0.16)
Prueba	AGE.EICOSA	90912-7		Perfil AG eritrocitarios: Acido Eicosapentanoico (C20:5n3)	%	(0.60 - 2.30)
Prueba	AGE.DECOSA	90914-3		Perfil AG eritrocitarios: Acido Docosahexanoico (C22:6n3)	%	(3.10 - 8.50)
Prueba	AGE.LINOLE	90917-6		Perfil AG eritrocitarios: Acido Linoleico (C18:2n6)	%	(8.60 - 13.20)
Prueba	AGE.GLINOL			Perfil AG eritrocitarios: Acido gamma-Linolenico (C18:3n6)	%	(0.04 - 0.50)
Prueba	AGE.DGLINO			Perfil AG eritrocitarios: Acido DH-G Linolenico (C20:3n6)	%	(0.95 - 2.00)
Prueba	AGE.ARAQUI	90913-8		Perfil AG eritrocitarios: Acido Araquidónico (C20:4n6)	%	(10.00 - 16.00)
Prueba	AGE.MIRIST			Perfil AG eritrocitarios: Acido Mirístico (C14:0)	%	(0.13 - 0.67)
Prueba	AGE.PALMIL			Perfil AG eritrocitarios: Acido Palmítico (C16:0)	%	(25.00 - 32.80)
Prueba	AGE.ESTEAR			Perfil AG eritrocitarios: Acido Estearico (C18:0):	%	(17.00 - 21.45)

Componentes						
Prueba	AGE.ELAIDI			Perfil AG eritrocitarios: Acido Elaidico (t-C18:1n9):	%	(Inf. 0.95)
Prueba	AGE.N6N3			Perfil AG eritrocitarios: Indice n6/n3		(2.70 - 6.00)
Prueba	AGE.PDF			AGE. INFORME EN PDF		

Descripción: ACIDOS ORGANICOS EN LCR
Código: ORGANILCR
Técnica: téc. cromatografía de gases/espectrometría de masas
Unidades:
Plazo: 23 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Código: ORGANICO2
Descripción: ACIDOS ORGANICOS EN ORINA
Técnica:
Comentario adicional: 10 ml de orina. Congelar y enviar congelado.Es recomendable que la muestra corresponda a una fase de crisis.Indicar informacion clinica.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	HGLUTARICO			Perfil ORGANICO2: ACIDO 2 HIDROXIGLUTARICO	mmol/mol crea	(Inf. 16)
Prueba	OXOGLUTARI			Perfil ORGANICO2: ACIDO OXOGLUTARICO	mmol/mol crea	(Inf. 152)
Prueba	BUTIRICO			Perfil ORGANICO2: ACIDO 3 HIDROXI BUTIRICO	mmol/mol crea	(Inf. 3)
Prueba	PROPIONICO			Perfil ORGANICO2: ACIDO 3 HIDROXI PROPIONICO	mmol/mol crea	(Inf. 10)
Prueba	VALERICO			Perfil ORGANICO2: ACIDO 3 HIDROXIVALÉRICO	mmol/mol crea	(Inf. 2)
Prueba	MGLUTARICO			Perfil ORGANICO2: ACIDO 3 METILGLUTÁRICO	mmol/mol crea	(Inf. 7)
Prueba	HBUTIRICO			Perfil ORGANICO2: ACIDO 4 HIDROXIBUTIRICO	mmol/mol crea	(Inf. 2)
Prueba	ETILMALONI			Perfil ORGANICO2: ACIDO ETILMALONICO	mmol/mol crea	(Inf. 7)
Prueba	FUMARICO			Perfil ORGANICO2: ACIDO FUMARICO	mmol/mol crea	(Inf. 2)
Prueba	GLICERICO			Perfil ORGANICO2: ACIDO GLICERICO	mmol/mol crea	(Inf. 9)
Prueba	GLICOLICO			Perfil ORGANICO2: ACIDO GLICOLICO	mmol/mol crea	(Inf. 103)
Prueba	GLUTARICO			Perfil ORGANICO2: ACIDO GLUTARICO	mmol/mol crea	(Inf. 10)
Prueba	HOMOVALINI			Perfil ORGANICO2: ACIDO HOMOVANILICO	mmol/mol crea	(Inf. 12)
Prueba	ALACTICO			Perfil ORGANICO2: ACIDO LACTICO	mmol/mol crea	(Inf. 250)
Prueba	METILMALON			Perfil ORGANICO2: ACIDO METILMALONICO	mmol/mol crea	(Inf. 2)

Componentes						
Prueba	NACETILASP			Perfil ORGANICO2: ACIDO N ACETILASPARTICO	mmol/mol crea	(Inf. 2)
Prueba	AOROTICO			Perfil ORGANICO2: ACIDO OROTICO	mmol/mol crea	(Inf. 11)
Prueba	ASUBERICO			Perfil ORGANICO2: ACIDO SUBERICO	mmol/mol crea	(Inf. 8)
Prueba	SUCCACETON			Perfil ORGANICO2: SUCCINILACETONA	mmol/mol crea	(Inf. 2)
Prueba	HEXAGLICI			Perfil ORGANICO2: HEXANOILGLICINA	mmol/mol crea	(Inf. 2)
Prueba	TIGLILGLIC			Perfil ORGANICO2: TIGLILGLICINA	mmol/mol crea	(Inf. 2)
Prueba	ORGANCOMEN			Perfil ORGANICO2; COMENTARIO		

Descripción: ACIDOS ORGANICOS EN SUERO

Código: ORGANICO

Técnica: Cromatografía de gases - Espectrometría de masas

Unidades:

Plazo: 16 días

Tubo: Suero Congelado

Comentario adicional: 2 mL Suero congelado

Valores de referencia: La relación de ácidos orgánicos estudiados corresponde al siguiente perfil: Ácido Adípico, Ácido 2-Ceto-isovalérico, Ácido Cítrico, Ácido Etilmalónico, Ácido Fumárico, Ácido Glicólico, Ácido Glutárico, Ácido 2-hidroxibutírico, Ácido 3-hidroxibutírico, Ácido 4-Hidroxifenilacético, Ácido 2-Hidroxi-isovalérico, Ácido 3-Hidroxi-3-metilglutárico, Ácido Láctico, Ácido Malónico, Ácido Metilmalónico, Ácido Orótico, Ácido Oxálico, Ácido Sebácico, Ácido Subérico, Ácido Succínico.

Descripción: Acidosis láctica infantil letal. Sec Gen: SUCLG1.

Código: GEN_000012

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Acidosis tubular renal distal. Sec Gen: SLC4A1.

Código: GEN_000013

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Acidosis tubular renal proximal AR. Sec Gen: SLC4A4.

Código: GEN_000014

Técnica:

Unidades:

Plazo: 30 días

Descripción: Acidosis tubular renal proximal AR. Sec Gen: SLC4A4.
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Aciduria 3-Metilglutacónica. Panel
Código: GEN_000015
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Aciduria alfa metil acetoacetil. Sec Gen: ACAT1.
Código: GEN_000016
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Aciduria argininosuccínica. Sec Gen: ASL.
Código: GEN_000017
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Aciduria glutárica tipo 1. Sec Gen: GCDH.
Código: GEN_000003
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Aciduria L-2-hidroxiglutarica. Sec Gen: L2HGDH.
Código: GEN_000018
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Aciduria malónica y metilmalónica combi. Sec Gen: ACSF3.
Código: GEN_000019
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Aciduria orótica. Sec Gen: UMPS.
Código: GEN_000020
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Código: ACILCARNIT
Descripción: ACILCARNITINAS
Técnica: LC-MS/MS
Comentario adicional: 1 mL PLASMA HEPARINA/SUERO, congelar y enviar congelado. INDISPENSABLE ENVIAR INFORMACIÓN CLÍNICA

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	CARNITINAL	30191-1		Perfil Acilcarnitinas: CARNITINA LIBRE	mcmol/L	(10.63 - 56.00) < 1 mes (16.17 - 60.74) 1 mes - 1 año (17.60 - 49.12) 1 año - 8 años (19.00 - 60.70) > 8 años
Prueba	ACETILCAR	30191-1		Perfil Acilcarnitinas: ACETIL CARNITINA	mcmol/L	(2.98 - 14.44) < 1 mes (4.61 - 16.33) 1 mes - 1 año (3.99 - 15.67) 1 año - 8 años (3.90 - 14.11) > 8 años
Prueba	PROPIOCAR	30551-6		Perfil Acilcarnitinas:PROPIONIL CARNITINA	mcmol/L	(0.12 - 0.73) < 1 mes (0.22 - 1.02) 1 mes - 1 año (0.23 - 0.92) 1 año - 8 años (0.20 - 0.82) > 8 años
Prueba	BUTIRILCAR	35655-0		Perfil Acilcarnitinas: BUTIRIL CARNITINA	mcmol/L	(0.06 - 0.31) < 1 mes (0.09 - 0.33) 1 mes - 1 año (0.09 - 0.35) 1 año - 8 años (0.07 - 0.38) > 8 años
Prueba	VALERILCAR	39009-6		Perfil Acilcarnitinas: VALERIL CARNITINA	mcmol/L	(0.04 - 0.31) < 1 mes (0.04 - 0.19) 1 mes - 1 año (0.04 - 0.20) 1 año - 8 años (0.04 - 0.20) > 8 años
Prueba	GLUTARICAR	30349-5		Perfil Acilcarnitinas: GLUTARIL CARNITINA	mcmol/L	(0.03 - 0.09) < 1 mes (0.02 - 0.11) 1 mes - 1 año (0.02 - 0.09) 1 año - 8 años (0.02 - 0.11) > 8 años
Prueba	HEXANOICAR	30358-6		Perfil Acilcarnitinas: HEXANOICAR	mcmol/L	(0.01 - 0.11) < 1 mes (0.03 - 0.11) 1 mes - 1 año (0.02 - 0.08) 1 año - 8 años (0.02 - 0.09) > 8 años

Componentes						
Prueba	OCTANOICAR	30540-9		Perfil Acilcarnitinas: OCTANOIL CARNITINA	mcmol/L	(0.03 - 0.15) < 1 mes (0.03 - 0.21) 1 mes - 1 año (0.04 - 0.20) 1 año - 8 años (0.03 - 0.27) > 8 años
Prueba	DECANOICAR	30327-1		Perfil Acilcarnitinas: DECANOIL CARNITINA	mcmol/L	(0.02 - 0.20) < 1 mes (0.05 - 0.25) 1 mes - 1 año (0.06 - 0.36) 1 año - 8 años (0.05 - 0.45) > 8 años
Prueba	LAUROILCAR	30331-3		Perfil Acilcarnitinas: LAUROIL CARNITINA	mcmol/L	(0.02 - 0.13) < 1 mes (0.01 - 0.15) 1 mes - 1 año (0.02 - 0.13) 1 año - 8 años (0.01 - 0.11) > 8 años
Prueba	MISTIROCAR	30565-6		Perfil Acilcarnitinas: MISTIROIL CARNITINA	mcmol/L	(0.01 - 0.07) < 1 mes (0.01 - 0.07) 1 mes - 1 año (0.01 - 0.06) 1 año - 8 años (0.01 - 0.04) > 8 años
Prueba	PALMITOCAR	30356-0		Perfil Acilcarnitinas: PALMITOIL CARNITINA (C16)	mcmol/L	(0.05 - 0.26) < 1 mes (0.04 - 0.17) 1 mes - 1 año (0.05 - 0.19) 1 año - 8 años (0.04 - 0.15) > 8 años
Prueba	OCTADECAR	30560-7		Perfil Acilcarnitinas: OCTADECANOIL CARNITINA	mcmol/L	(0.02 - 0.06) < 1 mes (0.01 - 0.07) 1 mes - 1 año (0.02 - 0.06) 1 año - 8 años (0.02 - 0.07) > 8 años
Prueba	NOTACAR	46252-3		Perfil Acilcarnitinas:COMENTARIO ACILCARNITINAS		

Descripción: ACLARAMIENTO DE ACIDO URICO

Código: CLEARANURI

Técnica: Espectrofotometría

Unidades: mL/min

Plazo: 3 días

Tubo: Orina 24 Horas

Comentario adicional: 1 mL Suero
Indicar diuresis

Valores de referencia: (Sup. 10)

Descripción: ACLARAMIENTO DE ALFA-1 ANTITRIPSINA FECAL

Código: ACLARATT

Técnica: Nefelometría

Unidades: mL/24 h

Plazo: 5 días

Tubo: heces especiales

Comentario adicional: 1 mL suero y 5 g heces. Indispensable indicar peso de heces/24 h o 72 h. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO

Valores de referencia: (Inf. 20)

Descripción: ACLARAMIENTO DE CREATININA

Código: CLEARANCEC

Técnica: Espectrofotometría

Unidades: mL/min

Plazo: 3 días

Tubo: Orina 24 Horas

Descripción: ACLARAMIENTO DE CREATININA
Comentario adicional: Suero y diuresis
Valores de referencia: (70 - 120)

Descripción: ACLARAMIENTO DE UREA
Código: CLEARANCEU
Técnica: Espectrofotometria
Unidades: mL/min
Plazo: 3 días
Tubo: Orina 24 Horas
Comentario adicional: Suero y diuresis
Valores de referencia: (59 - 94) Depuración Estandar
 (70 - 170) Depuración máxima

Descripción: Acondrogénesis tipo 2. Sec Gen: COL2A1.
Código: GEN_000021
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Acondroplasia: mutaciones G380R y G375C gen FGFR3
Código: ACONDROPLA
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
 Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Acrodisostosis. Sec Gen: PRKAR1A.
Código: GEN_000022
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Acromatopsia. Panel
Código: GEN_000023
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Descripción: Acromatopsia. Panel

Valores de referencia:

Descripción: ACTH (H.ADRENOCORTICOTROPA) PLASMA
Código: ACTH
Técnica: Técnica ICMA
Unidades: pg/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Plasma EDTA Pruebas Especiales
Comentario adicional: Plasma EDTA separado y congelado. Enviar congelado.
Valores de referencia: (Inf. 48.8)

Descripción: ACTIVIDAD ANTI FACTOR Xa
Código: ACTIVIDFXA
Técnica: método cronométrico
Unidades: UI/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional: Separa plasma y congelar inmediatamente y enviar congelado al laboratorio
Valores de referencia: (0.6 - 1.0) Rango terapéutico HBPM cada 12 horas
 (1.0 - 2.0) Rango terapéutico HBPM cada 24 horas
 HBPM: Heparinas de bajo peso molecular

Código: ADALIMUMAB
Descripción: ADALIMUMAB NIVELES SUERO Y AC. ANTIADALIMUMAB
Técnica: FIA
 2 mL Suero
Comentario adicional: Alternativa: plasma
 Toma de muestras antes de la administración de la próxima dosis.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	ADALIMUNIV	74117-3		PERFIL ADALIMUMAB NIVELES SUERO	µg/mL	Límite de cuantificación 0.20 µg/mL. Los rangos óptimos terapéuticos son específicos de la enfermedad.
Prueba	ADALIMUAC	74116-5		PERFIL ADALIMUMAB AC. SUERO	AU/mL	(Inf. 10) No se detectan

Descripción: Adams-Oliver tipo 5, Sd. Sec Gen: NOTCH1
Código: GEN_000693
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: ADAMTS-13 anticuerpos en plasma
Código: ADAMTS13AC

Descripción: ADAMTS-13 anticuerpos en plasma
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Plasma de Citrato congelado
Comentario adicional: 2 mL Plasma Citrato sódico, CONGELAR.
Valores de referencia:

Descripción: ADDIS RECuento ORINA
Código: ADDIS
Técnica: Microscopía óptica
Unidades: /24h
Plazo: 3 días
Tubo: ADDIS orina 24 horas
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 1000000) Hematíes
 (Inf. 2000000) Leucocitos
 (Inf. 5000) C. Hialinos

Descripción: Adenocarcinoma de pulmón. Sec Gen: ERBB2.
Código: GEN_000024
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Adenomas aislados de hipófisis familiar. Sec Gen: AIP.
Código: GEN_000025
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: ADENOSINA DESAMINASA (ADA) EN MUESTRA
Código: ADAMUES
Técnica:
Unidades: U/L
Plazo: 4 días
Tubo: Muestra envíos externos
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: ADENOSINA DESAMINASA (ADA) SUERO
Código: ADASU
Técnica: Cinética - Espectrofotometría
Unidades: U/L

Descripción: ADENOSINA DESAMINASA (ADA) SUERO
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero
 Alternativa: plasma de heparina.
 Centrifugar inmediatamentey mantener cerrado herméticamente.
Valores de referencia: (0.0 - 15.0)

Descripción: ADENOSINA DESAMINASA LCR
Código: ADALCR
Técnica: Cinetica - Espectrofotometria
Unidades: U/L
Plazo: 4 días
Tubo: Liquido cefalorraquideo congelado
Comentario adicional: LCR de aspecto claro obtenido en tubo estéril sin anticoagulante. Centrifugar la muestra, separar y congelar sobrenadante. Enviar sobrenadante congelado.
 Volumen mínimo 200 mcL.
Valores de referencia: (Inf. 9)

Descripción: ADENOVIRUS AC. IGG
Código: ADENOACG
Técnica: Técnica CLIA
Unidades: Indice
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 0.8) Negativo
 (0.8 - 1.1) Indeterminado
 (Sup. 1.1) Positivo

Descripción: ADENOVIRUS AC. IgG EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
Código: ADENOACGLC
Técnica: Tec. EIA
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo
 (Sup. 1) Positivo

Descripción: ADENOVIRUS AC. IGM
Código: ADENOACM
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero
 Alternativa Plasma (citrato, heparina)
Valores de referencia: (Inf. 9) Negativo
 (9 - 11) Indeterminado
 (Sup. 11) Positivo

Descripción: ADENOVIRUS AC. IgM EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
Código: ADENOACMLC
Técnica: TEC. EIA
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo
(Sup. 1) Positivo

Descripción: ADENOVIRUS ANTÍGENO EN HECES
Código: ADENOV1
Técnica: Inmunocromatografía
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Heces No Microbiología
Comentario adicional: 5 g de heces
Valores de referencia:

Descripción: ADENOVIRUS ANTÍGENO EN MUESTRA NASO-FARINGEAS
Código: ADENORESP
Técnica: Aglutinación
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Microbiología
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Adenovirus DNA PCR Cualitativa
Código: PCRADENOV
Técnica: Q-PCR
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Muestra envíos externos
Comentario adicional: LCR, aspirado nasofaríngeo, BAL, hisopo conjuntival, orina, sangre total, biopsia y heces.
Valores de referencia:

Descripción: ADIPONECTINA
Código: ADIPONECTI
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: µg/mL
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 ml Suero CON gel separador.
Conservación: CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO
Volumen mínimo: 0.5 mL
Valores de referencia: (3.40 - 19.50) IMC < 25
(2.60 - 13.70) IMC 25-30
(1.80 - 9.40) IMC > 30

Descripción: ADN CAPILAR: CARGA GENETICA ASOCIADA A ALOPECIA
Código: ADNCAPILAR
Técnica:
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional: Kit especial. Solicitar a almacén
Valores de referencia:

Descripción: Adrenoleucodistrofia ligada al X: gen ABCD1 (NGS)
Código: ABCD1_MUTS
Técnica: NGS con TSOE de Illumina y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Muestras de tejido tumotal y sangre.
 Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Afibrinogenemia congénita. Panel
Código: GEN_000026
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Afibrinogenemia congénita. Sec Gen: FGG.
Código: GEN_000027
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Agamaglobulinemia ligada al X. Sec Gen: BTK.
Código: GEN_000028
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Agenesia renal. Sec Gen: UPK3A.
Código: GEN_000029
Técnica:

Descripción: Agenesia renal. Sec Gen: UPK3A.
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: AGLUTININA ANTI-A
Código: AGLUANTIA
Técnica: Columna gel
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: Plasma EDTA, alternativo suero
Valores de referencia: NEGATIVO

Descripción: AGLUTININA ANTI-B
Código: AGLUANTIB
Técnica: Columna gel
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: Plasma EDTA, alternativo suero
Valores de referencia: NEGATIVO

Descripción: AGOMELATINA SUERO
Código: AGOMELATIN
Técnica: CROMATOGRFÍA LÍQUIDA-TÁNDEM MASAS
Unidades: ng/mL
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (7 - 300) 1-2 h después de 50 mg (AGNP 2017)

Descripción: Alagille. Panel
Código: GEN_000030
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Albinismo cutáneo. Panel
Código: GEN_000031
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Descripción: Albinismo cutáneo. Panel

Valores de referencia:

Descripción: Albinismo ocular ligado al cr. X. Sec Gen: GPR143.

Código: GEN_000032

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Albinismo oculocutáneo. Panel

Código: GEN_000033

Técnica:

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Albinismo oculocutáneo: gen TYR (NGS)

Código: TYROSINASA

Técnica: PCR, secuenciación y MLPA

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: ALBUMINA

Código: ALB

Técnica:

Unidades: g/dL

Plazo: 3 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional:

Valores de referencia: (2.8 - 4.4) 1 día - 4 días
(3.8 - 5.4) 4 días - 14 años
(3.5 - 5.2) 14 años - 60 años
(3.2 - 4.6) 60 años - 90 años
(2.9 - 4.5) > 90 años

Descripción: ALBUMINA EN LCR

Código: ALBLCR

Técnica: Nefelometría

Unidades: mg/dL

Plazo: 4 días

Tubo: Líquidos Biológicos

Comentario adicional: LCR. refrigerar.

Descripción: ALBUMINA EN LCR

Valores de referencia: (Inf. 35)

Descripción: Alcaptonuria. Sec Gen: HGD.

Código: GEN_000034

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: ALCOHOL (ETANOL) EN ORINA

Código: ALCOHOLOR

Técnica: Enzimática

Unidades: mg/dL

Plazo: 4 días

Tubo: Orina Drogas de Abuso

Comentario adicional: Orina. Micción aislada

Valores de referencia: (Inf. 10.0) Límite de detección de la técnica

Descripción: ALCOHOL (ETANOL)

Código: ALCOHOL

Técnica: Enzimática

Unidades: g/L

Plazo: 3 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: Tubo de suero. Durante la extracción no utilizar alcohol etílico para desinfectar la zona. Rotular el tubo con la palabra "ETANOL". Tubo exclusivo para esta determinación.

Valores de referencia: (Inf. 0.1) No detectable
(0.1 - 0.5) Ligera euforia
(0.5 - 1.0) Rubor, retardo de reflejos
(1.0 - 2.0) Depresión SNC
(Sup. 2.0) Intoxicación severa
(Sup. 3.5) Coma

Descripción: Alcohol metílico (metanol) en sangre

Código: METANOL

Técnica: Cromatografía gases-Detección con ionización de llama

Unidades: mg/L

Plazo: 7 días

Tubo: EDTA sangre total Referencia

Comentario adicional: 2 mL sangre total (EDTA) refrigerado

Valores de referencia: (Inf. 5) Personas no expuestas

Descripción: ALDOLASA

Código: ALDOLASA

Técnica: Cinética- Espectrofotometría

Unidades: U/L a 37 °C

Plazo: 6 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 0.5 mL suero o plasma citrato, oxalato o EDTA

Descripción: ALDOLASA
Valores de referencia: (Inf. 7.6)

Descripción: ALDOSTERONA
Código: ALDOS
Técnica: CLIA
Unidades: ng/dL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero. Como alternativa se admite plasma EDTA
Valores de referencia: (1.76 - 23.2) P. supina
 (2.52 - 39.2) P. erguida

Descripción: ALDOSTERONA EN ORINA
Código: ALDOS2
Técnica: RIA
Unidades: µg/24h
Plazo: 6 días
Tubo: Orina 24 Horas
Comentario adicional: 10 mL orina de orina de 24 h. (alícuota) Refrigerar.
 Indicar volumen de 24h

La ingestión excesiva de regaliz puede disminuir los niveles, ya que esa sustancia produce un efecto similar al de la aldosterona.

El ejercicio agotador y el estrés pueden estimular las secreciones adrenocorticales y elevar el nivel de aldosterona.

La postura, la dieta y el embarazo influyen en el resultado.

Supender los fármacos que alteran el equilibrio de sodio, potasio y líquidos (p. ej., diuréticos, hipotensores, esteroides)

Valores de referencia: (Inf. 18) La postura, la dieta y el embarazo influyen en el resultado.

Descripción: ALERGIA METALES (UN METAL)
Código: MELISA
Técnica:
Unidades:
Plazo: 23 días
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional: TUBOS ESPECIALES para prueba MELISA Pedir a almacen. Envío lunes-martes (laborables excepto vísperas de festivos).
Valores de referencia:

Descripción: Alexander, enfermedad de. Sec Gen: GFAP.
Código: GEN_000035
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: ALFA AMILASA EN SALIVA
Código: AMISALIVA
Técnica: ENZIMOINMUNOANÁLISIS
Unidades: U/mL

Descripción:	ALFA AMILASA EN SALIVA
Plazo:	8 días
Tubo:	Saliva
Comentario adicional:	1 mL de saliva.
Valores de referencia:	(3.1 - 423.1) Valores orientativos
Descripción:	ALFA AMINOADIPICO SEMIALDEHIDO ORINA
Código:	AMINOADIOR
Técnica:	Cromatografía Líquida Tándem-Masas (LC-MS/MS)
Unidades:	mmol/molcrea
Plazo:	47 días
Tubo:	Orina basal
Comentario adicional:	10 mL orina micción aislada. Indispensable fecha de nacimiento e historia clínica del paciente.
Valores de referencia:	(0.27 - 2.85)
Descripción:	ALFA CAROTENO, SUERO
Código:	ACA
Técnica:	EIA
Unidades:	µg/l
Plazo:	14 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	Suero. CONGELADO. Separar y congelar inmediatamente. Muestra protegida de la luz
Valores de referencia:	(Inf. 350)
Descripción:	ALFA GLUCOSIDASA PLASMA SEMINAL
Código:	GLUCOSIDSE
Técnica:	Espectrofotometría
Unidades:	mUI/mL
Plazo:	17 días
Tubo:	Semen
Comentario adicional:	1 ml de plasma seminal Congelar y enviar congelado Indicar volumen eyaculado
Valores de referencia:	Igual o superior a 20 mU/eyaculado Igual o superior a 6.35 mUI/mL
Descripción:	ALFA GLUCOSIDASA (E.POMPE) EDTA
Código:	GLUCOSISAN
Técnica:	Fluorimetría
Unidades:	nmol/h/mg prot
Plazo:	34 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	3.0 mL sangre total EDTA Coordinar previamente toma y envío de muestras con el laboratorio. Consultar con el laboratorio otro tipo de muestra.
Valores de referencia:	(6 - 32)
Descripción:	ALFA GLUCOSIDASA (E.POMPE) SANGRE SECA
Código:	GLUCOSISEC

Descripción: ALFA GLUCOSIDASA (E.POMPE) SANGRE SECA
Técnica: Fluorimetrica
Unidades: nmols/21hxdisco
Plazo: 32 días
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional: Sangre seca recogida en papel de filtro especial
 Pedir instrucciones
 Indispensable informe clinico y antecedentes familiares
Valores de referencia: (0.47 - 8.27)

Descripción: ALFA INTERFERON, SUERO
Código: AITFS
Técnica: EIA
Unidades: UI/mL
Plazo: 25 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: Suero congelado
Valores de referencia: (Inf. 2)

Descripción: Alfa triptasemia hereditaria TPSAB1, TPSB2 (ddPCR)
Código: TRIPTASEM
Técnica: Ensayo de CNV por ddPCR
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Alfa triptasemia hereditaria TPSAB1, TPSB2 (ddPCR)
Código: TRIPTASEM
Técnica: Ensayo de CNV por ddPCR
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Alfa triptasemia hereditaria TPSAB1, TPSB2 (ddPCR)
Código: TRIPTASEM
Técnica: Ensayo de CNV por ddPCR
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Alfa triptasemia hereditaria TPSAB1, TPSB2 (ddPCR)
Código: TRIPTASEM
Técnica: Ensayo de CNV por ddPCR
Unidades:

Descripción: Alfa triptasemia hereditaria TPSAB1, TPSB2 (ddPCR)
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Alfa triptasemia hereditaria TPSAB1, TPSB2 (ddPCR)
Código: TRIPTASEM
Técnica: Ensayo de CNV por ddPCR
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: ALFA-1 ANTITRIPSINA FECAL
Código: A1ATTFEC
Técnica: Técnica Nefelometría-turbidimetría
Unidades: mg/g heces hum.
Plazo: 8 días
Tubo: heces especiales
Comentario adicional: Volumen 0.5 g (mínimo 0.3 g)
Valores de referencia: (Inf. 0.76)

Descripción: ALFA-1-ANTITRIPSINA
Código: A1ANTI
Técnica: Turbidimetría
Unidades: mg/dL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL suero
 Alternativa: plasma de heparina
Valores de referencia: (90 - 200)

Descripción: Alfa-1-Antitripsina fenotipo en suero
Código: A1ANTIFENO
Técnica: isoelectroenfoque e inmunofijación
Unidades:
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 mL. Separar y enviar congelado
Valores de referencia: El déficit de alfa-1-antitripsina se asocia habitualmente al fenotipo Z, pero los fenotipos S y SZ presentan también niveles disminuidos de alfa-1-antitripsina. El resultado obtenido no descarta la presencia de variantes alélicas minoritarias, que pueden ocasionar, o no, niveles disminuidos de alfa-1-antitripsina, (Ejemplo: Fenotipo nulo).

Descripción: ALFA-1-FETOPROTEINA
Código: A1FETO.
Técnica: CMIA

Descripción: ALFA-1-FETOPROTEINA
Unidades: ng/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Alternativo heparina de sodio y litio, EDTA.
Valores de referencia: (Inf. 8.8)
 Observaciones: En los primeros meses de vida, los valores son mucho más elevados, descendiendo gradualmente

Descripción: ALFA-1-FETOPROTEINA LIQUIDO AMNIOTICO
Código: A1FETOLIQ
Técnica:
Unidades: ng/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia: 16410 Mediana semana 15
 13380 Mediana semana 16
 10910 Mediana semana 17
 8890 Mediana semana 18
 7250 Mediana semana 19
 5910 Mediana semana 20
 4820 Mediana semana 21

Descripción: ALFA-1-FETOPROTEINALCR
Código: A1FETOLCR
Técnica: Inmunoluminiscencia
Unidades: U/mL
Plazo: 8 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 ml de LCR
Valores de referencia: (Inf. 1.5) (Standard WHO 72/225)

Descripción: ALFA-1-GLUCOPROTEINA ACIDA (OROSOMUCOIDE)
Código: A1GLUCO
Técnica: Inmunoturbidimetría
Unidades: mg/dL
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero. Alternativa plasma de heparina
Valores de referencia: (50 - 120)

Descripción: ALFA-1-MICROGLOBULINA (ORINA)
Código: ALFA1MICRO
Técnica: Nefelometría
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Orina basal
Comentario adicional: Orina. Refrigerar.
Valores de referencia: (Inf. 12)

Descripción: ALFA2-ANTIPLASMINA EN PLASMA
Código: ANTIPLASMI
Técnica: Téc. Espectrometría de Absorción Molecular
Unidades: %
Plazo: 15 días
Tubo: Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional: 2 mL Plasma Citrato Sódico congelado. TUBO INDEPENDIENTE PARA ESTE ANÁLISIS.
Valores de referencia: (80 - 120)

Descripción: Alfa-2-Macroglobulina
Código: A2MACRO
Técnica: Inmunonefelometría
Unidades: mg/dL
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero. REFRIGERAR
Valores de referencia: (130 - 300) Standard IFCC/BCR/CAP - CRM 470

Descripción: ALFA-GALACTOSIDASA A, SUERO
Código: ALFAGALAC
Técnica: fluorometría
Unidades: nmol/h/mL
Plazo: 19 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 2 mL suero, Congelar inmediatamente.
 Se requiere información clínica y fecha de nacimiento.
Valores de referencia: (2.4 - 10.2)

Descripción: Alfa-manosidosis. Sec Gen: MAN2B1.
Código: GEN_000037
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Alfa-talasemia HBA. Del a3.7, a4.2, a20.5, aSEA, aFIL, aMED
Código: GEN_000038
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Alfa-talasemia. Sec Gen: HBA.
Código: GEN_000039
Técnica:
Unidades:

Descripción: Alfa-talasemia. Sec Gen: HBA.
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Allan-Herndon-Dudley, Sd. Sec Gen: SLC16A2.
Código: GEN_000040
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Alport y nefropatía por membrana basal fina, Sd. Panel
Código: GEN_000041
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: ALPRAZOLAM
Código: ALPRAZOLAM
Técnica: LC-MS/MS
Unidades: µg/L
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: (5 - 50) Niveles terapéuticos
 (Inf. 2) Límite de cuantificación: 2µg/l

Descripción: Alteraciones de la región 19q13. Reord/Amplificación
Código: MDFISH19Q
Técnica:
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional: 5-20 ml sangre periférica.
 min 2 ml médula ósea.
 Muestra alternativa: tejido fresco o fijado/parafinado
Valores de referencia:

Descripción: Alteraciones del gen EGFR (17p11). Reord/Amplificación.
Código: MDFISHEGFR
Técnica:
Unidades:
Plazo: 5 días

Descripción: Alteraciones del gen EGFR (17p11). Reord/Amplificación.
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional: 5-20 ml sangre periférica.
 min 2 ml médula ósea.
 Muestra alternativa: tejido fresco o fijado/parafinado
Valores de referencia:

Descripción: Alteraciones del gen FGFR1 (8p11). Reord/Amplificación
Código: MDFISHFGFR
Técnica:
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional: 5-20 ml sangre periférica.
 min 2 ml médula ósea.
 Muestra alternativa: tejido fresco o fijado/parafinado
Valores de referencia:

Descripción: Alteraciones del gen MET (7q31). Reord/Amplificación
Código: MDFISHMET
Técnica:
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional: 5-20 ml sangre periférica.
 min 2 ml médula ósea.
 Muestra alternativa: tejido fresco o fijado/parafinado
Valores de referencia:

Descripción: Alteraciones numéricas del cromosoma 7
Código: MDFISHCEN7
Técnica:
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional: 5-20 ml sangre periférica.
 min 2 ml médula ósea.
 Muestra alternativa: tejido fresco o fijado/parafinado
Valores de referencia:

Descripción: Alteraciones numéricas del cromosoma 8 (Trisomía 8)
Código: MDFISHCEN8
Técnica:
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional: 5-20 ml sangre periférica.
 min 2 ml médula ósea.
 Muestra alternativa: tejido fresco o fijado/parafinado
Valores de referencia:

Descripción:	ALUMINIO
Código:	AL
Técnica:	Técnica ICP-MS
Unidades:	µg/L
Plazo:	6 días
Tubo:	especial aluminio
Comentario adicional:	Tubo especial de suero libre de elementos traza con instrucciones según protocolo (REF:368380). Pedir a almacén en caso de no disponer del tubo. De manera alternativa también se podrá procesar en plasma de heparina sódica libre de elementos traza (REF:456080) de o plasma EDTA libre de elementos traza (REF:368381).
Valores de referencia:	(Inf. 10) en población sin patología. (Inf. 20) en pacientes hemodializados. Valores de referencia adaptados de las guías K/DOQI (Inf. 60) .Valores superiores a 60 ug/L potencialmente tóxicos.
Descripción:	ALUMINIO EN ORINA FINAL DE JORNADA
Código:	AL2
Técnica:	ICP-MS
Unidades:	ug/g creatinina
Plazo:	6 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	10 mL orina (micción aislada). Al final del turno en exposición laboral.
Valores de referencia:	(Inf. 15) personas no expuestas. (Inf. 50) personas expuestas a ALUMINIO. Valor límite biológico (BAT-DFG) al final de la semana laboral. (Inf. 5) Límite de cuantificación
Descripción:	Alzheimer, enfermedad de. Panel
Código:	GEN_000044
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	
Descripción:	AMANITINAS (AMATOXINAS) EN ORINA
Código:	AMANITINAS
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	ng/mL
Plazo:	5 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	10 mL de orina
Valores de referencia:	(Inf. 3)
Descripción:	Amaurosis congénita de Leber 13: gen RDH12 (NGS)
Código:	RDH12_MUTS
Técnica:	PCR y secuenciación
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Amaurosis congénita de Leber 13: gen RDH12 (NGS)
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Amaurosis congénita de Leber: >10 genes (NGS)
Código: LEBER_MUTS
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.
Alternativa: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: AMIKACINA
Código: AMIKA
Técnica: FPIA
Unidades: µg/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (20 - 25) Pico
(5 - 10) Valle

Descripción: AMILASA
Código: AMI
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: U/L a 37 °C
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL suero
También Líquidos biológicos
Valores de referencia: (25 - 125) < 70 años
(20 - 160) > 70 años

Descripción: AMILASA ORINA
Código: AMI2
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: U/L
Plazo: 3 días
Tubo: Orina Bioquímica
Comentario adicional:
Valores de referencia: (110 - 555)

Descripción: AMILASA PANCREATICA
Código: AMIPAN
Técnica: Inhibición con anticuerpos - Enzimático colorimétrico
Unidades: U/L
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal

Descripción: AMILASA PANCREATICA
Comentario adicional: 0.5 mL suero
 0.5 ml plasma heparina litio alternativo
Valores de referencia: (8 - 53)

Descripción: AMILASA PANCREATICA EN LIQUIDO QUISTICO
Código: AMILLIQQ
Técnica: Cinética-inhibición: Inhibición por anticuerpos monoclonales (substrato etilideno G7 PNP)
Unidades: U/L
Plazo: 5 días
Tubo: Líquido Bioquímica
Comentario adicional: 1 mL de líquido de quiste pancreático
Valores de referencia: (Inf. 250)

Descripción: AMILOIDE A (SAA-1) SUERO
Código: AMILOIDEA
Técnica: Nefelometría
Unidades: mg/L
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Volumen 1.0 mL (mínimo 0.50 mL)
Valores de referencia: (Inf. 6.4)

Descripción: Amiloidosis. Panel NGS
Código: AMILOID
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM.
Valores de referencia:

Código: AMINOLCR
Descripción: AMINOACIDOS EN LCR
Técnica: UHPLC
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	ASPLCR	22655-5		PERFIL AA EN LCR: AC. ASPARTICO	mcmol/L	(Inf. 5) < 1 mes (Inf. 5) 1 mes - 2 años (Inf. 5) 2 años - 18 años (Inf. 5) > 18 años
Prueba	GLUTLCR	22652-2		PERFIL AA EN LCR: AC. GLUTAMICO	mcmol/L	(Inf. 15) < 1 mes (Inf. 15) 1 mes - 2 años (Inf. 15) 2 años - 18 años (Inf. 15) > 18 años
Prueba	ASPALCR	26603-1		PERFIL AA EN LCR: ASPARAGINA	mcmol/L	(4 - 21) < 1 mes (4 - 21) 1 mes - 2 años (4 - 21) 2 años - 18 años (4 - 21) > 18 años

Componentes						
Prueba	SERLCR	22644-9		PERFIL AA EN LCR: SERINA	mcmol/L	(20 - 66) < 1 mes (20 - 66) 1 mes - 2 años (20 - 66) 2 años - 18 años (20 - 66) > 18 años
Prueba	GLILCR	22650-6		PERFIL AA EN LCR: GLICINA	mcmol/L	(Inf. 21) < 1 mes (Inf. 21) 1 mes - 2 años (Inf. 21) 2 años - 18 años (Inf. 21) > 18 años
Prueba	TRELCR	22643-1		PERFIL AA EN LCR: TREONINA	mcmol/L	(3 - 80) < 1 mes (3 - 74) 1 mes - 2 años (3 - 74) 2 años - 18 años (3 - 72) > 18 años
Prueba	ARGLCR	22656-3		PERFIL AA EN LCR: ARGININA	mcmol/L	(4 - 31) < 1 mes (4 - 31) 1 mes - 2 años (4 - 31) 2 años - 18 años (4 - 45) > 18 años
Prueba	ALALCR	22657-1		PERFIL AA EN LCR: ALFA-ALANINA	mcmol/L	(24 - 61) < 1 mes (17 - 41) 1 mes - 2 años (16 - 40) 2 años - 18 años (16 - 40) > 18 años
Prueba	TAULCR	26614-8		PERFIL AA EN LCR: TAURINA	mcmol/L	(60 - 86) < 1 mes (60 - 86) 1 mes - 2 años (60 - 86) 2 años - 18 años (60 - 86) > 18 años
Prueba	TIRLCR	22642-3		PERFIL AA EN LCR: : TIROSINA	mcmol/L	(5 - 23) < 1 mes (5 - 23) 1 mes - 2 años (5 - 23) 2 años - 18 años (5 - 23) > 18 años
Prueba	METLCR	22648-0		PERFIL AA EN LCR: METIONINA	mcmol/L	(2 - 10) < 1 mes (2 - 7) 1 mes - 2 años (2 - 7) 2 años - 18 años (2 - 12) > 18 años
Prueba	VALLCR	22649-8		PERFIL AA EN LCR: VALINA	mcmol/L	(Inf. 30) < 1 mes (Inf. 30) 1 mes - 2 años (Inf. 30) 2 años - 18 años (Inf. 30) > 18 años
Prueba	TRIPLCR	26602-3		PERFIL AA EN LCR: TRIPTOFANO	mcmol/L	(12 - 23) < 1 mes (12 - 20) 1 mes - 2 años (12 - 20) 2 años - 18 años (12 - 26) > 18 años
Prueba	FENALALCR	22646-4		PERFIL AA EN LCR: FENILALANINA	mcmol/L	(6 - 29) < 1 mes (6 - 34) 1 mes - 2 años (6 - 34) 2 años - 18 años (6 - 36) > 18 años
Prueba	SOLELCR	22659-7		PERFIL AA EN LCR: ISOLEUCINA	mcmol/L	(3 - 14) < 1 mes (3 - 14) 1 mes - 2 años (3 - 14) 2 años - 18 años (3 - 14) > 18 años
Prueba	LEULCR	9412-8		PERFIL AA EN LCR: LEUCINA	mcmol/L	(12 - 26) < 1 mes (12 - 23) 1 mes - 2 años (12 - 23) 2 años - 18 años (12 - 36) > 18 años
Prueba	ORNLCR	22647-2		PERFIL AA EN LCR: ORNITINA	mcmol/L	(2 - 13) < 1 mes (1.8 - 17) 1 mes - 2 años (1.8 - 17) 2 años - 18 años (2 - 23) > 18 años
Prueba	LISLCR	22651-4		PERFIL AA EN LCR: LISINA	mcmol/L	(10 - 35) < 1 mes (10 - 43) 1 mes - 2 años (10 - 43) 2 años - 18 años (10 - 43) > 18 años

Componentes						
Prueba	AAABLCR	26586-8		PERFIL AA LCR: ACIDO ALFA-AMINO BUTÍRICO	mcmol/L	(Inf. 11) < 1 mes (Inf. 7) 1 mes - 2 años (Inf. 7) 2 años - 18 años (Inf. 7) > 18 años
Prueba	ABABLCR	26590-0		PERFIL AA LCR: AC. BETA AMINOISOBUTÍRICO	mcmol/L	(Inf. 1) < 1 mes (Inf. 1) 1 mes - 2 años (Inf. 1) 2 años - 18 años (Inf. 1) > 18 años
Prueba	AGABLCR	26594-2		PERFIL AA LCR: ACIDO GAMMA AMINO BUTÍRICO	mcmol/L	(Inf. 2) < 1 mes (Inf. 2) 1 mes - 2 años (Inf. 2) 2 años - 18 años (Inf. 2) > 18 años
Prueba	ALLOILCR	22658-9		PERFIL AA LCR: ALLO-ISOLEUCINA	mcmol/L	(Inf. 1) < 1 mes (Inf. 1) 1 mes - 2 años (Inf. 1) 2 años - 18 años (Inf. 1) > 18 años
Prueba	ANSLCR	26588-4		PERFIL AA LCR: ANSERINA	mcmol/L	(Inf. 1) < 1 mes (Inf. 1) 1 mes - 2 años (Inf. 1) 2 años - 18 años (Inf. 1) > 18 años
Prueba	APPLCR	54327-2		PERFIL AA LCR: ACIDO PIPECÓLICO	mcmol/L	(Inf. 12) < 1 mes (Inf. 14) 1 mes - 2 años (Inf. 14) 2 años - 18 años (Inf. 24) > 18 años
Prueba	BALLCR	26589-2		PERFIL AA LCR: BETA-ALANINA	mcmol/L	(Inf. 2) < 1 mes (Inf. 2) 1 mes - 2 años (Inf. 2) 2 años - 18 años (Inf. 2) > 18 años
Prueba	CARLCR	26591-8		PERFIL AA LCR: CARNOSINA	mcmol/L	(Inf. 1) < 1 mes (Inf. 1) 1 mes - 1 año (Inf. 1) 2 años - 18 años (Inf. 1) > 18 años
Prueba	CISLCR	22653-0		PERFIL AA LCR: CISTINA	mcmol/L	(Inf. 5) < 1 mes (Inf. 5) 1 mes - 2 años (Inf. 5) 2 años - 18 años (Inf. 5) > 18 años
Prueba	CISTALCR	26592-6		PERFIL AA LCR: CISTATIONINA	mcmol/L	(Inf. 3) < 1 mes (Inf. 3) 1 mes - 2 años (Inf. 3) 2 años - 18 años (Inf. 3) > 18 años
Prueba	CITLCR	22654-8		PERFIL AA LCR: CITRULINA	mcmol/L	(Inf. 6) < 1 mes (Inf. 6) 1 mes - 2 años (Inf. 6) 2 años - 18 años (Inf. 6) > 18 años
Prueba	ETALCR	26593-4		PERFIL AA LCR: ETANOLAMINA	mcmol/L	(16 - 35) < 1 mes (7 - 84) 1 mes - 2 años (7 - 84) 2 años - 18 años (4 - 17) > 18 años
Prueba	FETALCR	26597-5		PERFIL AA LCR: FOSFOETANOLAMINA	mcmol/L	(Inf. 6) < 1 mes (Inf. 6) 1 mes - 2 años (Inf. 6) 2 años - 18 años (Inf. 6) > 18 años
Prueba	FOSLCR	26737-7		PERFIL AA LCR: FOSFOSERINA	mcmol/L	(Inf. 1) < 1 mes (Inf. 1) 1 mes - 2 años (Inf. 1) 2 años - 18 años (Inf. 1) > 18 años
Prueba	GTMLCR	22641-5		PERFIL AA LCR: GLUTAMINA	mcmol/L	(541 - 988) < 1 mes (281 - 1132) 1 mes - 2 años (370 - 886) 2 años - 18 años (370 - 886) > 18 años

Componentes						
Prueba	HIDLCR	26596-7		PERFIL AA LCR: HIDROXIPROLINA	mcmol/L	(Inf. 4) < 1 mes (Inf. 4) 1 mes - 2 años (Inf. 4) 2 años - 18 años (Inf. 4) > 18 años
Prueba	HILISLCR	26595-9		PERFIL AA LCR: HIDROXILISINA	mcmol/L	(Inf. 1) < 1 mes (Inf. 1) 1 mes - 2 años (Inf. 1) 1 año - 18 años (Inf. 1) > 18 años
Prueba	HISLCR	9453-2		PERFIL AA LCR: HISTIDINA	mcmol/L	(7 - 24) < 1 mes (3 - 37) 1 mes - 2 años (3 - 37) 2 años - 18 años (4 - 24) > 18 años
Prueba	HOMOLCR	22660-5		PERFIL AA LCR: HOMOCISTEÍNA	mcmol/L	(Inf. 1) < 1 mes (Inf. 1) 1 mes - 2 años (Inf. 1) 2 años - 18 años (Inf. 1) > 18 años
Prueba	HOMLCR	55875-9		PERFIL AA LCR: HOMOCITRULINA	mcmol/L	(Inf. 1) < 1 mes (Inf. 1) 1 mes - 2 años (Inf. 1) 2 años - 18 años (Inf. 1) > 18 años
Prueba	LCRACT	22651-4		PERFIL AA LCR: ACETILTROSINA	mcmol/L	(Inf. 1) < 1 mes (Inf. 1) 1 mes - 2 años (Inf. 1) 2 años - 18 años (Inf. 1) > 18 años
Prueba	LCRADEH			PERFIL AA LCR: ADENOSILHOMOCISTEINA	mcmol/L	(Inf. 1) < 1 mes (Inf. 1) 1 mes - 2 años (Inf. 1) 2 años - 18 años (Inf. 1) > 18 años
Prueba	MTH_1LCR	26584-3		PERFIL AA LCR: 1-METIL HISTIDINA	mcmol/L	(Inf. 3) < 1 mes (Inf. 3) 1 mes - 2 años (Inf. 3) 2 años - 18 años (Inf. 3) > 18 años
Prueba	MTH_3LCR	26585-0		PERFIL AA LCR: 3-METIL HISTIDINA	mcmol/L	(Inf. 3) < 1 mes (Inf. 3) 1 mes - 2 años (Inf. 3) 2 años - 18 años (Inf. 3) > 18 años
Prueba	PROLCR	22645-6		PERFIL AA LCR: PROLINA	mcmol/L	(Inf. 1) < 1 mes (Inf. 1) 1 mes - 2 años (Inf. 1) 2 años - 18 años (Inf. 1) > 18 años
Prueba	SACLCR	81781-7		PERFIL AA LCR: SACAROPINA	mcmol/L	(Inf. 1) < 1 mes (Inf. 1) 1 mes - 2 años (Inf. 1) 2 años - 18 años (Inf. 1) > 18 años
Prueba	SARCOSI			PERFIL AA LCR : SARCOSINA	mcmol/L	(Inf. 2) < 1 mes (Inf. 2) 1 mes - 2 años (Inf. 2) 2 años - 18 años (Inf. 2) > 18 años
Prueba	SULLCR	54336-3		PERFIL AA LCR: SULFOCISTEÍNA	mcmol/L	(Inf. 2) < 1 mes (Inf. 2) 1 mes - 2 años (Inf. 2) 2 años - 18 años (Inf. 2) > 18 años
Prueba	AASLCR	40838-5		PERFIL AA LCR: ACIDO ARGININSUCCÍNICO	mcmol/L	(Inf. 1) < 1 mes (Inf. 1) 1 mes - 2 años (Inf. 1) 2 años - 18 años (Inf. 1) > 18 años
Prueba	AADLCR	26587-6		PERFIL AA LCR: ACIDO ALFA-AMINOADIPICO	mcmol/L	(Inf. 3) < 1 mes (Inf. 3) 1 mes - 2 años (Inf. 3) 2 años - 18 años (Inf. 3) > 18 años

Código: AMINOLCM2

Descripción: AMINOACIDOS ORINA (COMPLETO)

Técnica: Ultra cromatografía líquida de alta presión con espectrometría de masas en tandem (UHPLC-MS/MS)

Comentario adicional: 10 - 20 mL de orina. CONGELAR

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	HIDQUINU2			PERFIL AA ORINA: HIDROXIQUINURENINA	mmol/mol crea	(Inf. 5) < 1 mes (Inf. 3) 1 mes - 1 año (Inf. 1.5) 1 año - 3 años (Inf. 1) 3 años - 13 años (Inf. 1) > 13 años
Prueba	ACETILTIR2	25119-9		PERFIL AA ORINA: ACETILTROSINA	mmol/mol crea	(Inf. 11) < 1 mes (Inf. 4) 1 mes - 1 año (Inf. 4) 1 año - 3 años (Inf. 4) 3 años - 13 años (Inf. 4) > 13 años
Prueba	ADESILHOM2	80176-1		PERFIL AA ORINA: ADENOSILHOMOCISTEINA	mmol/mol crea	(Inf. 1.5) < 1 mes (Inf. 1) 1 mes - 1 año (Inf. 1) 1 año - 3 años (Inf. 1) 3 años - 13 años (Inf. 1) > 13 años
Prueba	ACA2	22691-0		PERFIL AA ORINA: AC. ASPARTICO ORINA	mmol/mol crea	(Inf. 23) < 1 mes (Inf. 15) 1 mes - 1 año (Inf. 7) 1 año - 3 años (Inf. 4) 3 años - 13 años (Inf. 2) > 13 años
Prueba	ACG2	22711-6		PERFIL AA ORINA: AC. GLUTAMICO ORINA	mmol/mol crea	(Inf. 78) < 1 mes (Inf. 40) 1 mes - 1 año (Inf. 22) 1 año - 3 años (Inf. 16) 3 años - 13 años (Inf. 12) > 13 años
Prueba	ASP2	26577-7		PERFIL AA ORINA: ASPARAGINA ORINA	mmol/mol crea	(2 - 140) < 1 mes (8 - 68) 1 mes - 1 año (1 - 60) 1 año - 3 años (2 - 32) 3 años - 13 años (0.7 - 22) > 13 años
Prueba	SER2	22684-5		PERFIL AA ORINA:SERINA EN ORINA	mmol/mol crea	(17 - 425) < 1 mes (24 - 259) 1 mes - 1 año (15 - 171) 1 año - 3 años (2.3 - 116) 3 años - 13 años (0.5 - 83) > 13 años
Prueba	GLI2	22709-0		PERFIL AA ORINA: GLICINA ORINA	mmol/mol crea	(104 - 1845) < 1 mes (124 - 826) 1 mes - 1 año (120 - 784) 1 año - 3 años (58 - 588) 3 años - 13 años (28 - 360) > 13 años

Componentes						
Prueba	TRE2	22688-6		PERFIL AÁ ORINA: TREONINA ORINA	mmol/mol crea	(6 - 282) < 1 mes (5 - 96) 1 mes - 1 año (5 - 74) 1 año - 3 años (5 - 53) 3 años - 13 años (0.7 - 42) > 13 años
Prueba	ARG2	22697-7		PERFIL AÁ ORINA: ARGININA ORINA	mmol/mol crea	(Inf. 95) < 1 mes (Inf. 41) 1 mes - 1 año (Inf. 15) 1 año - 3 años (Inf. 13) 3 años - 13 años (Inf. 10) > 13 años
Prueba	ALA2	22698-5		PERFIL AÁ ORINA: ALANINA ORINA	mmol/mol crea	(41 - 276) < 1 mes (51 - 223) 1 mes - 1 año (38 - 188) 1 año - 3 años (14 - 106) 3 años - 13 años (9 - 47) > 13 años
Prueba	TIR2	22685-2		PERFIL AÁ ORINA: TIROSINA ORINA	mmol/mol crea	(Inf. 84) < 1 mes (Inf. 94) 1 mes - 1 año (Inf. 56) 1 año - 3 años (Inf. 34) 3 años - 13 años (Inf. 20) > 13 años
Prueba	MET2	22681-1		PERFIL AÁ ORINA: METIONINA ORINA	mmol/mol crea	(Inf. 12) < 1 mes (Inf. 12) 1 mes - 1 año (Inf. 5) 1 año - 3 años (Inf. 3.5) 3 años - 13 años (Inf. 2.5) > 13 años
Prueba	AAOXOP2	29522-0		PERFIL AÁ ORINA: OXOPROLINA	mmol/mol crea	(Inf. 85) < 1 mes (Inf. 76) 1 mes - 1 año (Inf. 76) 1 año - 3 años (Inf. 54) 3 años - 13 años (Inf. 41) > 13 años
Prueba	AAFENIL2	29522-0		PERFIL AÁ ORINA: FENILACETILGLUTAMINA	mmol/mol crea	(Inf. 842) < 1 mes (Inf. 640) 1 mes - 1 año (Inf. 816) 1 año - 3 años (Inf. 1044) 3 años - 13 años (Inf. 1084) > 13 años
Prueba	AAQUIN2	53507-0		PERFIL AÁ ORINA: QUINURENINA	mmol/mol crea	(Inf. 15) < 1 mes (Inf. 10) 1 mes - 1 año (Inf. 3) 1 año - 3 años (Inf. 2) 3 años - 13 años (Inf. 1.5) > 13 años
Prueba	VAL2	22692-8		PERFIL AÁ ORINA: VALINA ORINA	mmol/mol crea	(1 - 60) < 1 mes (1 - 52) 1 mes - 1 año (1 - 23) 1 año - 3 años (1 - 17) 3 años - 13 años (Inf. 9) > 13 años
Prueba	TRI2	25139-7		PERFIL AÁ ORINA: ORINA:TRIPTOFANO ORINA	mmol/mol crea	(0.9 - 42) < 1 mes (3 - 42) 1 mes - 1 año (1 - 42) 1 año - 3 años (2 - 22) 3 años - 13 años (0.8 - 17) > 13 años

Componentes						
Prueba	FEN2	18475-4		PERFIL AÁ ORINA: FENILALANINA	mmol/mol crea	(4.6 - 32) < 1 mes (5 - 26) 1 mes - 1 año (6 - 28) 1 año - 3 años (3.4 - 23) 3 años - 13 años (1.6 - 11) > 13 años
Prueba	ISO2	22706-6		PERFIL AÁ ORINA: ISOLEUCINA	mmol/mol crea	(1.9 - 17) < 1 mes (1.7 - 13) 1 mes - 1 año (0.9 - 7) 1 año - 3 años (0.7 - 4) 3 años - 13 años (0.2 - 3.4) > 13 años
Prueba	LEU2	22693-6		PERFIL AÁ ORINA: LEUCINA ORINA	mmol/mol crea	(3.6 - 42) < 1 mes (2 - 34) 1 mes - 1 año (2 - 17) 1 año - 3 años (1 - 11) 3 años - 13 años (0.5 - 7) > 13 años
Prueba	ORN2	22682-9		PERFIL AÁ ORINA: ORNITINA ORINA	mmol/mol crea	(Inf. 31) < 1 mes (Inf. 20) 1 mes - 1 año (Inf. 10) 1 año - 3 años (Inf. 7) 3 años - 13 años (Inf. 5) > 13 años
Prueba	LIS2	22679-5		PERFIL AÁ ORINA: LISINA EN ORINA	mmol/mol crea	(12 - 256) < 1 mes (5 - 146) 1 mes - 1 año (7 - 89) 1 año - 3 años (4 - 58) 3 años - 13 años (2 - 39) > 13 años
Prueba	FOS2	25128-0		PERFIL AÁ ORINA: FOSFOSERINA	mmol/mol crea	(Inf. 12) < 1 mes (Inf. 7) 1 mes - 1 año (Inf. 6) 1 año - 3 años (Inf. 8.5) 3 años - 13 años (Inf. 5.5) > 13 años
Prueba	HID2	25110-8		PERFIL AÁ ORINA: HIDROXIPROLINA	mmol/mol crea	(Inf. 178) < 1 mes (Inf. 91) 1 mes - 1 año (Inf. 5) 1 año - 3 años (Inf. 3.4) 3 años - 13 años (Inf. 3.4) > 13 años
Prueba	FETA2	25122-3		PERFIL AÁ ORINA: FOSFOETANOLAMINA	mmol/mol crea	(Inf. 40) < 1 mes (Inf. 56) 1 mes - 1 año (Inf. 56) 1 año - 3 años (Inf. 31) 3 años - 13 años (Inf. 15) > 13 años
Prueba	HIS2	22703-3		PERFIL AÁ ORINA: HISTIDINA	mmol/mol crea	(67 - 433) < 1 mes (34 - 433) 1 mes - 1 año (64 - 457) 1 año - 3 años (42 - 285) 3 años - 13 años (11 - 180) > 13 años
Prueba	SUL2	33876-4		PERFIL AÁ ORINA: SULFOCISTEÍNA	mmol/mol crea	(Inf. 12.5) < 1 mes (Inf. 8) 1 mes - 1 año (Inf. 3.3) 1 año - 3 años (Inf. 3.6) 3 años - 13 años (Inf. 2.4) > 13 años

Componentes						
Prueba	MTH_32	26575-1		PERFIL AÁ ORINA: 3-METILHISTIDINA	mmol/mol crea	(Inf. 144) < 1 mes (Inf. 119) 1 mes - 1 año (Inf. 161) 1 año - 3 años (Inf. 130) 3 años - 13 años (Inf. 141) > 13 años
Prueba	TAU2	25138-9		PERFIL AÁ ORINA: TAURINA	mmol/mol crea	(8 - 900) < 1 mes (8 - 515) 1 mes - 1 año (8 - 383) 1 año - 3 años (8 - 397) 3 años - 13 años (7 - 288) > 13 años
Prueba	MTH_12	26574-4		PERFIL AÁ ORINA: 1-METILHISTIDINA	mmol/mol crea	(Inf. 76) < 1 mes (Inf. 50) 1 mes - 1 año (Inf. 61) 1 año - 3 años (Inf. 69) 3 años - 13 años (Inf. 41) > 13 años
Prueba	GTM2	22710-8		PERFIL AÁ ORINA: GLUTAMINA	mmol/mol crea	(18 - 383) < 1 mes (23 - 497) 1 mes - 1 año (34 - 242) 1 año - 3 años (13 - 187) 3 años - 13 años (4 - 93) > 13 años
Prueba	CAR2	26580-1		PERFIL AÁ ORINA: CARNOSINA	mmol/mol crea	(Inf. 115) < 1 mes (Inf. 120) 1 mes - 1 año (Inf. 76) 1 año - 3 años (Inf. 31) 3 años - 13 años (Inf. 7) > 13 años
Prueba	ANS2	26576-9		PERFIL AÁ ORINA: ANSERINA	mmol/mol crea	(Inf. 23) < 1 mes (Inf. 17) 1 mes - 1 año (Inf. 47) 1 año - 3 años (Inf. 15) 3 años - 13 años (Inf. 8) > 13 años
Prueba	ETA2	25098-5		PERFIL AÁ ORINA: ETANOLAMINA	mmol/mol crea	(Inf. 372) < 1 mes (Inf. 259) 1 mes - 1 año (Inf. 206) 1 año - 3 años (Inf. 121) 3 años - 13 años (Inf. 68) > 13 años
Prueba	AAS2	29878-6		PERFIL AÁ ORINA: ACIDO ARGININSUCCINICO	mmol/mol crea	(Inf. 8) < 1 mes (Inf. 8) 1 mes - 1 año (Inf. 7) 1 año - 3 años (Inf. 5) 3 años - 13 años (Inf. 3) > 13 años
Prueba	SAR2	25133-0		PERFIL AÁ ORINA: SARCOSINA	mmol/mol crea	(Inf. 31) < 1 mes (Inf. 31) 1 mes - 1 año (Inf. 4) 1 año - 3 años (Inf. 4.4) 3 años - 13 años (Inf. 3.1) > 13 años
Prueba	CIT2	22694-4		PERFIL AÁ ORINA: CITRULINA	mmol/mol crea	(Inf. 15) < 1 mes (Inf. 10) 1 mes - 1 año (Inf. 5) 1 año - 3 años (Inf. 3) 3 años - 13 años (Inf. 3) > 13 años

Componentes						
Prueba	BAL2	26578-5		PERFIL AÁ ORINA: BETA-ALANINA	mmol/mol crea	(Inf. 109) < 1 mes (Inf. 170) 1 mes - 1 año (Inf. 20) 1 año - 3 años (Inf. 20) 3 años - 13 años (Inf. 11) > 13 años
Prueba	HOM2	79592-2		PERFIL AÁ ORINA: HOMOCITRULINA	mmol/mol crea	(Inf. 17) < 1 mes (Inf. 17) 1 mes - 1 año (Inf. 14) 1 año - 3 años (Inf. 10) 3 años - 13 años (Inf. 4) > 13 años
Prueba	AGAB2	26581-9		PERFIL AÁ ORINA: ACIDO GAMMA AMINO BUTIRICO	mmol/mol crea	(Inf. 15) < 1 mes (Inf. 26) 1 mes - 1 año (Inf. 14) 1 año - 3 años (Inf. 8) 3 años - 13 años (Inf. 2.4) > 13 años
Prueba	AAD2	26601-5		PERFIL AÁ ORINA: AMINOADIPICO	mmol/mol crea	(Inf. 72) < 1 mes (Inf. 27) 1 mes - 1 año (Inf. 19) 1 año - 3 años (Inf. 21) 3 años - 13 años (Inf. 9) > 13 años
Prueba	PRO2	22690-2		PERFIL AÁ ORINA: PROLINA	mmol/mol crea	(2 - 200) < 1 mes (2 - 200) 1 mes - 1 año (Inf. 17) 1 año - 3 años (Inf. 9) 3 años - 13 años (Inf. 4) > 13 años
Prueba	ABAB2	25086-0		PERFIL AÁ ORINA: ACIDO BETA AMINOISOBUTIRICO	mmol/mol crea	(Inf. 574) < 1 mes (Inf. 574) 1 mes - 1 año (Inf. 286) 1 año - 3 años (Inf. 64) 3 años - 13 años (Inf. 33) > 13 años
Prueba	HILIS_12	25109-0		PERFIL AÁ ORINA: HIDROXILISINA	mmol/mol crea	(Inf. 36) < 1 mes (Inf. 18) 1 mes - 1 año (Inf. 11) 1 año - 3 años (Inf. 6) 3 años - 13 años (Inf. 3) > 13 años
Prueba	CISTA2	25092-8		PERFIL AÁ ORINA: CISTATIONINA	mmol/mol crea	(Inf. 62) < 1 mes (Inf. 23) 1 mes - 1 año (Inf. 8) 1 año - 3 años (Inf. 7) 3 años - 13 años (Inf. 7) > 13 años
Prueba	AAAB2	26919-1		PERFIL AÁ ORINA: ACIDO ALFA AMINO BUTIRICO	mmol/mol crea	(Inf. 32) < 1 mes (Inf. 16) 1 mes - 1 año (Inf. 18) 1 año - 3 años (Inf. 7) 3 años - 13 años (Inf. 4) > 13 años
Prueba	CIS2	22687-8		PERFIL AÁ ORINA: CISTINA	mmol/mol crea	(Inf. 95) < 1 mes (Inf. 42) 1 mes - 1 año (Inf. 20) 1 año - 3 años (Inf. 11) 3 años - 13 años (Inf. 16) > 13 años

Componentes						
Prueba	APP2	47727-3		PERFIL AÁ ORINA: ACIDO PIPECOLICO	mmol/mol crea	(Inf. 15) < 1 mes (Inf. 5) 1 mes - 1 año (Inf. 2.5) 1 año - 3 años (Inf. 1) 3 años - 13 años (Inf. 1) > 13 años
Prueba	SAC2	79640-9		PERFIL AÁ ORINA: SACAROPINA	mmol/mol crea	(Inf. 7) < 1 mes (Inf. 5) 1 mes - 1 año (Inf. 3.5) 1 año - 3 años (Inf. 1.5) 3 años - 13 años (Inf. 1) > 13 años
Prueba	ALLOI2	22706-6		PERFIL AÁ ORINA: ALLO-ISOLEUCINA	mmol/mol crea	(Inf. 3) < 1 mes (Inf. 3) 1 mes - 1 año (Inf. 3) 1 año - 3 años (Inf. 3) 3 años - 13 años (Inf. 3) > 13 años
Prueba	HOMO2	26582-7		PERFIL AÁ ORINA: HOMOCISTEINA	mmol/mol crea	(Inf. 4) < 1 mes (Inf. 1.5) 1 mes - 1 año (Inf. 1.5) 1 año - 3 años (Inf. 1) 3 años - 13 años (Inf. 1) > 13 años
Prueba	CAMINO2	32296-6		COMENTARIO AMINOACIDOS ORINA		

Código: AMINO30

Descripción: AMINOACIDOS Plasma AAS (LC-MS/MS)

Técnica: Cromatografía líquida/Tándem masas (LC-MS/MS)

Comentario adicional: 1 mL suero. CONGELAR INMEDIATAMENTE Y ENVIAR CONGELADO. INDISPENSABLE edad e historia clínica.
Muestra alternativa: Plasma de heparina separado y congelado

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	BIO.TAURIN	20657-3		Perfil 30 AÁ: TAURINA	µmol/L	(25 - 300) < 1 mes (25 - 220) 1 mes - 12 meses (15 - 175) 12 meses - 10 años (15 - 175) > 10 años
Prueba	BIO.HLISIN	2442-2		Pérfil 30 AÁ: HIDROXILISINA	µmol/L	(0 - 5) < 1 mes (0 - 5) 1 mes - 12 meses (0 - 5) 12 meses - 10 años (0 - 5) > 10 años
Prueba	BIO.ORNIT	20652-4		Perfil 30 AÁ: ORNITINA	µmol/L	(30 - 200) < 1 mes (20 - 160) 1 mes - 12 meses (20 - 160) 12 meses - 10 años (20 - 160) > 10 años
Prueba	BIO.HISTID	20645-8		Perfil 30 AÁ: HISTIDINA	µmol/L	(40 - 170) < 1 mes (40 - 230) 1 mes - 12 meses (40 - 150) 12 meses - 10 años (40 - 200) > 10 años
Prueba	BIO.1METIL	20633-4		Perfil 30 AÁ: METILHISTIDINA	µmol/L	(0 - 33) < 1 mes (0 - 33) 1 mes - 12 meses (0 - 33) 12 meses - 10 años (0 - 33) > 10 años

Componentes						
Prueba	BIO.LISINA	20650-8		Perfil 30 AA: LISINA	μmol/L	(60 - 300) < 1 mes (60 - 280) 1 mes - 12 meses (80 - 270) 12 meses - 10 años (100 - 280) > 10 años
Prueba	BIO.ARGIN	20637-5		Perfil 30 AA: ARGININA	μmol/L	(25 - 90) < 1 mes (20 - 180) 1 mes - 12 meses (20 - 160) 1 año - 12 años (20 - 160) > 12 años
Prueba	BIO.ANSERI	1866-3		Perfil 30 AA: ANSERINA	μmol/L	(0 - 2) < 1 mes (0 - 2) 1 mes - 12 meses (0 - 2) 12 meses - 10 años (0 - 6) > 10 años
Prueba	BIO.CISTIN	22672-0		Perfil 30 AA: CISTINA	μmol/L	(3 - 100) < 1 mes (3 - 84) 1 mes - 12 meses (3 - 125) 12 meses - 10 años (3 - 100) > 10 años
Prueba	BIO.CISTAT	26607-2		Perfil 30 AA: CISTATIONINA	μmol/L	(0 - 33) < 1 mes (0 - 33) 1 mes - 12 meses (0 - 50) 12 meses - 10 años (0 - 50) > 10 años
Prueba	BIO.ASPARG	20638-3		Perfil 30 AA: ASPARAGINA	μmol/L	(20 - 130) < 1 mes (20 - 130) 1 mes - 12 meses (20 - 130) 1 año - 10 años (20 - 130) > 10 años
Prueba	BIO.GLUTAM	20643-3		Perfil 30 AA: GLUTAMINA	μmol/L	(285 - 950) < 1 mes (410 - 900) 1 mes - 12 meses (410 - 900) 12 meses - 10 años (410 - 900) > 10 años
Prueba	BIO.SERINA	20656-5		Perfil 30 AA: SERINA	μmol/L	(90 - 300) < 1 mes (90 - 300) 1 mes - 12 meses (60 - 200) 12 meses - 10 años (60 - 225) > 10 años
Prueba	BIO.GLICIN	20644-1		Perfil 30 AA: GLICINA	μmol/L	(150 - 500) < 1 mes (120 - 450) 1 mes - 12 meses (120 - 450) 12 meses - 10 años (120 - 400) > 10 años
Prueba	BIO.CITRUL	20640-9		Perfil 30 AA: CITRULINA	μmol/L	(5 - 50) < 1 mes (5 - 50) 1 mes - 12 meses (10 - 60) 1 año - 10 años (10 - 60) > 10 años
Prueba	BIO.SARCOS	26613-0		Perfil 30 AA: SARCOSINA	μmol/L	(0 - 12) < 1 mes (0 - 12) 1 mes - 12 meses (0 - 12) 12 meses - 10 años (0 - 12) > 10 años
Prueba	BIO.HIDROX	20647-4		Perfil 30 AA: HIDROXIPROLINA	μmol/L	(0 - 200) < 1 mes (0 - 200) 1 mes - 12 meses (0 - 200) 12 meses - 10 años (0 - 200) > 10 años
Prueba	BIO.TREONI	20658-1		Perfil 30 AA: TREONINA	μmol/L	(50 - 400) < 1 mes (50 - 300) 1 mes - 12 meses (60 - 200) 12 meses - 10 años (60 - 245) > 10 años
Prueba	BIO.BETAAL	26604-9		Perfil 30 AA: BETA-ALANINA	μmol/L	(0 - 20) < 1 mes (0 - 20) 1 mes - 12 meses (0 - 20) 12 meses - 10 años (0 - 20) > 10 años
Prueba	BIO.ALANIN	20636-7		Perfil 30 AA: ALANINA	μmol/L	(130 - 560) < 1 mes (150 - 570) 1 mes - 12 meses (150 - 570) 1 año - 10 años (150 - 600) > 10 años

Componentes						
Prueba	BIO.SULFON			perfil 30 AA: MET.SULFONA	μmol/L	(0 - 2) < 1 mes (0 - 2) 1 mes - 12 meses (0 - 2) 12 meses - 10 años (0 - 2) > 10 años
Prueba	BIO.ACGLUT	20642-5		Perfil 30 AA: ACIDO GLUTAMICO	μmol/L	(50 - 300) < 1 mes (25 - 270) 1 mes - 12 meses (10 - 190) 12 meses - 10 años (10 - 190) > 10 años
Prueba	BIO.PROLIN	20655-7		Perfil 30 AA: PROLINA	μmol/L	(100 - 400) < 1 mes (80 - 400) 1 mes - 12 meses (80 - 400) 12 meses - 10 años (50 - 350) > 10 años
Prueba	BIO.HOMOCI	25352-4		Pérfil AA: HOMOCISTINA	μmol/L	(0 - 2) < 1 mes (0 - 2) 1 mes - 12 meses (0 - 2) 12 meses - 10 años (0 - 2) > 10 años
Prueba	BIO.AAMNBU	20634-2		Perfil 30 AA: ACIDO AMINO BUTIRICO	μmol/L	(0 - 40) < 1 mes (0 - 40) 1 mes - 12 meses (0 - 40) 12 meses - 10 años (0 - 40) > 10 años
Prueba	BIO.AADIPI	26600-7		Pérfil 30 AA: AMINOADÍPICO	μmol/L	(0 - 5) < 1 mes (0 - 5) 1 mes - 12 meses (0 - 5) 12 meses - 10 años (0 - 5) > 10 años
Prueba	BIO.VALINA	20661-5		Perfil 30 AA: VALINA	μmol/L	(80 - 300) < 1 mes (80 - 300) 1 mes - 12 meses (100 - 300) 12 meses - 10 años (70 - 320) > 10 años
Prueba	BIO.METION	20651-6		Perfil 30 AA: METIONINA	μmol/L	(10 - 60) < 1 mes (10 - 60) 1 mes - 12 meses (14 - 50) 12 meses - 10 años (10 - 60) > 10 años
Prueba	BIO.TIROSÍ	20660-7		Perfil 30 AA: TIROSINA	μmol/L	(50 - 731) < 1 mes (30 - 160) 1 mes - 12 meses (30 - 130) 12 meses - 10 años (30 - 100) > 10 años
Prueba	BIO.ISOLEU	20648-2		Perfil 30 AA: ISOLEUCINA	μmol/L	(20 - 130) < 1 mes (20 - 130) 1 mes - 12 meses (30 - 130) 12 meses - 10 años (30 - 130) > 10 años
Prueba	BIO.LEUCIN	20649-0		Perfil 30 AA: LEUCINA	μmol/L	(50 - 200) < 1 mes (50 - 200) 1 mes - 12 meses (60 - 230) 12 meses - 10 años (60 - 230) > 10 años
Prueba	BIO.FENILA	14875-9		Perfil 30 AA: FENILALANINA	μmol/L	(30 - 120) < 1 mes (30 - 120) 1 mes - 12 meses (30 - 125) 12 meses - 10 años (30 - 110) > 10 años
Prueba	BIO.TRIPTO	20659-9		Perfil 30 AA: TRIPTOFANO	μmol/L	(15 - 100) < 1 mes (15 - 100) 1 mes - 12 meses (20 - 115) 12 meses - 10 años (20 - 130) > 10 años
Prueba	BIO.ASPART	20639-1		Perfil 30 AA: ACIDO ASPARTICO	μmol/L	(0 - 50) < 1 mes (0 - 40) 1 mes - 12 meses (0 - 35) 12 meses - 10 años (0 - 35) > 10 años
Prueba	BIO.COMENT	13500-4		Comentario		

Descripción: Amiodarona en suero
Código: AMIODARONA
Técnica: Cromatografía líquida de alta eficacia
Unidades: mg/L
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero. refrigerar.
 No utilizar tubos con gel separador.
 La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis.

Alternativa: Plasma de EDTA.

Valores de referencia: (0.5 - 2.0)
 (Sup. 2.5) Toxicidad
 (Inf. 0.2) Límite de cuantificación

Descripción: Amiotrofia escapulooperoneal: Kaeser, Sd. Sec Gen: DES.
Código: GEN_000045
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Código: QAMN
Descripción: AMITRIPTILINA / NORTRIPTILINA, SUERO
Técnica: LC-MS/MS
Comentario adicional: Suero refrigerado.
 La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	AMITR	3333-2		AMITRIPTILINA EN SUERO	µg/l	<11µg/l Límite de cuantificación
Prueba	NORTR	3872.9		NORTRIPTILINA EN SUERO	µg/l	<12 µg/l Límite de cuantificación
Prueba	AMINORSUMA			AMITRIPTILINA + NORTEPITILINA		(175 - 300) Intervalo terapéutico (Imipramina+desimipramina)

Descripción: AMONIACO (AMONIO) EN LCR
Código: AMONLCR
Técnica: Espectrofotometría ultravioleta
Unidades: µg/dL
Plazo: 9 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 50)

Descripción: AMONIO (AMONIACO) EN PLASMA
Código: AMONIACO
Técnica: Colorimetría
Unidades: mcmol/L
Plazo: 3 días
Tubo: Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional: 1 mL de plasma EDTA congelado
 (Alternativa: Plasma Heparina de litio separado y congelado)
Valores de referencia: (9 - 30)

Descripción: AMPA 1/ AMPA 2 RECEPTORES ANTICUERPOS EN SUERO
Código: AMPA1_2
Técnica: Técnica Cell Binding Assay IFI
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero refrigerado
Valores de referencia:

Descripción: AMP-CICLICO NEFROGENICO ORINA/PLASMA
Código: AMPNEFRO
Técnica: Radioisotópica
Unidades: nmol/dL F.G.
Plazo: 32 días
Tubo: Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional: PLASMA EDTA CONGELADO Y ORINA 24H CONGELADA
Valores de referencia: (0.3 - 3.8) filtrado glomerular

Descripción: AMP-CICLICO ORINA 24 HORAS
Código: AMPCI2
Técnica: RIA
Unidades: µmol/24h
Plazo: 13 días
Tubo: Orina congelada
Comentario adicional: Alícuota de ORINA 24 H (1 mL). CONGELAR
Valores de referencia: (2.26 - 10)

Descripción: AMP-CICLICO PLASMA
Código: AMPCI
Técnica: Radioisotópica
Unidades: nmol/L
Plazo: 23 días
Tubo: Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional: 2 mL PLASMA EDTA CONGELADO
Valores de referencia: (18 - 45.4)

Descripción: AMPHIPHYSINA AC. EN LCR
Código: AMPHILCR
Técnica: Técnica Inmunoblot

Descripción: AMPHIPHYSINA AC. EN LCR

Unidades:

Plazo: 15 días

Tubo: LIQUIDO LCR INMUNO

Comentario adicional: 0.5 ml LCR

Valores de referencia:

Descripción: Ampliación a Everli Avanzado (NIPT) - ASEGURADORA

Código: AMPEVERAVA

Técnica:

Unidades:

Plazo: 6 días

Tubo: Prenatal

Comentario adicional: NO REQUIERE MUESTRA.
Prueba solo para facturar la ampliación a Everli Avanzado

Valores de referencia:

Descripción: Ampliación a Everli Plus (NIPT) - ASEGURADORA

Código: AMPEVERPLU

Técnica:

Unidades:

Plazo: 7 días

Tubo: Prenatal

Comentario adicional: NO REQUIERE MUESTRA.
Prueba solo para facturar la ampliación a Everli Plus

Valores de referencia:

Descripción: Ampliación a Exoma Clínico en trío (muestras progenitores)

Código: AMPLI_TSO

Técnica:

Unidades:

Plazo: 40 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Ampliación a Harmony Avzdo (NIPT) - ASEGURADORA

Código: AMPHARMAVA

Técnica:

Unidades:

Plazo: 7 días

Tubo: Prenatal

Comentario adicional: NO REQUIERE MUESTRA.
Prueba solo para facturar la ampliación a Harmony Avanzado

Valores de referencia:

Descripción: Ampliación a Harmony Plus (NIPT) - ASEGURADORA

Código: AMPHARMPLU

Técnica:

Unidades:

Descripción: Ampliación a Harmony Plus (NIPT) - ASEGURADORA
Plazo: 7 días
Tubo: Prenatal
Comentario adicional: NO REQUIERE MUESTRA.
 Prueba solo para facturar la ampliación a Harmony Plus

Valores de referencia:

Descripción: Ampliación con STRs para cromosoma Y (2 individuos)
Código: PATERCRY
Técnica:
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Lleva KIT especial con cadena de custodia, solicitar a asesoría genética, Enviar con las muestras a Alfonso XII
 Muestra: mucosa bucal con Hisopo sin medio

Esta prueba es para 2 individuos adicionales tanto para paternidad como parentesco cuando hay que ampliar más marcadores sobre el cromosoma Y

Valores de referencia:

Descripción: Ampliación panel NGS
Código: AMPLINGS
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Biología Molecular
Comentario adicional: Ampliación de un estudio realizado previamente mirar comentarios

Valores de referencia:

Descripción: Amplificación del gen MDM2 (12q15).
Código: MDFISHMDM2
Técnica:
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional: 5-20 ml sangre periférica.
 min 2 ml médula ósea.
 Muestra alternativa: tejido fresco o fijado/parafinado

Valores de referencia:

Descripción: Análisis de 1 mutación de cualquier gen (sec. Sanger)
Código: UNA_MUTACI
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Biología Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
 Alternativas: Citrato.
 Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente

Valores de referencia:

Descripción: Análisis de 1 mutación de cualquier gen Mitocondrial
Código: MUTACMITOC
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tipo de tubo. Edta rotulado con BM. Tubo exclusivo para esta determinación
 Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente

Valores de referencia:

Descripción: Análisis de 1 mutación de cualquier gen por MLPA
Código: SOLO_MLPA
Técnica: MLPA
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Analisis de 2 mutaciones de cualquier gen/es (sec. Sanger)
Código: DOS_MUTACI
Técnica:
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
 Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente

Valores de referencia:

Descripción: Análisis de 3 mutaciones de cualquier gen/es (sec sanger)
Código: TRES_MUTAC
Técnica: Secuenciación Sanger
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Sangre en 1 tubo de EDTA a temperatura ambiente.
 Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente

Valores de referencia:

Descripción: Análisis de 3 mutaciones de cualquier gen/es (sec sanger)
Código: TRES_MUTAC
Técnica: Secuenciación Sanger
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Sangre en 1 tubo de EDTA a temperatura ambiente.
 Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente

Valores de referencia:

Descripción: Análisis de 3 mutaciones de cualquier gen/es (sec sanger)
Código: TRES_MUTAC
Técnica: Secuenciación Sanger
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Sangre en 1 tubo de EDTA a temperatura ambiente.
 Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente

Valores de referencia:

Descripción: Análisis de cualquier gen por MLPA 2 SALSAS
Código: DOS_MLPA
Técnica: MLPA
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
 Alternativas: Heparina y Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Análisis del porcentaje de dd-cfDNA
Código: TRAC
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional: Tubo PAXgene y Streck a temperatura ambiente
 Muestras para estudio trasplante riñón. Contactar con laboratorio NIPT

Valores de referencia:

Descripción: Análisis tripletes gen TCF4
Código: TCF4_EXPAN
Técnica: PCR y analisis de fragmentos
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
 Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Andersen-Tawil, Sd. Sec Gen: KCNJ2.
Código: GEN_000046
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: ANDROSTANDIOL GLUCURONIDO
Código: ANDROSGLU

Descripción: ANDROSTANDIOL GLUCURONIDO
Técnica: EIA
Unidades: ng/mL
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 2 mL suero. REFRIGERAR.
Valores de referencia: (1.53 - 14.82) Hombre
 (0.51 - 4.03) Mujer Pubertad
 (0.22 - 4.64) Mujer Adultas
 (0.61 - 3.71) Mujer Post-menopausia

Descripción: ANDROSTENDIONA DELTA 4
Código: DELTA4
Técnica: ICMA
Unidades: ng/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (0.5 - 3.5) Hombre > 22 años
 (0.4 - 3.4) Mujer > 22 años Mujer premenopáusica
 (Inf. 2.1) Mujer > 22 años Mujer postmenopáusica
 (Inf. 0.29) Hombre 2 años - 7 años
 (Inf. 0.74) Hombre 7 años - 12 años
 (0.2 - 2.21) Hombre 12 años - 17 años
 (0.44 - 2.65) Hombre 17 años - 22 años
 (Inf. 0.34) Mujer 2 años - 7 años
 (Inf. 2.41) Mujer 7 años - 12 años
 (0.42 - 3.41) Mujer 12 años - 17 años
 (0.70 - 4.31) Mujer 17 años - 22 años

Descripción: Anemia de células falciformes: gen HBB (sec. Sanger)
Código: ANEM_FALCI
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente
Valores de referencia:

Descripción: Anemia de Diamond-Blackfan. Panel
Código: GEN_000047
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Anemia de Fanconi: >10 genes (NGS)
Código: FANCONI

Descripción: Anemia de Fanconi: >10 genes (NGS)
Técnica: MLPA y NGS Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Anemia diseritropoyética congénita. Panel
Código: GEN_000048
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Anemia megaloblástica respuesta tiamina. Sec Gen SLC19A2
Código: GEN_000049
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Anemia sideroblástica ligada al X. Panel
Código: GEN_000050
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Aneurisma aorta torácica: >10 genes (NGS)
Código: ANEURIS_AO
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: ANEXINA V ANTICUERPOS IGG SUERO
Código: ANEXINVACG
Técnica: ENZIMOINMUNOANÁLISIS
Unidades: U/mL

Descripción: ANEXINA V ANTICUERPOS IGG SUERO
Plazo: 15 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: (Inf. 8) Negativo

Descripción: ANEXINA V ANTICUERPOS IGM SUERO
Código: ANEXINVACM
Técnica: ENZIMOINMUNOANÁLISIS
Unidades: U/mL
Plazo: 15 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero.
Valores de referencia: (Inf. 8) Negativo

Descripción: ANFETAMINA ORINA
Código: ANFETA
Técnica: Inmunoensayo
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Orina Drogas de Abuso
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Angelman, Sd. Sec Gen: UBE3A.
Código: GEN_000051
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Angioedema hereditario tipo 1. Sec Gen: SERPING1.
Código: GEN_000052
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Angiopatía amiloide cerebral. Panel
Código: GEN_000053
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: ANGIOTENSINA II PLASMA
Código: ANGIOTEN2
Técnica: Radioinmunoanálisis
Unidades: pmol/L
Plazo: 13 días
Tubo: Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional: 3 mL plasma (EDTA). Congelar y enviar congelado.
Valores de referencia: (19 - 38)

Descripción: ANGIOTENSINA,I PLASMA
Código: AT1
Técnica: RIA
Unidades: ng/mL
Plazo: 6 días
Tubo: Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional: Plasma de edta separado y congelado
Valores de referencia: (0.60 - 12.00)

Descripción: ANHIDRASA CARBONICA II AC. SUERO
Código: ANHCARBII
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 18 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia:

Descripción: ANION GAP
Código: ANIONGAP
Técnica: Cálculo
Unidades: mmol/L
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (10 - 20)

Descripción: Aniridia. Sec Gen: PAX6.
Código: GEN_000054
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: ANNA-3 ANTICUERPOS
Código: ANNA3
Técnica: Inmunofluorescencia indirecta/Inmunohistoquímica
Unidades:
Plazo: 17 días

Descripción: ANNA-3 ANTICUERPOS
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: Negativo <1/60
 Positivo >1/60

Descripción: Anomalías del tejido conectivo panel genes
Código: PHARMALAP3
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación y rotulado con BM.
 Alternativas: Citrato.
 Imprescindible enviar la historia clínica y formulario de petición de genética o consentimiento informado

Valores de referencia:

Descripción: ANTI NUCLEOSOMAS AC.
Código: AC.NUCLEOS
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: ANTI OXIDANTE GENETICO
Código: ANTIOXCOMP
Técnica:
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional: Kit especial. Solicitar a almacén
Valores de referencia:

Código: SINTETASA
Descripción: ANTI SINTETASA AC (Jo-1, SRP, PL-7 PL12, EJ,OJ)
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	SRPAC	63559-9		SRP (SIGNAL RECOGNITION PARTICLE) AC. SUERO		Negativo
Prueba	JO1AC	56731-3		Jo-1 AC. SUERO		Negativo
Prueba	PL7PL12AC			PL-7/PL-12 AC. SUERO		Negativo
Prueba	EJAC	82392-2		EJ AC. SUERO		Negativo
Prueba	OJAC	69557-7		OJ AC. SUERO		Negativo

Descripción: ANTIBIOGRAMA
Código: ATB
Técnica: Tarjetas con reactivos colorimétricos
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Microbiología
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Anticoagulante Lupico (dRVVT VÍBORA DE RUSSELL)
Código: ANTILUPICO
Técnica: Téc. coagulativa
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Plasma de Citrato congelado
Comentario adicional: 1 mL plasma citrato.

Se recomienda doble centrifugación para obtener las plaquetas del plasma: Primera centrifugación 15 minutos a 2000-2500 g. Separar el sobrenadante plasmático y centrifugarlo una segunda vez durante 15 minutos a 2000-2500 g. El número de plaquetas res

Enviar la muestra congelada.

Enviar congelado y rotulado como DOBLE CCENTRIFUGACION.

Valores de referencia: (Inf. 1.2) Negativo
(1.2 - 1.5) Positivo débil
(1.5 - 2) Positivo moderado
(Sup. 2) Positivo fuerte

Código: LUPISILICE
Descripción: ANTICOAGULANTE LUPICO ACTIVADO CON SILICE
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	PTT_LA	5007328		PTT_LA SCREEN	segundos	(33 - 45)
Prueba	PTT_LACONF	5007329		PTT_LA CONFIRMACION STACLOT LA	segundos	(Inf. 8) :Negativo (Sup. 8) :Positivo

Descripción: ANTICUERPOS ANTI DFS70 EN SUERO
Código: DFS70
Técnica: Téc. EIA
Unidades: U/mL
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero
Valores de referencia: (Inf. 7) Negativo
(7 - 10) Indeterminado

Descripción:	ANTICUERPOS ANTI INMUNOGLOBULINA A SUERO
Código:	IGAAC
Técnica:	Inmunoanálisis
Unidades:	U/mL
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml suero, alternativa plasma.
Valores de referencia:	(Inf. 7) Negativo (Sup. 10) Positivo (7 - 10) Zona límite

Descripción:	ANTICUERPOS ANTI TREPONEMA PALLIDUM (SYPHILIS TP)
Código:	VDRL
Técnica:	SYPHILIS TP
Unidades:	Indice
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. Alternativa: plasma de EDTA
Valores de referencia:	(Inf. 0.99) Negativo

Descripción:	ANTICUERPOS ANTINUCLEARES EN LCR
Código:	ANALCR
Técnica:	Inmunofluorescencia indirecta
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 ml LCR
Valores de referencia:	

Descripción:	ANTICUERPOS BP180 (BPAG2)
Código:	BP180
Técnica:	EIA
Unidades:	Ratio
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 1) Negativo

Descripción:	ANTICUERPOS GP210
Código:	GP210
Técnica:	Inmunoblot
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml suero
Valores de referencia:	Negativo

Descripción:	ANTICUERPOS INHIBIDORES DEL FACTOR VII PLASMA
Código:	INHIFVII

Descripción:	ANTICUERPOS INHIBIDORES DEL FACTOR VII PLASMA
Técnica:	Téc. Coagulométrica
Unidades:	U. Bethesda
Plazo:	7 días
Tubo:	Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:	1 mL plasma (citrato) pobre en plaquetas (doble centrifugación a 2500 g/15 min.) Aspirar parte superior. CONGELAR INMEDIATAMENTE Y ENVIAR CONGELADO.
Valores de referencia:	La línea de corte mediante esta técnica se establece en 0.5 Unidades Bethesda

Descripción:	ANTICUERPOS INHIBIDORES FRENTE AL FACTOR V EN PLASMA
Código:	INHIFV
Técnica:	Coagulométrica
Unidades:	U. Bethesda
Plazo:	7 días
Tubo:	Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:	2 mL plasma (citrato) pobre en plaquetas (doble centrifugación a 2500 g/15 min.) Aspirar parte superior. CONGELAR INMEDIATAMENTE Y ENVIAR CONGELADO
Valores de referencia:	

Descripción:	ANTICUERPOS INHIBIDORES FRENTE AL FACTOR V EN PLASMA
Código:	INHIFV
Técnica:	Coagulométrica
Unidades:	U. Bethesda
Plazo:	7 días
Tubo:	Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:	2 mL plasma (citrato) pobre en plaquetas (doble centrifugación a 2500 g/15 min.) Aspirar parte superior. CONGELAR INMEDIATAMENTE Y ENVIAR CONGELADO
Valores de referencia:	

Descripción:	ANTICUERPOS M2 MITOCONDRIALES SUERO
Código:	AMA2
Técnica:	Inmunoblot
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	Negativo

Descripción:	ANTICUERPOS Sp-100 SUERO
Código:	SP100
Técnica:	Téc. Inmunoblot
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	Negativo

Descripción:	ANTIDEPRESIVOS TRICICLICOS CONFIRMACION ORINA
Código:	ANTIDEPRE
Técnica:	LC-MS/MS
Unidades:	
Plazo:	9 días

Descripción: ANTIDEPRESIVOS TRICICLICOS CONFIRMACION ORINA
Tubo: Orina Drogas de Abuso
Comentario adicional: orina. Refrigerar
Valores de referencia:

Descripción: ANTIDEPRESIVOS TRICICLICOS CONFIRMACIÓN SUERO
Código: ANPRETRIC
Técnica: téc. HPLC
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 2 ml de suero
Valores de referencia:

Descripción: ANTIDIABÉTICOS ORALES EN ORINA
Código: SULFONILU2
Técnica: Cromatografía Líquida/Tándem masas
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 10 mL orina, micción aislada
Valores de referencia:

Descripción: ANTIDIDIABÉTICOS ORALES EN SUERO
Código: SULFONILU
Técnica: Cromatografía Líquida/Tándem Masas
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia:

Descripción: ANTI-DNA (CRITHIDIA LUCILIAE) AC.
Código: ANTIDNACRI
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero
Valores de referencia: Negativo < 1/10
 Positivo > 1/10

Descripción: ANTIESTREPTOLISINA O
Código: ASLO
Técnica: Turbidimetría
Unidades: UI/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL suero

Descripción: ANTIESTREPTOLISINA O
Valores de referencia: (Inf. 150) < 14 años
 (Inf. 200) > 14 años

Descripción: ANTIFUNGIGRAMA
Código: ANTIFUNGI
Técnica: Tarjetas con reactivos colorimétricos
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Microbiología
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: ANTIGENO BETA-D-GLUCANO SUERO
Código: GLUCANO
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: pg/mL
Plazo: 12 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1mL de suero separar y congelar inmediatamente.
Valores de referencia: (Inf. 70) Negativo
 Esta técnica no detecta Cryptococcus, Zygomycetes ni Blastomyces dermatitidis

Descripción: ANTIGENO DE ASPERGILLUS (GALACTOMANANO)
Código: GALACTOMA
Técnica: Técnica CLIA
Unidades: Índice
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Se necesitan 600 µl de suero
Valores de referencia: (Inf. 0.16) Negativo
 (0.16 - 0.19) Indeterminado
 (Sup. 0.19) Positivo

Descripción: ANTIGENO DE ASPERGILLUS (GALACTOMANANO) BAL/BAS, ASPIR, BRON
Código: GALACTOBAL
Técnica: Técnica CLIA
Unidades: Índice
Plazo: 6 días
Tubo: Muestra Microbiología
Comentario adicional: Aspirado, Lavado broncoalveolar
Valores de referencia: (Inf. 0.16) Negativo
 (0.16 - 0.19) Indeterminado
 (Sup. 0.19) Positivo

Descripción: Antígeno de Helicobacter pylori en heces
Código: HELIAG
Técnica: Inmunocromatografía
Unidades:
Plazo: 4 días

Descripción: Antígeno de Helicobacter pylori en heces
Tubo: Heces No Microbiología
Comentario adicional: Muestra: 2 g heces (Refrigerado)
Valores de referencia:

Descripción: ANTÍGENO SARS-CoV-2 TEST RAPIDO
Código: AGCOVDETEC
Técnica:
Unidades:
Plazo: 1 días
Tubo: TORUNDA AG. COVID (MICRO)
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: ANTIGENO SOLUBLE HEPATICO AC. SUERO
Código: SLALPAC
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: Negativo

Descripción: ANTIGRANULOCITOS AC. (NEUTROFILOS)
Código: ANGRA
Técnica: CITOMETRÍA DE FLUJO
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional: 15 mL SANGRE TOTAL EDTA y 1 mL SUERO. ENVIO A TEMPERATURA AMBIENTE. Evitar envío viernes y vísperas de festivo. Indispensable historia clínica. En niños pequeños se aceptan 5 mL de EDTA y 0.5 mL de suero.
Valores de referencia:

Descripción: ANTIMONIO EN ORINA
Código: ANTIMONIO2
Técnica: ICP-MS
Unidades: µg/g creatinina
Plazo: 7 días
Tubo: Orina Final de Jornada
Comentario adicional: Orina final de semana laboral preferiblemente.

No recolectar muestras de orina en un ambiente en el que sea más probable que ocurra la exposición. Es importante evitar que el polvo de la ropa pueda interferir en el contenido de la muestra.

No recoger la orina en recipientes con base de metal, como urinarios o sartenes de metal. Recoger la orina en tubos de polipropileno inoculero libre de metales sin tapones de colores. Cuando esto no sea posible, usar para la recogida de orina un envase

Valores de referencia: (Inf. 1) en personas no expuestas (valores orientativos).
 (Inf. 35) en personas expuestas a ANTIMONIO (Índice de exposición orientativo adaptado de ACGIH).

Descripción: ANTIMONIO SANGRE TOTAL (Tubo libre de metales)
Código: ANTIMONIO
Técnica: Técnica Absorción atómica

Descripción: ANTIMONIO SANGRE TOTAL (Tubo libre de metales)
Unidades: mcg/L
Plazo: 11 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: Sangre total EDTA Dipotásico (libre trazas metales). REFRIGERAR.
 Tubo Sangre EDTA metales traza
Valores de referencia: (Inf. 6)

Descripción: ANTINUCLEARES (ANA) AC. LIQUIDO PLEURAL
Código: ANALP
Técnica: IFI
Unidades: Titulo
Plazo: 5 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia: < 1/20 Negativo
 > 1/20 Positivo

Descripción: ANTINUCLEARES AC. (ANA) MUESTRA HUMANA
Código: ANAMUES
Técnica: INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA
Unidades: Titulo
Plazo: 4 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: Hay que indicar tipo de muestra.
Valores de referencia:

Descripción: ANTIOXIDANTES TOTALES
Código: CAT
Técnica: Téc. espectrofotométrica
Unidades: mmol/L
Plazo: 23 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 mL suero refrigerado.
Valores de referencia: (1.30 - 1.77)

Descripción: ANTITROMBINA III
Código: ATIII
Técnica: Sustrato cromogénico
Unidades: %
Plazo: 3 días
Tubo: Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:
Valores de referencia: (80 - 120)

Descripción: ANTITROMBINA III (PROTEINA)
Código: ATIIIPRO
Técnica: Nefelometría
Unidades: mg/dL
Plazo: 6 días

Descripción:	ANTITROMBINA III (PROTEINA)
Tubo:	Plasma de Citrato congelado
Comentario adicional:	1 mL Plasma Citrato sódico Conservación: Separar y congelar inmediatamente. ENVIAR CONGELADO
Valores de referencia:	(19 - 31)
Descripción:	Añadir DNA mitocondrial a panel NGS
Código:	AÑADIRMT
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	
Descripción:	Añadir tipaje HLA a PGT
Código:	HLAPGTINFR
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	
Descripción:	APIXABAN PLASMA
Código:	APIXABAN
Técnica:	Substrato cromogénico con anti Factor Xa
Unidades:	ng/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Plasma de Citrato congelado
Comentario adicional:	1 ml de plasma -citarto. Congelar y enviar congelado
Valores de referencia:	(59 - 321) Dosis 5 mg: Pico (2-3 horas) (22 - 230) Dosis 5 mg: Valle (previo siguiente dosis) ICSH guidance document for DOAC testing (2018)
Descripción:	APOLIPOPROTEINA A1
Código:	APOA
Técnica:	Turbidimetría
Unidades:	mg/dL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 mL suero.
Valores de referencia:	(105 - 175) Hombre (105 - 205) Mujer
Descripción:	APOLIPOPROTEINA B
Código:	APOB
Técnica:	Turbidimetría
Unidades:	mg/dL
Plazo:	3 días

Descripción: APOLIPOPROTEINA B
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL de suero
Valores de referencia: (60 - 140) Hombre
 (55 - 130) Mujer

Descripción: APOLIPOPROTEINA E
Código: APOE
Técnica: Nefelometría
Unidades: mg/L
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero. refrigerar
 Volumen mínimo: 0.3 mL
Valores de referencia: (23 - 63)

Código: ARABI
Descripción: Arabinosa y Arabitól en orina
Técnica: Arabinosa y arabitól|Técnica GC
Comentario adicional: 15 mL primera orina de la mañana

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	ARABINOSA	79281-2		PERFIL ARABINOSA EN ORINA	mg/g creatinina	(Inf. 25)
Prueba	ARABITOL			PERFIL ARABITOL EN ORINA	mg/g creatin.	(Inf. 50)
Prueba	ARABIINTER			PERFIL ARABINOSA Y ARABITOL INTERPRETACIÓN		

Descripción: Aracnodactilia contractual congénita. Sec Gen: FBN2.
Código: GEN_000055
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: ARILSULFATASA A EN LEUCOCITOS
Código: ARILSULFA
Técnica: Enzimática
Unidades: nmol/17h/mg pro
Plazo: 90 días
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional: 10 mL SANGRE TOTAL (Heparina). INDISPENSABLE AVISAR PREVIAMENTE PARA PROGRAMACIÓN DEL ESTUDIO. Informe clínico. Envío de sangre control en idénticas condiciones.
Valores de referencia: (73.0 - 215.0)

Descripción: ARIPIPAZOL SUERO
Código: ARIPIPAZO
Técnica:

Descripción: ARIPIPAZOL SUERO
Unidades: ng/mL
Plazo: 13 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL
Valores de referencia: (150 - 250)

Descripción: ARN RIBOSOMAL (16S), MUESTRA BIOLÓGICA
Código: R16S
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: LIQUIDO CITOGENETICA
Comentario adicional: Líquido Amniótico:
 Tubo esteril
 Volumen 0.5 mL,
 Conservación Refrigerar
 Volumen mínimo 0.5 mL
 Estabilidad 4°C, 72 Horas

Líquido pleural :
 Tubo esteril
 Volumen 0.5 mL,
 Conservación Refrigerar
 Volumen mínimo 0.5 mL

Líquido Sinovial
 Tubo esteril heparinizado
 Volumen 0.5 mL
 Conservación Refrigerar
 Volumen mínimo 0.5 mL
 Estabilidad 4°C 2 semanas, -20° 1 mes

Valores de referencia:

Descripción: Array 750k: restos abortivos
Código: CGHARRAYAB
Técnica:
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Citogenética
Comentario adicional: Muestra en medio de cultivo. Refrigerada.
 Contactar con genetica@megalab.es para envío de medio

Valores de referencia:

Descripción: Array CytoSNPs 850K
Código: ARRAY_850K
Técnica:
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: EDTA Biología Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
 Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción:	Array de exoma: Infinium OmniExpressExome-8 v1.4
Código:	ARRAYEXOMA
Técnica:	Array Infinium OmniExpressExome-8 v1.4
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM. Alternativa: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción:	ARSENICO EN PELO
Código:	ARSENIPELO
Técnica:	Espectrometría de absorción atómica-generator hidruros
Unidades:	mcg/g
Plazo:	17 días
Tubo:	
Comentario adicional:	200 mg de pelo aprox.
Valores de referencia:	(Inf. 0.90)

Descripción:	ARSENICO EN SANGRE
Código:	ASSANGRE
Técnica:	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente
Unidades:	µg/L
Plazo:	6 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	Sangre total EDTA Dipotásico (libre trazas metales) Volumen mínimo 0.15 mL
Valores de referencia:	(Inf. 10)

Descripción:	ARSENICO INORGANICO Y SUS METABOLITOS METILADOS EN ORINA
Código:	ASINORG2
Técnica:	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)
Unidades:	µg/L
Plazo:	9 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	10 Orina (micción aislada) al final de la semana laboral. Refrigerar
Valores de referencia:	(Inf. 35) Valor Límite Biológico-VLB (INSST) Fin de la semana Laboral (exposición a Arsénico elemental y sus compuestos inorgánicos solubles)

Descripción:	Arteriopatía, infarto subcortical, leucoencefalopatía Panel
Código:	GEN_000056
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción: Artrogriposis. Panel
Código: GEN_000057
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Arts, Sd. Sec Gen: PRPS1.
Código: GEN_000058
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Código: ETS7_ASEGU
Descripción: Aseguradoras PCR de 7 patógenos de transmisión sexual
Técnica: Real-time PCR
Comentario adicional: Muestras de zona genital: torundas secas, tejido, orina y semen.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	CHLAMPCR	35729-3		Chlamydia trachomatis DNA PCR Cualitativa		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	NEISSERPCR	24111-7		Neisseria gonorrhoeae DNA PCR Cualitativa		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	TRICOMOPCR			Trichomonas DNA PCR		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	MYCOPCR	68546-1		Mycoplasma Hominis en muestra por PCR		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	MYCOGENIT	69935-5		Mycoplasma genitalium DNA PCR Cualitativa		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	UREAPLPCR	51988-4		Ureaplasma urealyticum/parvum DNA PCR cualitativa		Valor de referencia: No se detecta

Código: ETS7_ASEGU
Descripción: Aseguradoras PCR de 7 patógenos de transmisión sexual
Técnica: Real-time PCR
Comentario adicional: Muestras de zona genital: torundas secas, tejido, orina y semen.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	CHLAMPCR	35729-3		Chlamydia trachomatis DNA PCR Cualitativa		Valor de referencia: No se detecta

Componentes						
Prueba	NEISSERPCR	24111-7		Neisseria gonorrhoeae DNA PCR Cualitativa		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	TRICOMOPCR			Trichomonas DNA PCR		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	MYCOPCR	68546-1		Mycoplasma Hominis en muestra por PCR		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	MYCOGENIT	69935-5		Mycoplasma genitalium DNA PCR Cualitativa		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	UREAPLPCR	51988-4		Ureaplasma urealyticum/parvum DNA PCR cualitativa		Valor de referencia: No se detecta

Descripción: ASIALOGLICOPROTEINA RECEPTOR AC. SUERO

Código: RECASIALO

Técnica: Enzimoinmunoanálisis

Unidades:

Plazo: 17 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 1 ml suero

Valores de referencia: (Sup. 1) Positivo

Descripción: Asociación VACTERL. Sec Gen: HOXD13.

Código: GEN_000059

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: ASPARAGINASA ACTIVIDAD SUERO

Código: ASPARAGINA

Técnica: Enzimática

Unidades: U/L

Plazo: 12 días

Tubo: Suero Congelado

Comentario adicional: 1 mL suero CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO

Valores de referencia: (Sup. 100) Niveles terapéuticos

Descripción: Aspartilglucosaminuria. Sec Gen: AGA

Código: GEN_000060

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: ASPECTO LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
Código: LIQLCASP
Técnica: Observación
Unidades:
Plazo:
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: ASPERGILLUS FUMIGATUS ANTICUERPOS
Código: ASPERAC
Técnica: Hemaglutinación
Unidades: Titulo
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero. Refrigerado.
Valores de referencia: Título <1/320: Negativo

Descripción: ASPERGILLUS SPP. DNA (PCR)
Código: ASPERGIPCR
Técnica: hibridación molecular con amplificación (PCR)
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 2 ml sangre total y otras muestras.
Valores de referencia:

Descripción: ASTROVIRUS RNA PCR EN MUESTRA
Código: ASTROVIPCR
Técnica: HIBRIDACIÓN MOLECULAR CON AMPLIFICACIÓN (PCR)
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Muestra envíos externos
Comentario adicional: Heces (10 mL o g) vómito (10 mL o g). Envío CONGELADO
Valores de referencia:

Descripción: Ataxia de Friedreich: gen FXN (NGS)
Código: FRIEDR_SEC
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 40 días
Tubo: EDTA Biología Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Ataxia de Friedreich: gen FXN secuencia (GAA)_n
Código: FRIEDREICH
Técnica: PCR, TP-PCR, y análisis de fragmentos
Unidades:

Descripción: Ataxia de Friedreich: gen FXN secuencia (GAA)n
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
 Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.

Valores de referencia:

Descripción: Ataxia episódica: >10 genes (NGS)
Código: ATAXIA_EPI
Técnica: NGS y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Ataxia espinocerebelosa 3: gen ATXN3 secuencia (CAG)n
Código: MACHADOJOS
Técnica: PCR, TP-PCR, y análisis de fragmentos
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Ataxia espinocerebelosa tipo 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, y 17
Código: ATAXIA_SP
Técnica: PCR, TP-PCR, y análisis de fragmentos
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
 Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.

Valores de referencia:

Descripción: Ataxia telangiectasia: gen ATM (NGS)
Código: TELANGIECT
Técnica: NGS con TSOE Illumina y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Muestras de tejido tumotal y sangre.
 Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Ataxia y anemia sideroblástica lig. al X. Sec Gen ABCB7
Código: GEN_000061
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Ataxias autosómicas recesivas. Panel
Código: GEN_000062
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Ataxias hereditarias no dinámicas. Panel
Código: GEN_000063
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Ataxias hereditarias. Panel
Código: GEN_000064
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: ATOMOXETINA SUERO
Código: ATOMOXETIN
Técnica: Comotagrafia liquida /Tándem masas
Unidades: ng/dL
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (30 - 160) Tras toma 2x20 mg/día
(503 - 915) Metabolizadores lentos(misma dosis)

Descripción: Atrofia dentatorrubro pálido-luisiana: gen DRPLA sec (CAG)n
Código: DRPLA_DNA
Técnica: PCR, TP-PCR y análisis de fragmentos
Unidades:

Descripción: Atrofia dentatorrubro pálido-luisiana: gen DRPLA sec (CAG)n
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
 Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.

Valores de referencia:

Descripción: Atrofia medular espinal: gen SMN1 (sec. Sanger)
Código: SMN1
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Atrofia muscular bulboespinal - Enf. Kennedy: sec (CAG)n AR
Código: KENNEDYPCR
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
 Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente

Valores de referencia:

Descripción: Atrofia muscular espinal. Panel
Código: GEN_000065
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Atrofia muscular espinal: deleciones en SMN1 y SMN2
Código: SMN_PCR
Técnica: PCR-RFLP y MLPA
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Atrofia óptica hereditaria: >10 genes (NGS)
Código: ATROFI_OPT
Técnica:

Descripción: Atrofia óptica hereditaria: >10 genes (NGS)
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Ausencia congénita conducto deferente. Sec Gen: CFTR
Código: GEN_000066
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Autismo y TDAH: >10 genes (NGS)
Código: AUTIS_TDAH
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.
Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: AUTOTOMA: Estudio de nutrigenética
Código: NUTRIGEN_A
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: kit especial (comprado vía web Megalab)
Valores de referencia:

Descripción: AUTOTOMA: Estudio genético de respuesta a 75 fármacos
Código: FARMAGEN_A
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: KIT DE ENSAYOS CLINICOS
Comentario adicional: kit especial (comprado vía web Megalab)
Valores de referencia:

Código: DEPORDUO_A
Descripción: AUTOTOMA: Estudio genético deporte + suplementos y vitaminas
Técnica:
Comentario adicional: kit especial (comprado vía web Megalab)

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	SUPLEVIT_A			AUTOTOMA: Estudio genético para suplementos y vitaminas		
Prueba	DEPORGEN_A			AUTOTOMA: Estudio genetico rendimiento deportivo		

Descripción: AUTOTOMA: Estudio genetico rendimiento deportivo

Código: DEPORGEN_A

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: Muestra Biología Molecular

Comentario adicional: kit especial (comprado vía web Megalab)

Valores de referencia:

Descripción: AVIDEZ IGG EPSTEIN-BARR

Código: AVIDEZEPSB

Técnica: CLIA

Unidades: % avidéz IgG

Plazo: 11 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 1 mL de Suero: Refrigerar.

Valores de referencia: (Inf. 40.0) Baja avidéz. Compatible con infección aguda, primaria.
Se recomienda efectuar pruebas adicionales para su confirmación.
(40.0 - 60.0) Avidéz zona límite
(Sup. 60.0) Alta avidéz

Descripción: AVIDEZ IGG VARICELA ZOSTER

Código: AVIDEZVARI

Técnica:

Unidades: % avidéz IgG

Plazo: 7 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional:

Valores de referencia: (Inf. 40.0) Baja avidéz. Compatible con infección aguda, primaria.
(40.0 - 60.0) Avidéz zona límite
(Sup. 60.0) Alta avidéz

Descripción: Axenfeld-Rieger, Sd. Sec Gen: FOXC1

Código: GEN_000067

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Biología Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: AZATIOPRINA (6-MERCAPTOPURINA)

Código: AZATI

Descripción: AZATIOPRINA (6-MERCAPTOPURINA)
Técnica: LC-MS/MS (Cromatografía líquida /Tándem masas)
Unidades: ng/mL
Plazo: 15 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: SUERO CONGELADO. Toma de muestra a 1-2 horas post-tratamiento
Valores de referencia: (40 - 300)

Descripción: BABESIA DIVERGENS (PIROPLASMOSIS) Ac IGG, SUERO
Código: BABESIA
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 11 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero (Refrigerado).
Valores de referencia: Valor de referencia indicativo: Negativo

Descripción: BABESIA SPP PCR SANGRE TOTAL
Código: BABESPCR
Técnica: HIBRIDACIÓN MOLECULAR PCR
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 2 Ml SANGRE TOTAL EDTA.
Valores de referencia:

Descripción: BACILLUS ANTHRACIS (CARBUNCO) PCR
Código: BACANTHR
Técnica: Hibridación molecular (PCR)
Unidades:
Plazo:
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Carbunco cutáneo (postula maligna): raspado de bordes de la lesión con torunda de algodón o de algodón-). Septicemia-sangre EDTA no congelado. Carbunco pulmonar: esudado respiratorio profundo.Gastrointestinal: heces.Refrigerado(4ref).Jamas 2 o Conge.máx 2
Valores de referencia:

Descripción: BACILOSCOPIA DE ESPUTO
Código: BACILOES
Técnica:
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Esputo
Comentario adicional: Esputo en frasco estéril
Valores de referencia:

Descripción: BACILOSCOPIA DE ORINA
Código: BACILO2
Técnica:
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Muestra Microbiología

Descripción: BACILOSCOPIA DE ORINA

Comentario adicional:

Valores de referencia:

Descripción: BACLOFENO
Código: BACLOFENO
Técnica: LC-MS/MS
Unidades: mcg/mL
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: (0.10 - 0.60)

Descripción: Bact. periodont. y polim.genes IL1A IL1B DNA PCR Cualitativa
Código: PERIO_IL1
Técnica: PCR y digestión
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Muestra exclusiva para esta determinación: puntas de papel (recogidas por el periodoncista en consulta).-REFRIGERAR.
 Las puntas de papel deben venir sin medio de transporte (secas). Mínimo 3 puntas de papel. Ideal: 6 puntas de papel.
Valores de referencia:

Descripción: Bacterias periodontales DNA PCR Cualitativa
Código: PERIODNA
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Muestra exclusiva para esta determinación: mucosa gingival en puntas de papel (recogidas por el periodoncista en consulta) que se envían en tubos estériles de tapón de rosca proporcionados por el laboratorio.-REFRIGERAR.
 Las puntas de papel deben venir sin ningún medio de transporte (secas). Mínimo 3 puntas de papel. Ideal, 6 puntas de papel.

Valores de referencia:

Descripción: Bacterias periodontales DNA PCR Cuantitativa
Código: PERIOCUAN
Técnica: PCR cuantitativa
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Muestra exclusiva para esta determinación: mucosa gingival en puntas de papel (recogidas por el periodoncista en consulta) que se envían en tubos estériles de tapón de rosca proporcionados por el laboratorio.-REFRIGERAR.
 Las puntas de papel deben llegar sin medio (secas). Mínimo 3 puntas de papel. Ideal 6-7 puntas de papel.

Valores de referencia:

Descripción: Baller-Gerold, Sd. Sec Gen: RECQL4
Código: GEN_000068
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Baller-Gerold, Sd. Sec Gen: RECQL4

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Código: BANOLIGIGG

Descripción: BANDAS OLIGOCLONALES EN LCR IGG

Técnica:

Comentario adicional: LCR y suero

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	BANOLIGOLC	56764-4		BANDAS OLIGOCLONALES IGG LCR (Indispensable 1 ml de suero)		Valor de referencia: No se detecta presencia de bandas oligoclonales
Prueba	BANOLIGGSU			BANDAS OLIGOCLONALES IGG SUERO (1 ml de suero+LCR)		

Código: BANOLIGIGM

Descripción: BANDAS OLIGOCLONALES EN LCR IGM

Técnica: Isoelectroenfoque.

Comentario adicional: LCR y suero

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	BANOLIGOLM	56765-1		BANDAS OLIGOCLONALES IGM LCR (Indispensable enviar suero)		Valor de referencia: No se detecta presencia de bandas oligoclonales
Prueba	BANOLIGMSU			BANDAS OLIGOCLONALES IGM SUERO (1 ml de suero+LCR)		

Descripción: BANDAS OLIGOCLONALES IGG LCR (Indispensable 1 ml de suero)

Código: BANOLIGOLC

Técnica: Téc. Isoelectroenfoque/Inmunoblot

Unidades:

Plazo: 32 días

Tubo: Líquidos Biológicos

Comentario adicional: 1 mL de LCR. Indispensable enviar también 1 mL de suero.

Valores de referencia: Valor de referencia: No se detecta presencia de bandas oligoclonales

Descripción: BANDAS OLIGOCLONALES IGM LCR (Indispensable enviar suero)

Código: BANOLIGOLM

Técnica: ISOELECTROENFOQUE E INMUNODETECCIÓN CON FOSFATASA ALCALINA

Unidades:

Plazo: 11 días

Tubo: Líquidos Biológicos

Comentario adicional: Condiciones de la muestra: 3 alícuotas de 200 µL cada una de LCR y de suero, ambas congeladas. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADAS. Extracción LCR y suero el mismo día.

Valores de referencia: Valor de referencia: No se detecta presencia de bandas oligoclonales

Descripción: BARBITURICOS EN PELO CONFIRMACION
Código: BARBIPELO
Técnica: Cromatografía líquida/Tanden masas (LC-MS/MS)
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional: PEDIR KIT ESPECIAL: almacen@ctes.eurofinseu.com
 PEDIR PROTOCOLO DE TOMA DE MUESTRA: calidad@ctes.eurofinseu.com
 -Análisis Informativo: incluye kit de toma de muestra y formulario de solicitud
-Cadena custodia: En caso de solicitar el análisis con validez judicial, solicitar al almacén también documentación de cadena custodia (foto de toma de muestra y hoja de seguimiento). El protocolo de cadena custodia debe solicitarse a calidad@ctes.eur
 En el caso de cadena custodia debe recogerse la muestra por duplicado.

Valores de referencia:

Descripción: BARBITURICOS ORINA (DETECCION DE METABOLITOS)
Código: BARBITU2
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Orina Drogas de Abuso
Comentario adicional:
 Valores de referencia:

Descripción: Bardet-Biedl, Sd. Panel
Código: GEN_000069
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
 Valores de referencia:

Descripción: BARIO EN ORINA
Código: BARIOORINA
Técnica: Espectrometría de emisión atómica/Espectrometría de masas (ICP-MS)(Espectrofotometría de absorción atómica / Cámara de grafito hasta 3/09/2012)
Unidades: mcg/L
Plazo: 9 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 10 mL orina (micción aislada)
 Valores de referencia: (3 - 6)

Descripción: BARIO EN SUERO
Código: BARIO
Técnica: Espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS)
Unidades: µg/L
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero (libre trazas metales)
 Tubo Suero metales traza
 Volumen mínimo: 0.35 mL

Descripción: BARIO EN SUERO
Valores de referencia: (Inf. 60) No expuestos
 (Inf. 1) Límite de cuantificación

Descripción: BARTONELLA HENSELAE AC IGG
Código: BARHEIGG
Técnica: Técnica CLIA
Unidades: Índice
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL suero.
 Alt: Plasma
Valores de referencia: (Inf. 0.9) Negativo
 (0.9 - 1.1) Indeterminado

Descripción: BARTONELLA HENSELAE AC IGM
Código: BARHEIGM
Técnica: Técnica CLIA
Unidades: Índice
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL suero.
 Alt: Plasma
Valores de referencia: (Inf. 0.9) Negativo
 (0.9 - 1.1) Indeterminado

Descripción: Bartonella henselae DNA PCR Cualitativa
Código: BARTONDNA
Técnica: RT-PCR
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional: Escobillón seco, LCR, orina. En suero sólo recomendable en fase aguda. Aceptable sangre (EDTA).
Valores de referencia:

Descripción: BARTONELLA QUINTANA AC IGG SUERO (FIEBRE DE LAS TRINCHERAS)
Código: BARQUIIGG
Técnica: INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA
Unidades: Título
Plazo: 12 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero. (Refrigerado).
Valores de referencia: Negativo :Título <1:64

Descripción: BARTONELLA QUINTANA AC IGM SUERO (FIEBRE DE LAS TRINCHERAS)
Código: BARQUIIGM
Técnica: Técnica IFI
Unidades: Título
Plazo: 12 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: suero

Descripción: BARTONELLA QUINTANA AC IGM SUERO (FIEBRE DE LAS TRINCHERAS)
Valores de referencia: Negativo: Título <1:12

Descripción: Bartter, Sd. Panel
Código: GEN_000070
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: BCR/ABL1 MUTACIONES DOMINIO KINASA · HOT SPOT
Código: BCRABL_MUT
Técnica: RT-PCR y Secuenciación
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Al menos 1 ml de Médula Ósea en tubo EDTA o al menos 5 ml de Sangre Periférica en tubo EDTA. Tubo exclusivo para esta determinación (tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO).
IMPORTANTE: SIEMPRE REFRIGERADO Y NO PINCHAR VIERNES NI VÍSPERAS DE FESTIVOS: la sangre se empieza a procesar dentro de las primeras 48 horas desde la extracción.
Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.
Valores de referencia:

Descripción: Beckwith-Wiedemann, Sd. Sec Gen: CDKN1C
Código: GEN_000071
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: BENCENO EN SANGRE
Código: BENCENO
Técnica: Cromatografía de gases
Unidades: mcg/L
Plazo: 9 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 2 mL de sangre total EDTA al final de la jornada
Valores de referencia: (Inf. 5) Personas expuestas. Valor límite orientativo. Al final de la jornada laboral

Código: CDOH
Descripción: BENZODIACEPINAS CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), ORINA
Técnica:
Comentario adicional: Orina. Contenedor de 70 mL. refrigerar

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.

Componentes						
Prueba	CO7COR			Confirmación de 7-amino-clonazepam en orina por LC-MS/MS	ng/mL	(Inf. 25) Límite de cuantificación (Inf. 4.4) Incertidumbre de medida
Prueba	CO7FOR			Confirmación de 7-amino-flunitrazepam en orina por LC-MS/MS	ng/mL	(Inf. 25) Límite de cuantificación (Inf. 4.8) Incertidumbre de medida
Prueba	COALPOR			Confirmación de Alprazolam en orina por LC-MS/MS	ng/mL	(Inf. 25) Límite de cuantificación (Inf. 4.8) Incertidumbre de medida
Prueba	COCNZOR			Confirmación de Clonazepam en orina por LC-MS/MS	ng/mL	(Inf. 25) Límite de cuantificación (Inf. 5) Incertidumbre de medida
Prueba	CODIAOR			Confirmación de Diazepam en orina por LC-MS/MS	ng/mL	(Inf. 25) Límite de cuantificación (Inf. 3) Incertidumbre de medida
Prueba	COFLUOR			Confirmación de Flunitrazepam en orina por LC-MS/MS	ng/mL	(Inf. 25) Límite de cuantificación (Inf. 5) Incertidumbre de medida
Prueba	COLOROR			Confirmación de Lorazepam en orina por LC-MS/MS	ng/mL	(Inf. 25) Límite de cuantificación (Inf. 3.9) Incertidumbre de medida
Prueba	CONDZOR			Confirmación de Nordiazepam en orina por LC-MS/MS	ng/mL	(Inf. 25) Límite de cuantificación (Inf. 4.1) Incertidumbre de medida
Prueba	COOXZOR			Confirmación de Oxazepam en orina por LC-MS/MS	ng/mL	(Inf. 25) Límite de cuantificación (Inf. 3.8) Incertidumbre de medida

Descripción: BENZODIACEPINAS CONFIRMACION EN SALIVA
Código: BENZOSAL
Técnica: LC-MS/MS
Unidades: ng/mL
Plazo: 10 días
Tubo: Saliva
Comentario adicional: Saliva recogida en kit ORAL-EZE. Solicitar kit en el almacén.
Valores de referencia:

Descripción: BENZODIAZEPINAS ORINA (DETECCION DE METABOLITOS)
Código: BENZODI2
Técnica: Inmunoensayo
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Orina Drogas de Abuso
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: BENZODIAZEPINAS ORINA CONFIRMACION
Código: BENZOCONF

Descripción: BENZODIAZEPINAS ORINA CONFIRMACION
Técnica: Cromatografía líquida/Tándem masas (LC-MS/MS)
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 10 ml de orina (micción aislada)
Valores de referencia:

Descripción: BENZODIAZEPINAS SUERO
Código: BENZODI
Técnica: EIA
Unidades: µg/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 0.3) Valor de corte

Descripción: Berardinelli-Seip, Sd. Panel
Código: GEN_000072
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: BERILIO EN ORINA
Código: BERILIO2
Técnica: ICP-MS
Unidades: µg/L
Plazo: 6 días
Tubo: Orina Final de Jornada
Comentario adicional: 10 mL orina (micción aislada)

No recoger muestras de orina en un ambiente en el que sea más probable que ocurra la exposición. Es importante evitar que el polvo de la ropa pueda interferir en el contenido de la muestra.

No recoger la orina en recipientes con base de metal, como urinarios o sartenes de metal. Recoger la orina en tubos de polipropileno inoculador libre de metales sin tapones de colores. Cuando esto no sea posible, usar para la recogida de orina un envase

Valores de referencia: (Inf. 0.040) BGV recomendado (SCOEL)

Descripción: BETA - NGF, SUERO
Código: NGF
Técnica: EIA
Unidades: pg/mL
Plazo: 19 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: Suero. Congelado
Separar y congelar inmediatamente.
Valores de referencia: (Inf. 14)

Descripción: BETA 2 DEFENSINA EN HECES
Código: B2DEFENSIN

Descripción: BETA 2 DEFENSINA EN HECES
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: ng/mL
Plazo: 15 días
Tubo: heces especiales
Comentario adicional:
Valores de referencia: (8 - 60)

Descripción: BETA TRACE (FISTULA CEFALORRAQ. EN RINO/OTICO)
Código: FISTULALCR
Técnica: Inmunonefelometría
Unidades: mg/L
Plazo: 8 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 mL LCR (2-8 °C - Refrigerar)
 1 mL Líquido biológico (2-8 °C - Refrigerar)
 1 mL Secreción nasal (2-8 °C - Refrigerar)
 1 mL Suero (2-8 °C - Refrigerar)
Valores de referencia: (8.89 - 25.90) LCR
 (Inf. 0.70) Suero
 Secreción nasal, ótica:
 (Inf. 0.70) , LCR en secreción improbable
 (Sup. 1.30) , LCR en secreción probable
 (0.70 - 1.29) , se recomienda valorar el cociente secreción/suero

Descripción: BETA-2 GLICOPROTEINA I AC. IGA
Código: B2GLICOA
Técnica: EIA
Unidades: U/mL
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL Suero (Refrigerado). Alternativa: plasma
Valores de referencia: (Inf. 7) Negativo
 (7 - 10) Indeterminado

Descripción: BETA-2 GLICOPROTEINA I AC. IGG
Código: B2GLICOI
Técnica: EIA
Unidades: U/mL
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 7) Negativo
 (7 - 10) Indeterminado

Descripción: BETA-2 GLICOPROTEINA I AC. IGM
Código: B2GLICOM
Técnica: EIA
Unidades: U/mL
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal

Descripción: BETA-2 GLICOPROTEINA I AC. IGM

Comentario adicional:

Valores de referencia: (Inf. 7) Negativo
(7 - 10) Indeterminado

Descripción: BETA-2 MICROGLOBULINA SUERO

Código: B2MICRO

Técnica: Inmunoturbidimetría

Unidades: mcg/mL

Plazo: 3 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 0.5 mL suero
Alternativa: plasma de sodio/litio

Valores de referencia: (0.8 - 2.4) < 60 años
(Inf. 3) > 60 años

Descripción: BETA-2-MICROGLOBULINA EN ORINA

Código: B2MICRO2

Técnica: Turbidimetría

Unidades: mcg/L

Plazo: 5 días

Tubo: orina oxalico

Comentario adicional: 5 ML ORINA (PH IGUAL O SUPERIOR A 6)

Se recomienda el siguiente procedimiento de recolección: El paciente ha de vaciar la vejiga, luego beber al menos 0,5L de agua. La muestra de orina ha de recogerse en una hora, y ajustar el pH (con NaOH 1M) a 6-8.

Valores de referencia: (Inf. 300)

Descripción: Beta-Caroteno en suero

Código: BCAROTENO

Técnica: Cromatografía líquida de alta resolución/Espectrometría

Unidades: µg/L

Plazo: 8 días

Tubo: Suero Congelado

Comentario adicional: 1 mL de suero CON gel separador
Conservación: CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO

Muestra protegida de la luz

Valores de referencia: (100 - 850) Los niveles de beta-caroteno en suero están influidos por la dieta.

Descripción: BETA-CROSSLAPS (CTX) TELOPEPTIDO C TERMINAL COLAGENO TIPO I

Código: CTX

Técnica: Electroquimioluminiscencia

Unidades: ng/mL

Plazo: 3 días

Tubo: Suero Congelado

Comentario adicional: 1 mL suero congelado, plasma de heparina litio congelado o plasma EDTA
Suero y plasma de heparina litio a 2-8°C tiene estabilidad de 8 horas. Plasma EDTA a 2-8°C tiene estabilidad de 8 días.

Descripción:	BETA-CROSSLAPS (CTX) TELOPEPTIDO C TERMINAL COLAGENO TIPO I
Valores de referencia:	(0.238 - 1.019) Hombre < 30 años (0.225 - 0.936) Hombre 30 años - 40 años (0.182 - 0.801) Hombre 40 años - 50 años (0.161 - 0.737) Hombre 50 años - 60 años (0.132 - 0.752) Hombre 60 años - 70 años (0.118 - 0.776) Hombre > 70 años (0.136 - 0.689) Mujer Pre-menopausia (0.177 - 1.015) Mujer Post-menopausia

Descripción:	Beta-Glucocerebrosidasa (E. Gaucher), sangre seca
Código:	BGLUCOCER
Técnica:	Fluorimetría
Unidades:	µmol/L x Hora
Plazo:	17 días
Tubo:	Tubo Especial
Comentario adicional:	Recoger gotas de sangre SIN ANTICOAGULANTE en 2 a 4 círculos de papel filtro (Solicitar a almacén). Dejar secar al aire libre durante 1 hora. Guardar en nevera en bolsa de plástico cerrada hasta el envío. Enviar a temperatura ambiente. INDISPENSABLE informe clínico y antecedentes familiares.
Valores de referencia:	(1.30 - 10.06)

Descripción:	BETAHCG
Código:	BETAHCG.
Técnica:	CMIA
Unidades:	mU/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 5) Mujer (No embarazo) (202 - 231000) Mujer Embarazo 1-10 semana gestación (22536 - 234990) Mujer Embarazo 11-15 semana gestación (8007 - 50064) Mujer Embarazo 16-22 semana gestación (1600 - 49413) Mujer Embarazo 23-40 semana gestación (Inf. 5) Hombre

Descripción:	BETA-HEXOSAMINIDASA TOTAL Y DISTRIB. ISOENZIMATICA (SUERO)
Código:	BHEXOSASUE
Técnica:	Electroforesis manual, Fluorimetría
Unidades:	
Plazo:	33 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	5 ml. Suero. Congelar. Centrifugar la muestra de sangre a 2500rpm 10 minutos a temperatura ambiente en las primeras 2 horas de su obtención, separar el sobrenadante a otro tubo y congelarlo inmediatamente a -20°C Adjuntar historia clínica resumida
Valores de referencia:	

Descripción:	BETA-PAPILOMAVIRUS (B-HPV) DNA DETECCIÓN
Código:	BHPV
Técnica:	PCR-Secuenciación
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	Muestra envíos externos

Descripción: BETA-PAPILOMAVIRUS (B-HPV) DNA DETECCIÓN
Comentario adicional: Biopsia- contenedor con solucion salina. Refrigerar.
 Lesión de piel. Refrigerar.

Valores de referencia:

Descripción: BETA-PAPILOMAVIRUS (B-HPV) DNA DETECCIÓN
Código: BHPV
Técnica: PCR-Secuenciación
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional: Biopsia- contenedor con solucion salina. Refrigerar.
 Lesión de piel. Refrigerar.

Valores de referencia:

Descripción: BICARBONATO EN ORINA
Código: BICARORINA
Técnica: Espectrometría
Unidades: mmol/L
Plazo: 9 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: Orina (micción aislada)
 Volumen: 10.0 mL
 Volumen mínimo: 5 mL

Valores de referencia: (20 - 50)

Descripción: BICARBONATO EN SUERO
Código: BIC
Técnica: Espectrometría
Unidades: mmol/L
Plazo: 3 días
Tubo: Suero doble
Comentario adicional: 1 mL suero en tubo sin destaponar
Valores de referencia: (17.00 - 24.00) < 2 meses
 (16.00 - 24.00) 2 meses - 24 meses
 (19.00 - 24.00) 3 años - 4 años
 (21.00 - 31.00) > 4 años

Descripción: BILIRRUBINA DIRECTA
Código: BILD
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: mg/dL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL suero o plasma.
 Proteger de la luz
Valores de referencia: (Inf. 0.2)

Descripción: BILIRRUBINA INDIRECTA SUERO (COLEMIA INDIRECTA)
Código: BILI
Técnica: Espectrofotometría

Descripción: BILIRRUBINA INDIRECTA SUERO (COLEMIA INDIRECTA)
Unidades: mg/dL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL de suero o plasma
Valores de referencia: (Inf. 1)

Descripción: BILIRRUBINA TOTAL
Código: BILT
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: mg/dL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL de suero
Valores de referencia: (1.4 - 8.7) < 1 día
 (3.4 - 11.5) 1 día - 2 días
 (1.5 - 12.0) 2 días - 5 días
 (0.3 - 1.2) > 5 días

Descripción: 'BIOMARCADOR TUMOR ONCOHEMATOLÓGICO · BCL2(18Q21.3)
Código: FISH_TBCL2
Técnica:
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: 'BIOMARCADOR TUMOR ONCOHEMATOLÓGICO · BCL6(3Q27.3)
Código: FISH_TBCL6
Técnica:
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: 'BIOMARCADOR TUMOR ONCOHEMATOLÓGICO · C-MYC (8Q24)
Código: FISH_TCMYC
Técnica:
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Biomarcador tumor sólido 11p15
Código: FISH11P15
Técnica: FISH
Unidades:

Descripción: Biomarcador tumor sólido 11p15
Plazo: 5 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Tejido parafinado T^a ambiente
Valores de referencia:

Descripción: Biomarcador tumor sólido 19q
Código: FISH19Q
Técnica: FISH
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Tejido parafinado T^a ambiente
Valores de referencia:

Descripción: Biomarcador tumor sólido 1p
Código: FISHSRD
Técnica: FISH
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Tejido parafinado T^a ambiente
Valores de referencia:

Descripción: Biomarcador tumor sólido 1p/19q
Código: FISH1P_19Q
Técnica: FISH
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Tejido parafinado T^a ambiente
Valores de referencia:

Descripción: Biomarcador tumor sólido cr 3
Código: FISHCEN3
Técnica: FISH
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Tejido parafinado T^a ambiente
Valores de referencia:

Descripción: Biomarcador tumor sólido cr 7
Código: FISHCEN7
Técnica: FISH
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Tejido parafinado T^a ambiente
Valores de referencia:

Descripción: Biomarcador tumor sólido FGFR1 (8p11)
Código: FISHFGFR
Técnica: FISH
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Tejido parafinado T^a ambiente
Valores de referencia:

Descripción: Biomarcador tumor sólido FOXO1A (13q14)
Código: FISHFOXO
Técnica: FISH
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Tejido parafinado T^a ambiente
Valores de referencia:

Descripción: Biomarcador tumor sólido HER2/neu
Código: FISHHER2
Técnica: FISH
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Tejido parafinado T^a ambiente
Valores de referencia:

Descripción: Biomarcador tumor sólido HER2/neu
Código: FISHHER2
Técnica: FISH
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Tejido parafinado T^a ambiente
Valores de referencia:

Descripción: Biomarcador tumor sólido MDM2 (12q15)
Código: FISHMDM2
Técnica: FISH
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Tejido parafinado T^a ambiente
Valores de referencia:

Descripción: Biomarcador tumor sólido NR4A3
Código: FISHNR4A3
Técnica: FISH
Unidades:
Plazo: 5 días

Descripción: Biomarcador tumor sólido NR4A3
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Tejido parafinado T^a ambiente
Valores de referencia:

Descripción: Biomarcador tumor sólido P16 (9p22)
Código: FISHP16
Técnica: FISH
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Tejido parafinado T^a ambiente
Valores de referencia:

Descripción: Biomarcador tumor sólido Reordenam COL1A1/PDFGB [t(17;22)]
Código: MDFISH1722
Técnica: FISH
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Tejido parafinado T^a ambiente
Valores de referencia:

Descripción: Biomarcador tumor sólido Reordenam COL1A1/PDFGB [t(17;22)]
Código: MDFISH1722
Técnica: FISH
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Tejido parafinado T^a ambiente
Valores de referencia:

Descripción: Biomarcador tumor sólido SYT (18q11)
Código: FISHSYT
Técnica: FISH
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Tejido parafinado T^a ambiente
Valores de referencia:

Descripción: BIOMARCADORES EN TS · IDH1(R132), IDH2(R172) · HOT SPOT
Código: IDH1_2SOMA
Técnica:
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Muestra: Tejido tumoral parafinado. T^a ambiente
Valores de referencia:

Descripción: BIOMARCADORES EN TS · KIT(9,11,13,17) · HOT SPOT
Código: KIT_MUTS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Sangre EDTA.
 ROTULAR: ONCO

Valores de referencia:

Descripción: BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · 1p/19q
Código: FISHTS1P19
Técnica: FISH
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:
 Valores de referencia:

Descripción: BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · ALK (2p23)
Código: FISH_TSALK
Técnica: FISH
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:
 Valores de referencia:

Descripción: BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · EWSR1(22q12)
Código: FISH_TSEWS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:
 Valores de referencia:

Descripción: BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · FGFR2 (10q26)
Código: FISHTFGFR2
Técnica:
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:
 Valores de referencia:

Descripción: BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · FGFR3 (4p16.3)
Código: FISHTFGFR3
Técnica:
Unidades:

Descripción: BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · FGFR3 (4p16.3)
Plazo: 5 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · NTRK2 (9q21.3)
Código: FISHTNTRK2
Técnica:
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · RET(10q11.21)
Código: FISH_TSRET
Técnica:
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · ROS1 (6q22)
Código: FISH_TROS1
Técnica:
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · BRAF(V600X) HOT SPOT
Código: BRAF_V600
Técnica: RT-PCR HOT-SPOT
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Posibilidad de estudio en oncohematología en médula ósea.
Valores de referencia:

Descripción: BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · EGFR(18-21) · HOT SPOT
Código: EGFR_MUTS
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica

Descripción: BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · EGFR(18-21) · HOT SPOT

Comentario adicional: Muestras: tejido incluido en parafina.
Una vez hechos los cortes que se necesitan para el estudio, devolvemos el bloque al paciente / médico.
Rotular ONCO.

Valores de referencia:

Descripción: BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · ERBB2 (20) · HOT SPOT

Código: ERBB2_MUTS

Técnica: SANGER - HOT SPOT

Unidades:

Plazo: 7 días

Tubo: Muestra Anatomía Patológica

Comentario adicional: 1 Pieza/s Tejido parafinado [Tªambiente] (Estabilidad: 20°C:1 Años)

Valores de referencia:

Descripción: BIOMARCADORES EN TUMORES SOLIDOS · H3-3A (G34R/V) · HOT SPOT

Código: H3_MUTSG34

Técnica: SANGER - HOT SPOT

Unidades:

Plazo: 7 días

Tubo: Muestra Anatomía Patológica

Comentario adicional: 1 Pieza/s Tejido parafinado [Tªambiente] (Estabilidad: 20°C:1 Años)

Valores de referencia:

Descripción: BIOMARCADORES EN TUMORES SOLIDOS · H3-3A (K27M) · HOT SPOT

Código: H3_MUTSK27

Técnica: SANGER - HOT SPOT

Unidades:

Plazo: 7 días

Tubo: Muestra Anatomía Patológica

Comentario adicional: 1 Pieza/s Tejido parafinado [Tªambiente] (Estabilidad: 20°C:1 Años)

Valores de referencia:

Descripción: BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · KRAS(2, 3, 4) · HOT SPOT

Código: KRAS_MUTS

Técnica: PCR y secuenciación

Unidades:

Plazo: 7 días

Tubo: Muestra Anatomía Patológica

Comentario adicional: Muestras: tejido incluido en parafina o EDTA
Una vez hechos los cortes que se necesitan para el estudio, devolvemos el bloque al paciente / médico.
Rotular ONCO.

Valores de referencia:

Descripción: BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · MGMT(METILACION PROMOTOR)

Código: MGMT

Técnica: qPCR

Unidades:

Plazo: 7 días

Tubo: Muestra Anatomía Patológica

Descripción: BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · MGMT(METILACION PROMOTOR)

Comentario adicional: Se requieren entre 2-10 secciones de tejido parafinado de 10 µm marcadas como muestra de oncogenética.
Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.

Valores de referencia:

Descripción: BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · NRAS(2, 3, 4) · HOT SPOT

Código: NRAS_MUTS

Técnica: PCR y secuenciación

Unidades:

Plazo: 7 días

Tubo: Muestra Anatomía Patológica

Comentario adicional: Tejido parafinado.Tª ambiente

Valores de referencia:

Descripción: BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS BÁSICO · PANEL · NGS

Código: TUMOR_MUT

Técnica:

Unidades:

Plazo: 15 días

Tubo: Muestra Anatomía Patológica

Comentario adicional: Bloque parafina. Tª ambiente
ROTULAR ONCO

Valores de referencia:

Código: BIOPSIARAD

Descripción: BIOPSIA CON CIRUGÍA RADICAL

Técnica:

Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	NBIOP			Registro Biopsia		
Prueba	SNOMED1			SNOMED1		
Prueba	DIAGNOST			DIAGNOST		
Prueba	DMACRO			DMACRO		
Prueba	DMICRO			DMICRO		
Prueba	NOTABIOP			NOTA		
Prueba	PATOLOGO			PATOLOGO		
Prueba	TDMRADICAL			TIPIO DE MUESTRA CIRUGÍA RADICAL		

Código: BIOPDISECC

Descripción: BIOPSIA CON DISECCION

Técnica:

Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	NBIOP			Registro Biopsia		

Componentes					
Prueba	SNOMED1			SNOMED1	
Prueba	DIAGNOST			DIAGNOST	
Prueba	DMACRO			DMACRO	
Prueba	DMICRO			DMICRO	
Prueba	NOTABIOP			NOTA	
Prueba	PATOLOGO			PATOLOGO	
Prueba	TDMDISECCI			TIPO DE MUESTRA CON DISECCIÓN	

Código: BIOPINTRA
Descripción: BIOPSIA INTRAOPERATORIA
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes					
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades V. ref.
Prueba	NBIOP			Registro Biopsia	
Prueba	SNOMED1			SNOMED1	
Prueba	DIAGNOST			DIAGNOST	
Prueba	DMACRO			DMACRO	
Prueba	DMICRO			DMICRO	
Prueba	NOTABIOP			NOTA	
Prueba	PATOLOGO			PATOLOGO	
Prueba	TDMINTRA			TIPO DE MUESTRA INTRAOPERATORIA	

Descripción: Biopsia líquida genes BRCA1 y BRCA2
Código: BLBRCA1.2
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: STRECK BIOPSIA LIQUIDA
Comentario adicional: 2 TUBOS STRECK
 Rotular con ONCO
Valores de referencia:

Descripción: Biopsia líquida panel de 40 genes
Código: BIOLIQPANE
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: STRECK BIOPSIA LIQUIDA
Comentario adicional: Solicitar kit específico, 2 tubos streck
 se envía a BIOSEQUENCE
Valores de referencia:

Descripción:

Biopsia liquida Pulmon

Código:

ONCOLIPUL

Técnica:

Unidades:

Plazo:

Tubo:

Tubo Especial

Comentario adicional:

Solicitar kit especial.Contactar con asesoría genética antes de tomar la muestra. Tubo sangre total especial

Valores de referencia:

Código:

BIOPSIADP1

Descripción:

BIOPSIA PIEZA PEQUEÑA

Técnica:

Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	NBIOP			Registro Biopsia		
Prueba	SNOMED			SNOMED		
Prueba	DIAGNOST			DIAGNOST		
Prueba	DMACRO			DMACRO		
Prueba	DMICRO			DMICRO		
Prueba	NOTABIOP			NOTA		
Prueba	PATOLOGO			PATOLOGO		
Prueba	TBIOPSIA			Especimen		

Descripción:

BIOPSIA PROTEOMICA EN AMILOIDOSIS

Código:

PROTEOBIOS

Técnica:

Unidades:

Plazo:

17 días

Tubo:

BIOPSIA ESPECIAL

Comentario adicional:

Bloque de parafina de la biopsia con una copia del informe del estudio AP (para poder confirmar que el bloque se corresponde con el paciente).
Breve resumen de la historia clínica del paciente (necesitamos que conste el nombre, apellidos y fecha de nacimiento).

ENVIAR A LA ATENCIÓN DE eNVIOS EXTERNOS.
ENVIAR A VAL CENTRAL DE LUNES A MIERCOLES

Valores de referencia:

Código:

BIOPSENC

Descripción:

BIOPSIA SENCILLA

Técnica:

Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	NBIOP			Registro Biopsia		
Prueba	SNOMED			SNOMED		
Prueba	DIAGNOST			DIAGNOST		

Componentes					
Prueba	DMACRO			DMACRO	
Prueba	DMICRO			DMICRO	
Prueba	NOTABIOP			NOTA	
Prueba	PATOLOGO			PATOLOGO	
Prueba	TDMSENC			TIPO DE MUESTRA BIOPSIA SENCILLA	

Descripción: Biotina (Vitamina H)
Código: BIOTINA
Técnica: EIA
Unidades: ng/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 2 ml de Suero . Refrigerar .
Valores de referencia: (Inf. 100) Niveles bajos
(100 - 250) Zona intermedia
(Sup. 250) Niveles normales

Descripción: BIOTINIDASA EN PLASMA
Código: BIOTINID
Técnica: Colorimetría
Unidades: nmol/min/mL
Plazo: 17 días
Tubo: Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional: 1 mL plasma de EDTA. Congelar inmediatamente. ENVIAR EN TUBO SEPARADO PARA ESTA DETERMINACIÓN. INDISPENSABLE ENVIAR HISTORIA CLINICA.
Valores de referencia: (7.8 - 13.1)

Descripción: BIPERIDENO (AKINETON) EN SUERO
Código: BIPERI
Técnica: HPLC
Unidades: µg/L
Plazo: 19 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 3 mL .
Valores de referencia: (10 - 100)

Descripción: Birk-Barel, Sd. Sec Gen: KCNK9
Código: GEN_000073
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: BISMUTO EN ORINA
Código: BISMUTO2
Técnica: Espectrometría de Emisión Atómica/MS

Descripción: BISMUTO EN ORINA
Unidades: mcg/24 h
Plazo: 9 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: .10 mL orina 24 h.Indicar volumen orina 24 horas.
Valores de referencia: (Inf. 3)

Descripción: BISMUTO SANGRE TOTAL
Código: BISMUSAN
Técnica: Espectrometría de masas-plasma acoplado inductivamente (ICP-MS)
Unidades: µg/L
Plazo: 10 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 2 ml sangre total EDTA
Valores de referencia: (Inf. 5.0)

Descripción: Björnstadt, Sd. Sec Gen: BCS1L
Código: GEN_000074
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Bladder Epicheck (screening cáncer de vejiga)
Código: BEPICHECK
Técnica:
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: ORINA ONCOGENETICA
Comentario adicional: Muestra: primera orina de la mañana recogida en bote estéril ROTULADO con ONCO (Laboratorio Oncogenética))hay kits a disponibilidad del paciente.
Volúmen mínimo 30 ml conservar en nevera hasta su recogida. La muestra dura máximo 5 días hasta su procesamiento.
SIN masaje prostático
Valores de referencia:

Descripción: BLASTOCYSTIS SPP en HECES PCR
Código: BLASTOPCR
Técnica: Hibridación molecular (PCR)
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: heces especiales
Comentario adicional: Heces congeladas
Valores de referencia:

Descripción: Bloom, Sd. Sec Gen: BLM
Código: GEN_000075
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días

Descripción: Bloom, Sd. Sec Gen: BLM
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: BOR, Sd., artrocalasia tipo Ehlers-Danlos. Panel NGS
Código: GEN_000688
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: BOR, Sd., Autoimmune proliferativo. Panel NGS
Código: GEN_000689
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: BORDETELLA PARAPERTUSSIS AC. IGG SUERO
Código: BORDEPAACG
Técnica: IFI
Unidades: Titulo
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero
Valores de referencia: < 1:100 Ausencia de Inmunidad

Descripción: BORDETELLA PARAPERTUSSIS AC. IGM SUERO
Código: BORDEPAACM
Técnica: IFI
Unidades: Titulo
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero
Valores de referencia: <1:100 Negativo
>0 =1:100 Positivo

Descripción: BORDETELLA PERTUSSIS AC. IGA SUERO
Código: BORDETEIGA
Técnica: EIA
Unidades: UI/mL
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero. Refrigerado.
Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo

Descripción: BORDETELLA PERTUSSIS AC. IGG SUERO
Código: BORDETEACG
Técnica: CLIA
Unidades: UI/mL
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 54) Negativo
 (55 - 65) Indeterminado
 (Sup. 66) Positivo

Descripción: BORDETELLA PERTUSSIS AC. IGM SUERO
Código: BORDETEACM
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero
 Alternativa: plasma (citrato, heparina)
Valores de referencia: (Inf. 9) Negativo
 (9 - 11) Indeterminado
 (Sup. 11) Positivo

Descripción: Bordetella pertussis DNA PCR Cualitativa
Código: B.PERTUSSI
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Muestra exudado
 Aspirado nasofaríngeo
 Frotis nasofaríngeo
 Alternativa: Exudado nasofaríngeo u orofaríngeo recogido con hisopo seco.
Valores de referencia: Valor de referencia: No se detecta

Descripción: Borjeson-Forssman-Lehmann, Sd. Sec Gen: PHF6
Código: GEN_000076
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: BORO SUERO
Código: BORO
Técnica: ICP-MS
Unidades: mcg/L
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:

Descripción: BORO SUERO

Valores de referencia: (Inf. 100)

Código: WEBM

Descripción: BORRELIA BURGDORFERI (ENF. LYME) CONFIRM.BLOT AC IgM. SU

Técnica:

Comentario adicional: Suero. refrigerar.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	WBM10	PROP5009512		Ac Borrelia IgM (western blot) Proteína P17		Valor de referencia indicativo: No se detecta
Prueba	WBM11	PROP5009900		Ac Borrelia IgM (western blot) Proteína P19		Valor de referencia indicativo: No se detecta
Prueba	WBM12	PROP5009900		Ac Borrelia IgM (western blot) Proteína P21		Valor de referencia indicativo: No se detecta
Prueba	WBM13	PROP5009902		Ac Borrelia IgM (western blot) Proteína P30		Valor de referencia indicativo: No se detecta
Prueba	WBM14	PROP5009903		Ac Borrelia IgM (western blot) Proteína P83		Valor de referencia indicativo: No se detecta
Prueba	WBM2	32666-0		Ac Borrelia IgM (western blot) Proteína P25 (OspC)		Valor de referencia indicativo: No se detecta
Prueba	WBM3	44947-0		Ac Borrelia IgM (western blot) Proteína P31 (OspA)		Valor de referencia indicativo: No se detecta
Prueba	WBM4	9599-2		Ac Borrelia IgM (western blot) Proteína P39 (BmpA)		Valor de referencia indicativo: No se detecta
Prueba	WBM7	PROP5009519		Ac Borrelia IgM (western blot) Proteína VlsE		Valor de referencia indicativo: No se detecta
Prueba	WBM9	13503-8		Ac Borrelia IgM (western blot) Comentario		

Descripción: BORRELIA BURGDORFERI AC. IGG (ENFERMEDAD DE LYME) SUERO

Código: BORRELIACG

Técnica: CLIA

Unidades: UA/mL

Plazo: 3 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: Suero.
Alternativa: Plasma (citrato, EDTA, heparina)

Valores de referencia: (Inf. 10) Negativo
(10 - 15) Indeterminado

Descripción: BORRELIA BURGDORFERI AC. IGG (ENFERMEDAD DE LYME) LCR

Código: BORREACGLC

Técnica: clia

Unidades: UA/mL

Plazo: 8 días

Tubo: Líquidos Biológicos

Descripción: BORRELIA BURGDORFERI AC. IGG (ENFERMEDAD DE LYME) LCR
Comentario adicional: 1 mL LCR.
Valores de referencia: (Inf. 4.5) Negativo

Descripción: BORRELIA BURGDORFERI AC. IGM (ENFERMEDAD DE LYME) LCR
Código: BORREACMLC
Técnica: IFI
Unidades: Titulo
Plazo: 8 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 mL LCR.
Valores de referencia: Título < 1/2 Negativo
Título > o =1/2 Positivo

Descripción: BORRELIA BURGDORFERI AC. IGM (ENFERMEDAD DE LYME) SUERO
Código: BORRELIACM
Técnica: EIA
Unidades: Indice
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 0.9) Negativo
(0.91 - 1.1) Indeterminado

Descripción: Borrelia burgdorferi DNA PCR Cualitativa
Código: BORRPCR
Técnica: PCR a tiempo real
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: 1 5 mL tubo angre total EDTA.Refrigerado.
LCR congelado.
Valores de referencia:

Descripción: BP230 (PENFIGOIDE BULLOSO) AC. SUERO
Código: BP230
Técnica: EIA
Unidades: Ratio
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL.
Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo

Descripción: Braquidactilia tipo a1. Sec Gen: IHH
Código: GEN_000077
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:

Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Descripción: Braquidactilia tipo a1. Sec Gen: IHH

Valores de referencia:

Descripción: BRIVARACETAM SUERO

Código: BRIVARACET

Técnica: Cromatografía Líquida-Tándem Masas

Unidades: mg/L

Plazo: 7 días

Tubo: Suero Congelado

Comentario adicional: Suero congelado.

Valores de referencia: (0.5 - 0.9)
(Sup. 1.8) Toxicidad

Descripción: BROMAZEPAM SUERO

Código: BROMAZEPAM

Técnica: Cromatografía líquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)

Unidades: µg/L

Plazo: 8 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 1 mL suero SIN gel separador
Volumen mínimo: 1 mL

La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la toma de la dosis.

Valores de referencia: (50 - 200) Intervalo terapéutico
(Inf. 10) Límite de cuantificación
(Sup. 300) Toxicidad

Descripción: BROMUROS EN ORINA

Código: BROMUR2

Técnica: Cromatografía líquida de alta resolución.

Unidades: mg/L

Plazo: 24 días

Tubo: Orina pruebas referencia

Comentario adicional: 10 ML orina (micción aislada)

Valores de referencia: (Inf. 15) Personal no expuesto
(Inf. 115) Personal expuesto

Descripción: BROMUROS EN SUERO

Código: BROMUROS

Técnica: HPLC

Unidades: mg/L

Plazo: 23 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional:

Valores de referencia: (Inf. 12) Final semana laboral (exposición a Bromuro de metilo);
BLW-DFG
(200 - 1200) Niveles terapéuticos (tratamiento con Bromuros)
(Sup. 3000) Niveles tóxicos (tratamiento con Bromuros)

Descripción: Bronquiectasia idiopática. Sec Gen: SCNN1A

Código: GEN_000078

Técnica:

Descripción: Bronquiectasia idiopática. Sec Gen: SCNN1A
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: BRUCELLA ABORTUS ANTICUERPOS, SUERO
Código: BRAB
Técnica: Aglutinación
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Siero refrigerado
Valores de referencia: Titulo inferior a 1/80 Negativo

Descripción: BRUCELLA AC. IGG LCR
Código: BRUCEACGLC
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 1.00) Negativo
(Sup. 1.00) Positivo

Descripción: BRUCELLA AC. IGG SUERO
Código: BRUCELAACG
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero
Alternativa: Plasma de EDTA/Heparina/Citrato
Valores de referencia: (Inf. 0.8) Negativo
La determinación de Ac IgG es útil para confirmar el diagnóstico de la enfermedad aunque no permite discernir entre curación y evolución a cronicidad ya que los anticuerpos pueden persistir en sujetos curados.

Descripción: BRUCELLA AC. IgM LCR
Código: BRUCEACMLC
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 1.00) Negativo
(Sup. 1.00) Positivo

Descripción:	BRUCELLA AC. IGM SUERO
Código:	BRUCELAACM
Técnica:	EIA
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero Alternativa: Plasma de EDTA/Heparina/citrato
Valores de referencia:	(Inf. 0.8) Negativo
Descripción:	BRUCELLA AC. SEROAGLUTINACION
Código:	AGLUBRU
Técnica:	AGLUTINACIÓN
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	Compatible con primoinfectados >1/160; Pueden aparecer resultados negativos en fases avanzadas de la enfermedad.
Descripción:	BRUCELLA AGLUTINACION EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
Código:	AGLUBRLC
Técnica:	Aglutinación
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	
Descripción:	BRUCELLA ANTICUERPOS INCOMPLETOS SUERO
Código:	BRUCEIMCOM
Técnica:	Técnica inmunocaptura-aglutinación
Unidades:	
Plazo:	23 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml suero
Valores de referencia:	Se considera resultado positivo a partir de título 1:320
Descripción:	BRUCELLA SPP DNA, MUESTRA BIOLÓGICA
Código:	BRUCESPPCR
Técnica:	PCR Nested
Unidades:	
Plazo:	10 días
Tubo:	Muestra envios externos
Comentario adicional:	1 tubo sangre total EDTA. refrigerar. 2 ml Orina en contenedor estéril. refrigerar. 1 pieza tejido parafinadp. Temperatura ambiente LCR en tubo esteril. Congelar Heces recogidas en tubo estéril. Congelar. tejido suero fisiológico. Congelar

Descripción: BRUCELLA SPP DNA, MUESTRA BIOLÓGICA

Valores de referencia:

Descripción: BRUCELLA TEST DE COOMBS SUERO

Código: COOMBSBRU

Técnica: Aglutinación de Ac. Incompletos

Unidades:

Plazo: 4 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 1 mL suero

Valores de referencia:

Descripción: Bruck, Sd. Sec Gen: PLOD2

Código: GEN_000694

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: BUN (NITROGENO UREICO)

Código: BUN

Técnica: Enzimático colorimétrico.

Unidades: mg/dL

Plazo: 3 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 3 mL suero.

Valores de referencia: (7 - 20) 1 año - 17 años
(8 - 24) Hombre > 17 años
(6 - 21) Mujer > 17 años

Descripción: BUPRENORFINA

Código: BUPRENORF

Técnica: LC-MS/MS

Unidades: ng/mL

Plazo: 9 días

Tubo: Orina congelada

Comentario adicional: 10 mL orina (micción aislada). CONGELAR Y ENVIAR CONGELADA.

Valores de referencia:

Descripción: BUPROPION SUERO

Código: BUPROPION

Técnica: Cromatografía Líquida/Tándem Masas (LC-MS/MS)

Unidades: ng/mL

Plazo: 17 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 1 mL suero.

Valores de referencia: (850 - 1500) Rango terapéutico (AGNP 2017)

Descripción: Buschke-Ollendorff, Sd. Sec Gen: LEMD3
Código: GEN_000079
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: C1Q ANTICUERPOS SUERO
Código: C1QAC
Técnica: ENZIMOINMUNOANÁLISIS
Unidades: U/mL
Plazo: 14 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero.
Volumen mínimo: 0,50 mL
Valores de referencia: (Inf. 9.99) Negativo

Descripción: C4b-BP (PROTEINA LIGANTE PROTEINA S)
Código: C4B.BP
Técnica: Inmunoanálisis.
Unidades: %
Plazo: 9 días
Tubo: Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional: .Congelar y enviar congelado.
Valores de referencia: (68 - 140)

Descripción: CA 125 II SUERO
Código: CA125
Técnica: CMIA
Unidades: UI/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Determinación realizable en Líquidos Biológicos
Valores de referencia: (Inf. 35)

Descripción: CA 15-3 suero
Código: CA153
Técnica: CMIA
Unidades: UI/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Determinación realizable también en Líquidos Biológicos
Valores de referencia: (Inf. 32)

Descripción: CA 199 EN MUESTRA
Código: CA199MUEST
Técnica: ECLIA
Unidades: UI/mL

Descripción: CA 199 EN MUESTRA
Plazo:
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: CA 19-9 SUERO
Código: CA199
Técnica: ECLIA
Unidades: U/mL
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero y Plasma tratado con heparina (litio, sodio, amonio) y EDTA tripotásico. No emplear plasma con citrato de sodio.
Valores de referencia: (Inf. 34) Observaciones: Los pacientes con grupo sanguíneo Lewis a-b- (aproximadamente el 6 % de la población) no expresan el determinante antigénico CA 19-9 ni siquiera en presencia de una enfermedad maligna. Esto tiene que tenerse en cuenta ante resultados indetectables.

Descripción: CA 50 SUERO
Código: CA50
Técnica: CLIA
Unidades: U/mL
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero congelado
Valores de referencia: (Inf. 25)

Descripción: CA 72-4 SUERO (TAG-72)
Código: CA72.4
Técnica: INMUNOQUIMIOLUMINISCENCIA
Unidades: U/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Alternativo 1 ml de plasma (EDTA o de Heparina litio, Heparina sódica)
Valores de referencia: (Inf. 6.9)

Descripción: Ca. de colon HNPCC: <10 genes (NGS)
Código: LYNCH_MUTS
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 45 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: CA-27.29 en suero
Código: CA27.29
Técnica: Quimioluminiscencia.

Descripción: CA-27.29 en suero
Unidades: U/mL
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero. Refrigerar
 Volumen: 1.0 mL
 Volumen mínimo: 0.50 mL
Valores de referencia: (Inf. 38.6)

Descripción: CADASIL: gen NOTCH3 (NGS)
Código: CADASILTOT
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
 Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Código: CADENASLI2
Descripción: CADENAS LIGERAS LIBRES ORINA KAPPA LAMBDA
Técnica: Nefelometría
Comentario adicional: 10 ml orina.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	KAPPALIB2	38176-4		CADENAS LIGERAS KAPPA LIBRES EN ORINA	mg/dL	(Inf. 3.29)
Prueba	LAMBDALIB2	38178-0		CADENAS LIGERAS LAMBDA LIBRES EN ORINA	mg/dL	(Inf. 0.38)

Código: FREELITE
Descripción: CADENAS LIGERAS LIBRES SUERO
Técnica: Inmunoanálisis
Comentario adicional: Suero. Refrigerado

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	FREELITEK	36916-5		CADENAS LIGERAS LIBRES KAPPA SUERO	mg/dL	(0.33 - 1.94)
Prueba	FREELITEL	33944-0		CADENAS LIGERAS LIBRES LAMBDA SUERO	mg/dL	(0.57 - 2.63)
Prueba	FREELITECO	48378-4		COCIENTE KAPPA/LAMBDA LIBRES SUERO		(0.26 - 1.65)

Descripción: CADMIO SANGRE
Código: CD
Técnica: ICP-MS

Descripción:	CADMIO SANGRE
Unidades:	µg/L
Plazo:	6 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	Sangre total EDTA Dipotásico (libre trazas metales)
Valores de referencia:	(Inf. 1) .Población no expuesta. (Inf. 5) .Valor límite biológico recomendado por INHST (2017) para exposición a cadmio y compuestos inorgánicos.
Descripción:	CAFEÍNA SUERO
Código:	CAFEIN
Técnica:	LC-MS/MS
Unidades:	mg/L
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	(2.00 - 10.00)
Descripción:	Caffey, enfermedad de. Sec Gen: COL1A1
Código:	GEN_000080
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	
Descripción:	Calcif. cerebr. fam. primaria: SLC20A2, PDGFRB, PDGFB, XPR1
Código:	CALCI_CERE
Técnica:	PCR y secuenciación
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:	
Descripción:	Calcinosis tumoral hipofosfatémica: gen GALNT3 (NGS)
Código:	GALNT3_MUT
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:	
Descripción:	CALCIO CORREGIDO
Código:	CACORLGS
Técnica:	

Descripción: CALCIO CORREGIDO
Unidades: mg/dL
Plazo:
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (8.80 - 10.60) > 12 años

Descripción: CALCIO ERITROCITARIO, SANGRE
Código: CAERI
Técnica: Absorción atómica.
Unidades: mmol/L
Plazo: 7 días
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional: Sangre total Heparina litio. Refrigerar.
Valores de referencia: (1.12 - 1.58)

Descripción: CALCIO IONICO
Código: CAIONICO
Técnica: Electrodo selectivo.
Unidades: mmol/L
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 mL suero. Separar y congelar
Valores de referencia: (1.01 - 1.36)

Descripción: CALCIO TOTAL
Código: CA
Técnica:
Unidades: mg/dL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (7.6 - 10.4) < 10 días
(9.0 - 11.0) 10 días - 2 años
(8.8 - 10.8) 2 años - 12 años
(8.8 - 10.6) > 12 años

Descripción: CALCIO TOTAL ORINA
Código: CA2
Técnica: Colorimetría.
Unidades: mg/24h
Plazo: 3 días
Tubo: Orina 24 Horas
Comentario adicional: .Indicar diuresis.
Valores de referencia: (100 - 300)

Descripción: CALCITONINA
Código: CALCITO
Técnica: Téc. CLIA
Unidades: pg/mL

Descripción: CALCITONINA
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 0.5 mL suero. Congelar y enviar congelado.
 No existe muestra alternativa
Valores de referencia: (Inf. 11.8) Hombre
 (Inf. 4.8) Mujer

Descripción: CALCULO BILIAR
Código: CALCULBI
Técnica: Espectrofotometría infrarroja
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Cálculo
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: CALCULO SALIVAL
Código: CALCULOSAL
Técnica: Espectrofotometría infrarroja.
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Cálculo
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: CALCULO URINARIO
Código: CALCULOR
Técnica: Espectroscopía infrarroja.
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Cálculo
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: CALCULO URINARIO 2ºMUESTRA
Código: CALCULOR2
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo: Cálculo
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: CALPROTECTINA EN HECES
Código: CALPROTEC
Técnica: CLIA
Unidades: µg/g
Plazo: 5 días
Tubo: Heces No Microbiología

Descripción:	CALPROTECTINA EN HECES
Comentario adicional:	Se recomienda recoger las primeras heces del día. Preferiblemente heces formes. Evitar heces sanguinolentas. Enviar congeladas.
Valores de referencia:	(Inf. 50) No son indicativos de inflamación del tracto intestinal.

Descripción:	CALPROTECTINA EN SUERO
Código:	CALPROSUE
Técnica:	Inmunoturbidimetría
Unidades:	ng/mL
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	Suero congelado
Valores de referencia:	(Inf. 3000)

Descripción:	CAMPYLOBACTER JEJUNI AC. IGG LCR
Código:	JEJUACGLCR
Técnica:	EIA
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 ml LCR
Valores de referencia:	(Inf. 0.80) Negativo (0.80 - 1.09) Indeterminado

Descripción:	CAMPYLOBACTER JEJUNI AC. IGA
Código:	JEJUNIACA
Técnica:	EIA
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	(Inf. 0.80) Ausencia de niveles detectables de anticuerpos (0.80 - 1.09) Zona límite

Descripción:	CAMPYLOBACTER JEJUNI AC.IGG
Código:	JEJUNACG
Técnica:	EIA
Unidades:	Índice
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml suero. Alt. plasma (EDTA, citrato, heparina)
Valores de referencia:	(Inf. 20) Negativo (20 - 30) Indeterminado

Descripción:	Camurati-Engelmann, enfermedad de. Sec Gen: TGFB1
Código:	GEN_000081
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular

Descripción:Camurati-Engelmann, enfermedad de. Sec Gen: TGFB1

Comentario adicional:Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Código:CANACALCR

Descripción:CANALES DE CALCIO AC. LCR

Técnica:RADIOINMUNOANÁLISIS

Comentario adicional:1 mL LCR (Refrigerado)

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	CANCAPLCR	5010766		PERFIL CANALES CALCIO AC. LCR TIPO PQ	pmol/L	(Inf. 40.0)
Prueba	CANCANLCR	5010765		PERFIL CANALES CALCIO AC. LCR TIPO N		(Inf. 15.0) Ratio

Descripción:CANALES DE CALCIO AC. SUERO TIPO P

Código:CANACAACPQ

Técnica:Radioisotópica

Unidades:pmol/L

Plazo:8 días

Tubo:Suero Basal

Comentario adicional:suero

Valores de referencia:(Inf. 30) Negativo

La detección de anticuerpos contra los canales de calcio tipo P es fundamental para el diagnóstico del Síndrome de Lambert Eaton, estando presentes en aproximadamente el 85-90% de los pacientes.

Descripción:CANALES DE POTASIO AC. LCR

Código:CANAKACLCR

Técnica:Radioinmunoanálisis

Unidades:pmol/L

Plazo:11 días

Tubo:Líquidos Biológicos

Comentario adicional:1 mL LCR

Valores de referencia:(Inf. 10)

Descripción:CANALES DE POTASIO AC. SUERO

Código:CANAKAC

Técnica:Radioisotópica

Unidades:pmol/L

Plazo:32 días

Tubo:Suero Basal

Comentario adicional:1 mL suero

Valores de referencia:(Inf. 72.0)

Descripción:Canalopatías del sistema nervioso central. Panel

Código:GEN_000082

Técnica:

Descripción: Canalopatías del sistema nervioso central. Panel

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Canalopatías panel genes

Código: PHARMALAP2

Técnica: NGS

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Imprescindible enviar la historia clínica y formulario de petición de genética o consentimiento informado

Valores de referencia:

Descripción: Canavan, enfermedad de. Sec Gen: ASPA

Código: GEN_000083

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Cáncer colon no polipósico familiar. Sec Gen: BMPR1A

Código: GEN_000087

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Cáncer colon. Poliposis adenomatosa atenuada. Gen MUTYH

Código: MUTYH_MUTS

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Cáncer de colon familiar ampliado. Panel

Código: GEN_000084

Técnica:

Unidades:

Plazo: 30 días

Descripción:	Cáncer de colon familiar ampliado. Panel
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	
Descripción:	Cáncer de colon familiar. Panel
Código:	GEN_000085
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	
Descripción:	Cáncer de colon HNPCC: gen MLH1 (NGS)
Código:	MLH1_MUTS
Técnica:	PCR y secuenciación
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:	
Descripción:	Cáncer de colon HNPCC: gen MSH2 (NGS)
Código:	MSH2_MUTS
Técnica:	PCR y secuenciación
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:	
Descripción:	Cáncer de colon HNPCC: gen MSH6 (NGS)
Código:	MSH6_MUTS
Técnica:	PCR, secuenciación, y MLPA
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:	
Descripción:	Cáncer de colon HNPCC: gen PMS2 (NGS)
Código:	PMS2_MUTS
Técnica:	PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular

Descripción:	Cáncer de colon HNPCC: gen PMS2 (NGS)
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:	
Descripción:	Cáncer de colon no polipósico familia. Sec Gen: EPCAM
Código:	GEN_000515
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	
Descripción:	Cáncer de colon no polipósico familiar. Sec Gen: MLH3
Código:	GEN_000090
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	
Descripción:	Cáncer de colon no polipósico familiar. Sec Gen: PMS1
Código:	GEN_000086
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	
Descripción:	Cáncer de colon: expresión de MYH
Código:	MYH_INMUN
Técnica:	Inmunohistoquímica
Unidades:	
Plazo:	10 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:	Muestra: tejido incluido en parafina. Una vez hechos los cortes que se necesitan para el análisis, se devuelve el bloque al paciente/médico.
Valores de referencia:	
Descripción:	Cáncer de mama / ovario familiar. Sec Gen: BRCA1
Código:	GEN_000091
Técnica:	Secuenciación masiva (NGS)
Unidades:	
Plazo:	20 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.

Descripción: Cáncer de mama / ovario familiar. Sec Gen: BRCA1

Valores de referencia:

Descripción: Cáncer de mama / ovario familiar. Sec Gen: BRCA2

Código: GEN_000092

Técnica: Secuenciación masiva (NGS)

Unidades:

Plazo: 20 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente

.

Valores de referencia:

Descripción: Cáncer de mama / ovario familiar. Sec Gen: RAD51D

Código: GEN_000093

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo:

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Cáncer de próstata familiar. Panel NGS > 10 genes

Código: PROSTATAH

Técnica: NGS

Unidades:

Plazo: 20 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Valores de referencia:

Descripción: Cáncer de pulmón NSCLC: reordenamientos EML4-ALK

Código: EML4_ALK

Técnica:

Unidades:

Plazo: 10 días

Tubo: Muestra Anatomía Patológica

Comentario adicional: **Muestras: tejido incluido en parafina.**

Una vez hechos los cortes que se necesitan para el estudio, devolvemos el bloque al paciente / médico.

Rotular ONCO.

Valores de referencia:

Descripción: Cáncer endometrio familiar. Panel NGS < 10 genes

Código: ENDOMETRH

Técnica: NGS

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Alternativas: Citrato

Descripción: Cáncer endometrio familiar. Panel NGS < 10 genes

Valores de referencia:

Descripción: Cáncer familiar de mama y ovario: genes BRCA1 y BRCA2 (NGS)

Código: BRCA1.2

Técnica: Secuenciación masiva (NGS)

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Alternativas: Heparina y Citrato.

Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente

Valores de referencia:

Descripción: Cáncer familiar de mama y ovario: genes BRCA1 y BRCA2 MLPA

Código: BRCA_MLPA

Técnica: MLPA

Unidades:

Plazo: 20 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Alternativas: Heparina o Citrato.

Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente

Valores de referencia:

Descripción: Cáncer familiar de mama y ovario: sec. BRCA1 y BRCA2 (NGS)

Código: BRCA1.2SEC

Técnica: Secuenciación masiva (NGS)

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Alternativas: Heparina o Citrato.

Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente

Valores de referencia:

Descripción: Cáncer familiar de mama, ovario y colon: 20 genes (NGS)

Código: BRCA_PLUS

Técnica: NGS

Unidades:

Plazo: 20 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo DE EDTA para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Alternativas: Citrato

Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente

Valores de referencia:

Descripción: Cáncer gástrico difuso hereditario: gen CDH1 (NGS)

Código: CANCERGAST

Técnica: PCR, secuenciación y MLPA

Unidades:

Descripción:	Cáncer gástrico difuso hereditario: gen CDH1 (NGS)
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato y muestra de tejido.
Valores de referencia:	

Descripción:	Cáncer gástrico familiar. Panel NGS > 10 genes
Código:	GASTRICOH
Técnica:	NGS
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Valores de referencia:	

Descripción:	Cáncer hereditario: secuenciación >150 genes
Código:	PANCANCER
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	Cáncer hereditario: secuenciación >150 genes (SIN INFORME)
Código:	PANCAN_VCF
Técnica:	NGS
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Muestra: sangre EDTA BM. Solo análisis (SIN INFORME)
Valores de referencia:	

Descripción:	Cáncer páncreas familiar. Panel NGS > 10 genes
Código:	PANCREASH
Técnica:	NGS
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Valores de referencia:	

Descripción:	Cáncer renal familiar. Panel NGS > 10 genes
Código:	RENALH
Técnica:	NGS
Unidades:	
Plazo:	30 días

Descripción: Cáncer renal familiar. Panel NGS > 10 genes
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Valores de referencia:

Descripción: CANDIDA ALBICANS AC. IGA
Código: CANDIDAIGA
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero (Refrigerado)
 Alternativa: Plasma citrato, plasma heparina
Valores de referencia: (Inf. 9) Negativo

Descripción: CANDIDA ALBICANS AC. IGG SUERO
Código: CANDIDA
Técnica: Técnica CLIA
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 0.90) Negativo

Descripción: CANDIDA ALBICANS AC. IGM
Código: CANDIDAIGM
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero (Refrigerado)
 Alternativa: Plasma citrato, plasma heparina
Valores de referencia: (Inf. 9) Negativo

Descripción: CANDIDA ANTIGENO MANANO SUERO
Código: CANDIMANA
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo:
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo
 (Sup. 1) Positivo

Descripción: CANDIDA SPP DNA, MUESTRA BIOLÓGICA
Código: DCSM
Técnica: RT-PCR
Unidades:
Plazo: 8 días
Tubo: Muestra envíos externos

Descripción: CANDIDA SPP DNA, MUESTRA BIOLÓGICA
Comentario adicional: LCR. refrigerar.
 Exudado vaginal. refrigerar.
 Orina (primera micción). refrigerar.

Secreción vaginal en torunda de dacrón con vástago de plástico. Se acepta torunda en medio de transporte (Stuart o Amies refrigerado) y frasco SurePath. Rechazo: Torunda de algodón y/o vástago de madera.

Valores de referencia: Valor de referencia: No se detecta

Descripción: CANNABINOIDES SINTETICOS (AB-PINACA)EN ORINA
Código: PINACA
Técnica:
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Orina Drogas de Abuso
Comentario adicional: orina micción aislada
Valores de referencia: Valor discriminante de la técnica: 5 ng/ml

Descripción: CANNABIS
Código: CANNA
Técnica: Inmunoensayo
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Orina Drogas de Abuso
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: CANNABIS CONFIRMACION EN SALIVA
Código: CANNASAL
Técnica: LC-MS/MS
Unidades: ng/mL
Plazo: 10 días
Tubo: Saliva
Comentario adicional: Saliva recogida en kit ORAL-EZE. Solicitar kit en el almacén.
Valores de referencia:

Descripción: CANNABIS EN PELO (NEODIAGNOSTICA)
Código: CANNAPELO
Técnica: Cromatografía líquida/Tandem masas (LC-MS/MS)
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional: PEDIR KIT ESPECIAL: almacen@ctes.eurofinseu.com
 PEDIR PROTOCOLO DE TOMA DE MUESTRA: calidad@ctes.eurofinseu.com
 -Análisis Informativo: incluye kit de toma de muestra y formulario de solicitud
-Cadena custodia: En caso de solicitar el análisis con validez judicial, solicitar al almacén también documentación de cadena custodia (foto de toma de muestra y hoja de seguimiento). El protocolo de cadena custodia debe solicitarse a calidad@ctes.eur
 En el caso de cadena custodia debe recogerse la muestra por duplicado.

Valores de referencia:

Descripción: CANVAS: gen RFC1 expansión (AAGGG)n
Código: RFC1_MUT
Técnica:

Descripción: CANVAS: gen RFC1 expansión (AAGGG)n
Unidades:
Plazo: 32 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: CAPACIDAD TOTAL FIJACION DE HIERRO (TIBC)

Código: TIBC

Técnica:

Unidades: µg/dL

Plazo: 3 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional:

Valores de referencia: (230 - 400)

Descripción: CARBAMAZEPINA

Código: CARBA

Técnica: Enzimoinmunoensayo.

Unidades: µg/mL

Plazo: 3 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional:

Valores de referencia: (4 - 10) Rango Terapéutico

Descripción: CARBAMAZEPINA 10:11 EPOXIDO

Código: CARBAEPOX

Técnica: LC-MS/MS

Unidades: µg/mL

Plazo: 16 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 3 mL

Valores de referencia: (0.80 - 3.20)

Descripción: CARBAMAZEPINA LIBRE SUERO (TEGRETOL LIBRE)

Código: CARBALI

Técnica: Ultrafiltración/EIA (Ultrafiltración/Inmunoluminiscencia desde el 4-2012)

Unidades: mcg/mL

Plazo: 3 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 3 mL

Valores de referencia: (1 - 3)

Descripción: CARBIDOPA

Código: CARBIDOPA

Técnica: Cromatografía líquida / Tándem masas (LC-MS/MS)

Unidades: mcg/L

Plazo: 12 días

Tubo: Suero Basal

Descripción: CARBIDOPA
Comentario adicional: 2 mL suero. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO
Valores de referencia: (20 - 200)

Descripción: CARBOXIHEMOGLOBINA
Código: COHB
Técnica: Espectroscopía de absorción visible.
Unidades: %
Plazo: 4 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 5 mL sangre total EDTA.
Valores de referencia: (Inf. 3.5) Exposición a monóxido de carbono
 (Inf. 10) Fumadores
 (Sup. 20) Tóxico

Descripción: Carcinoma medular de tiroide familiar. Sec Gen: RET
Código: GEN_000102
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Carcinoma papilar familiar cels renales. Sec Gen: MET
Código: GEN_000103
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Código: CARDINESCO
Descripción: CARDIOINCODE SCORE
Técnica: array
Comentario adicional: 2 tubos EDTA + cuestionario CardioIncode, todo en un sobre rotulado como INCODE

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	SCORPMF			CARDIOSCORE POLIMORFISMOS		
Prueba	SCORIESGO			CARDIOSCORE RIESGO		

Descripción: CARDIOLIPINA AC. IGG SUERO
Código: CARDIACG
Técnica: EIA
Unidades: GLP-U/mL
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal

Descripción: CARDIOLIPINA AC. IGG SUERO
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 10) Negativo
 (10 - 40) Indeterminado

Descripción: CARDIOLIPINA AC. IGM SUERO
Código: CARDIACM
Técnica: EIA
Unidades: MLP-U/mL
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 10) Negativo
 (10 - 40) Indeterminado

Descripción: CARDIOLIPINAS AC. IGA SUERO
Código: CARDIACA
Técnica: EIA
Unidades: ALP-U/mL
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL Suero.
 Alternativa: Plasma
Valores de referencia: (Inf. 14) Negativo
 (14 - 20) Indeterminado

Descripción: CARIOTIPO EN SANGRE DE CORDON UMBILICAL
Código: CARIOCUMB
Técnica: Cultivo celular
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: CARIOTIPO EN TEJIDOS
Código: CARIOTEJ
Técnica: Cultivo celular
Unidades:
Plazo: 21 días
Tubo: Muestra Citogenética
Comentario adicional: Biopsia o restos abortivos en medio RPMI
Valores de referencia:

Descripción: CARIOTIPO EN VELLOSIDADES CORIONICAS
Código: CARIOCORIO
Técnica: Cultivo celular
Unidades:
Plazo: 21 días
Tubo: GENETICA

Descripción: CARIOTIPO EN VELLOSIDADES CORIONICAS
Comentario adicional: Vellosidad corial en medio RPMI.
Valores de referencia:

Descripción: CARIOTIPO LIQUIDO AMNIOTICO
Código: CARIOAMN
Técnica: Cultivo celular
Unidades:
Plazo: 21 días
Tubo: LIQUIDO CITOGENETICA
Comentario adicional: 15-20 mL Líquido amniótico a t^a ambiente.
 Enviar la muestra preferentemente en dos tubos truncados esteriles de 10 mL
 Se requiere consentimiento informado
 Se requiere información clínica, imprescindible semanas de gestación y teléfono de contacto del médico prescriptor.

Valores de referencia:

Descripción: CARIOTIPO MEDULA OSEA
Código: CARIOMED
Técnica: Cultivo celular
Unidades:
Plazo: 21 días
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional: Médula ósea en medio RPMI
 Conservar en nevera

Valores de referencia:

Descripción: CARIOTIPO ONCOLOGICO EN SANGRE PERIFÉRICA
Código: CARIOSPM
Técnica:
Unidades:
Plazo: 21 días
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional: HEPARINA
 conservar y transportar a 4°C

Valores de referencia:

Descripción: CARIOTIPO SANGRE ALTA RESOLUCION
Código: CARIOSAR
Técnica: Cultivo celular
Unidades:
Plazo: 21 días
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional: 5 ml sangre total Heparina de litio.
 Envío inmediato a temperatura ambiente.
 Se requiere información clínica.
 Alternativa sangre total Heparina de sodio.

Valores de referencia:

Descripción: CARIOTIPO SANGRE PERIFERICA
Código: CARIOTIP
Técnica: Cultivo celular

Descripción: CARIOTIPO SANGRE PERIFERICA
Unidades:
Plazo: 21 días
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: CARNITINA LIBRE ORINA
Código: CARNILI2
Técnica: LC-MS/MS
Unidades: mcmol/g crea.
Plazo: 12 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 5 mL de orina.
 Congelar y enviar congelado.
Valores de referencia: (Inf. 1066)

Descripción: CARNITINA LIBRE PLASMA
Código: CARNITILIB
Técnica: Cromatografía líquida/Tándem masas (LC-MS/MS)
Unidades: μmol/L
Plazo: 12 días
Tubo: Plasma de Heparina Congelado
Comentario adicional: 2 ml de plasma (HEPARINA).CONGELAR y enviar congelado.
 Alternativa: Suero congelado
Valores de referencia: (10.6 - 56.0) < 1 mes
 (16.2 - 60.7) 1 mes - 1 año
 (17.6 - 49.1) 1 año - 8 años
 (18.6 - 53.9) 8 años - 18 años
 (19 - 60.7) > 18 años

Descripción: CARNITINA LIBRE PLASMA SEMINAL
Código: CARNILISE
Técnica: LC-MS/MS
Unidades: mcmol/L
Plazo: 12 días
Tubo: Semen
Comentario adicional: 1 mL plasma seminal
Valores de referencia: (250 - 620)

Descripción: CARNITINA TOTAL PLASMA (PERFIL)
Código: CARNITITOT
Técnica: Cromatografía líquida/Tándem masas (LC-MS/MS)
Unidades: μmol/L
Plazo: 12 días
Tubo: Plasma de Heparina Congelado
Comentario adicional: 1 mL plasma (heparina). CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.

Descripción: CARNITINA TOTAL PLASMA (PERFIL)

Valores de referencia: (12.7 - 69.0) < 1 mes
(18.3 - 74.8) 1 mes - 1 año
(26.1 - 62.2) 1 año - 8 años
(25.1 - 64.1) 8 años - 18 años
(25.2 - 77.1) > 18 años

Descripción: CASPR1 (CONTACTIN-ASSOC.PROTEIN-1) SUERO

Código: CASPR1

Técnica: Inmunofluorescencia indirecta (cell binding assay)

Unidades:

Plazo: 47 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 1 mL suero

Valores de referencia:

Descripción: Catarata congénita, miocardiopatía hipertrófica. Gen SLC25A4

Código: GEN_000105

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Catarata nuclear tipo 23. Sec Gen: CRYAB

Código: GEN_000106

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Código: CATECOL2BA

Descripción: CATECOLAMINAS EN ORINA ESPONTANEA

Técnica: Cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) acoplada a detector electroquímico

Comentario adicional: Añadir a 10 ml orina espontanea, 60 ul de HCL 5N Identificar tubo con el comentario +ácido
No ingerir 5 días antes de la recolección de la orina; té, café, plátano, chocolate, vainilla, queso, bebidas carbonatadas ni ningún tipo de medicamento especialmente de salicilatos, medicación hipotensora y contrastes con yodo (solo hacerlo bajo pres
Evitar cualquier tipo de ejercicio físico no habitual . Evitar el estrés. (3 días antes de la toma de muestra)

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	ADRE2BAS	13734-9		PERFIL CATECOLAMINAS EN ORINA ESPONTANEA ADRENALINA	ug/g creatinina	(Inf. 75) < 1 año (Inf. 39) 1 año - 5 años (Inf. 29) 5 años - 10 años (Inf. 18) 10 años - 15 años (Inf. 12) > 16 años

Componentes						
Prueba	NORAD2BAS	13782-8		PERFIL CATECOLAMINAS EN ORINA ESPONTANEA NORADRENALINA	ug/g creatinina	(36 - 272) < 3 meses (28 - 197) 3 meses - 6 meses (28 - 195) 6 meses - 12 meses (12 - 139) 1 año - 2 años (9 - 91) 2 años - 5 años (6 - 72) 5 años - 10 años (4 - 53) > 10 años
Prueba	DOPAM2BASA	13733-1		DOPAMINA/CREATININA	ug/g creatinina	(193 - 2675) < 3 meses (458 - 2453) 3 meses - 6 meses (463 - 1933) 6 meses - 12 meses (220 - 1654) 1 año - 2 años (168 - 1156) 2 años - 5 años (72 - 847) 5 años - 10 años (Inf. 450) 10 años - 18 años (Inf. 350) > 18 años

Código: CATECOF

Descripción: CATECOLAMINAS FRACCIONADAS PLA

Técnica: LC-MS/MS
plasma de (EDTA). Separar el plasma lo antes posible, CONGELAR INMEDIATAMENTE Y ENVIAR CONGELADO.

Comentario adicional: Volumen: 2.0 mL
Volumen mínimo: 1.00 mL

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	NORADRENA	2666-6		Perfil, Noradrenalina en plasma	pg/mL	(Inf. 420)
Prueba	ADRENALI	2230-1		Perfil, Adrenalina en plasma	pg/mL	(Inf. 84) Posición supina, relajada (Inf. 150) Posición ortostática
Prueba	DOPAMINA	2216-0		Perfil, Dopamina en plasma	pg/mL	(Inf. 85) El contenido en sal de la dieta y la edad son otros factores que influyen en los niveles de catecolaminas fraccionadas en plasma.

Código: CATECO2

Descripción: CATECOLAMINAS ORINA 24 HORAS

Técnica: Cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) acoplada a detector electroquímico
20 ml orina 24 horas con 60 ul de HCL 5N. Indicar diuresis de orina. Identificar tubo con el comentario +ácido

Comentario adicional: No ingerir 5 días antes de la recolección de la orina; té, café, plátano, chocolate, vainilla, queso, bebidas carbonatadas ni ningún tipo de medicamento especialmente de salicilatos, medicación hipotensora y contrastes con yodo.
Evitar cualquier tipo de ejercicio físico no habitual . Evitar el estrés. (3 días antes de la toma de muestra)

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	NORADRENA2	2668-2		PERFIL CATECOLAMINAS ORINA 24 HORAS NORADRENALINA	µg/24h	(Inf. 105) Límite de cuantificación: 4µg/L
Prueba	ADRENALI2	2232-7		PERFIL CATECOLAMINAS ORINA 24 HORAS ADRENALINA	µg/24h	(Inf. 20) Límite de cuantificación: 4µg/L

Componentes						
Prueba	DOPAMINA2	2218-6		PERFIL CATECOLAMINAS ORINA 24 HORAS DOPAMINA	µg/24h	(Inf. 446) Límite de cuantificación: 7µg/L
Prueba	HORAS_VOL			VOLUMEN DE ORINA: HORAS		
Prueba	VOL_ORINA			Volumen de orina mL	c.c.	

Descripción:	CBFB/MYH11(inv(16)(p13q22)) · RT-PCR
Código:	CBFB_MYH11
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional:	3 tubos de EDTA exclusivos para esta determinación: tubo sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO.
Muestra:	sangre periférica o médula ósea
	NO PINCHAR VIERNES NI VÍSPERAS DE FESTIVOS: la sangre se empieza a procesar dentro de las primeras 48 horas desde la extracción

Valores de referencia:

Descripción:	CCL5 (RANTES), SUERO
Código:	CCL5
Técnica:	ELISA
Unidades:	pg/mL
Plazo:	17 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 mL de suero congelado.
Valores de referencia:	

Descripción:	CD3 CD4 DR
Código:	CD3CD4DR
Técnica:	
Unidades:	% sobre CD4
Plazo:	4 días
Tubo:	Sangre EDTA
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(3 - 12) 2 años - 5 años (3 - 13) 5 años - 10 años (4 - 11) 10 años - 16 años (4 - 11) > 16 años

Descripción:	CD3 CD8 DR
Código:	CD3CD8DR
Técnica:	
Unidades:	% sobre CD8
Plazo:	4 días
Tubo:	Sangre EDTA
Comentario adicional:	

Descripción: CD3 CD8 DR
Valores de referencia: (7 - 37) 2 años - 5 años
 (6 - 29) 5 años - 10 años
 (5 - 25) 10 años - 16 años
 (5 - 25) > 16 años

Descripción: CD3-CD56+CD16+ TOTALES
Código: CD3_5616T
Técnica:
Unidades: /µL
Plazo:
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 1 tubo de EDTA de 5ml
Valores de referencia:

Descripción: CEA (ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO)
Código: CEA
Técnica: CMIA
Unidades: ng/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL.
Valores de referencia: (Inf. 5)

Descripción: Cegeura congénita: >10 genes (NGS)
Código: CEGUERACON
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.
Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Ceguera nocturna estacionaria congénita 2. Sec Gen PDE6B
Código: GEN_000107
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: CELULAS EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
Código: LIQLCCE
Técnica: Recuento manual
Unidades: /µL
Plazo: 3 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:

Descripción: CELULAS EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
Valores de referencia: (Inf. 5) Leucocitos (/µL)

Descripción: CELULAS ENDOTELIALES ANTICUERPOS
Código: CELENDOTEL
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: Negativo <1/100
 Positivo >1/100

Descripción: CELULAS LIQUIDO SINOVIAL
Código: LIQSICE
Técnica: Microscopía óptica
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Código: TMEMORIA
Descripción: CELULAS NAIVE Y MEMORIA T CD45RO/RA
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Perfil	T4T8	65759-3		LINFOCITOS T4/T8 (COCIE		
Prueba	T4NAIVE			perfil LINFOCITOS T CD4 NAIVE CD45RA+ CCR7+	% sobre CD4	(54 - 80) < 2 años (46 - 72) 2 años - 4 años (35 - 69) 4 años - 6 años (32 - 68) 6 años - 8 años (25 - 63) 8 años - 13 años (31 - 57) > 13 años
Prueba	T4CM			perfil LINFOCITOS T CD4 DE MEMORIA CENTRAL CD45 RO+ CCR7+	% sobre CD4	(10 - 26) < 2 años (11 - 20) 2 años - 4 años (9 - 25) 4 años - 6 años (9 - 24) 6 años - 8 años (11 - 25) 8 años - 13 años (10 - 27) > 13 años
Prueba	T4EM			perfil LINFOCITOS T CD4 DE MEMORIA EFECTORA CD45 RO+ CCR7-	% sobre CD4	(3 - 16) < 2 años (9 - 20) 2 años - 4 años (10 - 30) 4 años - 6 años (9 - 32) 6 años - 8 años (12 - 30) 8 años - 13 años (12 - 44) > 13 años
Prueba	T4TEMRA			perfil LINFOCITOS T CD4 TEMRA (CD45 RA+ CCR7-)	% sobre CD4	(3 - 12) < 2 años (3 - 14) 2 años - 4 años (4 - 22) 4 años - 6 años (4 - 15) 6 años - 8 años (4 - 24) 8 años - 13 años (4 - 12) > 13 años

Componentes						
Prueba	T8NAIVE			perfil LINFOCITOS T CD8 NAIVE (CD45RA + CCR7+)	% sobre CD8	(34 - 73) < 2 años (29 - 72) 2 años - 4 años (23 - 68) 4 años - 6 años (30 - 61) 6 años - 8 años (22 - 58) 8 años - 13 años (18 - 61) > 13 años
Prueba	T8CM			perfil LINFOCITOS T CD8 DE MEMORIA CENTRAL (CD45RO+ CCR7+)	% sobre CD8	(3 - 15) < 2 años (2 - 13) 2 años - 4 años (4 - 11) 4 años - 6 años (2 - 12) 6 años - 8 años (2 - 15) 8 años - 13 años (3 - 12) > 13 años
Prueba	T8EM			perfil LINFOCITOS T CD8 DE MEMORIA EFECTORA CD45RO+ CCR7-	% sobre CD8	(9 - 47) < 2 años (14 - 49) 2 años - 4 años (14 - 59) 4 años - 6 años (20 - 45) 6 años - 8 años (24 - 58) 8 años - 13 años (25 - 58) > 13 años
Prueba	T8TEMRA			perfil LINFOCITOS T CD8 TEMRA (CD45RA+ CCR7-)	% sobre CD8	(7 - 25) < 2 años (5 - 25) 2 años - 4 años (6 - 30) 4 años - 6 años (7 - 26) 6 años - 8 años (7 - 26) 8 años - 13 años (5 - 20) > 13 años

Código: NKT
Descripción: CELULAS NKT (CELULAS LGL/T) SUBPOBLACIONES
Técnica:
Comentario adicional: 5 mL DE SANGRE EDTA TOTAL

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	CELBRIGHT			CD56 ++ CELULAS BRIGHT	% sobre NK	(1 - 9)
Prueba	NKCD56CD16			NKCD56+CD16+	% sobre NK	(91 - 99)
Prueba	CD3CD56	17135-5		CD3+CD56+	%	(Inf. 13)
Prueba	CD3_5616	8112-5		CD3-CD56+CD16+	%	(4 - 16)
Prueba	CD3_5616_	5003820		CD3-CD56+CD16-	%	(Inf. 2)
Prueba	CD3_56_16	5003821		CD3-CD56-CD16+	%	(Inf. 2)
Prueba	CD3CD56T	26858-1		CD3+CD56+ TOTALES	/μL	
Prueba	CD3_5616T	9728-7		CD3-CD56+CD16+ TOTALES	/μL	
Prueba	CD3_56_16T			CD3-CD56-CD16+ TOTALES	/μL	
Prueba	CD3_5616_T			CD3-CD56+CD16- TOTALES	/μL	
Prueba	NOTATIP			NOTA TIPAJE LEUCOCITOS SANGRE PERIFERICA		
Prueba	CELULASNK1	5011449		LINFOCITOS NATURAL KILLER SANGRE		
Prueba	CELNK1TOT	53936-1		CELULAS NK TOTALES	/μL	
Prueba	LINFOTOT	30364-4		LINFOCITOS TOTALES (POBLACIONES LINFOCITARIAS)	/μL	(1000 - 4500)

Descripción: CERULOPLASMINA SUERO
Código: CERULO
Técnica: Turbidimetría
Unidades: mg/dL
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL de suero.
 Alternativa: Heparina litio/sodio
Valores de referencia: (20 - 60)

Descripción: Char, Sd. Sec Gen: TFAP2B
Código: GEN_000108
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Charcot-Marie-Tooth 1: gen EGR2 (NGS)
Código: CMT1A_EGR2
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
 Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Charcot-Marie-Tooth 1: gen MPZ (NGS)
Código: CMT1_MPZ
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
 Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Charcot-Marie-Tooth 1: gen PMP22 (NGS)
Código: CMT1_PMP22
Técnica: PCr y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
 Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Charcot-Marie-Tooth 1A: deleciones y duplicaciones gen PMP22
Código: CHARCOT.MT
Técnica: MLPA
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Charcot-Marie-Tooth 2: gen MFN2 (NGS)
Código: CMT2A_MFN2
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Charcot-Marie-Tooth 4A: gen GDAP1 (NGS)
Código: CMT4_GDAP1
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Charcot-Marie-Tooth ligado X: gen GJB1 (NGS)
Código: CMTX_CX32
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Charcot-Marie-Tooth tipo 3. Panel
Código: GEN_000109
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Charcot-Marie-Tooth: >10 genes (NGS)
Código: CHARCOT_MT

Descripción: Charcot-Marie-Tooth: >10 genes (NGS)
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Chediak-Higashi, Sd. Sec Gen: LYST
Código: GEN_000110
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: CHIKUNGUNYA AC. IGG EN SUERO
Código: CHIKUNGIGG
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: Índice
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Volumen mínimo: 0.5 mL
Enviar la muestra en un tubo estéril en un embalaje de seguridad biológica
Valores de referencia: (Inf. 0.80) Negativo
(0.80 - 1.10) Indeterminado
(Sup. 1.10) Positivo

Descripción: CHIKUNGUNYA AC. IGM EN SUERO
Código: CHIKUNGIGM
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: Índice
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Volumen mínimo: 0.5 mL
Enviar la muestra en un tubo estéril en un embalaje de seguridad biológica
Valores de referencia: (Inf. 0.80) Negativo
(0.80 - 1.10) Indeterminado
(Sup. 1.10) Positivo

Descripción: Chikungunya DNA PCR Cualitativa
Código: CHIKUNGPCR
Técnica: RT-PCR
Unidades:
Plazo: 8 días
Tubo: Muestra envíos externos

Descripción: Chikungunya DNA PCR Cualitativa
Comentario adicional: 1 mL suero, plasma y LCR
 Muestra a recoger hasta 7 días después de la aparición de síntomas

Valores de referencia:

Descripción: CHLAMYDIA ANTIGENO MUESTRA
Código: CHLAMYDIA
Técnica: Inmunocromatografía
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Muestra Microbiología
Comentario adicional: Torunda específica de Chlamydia.
 En mujeres toma cervical y en hombres toma uretral u orina

Valores de referencia:

Descripción: CHLAMYDIA PNEUMONIAE AC. IGG
Código: CHLAPNEACG
Técnica: CLIA
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 0.9) Negativo
 (0.9 - 1.1) Zona límite
 (Sup. 1.1) Positivo

Descripción: CHLAMYDIA PNEUMONIAE AC. IGM
Código: CHLAPNEACM
Técnica: CLIA
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 0.90) Negativo
 (0.90 - 1.10) Indeterminado
 (Sup. 1.10) Positivo

Descripción: CHLAMYDIA PNEUMONIAE AC.IGA
Código: CHLAPNEACA
Técnica: INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero refrigerado
 V. min: 0.60 mL
Valores de referencia: Negativo <1:12
 Positivo >1:12

Descripción: Chlamydia pneumoniae DNA PCR Cualitativa
Código: CHLAMPNPCR
Técnica: Q-PCR

Descripción: Chlamydia pneumoniae DNA PCR Cualitativa
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional: Muestra respiratoria
Valores de referencia:

Descripción: CHLAMYDIA PSITTACI AC. IGA SUERO
Código: CHLAPSIACA
Técnica: IFI
Unidades: Titulo
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml Suero
Valores de referencia: <1/12 Negativo
>1/12 Positivo

Descripción: CHLAMYDIA PSITTACI AC. IGG SUERO
Código: CHLAPSIACG
Técnica: IFI
Unidades: Titulo
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero Volumen 1 ml (mínimo 0.30 mL)
Valores de referencia: <1:64 Negativo
= o >1:64 Inmunidad adquirida o en evolución

Descripción: CHLAMYDIA PSITTACI AC. IGM SUERO
Código: CHLAPSIACM
Técnica: IFI
Unidades: Titulo
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml
Volumen mínimo
0.30 mL
Valores de referencia: Negativo <1/12
Positivo > o = 1/12

Descripción: CHLAMYDIA PSITTACI DNA, SANGRE TOTAL
Código: DNCPS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: sangre total Edta refrigerado.
Valores de referencia: Valor de referencia: No se detecta.

Descripción: CHLAMYDIA TRACHOMATIS AC Ig A SUERO
Código: CHLATRAACA

Descripción: CHLAMYDIA TRACHOMATIS AC Ig A SUERO
Técnica: EIA
Unidades: NTU
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
 Alterativa: Plasma de citrato/heparina
Valores de referencia: (Inf. 9) Negativo.

Descripción: CHLAMYDIA TRACHOMATIS AC. IGG SUERO
Código: CHLATRAACG
Técnica: EIA
Unidades: NTU
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero
 Alternativa: plasma citrato/heparina
Valores de referencia: (Inf. 9) Negativo

Descripción: CHLAMYDIA TRACHOMATIS AC. IGM
Código: CHLATRAACM
Técnica: ELISA
Unidades: Indice
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero
 Alternativa: Plasma
Valores de referencia: (Inf. 0.9) Negativo

Descripción: Chlamydia trachomatis DNA PCR Cualitativa
Código: CHLAMPCR
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional: orina . primera micción- REFRIGERAR
 exudado conjuntival-REFRIGERAR
 exudado endocervical-REFRIGERAR
 exudado uretral- REFRIGERAR
 raspado uretral- REFRIGERAR
 biopsia corneal-REFRIGERAR
 semen- REFRIGERAR
 liquido sinovial- REFRIGERAR
 Humor vitreo/acuoso- REFRIGERAR
Valores de referencia: Valor de referencia: No se detecta

Descripción: CICLOFOSFAMIDA EN SUERO
Código: CICLF
Técnica: GC-MS
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días

Descripción: CICLOFOSFAMIDA EN SUERO
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL de suero. Refrigerar.
Valores de referencia: (2 - 7) Tras dosis de 350 mg/día
 (15 - 30) Pico después de infusión de 900 mg
 (Inf. 0.05) Control de personal expuesto

Descripción: CICLOFOSFAMIDA ORINA
Código: CICLOFOSOR
Técnica: Técnica GC-MS
Unidades: mg/l
Plazo: 12 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 10 mL orina
Valores de referencia: (Inf. 0.005) Control personal expuesto.

Descripción: CICLOHEXANOL EN ORINA
Código: CICLOHEXAN
Técnica: Cromatografía de gases-Ionización de llama.
Unidades: mg/L
Plazo: 12 días
Tubo: Orina Final de Jornada
Comentario adicional: 10 ml de orina final de jornada laboral. Refrigerar
Valores de referencia: (Inf. 8) Fin de la jornada laboral (exposición a Ciclohexanona);
 VLB- INSHT

Descripción: CICLOSPORINA
Código: CICLOSPORINA
Técnica: Inmunofluorescencia de polarización.
Unidades: ng/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: .
 1 mL de sangre total EDTA.
Valores de referencia: (150 - 225) Trasplante renal. Terapia inicial
 (100 - 150) Trasplante renal. Terapia mantenimiento.
 (225 - 300) Trasplante hígado. Terapia inicial
 (100 - 150) Trasplante hígado. Terapia mantenimiento.
 (250 - 350) Trasplante corazón. Terapia inicial.
 (150 - 250) Trasplante corazón. Terapia mantenimiento.

Descripción: CID sindrom. o con sintomas asociada. Sec Gen STAT5B
Código: GEN_000111
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: CININÓGENO DE ALTO PESO MOLECULAR EN PLASMA
Código: CININOGENO

Descripción:	CININÓGENO DE ALTO PESO MOLECULAR EN PLASMA
Técnica:	Coagulación
Unidades:	%
Plazo:	17 días
Tubo:	Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:	1 mL plasma (citrato) pobre en plaquetas, congelado
Valores de referencia:	(70 - 120)

Descripción:	CISTATINA C SUERO
Código:	CISTATINAC
Técnica:	Nefelometría
Unidades:	mg/L
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml de suero . Ant. 1 mL plasma(EDTA, Heparina), separarlo lo antes posible.
Valores de referencia:	(0.62 - 1.11)

Descripción:	CISTINA EN ORINA
Código:	CISTINA
Técnica:	Cromatografía líquida/Tándem masas (LC-MS/MS)
Unidades:	mg/g creatin.
Plazo:	9 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	ORINA MICCIÓN AISLADA
Valores de referencia:	Niños 6-170 mg/g creatinina Adultos 10-50 mg/g creatinina

Descripción:	Cistina intraleucocitaria (Cistinosis), sangre total
Código:	CISTINAINT
Técnica:	HPLC-EM/EM
Unidades:	nmol cist/mg pt
Plazo:	30 días
Tubo:	Heparina Litio
Comentario adicional:	10mL de sangre total Heparina a temperatura ambiente. Enviar de Lunes a miércoles.

Condiciones de obtención:

Obtener la sangre heparinizada. Si es para control de tratamiento, extraer la sangre transcurridas 6 horas de la última medicación. No congelar

Valores de referencia:	< 0.5 nmol cistina/mg proteína
-------------------------------	--------------------------------

Descripción:	CISTINA ORINA 24H
Código:	CISTINA24H
Técnica:	Cromatografía Líquida de Alta Resolución
Unidades:	mg/24 h
Plazo:	11 días
Tubo:	Orina 24 Horas
Comentario adicional:	10 ml orina 24h (vol. mín. 5 mL) Indicar volumen 24h

Descripción: CISTINA ORINA 24H
Valores de referencia: (5 - 31) 1 año - 12 años
 (0.00 - 38.00) > 12 años
 (2.20 - 3.30) 10 días - 49 días

Descripción: Cistinosis. Sec Gen: CTNS
Código: GEN_000112
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Cistinuria. Sec Gen: SLC3A1
Código: GEN_000113
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Cistinuria. Sec Gen: SLC7A9
Código: GEN_000114
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: CITALOPRAM
Código: CITALOPRAM
Técnica: Cromatografía líquida/Espectrometría de masas tandem (LC-MS/MS)
Unidades: µg/L
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL suero SIN gel separador
 Volumen mínimo: 0.1 mL
 Alternativa: 0.5 mL Plasma EDTA

El contenedor recomendado es el tubo seco (sin gel separador) para evitar procesos de adsorción del fármaco. En caso de no disponer de tubo seco, la extracción se puede realizar en tubo con gel separador, separando el suero dentro de las 2 horas poste

Valores de referencia: (50 - 110) Intervalo terapéutico
 (Sup. 220) Toxicidad
 (Inf. 5) Límite de cuantificación

Descripción: Citocromo 450 2B6. Sec Gen: CYP2B6
Código: GEN_000115
Técnica:
Unidades:

Descripción: Citocromo 450 2B6. Sec Gen: CYP2B6
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Citocromo 450 2C9. Sec Gen: CYP2C9
Código: GEN_000116
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Citocromo 450 2D6. Sec Gen: CYP2D6
Código: GEN_000117
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Código: CITOLB
Descripción: CITOLOGÍA DE LÍQUIDOS BIOLÓGICOS (ORINA, BRONCOASPIRADOS...)
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	NREGCIT			NREGCIT		
Prueba	SNOMEDC			SNOMED Citologías		
Prueba	PATO			PATÓLOGO		
Prueba	DMACROCITO			EXAMEN MACROSCOPICO CITOLOGIA		
Prueba	DMICROCITO			EXAMEN MICROSCOPICO CITOLOGIA		
Prueba	NOTACITO			Nota Citologia		
Prueba	RESDIAG			Resumen Diagnóstico		
Prueba	TDMBIOLOGI			TIPO DE MUESTRA BIOLOGICA		

Código: CCITOPAAFS
Descripción: CITOLOGIA DE PAAF (CRISTALES)
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.

Componentes					
Prueba	NREGCIT			NREGCIT	
Prueba	SNOMEDC			SNOMED Citologías	
Prueba	PATO			PATÓLOGO	
Prueba	DMACROCITO			EXAMEN MACROSCOPICO CITOLOGIA	
Prueba	DMICROCITO			EXAMEN MICROSCOPICO CITOLOGIA	
Prueba	NOTACITO			Nota Citologia	
Prueba	RESDIAG			Resumen Diagnóstico	
Prueba	TDMPAAF			TDMPAAF	

Código: CCITOPAAF
Descripción: CITOLOGIA DE PAAF PROFUNDA (CRISTALES DIAGNÓSTICO))
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes					
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades V. ref.
Prueba	NREGCIT			NREGCIT	
Prueba	SNOMEDC			SNOMED Citologías	
Prueba	PATO			PATÓLOGO	
Prueba	DMACROCITO			EXAMEN MACROSCOPICO CITOLOGIA	
Prueba	DMICROCITO			EXAMEN MICROSCOPICO CITOLOGIA	
Prueba	RESDIAG			Resumen Diagnóstico	
Prueba	TDMPAAF			TDMPAAF	

Código: CITOPAAF
Descripción: CITOLOGIA DE PAAF SUPERFICIAL
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes					
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades V. ref.
Prueba	NREGCIT			NREGCIT	
Prueba	SNOMEDC			SNOMED Citologías	
Prueba	PATO			PATÓLOGO	
Prueba	DMACROCITO			EXAMEN MACROSCOPICO CITOLOGIA	
Prueba	DMICROCITO			EXAMEN MICROSCOPICO CITOLOGIA	
Prueba	NOTACITO			Nota Citologia	
Prueba	RESDIAG			Resumen Diagnóstico	
Prueba	TDMPAAF			TDMPAAF	

Código: CITOEXFO
Descripción: CITOLOGÍA EXFOLIATIVA

Código: CITOEXFO

Técnica:

Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	NREGCIT			NREGCIT		
Prueba	SNOMEDC			SNOMED Citologías		
Prueba	PATO			PATÓLOGO		
Prueba	ESTHORM			ESTHORM		
Prueba	ASPMORG			Aspecto Morfológico		
Prueba	NOTACITO			Nota Citologia		
Prueba	RESDIAG			Resumen Diagnóstico		
Prueba	TMEXFOLI			TOMA DE MUESTRA EXFOLIATIVA		
Prueba	CATCALIDAD			CATCALIDAD		
Prueba	ESTMICRO			ESTMICRO		

Código: CITOLIQ

Descripción: CITOLOGÍA GINECOLOGICA EN MEDIO LIQUIDO

Técnica:

Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	NREGCIT			NREGCIT		
Prueba	TDMVAGINAL			TIPO DE MUESTRA VAGINAL		
Prueba	ESTHORM			ESTHORM		
Prueba	CATCALIDAD			CATCALIDAD		
Prueba	ESTMICRO			ESTMICRO		
Prueba	ASPMORG			Aspecto Morfológico		
Prueba	RESDIAG			Resumen Diagnóstico		
Prueba	NOTACITO			Nota Citologia		
Prueba	SNOMEDC			SNOMED Citologías		
Prueba	PATO			PATÓLOGO		

Descripción: CITOMEGALOVIRUS AC. IGG

Código: CITOACG

Técnica: CMIA.

Unidades: Índice

Plazo: 3 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional:

Valores de referencia: (Inf. 5.9) Negativo
(Sup. 6.0) Inmunidad adquirida o en evolucion

Descripción: CITOMEGALOVIRUS AC. IGG EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
Código: CITOGLC
Técnica: Inmunoanálisis (Téc. Enzimoinmunoanálisis hasta el 22-03-2012)
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo
(Sup. 1) Positivo

Descripción: CITOMEGALOVIRUS AC. IGM
Código: CITOACM
Técnica: CMIA
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 0.85) Negativo

Descripción: CITOMEGALOVIRUS AC. IGM EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
Código: CITOMLC
Técnica: Inmunoanálisis (Hasta el 13/03/2012 Técnica EIA)
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: .
Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo
(Sup. 1) Positivo

Descripción: Citomegalovirus DNA PCR cualitativa
Código: CITOPCR
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: LCR-CONGELAR
3ml Plasma de EDTA-CONGELAR
3ml Sangre total EDTA-REFRIGERAR
1ml Aspirado bronquial-REFRIGERAR
1ml Lavado broncoalveolar-REFRIGERAR
1ml Líquido amniótico-CONGELAR
Orina-CONGELAR. En orina solo se realiza en recién nacidos o mujer gestante.
Humor vitreo/acuoso-CONGELAR
Placenta-REFRIGERAR
Tejido-REFRIGERAR
Tejido parafinadoTA
3ml Médula ósea-REFRIGERAR
Valores de referencia: Valor de referencia indicativo: No se detecta
Límite de detección: 178 UI/mL

Descripción: Citomegalovirus DNA PCR Cuantitativa
Código: CITOCUAN

Descripción: Citomegalovirus DNA PCR Cuantitativa
Técnica: PCR cuantitativa
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra envíos externos
Comentario adicional: 1ml LCR- CONGELAR
 1 ml plasma EDTA-CONGELAR
 1ml Sangre total EDTA
 1 ml BAL-CONGELAR
 1 ml BAS-CONGELAR
 1ml humor vitreo/acuoso-CONGELAR
 1ml Líquido amniótico-CONGELAR
 1ml Médula ósea EDTA-CONGELAR
 1ml Orina (Sólo bebes)-CONGELAR
 Placenta-REFRIGERAR
 Tejido parafinado- TA
 Biopsia en suero fisiológico-REFRIGERAR

Valores de referencia:

Descripción: CITOMEGALOVIRUS IgG AVIDEZ
Código: AVIDEZCITO
Técnica: CLIA
Unidades: Índice
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL de suero o plasma (citrato, heparina) positiva para CMV IgG
Valores de referencia: (Inf. 0.4) Baja Avidéz. Compatible con primoinfección reciente de menos de 4 meses.
 (0.4 - 0.5) Avidéz intermedia. No permite distinguir infección reciente de una infección anterior.
 (Sup. 0.5) Alta Avidéz. Compatible con infección pasada de más de 5 meses.
 El diagnóstico de una infección no solamente se debe basar en el resultado del ensayo. Es necesario considerar la anamnesis y la sintomatología del paciente junto al resultado serológico.

Descripción: Citopenia ligada al X asociada a GATA1. Sec Gen: GATA1
Código: GEN_000118
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: CITOPLASMA NEUTROFILOS AC. (ANCA)
Código: ANCA
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:

Descripción: CITOPLASMA NEUTROFILOS AC. (ANCA)
Valores de referencia: Negativo <1/40
 Positivo >1/40

Descripción: CITOSOL HEPATICO AC. SUERO
Código: LC1
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: Negativo < 1/10
 Positivo > 1/10

Descripción: CITRULINA PLASMA
Código: CITRU
Técnica: Cromatografía líquida de alta resolución
Unidades: mcmol/L
Plazo: 13 días
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional: TUBOS ESPECIALES, SOLICITAR AL LABORATORIO.

INSTRUCCIONES OBTENCIÓN MUESTRA:

Extraer sangre total en tubo de Heparina ó EDTA y separar el PLASMA. Mezclar a partes iguales INMEDIATAMENTE después, el plasma separado con Ácido Perclórico 1 mol/L (tubos enviados).

Ej: 1mL de plasma + 1 mL de Ácido perclórico.

Centrifugar a 3000 r.p.m. durante 10 minutos. Separar el SOBRENADANTE en tubo adjunto (vacío), UNA VEZ SEPARADO, CONGELAR INMEDIATAMENTE Y ENVIAR CONGELADO.

Valores de referencia: (10 - 60) > 1 año

Descripción: Citrulinemia tipo 1. Sec Gen: ASS1
Código: GEN_000119
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Descripción: Citrulinemia tipo 2. Sec Gen: SLC25A13
Código: GEN_000182
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Descripción: CK ISOENZIMA MB
Código: CKMB
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: U/L
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 0.5 mL suero congelado
Valores de referencia: (Inf. 24)

Descripción: CK ISOENZIMA MB (MASA)
Código: CKMBMASA
Técnica: CMIA
Unidades: ng/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL suero
 Alternativo plasma de Heparina y EDTA.
Valores de referencia: (Inf. 5.2) Hombre
 (Inf. 3.1) Mujer

Descripción: CLOMETIAZOL
Código: CLOMETIAZO
Técnica: Cromatografía líquida-tándem masas
Unidades: mcg/mL
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 2 mL de suero
Valores de referencia: (1.0 - 4.0)

Código: CLOMIPRAMI
Descripción: Clomipramina+Desmetilclomipramina
Técnica: Cromatografía Líquida de Alta Resolución
Comentario adicional: 2 mL suero. REFRIGERAR.

Componentes						V. ref.
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	
Prueba	CLPM	3491-8		CLOMIPRAMINA	µg/L	<10 µg/L: Límite de cuantificación
Prueba	DESMECLO	3536-0		DESMETILCLOMIPRAMINA	µg/L	<12 µg/L: Límite de cuantificación
Prueba	SUMACLDDES	3493-4		Clomipramina+Desmetilclomipramina	µg/L	(230 - 450) Intervalo terapéutico (Sup. 450) Toxicidad

Descripción: CLONALIDAD B · REORDENAMIENTOS IGH · FRAGMENTOS
Código: IGH
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA

Descripción:

CLONALIDAD B · REORDENAMIENTOS IGH · FRAGMENTOS

Comentario adicional:

Al menos 3 ml de Médula Ósea o Sangre Periférica en tubo EDTA. Tubo exclusivo para esta determinación (tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO).

IMPORTANTE: SIEMPRE REFRIGERADO

Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.

Valores de referencia:**Descripción:**

CLONALIDAD T · REORDENAMIENTOS TCRBETA · FRAGMENTOS

Código:

TCRBETA

Técnica:

PCR y análisis de fragmentos

Unidades:**Plazo:**

10 días

Tubo:

TUBO ONCOGENETICA

Comentario adicional:

Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO.

IMPORTANTE: REFRIGERADO SIEMPRE**Valores de referencia:****Descripción:**

CLONALIDAD T · REORDENAMIENTOS TCRDELTA · FRAGMENTOS

Código:

TCRDELTA

Técnica:**Unidades:****Plazo:**

10 días

Tubo:

Muestra Anatomía Patológica

Comentario adicional:

Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Alternativa: citrato.**Valores de referencia:****Descripción:**

CLONALIDAD T · REORDENAMIENTOS TCRDELTA · FRAGMENTOS

Código:

TCRDELTA

Técnica:**Unidades:****Plazo:**

10 días

Tubo:

Muestra Anatomía Patológica

Comentario adicional:**Valores de referencia:****Descripción:**

CLONALIDAD T · REORDENAMIENTOS TCRGAMMA · FRAGMENTOS

Código:

TCRGAMMA

Técnica:

PCR y análisis de fragmentos

Unidades:**Plazo:**

10 días

Tubo:

TUBO ONCOGENETICA

Comentario adicional:

Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO.

IMPORTANTE: REFRIGERADO SIEMPRE**Valores de referencia:****Descripción:**

CLONAZEPAM

Código:

CLONAZEPAM

Técnica:

LC-MS/MS

Unidades:

µg/L

Plazo:

8 días

Tubo:

Suero Basal

Descripción:	CLONAZEPAM
Comentario adicional:	Volumen: 0.5 ml suero Volumen mínimo: 0.1 mL suero Conservación: Refrigerar CONTENEDOR: TUBO SUERO SIN GEL SEPARADOR
Valores de referencia:	(20 - 70) (Sup. 80) Tóxico

Descripción:	CLORAZEPATO (TRANXILIUM) SUERO
Código:	CLORAZEPAM
Técnica:	LC-MS/MS
Unidades:	µg/mL
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	2 mL ml de suero Tubo suero con gel separador.
Valores de referencia:	(0.10 - 1.00) Valores terapéuticos indicativos. Los resultados se expresan como Nordiazepam (el clorazepato se convierte a Nordiazepam por efecto del HCl gástrico)

Descripción:	CLORDIAZEPOXIDO (LIBRIUM)
Código:	CLORDIAZE
Técnica:	LC-MS/MS
Unidades:	µg/L
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero, refrigerar. Alternativa: plasma de edta refrigerado. La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis.
Valores de referencia:	(400 - 3000) Índice terapéutico (Sup. 3500) Toxicidad (Inf. 60) Límite de cuantificación

Descripción:	CLOROQUINA SUERO
Código:	CLOROQ
Técnica:	LC-MS/MS
Unidades:	mcg/L
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(13 - 32) Profilaxis (96 - 192) Nivel terapéutico (Sup. 1000) Tóxico

Descripción:	CLORPROMACINA
Código:	CLORPROMA
Técnica:	LC-MS/MS
Unidades:	ng/mL
Plazo:	12 días

Descripción: CLORPROMACINA
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 2 ml suero
Valores de referencia: (50 - 300) Valores terapéuticos
(Sup. 1500) Toxicidad

Descripción: CLORURO DE METILENO (DICLOROMETANO) EN ORINA
Código: CLORUMETIL
Técnica: Cromatografía de Gases/ Captura electrónica
Unidades: mg/L
Plazo: 12 días
Tubo: Orina Final de Jornada
Comentario adicional: 3 mL orina final de jornada laboral
Volumen mínimo: 1 mL
Valores de referencia: (Inf. 0.3) Valor Límite Biológico-VLB® (INSST) en orina final de jornada
(Inf. 0.3) Biological Exposure Indices-BEIs® (ACGIH®) en orina final de jornada
(Inf. 0.05) Límite de cuantificación

Descripción: CLORURO DE METILENO (DICLOROMETANO) EN SANGRE
Código: CLORUROMET
Técnica: Cromatografía de gases/captura electrónica
Unidades: mg/L
Plazo: 13 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 2 ml de sangre total (EDTA)
Muestreo: final de turno o jornada laboral
Valores de referencia: (Inf. 0.5)

Descripción: CLORUROS
Código: CL
Técnica:
Unidades: mmol/L
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (90 - 110)

Descripción: Clostridium difficile, Toxina A y B, PCR
Código: CLOSTRIPCR
Técnica: PCR (HIBRIDACIÓN MOLECULAR CON AMPLIFICACIÓN)
Unidades:
Plazo: 8 días
Tubo: heces especiales
Comentario adicional: Heces diarreicas o acuosas. No se recomienda realizar una prueba para toxina de clostridium difficile si las heces no son diarreicas o líquidas.
Valores de referencia:

Descripción: Clouston, Sd. Sec Gen: GJB6
Código: GEN_000120
Técnica:

Descripción: Clouston, Sd. Sec Gen: GJB6

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: COACH, Sd. Sec Gen: TMEM67

Código: GEN_000121

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: COBALTO EN ORINA

Código: COBALTO2

Técnica: ICP-MS

Unidades: µg/L

Plazo: 7 días

Tubo: Orina Final de Jornada

Comentario adicional: 10 ml de orina aislada al final de la semana laboral.

No recolectar muestras de orina en un ambiente en el que sea más probable que ocurra la exposición. Es importante evitar que el polvo de la ropa pueda interferir en el contenido de la muestra.

No recoger la orina en recipientes con base de metal, como urinarios o sartenes de metal. Recoger la orina en tubos de polipropileno inoculador libre de metales sin tapones de colores. Cuando esto no sea posible, usar para la recogida de orina un envase

Valores de referencia: (Inf. 15) (VLB-INSHT) Exposición al final de la semana laboral
(Inf. 1) Límite de cuantificación

Descripción: COBALTO EN SANGRE TOTAL

Código: COBALTOSAN

Técnica: IPC-MS

Unidades: µg/L

Plazo: 6 días

Tubo: EDTA sangre total Referencia

Comentario adicional: Sangre total EDTA Dipotásico (libre trazas metales) al final de la semana laboral.

Valores de referencia: (Inf. 1.0) .Valor límite biológico recomendado por INHST al final de semana laboral tras exposición a COBALTO y sus derivados inorgánicos excepto óxidos.

Descripción: COBALTO EN SUERO

Código: COBALTO

Técnica: Espectrometría de masas -Plasma acoplado inductivamente

Unidades: µg/l

Plazo: 6 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: La muestra idónea es contenedor Tubo Suero metales traza.
Volumen 1.0 mL
Volumen mínimo 0.15 mL
.

Descripción:	COBALTO EN SUERO
Valores de referencia:	(Inf. 2.0) Prótesis e implantes: No existe desgaste (2 - 10) Prótesis e implantes: Riesgo de desgaste
Descripción:	COBRE EN ORINA AISLADA
Código:	CU2_MCG
Técnica:	ICP-MS
Unidades:	ug/g creatinina
Plazo:	7 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	OFJ en caso de exposición laboral. Orina aislada.
No recoger muestras de orina en un ambiente en el que sea más probable que ocurra la exposición. Es importante evitar que el polvo de la ropa pueda interferir en el contenido de la muestra. No recoger la orina en recipientes con base de metal, como urinarios o sartenes de metal. Recoger la orina en tubos de polipropileno vacíos libre de metales sin tapones de colores. Cuando esto no sea posible, usar para la recogida de orina un envase	
Valores de referencia:	(9 - 58) 2 años - 6 años (7 - 46) 7 años - 11 años (5 - 18) 12 años - 17 años (9 - 43) Hombre .Valores de referencia orientativos para población no expuesta. (7 - 72) Mujer .Valores de referencia orientativos para población no expuesta.
Descripción:	Cobre en tejido hepatico-Muestra parafinada
Código:	COBRETEJID
Técnica:	ICP-MS
Unidades:	mcg/g peso seco
Plazo:	9 días
Tubo:	Muestra envios externos
Comentario adicional:	2-3 mg de tejido. Congelar y enviar congelado
Valores de referencia:	(10 - 43) (Sup. 250) Compatible con Enf. de Wilson
Descripción:	COBRE ERITROCITARIO, SANGRE
Código:	CUG
Técnica:	
Unidades:	µg/dL
Plazo:	7 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	Sangre total EDTA Dipotásico (libre trazas metales) Volumen 1.0 mL Volumen mínimo 0.15 mL Alternativo: Se puede hacer con muestra en tubo libre de metales y anticoagulante Heparina Sódica.
Valores de referencia:	(43 - 91)
Descripción:	COBRE LIBRE EN SUERO
Código:	CULIBRE
Técnica:	Ultrafiltración-Espectrometría de Emisión Atómica/ Espectrometría de masas(ICP-MS)
Unidades:	µg/dL
Plazo:	10 días
Tubo:	Suero Basal

Descripción: COBRE LIBRE EN SUERO

Comentario adicional: 3 mL.

Valores de referencia: (0.0 - 10.0)

Descripción: COBRE ORINA DE 24 HORAS

Código: CU2

Técnica: ICP-MS

Unidades: µg/24h

Plazo: 7 días

Tubo: Orina 24 Horas

Comentario adicional: 5 mL de orina de 24 horas. Anotar diureis en el tubo/bote que se envíe. Válida orina acidificada

Valores de referencia: (Inf. 60)
(Inf. 6) Límite de cuantificación

Descripción: COBRE SUERO

Código: CU

Técnica: Espectrofotometría.

Unidades: µg/dL

Plazo: 3 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 0.5 mL suero

Valores de referencia: (70 - 140) Hombre > 18 años
(80 - 155) Mujer > 18 años
(20 - 70) < 6 meses
(90 - 190) 6 meses - 18 años

Descripción: COCAINA

Código: COCA

Técnica: Inmunoensayo

Unidades:

Plazo: 5 días

Tubo: Orina Drogas de Abuso

Comentario adicional: .

Valores de referencia:

Código: COCS

Descripción: COCAINA CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SANGRE

Técnica: LC-MS/MS

10 mL Sangre total Oxalato/Fluoruro [Refrigerar]

Comentario adicional: Alternativa:
10 mL Sangre total EDTA [Refrigerar]

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	COCASAN	72405-4		Perfil Confirmación de Cocaína en sangre por LC-MS/MS	ng/mL	(Inf. 1.3) Incertidumbre de medida (Inf. 8) Límite de cuantificación
Prueba	COBZST			Perfil Confirmación Benzoilecgonina sangre LC-MS/MS	ng/mL	(Inf. 1.6) Incertidumbre de medida (Inf. 8) Límite de cuantificación

Código: COCS
Descripción: COCAINA CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SANGRE
Técnica: LC-MS/MS
 10 mL Sangre total Oxalato/Fluoruro [Refrigerar]
Comentario adicional: Alternativa:
 10 mL Sangre total EDTA [Refrigerar]

Componentes						V. ref.
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	
Prueba	COCASAN	72405-4		Perfil Confirmación de Cocaína en sangre por LC-MS/MS	ng/mL	(Inf. 1.3) Incertidumbre de medida (Inf. 8) Límite de cuantificación
Prueba	COBZST			Perfil Confirmación Benzoilecgonina sangre LC-MS/MS	ng/mL	(Inf. 1.6) Incertidumbre de medida (Inf. 8) Límite de cuantificación

Descripción: COCAINA CONFIRMACION EN SALIVA
Código: COCASAL
Técnica: LC-MS/MS
Unidades: ng/mL
Plazo: 10 días
Tubo: Saliva
Comentario adicional: Saliva recogida en kit ORAL-EZE. Solicitar kit en el almacén.
Valores de referencia:

Descripción: COCAINA PELO CONFIRMACION
Código: COCAPELO
Técnica: Cromatografía líquida/Tanden masas (LC-MS/MS)
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional: PEDIR KIT ESPECIAL: almacen@ctes.eurofinseu.com
 PEDIR PROTOCOLO DE TOMA DE MUESTRA: calidad@ctes.eurofinseu.com
 -Análisis Informativo: incluye kit de toma de muestra y formulario de solicitud
-Cadena custodia: En caso de solicitar el análisis con validez judicial, solicitar al mismo tiempo documentación de cadena custodia (foto de toma de muestra y hoja de seguimiento). El protocolo de cadena custodia debe solicitarse a calidad@ctes.eur
 En el caso de cadena custodia debe recogerse la muestra por duplicado.

Valores de referencia:

Descripción: COCCIDIODES IMMITIS AC.
Código: COCCI
Técnica: Inmunodifusión Ouchterlony.
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia:

Descripción: COCIENTE ALDOSTERONA/RENINA DIRECTA
Código: RAR
Técnica: Cálculo
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo:
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Cockayne tipo B. Panel
Código: GEN_000122
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: COCLEARES P-68 KD (HSP-70) Ac. SUERO
Código: COCLEARAC
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero. Refrigerar
Valores de referencia: Valor de referencia: No se detecta

Descripción: COENZIMA Q 10 EN SUERO
Código: COEQ10
Técnica: Cromatografía líquida de alta eficacia - Ultravioleta.
Unidades: mg/L
Plazo: 13 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: Suero congelado.
 Alternativa: plasma Hepatina de litio. Congelado
 Muestra protegida de la luz
Valores de referencia: (0.35 - 1.94)

Descripción: COFACTOR II HEPARINA EN PLASMA
Código: COFACTHEPA
Técnica: Substrato cromogénico.,
Unidades: %
Plazo: 31 días
Tubo: Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional: 1 mL plasma. Congelar y enviar congelado
Valores de referencia: (65 - 145)

Descripción: Coffin-Lowry, Sd. Sec Gen: RPS6KA3
Código: GEN_000123
Técnica:

Descripción: Coffin-Lowry, Sd. Sec Gen: RPS6KA3
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Cohen, Sd. Sec Gen: VPS13B
Código: GEN_000124
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: COLAGENO TIPO II ANTICUERPOS, SUERO
Código: ACOL
Técnica: EIA
Unidades: Indice
Plazo: 32 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero refrigerado.
Valores de referencia: Valor de referencia indicativo:Negativo

Descripción: COLAGENO TIPO VII NC1 ANTICUERPOS SUERO
Código: COLAGTVII
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: Ratio
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo

Descripción: Colangiocarcinoma panel 2
Código: COLANGIO_2
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Muestras: tejido incluido en parafina.
Laboratorio Oncogenética
Valores de referencia:

Descripción: Colestasis intrahepática familiar progresiva. Panel
Código: GEN_000125
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción:	Colestasis intrahepática familiar progresiva. Panel
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	
Descripción:	Colestasis intrahepática familiar progresiva: gen MDR3 (NGS)
Código:	MDR3_MUTS
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM. Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:	
Descripción:	Colestasis intrahepática familiar. Sec Gen: ABCB11
Código:	GEN_000126
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	
Descripción:	COLESTEROL
Código:	CHOL
Técnica:	
Unidades:	mg/dL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf . 200)
Descripción:	COLINESTERASA
Código:	COLI
Técnica:	Colorimétrico multifrecuencia.
Unidades:	U/L a 37 °C
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 mL suero
Valores de referencia:	(5100 - 13700) Hombre (4400 - 12100) Mujer
Descripción:	COLINESTERASA ERITROCITARIA
Código:	COLINESERI
Técnica:	Espectrometría
Unidades:	U/L
Plazo:	5 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	1 mL sangre total (EDTA)

Descripción: COLINESTERASA ERITROCITARIA

Valores de referencia: (11188 - 16698)
 70% del valor pre-exposición: Valor límite biológico (exposición a insecticidas organofosforados, incluido paratión) (VLB-INSHT)
 70% del valor pre-exposición: Biological Exposure Indices-BEIs® (ACGIH®)

Descripción: Coloboma renal, Sd. Sec Gen: PAX2

Código: GEN_000127

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: COLOR LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO

Código: LIQLCCOLOR

Técnica: Observación

Unidades:

Plazo:

Tubo: Líquidos Biológicos

Comentario adicional:

Valores de referencia:

Descripción: Comentario interno FISH

Código: NOTAFISH

Técnica:

Unidades:

Plazo:

Tubo: Heparina Litio

Comentario adicional: Prueba para comentario interno

Valores de referencia:

Descripción: COMPARACIÓN PERFILES GENÉTICOS EN LÍQUIDO AMNIÓTICO

Código: COMPERFLA

Técnica: QF-PCR

Unidades:

Plazo: 2 días

Tubo: Muestra Biología Molecular

Comentario adicional: Muestra: líquido amniótico

Valores de referencia:

Descripción: Complejo de Carney. Sec Gen: PRKAR1A

Código: GEN_000128

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción:	COMPLEMENTO C-1 ESTERASA INHIBIDOR ACTIVIDAD PLASMA
Código:	C1ESTERA
Técnica:	Téc.Cromogénica
Unidades:	%
Plazo:	5 días
Tubo:	Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:	1mL plasma citrato separado y Congelado
Valores de referencia:	(70 - 130)

Descripción:	COMPLEMENTO C-1 ESTERASA INHIBIDOR PROTEÍNA
Código:	C1ESTERAP
Técnica:	Turbidimetría
Unidades:	mg/dL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	(21 - 38)

Descripción:	COMPLEMENTO C-1 Q SUERO
Código:	C1Q
Técnica:	Turbidimetría
Unidades:	mg/dL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	El Suero es el único tipo de muestra válido
Valores de referencia:	(15.7 - 30.6)

Descripción:	COMPLEMENTO C-2 SUERO
Código:	C2
Técnica:	Turbidimetría
Unidades:	mg/L
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 mL suero congelado
Valores de referencia:	(10.8 - 24.5)

Descripción:	COMPLEMENTO C3 ACTIVADOR SUERO (FACTOR B)
Código:	C3ACTIVA
Técnica:	Nefelometría
Unidades:	mg/dL
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Alt. plasma EDTA o plasma heparina
Valores de referencia:	(Sup. 22.5)

Descripción:	COMPLEMENTO C-3 SUERO
Código:	C3
Técnica:	Inmunoturbidimetría
Unidades:	mg/dL

Descripción:	COMPLEMENTO C-3 SUERO
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 mL suero. NOTA TECNICA ABBOTT (21-5-2019) NO SE PUEDE UTILIZAR EDTA Alternativa plasma heparina.
Valores de referencia:	(82 - 173) Mujer 1 año - 14 años (83 - 193) Mujer 14 años - 80 años (80 - 170) Mujer > 81 años (80 - 170) Hombre 1 año - 14 años (82 - 185) Hombre 14 años - 80 años (80 - 170) Hombre > 81 años

Descripción:	COMPLEMENTO C-4 SUERO
Código:	C4
Técnica:	Inmunoturbidimetría
Unidades:	mg/dL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 mL suero Alt. plasma EDTA o plasma heparina NOTA TECNICA ABBOTT (21-5-2019) NO SE PUEDE UTILIZAR EDTA NI PLASMA HEPATINA
Valores de referencia:	(13 - 46) Mujer 1 año - 14 años (15 - 57) Mujer 14 años - 80 años (14 - 44) Mujer > 81 años (14 - 44) Hombre 1 año - 14 años (15 - 53) Hombre 14 años - 80 años (14 - 44) Hombre > 81 años

Descripción:	COMPLEMENTO C-5 SUERO
Código:	C5
Técnica:	
Unidades:	mg/dL
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL de suero refrigerado.
Valores de referencia:	(Sup. 9.5)

Descripción:	COMPLEMENTO C-6 SUERO
Código:	C6
Técnica:	Inmunodifusión radial
Unidades:	mg/dL
Plazo:	17 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL.
Valores de referencia:	(2.8 - 6.9)

Descripción:	COMPLEMENTO C-7 SUERO
Código:	C7
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	mg/dL
Plazo:	17 días
Tubo:	Suero Basal

Descripción: COMPLEMENTO C-7 SUERO
Comentario adicional: 1 mL de suero.
Valores de referencia: (4.0 - 11.0)

Descripción: COMPLEMENTO C-8 SUERO
Código: C8
Técnica: Inmunodifusión radial
Unidades: mg/dL
Plazo: 23 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL.
Valores de referencia: (4.9 - 10.6)

Descripción: COMPLEMENTO C-9 SUERO
Código: C9
Técnica: Enzimoimmunoanálisis
Unidades: mg/dL
Plazo: 12 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL
Valores de referencia: (3.30 - 9.50)

Descripción: COMPLEMENTO HEMOLITICO 50 SUERO
Código: CH50
Técnica: Inmunoensayo in vitro automatizado basado en liposomas
Unidades: U/mL
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 mL suero. Congelar inmediatamente
Valores de referencia: (Sup. 41)

Descripción: Comunicación interauricular cardíaca. Sec Gen: MYH6
Código: GEN_000129
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: CONCENTRACION AC. HOMOGENISICO ORINA
Código: HOMOGENMG
Técnica: HPLC
Unidades: mg/L
Plazo: 17 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 10 mL orina (micción aislada) con 0,5 mL ác. clorhídrico conc
Valores de referencia: (Inf. 8)

Descripción: CONCENTRACION EN ORINA AISLADA DE PORFOBILIGENO
Código: PORFOBIMG
Técnica: Espectrometría
Unidades: mg/g creatin.
Plazo: 8 días
Tubo: Orina congelada
Comentario adicional: 1 tubo orina

Conservación preferiblemente enviar congelada
Volumen mínimo
0,5 mL

Valores de referencia: (1.8 - 4.70) Límite de cuantificación: <0.80 mg/L

Descripción: Condrodisplasia metafisaria tipo Jansen. Sec Gen: PTH
Código: GEN_000130

Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Condrodisplasia metafisaria tipo Schmid: gen COL10A1 (NGS)

Código: COL10A1
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:

Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Condrodisplasia punctata ligada al X t1. Sec Gen: ARSE
Código: GEN_000131

Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Condrodisplasia punctata ligada al X t2. Sec Gen: EBP
Código: GEN_000132

Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Condrodisplasia punctata ligada al X. Panel
Código: GEN_000133
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Condrodisplasia tipo Blomstrand. Sec Gen: PTH1R
Código: GEN_000134
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Confirmación 6-monoacetil morfina (6AM) sangreLC-MS/MS
Código: CO6MMST
Técnica:
Unidades: ng/mL
Plazo: 7 días
Tubo: Tubo fluoruro
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 2) Valor de corte recomendado
(Inf. 0.5) Incertidumbre de medida

Código: DASA
Descripción: CONFIRMACION ANFETAMINAS SALIVA LC-MS/MS
Técnica:
Comentario adicional: Saliva. refrigerar.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	COANFSA	72758-6		Confirmación de Anfetamina en saliva LC-MS/MS	ng/mL	(Inf. 15) Valor de corte recomendado (Inf. 3.8) Incertidumbre de medida
Prueba	COMDASA	72736-2		Confirmación de MDA saliva por LC-MS/MS	ng/mL	(Inf. 15) Valor de corte recomendado (Inf. 3.3) Incertidumbre de medida
Prueba	COMTFSA	72735-4		Confirmación de Metanfetamina en saliva por LC-MS/MS	ng/mL	(Inf. 15) Valor de corte recomendado (Inf. 2.9) Incertidumbre de medida
Prueba	COMDMASA	74651-1		Confirmación de MDMA en saliva LC-MS/MS	ng/mL	(Inf. 15) Valor de corte recomendado (Inf. 3.7) Incertidumbre de medida

Componentes						
Prueba	COMDEASA	74649-5		Confirmación de MDEA saliva por LC-MS/MS	ng/mL	(Inf. 15) Valor de corte recomendado (Inf. 3.2) Incertidumbre de medida

Código: DAPG
Descripción: CONFIRMACION ANFETAMINAS SANGRE LC-MS/MS
Técnica: Sangre total Oxalato/Fluoruro. refrigerar.
Comentario adicional: Sangre total Heparina litio. refrigerar.
 Sangre total EDTA. refrogerar.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	COANFST	42576-9		Confirmación de Anfetamina en sangre por LC-MS/MS	ng/mL	(Inf. 15) Valor de corte recomendado (Inf. 2.9) Incertidumbre de medida
Prueba	COMDAST	29598-0		Confirmación de MDA en sangre por LC-MS/MS	ng/mL	(Inf. 15) Valor de corte recomendado (Inf. 3.2) Incertidumbre de medida
Prueba	COMTFST	82966-3		Confirmación de Metanfetamina en sangre por LC-MS/MS	ng/mL	(Inf. 15) Valor de corte recomendado (Inf. 3) Incertidumbre de medida
Prueba	COMDMAST	29619-4		Confirmación de MDMA en sangre por LC-MS/MS	ng/mL	(Inf. 15) Valor de corte recomendado (Inf. 2.6) Incertidumbre de medida
Prueba	COMDEAST	82965-5		Confirmación de MDEA en sangre por LC-MS/MS	ng/mL	(Inf. 15) Valor de corte recomendado (Inf. 3.3) Incertidumbre de medida

Descripción: Confirmación de Anfetamina en saliva LC-MS/MS
Código: COANFSA
Técnica:
Unidades: ng/mL
Plazo: 7 días
Tubo: Saliva
Comentario adicional: Saliva
Valores de referencia: (Inf. 15) Valor de corte recomendado
 (Inf. 3.8) Incertidumbre de medida

Descripción: Confirmación de Benzoilecgonina en orina por LC-MS/MS
Código: COBZOR
Técnica: LC-MS/MS
Unidades: ng/mL
Plazo: 7 días
Tubo: Orina Drogas de Abuso

Descripción: Confirmación de Benzoilecgonina en orina por LC-MS/MS
Comentario adicional: orina refrigerada
Valores de referencia: Límite de cuantificación 25 ng/mL
 Incertidumbre de medida 3.9 ng/mL

Descripción: Confirmación de Cocaína en saliva por LC-MS/MS
Código: COCOCSA
Técnica:
Unidades: ng/mL
Plazo: 7 días
Tubo: Saliva
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 8) Valor de corte recomendado
 (Inf. 2) INCertidumbre de medida

Descripción: Confirmación de Codeína en sangre por LC-MS/MS
Código: COCODST
Técnica:
Unidades: ng/mL
Plazo: 7 días
Tubo: Tubo fluoruro
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 5) Valor de corte recomendado
 (Inf. 1) Incertidumbre de medida

Descripción: Confirmación de MDA saliva por LC-MS/MS
Código: COMDASA
Técnica:
Unidades: ng/mL
Plazo: 7 días
Tubo: Saliva
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 15) Valor de corte recomendado
 (Inf. 3.3) Incertidumbre de medida

Descripción: Confirmación de MDA saliva por LC-MS/MS
Código: COMDASA
Técnica:
Unidades: ng/mL
Plazo: 7 días
Tubo: Saliva
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 15) Valor de corte recomendado
 (Inf. 3.3) Incertidumbre de medida

Descripción: Confirmación de MDMA en saliva LC-MS/MS
Código: COMDMASA
Técnica:
Unidades: ng/mL
Plazo: 7 días
Tubo: Saliva

Descripción: Confirmación de MDMA en saliva LC-MS/MS
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 15) Valor de corte recomendado
 (Inf. 3.7) Incertidumbre de medida

Descripción: Confirmación de MDMA en saliva LC-MS/MS
Código: COMDMASA
Técnica:
Unidades: ng/mL
Plazo: 7 días
Tubo: Saliva
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 15) Valor de corte recomendado
 (Inf. 3.7) Incertidumbre de medida

Descripción: Confirmación de Morfina en saliva por LC-MS/MS
Código: COMORSA
Técnica:
Unidades: ng/mL
Plazo: 7 días
Tubo: Saliva
Comentario adicional: Saliva. Refrigerar. (1 ml)
Valores de referencia: (Inf. 5) Valor de corte recomendado
 (Inf. 1.2) Incertidumbre de medida

Descripción: Confirmación de Morfina en saliva por LC-MS/MS
Código: COMORSA
Técnica:
Unidades: ng/mL
Plazo: 7 días
Tubo: Saliva
Comentario adicional: Saliva. Refrigerar. (1 ml)
Valores de referencia: (Inf. 5) Valor de corte recomendado
 (Inf. 1.2) Incertidumbre de medida

Descripción: Confirmación de Morfina en saliva por LC-MS/MS
Código: COMORSA
Técnica:
Unidades: ng/mL
Plazo: 7 días
Tubo: Saliva
Comentario adicional: Saliva. Refrigerar. (1 ml)
Valores de referencia: (Inf. 5) Valor de corte recomendado
 (Inf. 1.2) Incertidumbre de medida

Descripción: Confirmación de Morfina en sangre por LC-MS/MS
Código: COMORST
Técnica:
Unidades: ng/mL
Plazo: 7 días
Tubo: Tubo fluoruro

Descripción: Confirmación de Morfina en sangre por LC-MS/MS

Comentario adicional:

Valores de referencia: (Inf. 5) Valor de corte recomendado
(Inf. 1) Incertidumbre de medida

Código: COCSA

Descripción: CONFIRMATORIO COCAINA SALIVA LC-MS/MS

Técnica:

Comentario adicional: Saliva. refrigerar.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	COBZSA	87809-0		Confirmación de Benzoilecgonina en saliva por LC-MS/MS	ng/mL	(Inf. 8) Valor de corte recomendado (Inf. 1.9) Incertidumbre de medida
Prueba	COCOCSA	72737-0		Confirmación de Cocaína en saliva por LC-MS/MS	ng/mL	(Inf. 8) Valor de corte recomendado (Inf. 2) INCertidumbre de medida

Código: CPIS

Descripción: CONFIRMATORIO OPIACEOS EN SANGRE LC-MS/MS

Técnica: LC-MS/MS

Sangre total Oxalato/Fluoruro. Refrigerar.

Comentario adicional: Sangre total Heparina litio. Refrigerar.
Sangre total EDTA. Refrigerar.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	CO6MMST	80115-9		Confirmación 6-monoacetil morfina (6AM) sangre LC-MS/MS	ng/mL	(Inf. 2) Valor de corte recomendado (Inf. 0.5) Incertidumbre de medida
Prueba	COCODST	86226-8		Confirmación de Codeína en sangre por LC-MS/MS	ng/mL	(Inf. 5) Valor de corte recomendado (Inf. 1) Incertidumbre de medida
Prueba	COMORST	86226-8		Confirmación de Morfina en sangre por LC-MS/MS	ng/mL	(Inf. 5) Valor de corte recomendado (Inf. 1) Incertidumbre de medida

Descripción: Convul. neonat-infantil benigna famil. Sec Gen: SCN2A

Código: GEN_000136

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: COPEPTINA (CT-proAVP) EN SUERO
Código: COPEPTINA
Técnica: Inmunoluminiscencia
Unidades: pmol/L
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 mL suero. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO. EVITAR MUESTRA DE PLASMA
Valores de referencia: Osmolalidad / Copeptina
 270-280 mOsm/kg / 0.8 - 11.6 pmol/L
 281-285 mOsm/kg / 1.0 - 13.7 pmol/L
 286-290 mOsm/kg / 1.5 - 15.3 pmol/L
 291-295 mOsm/kg / 2.3 - 24.5 pmol/L
 296-300 mOsm/kg / 2.4 - 28.2 pmol/L

Código: COPROANTI
Descripción: COPROCULTIVO (CULTIVO DE HECES)
Técnica: Cultivo en medios apropiados
 Se requiere una muestra de una deposición del tamaño de una nuez trasferida a un recipiente estéril de boca ancha y cierre hermético.
Comentario adicional: En el caso heces líquidas se necesitan entre 5 y 10 ml.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Perfil	CULTIVO		HECES	CULTIVO GENERAL en ESTUDIO MICROBIOLOGICO DE HECES		

Descripción: COPROPORFIRINA ISOMEROS (I-III) ORINA
Código: COPROISOME
Técnica: HPLC
Unidades: mcg/24h
Plazo: 9 días
Tubo: Orina 24 Horas
Comentario adicional: 10 mL de orina 24 horas. Indicar volumen total de 24 horas.
Valores de referencia: (Inf. 35) COPROPORFIRINA I
 (Inf. 65) COPROPORFIRINA III

Descripción: Corea benigna familiar. Sec Gen: NKX2-1
Código: GEN_000137
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Corea hereditaria benigna: gen NKK2-1 (NGS)
Código: NKX2_1_MUT
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días

Descripción: Corea hereditaria benigna: gen NKK2-1 (NGS)
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.
Alternativa: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Cornelia de Lange, Sd. Panel
Código: GEN_000138
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Coronavirus SARS-COV-2 RT-PCR
Código: COV2PCR
Técnica:
Unidades:
Plazo: 2 días
Tubo: ENSAYOS
Comentario adicional: Muestra respiratoria: torunda nasofaríngea con medio de transporte Vircell (solicitar al almacén Valderribas)
Valores de referencia:

Descripción: CORTICOSTERONA SUERO
Código: CORTICOSTE
Técnica: LC-MS/MS
Unidades: mcg/dL
Plazo: 32 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 2 ml de suero congelado
Valores de referencia: (0.1 - 2.0) Adultos
 (Inf. 6.5) Despues de ACTH

Descripción: CORTISOL EN SALIVA (1 MUESTRA) 23-24 HORAS
Código: CORTISA24H
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: ng/mL
Plazo: 18 días
Tubo: SALIVA PROYECTOS
Comentario adicional: 1 mL saliva
Valores de referencia: (Inf. 1.00)

Descripción: CORTISOL EN SALIVA (1 MUESTRA) MAÑANA
Código: CORTISA
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: ng/mL
Plazo: 18 días
Tubo: SALIVA PROYECTOS
Comentario adicional: 1 mL saliva

Descripción: CORTISOL EN SALIVA (1 MUESTRA) MAÑANA
Valores de referencia: (1.19 - 7.21)

Descripción: CORTISOL EN SALIVA (1 MUESTRA) TARDE
Código: CORTISATAR
Técnica: Enzimoimmunoanálisis
Unidades: ng/mL
Plazo: 18 días
Tubo: SALIVA PROYECTOS
Comentario adicional: 1 ml saliva
Valores de referencia: (0.33 - 2.23)

Descripción: CORTISOL LIBRE URINARIO
Código: CORTI2
Técnica: ICMA
Unidades: mcg/24 h
Plazo: 4 días
Tubo: Orina 24 Horas
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 53) < 20 años
 (Inf. 90) > 20 años

Descripción: CORTISOL SUERO
Código: CORTI
Técnica: ICMA
Unidades: mcg/dL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (5 - 25) Mañana
 (3 - 16) Tarde

Descripción: COTININA ORINA (METABOLITO DE NICOTINA)
Código: COTININA
Técnica: Técnica EIA
Unidades: ng/mL
Plazo: 5 días
Tubo: Orina Bioquímica
Comentario adicional: 10 mL orina
 Recoger orina sin conservantes.
Valores de referencia: (Inf. 500) No Fumadores

Descripción: COTININA SUERO (METABOLITOS DE NICOTINA)
Código: COTININASU
Técnica: Técnica ICMA
Unidades: ng/ml
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero refrigerado

Descripción: COTININA SUERO (METABOLITOS DE NICOTINA)
Valores de referencia: (Inf. 25) No Fumadores
 (Sup. 25) Fumadores

Descripción: Cowden, Sd. Panel
Código: GEN_000139
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Coxiella burnetii Fase II Ac. IGM
Código: COXIEIACM
Técnica: EIA
Unidades: Índice
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero.
 Alternativa: plasma (citrato, heparina)
Valores de referencia: (Inf. 9) Negativo
 (9.01 - 11) Indeterminado

Descripción: Coxiella burnetii DNA PCR
Código: COXIELLPCR
Técnica:
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: Muestra envíos externos
Comentario adicional: 2 ml de sangre total EDTA, suero, secreción, tejido, tejido parafinado, LCR..
Valores de referencia:

Descripción: Coxiella burnetii Fase I Ac. IGA
Código: COAFASEI
Técnica: EIA
Unidades: Índice
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml de suero refrigerado
Valores de referencia: (Inf. 0.9) Negativo
 (0.9 - 1.1) Indeterminado

Código: COXIEIACG
Descripción: COXIELLA BURNETII FASE I/II AC. IGG
Técnica: EIA
Comentario adicional: 1 mL suero

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.

Componentes						
Prueba	COGFASEI	51810-0		Coxiella burnetii Fase I IgG	Índice	(Inf. 9) Negativo (9.01 - 11) Indeterminado
Prueba	COGFASEII	51812-6		Coxiella burnetii Fase II IgG	Índice	(Inf. 9) Negativo (9.01 - 11) Indeterminado

Descripción: Coxiella burnetii Fase II IGG LCR

Código: COXBURLCR

Técnica:

Unidades:

Plazo: 6 días

Tubo: Líquidos Biológicos

Comentario adicional: 1 ml LCR

Biopsia ganglio: Se puede hacer siempre y cuando la muestra no esté conservada en FORMOL, tienen que en solución salina estéril.

Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo
(Sup. 1) Positivo

Descripción: Coxiella burnetii Fase II IGM LCR

Código: COXBIMLCR

Técnica:

Unidades:

Plazo: 6 días

Tubo: Líquidos Biológicos

Comentario adicional: 1 ml LCR

Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo
(Sup. 1) Positivo

Descripción: COXSACKIE B AC. IgM EN LCR

Código: COXACKBML

Técnica: Inmunofluorescencia indirecta.

Unidades:

Plazo: 9 días

Tubo: Líquidos Biológicos

Comentario adicional: 1 ml LCR. Se recomienda efectuar análisis simultáneo de suero y LCR

Valores de referencia: Positivo título > 1:1

Descripción: COXSACKIE B AC. IgG EN LCR

Código: COXACKBGL

Técnica: Inmunofluorescencia indirecta

Unidades:

Plazo: 6 días

Tubo: Líquidos Biológicos

Comentario adicional: 1 ml LCR. Se recomienda efectuar análisis simultáneo de suero y LCR

Valores de referencia: Positivo título > 1:1

Descripción: COXSACKIE B AC. IGG EN SUERO

Código: COXACKIB1G

Técnica: Enzimoinmunoanálisis

Unidades: Índice

Descripción: COXSACKIE B AC. IGG EN SUERO
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
 Alt. Plasma
Valores de referencia: (Inf. 0.9) Negativo
 (0.9 - 1.1) Indeterminado

Descripción: COXSACKIE B AC. IGM EN SUERO
Código: COXACKIB1M
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: Título
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1ml Suero
 Alt. Plasma
Valores de referencia: Título <1/10 Negativo

Descripción: Craneosinostosis: <10 genes (NGS)
Código: CRANEOSINO
Técnica: NGS con TSO Illumina y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
 Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: CREATIN KINASA
Código: CK
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: U/L a 37 °C
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL de suero
Valores de referencia: (Inf. 190) Hombre
 (Inf. 167) Mujer

Descripción: Creatina en suero
Código: CREATINAS
Técnica: Espectrometría
Unidades: mg/dL
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
 Volumen mínimo: 0.5 mL
Valores de referencia: (0.20 - 1.00) Hombre
 (0.20 - 1.20) Mujer

Descripción: CREATINA ORINA
Código: CREATINA

Descripción: CREATINA ORINA
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: mg/24 h
Plazo: 8 días
Tubo: ORINAS ENVIOS EXTERNOS
Comentario adicional: alicuota de orina de 24 horas. Refrigerar.
Valores de referencia: (Inf. 250)

Descripción: CREATININA
Código: CREA
Técnica: Técnica enzimática colorimétrica
Unidades: mg/dL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL suero o plasma Heparina, EDTA
Valores de referencia: (0.55 - 1.02) Mujer > 15 años
 (0.72 - 1.18) Hombre > 15 años
 (0.26 - 1.01) < 2 meses
 (0.15 - 0.37) 2 meses - 3 años
 (0.24 - 0.73) 3 años - 15 años

Descripción: CREATININA ORINA
Código: CREA2
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: g/24h
Plazo: 3 días
Tubo: Orina 24 Horas
Comentario adicional:
Valores de referencia: (1.2 - 2.5) Hombre
 (0.8 - 1.4) Mujer

Código: CKISOEN
Descripción: CREATINQUINASA ISOENZIMAS -MACROCREATINQUINASA
Técnica: Electroforesis en gel de agarosa
Comentario adicional: 1 mL suero.
 Plazo: 12 días

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	FRACCKBB	14680-3		ISOENZIMAS CK (CK-MB, CK-MM, CKBB) Electroforesis		

Descripción: Creutzfeldt-Jakob, enf. Gen: PRNP.Polimorfismo 129 (M129V)
Código: GEN_000325
Técnica:
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Descripción: Creutzfeldt-Jakob, enf. Gen: PRNP.Polimorfismo 129 (M129V)

Valores de referencia:

Descripción: Crigler Najjar 1, Sd.Gen: UGT1A1. Detección de inserción TA

Código: GEN_000140

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Crigler Najjar tipo 1, Sd. Sec Gen: UGT1A1

Código: GEN_000141

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: CRIOAGLUTININAS SUERO

Código: CRIOAGLU

Técnica: Aglutinación

Unidades:

Plazo: 5 días

Tubo: Tubo Especial

Comentario adicional: Suero extraído en tubo seco (tapón marrón, SIN gelosa. Los geles pueden interferir al quedar partículas de gel adsorbidas a la superficie del hematíe) Y tubo de EDTA. TUBOS EXCLUSIVOS PARA ESTAS DETERMINACIONES. OJO!! SOLO SE COGEN MUESTRAS DE LUNES A JUEVES (deben llegar a Valderribas antes de las 19:00h).

Valores de referencia: Valores significativos a partir de 1/32

Descripción: CRIOFIBRIONOGENO EN PLASMA

Código: CRIOFIBRI

Técnica: Precipitación a 4°C redisolución a 37°C, electroforesis

Unidades:

Plazo: 9 días

Tubo: Coagulación - Plasma Citrato

Comentario adicional: 2 mL Plasma Citrato sódico. NO CONGELAR

Valores de referencia:

Descripción: CRIOGLOBULINAS

Código: CRIOGLO

Técnica: Precipitación

Unidades:

Plazo: 5 días

Tubo: Tubo Especial

Descripción:	CRIOGLOBULINAS
Comentario adicional:	1 mL de suero extraído en tubo seco (tapón marrón, SIN gelosa). TUBO EXCLUSIVO PARA ESTA DETERMINACIÓN. OJO!! SOLO SE COGEN MUESTRAS DE LUNES A JUEVES (deben llegar a Valderribas antes de las 19:00h). Las crioglobulinas son inmunoglobulinas que precipitan a bajas temperaturas, por ello la muestra se debe obtener y mantener en todo momento hasta la obtención del suero a 37 ° C. Para ello la jeringa y el tubo en que se va a extraer la muestra se debe mantener en estufa 30 minutos antes de la extracción. Para poder tener siempre disponible material a 37° C, en la estufa de hematología se mantienen siempre tubos de bioquímica (descender, se transportan en el mismo recipiente en el que se encuentran en la estufa: termos llenos de arena en el que se "hundirán" los tubos y del que sólo se sacan en el momento de la extracción, volviéndolo a colocar en la arena para su transporte ha extracción la muestra se transporta a 37 ° C en la arena del termo y se deja coagular a 37 ° C en baño maría o en estufa. Cuando ya se ha producido la coagulación, se centrifuga el tubo y se obtiene el suero. Si el proceso se ha mantenido en todo momento a 37° C las crioglobulinas presentes en el suero se podrán recuperar por precipitación en frío.
Valores de referencia:	Valor de referencia orientativo: Negativo

Descripción:	Crisponi. Panel
Código:	GEN_000142
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Crohn, enfermedad de. Panel
Código:	GEN_000327
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	CROMO ORINA
Código:	CR2
Técnica:	ICP-MS
Unidades:	µg/L
Plazo:	6 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	Al menos 5 mL orina al final de la semana laboral. No recoger muestras de orina en un ambiente en el que sea más probable que ocurra la exposición. Es importante evitar que el polvo de la ropa pueda interferir en el contenido de la muestra. No recoger la orina en recipientes con base de metal, como urinarios o sartenes de metal. Recoger la orina en tubos de polipropileno incoloro libre de metales sin tapones de colores. Cuando esto no sea posible, usar para la recogida de orina un envase

Valores de referencia:	(Inf. 7.5) al final de la semana laboral (exposición a CROMO VI) VLB-INSHT 2024. (Inf. 0.8) Límite de cuantificación
------------------------	---

Descripción:	CROMO SUERO
Código:	CR
Técnica:	ICP-MS
Unidades:	µg/L
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal

Descripción:	CROMO SUERO
Comentario adicional:	1 mL suero. Al muestra óptima es suero en tubo libre de elementos traza. De forma alternativa se acepta suero.
Valores de referencia:	(Inf. 2) .Personas no expuestas. (Inf. 5) .No existe desgaste en prótesis de cadera (SECCA). (Inf. 0.8) Límite de cuantificación
Descripción:	CROMOGRANINA A SUERO
Código:	CROMOGRANI
Técnica:	EIA
Unidades:	mcg/L
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL de suero. Ayunas.
Valores de referencia:	(Inf. 100)
Descripción:	Crouzon, Sd. Sec Gen: FGFR2
Código:	GEN_000143
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	
Descripción:	CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS AG. EN LCR
Código:	CRYPTOLCR
Técnica:	Inmunocromatografía
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 mL
Valores de referencia:	
Descripción:	CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS ANTIGENO SUERO
Código:	CRYPTOAG
Técnica:	Inmunocromatografía
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero refrigerado
Valores de referencia:	Negativo
Descripción:	CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS MUESTRA PCR
Código:	CRYPTOCPCR
Técnica:	HIBRIDACIÓN MOLECULAR CON AMPLIFICACIÓN (PCR)
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	Muestra envíos externos
Comentario adicional:	2 mL Sangre Total EDTA, LCR, Humor vitreo/acuoso. REFRIGERAR.

Descripción: CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS MUESTRA PCR

Valores de referencia:

Descripción: CRYPTOSPORIDIUM MUESTRA PCR

Código: CRYPTOSPCR

Técnica: Hibridación molecular (PCR)

Unidades:

Plazo: 17 días

Tubo: Muestra envíos externos

Comentario adicional: 10 g heces, Biopsia mucosa intestinal. La muestra recomendada es de HECES, por tener este microorganismo su replicación en la mucosa intestinal de intestino delgado. (BAL)Para otras muestras, se necesita justificación del clínico.

Valores de referencia:

Descripción: Cuantificación ADN de bloque tumoral parafinado

Código: CUANTIFADN

Técnica:

Unidades:

Plazo:

Tubo: Muestra envíos externos

Comentario adicional:

Valores de referencia:

Descripción: CUERPOS REDUCTORES EN HECES

Código: REDUCTORES

Técnica: Colorimetría

Unidades:

Plazo: 4 días

Tubo: heces especiales

Comentario adicional: 1 g heces . CONGELADA

Valores de referencia:

Descripción: Culler-Jones, Sd. Sec Gen: GLI2

Código: GEN_000144

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Código: UROCULANTI

Descripción: CULTIVO DE ORINA, IDENTIFICACION Y ANTIBIOGRAMA

Técnica: Cultivo de la muestra en medio cromogénico adecuado

Comentario adicional: Preferiblemente primera orina de la mañana. Recoger orina de la porción media de la micción en recipiente estéril adecuado.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Perfil	CULTIVO		ORINA	CULTIVO GENERAL en ORINA		

Descripción: CULTIVO EN MEDIO LOWENSTEIN IDENTIFICACION Y ANTIBIOGRAMA (C
Código: LOWES
Técnica: Cultivo en medio Lowenstein-Jensen específico para Micobacterias
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: Muestra Microbiología
Comentario adicional: Muestra en frasco esteril
Valores de referencia:

Código: CULTIVO
Descripción: CULTIVO GENERAL
Técnica: Cultivo en medios apropiados
Comentario adicional: Líquido, exudado o muestra biológica

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	AISLADO			Cultivo		
Prueba	OBS.MICRO			Observaciones microbiologia		

Descripción: CULTIVO PRENATAL
Código: CULTPREN
Técnica:
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: LIQUIDO CITOGENETICA
Comentario adicional: Muestra Líquido amniótico o Tejido Prenatal.
Muestra en tubo sin aditivos
Valores de referencia:

Descripción: Currarino, Sd. Sec Gen: MNX1
Código: GEN_000145
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Cutis Laxa autosómico recesiva. Panel
Código: GEN_000146
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción:	Cutis Laxa. Panel
Código:	GEN_000147
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	CYFRA 21.1 SUERO
Código:	CYFRA21.1
Técnica:	ICMA
Unidades:	ng/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero recogido en tubos estándar de muestra o en tubos que contienen gel de separación. Plasma tratado con heparina de litio o con EDTA di o tripotásico. Pueden emplearse tubos para plasma que contengan gel de separación.
Valores de referencia:	(Inf. 2.37)

Descripción:	CYFRA 21-1 EN LIQUIDO PLEURAL
Código:	CYFRA211LP
Técnica:	Inmunoanálisis
Unidades:	ng/mL
Plazo:	12 días
Tubo:	Líquido Bioquímica
Comentario adicional:	1 mL líquido pleural
Valores de referencia:	(Inf. 50) Compatible con pleuritis benignas

Descripción:	DAO: mutaciones gen DAO
Código:	DAO_GEN
Técnica:	SANGER
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato. Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente
Valores de referencia:	

Descripción:	Darier-White, enfermedad de. Sec Gen: ATP2A2
Código:	GEN_000148
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción: DARUNAVIR EN PLASMA
Código: DARUNAVIR
Técnica: LC-MS/MS
Unidades: mcg/mL
Plazo: 12 días
Tubo: Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional: 2 mL plasma (EDTA). CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO
Valores de referencia: (1.26 - 7.37) Dosis 600 mg/dos veces al día

Descripción: Def. glucosa-6-fosfato deshidr.: gen G6PD (NGS)
Código: G6PD_MUTS
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Defect coagulac por defici recep prot C. Sec Gen: PROCR
Código: GEN_000152
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Defectos coagula por deficien Factor XI. Sec Gen: F11
Código: GEN_000151
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Defectos congénitos de la glicosilación. Panel
Código: GEN_000149
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Defectos en la biogénesis de peroxisomas. Panel
Código: GEN_000150
Técnica:
Unidades:

Descripción: Defectos en la biogénesis de peroxisomas. Panel
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Defectos en la fosforilación oxidativa. Panel
Código: GEN_000153
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Defectos en la oxidación de los ácidos grasos. Panel
Código: GEN_000154
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Deficiencia del transportador de MCT8: gen SLC16A2 (NGS)
Código: SLC16A2
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.
Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Deficiencia en 21-hidroxilasa: secuenciación gen CYP21A2
Código: CYP21
Técnica: PCR, y secuenciación
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente
Valores de referencia:

Descripción: Deficiencia en 5-alfa-reductasa: gen SRD5A2 (NGS)
Código: ALFA_REDUC
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días

Descripción: Deficiencia en 5-alfa-reductasa: gen SRD5A2 (NGS)
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Deficiencia en mioadelinato desaminasa: gen AMPD1 (NGS)
Código: AMPD1
Técnica: NGS Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Deficiencia en TPMT: gen TPMT (NGS)
Código: TPMT_MUTS
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Deficiencia transp. glucosa 1 (GLUT1): gen SLC2A1 (NGS)
Código: SLC2A1
Técnica: NGS con TSOE de Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Déficit 3-hidroxiacil-CoA deshidrogena. Sec Gen: HADH
Código: GEN_000161
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Déficit 3hidroxiacilCoA deshidrogenasa cad larga Gen HADHA
Código: GEN_000160
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Déficit 3hidroxiacilCoA deshidrogenasa cad larga Gen HADHA

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Déficit 3-metilcrotonil-CoA carboxi 1. Sec Gen: MCCC1

Código: GEN_000162

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Déficit 3-metilcrotonil-CoA carboxil2. Sec Gen: MCCC2

Código: GEN_000163

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Déficit Acil-CoA deshidr cadena media. Sec Gen: ACADM

Código: GEN_000165

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Déficit Acil-CoA deshidrog cad larga. Sec Gen: ACADVL

Código: GEN_000167

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Déficit Acil-CoA deshidroge cad corta. Sec Gen: ACADS

Código: GEN_000166

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Déficit acil-CoA oxidasa peroxisomal. Sec Gen: ACOX1
Código: GEN_000168
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit adenina fosforribosiltransfer. Sec Gen: APRT
Código: GEN_000169
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit arginina:glycina amidinotransf. Sec Gen: GATM
Código: GEN_000173
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit carnitina palmitoiltransfer 1. Sec Gen: CPT1A
Código: GEN_000178
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit carnitina palmitoiltransfer 2. Sec Gen: CPT2
Código: GEN_000179
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit carnitina-acilcarnitina. Sec Gen SLC25A20
Código: GEN_000180
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días

Descripción: Déficit carnitina-acilcarnitina. Sec Gen SLC25A20
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit combinado de hormona pituitaria. Panel
Código: GEN_000158
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de 3-metilcrotonil-CoA carboxilasa. Panel
Código: GEN_000164
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de adenosina deaminasa. Sec Gen: ADA
Código: GEN_000170
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de arginasa. Sec Gen: ARG1
Código: GEN_000172
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de ATP sintasa, nuclear 1. Sec Gen: ATPAF2
Código: GEN_000188
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de beta-cetotiolasa. Sec Gen: ACAT1
Código: GEN_000174
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de biotinidasa. Sec Gen: BTD
Código: GEN_000175
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de butiril-colinesterasa. Sec Gen: BCHE
Código: GEN_000176
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de carnitina-palmitoiltransferasa. Panel
Código: GEN_000177
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de citocromo C oxidasa. Sec Gen: SCO2
Código: GEN_000181
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de coenzima Q10. Sec Gen: APTX
Código: GEN_000183
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días

Descripción: Déficit de coenzima Q10. Sec Gen: APTX
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de fumarasa. Sec Gen: FH
Código: GEN_000184
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de glipoproteína VI. Sec Gen: GP6
Código: GEN_000156
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de glutamina sintetasa. Sec Gen: GLUL
Código: GEN_000185
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de hormona de crecimiento. Sec Gen: GH1
Código: GEN_000189
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de hormona hipofisaria. Sec Gen: PROP1
Código: GEN_000187
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de malonil-CoA. Sec Gen: MLYCD
Código: GEN_000190
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de N-acetil glutamato sintasa. Sec Gen: NAGS
Código: GEN_000191
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de ornitina aminotransferasa. Sec Gen: OAT
Código: GEN_000192
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de ornitina transcarbamilasa. Sec Gen: OTC
Código: GEN_000193
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de pir.deshidrogenasa fosfatas. Sec Gen: PDP1
Código: GEN_000196
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de piruvato carboxilasa. Sec Gen: PC
Código: GEN_000194
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días

Descripción: Déficit de piruvato carboxilasa. Sec Gen: PC
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de piruvato descarboxilasa. Sec Gen: PDHA1
Código: GEN_000195
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de piruvato quinasa. Sec Gen: PKLR
Código: GEN_000197
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de plasminógeno tipo 1. Sec Gen: PLG
Código: GEN_000198
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de proteína D-bifuncional. Sec Gen: HSD17B4
Código: GEN_000199
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de purina nucleósido fosforilasa. Sec Gen: PNP
Código: GEN_000209
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de sacarasa isomaltasa: gen IS (NGS)
Código: SACAR_ISOM
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Déficit de succinato-CoQ reductasa. Sec Gen: SDHA
Código: GEN_000202
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de tetrahydrobiopterina. Panel
Código: GEN_000204
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit del complejo II mitocondrial. Sec Gen: SDHAF1
Código: GEN_000210
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit en alfa-1-antitripsina. Sec Gen: SERPINA1.
Código: GEN_000036
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit en colesterol7alfahidroxilas. Sec Gen: CYP7A1
Código: GEN_000212
Técnica:
Unidades:

Descripción: Déficit en colesterol7alfahidroxilas. Sec Gen: CYP7A1
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit en tirosin hidroxilasa. Sec Gen: TH
Código: GEN_000207
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit familiar de lipoproteinlipasa. Sec Gen: LPL
Código: GEN_000213
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit guanidino-acetato metiltransfe. Sec Gen: GAMT
Código: GEN_000186
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit inhibidor activador plasminógeno. SERPINE1. 4G/5G
Código: GEN_000159
Técnica:
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit intelectual lig X. Hipoplasia cerebelosa. Gen OPHN1
Código: GEN_000214
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit intelectual ligado al cr X Hedera. Sec Gen: ATP6AP2
Código: GEN_000215
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit intelectual. Panel
Código: GEN_000216
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit múltiple de carboxilasa. Sec Gen: HLCS
Código: GEN_000217
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit múltiple de sulfatasa. Sec Gen: SUMF1
Código: GEN_000218
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit primario de carnitina. Sec Gen: SLC22A5
Código: GEN_000219
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit primario de coenzima Q10. Panel
Código: GEN_000220
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días

Descripción: Déficit primario de coenzima Q10. Panel
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit prot. E3binding pir. deshidrogen. Sec Gen: PDHX
Código: GEN_000201
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit succíninil-semialdehido-deshidrogen. Gen ALDH5A1
Código: GEN_000203
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit zinc neonatal transitoria. Sec Gen: SLC30A2
Código: GEN_000157
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficits combinados de la fosforilación oxidativa. Panel
Código: GEN_000221
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Deg. macular asociada a la edad: 6 polim. (sec. Sanger)
Código: DMAE_SNP
Técnica: SNPs
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente
Valores de referencia:

Descripción:	Degeneración de la retina. Panel
Código:	GEN_000222
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Degeneración macular asociada a la edad. Panel
Código:	GEN_000223
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Degeneración macular asociada a la edad: >10 genes (NGS)
Código:	DMAE
Técnica:	NGS Illumina
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Degeneración macular. Panel
Código:	GEN_000224
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	DEHIDROEPIANDROSTERONA -S EN SALIVA
Código:	DEHASSALI
Técnica:	Téc. EIA (Enzimoinmunoanálisis)
Unidades:	ng/mL
Plazo:	23 días
Tubo:	Tubo Especial
Comentario adicional:	1 ml de saliva. Toma de muestra a las 8 mañana.
Valores de referencia:	(0.2 - 2.5) Mujer (0.2 - 2.7) Hombre

Descripción:	DEHIDROEPIANDROSTERONA, SUERO
Código:	DEHA
Técnica:	Técnica EIA

Descripción:	DEHIDROEPIANDROSTERONA, SUERO
Unidades:	ng/mL
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1mL de suero. Alternativa PLasma EDTA/. Refrigerado
Valores de referencia:	(1.87 - 15.01) Hombre > 14 años (1.65 - 13.50) Mujer > 14 años (0.13 - 1.87) Hombre 6 años - 9 años (0.31 - 2.05) Hombre 9 años - 11 años (0.83 - 2.58) Hombre 11 años - 14 años (0.18 - 1.89) Mujer 6 años - 9 años (1.12 - 2.24) Mujer 9 años - 11 años (0.98 - 3.60) Mujer 11 años - 14 años

Descripción:	DEHIDROEPIANDROSTERONA-S
Código:	DEHAS
Técnica:	Téc. ICMA
Unidades:	µg/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(0.086 - 1.70) Mujer 11 años - 15 años (0.61 - 4.94) Mujer 15 años - 20 años (1.34 - 4.07) Mujer 20 años - 25 años (0.96 - 5.11) Mujer 25 años - 35 años (0.75 - 4.10) Mujer 35 años - 45 años (0.56 - 2.83) Mujer 45 años - 55 años (0.29 - 1.82) Mujer 55 años - 65 años (0.34 - 0.79) Mujer 65 años - 70 años (0.166 - 2.43) Hombre 11 años - 15 años (0.45 - 3.85) Hombre 15 años - 20 años (2.38 - 5.39) Hombre 20 años - 25 años (1.68 - 5.92) Hombre 25 años - 35 años (1.39 - 4.84) Hombre 35 años - 45 años (1.36 - 4.48) Hombre 45 años - 55 años (0.49 - 3.62) Hombre 55 años - 65 años (2.29 - 2.84) Hombre 65 años - 70 años

Descripción:	Delec y Dupli MLPA gen MEFV. Fiebre mediterránea familiar
Código:	FIEBRME_DE
Técnica:	MLPA
Unidades:	
Plazo:	20 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina y Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	Delecio y dupli MLPA: gen CFTR, Fibrosis Quisítica y ACBVD
Código:	CFTR_MLPA
Técnica:	RCP-MLPA
Unidades:	
Plazo:	20 días

Descripción: Delección y duplicación MLPA: gen CFTR, Fibrosis Quística y ACBVD

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina y Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Delecciones subteloméricas y síndrome de microdelección por MLPA

Código: MLPA_RMENT

Técnica: MLPA

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina y Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Delecciones y duplicación 21-hidroxilasa, MLPA gen CYP21A2

Código: CYP21_MLPA

Técnica: PCR-MLPA

Unidades:

Plazo: 20 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina y Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Delecciones y duplicación MLPA gen GJB2, Cx 26. Hipoacusia hereditaria

Código: GJB2_MLPA

Técnica: MLPA

Unidades:

Plazo: 20 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina y Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Delecciones y Duplicación MLPA gen TSC1. Esclerosis Tuberosa 1

Código: TSC1_MLPA

Técnica: MLPA

Unidades:

Plazo: 20 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina y Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Delecciones y Duplicación MLPA gen TSC2. Esclerosis Tuberosa 2

Código: TSC2_MLPA

Técnica: MLPA

Unidades:

Plazo: 20 días

Descripción: Deleciones y Duplicac MLPA gen TSC2.Esclerosis Tuberosa 2
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina y Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Deleciones y Duplicaciones MLPA gen NF1. Neurofibromatosis 1
Código: NF1_MLPA
Técnica: MLPA
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina y Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Deleciones y Duplicaciones MLPA gen USHA2. Síndrome Usher 2
Código: USHER2_MLP
Técnica: MLPA
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina y Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Deleciones y Duplicaciones MLPA: Diabetes MODY tipos 1al 10
Código: MODY_MLPA
Técnica: MLPA
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina y Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Demencia de Pick: genes PSEN1 y MAPT (NGS)
Código: DEMEN_PICK
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación

Valores de referencia:

Descripción: Demencia frontotemporal. Panel
Código: GEN_000225
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción:	Demencia frontotemporal. Panel
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	
Descripción:	Demencia Lewy-Boy: secuenciación genes GBA, SNCA y SNCB
Código:	LEWY_BODY
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	
Descripción:	Demencia por cuerpos de Lewy. Sec Gen: SNCA
Código:	GEN_000226
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	
Descripción:	Demencias panel genes
Código:	PHARMALAP9
Técnica:	NGS
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo EDTA exclusivo para esta determinación y rotulado con BM. Alternativas: Citrato. Imprescindible enviar la historia clínica y formulario de petición de genética o consentimiento informado
Valores de referencia:	
Descripción:	Demencias. Panel
Código:	GEN_000227
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	
Descripción:	DENGUE AC. IGG
Código:	DENGUEAC
Técnica:	CLIA
Unidades:	Índice
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero

Descripción: DENGUE AC. IGG
Valores de referencia: (Inf. 0.9) Negativo
 (0.9 - 1.1) Indeterminado
 (Sup. 1.1) Positivo

Descripción: DENGUE AC. IGM
Código: DENGUEACM
Técnica: CLIA
Unidades: Índice
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero
Valores de referencia: (Inf. 0.9) Negativo
 (0.9 - 1.1) Indeterminado
 (Sup. 1.1) Positivo

Descripción: DENGUE VIRUS (SEROTIPOS 1-4 FLAVIVIRUS)PCR
Código: DENGUEPCR
Técnica: RT-PCR
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL Plasma EDTA, Suero, Orina, Saliva. Refrigerada
Valores de referencia:

Descripción: Dent, enfermedad de. Panel
Código: GEN_000228
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Denys-Drash, Sd. Sec Gen: WT1
Código: GEN_000229
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Código: DEPORTPLUS
Descripción: Deporte +Nutrigenetica+ Suplementos y vitaminas
Técnica:
Comentario adicional: Muestra EDTA rotulada con BM y hoja de petición especial (wellness)

Componentes							
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.	
Prueba	DEPORGEN			T. genetico predisposicion rendimiento deportivo			

Componentes					
Prueba	NUTRIGEN			T. genetico nutricion y metabolismo	
Prueba	SUPLEMEN			Estudio genético para suplementos alimenticios y vitaminas	

Código: BIENESTAR
Descripción: Deporte+Nutrigenetica+Intolerancias +Suplementos y vitaminas
Técnica:
Comentario adicional: Muestra EDTA rotulada con BM y hoja de petición especial (wellness)

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	DEPORGEN			T. genetico predisposicion rendimiento deportivo		
Prueba	NUTRIGEN			T. genetico nutricion y metabolismo		
Prueba	INTALIGEN			Test genético intolerancia gluten, lactosa y fructosa		
Prueba	SUPLEMEN			Estudio genético para suplementos alimenticios y vitaminas		

Descripción: DESALQUILFLURAZEPAM EN SUERO
Código: DESFLURAZE
Técnica: Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectrometría de masas
Unidades: µg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL Suero. Refrigerado.
 Alternativamente 1 mL plasma EDTA TRIPOTÁSICO.
Valores de referencia: (10 - 150) Rango Terapéutico

Descripción: DESMOGLEINA-1 (Dsg-1) AC. SUERO
Código: DESMOGL1
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: Ratio
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: (Inf. 1.00) Negativo

Descripción: DESMOGLEINA-3 (Dsg-3) AC. SUERO
Código: DESMOGL3
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: Ratio
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: (Inf. 1.00) Negativo

Descripción: Desoxicorticosterona a los 30 minutos
Código: DESOXI30
Técnica: Radioinmunoanálisis

Descripción: Desoxicorticosterona a los 30 minutos
Unidades: ng/dL
Plazo: 32 días
Tubo: Suero 30 minutos
Comentario adicional: 2 mL suero.Alternativa plasma de heparina.
 CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO

Valores de referencia:

Descripción: Desoxicorticosterona a los 60 minutos
Código: DESOXI60
Técnica:
Unidades: ng/dL
Plazo: 32 días
Tubo: Suero 60 Minutos
Comentario adicional: 2 mL suero.Alternativa plasma de Heparina
 CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO

Valores de referencia:

Descripción: DESOXCORTICOSTERONA EN SUERO
Código: DESOXICOR
Técnica: LC-MS/MS
Unidades: ng/dL
Plazo: 32 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 2 ml de suero. Alternativa plasma de heparina.
 INDISPENSABLE INFORMAR EDAD.
 CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO

Valores de referencia: (Inf. 105) < 1 día
 (7 - 49) 1 mes - 1 año
 (2 - 34) 2 años - 10 años
 (2 - 15) > 15 años
 (Inf. 90) Después de ACTH

Descripción: DETECCION DE CANDIDA ALBICANS EN MUESTRA POR PCR
Código: CANDIDAPCR
Técnica: RT-PCR
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional: Enviar los escobillones secos, sin medio.
 secreción vaginalRefrigeración
 citologia liquidaRefrigeración
 orinaRefrigeración
 salivaRefrigeración
 exudado heridaRefrigeración
 liquido biologico-recipiente esterilRefrigeración
 medula osea- tubo sangre edtaRefrigeración
 BALRefrigeración
 BASRefrigeración

Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío.
 Enviar los escobillones secos, sin medio. Estabilidad de la muestra

Descripción: DETECCION DE CANDIDA ALBICANS EN MUESTRA POR PCR

Valores de referencia: Valor de referencia: No se detecta

Descripción: Detección de la expansión (CTG/CAG) del gen ATXN8OS

Código: SCA8_EXPA

Técnica: PCR, TP-PCR, y análisis de fragmentos

Unidades:

Plazo: 20 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Detección de la expansión (CAG) del gen ATXN7

Código: SCA7_EXPA

Técnica: PCR, TP-PCR, y análisis de fragmentos

Unidades:

Plazo: 20 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Detección de la expansión (CAG) del gen CACNA1A

Código: SCA6_EXPA

Técnica: PCR, TP-PCR, y análisis de fragmentos

Unidades:

Plazo: 20 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Detección de la expansión (CAG) del gen ATXN1

Código: SCA1_EXPA

Técnica: PCR, TP-PCR, y análisis de fragmentos

Unidades:

Plazo: 20 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Detección de la expansión GGCCTG del gen NOP56

Código: SCA36_EXPA

Técnica: PCR, TP-PCR, y análisis de fragmentos

Unidades:

Plazo: 20 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato

Descripción: Detección de la expansión GGCCTG del gen NOP56

Valores de referencia:

Descripción: Detección de la expansión (CAG) del gen TBP

Código: SCA17_EXPA

Técnica: PCR, TP-PCR, y análisis de fragmentos

Unidades:

Plazo: 20 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Detección de mutaciones específicas LONG PCR (Pseudogenes)

Código: LONG_PCR

Técnica: LONG PCR

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Detección del gen de fusión KMT2A/AFF1 (MLL-AF4)

Código: KMT2A_AFF1

Técnica:

Unidades:

Plazo: 10 días

Tubo: TUBO ONCOGENETICA

Comentario adicional: 3 tubos de EDTA exclusivos para esta determinación: tubo sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con onco.

IMPORTANTE: MUESTRA REFRIGERADA

Muestra: sangre periférica o médula ósea

NO PINCHAR VIERNES NI VISPERAS DE FESTIVOS: la sangre se empieza a procesar dentro de las primeras 48 horas desde la extracción

Valores de referencia:

Descripción: Detección del virus de la viruela del mono

Código: MONO_VIRU

Técnica:

Unidades:

Plazo: 5 días

Tubo: Muestra Biología Molecular

Comentario adicional: Exudado (Escobillón con medio de transporte de virus)
Exudado (Escobillón seco)-REFRIGERAR

Muestra recomendada:

Exudado de lesión cutánea (vesículas, pústulas). Contactar con el laboratorio antes de solicitar el estudio.REFRIGERAR

Valores de referencia:

Descripción: Detección del virus del molluscum contagiosum

Código: MOLLU_CONT

Descripción: Detección del virus del molluscum contagiosum

Técnica:

Unidades:

Plazo: 7 días

Tubo: Muestra Biología Molecular

Comentario adicional: Lesión de piel o exudado de herida en escobillón seco
4°C: 48 Horas; -20°C: 3 Meses

Valores de referencia:

Descripción: Detección expansión (GAA)n del gen FGF14 (SCA27B) + TP-PCR

Código: SCA27_EXPA

Técnica: PCR, TP-PCR, y análisis de fragmentos

Unidades:

Plazo: 20 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas:Citrato.
Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.

Valores de referencia:

Descripción: Detección expansión (GAA)n del gen FGF14 (SCA27B) + TP-PCR

Código: SCA27_EXPA

Técnica: PCR, TP-PCR, y análisis de fragmentos

Unidades:

Plazo: 20 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas:Citrato.
Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.

Valores de referencia:

Descripción: Detección expansión (GAA)n del gen FGF14 (SCA27B) + TP-PCR

Código: SCA27_EXPA

Técnica: PCR, TP-PCR, y análisis de fragmentos

Unidades:

Plazo: 20 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas:Citrato.
Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.

Valores de referencia:

Descripción: Determinación presencia/ausencia del gen SRY (PCR)

Código: SEXO_GEN

Técnica: RT-PCR

Unidades:

Plazo: 5 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: 2 tubos de 10mL sangre EDTA

Valores de referencia:

Descripción: Determinación temprana del sexo fetal en sangre materna
Código: SEXOFETAL
Técnica: PCR digital
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: STRECK BIOPSIA LIQUIDA
Comentario adicional: 2 Tubos Streck cfDNA.Solicitar tubos al almacen.ENVIAR A TEMPERATURA AMBIENTE Y PROTEGIDO CON PAPEL DE BURBUJA junto con hoja de solicitud/CI
Valores de referencia: Se realiza a partir de la semana 10 de gestación

Descripción: DEXAMETASONA SUERO
Código: DEXAMETA
Técnica: Cromatografía Líquida de Alta Resolución
Unidades: ng/mL
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 2 mL suero
Valores de referencia: (Sup. 1.0) 8 a.m tras 1 mg Dexametasona noche anterior
(Sup. 8.0) 8 a.m tras 8 mg Dexametasona (4x2 mg) día anterior

Descripción: Diabetes insípida nefrogénica ligada X. Sec Gen: AVPR2
Código: GEN_000232
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Diabetes insípida nefrogénica. Panel
Código: GEN_000233
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Diabetes insípida. Sec Gen: AVP
Código: GEN_000231
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Diabetes Mellitus neonatal permanente (PNDM). Panel
Código: GEN_000234
Técnica:

Descripción:	Diabetes Mellitus neonatal permanente (PNDM). Panel
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Diabetes Mellitus neonatal transitoria (TNDM). Panel
Código:	GEN_000235
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Diabetes MODY. Panel
Código:	GEN_000236
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Diabetes MODY1 a 6: >10 genes (NGS)
Código:	MODY_1_6
Técnica:	PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	Diabetes MODY1: gen HNF4A (NGS)
Código:	MODY1_GEN
Técnica:	PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	Diabetes MODY2: gen GCK (NGS)
Código:	MODY2_GEN
Técnica:	PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:	
Plazo:	30 días

Descripción: Diabetes MODY2: gen GCK (NGS)
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Diabetes MODY3: gen HNF1A (NGS)
Código: MODY3_GEN
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Diabetes MODY4: gen PDX1 (NGS)
Código: MODY4_GEN
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Diabetes MODY5: TCF2 (NGS)
Código: MODY5_GEN
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Diabetes MODY6: gen NEUROD1 (NGS)
Código: MODY6_GEN
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 21 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: DIAMINOOXIDASA (DAO) CONCENTRACION
Código: DIAMINOOX
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: U/mL
Plazo: 7 días

Descripción: DIAMINOOXIDASA (DAO) CONCENTRACION
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml suero
Valores de referencia: (Inf. 3) Alta incidencia de intolerancia a la histamina
 (3 - 10) Probable intolerancia a la histamina
 (Sup. 10) Baja incidencia de intolerancia a la histamina

Descripción: Diaminooxidasa actividad
Código: DAO2.EXT
Técnica: Radioinmunoensayo
Unidades: U/mL
Plazo: 15 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 ml de suero congelado, separar rápidamente y congelar a -20°C
 En casos puntuales, podrá también enviarse plasma EDTA congelado.
Valores de referencia: (3.74 - 12.54) Moderada capacidad de degradacion de histamina (40-80 HDU)
 (Sup. 12.54) Alta capacidad de degradación de histamina (>80 HDU)

Descripción: Diarrea congénita por cloreto. Sec Gen: SLC26A3
Código: GEN_000237
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Código: DIAZE
Descripción: DIAZEPAM (DIAZEPAM+NORDIAZEPAM) EN SUERO
Técnica: Cromatografía líquida/Tándem masas
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	DIAZEPAM	3548-5		PERFIL DIAZEPAM (DIAZEPAM)	mcg/mL	
Prueba	NORDIAZEPA	3537-8		PERFIL DIAZEPAM (NORDIAZEPAM)	mcg/mL	
Prueba	DIAZESUMA	16757-7		PERFIL DIAZEPAM (DIAZEPAM TOTAL)	mcg/mL	(0.20 - 2.50) Valores terapéuticos indicativos

Descripción: DIBUCAINA NUMERO SUERO
Código: DIBUCA
Técnica: Cinética
Unidades: %
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero

Descripción: DIBUCAINA NUMERO SUERO
Valores de referencia: (75 - 100) Normal
 (30 - 75) Heterozigoto
 (Inf. 30) Homozigoto

Descripción: DIETA INFLAM + marcadores antioxidantes
Código: TDICOM
Técnica:
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Muestra envíos externos
Comentario adicional: 1 tubos de 3 mL de sangre total EDTA K2 (protegido de la luz, por ejemplo, envolver en papel de aluminio)
 •1 tubos de 3 mL de sangre total EDTA K2 (centrifugar, separar 1 alícuota y congelar - marcar tubo como PLEC) para TIOTOT
 •1 tubo de gelosa suero de 8,5 mL (centrifugar, separar 1 alícuota y congelarla) para CQ10
 •1 tubo de SUET (libre de metales) de 5 mL Refrigerada 3 días / Congelada 1 mes

Valores de referencia:

Descripción: DIFTERIA AC IGG
Código: DIFTERIA
Técnica: Técnica EIA
Unidades: UI/mL
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 0.01) Sin protección
 (0.01 - 0.1) Protección no efectiva. Se recomienda revacunación.
 (0.1 - 1) Protección básica
 (Sup. 1) Protección efectiva

Descripción: DIGESTION DE PRINCIPIOS INMEDIATOS (HECES)
Código: DIGES
Técnica: Microscopía óptica
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Heces Microbiología
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: DIGITOXINA SUERO
Código: DIGITOXI
Técnica: Quimioluminiscencia
Unidades: ng/mL
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL de suero refrigerado (2-8°C)
 Volumen mínimo 0.20 mL
Valores de referencia: (10 - 25)

Descripción: DIGOXINA
Código: DIGO
Técnica: Inmunoensayo
Unidades: ng/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (0.8 - 2.0) Rango Terapéutico

Descripción: DIHIDROTESTOSTERONA SUERO
Código: DIHIDROTES
Técnica: EIA
Unidades: pg/mL
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml suero refrigerado.
Valores de referencia: (143 - 842) Hombre > 18 años
 (0 - 596) Mujer 18 años - 50 años Premenopausia
 (0 - 431) Mujer 50 años - 83 años Postmenopausia
 (Inf. 85.7) Hombre 1 año - 9 años
 (11.1 - 875.6) Hombre 9 años - 14 años
 (70.3 - 1260.9) Hombre 14 años - 18 años
 (Inf. 88.9) Mujer 2 años - 9 años
 (22.5 - 280.6) Mujer 9 años - 14 años
 (62.6 - 760.3) Mujer 14 años - 18 años

Descripción: DIMERO D PLASMA
Código: DIMEROD
Técnica: INMUNOTURBIDIMETRIA
Unidades: ng/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional: 1 mL plasma
Valores de referencia: (Inf. 500)

Descripción: Dis. ectodérmica anhidrótica,inmunodef. Osteopetrosis. IKBKG
Código: GEN_000258
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Discapacidad intelectual con alfa-talasemia lig X. Gen ATRX
Código: GEN_000239
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Descripción: Discapacidad intelectual con alfa-talasemia lig X. Gen ATRX

Valores de referencia:

Descripción: Discinesia ciliar primaria. Kartagener, Sd. Panel

Código: GEN_000238

Técnica:

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Discinesia paroxística cinesiogénica fam: gen PRRT2 (NGS)

Código: PRRT2

Técnica: PCR y secuenciación

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Alternativas: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Discinesia paroxística. Panel

Código: GEN_000241

Técnica:

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Disfunción del metabolismo del surfactante pulmonar. Panel

Código: GEN_000242

Técnica:

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Disgenesia gonadal completa 46,XY. Sec Gen: SRY

Código: GEN_000243

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Disgenesia reticular. Sec Gen: AK2

Código: GEN_000245

Descripción: Disgenesia reticular. Sec Gen: AK2

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Disgenesia, respuesta ovárica estimulac FSH. Gen: FSHR

Código: GEN_000244

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Dishormonogénesis tiroidea familiar 2A. Sec Gen: TPO

Código: GEN_000246

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Dislipemias panel de genes

Código: PHARMALAP4

Técnica: NGS

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: **Tubo EDTA exclusivo para esta determinación y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.**
Imprescindible enviar la historia clínica y formulario de petición de genética o consentimiento informado

Valores de referencia:

Descripción: Disostosis acrofacial de Weyers. Panel

Código: GEN_000247

Técnica:

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Disostosis acrofacial, tipo Weyers. Sec Gen: EVC

Código: GEN_000248

Técnica:

Unidades:

Descripción: Disostosis acrofacial, tipo Weyers. Sec Gen: EVC
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Disostosis espondilocostal autosómico recesiva. Panel
Código: GEN_000249
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia acromesomélica Maroteaux. Sec Gen: NPR2
Código: GEN_000250
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia arritmogénica ventrículo derecho.: >10 genes (NGS)
Código: DAVD
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 40 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Valores de referencia: Alternativas: Heparina o Citrato.

Descripción: Displasia campomélica. Sec Gen: SOX9
Código: GEN_000251
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia cleidocraneal. Sec Gen: RUNX2
Código: GEN_000252
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Descripción: Displasia cleidocraneal. Sec Gen: RUNX2

Valores de referencia:

Descripción: Displasia cráneo -metafisaria AD. Sec Gen: SOST

Código: GEN_000254

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Displasia cráneo -metafisariaAD. Sec Gen: ANKH

Código: GEN_000253

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Displasia craneofrontonasal. Sec Gen: EFNB1

Código: GEN_000692

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Displasia de Schneckenbecken. Sec Gen: SLC35D1

Código: GEN_000255

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Displasia diastrófica. Sec Gen: SLC26A2

Código: GEN_000256

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Displasia ectoderm. anhidrótica Inmunodefi celula T. NFKBIA

Código: GEN_000257

Descripción: Displasia ectoderm. anhidrótica Inmunodefi celula T. NFKBIA
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia ectodérmica hidrótica tipo 2. Sec Gen: GJB6.
Código: GEN_000260
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia ectodérmica hidrótica2: gen GJB6 (sec. Sanger)
Código: EDA2_MUTS
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Displasia ectodérmica hipohidrótica ligada al X. Gen: EDA
Código: GEN_000261
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia ectodérmica hipohidrótica. Panel
Código: GEN_000262
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia ectodérmica. Panel
Código: GEN_000263
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días

Descripción:	Displasia ectodérmica. Panel
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	
Descripción:	Displasia epifisaria múltiple: gen COMP (NGS)
Código:	COMP
Técnica:	PCR y secuenciación
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:	
Descripción:	Displasia epifiseal múltiple. Panel
Código:	GEN_000264
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	
Descripción:	Displasia epifisaria-falángica forma de ángel. Gen: GDF5
Código:	GEN_000265
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	
Descripción:	Displasia espondiloepifisaria tardía cr. X. Gen: TRAPPC2
Código:	GEN_000266
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	
Descripción:	Displasia espondiloepimetafisaria anauxética. Gen: RMRP
Código:	GEN_000267
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción: Displasia esquelét platiespondilítica letal,Torrance. COL2A1
Código: GEN_000269
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia esquelética de Eiken. Sec Gen: PTH1R
Código: GEN_000268
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia esquelética. Sec Gen: CHST3
Código: GEN_000270
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia inmuno ósea de Schimke. Sec Gen: SMARCAL1
Código: GEN_000271
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia mandibuloacral con lipoDistr. tip A (MADA). Panel
Código: GEN_000272
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia oculodentodigital. Sec Gen: GJA1
Código: GEN_000273
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días

Descripción: Displasia oculodentodigital. Sec Gen: GJA1
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia ósea esclerosante. Sec Gen: SOST
Código: GEN_000274
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia osteoglofónica. Sec Gen: FGFR1
Código: GEN_000275
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia septo-óptica. Sec Gen: HESX1
Código: GEN_000276
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia ventricular arritmogénica aislada derecho. JUP
Código: GEN_000277
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia ventricular arritmogénica aislada derecho: TGFB3
Código: GEN_000278
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasias esqueléticas: >10 genes
Código: DISPLA_ESQ
Técnica: NGS y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Disqueratosis congénita AD tipo 1. Sec Gen: TERC
Código: GEN_000279
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Disqueratosis congénita XL - Zinsser-Cole-Engman. Gen: DKC1
Código: GEN_000280
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Disqueratosis congénita. Panel
Código: GEN_000281
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: DISTOMATOSIS AC. SUERO (FASCIOLA HEPATICA)
Código: FASCIOLAAC
Técnica: Hemaglutinación
Unidades: Titulo
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL de suero.
Volumen 1.0 mL (mínimo 0.57 mL)
Valores de referencia: > 1:320 Positivo
<1:160 Negativo
1:160 Indeterminado

Descripción:	Distonía de torsión DYT1: gen TOR1A (NGS)
Código:	DYT1_MUTS
Técnica:	PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	Distonía de torsión DYT5: gen GCH1 (NGS)
Código:	DYT5_MUTS
Técnica:	PCR, secuenciación, y MLPA
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	Distonía de torsión DYT6: gen THAP1 (NGS)
Código:	DYT6_MUTS
Técnica:	PCR y secuenciación
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	Distonía hereditaria sensible a L-dopa secundaria. GCH1
Código:	GEN_000282
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Distonía mioclónica DYT11: gen SGCE (NGS)
Código:	DYT11_MUTS
Técnica:	PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	Distonía mioclónica. Panel
Código:	GEN_000283

Descripción: Distonía mioclónica. Panel

Técnica:

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Distonía primaria mioclónica. Sec Gen: DRD2

Código: GEN_000284

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Distonía. Panel

Código: GEN_000288

Técnica:

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Distonía-parkinsonismo hipermanganesemia. Gen: SLC30A10

Código: GEN_000285

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Distonía-parkinsonismo inicio rápido. Sec Gen: ATP1A3

Código: GEN_000286

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Distonía-parkinsonismo ligado al X. Sec Gen: TAF1

Código: GEN_000287

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Distonía-parkinsonismo ligado al X. Sec Gen: TAF1
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distr. corneal congénita del estroma. Sec Gen: DCN
Código: GEN_000289
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distr. corneoretinal cristalina Bietti. Sec Gen: CYP4V2
Código: GEN_000292
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distr. coroidea areolar central tip 2. Sec Gen: PRPH2
Código: GEN_000293
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distr. facioescapulohumeral tipo 2. Sec Gen: SMCHD1
Código: GEN_000297
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distr. macular viteliforme de Best. Sec Gen: BEST1
Código: GEN_000299
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción:	Distr. muscular congénita Fukuyama. Sec Gen: FKTN
Código:	GEN_000303
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	
Descripción:	Distr. Sorsby fondo de ojo, pseudoinflamatoria. Gen: TIMP3
Código:	GEN_000740
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	
Descripción:	Distrof. muscul. Emery-Dreiffuss: genes EMD, FHL1 y LMNA (NGS)
Código:	EMERY_DREI
Técnica:	PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:	
Descripción:	Distrof. muscular Emery-Dreifuss 1 ligada al X. Gen: EMD
Código:	GEN_000307
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	
Descripción:	Distrof. muscular Emery-Dreifuss 6 ligada al X. Gen: FHL1
Código:	GEN_000308
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	
Descripción:	Distrofia corneal de Meesman: gen KRT12 (NGS)
Código:	DISTRO_COR
Técnica:	NGS Illumina
Unidades:	

Descripción: Distrofia corneal de Meesman: gen KRT12 (NGS)
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Distrofia corneal. Panel
Código: GEN_000290
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distrofia corneana, microquística. Sec Gen: TGFB1
Código: GEN_000291
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distrofia de conos y bastones. Sec Gen: AIPL1
Código: GEN_000294
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distrofia de conos y bastones: >10 genes (NGS)
Código: DIS_CONBAS
Técnica: NGS Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Distrofia de retina de Bothnia. Sec Gen: RLBP1
Código: GEN_000295
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción:	Distrofia de retina de Bothnia. Sec Gen: RLBP1
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Distrofia facio-escápulo-humeral
Código:	DISTROFFEH
Técnica:	PCR y Southern blotting
Unidades:	
Plazo:	60 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	10 mL sangre total EDTA. INDISPENSABLE enviar información clínica y antecedentes familiares. Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	Distrofia macular corneal. Sec Gen: CHST6
Código:	GEN_000298
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Distrofia macular juvenil de retina: gen ABCA4 (NGS)
Código:	STARGARDT
Técnica:	PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	Distrofia macular pseudovitell.: genes BEST1 y PRPH 2 (NGS)
Código:	DIST_VITEL
Técnica:	NGS Illumina y MLPA
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Distrofia macular y/o de retina. Sec Gen: SIX6
Código:	GEN_000300
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Distrofia macular y/o de retina. Sec Gen: SIX6

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Distrofia macular. Panel

Código: GEN_000302

Técnica:

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Distrofia macular. Sec Gen: PRPH2

Código: GEN_000301

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Distrofia miotónica 1 (Steinert): gen DMPK secuencia (CTG)n

Código: DISTROFIAM

Técnica: PCR, TP-PCR, y análisis de fragmentos

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
 Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.

Valores de referencia:

Descripción: Distrofia miotónica 2: gen CNBP secuencia (CCTG)n

Código: DISTROFI_2

Técnica: PCR, TP-PCR y análisis de fragmentos

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
 Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.

Valores de referencia:

Descripción: Distrofia musc. oculofaríngea: gen PABPN1 secuencia (GCN)

Código: PABPN1_GCN

Técnica: PCR y secuenciación

Unidades:

Plazo: 20 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Distrofia musc. oculofaríngea: gen PABPN1 secuencia (GCN)

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Alternativas: Heparina o Citrato.

Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente

Valores de referencia:

Descripción: Distrofia muscular congénita tipo 1C. Sec Gen: FKRP

Código: GEN_000305

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Distrofia muscular congénita. Sec Gen: LAMA2

Código: GEN_000304

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Distrofia muscular de cintura 1B/CMT2B1: gen LMNA (NGS)

Código: LMNA

Técnica: PCR y secuenciación

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Distrofia muscular de cinturas 2A: gen CAPN3 (NGS)

Código: CAPN3_MUTS

Técnica: PCR, secuenciación, y MLPA

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Distrofia muscular de cinturas 2B: gen DYSF (NGS)

Código: DYSF

Técnica: PCR, secuenciación y MLPA

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Distrofia muscular de cinturas 2B: gen DYSF (NGS)

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Distrofia muscular de cinturas: >10 genes (NGS)

Código: D_CINTURAS

Técnica: NGS con TSO Illumin

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Distrofia muscular de Duchenne-Becker. Sec Gen: DMD

Código: GEN_000306

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Distrofia muscular Duchenne/Becker: del. y dup. gen DMD

Código: DUCHENNE

Técnica: MLPA

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Distrofia muscular espinal tipo 1. Sec Gen: SEPN1

Código: GEN_000309

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Distrofia muscular. Panel

Código: GEN_000310

Técnica:

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Descripción: Distrofia muscular. Panel

Valores de referencia:

Descripción: Distrofia retiniana. Panel

Código: GEN_000311

Técnica:

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Distrofia torácica asfixiante tipo 2. Sec Gen: IFT80

Código: GEN_000312

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: DIURETICOS EN ORINA

Código: DIURETICOS

Técnica: Cromatografía Líquida / Tándem masas (LC-MS/MS)

Unidades:

Plazo: 9 días

Tubo: Orina pruebas referencia

Comentario adicional: 10 ml orina.Micción aislada.

Esta determinación detecta la presencia HIDROCLOROTIAZIDA, ACETETAZOLAMIDA, CLORTALIDONA, FUROSEMIDA, TRIAMTERENO, XIPAMIDA, INDAPAMIDA, TORASEMIDA, Y ESPIRONOLACTO

Valores de referencia:

Descripción: DNA ASCARIS LUMBRICOIDES

Código: DNAASCARIS

Técnica:

Unidades:

Plazo: 9 días

Tubo: Muestra envios externos

Comentario adicional: Muestra: heces, orina...muestras focalizadas al punto de infección.

Valores de referencia:

Descripción: DNA Chlamydia tracho/Neisseria gonor. muestra oral

Código: DNCNOR

Técnica: PCR-Real time

Unidades:

Plazo: 7 días

Tubo: Muestra envios externos

Comentario adicional: exudado bucal refrigerado

Valores de referencia:

Descripción: DNA Chlamydia tracho/Neisseria gonor. muestra oral

Código: DNCNOR

Descripción: DNA Chlamydia tracho/Neisseria gonor. muestra oral
Técnica: PCR-Real time
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional: exudado bucal refrigerado
Valores de referencia:

Descripción: DNA NATIVO (n-DNA) DSDNA ANTICUERPOS
Código: NDNAAC
Técnica: EIA
Unidades: UI/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 10) Negativo
 (10 - 15) Indeterminado
 Límite de cuantificación: 1.5 UI/mL

Descripción: DNA NATIVO AC. (n-DNA) EN LCR
Código: NDNAACLCR
Técnica: EIA
Unidades: U/mL
Plazo: 4 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 ml LCR
Valores de referencia: (Inf. 20)

Descripción: DNASA B anticuerpos en suero
Código: DNASABAC
Técnica: Nefelometría-turbidimetría
Unidades: UI/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml suero
Valores de referencia: (Inf. 300) < 14 años
 (Inf. 200) > 14 años

Descripción: DNP ANTICUERPOS (DESOXI-RIBONUCLEOPROTEÍNA)
Código: DNPAC
Técnica: Aglutinación de partículas
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero. Refrigerar.
Valores de referencia: Valor de referencia indicativo: Negativo

Descripción: Donnai-Barrow, Sd. Sec Gen: LRP2
Código: GEN_000313
Técnica:

Descripción: Donnai-Barrow, Sd. Sec Gen: LRP2

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: DOPAMINA AC. ANTI RECEPTOR 2 (D2R) SUERO

Código: DOPRACSUE

Técnica: INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA EN CÉLULAS TRANSFECTADAS

Unidades:

Plazo: 16 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 1 mL SUERO (alt. Plasma CONGELADO)
Volumen mínimo 0.30mL

Valores de referencia:

Descripción: DOPAMINA AC. ANTI RECEPTOR 2 (DR2) LCR

Código: DOPRACLCR

Técnica: INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA (CELL BINDING ASSAY)

Unidades:

Plazo: 46 días

Tubo: Líquidos Biológicos

Comentario adicional: 1 mL LCR.

Valores de referencia:

Descripción: Dos individuos adicionales legal: Paternidad y parentesco

Código: PATER2HIJ3

Técnica:

Unidades:

Plazo: 10 días

Tubo: Muestra Biología Molecular

Comentario adicional: Lleva KIT especial con cadena de custodia, solicitar a asesoría genética, Enviar con las muestras a Alfonso XII
Muestra: mucosa bucal con Hisopo sin medio

Esta prueba es para 2 individuos adicionales tanto para paternidad como parentesco

Valores de referencia:

Código: DOXEPINA

Descripción: DOXEPINA (doxepina + desmetildoxepina), Suero

Técnica: LC-MS/MS

Comentario adicional: 2 mL

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	SUMADOX	3582-4		(doxepina+desmetildoxepina)	ng/mL	(30 - 150) Rango terapeutico indicativo
Prueba	DOXEPIN	3579-0		Perfil Doxepina	ng/mL	
Prueba	DESDOXE	3862-0		Perfil desmetildoxepina	ng/mL	

Descripción: DPPX AC. (Dipeptidil Aminopeptidasa like Protein-6) SUERO
Código: DPPXAC
Técnica: INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL Suero.
Valores de referencia: Negativo: Título <1/10

Descripción: DPPX ANTICUERPOS LCR(determinación aislada)
Código: DPPXACLCR
Técnica:
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: LIQUIDO LCR INMUNO
Comentario adicional: 1 mL LCR
Valores de referencia:

Descripción: DPYD*2A (toxicidad a FU)
Código: DPYD_2A
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Al menos 1 ml de Médula Ósea en tubo EDTA o al menos 5 ml de Sangre Periférica en tubo EDTA. Tubo exclusivo para esta determinación (tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO).
IMPORTANTE: SIEMPRE REFRIGERADO
 Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.

Valores de referencia:

Descripción: DROGA EN SALIVA (UNA DETERMINACION)
Código: DROGASALIV
Técnica: LC-MS/MS
Unidades: ng/mL
Plazo: 10 días
Tubo: Saliva
Comentario adicional: Saliva recogida en kit ORAL-EZE. Solicitar kit en el almacén. Especificar la droga a analizar.

Valores de referencia:

Descripción: DROGAS EN SALIVA. PANEL 10 DROGAS
Código: SALIVDAO10
Técnica: LC-MS/MS
Unidades: ng/mL
Plazo: 10 días
Tubo: Saliva
Comentario adicional: Saliva recogida en kit ORAL-EZE. Solicitar kit en el almacén.

Valores de referencia:

Descripción: Duane-Radial Ray, Sd. Sec Gen: SALL4
Código: GEN_000314

Descripción: Duane-Radial Ray, Sd. Sec Gen: SALL4

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: DULOXETINA

Código: DULOXETINA

Técnica: Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectrometría de masas.

Unidades: ng/mL

Plazo: 5 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 2 mL Suero (Congelado)

Valores de referencia: (20 - 80)

Descripción: ECHINOCOCCUS AC. IGG

Código: ECHINOCIGG

Técnica: Enzimoinmunoanálisis

Unidades: Índice

Plazo: 7 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 1 mL suero
Alternativa: Plasma de citrato o heparina

Valores de referencia: (Inf. 9) Negativo
(9 - 11) Indeterminado
(Sup. 11) Positivo

Descripción: ECHINOCOCCUS GRANULOSUS AC.TOTALES SUERO (HIDATIDOSIS)

Código: HIDATIAC

Técnica: CLIA

Unidades: Índice

Plazo: 4 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional:

Valores de referencia: (Inf. 0.9) Negativo
(0.91 - 1.09) Indeterminado
(Sup. 1.1) Positivo

Descripción: ECHINOCOCCUS spp IGG INMUNOBLOT

Código: ECHINOBLLOT

Técnica:

Unidades:

Plazo: 12 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional:

Valores de referencia:

Descripción: ECHOVIRUS AC. IgG EN LCR

Código: ECHOVIIGGL

Descripción: ECHOVIRUS AC. IgG EN LCR
Técnica: Tec. EIA
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo
(Sup. 1) Positivo

Descripción: ECHOVIRUS AC. IGG EN SUERO
Código: ECHOVIIGG
Técnica: EIA
Unidades: Indice
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: suero
Valores de referencia: (Inf. 0.9) Negativo
(0.9 - 1.09) Indeterminado
(Sup. 1.09) Positivo

Descripción: ECHOVIRUS AC. IgM EN LCR
Código: ECHOVIIGML
Técnica: Tec. EIA
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo
(Sup. 1) Positivo

Descripción: ECHOVIRUS AC. IGM EN SUERO
Código: ECHOVIIGM
Técnica: EIA
Unidades: Indice
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: suero
Valores de referencia: (Inf. 0.9) Negativo
(0.9 - 1.1) Indeterminado
(Sup. 1.1) Positivo

Descripción: EDAD BIOLOGICA Y LONGEVIDAD
Código: EBLONGEVID
Técnica:
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional: Kit especial. Solicitar a almacén
Valores de referencia:

Descripción: Ehlers-Danlos clásico: genes COL1A,1 COL5A1 y COL5A2 (NGS)
Código: EHLERSD1_2
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Ehlers-Danlos hipermóvil: genes TNXB y COL3A1 (NGS)
Código: EHLERHIPER
Técnica: NGS Illumina y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Ehlers-Danlos tipo IV: gen COL5A1 (NGS)
Código: EHLERSD_5A
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Ehlers-Danlos: >10 genes (NGS)
Código: EHLERSDTOT
Técnica: NGS con TSOE Illumina y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: EHRlichia chaffeensis AC.IGG
Código: EHRCHAACG
Técnica: IFI
Unidades: Título
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Volumen mínimo 0.10 mL

Valores de referencia: Negativo < 1:64
Positivo >1:64

Descripción: EHRlichia chaffeensis AC.IGM
Código: EHRCHAACM
Técnica: IFI
Unidades: Título
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL de Suero
Volumen mínimo 0.10 mL
Valores de referencia: Negativo <1:64
Positivo > 1:64

Descripción: EJ AC. SUERO
Código: EJAC
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: Negativo

Descripción: ELASTASA ANTICUERPOS
Código: ELASTASAAC
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 23 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1mL de suero
Valores de referencia: (Inf. 0.80) Negativo
(0.80 - 1.20) Indeterminado
(Sup. 1.20) Positivo

Descripción: ELASTASA PANCREATICA HECES
Código: ELASTASAHE
Técnica: CLIA
Unidades: mcg/gheces
Plazo: 5 días
Tubo: Heces No Microbiología
Comentario adicional: HECES REFRIGERADO.
No requiere que los pacientes ingieran una dieta especial o interrumpan la terapia de reemplazo de enzimas pancreáticas.
Valores de referencia: (Sup. 200) :Normal
(100 - 200) :Insuficiencia pancreática exocrina leve a moderada
(Inf. 100) :Insuficiencia pancreática exocrina severa

Descripción: ELASTASA PLASMA EDTA
Código: ELASTASAPL
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: µg/L
Plazo: 17 días
Tubo: Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional: 1 mL de plasma de EDTA.

Descripción: ELASTASA PLASMA EDTA

Valores de referencia: (19.0 - 78.0)

Código: ELP

Descripción: ELECTROFORESIS DE PROTEINAS SU

Técnica: Electroforesis

Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	ALB_P	13980-8		ALBUMINA, PROTEINOGRAMA	%	(54.70 - 69.66)
Prueba	ALFA1	13978-2		ALFA-1-GLOBULINAS	%	(2.63 - 5.03)
Prueba	ALFA2	13981-6		ALFA-2-GLOBULINAS	%	(4.87 - 10.48)
Prueba	BETA	13982-4		BETA GLOBULINAS	%	(7.73 - 16.30)
Prueba	GAMMA	13983-2		GAMMA GLOBULINAS	%	(9.69 - 18.90)
Prueba	A_G	44429-9		COCIENTE ALBUMINA/GLOBULINA		(1.1 - 2.1)
Prueba	SUMA2			SUMA PROTEINOGRAMA		(98 - 101)
Prueba	PT	2885-2		PROTEINAS TOTALES SUERO	g/dL	(6 - 8.3)
Prueba	NOTAPROT	12851-2		NOTA PROTEINOGRAMA		
Prueba	GRAFICO			Grafico Proteinograma		
Prueba	ALB_P#			ALBUMINA PROTEINOGRAMA GRAMOS	g/dL	(3.5 - 5.1)
Prueba	ALFA1#			ALFA-1-GLOBULINAS GRAMOS	g/dL	(0.1 - 0.4)
Prueba	ALFA2#			ALFA-2-GLOBULINAS GRAMOS	g/dL	(0.51 - 0.85)
Prueba	BETA#			BETA GLOBILINAS GRAMOS	g/dL	(0.60 - 0.94)
Prueba	GAMMA#			GAMMA GLOBULINAS GRAMOS	g/dL	(0.8 - 1.35)

Código: ELPLCR

Descripción: ELECTROFORESIS EN LCR

Técnica: Electroforesis

Comentario adicional: LCR. REFRIGERAR.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	LPT			PROTEINAS TOTALES EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO	mg/dL	(15 - 45)
Prueba	LPREALB	13973-3		PREALBUMINA EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO	%	(2 - 7)
Prueba	LALB	13974-1		ALBUMINA EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO	%	(56 - 76)
Prueba	LALFA1	13972-5		ALFA 1 GLOBULINA EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO	%	(2 - 7)
Prueba	LALFA2	13975-8		ALFA 2 GLOBULINA EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO	%	(4 - 12)
Prueba	LBETA	13976-6		BETA GLOBULINA EN LIQUIDO CELAFORRAQUIDEO	%	(5.3 - 12)
Prueba	LTAU	58463-1		TAU GLOBULINA LCR (perfil electroforesis)	%	(2.7 - 6)
Prueba	LGAMMA	13977-4		GAMMA GLOBULINA EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO	%	(3 - 12)

Componentes					
Prueba	A_G_LCR			COCINETE ALBUMINA /GLOBULINA EN LCR	(0 - 4.5)

Descripción: Eliptocitosis: genes EPB41, SPTA1, SPTB y SLC4A1 (NGS)
Código: ELIPTOCITO
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.
Alternativa: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: EMA (EOSIN 5 MALEIMIDE) RELACIONADO CON ESFEROCITOSIS HEREDI
Código: EMA
Técnica: citometría de flujo
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 5 mL sangre total EDTA. 2 extensiones de sangre reciente sin teñir.IMPRESINDIBLE: Adjuntar historia clínica y día de la extracción
Valores de referencia: (Sup. 0.86) Valores del test EMA inferiores a 0.86 se asocian a esferocitosis hereditaria

Descripción: ENA (ANTIGENOS NUCLEARES EXTRAIBLES) AC. SUERO
Código: ENA
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: Negativo

Descripción: Encefalopatía atípica por glicina. Sec Gen: AMT
Código: GEN_000315
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Encefalopatía epiléptica infantil temprana. Panel NGS
Código: GEN_000316
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Descripción: Encefalopatía epiléptica infantil temprana. Panel NGS

Valores de referencia:

Descripción: Encefalopatía epiléptica infantil. Panel Ampliado NGS

Código: GEN_000317

Técnica:

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Encefalopatía epiléptica precoz infantil. Sec Gen: ARX

Código: GEN_000318

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Encefalopatía epiléptica temprana: gen CDKL5 (NGS)

Código: CDKL5

Técnica: PCR, secuenciación, y MLPA

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Encefalopatía infantil por glicina. Sec Gen: GCSH

Código: GEN_000319

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Encefalopatía neonatal grave. Sec Gen: MECP2

Código: GEN_000320

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Encefalopatía por glicina. Panel NGS

Código: GEN_000321

Descripción: Encefalopatía por glicina. Panel NGS

Técnica:

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: ENDOMISIO AC. IGA

Código: ENDOMIACA

Técnica: IFI

Unidades:

Plazo: 3 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional:

Valores de referencia: Negativo < 1/10
Positivo >1/10

Descripción: ENDOMISIO AC. IGG

Código: ENDOMIACG

Técnica: IFI

Unidades:

Plazo: 3 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional:

Valores de referencia: Negativo <1/10
Positivo >1/10

Descripción: Enf, Alzheimer 3 y 6: gen PSEN1 (NGS)

Código: ALZH_PSEN1

Técnica: NGS Illumina y MLPA

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Enf. Alzheimer 1: gen APP (NGS)

Código: ALZH_APP

Técnica: NGS Illumina y MLPA

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Enf. Alzheimer 4: gen PSEN2 (NGS)

Código: ALZH_PSEN2

Técnica: NGS Illumina y MLPA

Descripción: Enf. Alzheimer 4: gen PSEN2 (NGS)
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enf. cerebral peq. vasos hemorragia. Sec Gen: COL4A1
Código: GEN_000322
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enf. de Gilbert: gen UGT1A1 (TA)n promotor (sec. Sanger)
Código: GILBERTGEN
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente
Valores de referencia:

Descripción: Enf. de Pompe: gen GAA (NGS)
Código: GAA_MUTS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.
Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Enf. Osler-Weber-Rendu: genes ENG, ACVRL1, SMAD4, GDF2 (NGS)
Código: HHT
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Enf. Parkinson de aparición temprana (PDEO): <10 genes (NGS)
Código: PARKINS_EO
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA

Descripción: Enf. Parkinson de aparición temprana (PDEO): <10 genes (NGS)
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Enf. por cuerpos poliglucosanos adulto. Sec Gen: GBE1
Código: GEN_000339
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enferm. veno-oclusiva hepática inmunodeficiencia. Gen: SP110
Código: GEN_000341
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad celiaca: haplotipos HLADQ2 y HLADQ8
Código: HLACELIACA
Técnica: PCR e hibridación con sondas
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad de Alzheimer: <10 genes (NGS)
Código: ALZHEIMER
Técnica: NGS con TSOE y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Sec Gen: PRNP
Código: GEN_000326
Técnica:
Unidades:

Descripción:	Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Sec Gen: PRNP
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Enfermedad de Devic: gen AQP4 (NGS)
Código:	DEVIC
Técnica:	PCR y secuenciación
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	Enfermedad de Fabry, Alfa Galactosidasa A, sangre seca
Código:	GALACTSECA
Técnica:	Fluorimetrica
Unidades:	mcmol/Lxhora
Plazo:	32 días
Tubo:	Tubo Especial
Comentario adicional:	Sangre seca recogida en papel de filtro especial. Pedir instrucciones. Indispensable informe clínico y antecedentes familiares
Valores de referencia:	(4.7 - 18.8)

Descripción:	Enfermedad de Fabry: gen GLA (NGS)
Código:	FABRY
Técnica:	PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	Enfermedad de Gaucher: gen GBA (NGS)
Código:	GAUCHERDNA
Técnica:	PCR y secuenciación
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	Enfermedad de Hirschsprung. Sec Gen: RET
Código:	GEN_000329
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días

Descripción: Enfermedad de Hirschsprung. Sec Gen: RET
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad de Huntington: gen HTT secuencia (CAG)n
Código: HUNTINGTON
Técnica: PCR, TP-PCR, y análisis de fragmentos
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce. Panel
Código: GEN_000330
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad de Menkes: gen ATP7A (NGS)
Código: MENKES_MUT
Técnica: NGS y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad de multiminicore. Panel
Código: GEN_000332
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad de músculo-ojo-cerebro. Sec Gen: POMGNT1
Código: GEN_000333
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Enfermedad de músculo-ojo-cerebro. Sec Gen: POMGNT1
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad de Norrie: gen NDP (NGS)
Código: NORRIE
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad de Parkinson 1: gen SNCA (NGS)
Código: PARKINSON1
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad de Parkinson 2: gen PARK2 (NGS)
Código: PARKINSON2
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad de Parkinson 8: gen LRRK2 (NGS)
Código: PARKINSON8
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad de Parkinson AD: genes SNCA, LRRK2 y VPS35 (NGS)
Código: PARKINS_AD
Técnica: Secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Enfermedad de Parkinson AD: genes SNCA, LRRK2 y VPS35 (NGS)
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad de Parkinson AR: <10 genes (NGS)
Código: PARKINS_AR
Técnica: Secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo:
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad de Parkinson: >10 genes (NGS)
Código: PARKINSON
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad de Tay Sachs: gen HEXA (NGS)
Código: TAY_SACHS
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad de Von Hippel-Lindau: gen VHL (NGS)
Código: VHL_MUTS
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad de Wilson: gen ATP7B (NGS)
Código: WILSON
Técnica: PCR, Secuenciación, y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Enfermedad de Wilson: gen ATP7B (NGS)
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad del núcleo central. Sec Gen: RYR1
Código: GEN_000334
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad granulomatosa crónica. Panel NGS
Código: GEN_000335
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad granulomatosa crónica: gen CYBB (NGS)
Código: CYBB
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo:
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad hepática poliquística. Sec Gen: PRKCSH
Código: GEN_000336
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Panel NGS
Código: GEN_000337
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: ENFERMEDAD MEDIBLE RESIDUAL (EMR) LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA
Código: EMR_LLA
Técnica: Citometría de flujo
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: 1 tubo de EDTA de 5ml
Valores de referencia:

Descripción: ENFERMEDAD MEDIBLE RESIDUAL (EMR) LINFOMA
Código: EMR_LNH
Técnica: Citometría de flujo
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: 1 tubo de EDTA de 5ml
Valores de referencia:

Descripción: ENFERMEDAD MEDIBLE RESIDUAL (EMR) MIELOMA MÚLTIPLE
Código: EMR_MM
Técnica: Citometría de flujo
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: 1 tubo de EDTA de 5ml
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad medular quística renal: genes UMOD y MUC1 (NGS)
Código: UROMO_MUTS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Biología Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad renal poliquística AD. Sec Gen: PKD1
Código: GEN_000340
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Biología Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad renal quística medular 2AD. Sec Gen: UMOD
Código: GEN_000568
Técnica:
Unidades:

Descripción: Enfermedad renal quística medular 2AD. Sec Gen: UMOD
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad von Willebrand: gen VWF (NGS)
Código: WILLEB_SEC
Técnica: NGS y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedades autoinflamatorias. Panel
Código: GEN_000342
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedades lisosomales. Panel NGS
Código: GEN_000343
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedades mitocondriales. Panel NGS
Código: GEN_000344
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedades musculares panel de genes
Código: PHARMALAP6
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción:	Enfermedades musculares panel de genes
Comentario adicional:	Tubo EDTA exclusivo para esta determinación y rotulado con BM. Alternativas: Citrato. Imprescindible enviar la historia clínica y formulario de petición de genética o consentimiento informado
Valores de referencia:	
Descripción:	Enfermedades priónicas: gen PRNP (NGS)
Código:	PRION_ENF
Técnica:	PCR y secuenciación
Unidades:	
Plazo:	10 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato y muestra de tejido.
Valores de referencia:	
Descripción:	ENOLASA NEURONAL ESPECIFICA SUERO
Código:	NSE
Técnica:	Electroquimioluminiscencia
Unidades:	ng/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero. Evitar muestra de Plasma. La hemólisis interfiere esta determinación. Se recomienda centrifugar la muestra en menos de 1 hora
Valores de referencia:	(Inf. 16.3)
Descripción:	ENOLASA NEURONAL ESPECIFICA LCR
Código:	NSELCR
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	µg/l
Plazo:	7 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 mL. Evitar la hemólisis
Valores de referencia:	(Inf. 13)
Descripción:	ENOLASA NEURONAL ESPECIFICA LIQ.PLEURAL
Código:	NSEPLEURAL
Técnica:	Inmunoanálisis
Unidades:	ng/mL
Plazo:	4 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 mL de Líquido Pleural.
Valores de referencia:	Valores inferiores a 13.0 ng/ml son compatibles con Pleuritis benignas
Descripción:	ENTAMOEBA HISTOLYTICA MUESTRA PCR
Código:	ENTAMOEPCR
Técnica:	Hibridación molecular (PCR)
Unidades:	
Plazo:	12 días
Tubo:	Muestra envíos externos

Descripción: ENTAMOEBA HISTOLYTICA MUESTRA PCR
Comentario adicional: Heces frescas. suero y heces congeladas
Valores de referencia:

Descripción: ENTAMOEBA HISTOLYTICA AC (AMEBIASIS)
Código: AMEBAAC
Técnica: Hemaglutinación
Unidades: Titulo
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: Negativo: <1/80
Indeterminado: titulos entre 1/80 y 1/160
Valores significativos : = o > 1/320

Descripción: ENTAMOEBA HYSTOLITICA ANTIGENO, HECES
Código: ENTA
Técnica: Inmunocromatografía.
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: heces especiales
Comentario adicional: Heces. refrigerar.
Cantidad: 5 g (en tubo)
Valores de referencia: Valor de referencia: Negativo

Descripción: ENTEROBACTERIAS PORTADORAS DE CARBAPENEMASAS
Código: EPC
Técnica: Cultivo
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Microbiología
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: ENTEROCITOS AC. (AIE-75) SUERO
Código: ENTEROAC
Técnica: Radioinmunoprecipitacion (RIPA)
Unidades: Ratio
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero refrigerado
Valores de referencia: (Inf. 10) Negativo
(10 - 15) Indeterminado
(Sup. 15) Positivo

Descripción: ENTEROVIRUS ANTICUERPOS IgG SUERO
Código: ENTEROIGG
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal

Descripción: ENTEROVIRUS ANTICUERPOS IgG SUERO
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: (Inf. 0.80) Negativo
 (0.80 - 1.09) Indeterminado
 (Sup. 1.10) Positivo

Descripción: ENTEROVIRUS ANTICUERPOS IgM SUERO
Código: ENTEROIGM
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1mL suero refrigerado
Valores de referencia: (Inf. 0.80) Negativo
 (0.80 - 1.09) Indeterminado
 (Sup. 1.10) Positivo

Descripción: ENTEROVIRUS EN HECES
Código: ENTEROVHEC
Técnica: INMUNOCROMATOGRFÍA
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Heces No Microbiología
Comentario adicional: Heces .
Valores de referencia: NEGATIVO

Descripción: Enterovirus RNA RT-PCR Cualitativa
Código: ENTEROVIRU
Técnica: RT-PCR
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: 1 mL LCR-CONGELAR
 1 mL plasma EDTA-CONGELAR
 0,5mL líquido pericárdico-CONGELAR
 5g heces (sólo niños)-CONGELAR
 5mL Sangre total EDTA-REFIRGERAR
Valores de referencia: Valor de referencia: No se detecta

Descripción: ENVOPLAQUINA ANTICUERPOS SUERO
Código: ENVOPLAQ
Técnica: EIA
Unidades: Ratio
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero
Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo

Descripción: ENZIMA CONVERTIDOR ANGIOTENSINA EN LCR
Código: ECALCR
Técnica: Espectrometría

Descripción: ENZIMA CONVERTIDOR ANGIOTENSINA EN LCR

Unidades: U/L

Plazo: 9 días

Tubo: Líquidos Biológicos

Comentario adicional: 1 mL LCR. Refrigerar .

Valores de referencia: (Inf. 11.3)

Descripción: ENZIMA CONVERTIDOR DE LA ANGIOTENSINA SUERO (ECA)

Código: ECA

Técnica: Cinética

Unidades: U/L

Plazo: 3 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 1 mL de suero.
Alternativa: Plasma de litio/sodio, separado inmediatamente de los eritrocitos
El plasma de EDTA interfiere en esta determinación

Valores de referencia: (13.3 - 63.9) > 14 años
(5 - 83) < 3 años
(8 - 76) 3 años - 8 años
(6 - 89) 8 años - 14 años

Descripción: Enzima convertidora de angiotensina: polimorfismos (Sanger)

Código: ECA_MUTS

Técnica: PCR y Secuenciación

Unidades:

Plazo: 15 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente

Valores de referencia:

Código: ENZLISOLEU

Descripción: ENZIMAS LISOSOMALES EN LEUCOCITOS

Técnica: Fluorimetría

10 mL Sangre total (anticoagulante heparina). Refgigerada

Comentario adicional: Indispensable concertación previa a la preparación de leucocitos se ha de realizar en nuestro Centro. Si lo prefieren pueden enviar los leucocitos congelados en naves carbónicas preparados según se describe en el Anexo (Consultar comentario).
Se debe adjuntar un preparado de leucocitos control de un individuo no emparentado.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	BGLUCURO	24065-5		BETA-GLUCURONIDASA- Leucocitos	nmol/h/mg prot	(147 - 1148)
Prueba	PALMIPROTI	74935-8		PALMITOIL PROTEÍNA TIOESTERASA- Leucocitos	nmol/h/mg prot	(12.7 - 26.0)
Prueba	TRIPLEPT	76038-9		TRIPLEPTIDIL PEPTIDASA I - Leucocitos	nmol/h/mg prot	(173 - 318)
Prueba	COMENZLISO			COMENTARIO ENZIMAS LISOSOMALES LEUCOCITOS		

Descripción:	Epidermolisis ampollosa simple, AR 1, Dowling-Meara. Panel
Código:	GEN_000347
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Epidermolisis bullosa con atresia pilórica. Panel NGS
Código:	GEN_000348
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Epidermolisis bullosa distrófica: gen COL7A1 (NGS)
Código:	EPIDERMOLI
Técnica:	PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	Epidermolisis bullosa juntural estenosis pilóric. Gen: ITGA6
Código:	GEN_000349
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Epidermolisis bullosa simple, AR, tipo1. Gen: KRT14
Código:	GEN_000350
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Epidermolisis bullosa simple. Sec Gen: KRT5
Código:	GEN_000351
Técnica:	
Unidades:	

Descripción: Epidermolisis bullosa simple. Sec Gen: KRT5
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Epidermolisis bullosa. Panel NGS
Código: GEN_000352
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Epilepsia AD con afectación auditiva. Sec Gen: LGI1
Código: GEN_000353
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Epilepsia con Displasia. Panel NGS
Código: GEN_000354
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Epilepsia de ausencias juveniles 1. Sec Gen: EFHC1
Código: GEN_000355
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Epilepsia dependiente de piridoxina. Sec Gen: ALDH7A1
Código: GEN_000358
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Epilepsia femenina retraso mental: gen PCDH19 (NGS)
Código: PCDH19
Técnica: PCR, secuenciación, y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Epilepsia mioclónica progr. Lafora: secu. EPM2A y NHLRC1
Código: LAFORA_MUT
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Epilepsia mioclónica progresiva. Panel NGS
Código: GEN_000356
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Epilepsia nocturna dominante del lóbulo frontal. Panel NGS
Código: GEN_000357
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Epilepsia panel de genes
Código: PHARMALP11
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
 Imprescindible enviar la historia clínica y formulario de petición de genética o consentimiento informado

Valores de referencia:

Descripción: Epilepsia relacionada con piridoxina. Panel NGS
Código: GEN_000359

Descripción:	Epilepsia relacionada con piridoxina. Panel NGS
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Epilepsia Síndrome de Dravet: gen SCN1A (NGS)
Código:	SCN1A
Técnica:	PCR, secuenciación, y MLPA
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	Epilepsia: >10 genes (NGS)
Código:	EPILEPSIA
Técnica:	NGS Illumina y MLPA
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	EPSTEIN BARR AC. VCA IGG
Código:	EPSBARRACG
Técnica:	CLIA
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero
Valores de referencia:	(Inf. 0.74) Negativo (0.75 - 0.99) Indeterminado (Sup. 1.00) Positivo

Descripción:	EPSTEIN BARR AC. VCA IGA
Código:	EPSBARRACA
Técnica:	ELISA
Unidades:	
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1mL de suero refrigerado. Alt. Plasma heparina o citrato
Valores de referencia:	(Inf. 9) (9 - 11) (Sup. 11)

Descripción: EPSTEIN-BARR AC. EARLY ANTIGEN IGG
Código: EBEARLAC
Técnica: CLIA
Unidades: UI/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero. Alternativo 1 mL plasma de EDTA.
 ALTERNATIVA: plasma citrato, plasma heparina
Valores de referencia: (Inf. 10) Negativo

Descripción: EPSTEIN-BARR AC. VCA IGG EN LCR
Código: EPSBARGLC
Técnica: IFI
Unidades: Título
Plazo: 5 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 mL LCR. refrigerar.
Valores de referencia: Título <1/2 Negativo
 Título >0 = 1/2 Positivo

Descripción: EPSTEIN-BARR AC. VCA IGM EN LCR
Código: EPSBARMMLC
Técnica: IFI
Unidades: Título
Plazo: 5 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 mL LCR. Se recomienda efectuar análisis simultáneo en suero y LCR
Valores de referencia: Título <1/2 Negativo
 Título > 0 = 1/2 Positivo

Descripción: EPSTEIN-BARR AC. VCA IGM
Código: EPSBARRACM
Técnica: CMIA
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero
Valores de referencia: (Inf. 0.49) Negativo
 (0.50 - 0.99) Indeterminado
 (Sup. 1.0) Positivo

Descripción: EPSTEIN-BARR AC. EARLY ANTIGEN IGM
Código: EBEARLAIGM
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: Índice
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml de suero.
 Alternativa Plasma (EDTA o Heparina)

Descripción: EPSTEIN-BARR AC. EARLY ANTIGEN IGM
Valores de referencia: (Inf. 1.0) Negativo
 (1.0 - 1.2) Indeterminado
 (Sup. 1.2) Positivo

Descripción: EPSTEIN-BARR AC. NUCLEAR ANTIGEN (EBNA) IGG
Código: EBNUCACG
Técnica: Quimioluminiscencia
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero/PLasma EDTA
Valores de referencia: (Inf. 0.9) Negativo
 (0.91 - 1.1) Indeterminado
 (Sup. 1.11) Positivo

Descripción: EPSTEIN-BARR AC. NUCLEAR ANTIGEN (EBNA) IGM
Código: EBNUCACM
Técnica: IFI
Unidades: Título
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero.
Valores de referencia: Negativo <1:20

Descripción: Epstein-Barr DNA PCR Cualitativa
Código: DNAEPSBA
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: LCR- CONGELAR
 1ml Plasma de EDTA-CONGELAR
 3ml Sangre total EDTA-REFRIGERAR
 1ml Aspirado bronquial-REFRIGERAR
 1ml Lavado broncoalveolar-REFRIGERAR
 Tejido parafinado-TA
 2ml Lavado broncoalveolar-REFRIGERAR
Valores de referencia:

Descripción: Epstein-Barr DNA PCR Cuantitativa
Código: EBVCUAN
Técnica: PCR cuantitativa
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: 2ml Plasma-CONGELAR
 2ml LCR-CONGELAR
 5ml Sangre total EDTA-REFRIGERAR
Valores de referencia:

Descripción: Eritrocitosis. Sec Gen: EPOR
Código: GEN_000361
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Eritrodermia ictiosiforme congénita no bullosa. Panel NGS
Código: GEN_000362
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Eritromelalgia hereditaria. Sec Gen: SCN9A
Código: GEN_000363
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: ERITROPOYETINA
Código: ERITROPO
Técnica: ICMA
Unidades: mU/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero. Evitar plasma de EDTA.
Valores de referencia: (2.6 - 19)

Descripción: ERITROPOYETINA ANTICUERPOS
Código: ERITROANTI
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: Índice
Plazo: 32 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 2 mL suero. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO
Valores de referencia:

Descripción: Escherichia coli K1 PCR en LCR
Código: ECOLIK1PCR
Técnica:
Unidades:
Plazo: 9 días

Descripción: Escherichia coli K1 PCR en LCR
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional: 1 ml de LCR, puede usarse tambien sangre total
Valores de referencia:

Descripción: ESCITALOPRAM, SUERO
Código: ESCITALO
Técnica: LC-MS/MS
Unidades: ng/mL
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 2 mL Suero
Valores de referencia: (10 - 150)

Descripción: Esclerosis lateral amiotrófica 1 (ELA1): gen SOD1 (NGS)
Código: SOD1_MUT
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Esclerosis lateral amiotrófica fam. frontotemporal. C9orf72
Código: GEN_000365
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Esclerosis lateral amiotrófica familiar. Panel NGS
Código: GEN_000366
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Esclerosis lateral amiotrófica juvenil: gen ALS2 (NGS)
Código: ALS2
Técnica: NGS con TSOE Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Descripción: Esclerosis lateral amiotrófica juvenil: gen ALS2 (NGS)

Valores de referencia:

Descripción: Esclerosis lateral amiotrófica. Panel NGS

Código: GEN_000364

Técnica:

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Esclerosis lateral amiotrófica: expansión C9orf72

Código: C9ORF72

Técnica: PCR, TP-PCR y análisis de fragmentos

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Alternativas: Citrato

Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.

Valores de referencia:

Descripción: Esclerosis tuberosa. Sec Gen: TSC1

Código: GEN_000367

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Esclerosis tuberosa. Sec Gen: TSC2

Código: GEN_000368

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Esclerosis tuberosa: genes TSC1 y TSC2 (NGS)

Código: ESCLER_TUB

Técnica: PCR, secuenciación y MLPA

Unidades:

Plazo: 60 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: ESCOPOLAMINA EN ORINA
Código: ESCOPOLAMI
Técnica: Cromatografía líquida/Tándem masas
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Orina Drogas de Abuso
Comentario adicional: 10 mL de orina
Valores de referencia:

Descripción: Esferocitosis hereditaria. Sec Gen: EPB42
Código: GEN_000370
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Esferocitosis hereditaria. Sec Gen: SPTB
Código: GEN_000369
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Esferocitosis: <10 genes (NGS)
Código: ESFER_MUTS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: ESLICARBAZEPINA
Código: ESLICARBA
Técnica: Cromatografía Líquida - Tándem Masas (LC-MS/MS)
Unidades: µg/mL
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: (10.0 - 35.0)

Descripción: ESPERMATOZOIDES ANTICUERPOS SUERO
Código: ESPERMAAC
Técnica: ELISA
Unidades: Índice

Descripción: ESPERMATOZOIDES ANTICUERPOS SUERO
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL Suero (Refrigerado)
Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo

Código: SEMIN
Descripción: ESPERMIOGRAMA
Técnica:
Comentario adicional: Centros de fuera de Madrid, solo se realiza control postvasectomia

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	COLOR	10569-2		ESPERMIOGRAMA: COLOR		
Prueba	VISCOS	32789-0		ESPERMIOGRAMA: VISCOSIDAD		
Prueba	VOLUM	3160-9		ESPERMIOGRAMA: VOLUMEN	mL	
Prueba	PHESPER	2752-4		ESPERMIOGRAMA: PH		
Prueba	NESPER	9780-8		ESPERMIOGRAMA: NUMERO DE ESPERMATOZOIDES	millones/mL	
Prueba	NCELGER	10576-7		ESPERMIOGRAMA: NUMERO CELULAS GERMINALES	Células germina	
Prueba	NLEUCO	10579-1		ESPERMIOGRAMA: NUMERO DE LEUCOCITOS	Leucocitos/mL	
Prueba	NCELRED	10585-8		CELULAS REDONDAS EN SEMEN	células redonda	
Prueba	MOTITOT	6800-7		ESPERMIOGRAMA: MOTILIDAD PROGRESIVA	%	
Prueba	MOTPRO	14194-5		ESPERMIOGRAMA: MOTILIDAD PROGRESIVA	%	
Prueba	MOTNOPRO	10620-3		ESPERMIOGRAMA: MOTILIDAD NO PROGRESIVA	%	
Prueba	INMOVI	10611-2		ESPERMIOGRAMA: MOTILIDAD: INMOVILES	%	
Prueba	MORNOR	10622-9		ESPERMIOGRAMA: MORFOLOGIA NORMAL	%	
Prueba	MORANOR	15376-7		ESPERMIOGRAMA: MORFOLOGIA ANORMALES	% morfologicame	
Prueba	CABEZA	10602-1		ESPERMIOGRAMA: MALFOR. CABEZA	% malformacione	
Prueba	PINTERME	10603-9		ESPERMIOGRAMA: MALFOR. P. INTERMEDIA	% malformacione	
Prueba	COLA	10604-7		ESPERMIOGRAMA: MALFOR. COLA	% malformacione	
Prueba	POLINU	14377-6		ESPERMIOGRAMA: POLINUCLEARES	% polinucleares	
Prueba	LINFOCI	14383-4		ESPERMIOGRAMA: LINFOCITOS	%	
Prueba	ESPERTOTAL	72517-6		ESPERMIOGRAMA: CANTIDAD TOTAL DE ESPERMATOZOIDES EN EYACULAD		
Prueba	OPACIDAD	13359-5		ESPERMIOGRAMA: OPACIDAD		
Prueba	NOTASEMI	15426-0		NOTA SEMINOGRAMA		
Prueba	ITZ	5004594		INDICE DE TERATOZOOSPERMIA		

Descripción: Espondilolistesis Ehlers-Danlos. Sec Gen: SLC39A13
Código: GEN_000371
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Código: ESPUCUL
Descripción: ESPUTO CULTIVO, IDENTIFICACION
Técnica: Cultivo en placas adecuadas
Comentario adicional: La muestra se obtiene tras una expectoración profunda, preferentemente matinal. Se necesitan de 2 a 10 ml, si es posible.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Perfil	CULTIVO		ESPUTO	CULTIVO GENERAL en ESTUDIO MICROBIOLOGICO DE ESPUTO		

Descripción: Esquizencefalia. Sec Gen: EMX2
Código: GEN_000372
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: ESTAÑO EN ORINA
Código: ESTAÑO2
Técnica: ICP-MS
Unidades: µg/g creatin.
Plazo: 7 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 10 mL orina (micción aislada). Refrigerar
Valores de referencia: (Inf. 50)

Descripción: ESTAÑO EN SANGRE
Código: ESTAÑO
Técnica: ICP-MS. Hasta 29-05-2006 AAS/cámara de grafito.
Unidades: mcg/L
Plazo: 11 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 2 mL sangre total (EDTA)
Valores de referencia: (Inf. 50) No exposición

Descripción: Estenosis supraavicular aórtica. Sec Gen: ELN
Código: GEN_000373

Descripción:	Estenosis supraválvular aórtica. Sec Gen: ELN
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	ESTIRENO EN SANGRE TOTAL
Código:	ESTIR
Técnica:	Cromatografía de gases-ionización de llama
Unidades:	mg/L
Plazo:	12 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	5 mL sangre total al final de la jornada laboral
Valores de referencia:	(Inf. 0.20) Final de jornada (exposición a ESTIRENO). Valor límite biológico-VLB(INSS)

Descripción:	ESTRADIOL
Código:	E2
Técnica:	Técnica CMIA
Unidades:	pg/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 44) Hombre > 14 años (24 - 251) Mujer > 14 años F. Folicular (38 - 649) Mujer > 14 años Ovulación (24 - 312) Mujer > 14 años F. Luteínica (Inf. 28) Mujer > 14 años Post-menopausia sin tratamiento hormonal sustitutivo (Inf. 144) Mujer > 14 años Post-menopausia con tratamiento hormonal sustitutivo

Descripción:	ESTRIOL LIBRE (EMBARAZO) SUERO
Código:	ESTRIOLLIB
Técnica:	Inmunoquimioluminiscencia
Unidades:	ng/mL
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1ml suero (Refrigerar) Alt. 1 mL Plasma(Refrigerar)
Valores de referencia:	(Inf. 0.22) Hombre (Inf. 0.20) Mujer (2.10 - 7.40) Mujer 25 semanas gestación (2.20 - 8.00) Mujer 26 semanas gestación (2.30 - 10.00) Mujer 27-29 semanas gestación (2.70 - 11.70) Mujer 30-31 semanas gestación (2.90 - 18.40) Mujer 32-37 semanas gestación

Descripción:	ESTRIOL SUERO
Código:	ESTRIOL

Descripción: ESTRIOLO SUERO

Técnica: EIA

Unidades: ng/mL

Plazo: 6 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: Suero.
Alternativa: Plasma humano.

Valores de referencia: (Inf. 8.5) Mujer
(5.49 - 25.30) Mujer 17-20 semanas gestación
(6.73 - 41.40) Mujer 21-24 semanas gestación
(13.40 - 50.28) Mujer 25-28 semanas gestación
(17.49 - 54.91) Mujer 29-32 semanas gestación
(18.52 - 61.62) Mujer 33-36 semanas gestación
(21.97 - 84.83) Mujer 37 semanas gestación-parto
(Inf. 8.50) Hombre

Descripción: ESTRONA SUERO

Código: ESTRONA

Técnica: EIA

Unidades: pg/mL

Plazo: 6 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 1 mL Suero. Refrigerado.

Alt. 1 mL Plasma EDTA Tripotásico, 1mL Plasma Heparina.

Valores de referencia: (15.6 - 77) Hombre
(15.5 - 220.2) Mujer Premenopausia
(11.0 - 54.5) Mujer Postmenopausia

Descripción: ESTRONCIO EN SANGRE

Código: SR

Técnica: ICP-MS

Unidades: µg/L

Plazo: 9 días

Tubo: Sangre EDTA

Comentario adicional: 2 mL Sangre total EDTA (2-8 °C - Refrigerar)

Valores de referencia: (7.8 - 35.0)

Código: BLOQUEONCO

Descripción: Estudio bloque muestra parafinada ONCO/AP

Técnica:

Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	EXTRACCADN			Extracción ADN de bloque tumoral parafinado		
Prueba	CUANTIFADN			Cuantificación ADN de bloque tumoral parafinado		
Prueba	MACRODISEC			AP: MACRODISECCIÓN (MUESTRAS GENÉTICA)		
Prueba	PORCEN_ADN			Porcentaje ADN tumoral en bloque original		

Descripción:	Estudio de cualquier gen por NGS
Código:	SEC_UNGEN
Técnica:	TP-PCR, y análisis de framgentos
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
	Alternativas: Heparina o Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	ESTUDIO DE E. COLI ENTEROHEMORRÁGICO
Código:	ECEH
Técnica:	Cultivo
Unidades:	
Plazo:	
Tubo:	Heces Microbiología
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	Estudio de una expansión
Código:	UNA_EXPANS
Técnica:	TP-PCR, y análisis de framgentos
Unidades:	
Plazo:	20 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
	Alternativas: Heparina o Citrato
Valores de referencia:	

Código:	ESTEROLES
Descripción:	ESTUDIO DEL METABOLISMO DE LOS ESTEROLES EN SUERO
Técnica:	Cromatografía de gases - Ionización de llama.
Comentario adicional:	2 ml de suero. Congelar y enviar congelado. Proteger de la luz con papel de aluminio.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	DHCOL	32289-1		Perfil Esteroles en suero 7-Dehidrocolesterol	μmol/L	(Inf. 8)
Prueba	COLESTENOL	76022-3		Perfil Esteroles en suero 8(9)-Colectenol	μmol/L	(Inf. 2.0)
Prueba	DEHIDROCOL	56535-8		Perfil Esteroles en suero 8-Dehidrocol	μmol/L	(Inf. 2.0)
Prueba	BCOL	74432-6		Perfil Esteroles en suero Beta-Colestanol	μmol/L	(2.2 - 12.6)
Prueba	CAMPESTERO	58464-9		Perfil Esteroles en suero Campesterol	μmol/L	(Inf. 10)
Prueba	COL	14647-2		Perfil Esteroles en suero Colesterol	mmol/L	(1.7 - 6.6)
Prueba	DESMOS	74905-1		Perfil Esteroles en suero Desmosterol	μmol/L	(Inf. 2.0)
Prueba	SITOSTEROL	74907-7		Perfil Esteroles en suero Sitosterol	μmol/L	(Inf. 10.0)
Prueba	COMESTEROL	79327-3		COMENTARIO ESTUDIO METABOLISMO DE LOS ESTEROLES EN SUERO		

Descripción: Estudio genético de cardiopatías
Código: CARDIO_GEN
Técnica: NGS con TSO de Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Estudio genético de respuesta a 113 fármacos
Código: FARMAGEN75
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: Muestra EDTA rotulada con BM y hoja de petición especial (wellness)
Valores de referencia:

Descripción: Estudio genético para suplementos alimenticios y vitaminas
Código: SUPLEMEN
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Muestra EDTA rotulada con BM y hoja de petición especial (wellness)
Valores de referencia:

Descripción: Estudio genómico del complemento: gen C3 (NGS)
Código: C3_MUTS
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Estudio hallazgos 2 mutaciones puntuales
Código: DOS_HALLMT
Técnica: SANGER
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Sangre EDTA rotulada con BM.
Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente

Valores de referencia:

Descripción: Estudio hallazgos CNV
Código: HALLAZCNV

Descripción: Estudio hallazgos CNV
Técnica: MLPA
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación y rotulado con BM.
Valores de referencia:

Descripción: Estudio hallazgos mutación puntual
Código: HALLAZMUTA
Técnica: SANGER
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación y rotulado con BM.
 Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente
Valores de referencia:

Descripción: ESTUDIO INMUNOHISTOQUIMICO BAP1
Código: IHQBAP1
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo:
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: ESTUDIO INMUNOHISTOQUIMICO CLAUDINA 18
Código: IHQCLAU18
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo:
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: ESTUDIO INMUNOHISTOQUIMICO DE PDL1 CLON 22C3
Código: IHQPDL1_22
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo:
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: ESTUDIO INMUNOHISTOQUIMICO MTAP
Código: IHQMTAP
Técnica:
Unidades:
Plazo:

Descripción: ESTUDIO INMUNOHISTOQUIMICO MTAP

Tubo:

Comentario adicional:

Valores de referencia:

Descripción: ESTUDIO PRENATAL DE ESTEROLES EN LIQ. AMNIOTICO

Código: ESTERAMNIO

Técnica: Cromatografía de gases

Unidades:

Plazo: 13 días

Tubo: Líquidos Biológicos

Comentario adicional: 5 mL líquido amniótico. Indicar edad gestacional. Indispensable historia clínica y antecedentes familiares

Valores de referencia:

Descripción: ETANERCEPT Y ANTICUERPOS SUERO

Código: ETANERCEPT

Técnica: Enzimoinmunoanálisis

Unidades:

Plazo: 17 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 2 mL suero. Toma de muestras antes de la administración de la próxima dosis.

Valores de referencia:

Descripción: ETIL GLUCURÓNIDO, SUERO

Código: ETGLS

Técnica: LC-MS/MS

Unidades:

Plazo: 14 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 1 mL Suero. refrigerar.

Valores de referencia: Interpretación según criterio clínico

Descripción: ETILENGLICOL SUERO

Código: ETILENGLI

Técnica: Cromatografía de gases

Unidades:

Plazo: 4 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 2 mL de suero

Valores de referencia:

Descripción: ETILGLUCURONIDO CONFIRMACION EN ORINA

Código: ETILGLCONF

Técnica: LC-MS/MS

Unidades: ng/mL

Plazo: 9 días

Tubo: Orina pruebas referencia

Comentario adicional: 5 mL orina micción aislada

Valores de referencia: (Inf. 250)

Descripción:	ETOSUXIMIDA SUERO
Código:	ETOSU
Técnica:	EIA
Unidades:	mcg/mL
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL Suero.
Valores de referencia:	(40 - 100) Niveles terapéuticos indicativos

Descripción:	ETV6(TEL)/RUNX1(AML1) · RT-PCR
Código:	ETV6_RUNX1
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional:	3 tubos de EDTA exclusivos para esta determinación: tubo sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO.
	Muestra: sangre periférica o médula ósea
	NO PINCHAR VIERNES NI VÍSPERAS DE FESTIVOS: la sangre se empieza a procesar dentro de las primeras 48 horas desde la extracción

Valores de referencia:

Descripción:	Evaluacion del microbioma endometrial (Endometriome)
Código:	DISBIENDOM
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	BIOPSIA ESPECIAL
Comentario adicional:	Solicitar kit especial.Contactar con asesoría genética antes de tomar la muestra.
Valores de referencia:	

Descripción:	EVERLI COMPLETO (ANEUPLOIDIAS, DELECCIONES Y DUPLICACIONES)
Código:	EVERLICOMP
Técnica:	NGS (Next Generation Sequencing)
Unidades:	
Plazo:	6 días
Tubo:	Prenatal
Comentario adicional:	Tubo Streck cfDNA.
Valores de referencia:	

Código:	EVERGENES
Descripción:	EVERLI PLUS + GENESAFE COMPLETO
Técnica:	NGS
Comentario adicional:	se necesitan 2 kits: Genesafe + Everlyplus

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	EVERLIPLUS			EVERLI TEST COMPLETO MAS 9 SINDROMES DE MICRODELECCION		
Prueba	GENESAFECO			GENESAFE INHERITED + GENESAFE DE NOVO		

Descripción: EVERLI TEST AVANZADO (T21, T18, T13 CrX, CrY)
Código: EVERLIAVAN
Técnica: NGS (Next Generation Sequencing)
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Prenatal
Comentario adicional: Tubo Streck cfDNA.
Valores de referencia:

Descripción: EVERLI TEST BASICO (CROMOSOMAS T21, T18, T13)
Código: EVERLIBASI
Técnica: NGS (Next Generation Sequencing)
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Prenatal
Comentario adicional: Tubo Streck cfDNA.
Valores de referencia:

Descripción: EVERLI TEST COMPLETO MAS 9 SINDROMES DE MICRODELECCION
Código: EVERLIPLUS
Técnica: NGS (Next Generation Sequencing)
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Prenatal
Comentario adicional: Tubo Streck cfDNA.
Valores de referencia:

Código: EVERLIT21
Descripción: EVERLI TRISOMIA 21
Técnica: NGS
Comentario adicional: Tubo Streck cfDNA. Es el mismo kit que el Everli

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	EVERLI_T21			EVERLI TRISOMIA 21		
Prueba	EVERLISEXO			EVERLI TEST CON/SIN SEXO		
Prueba	EVERLIFETO			EVERLI TEST Nº FETOS		
Prueba	NIPT.FRACC			NIPT FRACCION		
Prueba	NIPT.CROMO			NIPT CROMOSEX		
Prueba	NIPT.DESCR			NIPT DESCRIPCIO		
Prueba	NIPT.ANOMA			NIPT ANOMALIA		

Código: EVERLIT21
Descripción: EVERLI TRISOMIA 21
Técnica: NGS

Código: EVERLIT21

Comentario adicional: Tubo Streck cfDNA. Es el mismo kit que el Everli

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	EVERLI_T21			EVERLI TRISOMIA 21		
Prueba	EVERLISEXO			EVERLI TEST CON/SIN SEXO		
Prueba	EVERLIFETO			EVERLI TEST Nº FETOS		
Prueba	NIPT.FRACC			NIPT FRACCION		
Prueba	NIPT.CROMO			NIPT CROMOSEX		
Prueba	NIPT.DESCR			NIPT DESCRIPCIO		
Prueba	NIPT.ANOMA			NIPT ANOMALIA		

Descripción: EVEROLIMUS SANGRE TOTAL

Código: EVEROLIMUS

Técnica: Cromatografía líquida / Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)

Unidades: ng/mL

Plazo: 6 días

Tubo: EDTA sangre total Referencia

Comentario adicional: 1 mL sangre total EDTA
Conservación: Refrigerar

Muestra extraída en pre dosis.

Valores de referencia: (3.0 - 8.0) Intervalo terapéutico. Terapia triple (ciclosp. A; corticos.) en transplante renal.
(Inf. 0.5) Límite de cuantificación

Descripción: EXAMEN DE GOTA GRUESA

Código: GOTAGRUE

Técnica: Examen microscópico

Unidades:

Plazo: 3 días

Tubo: Sangre EDTA

Comentario adicional: 2 mL sangre total (EDTA)

Valores de referencia:

Descripción: Exoma clínico (NGS)

Código: EXOMA_TSO

Técnica: PCR y secuenciación

Unidades:

Plazo: 40 días

Tubo: EDTA Biología Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Exoma clínico + ADN mitocondrial completo

Código: MIT_TSO

Descripción: Exoma clínico + ADN mitocondrial completo

Técnica:

Unidades:

Plazo: 40 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Exoma clínico + Exoma Mitocondrial

Código: EXOCLINMIT

Técnica:

Unidades:

Plazo: 40 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Valores de referencia:

Descripción: Exoma clínico en duo

Código: DUO_TSO

Técnica:

Unidades:

Plazo: 40 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Exoma clínico en trío

Código: TRIO_TSO

Técnica:

Unidades:

Plazo: 40 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Exoma completo (NGS)

Código: EXOMA

Técnica: PCR y secuenciación

Unidades:

Plazo: 40 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Exoma completo individual con screening de CNVs

Código: EXOMA_CNV

Técnica:

Descripción: Exoma completo individual con screening de CNVs

Unidades:

Plazo: 40 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Exoma completo madre, padre e hijo (NGS)

Código: EXOMA_TRIO

Técnica: NGS Illumina

Unidades:

Plazo: 40 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Exoma completo: archivos FASTQ

Código: EXOMA_RAW

Técnica:

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Exoma completo: archivos VCF

Código: EXOMA_VCF

Técnica:

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Expresión génica + porcentaje dd-cfDNA

Código: OMNIGRAFT

Técnica:

Unidades:

Plazo:

Tubo: Tubo Especial

Comentario adicional: Tubo Hemasure
Muestras para estudio trasplante riñón. Contactar con laboratorio NIPT

Valores de referencia:

Descripción: Extracción ADN de bloque tumoral paraafinado

Código: EXTRACCADN

Técnica: Extracción de ADN

Descripción: Extraccion ADN de bloque tumoral parafinado

Unidades:

Plazo:

Tubo: Muestra Anatomía Patológica

Comentario adicional:

Valores de referencia:

Código: CULCONJUN

Descripción: EXUDADO CONJUNTIVAL CULTIVO, IDENTIFICACION

Técnica: Cultivo de la muestra en medios apropiados

Comentario adicional: Torunda con medio tipo Stuart o Amies (medio semi-sólido, no nutriente) y suero salino estéril.
Con la torunda mojada en suero fisiológico recoger el exudado procedente del saco inferior y del canto interno del ojo

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Perfil	CULTIVO		CONJUNTIVA	CULTIVO GENERAL en ESTUDIO MICROBIOLOGICO DE EXUDADO CONJUNTIVAL		

Código: CULFAR

Descripción: EXUDADO FARINGEO CULTIVO, IDENTIFICACION

Técnica: Cultivo en medios apropiados

Comentario adicional: Torunda con medio tipo Stuart o Amies (medio semi-sólido, no nutriente)
Tocar con la torunda el fondo de garganta, amígdalas, fosas tonsilares y cualquier otra zona donde exista inflamación, exudado o ulceración

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Perfil	CULTIVO		FARINGE	CULTIVO GENERAL en ESTUDIO MICROBIOLOGICO DE EXUDADO FARINGEO		

Código: CULNA

Descripción: EXUDADO NASAL CULTIVO, IDENTIFICACION

Técnica: Cultivo en medios apropiados

Comentario adicional: Torundas con medio tipo Stuart o Amies (medio semi-sólido, no nutriente).

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Perfil	CULTIVO		NASAL	CULTIVO GENERAL en ESTUDIO MICROBIOLOGICO DE EXUDADO NASAL		

Código: CULOTI

Descripción: EXUDADO OTICO CULTIVO, IDENTIFICACION

Técnica: Cultivo en medios apropiados

Comentario adicional: torundas con medio tipo Stuart o Amies (medio semi-sólido, no nutriente).

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.

Componentes						
Perfil	CULTIVO		OTICO	CULTIVO GENERAL en ESTUDIO MICROBIOLOGICO DE EXUDADO OTICO		

Código: CULRECTAL

Descripción: EXUDADO RECTAL CULTIVO, IDENTI

Técnica: Cultivo en medios apropiados

Comentario adicional: Torundas con medio en gel tipo Stuart o Amies (medio semi-sólido, no nutriente)

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Perfil	CULTIVO		RECTAL	CULTIVO GENERAL en EXUDADO RECTAL		

Código: CULURE

Descripción: EXUDADO URETRAL CULTIVO, IDENTIFICACION

Técnica: Cultivo en medios apropiados

Comentario adicional: Torundas uretrales finas, de alginato cálcico o Dracon con medios de transporte tipo Stuart-Amies

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Perfil	CULTIVO		URETRAL	CULTIVO GENERAL en ESTUDIO MICROBIOLOGICO DE EXUDADO URETRAL		

Código: CULVAGI

Descripción: EXUDADO VAGINAL CULTIVO, IDENTIFICACION

Técnica: Cultivo en medios apropiados

Comentario adicional: Torundas con medio en gel tipo Stuart o Amies (medio semi-sólido, no nutriente)
Regoger material de la zona con mayor exudado, o en su defecto, del fondo de saco vaginal posterior.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Perfil	CULTIVO		VAGINAL	CULTIVO GENERAL en ESTUDIO MICROBIOLOGICO DE EXUDADO VAGINAL		

Descripción: F-ACTINA AC. IGG SUERO

Código: ACACTINAF

Técnica: EIA

Unidades:

Plazo: 15 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional:

Valores de referencia: Títulos significativos a partir de 1:100

Descripción: FACTOR 23 DE CRECIMIENTO DE FIBROBLASTOS PLASMA

Código: FACTOR23

Descripción: FACTOR 23 DE CRECIMIENTO DE FIBROBLASTOS PLASMA
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: pg/mL
Plazo: 19 días
Tubo: Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional: 1 mL de PLASMA (EDTA). CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.
Valores de referencia: (23.20 - 95.40) Mas de 18 años

Descripción: FACTOR A DE CRECIMIENTO VASCULAR ENDOTELIAL (VEGF-A)
Código: VEGFA
Técnica: EIA
Unidades: pg/mL
Plazo: 12 días
Tubo: Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional: 1 mL plasma.
 CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO
 Evitar muestra de suero
Valores de referencia: (Inf. 311.4)

Descripción: FACTOR D DE CRECIMIENTO VASCULAR ENDOTELIAL (VEGF-D)
Código: VEGFD
Técnica: EIA
Unidades: pg/mL
Plazo: 12 días
Tubo: Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional: 1 mL plasma EDTA.
 CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO
Valores de referencia: (Inf. 437.0)

Descripción: FACTOR DE CRECIMIENTO PLACENTARIO (PIGF)
Código: PIGF
Técnica: Técnica ECLIA
Unidades: pg/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: suero refrigerado 48h, sino, suero congelado
Valores de referencia: (28.8 - 122) Mujer 10-14 sem.gestación
 (66.2 - 289) Mujer 15-19 sem.gestación
 (119 - 605) Mujer 20-23 sem.gestación
 (169 - 1117) Mujer 24-28 sem.gestación
 (114 - 1297) Mujer 29-33 sem.gestación
 (78 - 984) Mujer 34-36 sem.gestación
 (54.4 - 862) Mujer 37 sem.gestación-parto

Descripción: Factor de Necrosis Tumoral Alfa
Código: TNF
Técnica: ELISA
Unidades: pg/mL
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Congelado

Descripción: Factor de Necrosis Tumoral Alfa

Comentario adicional: 1 ml suero. Separar el suero lo antes posible y CONGELAR. ENVIAR CONGELADO.

Valores de referencia: (4.60 - 12.40)

Descripción: FACTOR FLETCHER (PRECALICREINA) EN PLASMA

Código: FACTFELT

Técnica: Método coagulométrico

Unidades: %

Plazo: 32 días

Tubo: Coagulación - Plasma Citrato

Comentario adicional: 1 ml Plasma citrato sódico
Congelar la muestra inmediatamente

Valores de referencia: (50 - 150)

Descripción: FACTOR H COMPLEMENTO SUERO ANTICUERPOS

Código: FHCOMPLAC

Técnica: EIA

Unidades:

Plazo: 32 días

Tubo: Suero Congelado

Comentario adicional: Volumen y condiciones de la muestra: 2 mL suero. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO. Adjuntar historial clínico. INDISPENSABLE enviar alicuota separada del resto de determinaciones.

Valores de referencia: (Inf. 1.00) Negativo

Descripción: FACTOR H DEL COMPLEMENTO

Código: FACTORH

Técnica: Inmunodifusión Radial

Unidades: mg/dL

Plazo: 17 días

Tubo: Suero Congelado

Comentario adicional: 2 mL se suero. Congelar y enviar congelado. Adjuntar historial clínico con fecha de nacimiento.

Valores de referencia: (36 - 68)

Descripción: FACTOR II PLASMA

Código: FACTORII

Técnica: Método coagulométrico

Unidades: %

Plazo: 9 días

Tubo: Coagulación - Plasma Citrato

Comentario adicional:

Valores de referencia: (70 - 120)

Descripción: FACTOR INTRINSECO AC

Código: FACTORINAC

Técnica: Técnica EIA

Unidades:

Plazo: 7 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional:

Descripción: FACTOR INTRINSECO AC
Valores de referencia: (Inf. 0.9) Negativo
 (0.9 - 1.1) Indeterminado

Descripción: FACTOR IX EN PLASMA
Código: FACTORIX
Técnica: Método coagulométrico
Unidades: %
Plazo: 9 días
Tubo: Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:
Valores de referencia: (60 - 150)

Descripción: FACTOR LIBERADOS DE CORTICOTROPINA (CRF)
Código: CRF
Técnica: EIA
Unidades: pg/mL
Plazo: 19 días
Tubo: Plasma trasylol/aprotinina
Comentario adicional: 1 mL Plasma EDTA Aprotinina (Trasylol) (Congelado)
 Separar el plasma y congelar inmediatamente después de la extracción.
Valores de referencia: (12.4 - 64.0)

Descripción: FACTOR NEFRITICO C3
Código: FACNEFRITI
Técnica: Hemólisis
Unidades:
Plazo: 13 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL de suero con separador. REFRIGERAR.
Valores de referencia: Valores de referencia indicativos: Negativo

Descripción: FACTOR Rh
Código: RH
Técnica: Aglutinación
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: Sangre total EDTA. También se admite citrato
Valores de referencia:

Descripción: FACTOR RH ESTUDIO DU
Código: RH DU
Técnica: Microtipaje en columnas
Unidades:
Plazo:
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: FACTOR V EN PLASMA
Código: FACTORV
Técnica: Método coagulométrico
Unidades: %
Plazo: 9 días
Tubo: Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:
Valores de referencia: (70 - 120)

Descripción: FACTOR VII EN PLASMA
Código: FACTORVII
Técnica: Método coagulométrico
Unidades: %
Plazo: 9 días
Tubo: Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:
Valores de referencia: (55 - 170)

Descripción: FACTOR VIII ANTIGENICO
Código: FVIIIANTIG
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: %
Plazo: 9 días
Tubo: Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional: 1 mL plasma (citrato) pobre en plaquetas (doble centrifugación a 2500 g/15 min.) Aspirar parte superior. CONGELAR INMEDIATAMENTE Y ENVIAR CONGELADO. Tubo aparte
Valores de referencia: (63 - 199)

Descripción: FACTOR VIII EN PLASMA
Código: FACTORVIII
Técnica: Método coagulométrico
Unidades: %
Plazo: 9 días
Tubo: Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:
Valores de referencia: (50 - 150)

Descripción: FACTOR VON WILLEBRAND ACTIVIDAD (COFACTOR DE LA RISTOCETINA)
Código: RISTOCETIN
Técnica: Método turbidimétrico basado en la agregación de plaquetas
Unidades: %
Plazo: 9 días
Tubo: Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:
Valores de referencia: (50 - 200) Los pacientes de grupo sanguíneo 0 suelen mostrar un VWF:RCO más bajo

Descripción: FACTOR VON WILLEBRAND ANTIGENO PLASMA
Código: WILLEBRAND
Técnica: Técnica inmunoturbidimétrica
Unidades: %

Descripción: FACTOR VON WILLEBRAND ANTIGENO PLASMA
Plazo: 9 días
Tubo: Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional: Plasma citrato
Valores de referencia: (50 - 160)

Descripción: FACTOR X EN PLASMA
Código: FACTORX
Técnica: Método coagulométrico
Unidades: %
Plazo: 9 días
Tubo: Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:
Valores de referencia: (70 - 120)

Descripción: FACTOR XI
Código: FACTORXI
Técnica: Método coagulométrico
Unidades: %
Plazo: 9 días
Tubo: Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:
Valores de referencia: (60 - 150)

Descripción: FACTOR XII EN PLASMA
Código: FACTORXII
Técnica: Método coagulométrico
Unidades: %
Plazo: 9 días
Tubo: Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:
Valores de referencia: (60 - 150)

Descripción: FACTOR XIII EN PLASMA
Código: FACTORXIII
Técnica: Método Inmunoturbidimétrico
Unidades: %
Plazo: 7 días
Tubo: Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional: 1 mL de plasma citrato refrigerado
Valores de referencia: (59 - 181)

Descripción: Fallo espermático tipo 8. Sec Gen: NR5A1
Código: GEN_000374
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Fallo ovárico precoz. Sec Gen: BMP15
Código: GEN_000375
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Fanconi-Bickel, Sd. Sec Gen: SLC2A2
Código: GEN_000376
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Farmacogenética del Clopidogrel: genotipos CYP2C19
Código: CLOPIDOGRE
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Farmacogenética del tamoxifeno: genotipos CYP2D6
Código: TAMOXIFENO
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Feingold, Sd. Sec Gen: MYCN
Código: GEN_000377
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: FENCICLIDINA EN ORINA CONFIRMACION
Código: FENCICONF
Técnica:

Descripción: FENCICLIDINA EN ORINA CONFIRMACION

Unidades:

Plazo: 12 días

Tubo: Orina pruebas referencia

Comentario adicional: 10 ML DE ORINA AISLADA

Valores de referencia: (Sup. 25) Positivo

Descripción: FENIL MERCAPTURICO EN ORINA

Código: FENILMERCA

Técnica: Cromatografía líquida/Espectrometría de masas tandem

Unidades: µg/g creatin.

Plazo: 12 días

Tubo: Orina Final de Jornada

Comentario adicional: 10 mL orina (micción aislada) al final de la jornada laboral con Cantidad. Refrigerar
Volumen mínimo: 5 mL

Valores de referencia: (Inf. 8) Valor límite biológico (VLB-INSST) Final jornada laboral (exposición BENCENO)
Límite de cuantificación: 5 µg/L

Descripción: Fenilalanina

Código: FENILALA

Técnica: Cromatografía líquida/Tándem masas (LC-MS/MS)

Unidades: mcmol/L

Plazo: 13 días

Tubo: Suero Congelado

Comentario adicional: 1 mL Suero CONGELADO. Indicar información clínica.

Valores de referencia: (28 - 80) < 2 años
(30 - 95) 2 años - 18 años
(35 - 80) > 18 años

Descripción: FENILALANINA ORINA

Código: FENILALA2

Técnica: Técnica Cromatografía Liquida/Tandem masas (LC-MS/MS)

Unidades: mcmol/g crea.

Plazo: 9 días

Tubo: Orina pruebas referencia

Comentario adicional: 10 mL orina (micción aislada).

Valores de referencia: (58 - 268) < 14 años
(39 - 81) > 14 años

Descripción: Fenilcetonuria. Sec Gen: PAH

Código: GEN_000378

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: FENITOINA LIBRE (DIFENILHIDANTOINA LIBRE)
Código: FENITOLI
Técnica: Técnica Ultrafiltración-Inmunoluminiscencia (Hasta el 19-03-2012 Tec. Ultracentrifugación/EIA)
Unidades: mcg/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 3 mL
Valores de referencia: (1.0 - 2.0)

Descripción: FENITOINA TOTAL (DIFENILHIDANTOÍNA TOTAL)
Código: FENITO
Técnica: Inmunoensayo
Unidades: µg/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (10 - 20) Rango Terapéutico

Descripción: FENOBARBITAL
Código: FENOBAR
Técnica: Inmunoensayo
Unidades: µg/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (15 - 40) Rango Terapéutico

Descripción: FENOLES LIBRES EN ORINA
Código: FENOLESLIB
Técnica: Cromatografía de gases
Unidades: mg/g creatin.
Plazo: 6 días
Tubo: Orina Final de Jornada
Comentario adicional: 10 mL de orina, micción aislada
Valores de referencia: (Inf. 20) Persona no expuesta
 (Inf. 40) Exposición (B.E.I.)

Descripción: FENOLES TOTALES ORINA
Código: FENOLES
Técnica: Téc. Cromatografía líquida de alta eficacia
Unidades: mg/g creatin.
Plazo: 11 días
Tubo: Orina Final de Jornada
Comentario adicional: Muestra de Orina Final de Jornada.
 5 mL Orina (Refrigerado) Toma muestra:Final de la jornada laboral.Refrigerar
Valores de referencia: (Inf. 120) VLB-INSHT. Final jornada laboral (Fenol)

Descripción: FENOTIPO ERITROCITARIO
Código: FENOERITRO

Descripción: FENOTIPO ERITROCITARIO
Técnica: Microtipaje en columnas
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: 5 mL EDTA
Valores de referencia:

Descripción: FENOTIPO Rh
Código: FENORH
Técnica: Microtipaje en columnas
Unidades:
Plazo:
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: 1 mL sangre total EDTA
Valores de referencia:

Descripción: FENTANILO CONFIRMACIÓN ORINA (LC-MS/MS)
Código: FENTANILOR
Técnica: Cromatografía líquida/Tándem masas (LC-MS/MS)
Unidades: ng/mL
Plazo: 7 días
Tubo:
Comentario adicional: 5 mL
Volumen mínimo 1 mL
Valores de referencia:

Descripción: FERRITINA
Código: FERRI
Técnica: ICMA
Unidades: ng/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL de suero
Valores de referencia: (21.81 - 274.66) Hombre > 15 años
(10 - 204.00) Mujer > 15 años
(200 - 600) 1 semana - 4 semanas
(50 - 200) 4 semanas - 5 meses
(7 - 140) 5 meses - 15 años

Descripción: FERRITINA GLUCOSILADA
Código: FERRIGLUKO
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 23 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 2 mL de suero. Evitar plasma (EDTA). La ferritina debe ser superior a 150 ng/mL
Valores de referencia: (20 - 200) mcg/L Ferritina
(50 - 80) % glicosilación

Descripción: Fertiscan Abortos Recurrentes, panel NGS
Código: ABORTRECUR
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Sangre EDTA Tª ambiente. Rotulado con BM
 Tubo exclusivo para esta determinación
Valores de referencia:

Descripción: Fertiscan Defectos maduración ovocitos, panel NGS
Código: MADUROVOCI
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Sangre EDTA Tª ambiente. Rotulado con BM
 Tubo exclusivo para esta determinación
Valores de referencia:

Descripción: Fertiscan Disgenesia ovarica, panel NGS
Código: DISGENOVAR
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Sangre EDTA Tª ambiente. Rotulado con BM
 Tubo exclusivo para esta determinación
Valores de referencia:

Descripción: Fertiscan Hiperestimulación ovarica, panel NGS
Código: ESTIMOVARI
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Sangre EDTA Tª ambiente. Rotulado con BM
 Tubo exclusivo para esta determinación
Valores de referencia:

Descripción: Fertiscan infertilidad Femenina, panel NGS
Código: INFERTFEM
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Sangre EDTA Tª ambiente. Rotulado con BM
 Tubo exclusivo para esta determinación
Valores de referencia:

Descripción: Fertiscan Infertilidad Masculina, panel NGS
Código: INFERTMASC
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Sangre EDTA T^a ambiente. Rotulado con BM
 Tubo exclusivo para esta determinación
Valores de referencia:

Descripción: Fertiscan Insuficiencia ovarica primaria, panel NGS
Código: INSUFOVARI
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Sangre EDTA T^a ambiente. Rotulado con BM
 Tubo exclusivo para esta determinación
Valores de referencia:

Descripción: Fertiscan Mortalida embrionaria previa implantacion, NGS
Código: IMPLANTEMB
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Sangre EDTA T^a ambiente. Rotulado con BM
 Tubo exclusivo para esta determinación
Valores de referencia:

Descripción: Fertiscan Ovario poliquistico, panel NGS
Código: OVARPOLIQ
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Sangre EDTA T^a ambiente. Rotulado con BM
 Tubo exclusivo para esta determinación
Valores de referencia:

Descripción: FIBRILARINA AC. SUERO
Código: FIBRILARAC
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL
Valores de referencia: Negativo

Descripción:	FIBRINOGENO
Código:	FIBRI
Técnica:	Método coagulométrico de Claus
Unidades:	mg/dL
Plazo:	3 días
Tubo:	Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:	Plasma citrato. (solución de citrato trisódico 0,109 M: 1 vol. de citrato por 9 vol. de sangre.)
Valores de referencia:	(200 - 400)

Descripción:	FIBRINOGENO (PROTEÍNA)
Código:	FIBRIPRO
Técnica:	Nefelometría
Unidades:	g/L
Plazo:	6 días
Tubo:	Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:	1 mL plasma
Valores de referencia:	(1.80 - 3.50)

Descripción:	Fibrodisplasia osificante progresiva. Sec Gen: ACVR1
Código:	GEN_000379
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Fibromialgia: mutación V185M gen COMT (sec. Sanger)
Código:	COMT_V185M
Técnica:	PCR y secuenciación
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato. Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente
Valores de referencia:	

Descripción:	Fibronectina en plasma
Código:	FIBRONEC
Técnica:	Nefelometría
Unidades:	mg/dL
Plazo:	4 días
Tubo:	Plasma CITRATO Refrigerado
Comentario adicional:	1 ml plasma de CITRATO congelado
Valores de referencia:	(25 - 40)

Descripción: Fibrosis cong. músculos extraoculares: <10 genes (NGS)
Código: FIB_MUSOCU
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.
Alternativa: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Fibrosis congénit músculos extraocul. Sec Gen: KIF21A
Código: GEN_000380
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Fibrosis congénit músculos extraocul. Sec Gen: TUBB2B
Código: GEN_000381
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Fibrosis Quística: 62 mutaciones gen CFTR
Código: FIBROPCR
Técnica: PCR-RLB
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Fibrosis quística: gen CFTR (NGS)
Código: FIBRO_SEC
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: FIEBRE AMARILLA AC IGG
Código: FAMARILIGG

Descripción: FIEBRE AMARILLA AC IGG
Técnica: Inmunofluorescencia indirecta
Unidades:
Plazo: 23 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: Positivo título >1:100

Descripción: FIEBRE AMARILLA AC IGM
Código: FAMARILIGM
Técnica: Inmunofluorescencia indirecta
Unidades:
Plazo: 23 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: Positivo título>1:10

Descripción: FIEBRE AMARILLA VACUNAL PCR LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
Código: FIAMAPCR
Técnica: RT-PCR
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: -Adjuntar historia clínica resumida, incluyendo si el paciente ha visitado otros países recientemente y un resumen de la sintomatología. Indicar fecha de la vacunación contra fiebre amarilla.
 Es para diagnóstico de reacciones adversas a la vacuna, no para casos de fiebre amarilla salvaje
-Volumen requerido: 1mL
-Condiciones de transporte: Enviar la muestra en un tubo estéril en un embalaje de seguridad biológica. A temperatura ambiente el mismo día de la obtención, CONGELADA si se remite al día siguiente.

Valores de referencia:

Descripción: Fiebre mediterránea familiar: gen MEFV (NGS)
Código: FIEBRE_MED
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Fiebre mediterránea familiar: gen MEFV (SANGER)
Código: MEFV_SANG
Técnica: Secuenciación Sanger
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: FILARIAS ANTICUERPOS
Código: FILARIAS

Descripción: FILARIAS ANTICUERPOS
Técnica: ELISA
Unidades: NTU
Plazo: 12 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml de suero. Refrigerado
 Puede tener reacciones cruzadas con otros parásitos.
Valores de referencia: (Inf. 9.00) Negativo

Descripción: Filarias DNA PCR
Código: FILARIAPCR
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: 2 mL sangre total (EDTA) para filariasis linfáticas (*Wuchereria bancrofti*) y subcutáneas (*Loa loa*).
 Exudado de lesiones cutáneas para *Onchocerca volvulus*
Valores de referencia:

Descripción: FILTRADO GLOMERULAR ESTIMADO (CKD-EPI CREATININA)
Código: FILTRACKD
Técnica: Fórmula
Unidades: mL/min/1.73m²
Plazo:
Tubo:
Comentario adicional: Asociado a realización de creatinina sérica
Valores de referencia: (Sup. 60)

Descripción: Filtrado glomerular estimado por Cistatina C
Código: FGECC
Técnica:
Unidades: mL/min/1.73m²
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: _COMENTARIODT
Valores de referencia:

Descripción: Filtrado glomerular estimado por Cistatina C
Código: FGECC
Técnica:
Unidades: mL/min/1.73m²
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: _COMENTARIODT
Valores de referencia:

Descripción: Filtrado glomerular estimado por Cistatina C
Código: FGECC
Técnica:
Unidades: mL/min/1.73m²

Descripción: Filtrado glomerular estimado por Cistatina C
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: _COMENTARIODT
Valores de referencia:

Descripción: Filtrado glomerular estimado por Cistatina C
Código: FGECC
Técnica:
Unidades: mL/min/1.73m²
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: _COMENTARIODT
Valores de referencia:

Descripción: Filtrado glomerular estimado por Cistatina C
Código: FGECC
Técnica:
Unidades: mL/min/1.73m²
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: _COMENTARIODT
Valores de referencia:

Descripción: Filtrado glomerular estimado por Cistatina C
Código: FGECC
Técnica:
Unidades: mL/min/1.73m²
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: _COMENTARIODT
Valores de referencia:

Descripción: Filtrado glomerular estimado por Cistatina C
Código: FGECC
Técnica:
Unidades: mL/min/1.73m²
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: _COMENTARIODT
Valores de referencia:

Descripción: Filtrado glomerular estimado por Cistatina C
Código: FGECC
Técnica:
Unidades: mL/min/1.73m²
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: _COMENTARIODT
Valores de referencia:

Descripción: Filtrado glomerular estimado por Cistatina C
Código: FGECC
Técnica:
Unidades: mL/min/1.73m²
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: _COMENTARIODT
Valores de referencia:

Descripción: Filtrado glomerular estimado por Cistatina C
Código: FGECC
Técnica:
Unidades: mL/min/1.73m²
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: _COMENTARIODT
Valores de referencia:

Descripción: Filtrado glomerular estimado por Cistatina C
Código: FGECC
Técnica:
Unidades: mL/min/1.73m²
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: _COMENTARIODT
Valores de referencia:

Descripción: Filtrado glomerular estimado por Cistatina C
Código: FGECC
Técnica:
Unidades: mL/min/1.73m²
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: _COMENTARIODT
Valores de referencia:

Descripción: FISH 13(q14) [delección 13q14]
Código: MDFISHDE13
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: FISH 5 SONDAS (ESPERMATOZOIDES)
Código: FISH5ESPER
Técnica: Hibridación in situ fluorescente (FISH)
Unidades:
Plazo: 15 días

Descripción: FISH 5 SONDAS (ESPERMATOZOIDES)
Tubo: Semen
Comentario adicional: Conservar en nevera
Valores de referencia:

Descripción: FISH 7 SONDAS (ESPERMATOZOIDES)
Código: FISH7ESPER
Técnica: Hibridación in situ fluorescente (FISH)
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Semen
Comentario adicional: Muestra de semen fresco o congelado liofilizar a temperatura ambiente (mantener en nevera hasta el momento de realizar el envío) liofilizar de un día para otro, entre lunes y jueves, evitando fines de semana y festivos. Las muestras deben ir acompañadas del
Valores de referencia:

Descripción: FISH 9 SONDAS (ESPERMATOZOIDES)
Código: FISH9ESPER
Técnica: Hibridación in situ fluorescente (FISH)
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Semen
Comentario adicional: Muestra de semen fresco o congelado liofilizar a temperatura ambiente (mantener en nevera hasta el momento de realizar el envío) liofilizar de un día para otro, entre lunes y jueves, evitando fines de semana y festivos. Las muestras deben ir acompañadas del
Valores de referencia:

Descripción: FISH delección región 5q31/5q33 (región control: 5p15)
Código: MDFISHDE5Q
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: FISH delección región 7q22;7q36 (región control: Cen7)
Código: MDFISHDE7Q
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: FISH delección TP53 (región: 17p13, región control: Cen17)
Código: MDFISHP53
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: FISH ganacia gen SRD (región: 1p36, región control: Cen1)
Código: MDFISHSRD
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: FISH gen de fusión BCR/ABL [translocación: t(9:22)]
Código: MDFISHT922
Técnica:
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: FISH reordenamiento gen IGH (región: 14q32)
Código: MDFISHIGH
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: FISH reordenamiento gen NTKR1
Código: MDFISHNTK1
Técnica:
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: FISH sonda centromérica (por centrómero analizado)
Código: MDFISHCEN
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: FISH sonda centromérica cromosoma 15
Código: MDFISHCE15
Técnica:
Unidades:
Plazo:

Descripción: FISH sonda centromérica cromosoma 15
Tubo:
Comentario adicional: Médula ósea
Valores de referencia:

Descripción: FISH sonda centromérica cromosoma 9
Código: MDFISHCEN9
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo:
Comentario adicional: Muestra médula ósea
Valores de referencia:

Código: FLAVIVIIGG
Descripción: FLAVIVIRUS MOSAICO 1 IGG
Técnica: IFI
Comentario adicional: 1 mL suero

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	TBEIGG			VIRUS TBE (PERFIL FLAVIVIRUS) IGG	Titulo	Negativo <1/10
Prueba	VFAIGG	77954-6		FLAVIVIRUS FIEBRE A (PERFIL FLAVIVIRUS) IGG		Negativo <1/10
Prueba	NILOOCIIGG	60030-4		VIRUS NILO OCCIDENTAL (PERFIL FLAVIVIRUS) IGG		Negativo <1/10
Prueba	ENJAPONIGG			VIRUS ENCEFALITIS JAPONESA (PERFIL FLAVOVIRUS) IGG		Negativo <1/10

Código: FLAVIVIIGM
Descripción: FLAVIVIRUS MOSAICO 1 IGM
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	TBEIGM	5009468		VIRUS TBE (PERFIL FLAVIVIRUS) IGM		Negativo <1/10
Prueba	VFAIGM	77955-3		FLAVIVIRUS FIEBRE A (PERFIL FLAVIVIRUS) IGM		Negativo <1/10
Prueba	NILOOCIIGM	31704-0		VIRUS NILO OCCIDENTAL (PERFIL FLAVIVIRUS) IGM		Negativo <1/10
Prueba	ENJAPONIGM			VIRUS ENCEFALITIS JAPONESA (PERFIL FLAVOVIRUS) IGM		Negativo <1/10

Descripción: FLECAINIDA (APOCARD)
Código: FLECAINIDA
Técnica: Téc. HPLC

Descripción:	FLECAINIDA (APOCARD)
Unidades:	µg/L
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero.Refrigerar No utilizar tubos con gel separador.
Valores de referencia:	(200 - 500) < 15 años Rango terapéutico en niños (300 - 800) > 15 años Rango terapéutico en adultos

Descripción:	FLUCONAZOL SUERO
Código:	FLUCONA
Técnica:	Cromatografía líquida/Tándem masas (LC-MS/MS)
Unidades:	mg/L
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	(2 - 15) (Sup. 20) Toxicidad

Descripción:	FLUNITRAZEPAM ORINA (ROHIPNOL)
Código:	FLUNITRAZE
Técnica:	Cromatografía líquida/tándem masas
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	10 mL de orina (micción aislada)
Valores de referencia:	Negativo

Descripción:	FLUOR SUERO
Código:	FLUORSUERO
Técnica:	Electrodo selectivo
Unidades:	µg/L
Plazo:	10 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	5 mL suero
Valores de referencia:	(Inf. 19) Valores de referencia indicativos (Inf. 76) Valores máximos recomendados (Inf. 950) Límite máximo aceptado tras medicación

Descripción:	FLUORURO ORINA FINAL DE JORNADA
Código:	FLUORURO
Técnica:	Electrodo selectivo
Unidades:	mg/L
Plazo:	7 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	Tubo 5 mL. Volumen 2.0 mL (Volumen mínimo 0,5 mL
Valores de referencia:	(Inf. 3.0) Final de jornada laboral. Valor Límite Biológico-VLB®

Código:	FLUOXETINA
Descripción:	FLUOXETINA (FLUOXETINA+NORFLUOXETINA) EN SUERO

Código: FLUOXETINA
 Técnica: LC-MS/MS
 Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	FLUOXE	3644-2		PERFIL FLUOXETINA (FLUOXETINA)	ng/mL	
Prueba	NORFLUOXE	3868-7		PERFIL FLUOXETINA (NORFLUOXETINA)	ng/mL	
Prueba	FLUOXSUMA	10339-0		PERFIL FLUOXETINA (FLUOXETINA TOTAL)	ng/mL	(200 - 1100) Valores terapéuticos indicativos (Sup. 2000) Niveles tóxicos

Descripción: FLURAZEPAM SUERO
 Código: FLURAZEPAM
 Técnica: Cromatografía líquida/Espectrometría de masas tandem (LC-MS/MS)
 Unidades: µg/L
 Plazo: 8 días
 Tubo: Suero Basal
 Comentario adicional: 0.5 mL suero SIN gel separador
 Volumen mínimo: 0.1 mL
 Valores de referencia: (75 - 165) Intervalo Terapéutico
 (Inf. 3) Límite de cuantificación
 (Sup. 330) Toxicidad

Descripción: FLUVOXAMINA SUERO
 Código: FLUVOXAMIN
 Técnica: CROMATOGRFÍA LÍQUIDA/TÁNDEM MASAS (LC-MS/MS)
 Unidades: ng/mL
 Plazo: 9 días
 Tubo: Suero Basal
 Comentario adicional: 2 mL suero.
 Valores de referencia: (50 - 900)

Código: FR
 Descripción: FORMULA SANGUINEA, RECUENTO TR
 Técnica:
 Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	HEMATIES	789-8		NUMERO TOTAL HEMATIES	10 ⁶ /µL	(4.60 - 6.20) Hombre (4.20 - 5.40) Mujer
Prueba	HGB	718-7		HEMOGLOBINA SANGRE	g/dL	(13.5 - 18) Hombre (12 - 16) Mujer
Prueba	HTO	4544-3		HEMATOCRITO SANGRE	%	(42 - 52) Hombre (37 - 47) Mujer

Componentes						
Prueba	VCM	787-2		VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO SANGRE	fL	(80 - 100) Hombre (80 - 100) Mujer
Prueba	HCM	785-6		HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MEDIA SANGRE	pg	(27 - 33) Hombre (27 - 33) Mujer
Prueba	CHCM	786-4		CHCM	g/dL	(31 - 35.5)
Prueba	RDW	788-0		RDW	%	(11 - 18)
Prueba	PLAQ	777-3		NUMERO TOTAL PLAQUETAS	10 ³ /μL	(130 - 450)
Prueba	VPM	32623-1		VPM	fL	(7 - 13)
Prueba	LEUCOCITOS	6690-2		NUMERO TOTAL LEUCOCITOS	10 ³ /μL	(4.00 - 11.00)
Prueba	LINFO	736-9		% LINFOCITOS	%	(16 - 45)
Prueba	MONO	5905-5		% MONOCITOS	%	(Inf. 12)
Prueba	SEG	770-8		% NEUTROFILOS	%	(35 - 70)
Prueba	EOS	713-8		% EOSINOFILOS	%	(Inf. 5)
Prueba	BASO	706-2		% BASOFILOS	%	(Inf. 1.5)
Prueba	CAYA	35332-6		% CAYADOS	%	
Prueba	SUMA			SUMA % FORMULA		
Prueba	STK1	18314-5		COMENTARIO 1 HEMATOLOGIA		
Prueba	STK2	18314-5		COMENTARIO 2 STKR		
Prueba	BASO#	704-7		Basofilos global	/μL	(Inf. 200)
Prueba	CAY#	30229-9		Cayados global	/μL	
Prueba	EOS#	711-2		Eosinofilos global	/μL	(Inf. 700) < 2 años (Inf. 650) 2 años - 5 años (Inf. 600) 5 años - 16 años (Inf. 800) > 16 años
Prueba	SEG#	751-8		Neutrófilos global	/μL	(1500 - 8500) < 16 años (1800 - 7500) > 16 años
Prueba	LINFO#	731-0		linfocitos global	/μL	(4000 - 10500) < 2 años (2000 - 8000) 2 años - 5 años (1500 - 6500) 5 años - 16 años (1000 - 4500) > 16 años
Prueba	MONO#	742-7		Monocitos global	/μL	(Inf. 800) < 16 años (200 - 1000) > 16 años

Descripción: FOSFATASA ACIDA PLASMA SEMINAL

Código: FACSEMEN

Técnica: Cinética

Unidades: kU/L

Plazo: 4 días

Tubo: Semen

Comentario adicional:

Valores de referencia: (280 - 994)

Descripción: FOSFATASA ACIDA PROSTATICA
Código: FACP
Técnica: ICMA
Unidades: ng/mL
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero.
 Fines de semana: enviar suero congelado
Valores de referencia: (Inf. 2.3)

Descripción: FOSFATASA ACIDA TARTRATO RESISTENTE
Código: FACTARRESI
Técnica: Espectrometría
Unidades: U/L (37°C)
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero. Refrigerar
Valores de referencia: (Inf. 3.90)

Descripción: FOSFATASA ACIDA TOTAL
Código: FACT
Técnica: Cinética
Unidades: U/L a 37 °C
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1ml de suero. Congelar si no se envía en el día.
Valores de referencia: (Inf. 4.5) Mujer
 (Inf. 5.5) Hombre

Descripción: FOSFATASA ALCALINA
Código: ALP
Técnica:
Unidades: U/L a 37°C
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (38 - 126) > 15 años
 (Inf. 373) Hombre < 15 años
 (Inf. 360) Mujer < 15 años

Descripción: FOSFATASA ALCALINA ISOENZIMA OSEA
Código: ALPISOEN
Técnica: CLIA
Unidades: mcg/L
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero, evitar plasma EDTA

Descripción:	FOSFATASA ALCALINA ISOENZIMA OSEA
Valores de referencia:	(25 - 221) Hombre < 2 años (27 - 148) Hombre 2 años - 9 años (35 - 169) Hombre 9 años - 13 años (13 - 111) Hombre 13 años - 17 años (Inf. 20) Hombre > 17 años (28 - 187) Mujer < 2 años (31 - 152) Mujer 2 años - 9 años (29 - 177) Mujer 9 años - 13 años (7 - 41) Mujer 13 años - 17 años (Inf. 14) Mujer > 17 años Premenopausia (Inf. 22) Mujer > 17 años Postmenopausia

Descripción:	FOSFATASAS ALCALINAS GRANULOCITICAS
Código:	FAGRANULO
Técnica:	Técnica Citoquímica
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	Heparina Litio
Comentario adicional:	2 mL de sangre total (heparina), ademas de 4 extensiones en porta, sin fijar, sangre nativa o con heparina. El EDTA interfiere en esta determinación.
Valores de referencia:	(20 - 120) Índice de actividad

Descripción:	FOSFATIDILETANOLAMINA AC IgG SUERO
Código:	FOSETANOLA
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	Indice
Plazo:	11 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero. REFRIGERAR.
Valores de referencia:	(Inf. 10) Negativo Los resultados positivos deben confirmarse en un plazo de 12 semanas

Descripción:	FOSFATIDILETANOLAMINA AC IgM SUERO
Código:	FOSETANOLM
Técnica:	EIA
Unidades:	Indice
Plazo:	11 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. REFRIGERAR.
Valores de referencia:	(Inf. 10) Negativo

Descripción:	FOSFATIDILINOSITOL AC Ig G SUERO
Código:	FOSFINOACG
Técnica:	EIA
Unidades:	Indice
Plazo:	12 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	(Inf. 10) Negativo

Descripción:	FOSFATIDILINOSITOL AC Ig M SUERO
Código:	FOSFINOACM

Descripción: FOSFATIDILINOSITOL AC Ig M SUERO
Técnica: EIA
Unidades: Índice
Plazo: 12 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: (Inf. 10) Negativo

Descripción: FOSFATIDILSERINA /PROTROMBINA AC. Ig G SUERO
Código: FOSFPROACG
Técnica:
Unidades: U/L
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero.
Valores de referencia: (Inf. 30) Negativo

Descripción: FOSFATIDILSERINA /PROTROMBINA AC. Ig M SUERO
Código: FOSFPROACM
Técnica:
Unidades: U/L
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL. Suero.
Valores de referencia: (Inf. 30) Negativo

Descripción: FOSFATIDILSERINA AC. IGG SUERO
Código: FOSFAACG
Técnica: EIA
Unidades: RLU/mL
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: (Inf. 12) Negativo

Descripción: FOSFATIDILSERINA AC. IGM SUERO
Código: FOSFAACM
Técnica: EIA
Unidades: RLU/mL
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: (Inf. 12) Negativo

Descripción: FOSFATIDILSERINA ANTICUERPOS IgA, SUERO
Código: AFOA
Técnica:
Unidades: RU/mL
Plazo: 8 días

Descripción: FOSFATIDILSERINA ANTICUERPOS IgA, SUERO
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero refrigerado
Valores de referencia: (Inf. 12) Negativo

Descripción: FOSFOETANOLAMINA ORINA
Código: FOSFOETANO
Técnica: Cromatografía líquida-Tándem masas
Unidades: mcmol/g creatin
Plazo: 12 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 10 mL orina (micción aislada)
Valores de referencia: (Inf. 150) < 14 años
 (Inf. 70) > 14 años

Descripción: Fosfohexosaisomerasa (PHI) en suero
Código: PHI
Técnica: Espectrometría de absorción molecular
Unidades: U/L
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: (26 - 110)

Descripción: FOSFOLIPASA A2 RECEPTOR (PLA2R) ANTICUERPOS
Código: PLA2R
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: Indice
Plazo: 11 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ML SUERO
Valores de referencia: (Inf. 0.69) Negativo
 (0.70 - 0.99) Indeterminado
 (Sup. 1.00) Positivo

Descripción: FOSFOLIPIDOS
Código: FOSFO
Técnica: Espectrofotometría Enzimática
Unidades: mg/dL
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: (125 - 366)

Descripción: FOSFORO
Código: P
Técnica:
Unidades: mg/dL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal

Descripción: FOSFORO

Comentario adicional:

Valores de referencia: (3.5 - 6.5) < 14 años
(2.5 - 5) 14 años - 70 años
(1.8 - 4.6) > 70 años

Descripción: FOSFORO ORINA

Código: P2

Técnica: Espectrofotometría

Unidades: g/24h

Plazo: 3 días

Tubo: Orina 24 Horas

Comentario adicional:

Valores de referencia: (Inf. 3)

Descripción: Fragmentación espermática cad. simple + cad. doble (COMET)

Código: FRAGM_SIMP

Técnica:

Unidades:

Plazo: 15 días

Tubo: Semen

Comentario adicional: Dpto. citogenética

Eyaculado tras 3, 4 días de abstinencia en tubo estéril sin ningún medio. Envío de la muestra CONGELADA. Contactar con logistica@megalab.es y genetica@megalab.es

Valores de referencia:

Descripción: Fragmentación espermática total (SCD)

Código: FRAGM_TOT

Técnica:

Unidades:

Plazo: 17 días

Tubo: Semen

Comentario adicional: Dpto. citogenética

Guardar en nevera (NO congelar). enviar de lunes a miércoles.

Valores de referencia:

Descripción: Fragmentación espermática total (SCD) + cadena doble (COMET)

Código: FRAGM_DC

Técnica:

Unidades:

Plazo: 15 días

Tubo: Semen

Comentario adicional: Dpto. citogenética

Eyaculado tras 3, 4 días de abstinencia en tubo estéril sin ningún medio. Envío de la muestra CONGELADA. Contactar con logistica@megalab.es y genetica@megalab.es

Valores de referencia:

Descripción: FRANCISELLA TULARENSIS AC. IGG SUERO (TULAREMIA)

Código: TULAREMACG

Técnica: ENZIMOINMUNOANÁLISIS

Descripción:	FRANCISELLA TULARENSIS AC. IGG SUERO (TULAREMIA)
Unidades:	U/mL
Plazo:	10 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero.
Valores de referencia:	(Inf. 10) Negativo (10 - 15) Indeterminado

Descripción:	FRANCISELLA TULARENSIS AC. IGM SUERO (TULAREMIA)
Código:	TULAREMACM
Técnica:	ENZIMOINMUNOANÁLISIS
Unidades:	U/mL
Plazo:	10 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero.
Valores de referencia:	(Inf. 10) Negativo (10 - 15) Indeterminado

Descripción:	FRANCISELLA TULARENSIS AC. SUERO (TULAREMIA)
Código:	TULAREMIAC
Técnica:	CLIA
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 0.9) Negativo (0.9 - 1.1) Indeterminado (Sup. 1.1) Positivo

Descripción:	Francisella Tularensis DNA PCR Cualitativa
Código:	FRANCISDNA
Técnica:	PCR
Unidades:	
Plazo:	10 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero. También válidas otros tipos de muestras.
Valores de referencia:	

Descripción:	Fraser, Sd. Sec Gen: FREM2
Código:	GEN_000382
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Freeman-Sheldon, Sd. Sec Gen: MYH3
Código:	GEN_000383
Técnica:	

Descripción: Freeman-Sheldon, Sd. Sec Gen: MYH3
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: FROTIS DE SANGRE PERIFERICA
Código: FROTIS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: EXTENSION FROTIS SANGUINEO
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: FRUCTOSA PLASMA SEMINAL
Código: FRUTOSASE
Técnica: Enzimática-Espectrofotometría ultravioleta
Unidades: mg/dL
Plazo: 5 días
Tubo: SEMEN CONGELADO
Comentario adicional: 1 mL de Plasma Seminal. Congelar y enviar congelado.
Valores de referencia: (150 - 500)

Descripción: FRUCTOSAMINA
Código: FRUC
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: µmol/L
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL de suero
Valores de referencia: (205 - 285)

Descripción: FSH
Código: FSH
Técnica: Técnica ICMA
Unidades: mU/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (3.03 - 8.08) Mujer > 14 años F. Folicular
(2.55 - 16.69) Mujer > 14 años Ovulacion
(1.38 - 5.47) Mujer > 14 años F. Luteinica
(26.72 - 133.41) Mujer > 14 años Post-menopausia
(0.95 - 11.95) Hombre > 14 años

Descripción: FTA
Código: FTA
Técnica: Aglutinación

Descripción: FTA
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero.
 Alternativa: plasma de EDTA
Valores de referencia: Negativo

Descripción: Fucosidosis. Sec Gen: FUCA1
Código: GEN_000384
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Fundus albipunctatus. Panel NGS
Código: GEN_000385
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Fundus flavimaculatus. Sec Gen: ABCA4
Código: GEN_000386
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: FUROSEMIDA SUERO
Código: FUROSEMIDA
Técnica: Cromatografía Líquida/ Tándem Masas (LC-MS/MS). Hasta la fecha 1 de Febrero se hacía por HPLC.
Unidades: mcg/mL
Plazo: 23 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 4) DESPUES DOSIS 40 mg

Descripción: GABA A (Subunid GABA-A) AC.antireceptor, LCR
Código: GABARALCR
Técnica: Técn. Cell Binding Assay Inmunofluorescencia indirecta
Unidades:
Plazo: 17 días

Descripción: GABA A (Subunid GABA-A) AC.antireceptor, LCR
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 mL LCR.
Valores de referencia: Negativo Título <1/2
 Positivo Título >0=1/2

Descripción: GABA A (Subunid GABA-A) AC.antireceptor, SUERO
Código: GABARASUE
Técnica: Cell Binding Assay Inmunofluorescencia indirecta
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL de suero
Valores de referencia: Negativo Título <1/10
 Positivo Título >0=1/10

Descripción: GABA B (Subunid GABARB1/B2) AC.antireceptor, LCR
Código: GABARBLCR
Técnica: Cell Binding Assay Inmunofluorescencia indirecta
Unidades:
Plazo: 16 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 ml LCR
Valores de referencia: Valores de referencia indicativos: se consideran niveles significativos a partir de título 1:2

Descripción: GABA B (Subunid GABARB1/B2) AC.antireceptor, Suero
Código: ANTIGABA
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: Negativo: Título < 1/10

Descripción: GABAPENTINA EN SUERO
Código: GABAPENTI
Técnica: Cromatografía Líquida Tándem Masas (LC-MS/MS).
Unidades: mg/L
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 mL suero. Congelar.

La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis.

Valores de referencia: (0.5 - 6.0) Índice terapéutico
 (Sup. 25.0) Toxicidad
 (Inf. 0.4) Límite de cuantificación

Descripción: GAD/65K AC. SUERO
Código: GAD_64KAC

Descripción: GAD/65K AC. SUERO
Técnica: ELISA
Unidades: UI/mL
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero/alt. plasma EDTA
Valores de referencia: (Inf. 10) Negativo

Descripción: GALACTOSA 1 FOSFATO, ERITROCITOS
Código: G1FOSFATO
Técnica: Enzimática
Unidades: µmol/g Hb
Plazo: 12 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: 5 mL sangre total (EDTA).
Envío inmediato. Evitar envío viernes y vísperas de festivo.
Enviar informe clínico(debe incluir edad, si toma lactosa, si presenta clínica hepática y/o cataratas).
Valores de referencia: (Inf. 0.20)
(Inf. 0.90) Valores de referencia en pacientes galactosémicos bajo tratamiento

Descripción: GALACTOSA EN PLASMA
Código: GALACTOSA
Técnica: Enzimática
Unidades: mcmol/L
Plazo: 12 días
Tubo: Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional: 1 mL plasma de EDTA. Enviar informe clínico (debe incluir edad, si toma lactosa, si presenta clínica hepática y/o cataratas. Envío inmediato, evitar envíos viernes y vísperas de festivos
Valores de referencia: (Inf. 300)

Descripción: GALACTOSA-1-FOSFATO URIDIL TRANSFERASA EN SANGRE
Código: GALAC1FURI
Técnica: Téc. Cromatografía líquida/Tándem masas (LC-MS/MS)
Unidades: mmol/h/g Hb
Plazo: 17 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 5 mL sangre total EDTA.
Envío inmediato (no viernes ni festivos) Se requiere información clínica (edad, si toma lactosa, si daño hepático, catarata)
Valores de referencia: (18 - 28)

Descripción: Galactosemia 3 Déficit UDP-galactosa-4epimeras. Gen: GALE
Código: GEN_000387
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Biología Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Galactosemia tipo 2. Sec Gen: GALK1
Código: GEN_000389

Descripción:	Galactosemia tipo 2. Sec Gen: GALK1
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Galactosemia. Panel NGS
Código:	GEN_000388
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Galactosemia: gen GALT (NGS)
Código:	GALT_MUTS
Técnica:	NGS con TSO Illumina
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	GAN AC. IGG
Código:	GANGQGDGG
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	17 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 0.90) Negativo (0.90 - 1.10) Indeterminado (Sup. 1.10) Positivo

Descripción:	GAN AC. IGM
Código:	GANGQGDGM
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	17 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 0.90) Negativo (0.90 - 1.10) Indeterminado (Sup. 1.10) Positivo

Descripción:	GANCICLOVIR PLASMA
Código:	GANCICLOVI

Descripción:	GANCICLOVIR PLASMA
Técnica:	Cromatografía líquida de alta resolución
Unidades:	mcg/mL
Plazo:	17 días
Tubo:	Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional:	2 mL plasma (EDTA). CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO. Evitar muestra de suero.
Valores de referencia:	(0.3 - 1.5) Valores terapéuticos indicativos
Descripción:	GANGLIÓNICO ACETILCOLINA RECEPALFA 3 AC. SUERO
Código:	GANGALFA3
Técnica:	Radioisotópica
Unidades:	pmol/L
Plazo:	35 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL de suero Indispensable nombre completo y fecha de nacimiento
Valores de referencia:	(Inf. 10) Negativo (10 - 14.9) Indeterminado (Sup. 15) Positivo
Descripción:	GANGLIOSIDOS MAS SULFATIDOS AC. IGM
Código:	GANGIGM
Técnica:	Inmunoblot
Unidades:	
Plazo:	17 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL
Valores de referencia:	
Descripción:	GANGLIOSIDOS GM1,GM2,GM3,GD1a,GD1b,GT1b,GQ1b IgG LCR
Código:	GANGLCR
Técnica:	Inmunoblot
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	LIQUIDO LCR INMUNO
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	NOTA: Mediante esta técnica se identifican los siguientes anticuerpos frente a los gangliósidos GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b.
Descripción:	GANGLIOSIDOS GM1,GM2,GM3,GD1a,GD1b,GT1b,GQ1b IgM LCR
Código:	GANMLCR
Técnica:	Inmunoblot
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	LIQUIDO LCR INMUNO
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	NOTA: Mediante esta técnica se identifican los siguientes anticuerpos frente a los gangliósidos GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b.

Código: GQ1BGD1BGM
Descripción: GANGLIÓSIDOS GQ1b + GD1b + GM1 ANTICUERPOS IgG SUERO
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	GANGGD1B	58971-3		PERFIL GD1B AC. IgG LCR (GANGLIOSIDO GD1B)		
Prueba	GANGGQ1B	58975-4		PERFIL GQ1B AC. IgG LCR (GANGLIOSIDO GQ1B)		
Prueba	GM1AGLCR			GM1ACLCR-ANTICUERPOS IG G ANTIGANGLIOSIDOS M1 EN LCR		

Código: GQ1BGD1BGM
Descripción: GANGLIÓSIDOS GQ1b + GD1b + GM1 ANTICUERPOS IgG SUERO
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	GANGGD1B	58971-3		PERFIL GD1B AC. IgG LCR (GANGLIOSIDO GD1B)		
Prueba	GANGGQ1B	58975-4		PERFIL GQ1B AC. IgG LCR (GANGLIOSIDO GQ1B)		
Prueba	GM1AGLCR			GM1ACLCR-ANTICUERPOS IG G ANTIGANGLIOSIDOS M1 EN LCR		

Descripción: GANGLIOSIDOS MAS SULFATIDOS AC. IGG
Código: GANGIGG
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL
Valores de referencia:

Descripción: GANGLIÓSIDOS PERFIL ANTICUERPOS IgG SUERO
Código: GANGLIOIGG
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml de suero
Valores de referencia:

Descripción: GANGLIÓSIDOS PERFIL ANTICUERPOS IgM SUERO
Código: GANGLIOIGM
Técnica: Immunoblot
Unidades:

Descripción: GANGLIÓSIDOS PERFIL ANTICUERPOS IgM SUERO
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia:

Descripción: Gangliosidosis tipo 1 (GM1): gen GLB1 (NGS)
Código: GM1_MUTS
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Gangliosidosis. Panel NGS
Código: GEN_000390
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación.
Tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Gardner, Sd. Sec Gen: APC
Código: GEN_000391
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Código: GASOMEARTE
Descripción: GASOMETRIA ARTERIAL
Técnica: Electrodo de estado sólido
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	PH_GASES	2744-1		PH, GASOMETRIA ARTERIAL		(7.35 - 7.45)
Prueba	PCO2	2019-8		PCO2, GASOMETRIA ARTERIAL	mm Hg	(35 - 45)
Prueba	PO2	2703-7		PO2, GASOMETRIA ARTERIAL	mm Hg	(73 - 105)
Prueba	HCO3	1960-4		BICARBONATO ACTUAL, GASOMETRIA ARTERIAL	mEq/L	(22 - 26)
Prueba	TCO2	2026-3		CO2 TOTAL, GASOMETRIA ARTERIAL	mEq/L	(23 - 27)

Componentes						
Prueba	BEB	1925-7		EXCESO DE BASES CELULARES, GASOMETRIA ARTERIAL	mEq/L	(-5 - 5)
Prueba	SO2C	2708-6		SATURACION DE O2, GASOMETRIA ARTERIAL	%	(95 - 100)

Código: GASOCORD
Descripción: GASOMETRÍA SANGRE CORDÓN
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	PHCORD			PH SANGRE DE CORDON		(7.18 - 7.45)
Prueba	PCO2CORD			PCO2 SANGRE DE CORDÓN		(32.4 - 56)
Prueba	PO2CORD			PO2 SANGRE DE CORDÓN		(5.6 - 30.4)
Prueba	HCO3CORD			HCO3 SANGRE CORDÓN		(17.3 - 27.3)
Prueba	EBCORD			EXCESO DE BASES SANGREN DE CORDÓN		(-6 - +2)

Código: GASOMEVENO
Descripción: GASOMETRIA VENOSA
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	PH_GASV	2746-6		PH, GASOMETRIA VENOSA		(7.30 - 7.42)
Prueba	PCO2V	2021-4		PCO2, GASOMETRIA VENOSA	mm Hg	(41 - 45)
Prueba	PO2V	2705-2		PO2, SANGRE VENOSA	mm Hg	(25 - 40)
Prueba	HCO3V	14627-4		BICARBONATO ACTUAL, GASOMETRIA VENOSA	mEq/L	(24 - 28)
Prueba	TCO2V	2027-1		CO2 TOTAL, GASOMETRIA VENOSA	mEq/L	(25 - 29)

Descripción: GASTRINA SUERO
Código: GASTRINA
Técnica: ICMA-Inmunoensayo quimioluminiscente
Unidades: pg/mL
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 ml de suero.

Separar el suero lo antes posible, congelar y enviar congelado. El paciente no debe tomar café y/o té durante el ayuno. El paciente no debe tomar antácidos durante las 24 horas previas al análisis. El paciente no debe fumar durante las 24 horas prev

Valores de referencia: (Inf. 16)

Descripción: Gaucher, enfermedad de. Sec Gen: GBA
Código: GEN_000392

Descripción:	Gaucher, enfermedad de. Sec Gen: GBA
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	
Descripción:	GAXILOSA EN ORINA (ACTIVIDAD LACTASAS INTESTINALES)
Código:	GAXILOSA
Técnica:	Espectrofotometría
Unidades:	g
Plazo:	5 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	Congelar la orina si va a pasar 24 horas hasta analisis. Anotar la diuresis
Valores de referencia:	(Sup. 37.87) (Inf. 37.87) Hipolactasia
Descripción:	Gen SCN5A (NGS)
Código:	SCN5A
Técnica:	PCR y secuenciación
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:	
Descripción:	Gen SHOX (NGS)
Código:	SHOX
Técnica:	PCR, secuenciación, y MLPA
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:	
Descripción:	Gen SHOX. Deleciones y Duplicaciones (MLPA) Talla Baja
Código:	SHOX_MLPA
Técnica:	MLPA
Unidades:	
Plazo:	20 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina y Citrato.
Valores de referencia:	
Descripción:	Genes COL6A1, COL6A2 y COL6A3 (NGS)
Código:	COLAG_MUTS

Descripción: Genes COL6A1, COL6A2 y COL6A3 (NGS)
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: GeneScreen Añadir pareja. Compatibilidad genetica/portadores
Código: GENEPAJEJA
Técnica:
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación sangre EDTA rotulado con BM.
Valores de referencia:

Descripción: GeneScreen Avanzado:400 gen Compat. genetica/portadores
Código: COMPATAVA
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 22 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Muestra: sangre EDTA
+ Hoja solicitud GeneScreen

Valores de referencia:

Descripción: GeneScreen Avanzado:400 gen Compat. genetica/portadores
Código: COMPATAVA
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 22 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Muestra: sangre EDTA
+ Hoja solicitud GeneScreen

Valores de referencia:

Descripción: GeneScreen Básico:120 gen Compatibilidad genetica/portadores
Código: COMPATBAS
Técnica: Ngs
Unidades:
Plazo: 22 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Muestra: sangre EDTA
+ hoja soliciutd genescreen

Valores de referencia:

Descripción: GeneScreen Completo: Exoma Compat. genetica/portadores
Código: COMPATCOMP
Técnica: NGS

Descripción: GeneScreen Completo: Exoma Compat. genetica/portadores
Unidades:
Plazo: 22 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Muestra: sangre EDTA BM
+ Hoja solicitud GeneScreen

Valores de referencia:

Código: PORTGSPLUS
Descripción: GeneScreen Plus Parejas: Compatibilidad genetica/portadores
Técnica:
Perfil para parejas que se realicen GenescreenPlus (2 pacietnes)
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación sangre EDTA rotulado con BM.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
	COMPATPLUS					
Prueba	GENEPAREJA			GeneScreen Añadir pareja. Compatibilidad genetica/portadores		

Descripción: Genoma completo: secuenciación
Código: GENOMA
Técnica:
Unidades:
Plazo: 60 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Genoma madre, padre e hijo (NGS)
Código: GENOMA_TRI
Técnica:
Unidades:
Plazo: 60 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: GENOSPORT CARDIO COMPLET: GENES ASOCIADOS A CARDIOPATIAS
Código: GENSPORTCA
Técnica:
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional: Kit especial. Solicitar a almacén
Valores de referencia:

Descripción: GENOSPORT ENTRENAMIENTO COMPLET: GENES ASOCIADOS A EFICIENCIA
Código: GENSPONENT
Técnica:
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional: Kit especial. Solicitar a almacén
Valores de referencia:

Descripción: GENOSPORT LESIONES COMPLET: GENES ASOCIADOS A LESIONES
Código: GENSPORLES
Técnica:
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional: Kit especial. Solicitar a almacén
Valores de referencia:

Descripción: GENOTIPO ABO (GRUPO SANGUINEO) POR PCR-SSP
Código: GENOTIPABO
Técnica: PCR-SSP
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 5 mL sangre total EDTA
Valores de referencia:

Descripción: Genotipo alfa-1 antitripsina
Código: PIGENOTIPO
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Biología Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente
Valores de referencia:

Descripción: Genotipo apolipoproteína E (sec. Sanger)
Código: APOE_PCR
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Biología Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato
Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente
Valores de referencia:

Descripción: Genotipo de receptores KIR en sangre
Código: GENOKIR

Descripción:	Genotipo de receptores KIR en sangre
Técnica:	Tipaje mediante el uso de sondas específicas SSO (Sequence Specific Oligonucleotide) unidas a microesferas Luminex (Lifecodes, Inmucor).
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	GENOTIPO DE RESISTENCIAS HIV-1
Código:	VIH1MUT
Técnica:	RT-PCR y secuenciación
Unidades:	
Plazo:	24 días
Tubo:	Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional:	Plasma de EDTA -CONGELAR Alternativa: sangre total EDTA refrigerado.
Valores de referencia:	

Descripción:	GENTAMICINA
Código:	GENTA
Técnica:	Inmunoensayo
Unidades:	mcg/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(6.0 - 10.0) Pico (Sup. 12.0) Asociado a Toxicidad-Pico (6.0 - 8.0) Pico- Infecciones graves (8.0 - 10.0) Pico-Infecciones muy graves (0.5 - 2.0) Valle (Sup. 2.0) Asociado a Toxicidad-Valle (0.5 - 1.5) Valle-Infecciones graves (1.0 - 2.0) Valle- Infecciones muy graves

Descripción:	Gerstmann-Straussler, Sd. Sec Gen: PRNP
Código:	GEN_000395
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	GFAP ANTICUERPOS SUERO
Código:	GFAP
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	32 días

Descripción: GFAP ANTICUERPOS SUERO
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml LCR
Valores de referencia:

Descripción: GFAP ANTICUERPOS SUERO
Código: GFAP
Técnica:
Unidades:
Plazo: 32 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml LCR
Valores de referencia:

Descripción: GGT
Código: GGT
Técnica:
Unidades: U/L a 37 °C
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (12 - 64) Hombre
(9 - 36) Mujer

Descripción: GHRELINA EN SUERO
Código: GHRELINA
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: pg/mL
Plazo: 23 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 ml de suero congelado.
Valores de referencia: (520 - 700) Individuos con peso normal
(340 - 450) Individuos obesos antes de la dieta
(450 - 600) Individuos obesos tras tratamiento dietético
(Inf. 120) Individuos obesos tras bypass gástrico

Descripción: GHRH (Growth Hormone Releasing Hormone) en plasma
Código: GHRH
Técnica: Radioinmunoensayo
Unidades: ng/L
Plazo: 26 días
Tubo: Plasma trasylol/aprotinina
Comentario adicional: 2mL plasma-EDTA con aprotinina (TRASYLOL). CONGELAR INMEDIATAMENTE Y ENVIAR CONGELADO. Envío tubo independiente del resto de pruebas.
Valores de referencia: (Inf. 60)

Descripción: GIARDIA LAMBLIA EN HECES PCR
Código: GIARDIAPCR
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 12 días

Descripción: GIARDIA LAMBLIA EN HECES PCR
Tubo: heces especiales
Comentario adicional: 10 g heces (REFRIGERADO)
Valores de referencia:

Descripción: GIARDIA LAMBLIA IgA (EIA) ANTICUERPOS, SUERO
Código: GIARAE
Técnica: EIA
Unidades: U/mL
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero Refrigerado.
Valores de referencia: (Inf. 5) Negativo

Descripción: GIARDIA LAMBLIA IGG AC
Código: LAMBLIAAC
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: U/mL
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL suero
Volumne mínimo: 0.2 mL
Valores de referencia: (Inf. 10) Negativo

Descripción: GIARDIA LAMBLIA IgM (EIA) ANTICUERPOS, SUERO
Código: GIARME
Técnica: EIA
Unidades: U/mL
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero refrigerado.
Valores de referencia: (Inf. 25) Negativo

Descripción: GIARDIA LAMBLIA TEST RAPIDO
Código: GIARDIAAG
Técnica: Inmunocromatografía
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Heces No Microbiología
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Gilbert, Sd. Sec Gen: UGT1A1
Código: GEN_000396
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Gilles de la Tourette, Sd. Sec Gen: SLITRK1
Código: GEN_000699
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: GIST · KIT(9, 11, 13, 17), PDGFRA(12, 14, 18) · HOT SPOT
Código: GIST_MUTS
Técnica: SANGER - HOT SPOT
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: 1 Pieza/s Tejido parafinado [Tªambiente] (Estabilidad: 20°C:1 Años)
Valores de referencia:

Descripción: GIST · KIT(9, 11, 13, 17), PDGFRA(12, 14, 18) · HOT SPOT
Código: GIST_MUTS
Técnica: SANGER - HOT SPOT
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: 1 Pieza/s Tejido parafinado [Tªambiente] (Estabilidad: 20°C:1 Años)
Valores de referencia:

Descripción: GLANDULA SALIVAR ANTICUERPOS
Código: GLANDUSAAC
Técnica: IFI
Unidades: Titulo
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL Suero (Refrigerado)
Valores de referencia: Negativo <1/5
 Positivo >1/5

Descripción: Glaucoma congénito. Sec Gen: CYP1B1
Código: GEN_000397
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Glaucoma congénito. Sec Gen: MYOC
Código: GEN_000398
Técnica:
Unidades:

Descripción: Glaucoma congénito. Sec Gen: MYOC
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Glaucoma congénito. Sec Gen: OPTN
Código: GEN_000399
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Glaucoma exfoliativo: gen LOXL1 polimorfismos (sec. Sanger)
Código: GLAUCO_EXF
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Glaucoma por pseudoexfoliación. Sec Gen: LOXL1
Código: GEN_000400
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: GLIADINA AC. IGA SUERO
Código: GLIADIACA
Técnica: Téc. EIA
Unidades: U/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 7) Negativo
 (7 - 10) Indeterminado

Descripción: GLIADINA AC. IGG SUERO
Código: GLIADIACG
Técnica: Téc. EIA
Unidades: U/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal

Descripción: GLIADINA AC. IGG SUERO
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 7) Negativo
 (7 - 10) Indeterminado

Descripción: GLICINA ANTICUERPOS RECEPTORES NEURONALES
Código: GLICINAACN
Técnica: Inmunohistoquímica
Unidades:
Plazo: 23 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1mL suero refrigerado
Valores de referencia:

Descripción: GLICOPROTEINAS DE MEMBRANA PLAQUETAR SANGRE TOTAL
Código: GLICOPLAQ
Técnica: CITOMETRÍA DE FLUJO
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 10 mL sangre total (EDTA). Envío inmediato a temperatura ambiente. Indispensable información clínica
Valores de referencia:

Código: GAGS
Descripción: GLICOSAMINOGLICANOS (GAGS): DERMATÁN HEPARÁN QUERATÁN
Técnica: Cromatografía líquida/Tándem masas (LC-MS/MS)
Comentario adicional: 10 mL orina. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.INDISPENSABLE enviar historia clínica

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	DERMATAN			PERFIL DERMATÁN SULFATO	mg/g creatinina	(Inf. 22) < 3 años (Inf. 18) 4 años - 13 años (Inf. 9) > 13 años
Prueba	HEPARAN			PERFIL HEPARÁN SULFATO	mg/g creatinina	(Inf. 10) < 3 años (Inf. 8) 4 años - 13 años (Inf. 5) > 13 años
Prueba	QUERATAN			PERFIL QUERATÁN SULFATO	mg/g creatinina	(Inf. 20) < 3 años (Inf. 10) 4 años - 13 años (Inf. 5) > 13 años

Descripción: Glioma Hereditario
Código: GLIOMAH
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Biología Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Valores de referencia:

Descripción: Glomeruloesclero focal y segmentaria / Sd.nefrótico. Panel
Código: GEN_000401

Descripción: Glomeruloesclero focal y segmentaria / Sd.nefrótico. Panel

Técnica:

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: GLUCAGON PLASMA

Código: GLUCAGON

Técnica: Técnica RIA

Unidades: pg/mL

Plazo: 9 días

Tubo: Plasma trasylol/aprotinina

Comentario adicional: Tubo especial con aprotinina (TRASYLOL). 2 mL plasma EDTA con Aprotinina, separar y congelar inmediatamente (mínimo: 0.50mL)

Valores de referencia: Ayuno mínimo de 12 horas.
(Inf. 208)

Descripción: Glucogenosis de corazón, letal. Sec Gen: PRKAG2

Código: GEN_000402

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Glucogenosis tipo III: gen AGL (NGS)

Código: AGL_MUTS

Técnica:

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Glucogenosis tipo V: mutaciones R49X, G204S y W797R gen PYGM

Código: MCARDLE

Técnica: PCR y secuenciación

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Glucogenosis. Enf. almace.glucógeno lisosómico. Gen: LAMP2

Código: GEN_000338

Descripción: Glucogenosis. Enf. almace.glucógeno lisosómico. Gen: LAMP2

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Glucogenosis. Enferm.del almacenamiento de glucógeno. Panel

Código: GEN_000324

Técnica:

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: GLUCOSA

Código: GLU

Técnica: Espectrofotometría

Unidades: mg/dL

Plazo: 3 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 0.5 mL de suero o plasma con fluoruro o heparina

Valores de referencia: (60 - 100)

Descripción: GLUCOSA EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO

Código: LIQLCGLU

Técnica: Espectrofotometría

Unidades: mg/dL

Plazo: 3 días

Tubo: Líquido Bioquímica

Comentario adicional:

Valores de referencia: (50 - 80)

Descripción: GLUCOSA FOSFATO ISOMERASA (GPI) SANGRE TOTAL

Código: GPI_ERIT

Técnica: Espectrofotometría

Unidades: UI/g Hb

Plazo: 17 días

Tubo: Heparina Litio

Comentario adicional: 5 mL sangre total (heparina). También válida sangre (EDTA). Envío inmediato de Lunes a Miercoles. Avisar previamente.

Valores de referencia: (46 - 66)

Descripción: GLUCOSA ORINA (GLUCOSURIA) EN ORINA DE 24 HORAS

Código: GLU2

Técnica: Espectrofotometría

Unidades: g/24h

Plazo: 3 días

Tubo: Orina Bioquímica

Descripción: GLUCOSA ORINA (GLUCOSURIA) EN ORINA DE 24 HORAS
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 0.5) Negativo

Descripción: GLUCOSA POSTPRANDIAL 1 HORA SUERO
Código: GLUPOST1H
Técnica:
Unidades: mg/dL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero 60 Minutos
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 180)

Descripción: GLUCOSA POSTPRANDIAL 2 HORAS SUERO
Código: GLUPOST2H
Técnica:
Unidades: mg/dL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero 120 minutos
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 140)

Descripción: GLUCOSA TRAS INGESTA DE 50 G. DE GLUCOSA
Código: GLUINGESTA
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: mg/dL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero 60 Minutos
Comentario adicional: 1h. tras ingesta de 50 g. de glucosa
Valores de referencia: (Inf. 140) Raza blanca
 (Inf. 130) Raza negra
 (Inf. 145) Filipinas
 (Inf. 150) Asiáticas

Descripción: GLUCOSA-6-P-DESHIDROGENASA, SANGRE
Código: G6PDB
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: U/g Hb
Plazo: 3 días
Tubo: Sangre EDTA Colinesterasa
Comentario adicional: 1 mL sangre total EDTA refrigerado. NO congelar
 Evitar extracciones en vísperas de festivos
Valores de referencia: (Sup. 9.52) Hombre Normal
 (Inf. 2.71) Hombre Deficiente
 (Sup. 10.22) Mujer Normal
 (Inf. 2.95) Mujer Deficiente

Descripción: GLUTAMATO DEHIDROGENASA (GDH) CLOSTRIDIUM DIFFICILE
Código: GDHCLOST
Técnica: Inmunocromatografía
Unidades:

Descripción: GLUTAMATO DEHIDROGENASA (GDH) CLOSTRIDIUM DIFFICILE
Plazo: 4 días
Tubo: Heces Microbiología
Comentario adicional: Heces
Valores de referencia:

Descripción: Glutamato Deshidrogenasa (GLDH) (alfa cetoglutarato)
Código: GLDH
Técnica: Cinética
Unidades: U/L a 37 °C
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml suero
Valores de referencia: (Inf. 7) Hombre
(Inf. 5) Mujer

Descripción: Glutation oxidado
Código: GLUOX
Técnica: ICP-MS
Unidades: µmol/L
Plazo: 39 días
Tubo: KIT DE ENSAYOS CLINICOS
Comentario adicional: Suero. KIT especial. CONGELAR

Se precisa KIT ESPECÍFICO. Obtener 8 ml de suero en un tubo facilitado y mezclar por inversión como máximo 5 veces. Centrifugar 10 min a 3000 rpm durante la hora siguiente a la obtención de la muestra. Transferir 500 µl de suero claro por análisis (g)

Kit Ref SAP: 600063597

Valores de referencia: (0.16 - 0.50)

Código: GLUO
Descripción: GLUTATION OXIDADO-REDUCIDO en suero
Técnica: ICP-MS/MS
Comentario adicional: Se precisa KIT ESPECÍFICO. CONGELAR.
Los centros propios lo pueden pedir por email y los clientes externos via enlace web de pedidos dentro de la ventana de "materiales fuera de plantilla"
Obtener 8 ml de suero en un tubo facilitado y mezclar por inversión como máximo 5 veces. Centrifugar 10 min a 3000 rpm durante la hora siguiente a la obtención de la muestra. Transferir 500 µl de suero claro por análisis (glutación total, glutatón o
Kit Ref SAP: 600063597

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	GLUOX	79600-3		Glutation oxidado	µmol/L	(0.16 - 0.50)
Prueba	GLURE	79600-3		Glutation reducido	µmol/L	(3.80 - 5.50)

Descripción: GLUTATION PEROXIDASA ERITROCITARIA
Código: GLUTATION
Técnica: Téc. espectrofotometría ultravioleta
Unidades: U/g Hb
Plazo: 18 días
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional: 1 mL sangre total heparina
Valores de referencia: (27.5 - 73.6)

Descripción: Glutation reducido
Código: GLURE
Técnica: ICP-MS
Unidades: $\mu\text{mol/L}$
Plazo: 39 días
Tubo: KIT DE ENSAYOS CLINICOS
Comentario adicional: Suero. KIT especial. CONGELAR

Se precisa KIT ESPRCEP20. Obtener 8 ml de suero en un tubo facilitado y mezclar por inversión como mínimo 5 veces. Centrifugar 10 min a 2000 rpm durante la hora siguiente a la obtención de la muestra. Transferir 500 μl de suero claro por análisis (4

Kit Ref SAP: 600063597

Valores de referencia: (3.80 - 5.50)

Descripción: Glutation Reductasa
Código: GLUTAREduc
Técnica: Espectrometría de Absorción Molecular
Unidades: ng/mL
Plazo: 22 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 mL suero. Congelar inmediatamente
Valores de referencia: (33 - 73)

Descripción: GM1 AC. IgM LCR (GANGLIOSIDO M1)
Código: GM1ACLCR
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: LIQUIDO LCR INMUNO
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: GM1 AC.IgM SUERO (GANGLIOSIDOS M1)
Código: GM1AC
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 11 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: Negativo

Descripción: GM1ACLCR-ANTICUERPOS IG G ANTIGANGLIOSIDOS M1 EN LCR
Código: GM1AGLCR
Técnica:
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: LIQUIDO LCR INMUNO
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: GOBLET CELLS ANTICUERPOS IGG EN SUERO
Código: GOBLETACG

Descripción: GOBLET CELLS ANTICUERPOS IGG EN SUERO
Técnica: Técnica IFI
Unidades: Título
Plazo: 45 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: Negativo Título < 1:10

Descripción: GONOCOCO ANTIGENO MUESTRA GENITAL (TEST RAPIDO)
Código: GONOCOCO
Técnica: Inmunocromatografía
Unidades:
Plazo: 1 días
Tubo: Muestra Microbiología
Comentario adicional: Exclusivamente muestras genitales: uretral, cervical y vaginal, obtenidas con la misma TORUNDA ESPECIAL que Chlamydia (de rayón o tacron). No admite torunda de algodón.
Valores de referencia:

Descripción: GPT (VITROS)
Código: GPTV
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: U/L a 37 °C
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL suero
 Alternativa sangre total Heparina de litio
Valores de referencia: (0 - 50) Hombre
 (0 - 35) Mujer

Descripción: GRASA TOTAL EN HECES (ESTEATORREA)
Código: GRASAHEC
Técnica: Espectrofotometría de infrarrojos
Unidades: g/100g
Plazo: 10 días
Tubo: heces especiales
Comentario adicional: 5 g de heces. REFRIGERAR.
 Las heces deben recogerse en un recipiente limpio y seco. Evite la contaminación con orina o papel.
 Recoger una muestra de las heces, del tamaño mínimo de una nuez, excretadas durante 3 días.
 Es necesario mantener la muestra refrigerada dentro de los contenedores adecuados, hasta la entrega en el laboratorio.
 Dieta con contenido normal de grasas 3 días antes y posterior a la recogida.
 NO utilizar enemas, laxantes, o aceites minerales y es conveniente no estar en tratamiento con antibiótico.
 Evitar que la toma de muestra coincida con la administración de algún contraste para exploración radiológica.
Valores de referencia: (Inf. 20)

Descripción: Greig, Sd. Sec Gen: GLI3
Código: GEN_000405
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días

Descripción: Greig, Sd. Sec Gen: GLI3
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: GRIPE A/H1N1 AC. SUERO
Código: GRIPEAAC
Técnica: Hemaglutinación.
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL .
Valores de referencia:

Descripción: Griscelli, Sd. Panel NGS
Código: GEN_000406
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: GRUPO SANGUINEO
Código: GS
Técnica: Aglutinación
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: Sangre total EDTA. También se admite citrato
Valores de referencia:

Descripción: GRUPO SERICO
Código: GSSERICO
Técnica:
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: GUANIDINOACETATO
Código: ACGUANIAC
Técnica: HPLC-Espectrometría de masas
Unidades: mmol/mol creat.
Plazo: 10 días
Tubo: Orina congelada
Comentario adicional: 15 ml de Orina CONGELADA
 Se requiere Fecha de nacimiento e información clínica

Descripción: GUANIDINOACETATO

Valores de referencia: (9 - 200) < 4 años
(12 - 127) 4 años - 12 años
(8 - 68) > 12 años

Descripción: HA ANTICUERPOS(TIROSIL-TRNA SINTETASA) EN SUERO

Código: HAAC

Técnica:

Unidades:

Plazo: 11 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: Suero

Valores de referencia:

Descripción: HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO b AC.IGG SUERO

Código: HAEMOBIGG

Técnica: EIA

Unidades: mcg/mL

Plazo: 8 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 1.0 mL (mínimo 0.5 mL)

Valores de referencia: (Sup. 1) Niveles protectores

Descripción: Haemophylus ducreyi DNA PCR muestra

Código: HAEMDUCPCR

Técnica: HIBRIDACIÓN MOLECULAR (PCR) A TIEMPO REAL

Unidades:

Plazo: 10 días

Tubo: Muestra Biología Molecular

Comentario adicional: 1 ml orina-REFRIGERAR
2 exudados genitales-REFRIGERAR

Valores de referencia: Valor de referencia: No se detecta

Descripción: HALOPERIDOL SUERO

Código: HALOPERI

Técnica: LC-MS/MS

Unidades: µg/L

Plazo: 8 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 0.5 mL Suero (Refrigerado)
Alt. 0.5 mL Plasma de EDTA (Refrigerado)

Refrigerar
Volumen mínimo
0,1 mL

Se aconseja toma de muestra 12 horas después de la última dosis.

El contenedor recomendado es el tubo seco (con gel separador) para evitar procesos de adsorción del fármaco. En caso de no disponer de tubo seco, la extracción se puede realizar en tubo con gel separador, separando el suero dentro de las 2 horas post-toma.

Valores de referencia: (5.0 - 17) Intervalo Terapéutico

Descripción: HANTAVIRUS ANTICUERPOS IgG, SUERO

Código: HANTA

Descripción: HANTAVIRUS ANTICUERPOS IgG, SUERO
Técnica: EIA
Unidades: Titulo
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero.
 Refrigerar
 Rogamos adjunten edad e información clínica del paciente indicando sospecha de patología renal o respiratoria.
 Para valoración clínica del paciente se recomienda la determinación simultánea de IgM e IgG.

Valores de referencia: Título <1/100: Negativo

Descripción: HANTAVIRUS ANTICUERPOS IgM, SUERO
Código: HANTAM
Técnica: IFI
Unidades: Titulo
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero. refrigerar.
 Rogamos adjunten edad e información clínica del paciente indicando sospecha de patología renal o respiratoria.
 Para valoración clínica del paciente se recomienda la determinación simultánea de IgM e IgG.

Valores de referencia: Título <1/100: Negativo

Descripción: HAPTOGLOBINA
Código: HAPTO
Técnica: Turbidimetría
Unidades: mg/dL
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL suero.
 Alternativa plasma EDTA/heparina.

Valores de referencia: (30 - 200)

Descripción: HARMONY MÁS DELECCIÓN 22q11.2
Código: HARMON22Q
Técnica: Microarray
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Prenatal
Comentario adicional: Tubo Roche cfDNA.

Valores de referencia:

Descripción: HARMONY TEST PRENATAL (T21, T18, T13)
Código: HARMOBASIC
Técnica: Microarray
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Prenatal
Comentario adicional: Tubo Roche cfDNA.

Valores de referencia:

Descripción: HARMONY TEST PRENATAL CON ANEUPLOIDIAS SEXUALES
Código: HARMONANEU
Técnica: Microarray
Unidades:
Plazo:
Tubo: Prenatal
Comentario adicional: Tubo Roche cfDNA.
Valores de referencia:

Descripción: HARMONY TEST PRENATAL CON MONOSOMÍA X
Código: HARMONMONX
Técnica: Microarray
Unidades:
Plazo:
Tubo: Prenatal
Comentario adicional: Tubo Roche cfDNA.
Valores de referencia:

Descripción: HARMONY TEST PRENATAL CON SEXO FETAL
Código: HARMONSEXO
Técnica: Microarray
Unidades:
Plazo:
Tubo: Prenatal
Comentario adicional: Tubo Roche cfDNA.
Valores de referencia:

Descripción: Hay-Wells; Sd.AEC, Sd. Sec Gen: TP63
Código: GEN_000407
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Biología Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: HBV DNA PCR Cualitativa (hepatitis B)
Código: HBDNA
Técnica: PCR
Unidades: UI/mL
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Tubo SUERO. Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato.
Valores de referencia: Valor de referencia: No se detecta
 (Inf. 3) Límite de detección

Descripción: HBV DNA PCR Cuantitativa (hepatitis B)
Código: DNAHBHIB
Técnica: RT-PCR
Unidades: UI/mL

Descripción:	HBV DNA PCR Cuantitativa (hepatitis B)
Plazo:	10 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Tubo de SUERO. Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Valores de referencia:	(Inf. 3) Límite de detección (10 - 1000000000) Rango de medida
Descripción:	HBV DNA PCR mutaciones gen HBpol (hepatitis B)
Código:	HBVMUT
Técnica:	PCR y secuenciación
Unidades:	
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Biología Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Plasma EDTA CONGELADO Cantidad
Valores de referencia:	
Descripción:	HBV DNA Semen PCR Cualitativa (hepatitis B)
Código:	DNABSEME
Técnica:	RT-PCR
Unidades:	
Plazo:	12 días
Tubo:	Semen
Comentario adicional:	Semen fresco y lavado o solo fresco Hablar con Diagnóstico Molecular antes de hacer el envío. Condiciones especiales. Las muestras tienen que enviarse congeladas en nieve carbónica.
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta
Descripción:	HCG POR VIDAS (GONADOTROFINA CORIONICA)
Código:	HCG
Técnica:	Técnica ELFA
Unidades:	mU/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 4) Mujer (1500 - 23000) Mujer 4- 5 semanas (3400 - 135300) Mujer 5-6 semanas (10500 - 161000) Mujer 6- 7 semanas (18000 - 209000) Mujer 7- 8 semanas (37500 - 219000) Mujer 8- 9 semanas (42800 - 218000) Mujer 9- 10 semanas (33700 - 218700) Mujer 10-11 semanas (21800 - 193200) Mujer 11- 12 semanas (20300 - 166100) Mujer 12-13 semanas (15400 - 190000) Mujer 13-14 semanas (2800 - 176100) Mujer 2º trimestre (14-26) (2800 - 144400) Mujer 3º trimestre (26-39)
Descripción:	HCG-BETA LIBRE SUERO
Código:	BETAHCGL
Técnica:	ICMA

Descripción: HCG-BETA LIBRE SUERO
Unidades: ng/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero. No hay muestra alternativa.
Valores de referencia: 55.13 ng/mL -Embarazo - 8 semanas
 72.55 ng/mL -Embarazo - 9 semanas
 60.67 ng/mL-Embarazo - 10 semanas
 44.54 ng/mL -Embarazo - 11 semanas
 34.33 ng/mL-Embarazo - 12 semanas
 28.82 ng/mL-Embarazo - 13 semanas

Descripción: HCV RNA RT-PCR Cualitativa (hepatitis C)
Código: HCRNA
Técnica: RT-PCR
Unidades: UI/mL
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Tubo de SUERO. Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, si pasar por ningún aparato.
Valores de referencia: Valor de referencia: No se detecta
 (Inf. 8.46) Límite de detección

Descripción: HCV RNA RT-PCR Cuantitativa (hepatitis C)
Código: RNACCUAN
Técnica: RT-PCR cuantitativa
Unidades: UI/mL
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Tubo de Suero. Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato.
Valores de referencia: (Inf. 8.46) Límite de detección
 (15 - 100000000) Rango de medida

Descripción: HCV RNA RT-PCR Genotipo (hepatitis C)
Código: VHC
Técnica: RTPCR
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional: Plasma de EDTA separado y congelado y rotulado con BM.
Valores de referencia: Observaciones: Se identifican los subtipos;1,1a, 2 (2a/2b), 3, 4, 5a y 6

Descripción: HCV RNA Semen RT-PCR Cualitativa (hepatitis C)
Código: RNACSEME
Técnica: RT-PCR
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Semen
Comentario adicional: Semen fresco y lavado o solo fresco
 Hablar con Diagnóstico Molecular antes de hacer el envío. Condiciones especiales.
 Las muestras tienen que enviarse congeladas en nieve carbónica.

Descripción: HCV RNA Semen RT-PCR Cualitativa (hepatitis C)

Valores de referencia: Valor de referencia: No se detecta

Descripción: HCV: gen NS3 mutación Q80K (sec. Sanger)

Código: Q80K_NS3

Técnica: PCR y secuenciación

Unidades:

Plazo: 15 días

Tubo: Plasma EDTA Congelado

Comentario adicional: Plasma de Edta congelado

Valores de referencia:

Descripción: HDL COLESTEROL

Código: HDL

Técnica:

Unidades: mg/dL

Plazo: 3 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional:

Valores de referencia: (Sup. 40)

Descripción: HDV RNA RT-PCR Cuantitativa (hepatitis delta)

Código: DELTACUAN

Técnica: RT-PCR cuantitativa

Unidades: copias/mL

Plazo: 9 días

Tubo: Plasma EDTA Congelado

Comentario adicional: 1 mL Plasma de EDTA SEPARADO Y CONGELADO. ENVIAR CONGELADO. Separar plasma lo antes posible. Tubo exclusivo para esta determinación, rotulado con BM. Como alternativa suero en las mismas condiciones.

Valores de referencia: (Inf. 150) La línea de corte de esta técnica es de 150 copias/mL

Descripción: HE4 (PROTEINA EPIDIDIMAL HUMANA)

Código: HE4

Técnica: ICMA

Unidades: pmol/L

Plazo: 7 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 1 mL suero

Valores de referencia: (Inf. 70) Mujer > 14 años Premenopausia
(Inf. 140) Mujer > 14 años Postmenopausia

Descripción: HELICOBACTER PYLORI AC. IGA SUERO

Código: CAMPYLOACA

Técnica: EIA

Unidades:

Plazo: 5 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: Suero o plasma (citrato, heparina)

Descripción: HELICOBACTER PYLORI AC. IGA SUERO
Valores de referencia: (Inf. 9) Negativo
 (9 - 11) Indeterminado

Descripción: HELICOBACTER PYLORI AC. IGG SUERO
Código: CAMPYLOACG
Técnica: CLIA
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero
Valores de referencia: (Inf. 0.80) Negativo
 (0.80 - 0.90) Indeterminado

Descripción: HELICOBACTER PYLORI AG EN HECES
Código: HELIAGCLIA
Técnica:
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Heces No Microbiología
Comentario adicional: las muestras de heces se recogen en un recipiente limpio, hermético y sin conservantes
Valores de referencia: (Inf. 0.9) Negativo
 (0.9 - 1.1) Indeterminado

Descripción: HELICOBACTER PYLORI AC. IGM SUERO
Código: CAMPYLOACM
Técnica: EIA
Unidades: .
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 1.0) Negativo
 (1.0 - 1.2) Indeterminado

Descripción: Helicobacter pylori DNA PCR Cualitativa
Código: HELIPCR
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 8 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: 1ml Jugo gástrico-REFRIGERAR
 biopsia gástrica (solución salina)-REFRIGERAR
 Biopsia gástrica (parafina)-TA
 1ml saliva-TA
 Heces-CONGELAR
Valores de referencia:

Descripción: Helicobacter pylori, Test de aire espirado
Código: CAMPYALI
Técnica: Espectrometría de masas
Unidades:

Descripción:	Helicobacter pylori, Test de aire espirado
Plazo:	8 días
Tubo:	Test Aliento
Comentario adicional:	El comprimido contenido en este kit no debe administrarse a niños menores de 18 años debido a la falta de datos que valoren los resultados
Valores de referencia:	

Descripción:	HEMATIES EN EXUDADO
Código:	LIQEXUHEM
Técnica:	Microscopía óptica
Unidades:	/μL
Plazo:	
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	HEMATIES EN LIQUIDO ASCITICO
Código:	LIQASCHEM
Técnica:	Microscopía óptica
Unidades:	/μL
Plazo:	
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	HEMATIES EN LIQUIDO PLEURAL
Código:	LIQPLHEM
Técnica:	Microscopía óptica
Unidades:	/μL
Plazo:	
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	Hemidisplasia congénita eritrodermia. Sec Gen: NSDHL
Código:	GEN_000408
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Hemiplejía alternante de la infancia. Sec Gen: ATP1A3
Código:	GEN_000409
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción: Hemocromatosis 3 (HFE3): gen TFR2 (NGS)
Código: HFE3
Técnica: NGS Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Hemocromatosis hereditaria: gen HFE (NGS)
Código: HFE_MUTS
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.
Alternativa: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Hemocromatosis hereditaria: mutaciones C282Y, H63D, S65C HFE
Código: PCRHEMO
Técnica: Estudio de genotipado con sondas TaqMan mediante PCR en tiempo real (Real-Time PCR)
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario de EDTA sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
 El tiempo estimado para cada prueba se contará desde el día de entrada de la muestra en el laboratorio central (días laborables).
 Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.

Valores de referencia:

Descripción: Hemocromatosis juvenil 2A (HFE2A): gen HFE2 (NGS)
Código: HFE2A
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Hemocromatosis juvenil 2B (HFE2B): gen HAMP (NGS)
Código: HFE2B
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.

Descripción:

Hemocromatosis juvenil 2B (HFE2B): gen HAMP (NGS)

Valores de referencia:

Descripción:

Hemocromatosis: <10 genes (NGS)

Código:

HEMOCROMAT

Técnica:

NGS y MLPA

Unidades:

Plazo:

30 días

Tubo:

EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional:

Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.
Alternativa: Citrato.

Valores de referencia:

Código:

HEMOCUL

Descripción:

HEMOCULTIVO (CULTIVO DE SANGRE

Técnica:

Cultivo en medios apropiados

Introducir la sangre obtenida por venopunción en los dos medios (aerobio y anaerobio) pinchando en el tapón (nunca abrir el tapón), 10 ml en cada frasco.

En caso de neonatos y niños pequeños en que no se pueden obtener volúmenes grandes de sangre es suficiente una cantidad de 1-5 ml, que se introduce en un solo frasco pediátrico.

Comentario adicional:

Mover suavemente los frascos para que la sangre y el medio de cultivo se mezclen y remitir al laboratorio

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Perfil	CULTIVO		SANGREC	CULTIVO GENERAL en HEMOCULTIVO		

Descripción:

Hemofilia A: gen F8 (NGS e inversión)

Código:

HEMOFILIAA

Técnica:

NGS Illumina

Unidades:

Plazo:

30 días

Tubo:

EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional:

Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción:

Hemofilia B: gen F9 (NGS)

Código:

HEMOFILIA B

Técnica:

NGS con TSO Illumina

Unidades:

Plazo:

30 días

Tubo:

EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional:

Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción:

Hemofilia. Panel NGS

Código:

GEN_000410

Técnica:

Unidades:

Plazo:

30 días

Descripción: Hemofilia. Panel NGS
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: HEMOGLOBINA A2
Código: HBA2
Técnica: HPLC
Unidades: %
Plazo: 7 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 5 mL sangre total EDTA/Heparina Li.
Valores de referencia: (2.0 - 3.5)

Descripción: HEMOGLOBINA FETAL
Código: HBFETAL
Técnica: HPLC
Unidades: %
Plazo: 7 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 5 mL sangre total EDTA/Heparina Li.
Valores de referencia: (Inf. 92) 0-2 meses
 (Inf. 90) 2-3 meses
 (Inf. 42) 3-6 meses
 (Inf. 17) 6-9 meses
 (Inf. 10) 9-12 meses
 (Inf. 6.3) 1-2 años
 (Inf. 1.0) > 2 años

Descripción: HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)
Código: HBA1C
Técnica:
Unidades: %
Plazo: 3 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 5.7)

Descripción: HEMOGLOBINA LIBRE
Código: HGBLIBRE
Técnica: Espectrometría de absorción molecular.
Unidades: g/L
Plazo: 8 días
Tubo: Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional: 2 mL de plasma citrato
Valores de referencia: (Inf. 0.04)

Descripción: HEMOGLOBINA SANGRE
Código: HGB
Técnica:
Unidades: g/dL

Descripción: HEMOGLOBINA SANGRE
Plazo: 3 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional:
Valores de referencia: (13.5 - 18) Hombre
(12 - 16) Mujer

Descripción: HEMOGLOBINAS ELECTROFORESIS SANGRE
Código: HBELEC
Técnica: Electroforesis
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 5 mL sangre total EDTA
Valores de referencia:

Código: HPN
Descripción: HEMOGLOBINURIA PAROXISTICA NOCTURNA
Técnica: Citometría de flujo
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	CD59	49031-8		CD59 (HEMATIES)	%	
Prueba	CD24GRA			CD24 (GRANULOCITOS)	%	
Prueba	FLAERGRA			FLAER (GRANULOCITOS)	%	
Prueba	CD14MON			CD14 (MONOCITOS)	%	
Prueba	FLAERMON			FLAER (MONOCITOS)	%	

Descripción: HEMOGLOBINURIA PAROXISTICA NOCTURNA SCREENING
Código: HPNSCREEN
Técnica: Microtipaje en columnas de gel
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 10 mL Sangre total EDTA
Valores de referencia:

Descripción: Hemoglobinuria paroxística nocturna. Sec Gen: PIGA
Código: GEN_000411
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: HEMOPEXINA EN SUERO
Código: HEMOPEXINA
Técnica: Inmuno Nefelometría
Unidades: mg/dL
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero
Valores de referencia: (50 - 115)

Descripción: HEMORRAGIAS OCULTAS
Código: HEMOC
Técnica: Inmunoensayo
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: FOB
Comentario adicional: Mantener refrigerado tubo recolector de heces del kit, máximo 5 días.
Valores de referencia: NEGATIVO

Descripción: HEMOSIDERINA ORINA
Código: HEMOSI2
Técnica: Tinción de Perls
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Orina basal
Comentario adicional: 5 ml orina refrigerada
Valores de referencia: Valor de referencia: No se detecta

Descripción: HEPATITIS A AC. IGG SUERO
Código: HAACG
Técnica: Técnica CMIA
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: HEPATITIS A AC. IGM
Código: HAACM
Técnica: Técnica ICMA
Unidades: Índice
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 0.8) Negativo
(0.8 - 1.2) Indeterminado

Descripción: HEPATITIS B AC. SUPERFICIE
Código: HBACS
Técnica: Téc. ICMA
Unidades: mUI/mL

Descripción: HEPATITIS B AC. SUPERFICIE
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Sup. 10) Niveles de Ac. protectores en personas vacunadas

Descripción: HEPATITIS B AC.ANTI CORE IGM
Código: HBACCM
Técnica: ICMA
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 0.99) Negativo

Descripción: HEPATITIS B AC.ANTI-CORE
Código: AHBACC
Técnica: Técnica ICMA
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 1.00) Negativo

Descripción: HEPATITIS B ANTICUERPOS ANTI-E
Código: HBACE
Técnica: Técnica ICMA
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Sup. 1.01) Negativo
 (Inf. 1.01) Positivo

Descripción: HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE
Código: HBAGS
Técnica: Técnica ICMA
Unidades: Índice
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 0.99) Negativo

Descripción: HEPATITIS B ANTIGENO E
Código: HBAGE
Técnica: Técnica ICMA
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:

Descripción: HEPATITIS B ANTIGENO E
Valores de referencia: (Inf. 0.99) Negativo
 (1.00 - 1.19) Indeterminado

Descripción: HEPATITIS B CONFIRMACION DEL ANTIGENO DE SUPERFICIE
Código: HBSCONF
Técnica: CMIA con neutralización con anticuerpos específicos
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero o plasma (Edta, litio, heparina)
Valores de referencia:

Descripción: HEPATITIS B DELTA AC. SUERO
Código: HBDELTAACG
Técnica: Técnica CLIA
Unidades: UA/mL
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero. Alternativa: Citrato, EDTA, heparina sodica y de litio. Muestras post mortem recogidas 24h despues de la muerte.
Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo

Descripción: HEPATITIS B DELTA ANTIGENO SUERO
Código: HBDAG
Técnica: EIA
Unidades: Índice
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero
 Volumen 1.0 mL
 Volumen mínimo 0.50 mL
Valores de referencia: (Inf. 0.9) Negativo

Descripción: HEPATITIS C ANTICUERPOS IgG
Código: HCACG
Técnica: Técnica ICMA
Unidades: Índice
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 0.90) Negativo
 (0.90 - 1.10) Indeterminado

Descripción: HEPATITIS C CONFIRMACION E IDENTIFICACION ANTICUERPOS
Código: HCCONF
Técnica: (Téc. inmunoblot 3ª generación)
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal

Descripción: HEPATITIS C CONFIRMACION E IDENTIFICACION ANTICUERPOS
Comentario adicional: 0.5 ml Suero
 Muestra alternativa: Plasma de EDTA, citrato, heparina

Valores de referencia:

Descripción: HEPATITIS D VIRUS (VHD) (IgM ANTI-VHD) AC IgM, SUERO
Código: HDV
Técnica:
Unidades: Índice
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero refrigeradao
Valores de referencia: (Inf. 0.9) No se detecta
 (0.9 - 1.1) Indeterminado
 (Sup. 1.1) Positivo

Descripción: HEPATITIS DELTA (HDV) RNA RT-PCR Cualitativa
Código: RNADELTA
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 21 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
 1 mL suero, separado lo antes posible del coágulo. Evitar hemólisis. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO

Valores de referencia:

Descripción: HEPATITIS E AC IGG CONFIRMACION
Código: HEACGCONF
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo:
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: HEPATITIS E AC IGM CONFIRMACION
Código: HEACMCONF
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo:
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: HEPATITIS E AC. IGG SUERO
Código: HEACG
Técnica: Técnica CLIA
Unidades: Índice
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero. Alternativa plasma.

Descripción: HEPATITIS E AC. IGG SUERO
Valores de referencia: (Inf. 0.9) Negativo
 (0.9 - 1.1) Indeterminado

Descripción: HEPATITIS E ANTICUERPOS IGM
Código: HEACM
Técnica: Técnica CLIA
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero. Alternativa plasma.
Valores de referencia: (0.4 - 0.5) Indeterminado
 (Inf. 0.4) Negativo

Descripción: Hepatitis E virus RNA PCR Cualitativa
Código: VHEPCR
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 mL suero separado lo antes posible del coágulo. Evitar hemólisis. CONGELAR INMEDIATAMENTE Y ENVIAR CONGELADO
 OTRAS MUESTRAS:
 Plasma de EDTA. Congelado.
 Heces en recipiente esteril. Congeladas
 Sangre total EDTA. Refrigerado

Valores de referencia:

Descripción: HEPCIDINA (25-BIOACTIVA) SUERO
Código: HEPCIDINA
Técnica: Enzimoinmunoanálisis.
Unidades: ng/mL
Plazo: 12 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero. refrigerar.
 Alternativa: Plasma de EDTA/CITRATO NA/HEPATINA LI/HEPARINA NA
Valores de referencia: (1.49 - 41.46)

Descripción: Hermansky-Pudlak, Sd. Panel NGS
Código: GEN_000412
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Herpes 1 y 2 PCR Cualitativa + Genotipo
Código: HSVPCR
Técnica: PCR
Unidades:

Descripción: Herpes 1 y 2 PCR Cualitativa + Genotipo
Plazo: 6 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Exudado genital (escobillón seco)-REFRIGERAR
 1ml LCR-CONGELAR
 Frotis-REFRIGERAR
 1ml humor vitreo/acuoso-CONGELAR
 1ml Líquido amniótico-CONGELAR
 1ml Plasma de EDTA-CONGELAR
 1ml Sangre total EDTA-REFRIGERAR
 5ml orina-REFRIGERAR
Valores de referencia: Valor de referencia: No se detecta

Descripción: Herpes 6 DNA PCR Cualitativa
Código: DNAHERP6
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: 1 ml LCR-CONGELAR
 2 ml esputo-REFRIGERAR
 3ml Sangre total EDTA-REFRIGERAR
 5ml Orina-REFRIGERAR
 1ml humor vitreo/ocuoso-REFRIGERAR
Valores de referencia: Valor de referencia: No se detecta
 Esta prueba tiene una sensibilidad del 99% y una especificidad del 98%.

Descripción: Herpes 7 DNA PCR
Código: DNAHERP7
Técnica: Hibridación Molecular (PCR) a Tiempo Real
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional: Escobillón seco, LCR, sangre total (EDTA)
Valores de referencia:

Descripción: Herpes 8 DNA PCR Cualitativa
Código: DNAHERP8
Técnica: RT-PCR
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional: LCR- CONGELAR
 Esputo-REFRIGERAR
 Sangre total EDTA: REFRIGERAR
 Orina-REFRIGERAR
 Humor vitreo/acuoso- REFRIGERAR
Valores de referencia: Valor de referencia indicativo: No se detecta

Descripción: HERPES SIMPLE TIPO I AC. IGG SUERO (HOMINIS)
Código: HERPES1ACG
Técnica: Téc. ECLIA

Descripción: HERPES SIMPLE TIPO I AC. IGG SUERO (HOMINIS)
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero. Alternativa: Plasma (heparina, edta)
Valores de referencia: (Inf. 0.59) Negativo
 (0.60 - 0.99) Indeterminado
 (Sup. 1.0) Positivo

Descripción: HERPES SIMPLE TIPO I AC. IGM SUERO (HOMINIS)
Código: HERPES1ACM
Técnica: Téc. EIA
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero. Alternativa plasma (citrato, heparina)
Valores de referencia: (Inf. 9) Negativo
 (9 - 11) Indeterminado

Descripción: HERPES SIMPLE TIPO I ANTICUERPOS IGG EN LCR
Código: HERP1GLC
Técnica: Téc. EIA
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo
 (Sup. 1) Positivo

Descripción: HERPES SIMPLE TIPO I ANTICUERPOS IGM EN LCR
Código: HERP1MLC
Técnica: Téc. EIA
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo
 (Sup. 1) Positivo

Descripción: HERPES SIMPLE TIPO II AC. IGG SUERO (HOMINIS)
Código: HERPES2ACG
Técnica: Téc. CLIA
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero. Muestra alternativa: Plasma (heparina, edta).
Valores de referencia: (Inf. 0.50) Negativo
 (0.51 - 0.99) Indeterminado
 (Sup. 1) Positivo

Descripción:	HERPES SIMPLE TIPO II AC. IGM SUERO (HOMINIS)
Código:	HERPES2ACM
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. Alternativa plasma (citrato, heparina)
Valores de referencia:	(Inf. 9) Negativo (9 - 11) Indeterminado

Descripción:	HERPES SIMPLE TIPO II ANTICUERPOS IGG EN LCR
Código:	HERP2GLC
Técnica:	Téc. EIA
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	Interpretación según criterio clínico

Descripción:	HERPES SIMPLE TIPO II ANTICUERPOS IGM EN LCR
Código:	HERP2MLC
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	Interpretación según criterio clínico

Descripción:	HERPES VIRUS 1/2 ANTICUERPOS IgM
Código:	HERPES1_2M
Técnica:	Técnica CLIA
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	El ensayo se puede efectuar en muestras de suero o plasma humano. Se pueden utilizar anticoagulantes como el citrato, el EDTA y la heparina
Valores de referencia:	(Inf. 0.9) Negativo (0.9 - 1.1) Indeterminado

Descripción:	HERPES VIRUS TIPO 6 AC. IGG
Código:	HERPES6ACG
Técnica:	Técnica CLIA
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 0.80) Negativo (0.81 - 1.00) Indeterminado (Sup. 1.01) Positivo

Descripción: HERPES VIRUS TIPO 6 AC. IGM
Código: HERPES6ACM
Técnica: IFI
Unidades: Titulo
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1mL de suero

Volumen mínimo
0.2 mL

Valores de referencia: Negativo <1/10
Positivo > 0 = 1/10

Descripción: HERPES VIRUS TIPO 6 ANTICUERPOS IGG EN LCR
Código: HERP6GLC
Técnica: Inmunofluorescencia Indirecta (IFI)
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 ml LCR, se recomienda efectuar análisis simultaneo en suero y LCR
Valores de referencia: Positivo título >1:1

Descripción: HERPES VIRUS TIPO 6 ANTICUERPOS IGM EN LCR
Código: HERP6MLC
Técnica: Inmunofluorescencia Indirecta (IFI)
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 ml de LCR , se recomienda efectuar análisis simultaneo en suero y LCR
Valores de referencia: Positivo título >1:1

Descripción: HERPES VIRUS TIPO 7 AC. IGG
Código: HERPES7ACG
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 11 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL
Valores de referencia: <1:20 Título<1:20 Negativo
>1:20 Título>0=1:20 Positivo

Descripción: HERPES VIRUS TIPO 7 AC. IGM
Código: HERPES7ACM
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 11 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL
Valores de referencia: <1:10 Título<1:10 Negativo
>1:10 Título>0=1:10 Positivo

Descripción: HERPES VIRUS TIPO 8 AC. IGG
Código: HERPES8ACG
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 18 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero.
Valores de referencia: <1:64 Negativo <1:64
 >1:64 Positivo >1:64

Descripción: HERPES VIRUS TIPO 8 AC. IGM
Código: HERPES8ACM
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL
Valores de referencia: <1:20 Negativo <1:20
 >1:20 Positivo >1:20

Descripción: HERPESVIRUS 1/2 ANTICUERPOS IgG
Código: HERPES1_2G
Técnica: Técnica CLIA
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: El ensayo se puede efectuar en muestras de suero o plasma humano. Se pueden utilizar anticoagulantes como el citrato, el EDTA y la heparina
Valores de referencia: (Inf. 0.9) Negativo
 (0.9 - 1.10) Indeterminado

Descripción: Heteroplasia progresiva ósea. Sec Gen: GNAS
Código: GEN_000413
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Heterotopia periventricular ligada al X. Panel NGS
Código: GEN_000414
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Heterotopía periventricular ligada al X. Sec Gen: WAS
Código: GEN_000415
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: HEXANODIONA 2,5 ORINA
Código: HEXANODION
Técnica: Cromatografía de Gases / Espectrometría Masas.
Unidades: mg/L
Plazo: 13 días
Tubo: Orina Final de Jornada
Comentario adicional: 5 ml de orina (micción aislada) al final de la jornada laboral.
 Volumen mínimo: 2 mL
Valores de referencia: (Inf. 0.2) Final de semana laboral (exposición a Hexano o Metil-N-butilcetona)

Descripción: HGV RNA RT-PCR Cualitativa
Código: HGRNA
Técnica: RTPCR
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Biología Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, si pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Valores de referencia:

Descripción: Hialuronidasa anticuerpos
Código: HIALUROAC
Técnica: Hemaglutinación
Unidades: U/mL
Plazo: 13 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero.
Valores de referencia: (Inf. 300)

Descripción: Hibridación en arrays 750k: deleciones y ganancias de ADN
Código: CGHARRAY
Técnica: aCGH
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Muestra exclusiva para esta determinación: tubo de EDTA sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
 Enviar informe médico
Valores de referencia:

Descripción: Hibridación en arrays CGH180K: delec. y ganancias de ADN
Código: ARRAY180K
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Sangre total en EDTA
 Adjuntar informe médico
Valores de referencia:

Descripción: Hibridación en arrays CGH400K: delec. y ganancias de ADN
Código: ARRAY400K
Técnica: ARRAY CGH
Unidades:
Plazo: 35 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Sangre total en EDTA
 Adjuntar informe médico
Valores de referencia:

Descripción: Hidrocefalia ligada al X. Sec Gen: L1CAM
Código: GEN_000416
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hidropesía fetal no autoinmune. Sec Gen: EPHB4
Código: GEN_000417
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: HIDROXIBUTIRATO BETA EN ORINA
Código: BETAOHBUTO
Técnica: Enzimática-Espectrofotometría ultravioleta
Unidades: mg/L
Plazo: 6 días
Tubo: Orina basal
Comentario adicional: 5 ml orina (micción aislada)
Valores de referencia: (Inf. 10)

Descripción: HIDROXIBUTIRATO BETA EN SUERO
Código: BETAOHBUTI
Técnica: Enzimática UV

Descripción:	HIDROXIBUTIRATO BETA EN SUERO
Unidades:	mmol/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 mL de suero CONGELADO Volumen mínimo: 0.20 mL
Valores de referencia:	(0.02 - 0.27) < 14 años Nota: Los valores de referencia son orientativos. En condiciones de ayuno los valores aumentan significativamente. (0.02 - 0.43) > 14 años Nota: Los valores de referencia son orientativos. En condiciones de ayuno los valores aumentan significativamente.

Descripción:	Hidroxi pireno (Exposicion al Alquitrán), Orina
Código:	HIDROPIREN
Técnica:	H.P.L.C.
Unidades:	µg/L
Plazo:	9 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	10 mL Orina Final de Jornada
Valores de referencia:	(Inf. 2.5) Exposición a hidrocarburos aromáticos policíclicos (PHAS). Biological Exposure Indices-BEIs® (ACGIH®)

Descripción:	HIDROXI PROGESTERONA 17 ALFA
Código:	OHPRO17
Técnica:	CLIA
Unidades:	ng/ml
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1mL suero. En recién nacidos es indispensable efectuar técnica de extracción, (distinta de la habitual), por lo que se debe indicar la edad del paciente. Hablar con envíos externos
Valores de referencia:	(0.0 - 16.8) 1 día - 1 mes (1.9 - 9.8) 1 mes - 2 meses (0.1 - 4.0) 2 meses - 3 meses (0.07 - 1.7) 3 años - 14 años (0.5 - 2.1) Hombre > 14 años (0.1 - 0.8) Mujer > 14 años Fase folicular (0.6 - 2.3) Mujer > 14 años Fase lutea (0.3 - 1.4) Mujer > 14 años Ovulación (2.0 - 12.0) Mujer > 14 años Tercer trimestre (0.13 - 0.51) Mujer > 14 años Postmenopáusica

Descripción:	HIDROXI PROGESTERONA 17-ALFA 60 MINUTOS
Código:	OHPRO17.60
Técnica:	
Unidades:	ng/mL
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero 60 Minutos
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	HIDROXI PROLINA (NORDIN) MG/G CREATININA
Código:	OHPRONG

Descripción: HIDROXIPROLINA (NORDIN) MG/G CREATININA
Técnica: HPLC
Unidades: mg/g Creatinina
Plazo: 8 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: Orina. Refrigerar.

La noche anterior al examen, el paciente deberá evitar beber, comer o fumar a partir de las 21h.
 A las 7h de la mañana orinar y desechar dicha micción.
 A continuación, el paciente deberá beber 250ml. de agua destilada y seguirá evitando beber otros líquidos, comer o fumar.
 A las 9h el paciente debe orinar en un recipiente estéril y entregarlo al laboratorio

Valores de referencia: (9 - 25)
 Límite de cuantificación: 2.2 mg/L

Descripción: HIDROXIPROLINA EN ORINA 24 HORAS
Código: OHPRO.MG.H
Técnica: Cromatografía líquida de alta eficiencia
Unidades: mg/24h
Plazo: 8 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: Orina 24h. (alícuota). refrigerar.
 Acidificar la orina.

No ingerir 3 días antes de la toma de muestra : Cualquier tipo de carne pescado o marisco, caldos, salsas, conservas, alubias, garbanzos, lentejas, habas, frutos secos, dulces, helados, licores. Dieta exenta de gelatinas y colágeno
 Alimentos permitidos: Queso, huevos, leche, legumbres verdes, arroz, pan blanco, naranjas, manzanas, peras, agua sin gas.

Al tercer día de dieta, el paciente recogerá la orina de 24 horas

Valores de referencia: (13.1 - 45.9)
 Límite de cuantificación: 2.2 mg/L

Descripción: HIDROXITRIPTOFANO-5 ORINA
Código: HIDROXITRI
Técnica: H.P.L.C.-Fluorimetría
Unidades: mcg/24 h
Plazo: 12 días
Tubo: Orina 24 Horas
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 150)

Descripción: HIERRO
Código: FE
Técnica:
Unidades: µg/dL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (59 - 160) Hombre
 (37 - 160) Mujer

Descripción: HIERRO EN ORINA AISLADA FINAL DE JORNADA
Código: FEOR
Técnica: ICP-MS
Unidades: µg/L

Descripción: HIERRO EN ORINA AISLADA FINAL DE JORNADA
Plazo: 14 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 10.0 mL Orina final jornada
Valores de referencia: (Inf. 650)

Descripción: HIERRO ORINA
Código: FE2
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: µg/24 h
Plazo: 4 días
Tubo: Orina 24 Horas
Comentario adicional: Orina 24h. (alícuota de 1 ml). Refrigerar
Valores de referencia: (Inf. 200)
 Prueba de eliminación: <1000 µg/6h. Límite de detección: 10 µg/L

Descripción: Hígado graso no alcohólico, enf. de. Gen: PNPLA3
Código: GEN_000418
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hiperaldosteronismo familiar 1. Sec Gen: CYP11B2
Código: GEN_000420
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hiperaldosteronismo familiar. Sec Gen: CYP11B1
Código: GEN_000421
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hiperaldosteronismo primario: gen de fusión Cyp11b1-Cyp11b2
Código: CYP11B2
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Hiperaldosteronismo primario: gen de fusión Cyp11b1-Cyp11b2

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Hipercalcemia hipocalciúrica familiar: gen CASR (NGS)

Código: HIPERCALC

Técnica: PCR, secuenciación y MLPA

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: HiperCKemia asintomática: gen ANO5 (NGS)

Código: ANO5

Técnica: NGS Illumina y MLPA

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Hipercol. familiar: gen APOB exones 26 y 29 (sec. Sanger)

Código: APOB_SEC

Técnica: PCR y secuenciación

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Alternativas: Heparina o Citrato.

Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente

Valores de referencia:

Descripción: Hipercolesterolemia familiar. Panel NGS

Código: GEN_000423

Técnica:

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Hipercolesterolemia familiar. Sec Gen: APOB

Código: GEN_000422

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción:	Hipercolesterolemia familiar. Sec Gen: APOB
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Hipercolesterolemia familiar: >10 genes (NGS)
Código:	HIPERCOLES
Técnica:	PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	Hipercolesterolemia familiar: gen LDLR (NGS)
Código:	LDLR
Técnica:	PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	Hipercolesterolemia familiar: gen LDLRAP1 (NGS)
Código:	LDLRAP1
Técnica:	PCR y secuenciación
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	Hipercolesterolemia familiar: gen PCSK9 (NGS)
Código:	PCSK9
Técnica:	PCR y seucenciación
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	Hiperekplexia hereditaria. Sec Gen: SLC6A5
Código:	GEN_000424
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Hiperekplexia hereditaria. Sec Gen: SLC6A5
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hiperferritinemia con cataratas congénitas: gen FTL (NGS)
Código: FTL
Técnica: NGS con TSO Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación sin abrir, marcado con BM. Alternativa: citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hiperinsulinismo congénito (CHI). Panel NGS
Código: GEN_000425
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hiperinsulinismo-hiperamoniemia, Sd. Sec Gen: GLUD1
Código: GEN_000426
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hiperlipemias: >10 genes (NGS)
Código: HIPERLIPEM
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM. Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Hiperlipoproteinemia 1 y 5: déficit lipoproteína lipasa. LPL
Código: GEN_000427
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hiperlipoproteinemia tipo 1: genes LPL y APOC2 (NGS)
Código: LPL_APOC2
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Hipermetioninemia. Sec Gen: MAT1A
Código: GEN_000428
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hiperoxaluria primaria. Panel NGS
Código: GEN_000429
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hiperparatiroidismo 2 (HRPT2): gen CDC73 (NGS)
Código: CDC73
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Hiperparatiroidismo familiar. Panel NGS
Código: GEN_000430
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hiperplasia suprarren. congénita 2: gen HSD3B2 (NGS)
Código: HSD3B2
Técnica: NGS con TSO de Illumina

Descripción:	Hiperplasia suprarren. congénita 2: gen HSD3B2 (NGS)
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación sin abrir, marcado con BM. Alternativa: citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Hiperplasia suprarrenal def. 17-alfa-hidroxilasa. CYP17A1
Código:	GEN_000431
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Hiperprolinemia. Panel NGS
Código:	GEN_000432
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Hipertensión pulmonar primaria. Sec Gen: BMPR2
Código:	GEN_000433
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Hipertermia maligna muscular. Sec Gen: RYR1
Código:	GEN_000434
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Hipertermia maligna: <10 genes (NGS)
Código:	HIPERT_MAL
Técnica:	NGS y MLPA
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Hipertermia maligna: <10 genes (NGS)
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Hipertrofia muscular asociada a miostatina. Sec Gen: MSTN
Código: GEN_000435
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipoacusia acueducto vestibular dilatado, AR. SLC26A4
Código: GEN_000437
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipoacusia asociada a OTOF: gen OTOF (NGS)
Código: OTOF
Técnica: NGS con TSO Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipoacusia congénita ligada a X. Sec Gen: POU3F4
Código: GEN_000438
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipoacusia congénita no sindrómica. Screening
Código: GEN_000443
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo:
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipoacusia congénita. Panel
Código: GEN_000436
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipoacusia congénita. Sec Gen: GJB2. Mutación 35delG
Código: GEN_000439
Técnica:
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipoacusia congénita. Sec Gen: GJB3
Código: GEN_000441
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipoacusia hereditaria. Panel NGS
Código: GEN_000444
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipoacusia hereditaria: >10 genes (NGS)
Código: HIPOACUHER
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Hipoacusia hereditaria: gen GJB2 (NGS)
Código: GJB2
Técnica:
Unidades:

Descripción: Hipoacusia hereditaria: gen GJB2 (NGS)
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.
Alternativa: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Hipoacusia hereditaria: gen GJB6 (NGS)
Código: GJB6
Técnica: NGS con TSO Illumina y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Hipoacusia neurosensorial no sind. mtADN. MTRNR1. Mut A1555G
Código: GEN_000445
Técnica:
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Hipoacusia y sordera no sindr. mitocondrial: sec gen MT-RNR1
Código: MT_RNR1
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Hipobetalipoproteinemia: genes APOB y ANGPTL3 (NGS)
Código: HIPOBETALI
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Hipocondrogénesis. Panel
Código: GEN_000446
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días

Descripción:	Hipocondrogénesis. Panel
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	
Descripción:	Hipocondroplasia estudio ampliado: genes FGFR2, FGFR3 y SHOX
Código:	HIPOCONAMP
Técnica:	PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:	
Plazo:	40 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:	
Descripción:	Hipocondroplasia: secuenciación gen FGFR3
Código:	HIPOCONDRO
Técnica:	PCR y secuenciación
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:	
Descripción:	Hipofosfatasa: secuenciación gen ALPL
Código:	ALPL
Técnica:	NGS con TSO Illumina
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:	
Descripción:	Hipoglucemia >10 genes (NGS)
Código:	HIPOGLUCEM
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo EDTA marcado con BM, sin manipular
Valores de referencia:	
Descripción:	Hipogonadis. hipogonadotr.: genes LEP, LEPR y PCSK1 (NGS)
Código:	HIPOGONADI
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Hipogonadis. hipogonadotr.: genes LEP, LEPR y PCSK1 (NGS)
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Hipogonadismo congénito. Panel NGS
Código: GEN_000448
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipogonadismo hipogonadotrófico 3 con o sin anosmia.PROKR2
Código: GEN_000449
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipogonadismo hipogonadotrófico. Sec Gen: LHB
Código: GEN_000450
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipomagnesemia renal tipo 1. Sec Gen: TRPM6
Código: GEN_000451
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipomielinización y catarata congénita. Sec Gen: FAM126A
Código: GEN_000452
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipoparatiroidismo. Panel NGS
Código: GEN_000453
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipoplasia adrenal congénita. Sec Gen: NROB1
Código: GEN_000454
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipoplasia células de Leydig por resistencia a LH. LHCGR
Código: GEN_000456
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipoplasia cerebelosa. Sec Gen: VLDLR
Código: GEN_000455
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipoplasia dérmica focal. Sec Gen: PORCN
Código: GEN_000457
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipoplasia pontocerebelar. Panel NGS
Código: GEN_000458
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días

Descripción:	Hipoplasia pontocerebelar. Panel NGS
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Hipoplasia suprarrenal congénita ligada al X. Gen: NR0B1
Código:	GEN_000460
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Hipotiroidismo congénito. Sec Gen: TRHR
Código:	GEN_000461
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	HIPROCRETINA-1 (OREXINA-A) EN LCR
Código:	HIPOCRETIN
Técnica:	Radioinmunoensayo
Unidades:	pg/ml
Plazo:	47 días
Tubo:	Liquido cefalorraquideo congelado
Comentario adicional:	1 mL LCR. INDISPENSABLE VOLUMEN 1 mL.en tubo de polipropileno ESPECIAL con rosca a su disposición.Envío inmediato a 4°C.
Valores de referencia:	(Sup. 200) (Inf. 110) En pacientes con narcolepsia y cataplejia. (110 - 200) En pacientes con otras enfermedades neurológicas asociadas con trastornos del sueño.

Descripción:	Hirschsprung, enfermedad de. Panel Ampliado NGS
Código:	GEN_000328
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Hirschsprung, enfermedad de. Panel NGS
Código:	GEN_000462
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Hirschsprung, enfermedad de. Panel NGS

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: HISTAMINA ORINA 24 HORAS

Código: HISTAMI2

Técnica: EIA

Unidades: µg/24h

Plazo: 6 días

Tubo: Orina 24 Horas

Comentario adicional: 10 mL orina de 24h (alícuota). Indicar volumen, se requiere la diuresis.

Valores de referencia: (Inf. 56)

Descripción: HISTAMINA PLASMA

Código: HISTAMINA

Técnica: EIA

Unidades: ng/ml

Plazo: 6 días

Tubo: Plasma EDTA Congelado

Comentario adicional: 1 mL Plasma EDTA CONGELADO,

Valores de referencia: (Inf. 1.98)

Descripción: HISTAMINA SANGRE TOTAL HEPARINA

Código: HISTAMSANG

Técnica: Radioinmunoensayo

Unidades: mcg/dl

Plazo: 10 días

Tubo: Heparina Litio

Comentario adicional: 4 mL sangre total heparina, evitar sangre EDTA (1 TUBO): Refrigerar. Evitar remitir la muestra en fines de semana y vísperas de festivos.

Valores de referencia: (2 - 20)

Descripción: HISTAMINA, HECES

Código: HISTHE

Técnica:

Unidades: ng/g heces

Plazo: 8 días

Tubo: HECES CONGELADAS

Comentario adicional: Heces recogidas en recipiente estéril. Congelar

Valores de referencia: (Inf. 959)

Descripción: Histidinemia. Sec Gen: HAL

Código: GEN_000463

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: HISTONAS AC. IGG SUERO
Código: HISTONASAC
Técnica: Técnica ELISA
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero alternativo plasma de EDTA o plasma citrato
Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo
(Sup. 1) Positivo

Descripción: Histoplasma capsulatum PCR cualitativa
Código: HISTOP_PCR
Técnica:
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: HISTOPLASMOSIS AC. SUERO (HISTOPLASMA CAPSULATUM)
Código: HISTOPLAAC
Técnica: Inmunodifusión Ouchterlony
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1mL suero.
Valores de referencia:

Descripción: HIV-1 RNA RT-PCR Cualitativa
Código: VIH1RNA
Técnica: RT-PCR
Unidades: copias/mL
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: TUBO DE EDTA. Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Valores de referencia: Valor de referencia: No se detecta
(Inf. 13.2) Límite de detección

Descripción: HLA A ALTA RESOLUCION EN SANGRE TOTAL
Código: HLAAALTARE
Técnica: PCR-SSO/SBT
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: 2 ML EDTA sangre total.
Envío a temperatura ambiente.

Valores de referencia:

Descripción: HLA ANTICUERPOS SUERO
Código: HLAAC
Técnica: Tecnica bead array, luminex
Unidades:
Plazo: 33 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: Negativo

Descripción: HLA DQA1/DQB1 Diabetes mellitus
Código: HLADIABE
Técnica: PCR e hibricación
Unidades:
Plazo: 21 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación sin abrir y marcado con BM.
 Alternativa: citrato
Valores de referencia:

Descripción: HLA DR2 SANGRE
Código: HLADR2
Técnica: Hibridación molecular (PCR)
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 5 mL sangre total (EDTA)
Valores de referencia:

Descripción: HLA DR3 EN SANGRE
Código: HLADR3
Técnica: Hibridación molecular (PCR)
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 5 mL sangre total (EDTA)
Valores de referencia:

Descripción: HLA DR4 EN SANGRE
Código: HLADR4
Técnica: Hlibridacion molecular (PCR)
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 5 mL sangre total (EDTA)
Valores de referencia:

Descripción: HLA DR5 SANGRE
Código: HLADR5
Técnica: Hibridación molecular (PCR)
Unidades:

Descripción: HLA DR5 SANGRE
Plazo: 12 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 5 mL sangre total (EDTA)
Valores de referencia:

Descripción: HLA DRB1 artritis reumatoide
Código: HLADRB1
Técnica: PCR e hibridación
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: EDTA Biología Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación sin abrir, marcado con BM.
 Alternativa: citrato
Valores de referencia:

Descripción: HLA PGT Monogenicas
Código: HLAPGTM
Técnica:
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: BIOPSIA ESPECIAL
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: HLA-A TIPAJE DNA POR HIBRIDACIÓN MOLECULAR
Código: HLAAPCR
Técnica: Hibidación molecular (PCR)
Unidades:
Plazo: 23 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 5 mL de sangre total (EDTA)
Valores de referencia:

Descripción: HLA-A29 EN SANGRE
Código: HLAA29
Técnica: PCR-SSO
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: 10 mL de sangre total EDTA
Valores de referencia: La presencia del alelo HLA A29 está asociado con un marcado incremento de riesgo para la corirretinopatía en perdigonada o de Birdshot.

Descripción: HLA-B TIPAJE DNA POR HIBRIDACION MOLECULAR
Código: HLABLOCUS
Técnica: Hibridación molecular (PCR)
Unidades:
Plazo: 23 días

Descripción: HLA-B TIPAJE DNA POR HIBRIDACION MOLECULAR
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 5 mL sangre total (EDTA)
Valores de referencia:

Descripción: HLAB*5701 relacionado con hipersensibilidad a Abacavir
Código: HLAB5701
Técnica: Hibridación molecular (PCR)
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: 2 mL sangre total (EDTA)
Valores de referencia:

Descripción: HLAB27 ANTIGENO DE HISTOCOMPATIBILIDAD CF
Código: HLAB27
Técnica: Citometría de flujo
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: Sangre total (EDTA). Envío inmediato a temperatura ambiente. Tubo exclusivo para esta determinación
Alternativa: sangre total Heparina
Valores de referencia: El antígeno de histocompatibilidad B27 representa una característica genética y está asociado a un aumento del riesgo relativo de espondilitis anquilosante. En esta determinación se efectúa una selección previa de la población celular CD3 positiva. Se emplean dos anticuerpos anti HLA B27 de diferentes especificidades.

Descripción: HLAB27 antígeno de histocompatibilidad por PCR
Código: HLAB27_GEN
Técnica:
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: EDTA Biología Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: HLA-B5 (B51/B52) SANGRE
Código: HLAB5
Técnica:
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: _COMENTARIODT

Descripción:	HLA-B5 (B51/B52) SANGRE
Valores de referencia:	La enfermedad de Behçet (BD) es una forma de vasculitis que se manifiesta con úlceras dolorosas en la boca y genitales, lesiones cutáneas y oculares (uveítis). También puede aparecer inflamación en articulaciones, sistema nervioso y tracto digestivo. A pesar de ser de distribución global, es más frecuente en la zona de la ruta de la seda (del Este de Asia hasta la cuenca del Mediterráneo), con mayor prevalencia en Turquía y relativamente frecuente en Japón e Irán. BD está asociada al antígeno HLA-B*5, codificado por los alelos HLA-B*51 y HLA-B*52. Por lo tanto, su presencia se considera un factor de riesgo para padecer dicha enfermedad, así como un efecto modulador de su expresión. Este informe ha de ser interpretado por un especialista dentro del contexto clínico y la historia familiar del paciente, en conjunto con otros hallazgos de laboratorio. Se recomienda asesoramiento genético.

Descripción:	HLA-B5 (B51/B52) SANGRE
Código:	HLAB5
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	_COMENTARIODT
Valores de referencia:	La enfermedad de Behçet (BD) es una forma de vasculitis que se manifiesta con úlceras dolorosas en la boca y genitales, lesiones cutáneas y oculares (uveítis). También puede aparecer inflamación en articulaciones, sistema nervioso y tracto digestivo. A pesar de ser de distribución global, es más frecuente en la zona de la ruta de la seda (del Este de Asia hasta la cuenca del Mediterráneo), con mayor prevalencia en Turquía y relativamente frecuente en Japón e Irán. BD está asociada al antígeno HLA-B*5, codificado por los alelos HLA-B*51 y HLA-B*52. Por lo tanto, su presencia se considera un factor de riesgo para padecer dicha enfermedad, así como un efecto modulador de su expresión. Este informe ha de ser interpretado por un especialista dentro del contexto clínico y la historia familiar del paciente, en conjunto con otros hallazgos de laboratorio. Se recomienda asesoramiento genético.

Descripción:	HLA-B5 (B51/B52) SANGRE
Código:	HLAB5
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	_COMENTARIODT

Descripción:	HLA-B5 (B51/B52) SANGRE
Valores de referencia:	La enfermedad de Behçet (BD) es una forma de vasculitis que se manifiesta con úlceras dolorosas en la boca y genitales, lesiones cutáneas y oculares (uveítis). También puede aparecer inflamación en articulaciones, sistema nervioso y tracto digestivo. A pesar de ser de distribución global, es más frecuente en la zona de la ruta de la seda (del Este de Asia hasta la cuenca del Mediterráneo), con mayor prevalencia en Turquía y relativamente frecuente en Japón e Irán. BD está asociada al antígeno HLA-B*5, codificado por los alelos HLA-B*51 y HLA-B*52. Por lo tanto, su presencia se considera un factor de riesgo para padecer dicha enfermedad, así como un efecto modulador de su expresión. Este informe ha de ser interpretado por un especialista dentro del contexto clínico y la historia familiar del paciente, en conjunto con otros hallazgos de laboratorio. Se recomienda asesoramiento genético.

Descripción:	HLA-B5 (B51/B52) SANGRE
Código:	HLAB5
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	_COMENTARIODT
Valores de referencia:	La enfermedad de Behçet (BD) es una forma de vasculitis que se manifiesta con úlceras dolorosas en la boca y genitales, lesiones cutáneas y oculares (uveítis). También puede aparecer inflamación en articulaciones, sistema nervioso y tracto digestivo. A pesar de ser de distribución global, es más frecuente en la zona de la ruta de la seda (del Este de Asia hasta la cuenca del Mediterráneo), con mayor prevalencia en Turquía y relativamente frecuente en Japón e Irán. BD está asociada al antígeno HLA-B*5, codificado por los alelos HLA-B*51 y HLA-B*52. Por lo tanto, su presencia se considera un factor de riesgo para padecer dicha enfermedad, así como un efecto modulador de su expresión. Este informe ha de ser interpretado por un especialista dentro del contexto clínico y la historia familiar del paciente, en conjunto con otros hallazgos de laboratorio. Se recomienda asesoramiento genético.

Descripción:	HLA-B5 (B51/B52) SANGRE
Código:	HLAB5
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	_COMENTARIODT

Descripción:	HLA-B5 (B51/B52) SANGRE
Valores de referencia:	La enfermedad de Behçet (BD) es una forma de vasculitis que se manifiesta con úlceras dolorosas en la boca y genitales, lesiones cutáneas y oculares (uveítis). También puede aparecer inflamación en articulaciones, sistema nervioso y tracto digestivo. A pesar de ser de distribución global, es más frecuente en la zona de la ruta de la seda (del Este de Asia hasta la cuenca del Mediterráneo), con mayor prevalencia en Turquía y relativamente frecuente en Japón e Irán. BD está asociada al antígeno HLA-B*5, codificado por los alelos HLA-B*51 y HLA-B*52. Por lo tanto, su presencia se considera un factor de riesgo para padecer dicha enfermedad, así como un efecto modulador de su expresión. Este informe ha de ser interpretado por un especialista dentro del contexto clínico y la historia familiar del paciente, en conjunto con otros hallazgos de laboratorio. Se recomienda asesoramiento genético.

Descripción:	HLA-B5 (B51/B52) SANGRE
Código:	HLAB5
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	_COMENTARIODT
Valores de referencia:	La enfermedad de Behçet (BD) es una forma de vasculitis que se manifiesta con úlceras dolorosas en la boca y genitales, lesiones cutáneas y oculares (uveítis). También puede aparecer inflamación en articulaciones, sistema nervioso y tracto digestivo. A pesar de ser de distribución global, es más frecuente en la zona de la ruta de la seda (del Este de Asia hasta la cuenca del Mediterráneo), con mayor prevalencia en Turquía y relativamente frecuente en Japón e Irán. BD está asociada al antígeno HLA-B*5, codificado por los alelos HLA-B*51 y HLA-B*52. Por lo tanto, su presencia se considera un factor de riesgo para padecer dicha enfermedad, así como un efecto modulador de su expresión. Este informe ha de ser interpretado por un especialista dentro del contexto clínico y la historia familiar del paciente, en conjunto con otros hallazgos de laboratorio. Se recomienda asesoramiento genético.

Descripción:	HLA-B5 (B51/B52) SANGRE
Código:	HLAB5
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	_COMENTARIODT

Descripción:	HLA-B5 (B51/B52) SANGRE
Valores de referencia:	La enfermedad de Behçet (BD) es una forma de vasculitis que se manifiesta con úlceras dolorosas en la boca y genitales, lesiones cutáneas y oculares (uveítis). También puede aparecer inflamación en articulaciones, sistema nervioso y tracto digestivo. A pesar de ser de distribución global, es más frecuente en la zona de la ruta de la seda (del Este de Asia hasta la cuenca del Mediterráneo), con mayor prevalencia en Turquía y relativamente frecuente en Japón e Irán. BD está asociada al antígeno HLA-B*5, codificado por los alelos HLA-B*51 y HLA-B*52. Por lo tanto, su presencia se considera un factor de riesgo para padecer dicha enfermedad, así como un efecto modulador de su expresión. Este informe ha de ser interpretado por un especialista dentro del contexto clínico y la historia familiar del paciente, en conjunto con otros hallazgos de laboratorio. Se recomienda asesoramiento genético.

Descripción:	HLA-B5 (B51/B52) SANGRE
Código:	HLAB5
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	_COMENTARIODT
Valores de referencia:	La enfermedad de Behçet (BD) es una forma de vasculitis que se manifiesta con úlceras dolorosas en la boca y genitales, lesiones cutáneas y oculares (uveítis). También puede aparecer inflamación en articulaciones, sistema nervioso y tracto digestivo. A pesar de ser de distribución global, es más frecuente en la zona de la ruta de la seda (del Este de Asia hasta la cuenca del Mediterráneo), con mayor prevalencia en Turquía y relativamente frecuente en Japón e Irán. BD está asociada al antígeno HLA-B*5, codificado por los alelos HLA-B*51 y HLA-B*52. Por lo tanto, su presencia se considera un factor de riesgo para padecer dicha enfermedad, así como un efecto modulador de su expresión. Este informe ha de ser interpretado por un especialista dentro del contexto clínico y la historia familiar del paciente, en conjunto con otros hallazgos de laboratorio. Se recomienda asesoramiento genético.

Descripción:	HLA-B5 (B51/B52) SANGRE
Código:	HLAB5
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	_COMENTARIODT

Descripción:	HLA-B5 (B51/B52) SANGRE
Valores de referencia:	La enfermedad de Behçet (BD) es una forma de vasculitis que se manifiesta con úlceras dolorosas en la boca y genitales, lesiones cutáneas y oculares (uveítis). También puede aparecer inflamación en articulaciones, sistema nervioso y tracto digestivo. A pesar de ser de distribución global, es más frecuente en la zona de la ruta de la seda (del Este de Asia hasta la cuenca del Mediterráneo), con mayor prevalencia en Turquía y relativamente frecuente en Japón e Irán. BD está asociada al antígeno HLA-B*5, codificado por los alelos HLA-B*51 y HLA-B*52. Por lo tanto, su presencia se considera un factor de riesgo para padecer dicha enfermedad, así como un efecto modulador de su expresión. Este informe ha de ser interpretado por un especialista dentro del contexto clínico y la historia familiar del paciente, en conjunto con otros hallazgos de laboratorio. Se recomienda asesoramiento genético.

Descripción:	HLA-B5 (B51/B52) SANGRE
Código:	HLAB5
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	_COMENTARIODT
Valores de referencia:	La enfermedad de Behçet (BD) es una forma de vasculitis que se manifiesta con úlceras dolorosas en la boca y genitales, lesiones cutáneas y oculares (uveítis). También puede aparecer inflamación en articulaciones, sistema nervioso y tracto digestivo. A pesar de ser de distribución global, es más frecuente en la zona de la ruta de la seda (del Este de Asia hasta la cuenca del Mediterráneo), con mayor prevalencia en Turquía y relativamente frecuente en Japón e Irán. BD está asociada al antígeno HLA-B*5, codificado por los alelos HLA-B*51 y HLA-B*52. Por lo tanto, su presencia se considera un factor de riesgo para padecer dicha enfermedad, así como un efecto modulador de su expresión. Este informe ha de ser interpretado por un especialista dentro del contexto clínico y la historia familiar del paciente, en conjunto con otros hallazgos de laboratorio. Se recomienda asesoramiento genético.

Descripción:	HLA-B7 EN SANGRE
Código:	HLAB7
Técnica:	Test de citotoxicidad
Unidades:	%
Plazo:	4 días
Tubo:	Heparina Litio
Comentario adicional:	10 mL de sangre total Heparina litio.Envío a temperatura ambiente. Evitar envío los jueves y viernes.
Valores de referencia:	(Inf. 50) Negativo (Sup. 50) Positivo

Descripción:	HLA-C TIPAJE EN SANGRE
Código:	HLACPCR
Técnica:	Tipaje mediante el uso de sondas específicas SSO (Sequence Specific Oligonucleotide) unidas a microesferas Luminex (Lifecodes, Inmucor).
Unidades:	

Descripción: HLA-C TIPAJE EN SANGRE
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: HLAC-W6 TIPAJE EN SANGRE (psoriasis)
Código: HLACW6
Técnica: Tipaje mediante el uso de sondas específicas SSO (Sequence Specific Oligonucleotide) unidas a microesferas Luminex (Lifecodes, Inmucor).
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: HLA-DQ2 EN SANGRE
Código: HLADQ2
Técnica:
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: 5 mL sangre total (EDTA)

Valores de referencia:

Descripción: HLA-DQ8 EN SANGRE
Código: HLADQ8
Técnica: DQ3
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: sangre en EDTA 5 mL

Valores de referencia:

Descripción: HLA-DR TIPAJE DNA POR HIBRIDACIÓN MOLECULAR
Código: HLADRT
Técnica: Hibridación molecular (PCR)
Unidades:
Plazo: 14 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 5 mL de Sangre total (EDTA)

Valores de referencia:

Descripción: HLA-DR1 EN SANGRE
Código: HLADR1
Técnica: Hibridación molecular (PCR)
Unidades:
Plazo: 23 días

Descripción: HLA-DR1 EN SANGRE
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 5 mL Sangre total EDTA
Valores de referencia:

Descripción: HLA-DRB1-1501, HLA-DQA1-0102, y HLA-DQB1-0602
Código: NARCOLEPSI
Técnica: PCR e hibridación con sondas
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: HMGCRCR ANTICUERPOS SUERO (CoA reductasa)
Código: HMGCRCRAC
Técnica: EIA
Unidades: UA/mL
Plazo: 14 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1mL suero. REFRIGERAR.
Volumne mínimo: 0.5 ML
Valores de referencia: (Inf. 20)

Descripción: Holoprosencefalia no sindrómica. Panel NGS
Código: GEN_000464
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: HOLOTRANSCOBALAMINA
Código: HOLOTRANSC
Técnica: Inmunoanálisis
Unidades: pmol/L
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero
Volumen 2.0 mL
Volumen mínimo 0.57 mL
Valores de referencia: (25.1 - 165)

Descripción: Holt-Oram, Sd. Sec Gen: TBX5
Código: GEN_000465
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días

Descripción: Holt-Oram, Sd. Sec Gen: TBX5
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: HOMOCISTEINA TOTAL EN SUERO
Código: HOMOCISTE
Técnica: Inmunoensayo turbidimétrico
Unidades: mcmol/L
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml suero.
 1 mL plasma EDTA/HEPARINA Litio
Valores de referencia: (4.44 - 13.56) Mujer
 (5.46 - 16.20) Hombre

Descripción: HOMOCISTINA ORINA
Código: HOMOCIST
Técnica: Cromatografía líquida de alta resolución
Unidades: mcmol/g crea.
Plazo: 9 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 10mL orina (micción aislada)
Valores de referencia: (Inf. 2)

Descripción: Homocistinuria Ampliado Panel NGS
Código: GEN_000468
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Homocistinuria def. cistationina beta sintasa: gen CBS (NGS)
Código: CBS
Técnica: NGS con TSOE Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Homocistinuria por déficit de MTHFR. Sec Gen: MTHFR
Código: GEN_000467
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Homocistinuria por déficit de MTHFR. Sec Gen: MTHFR
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Homocistinuria. Panel NGS
Código: GEN_000469
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: HONGOS DERMATOFITOS DNA PCR Cualitativa
Código: HONGOSPCR
Técnica: Reacción en cadena de la polimerasa.
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional: Escamas, piel, uñas
Valores de referencia:

Descripción: HORMONA ANTIMULLERIANA ROCHE
Código: MULLERIANA
Técnica: ECLIA
Unidades: ng/ml
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero o plasma heparina. Preferible enviar congelado.
 No emplear plasma con EDTA
 Conveniente indicar edad y sexo
Valores de referencia: (1.43 - 11.60) Hombre
 (1.52 - 9.95) Mujer 20 años - 24 años
 (1.20 - 9.05) Mujer 24 años - 29 años
 (0.71 - 7.59) Mujer 29 años - 34 años
 (0.41 - 6.96) Mujer 34 años - 39 años
 (0.06 - 4.44) Mujer 39 años - 44 años
 (0.01 - 1.79) Mujer 44 años - 50 años
 Mujer Ovario Poliquístico:
 (2.41 - 17.1) Mujer
 Mujer Reserva ovárica estimada:
 (Inf. 0.68) Mujer Baja reserva ovárico
 (0.68 - 2.27) Mujer Suficiente reserva ovárica
 (Sup. 2.27) Mujer Reserva ovárica normal

Descripción: HORMONA DE CRECIMIENTO SUERO (HGH)
Código: GH
Técnica: Técnica Quimioluminiscencia
Unidades: ng/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:

Descripción: HORMONA DE CRECIMIENTO SUERO (HGH)

Valores de referencia: (Inf. 5) Los niveles basales de GH sufren variaciones fisiológicas por lo que se recomienda, para su valoración, efectuar pruebas dinámicas. De manera orientativa se considera valor normal inferior a 5 ng/mL

Descripción: HORMONA DE CRECIMIENTO SUERO (HGH)

Código: GH

Técnica: Técnica Quimioluminiscencia

Unidades: ng/mL

Plazo: 3 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional:

Valores de referencia: (Inf. 5) Los niveles basales de GH sufren variaciones fisiológicas por lo que se recomienda, para su valoración, efectuar pruebas dinámicas. De manera orientativa se considera valor normal inferior a 5 ng/mL

Descripción: HORMONA ESTIMULADORA DE MELANOCITOS (ALFA-MSH)

Código: MSH

Técnica: Técnica RIA

Unidades: pmol/L

Plazo: 31 días

Tubo: Plasma trasylol/aprotinina

Comentario adicional: 2 mL plasma EDTA con aprotinina, separar y congelar inmediatamente Tubo especial con aprotinina (TRASYLOL).

Valores de referencia: (9.0 - 18.0)

Descripción: HORMONA LIBERADORA DE GONADOTROFINA (GNRH), SUERO

Código: GNRH

Técnica: EIA

Unidades: ng/mL

Plazo: 19 días

Tubo: Suero Congelado

Comentario adicional: 1 mL de suero congelado

Valores de referencia: (4.09 - 11.55)
Determinación realizada mediante un procedimiento EIA de tipo RU0. Los valores reportados tienen carácter orientativo.

Descripción: HSV1, HSV2, Herpes 6, Varicela zoster, Eps.-Barr, y CMV PCR

Código: HERPESPCR

Técnica: PCR

Unidades:

Plazo: 10 días

Tubo: Muestra Biología Molecular

Descripción: HSV1, HSV2, Herpes 6, Varicela zoster, Eps.-Barr, y CMV PCR

Comentario adicional: 1ml LCR-CONGELAR
Exudado genital (escobillón seco)-REFRIGERAR
Frotis (escobillón seco)-REFRIGERAR
Lesión de piel -REFRIGERAR
1 ml BAL(SOLO ACEPTAMOS PARA cmv)-REFRIGERAR
1ml DNA extraído-CONGELAR
1ml humor vitreo/acuoso-CONGELAR
2ml Sangre total EDTA- REFRIGERAR

Valores de referencia:

Descripción: HTLV I + HTLV II DNA, PROVIRAL SANGRE TOTAL

Código: DNHT

Técnica: PCR

Unidades:

Plazo: 10 días

Tubo: Sangre EDTA

Comentario adicional: Sangre total EDTA. refrigerar.

Valores de referencia: Valor de referencia indicativo: No se detecta

Descripción: HTLV I/II AC. INMUNOBLOT

Código: HTLVBLOT

Técnica: Inmunoblot

Unidades:

Plazo: 12 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 1 mL suero

Valores de referencia:

Descripción: HTLV-1 Y 2 AC. SUERO

Código: HTLV1AC

Técnica: Técnica Inmunoanálisis. Hasta fecha 21-09-2011 Enzimoinmunoanálisis.

Unidades:

Plazo: 7 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 1 mL de suero
Alternativa: Plasma de EDTA, CITRATO, HEPARINA LITIO Y HEPARINA SODIO.

Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo
(Sup. 1) Positivo

Descripción: Hu (ANNA-1) AC. LCR

Código: ACHU.LCR

Técnica: Técnica Inmunoblot

Unidades:

Plazo: 15 días

Tubo: LIQUIDO LCR INMUNO

Comentario adicional: 1 mL LCR

Valores de referencia:

Descripción: Huella genética (DNI genético)

Código: HUELLAGEN

Técnica:

Descripción: Huella genética (DNI genético)
Unidades:
Plazo:
Tubo:
Comentario adicional: Previo contacto con el laboratorio
Valores de referencia:

Descripción: HUESO NASAL AUSENTE
Código: HUESONASAL
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo:
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Human Peripheral Blood Mononuclear Cells
Código: PBMC
Técnica:
Unidades: 10⁶ células/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Hurler o MPS1, Sd. Sec Gen: IDUA
Código: GEN_000470
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: IA2 AC. SUERO
Código: IA.2AC
Técnica: ICMA
Unidades: UI/mL
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL de suero sin hemolisis
Valores de referencia: (Inf. 28) Negativo
 (28 - 33) Indeterminado

Descripción: IBSSMART TEST_DIAG COLON / INTESTINO IRRITIBLE
Código: IBS_SMART
Técnica:
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Sangre EDTA

Descripción: IBSSMART TEST_DIAG COLON / INTESTINO IRRITIBLE

Comentario adicional: 3 tubos de 3ml de sangre EDTA.
 Las extracciones se realizarán únicamente los LUNES (enviar el mismo día que se obtiene la muestra).
 CONDICIONES PREVIAS: 7 días antes de la toma de la muestra no se debe tomar: antihistamínicos, inmunosupresores o corticoides.
 Aconsejable estar en ayunas.
 Llamar a la mensajería Nacex (Tfno. 900 100 000) y realizar el envío al n.º de abonado 1201/75
 Si surge cualquier problema llamar al 964 220216.
 El envío se hace desde el punto de extracción.

Valores de referencia:

Descripción: Ictiosis arlequín. Sec Gen: ABCA12

Código: GEN_000471

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Ictiosis con hipotricosis, AR. Sec Gen: ST14

Código: GEN_000472

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Ictiosis epidermolítica. Sec Gen: KRT10

Código: GEN_000474

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Ictiosis epidermolítica: genes KRT1 y KRT10 (NGS)

Código: ICTIO_EPID

Técnica: NGS Illumina

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
 Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Ictiosis folicular-atrofia-fotofobia, Sd. Gen: MBTPS2

Código: GEN_000475

Técnica:

Unidades:

Descripción: Ictiosis folicular-atricquia-fotofobia, Sd. Gen: MBTPS2
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Ictiosis lamelar. Sec Gen: TGM1
Código: GEN_000476
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Ictiosis ligada al cromosoma X. Sec Gen: STS
Código: GEN_000477
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Ictiosis vulgar. Sec Gen: FLG
Código: GEN_000478
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Ictiosis y eritroderma ictiosiforme. Panel NGS
Código: GEN_000479
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Ictiosis-colangitis esclerosante neonatal, Sd. Gen: CLDN1
Código: GEN_000480
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: IDENTIFICACION DE ANTICUERPOS IRREGULARES
Código: IRREGUAC
Técnica: Columna gel
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Se requiere suero y sangre total (EDTA)
Valores de referencia:

Descripción: IFAP, Sd. Sec Gen: MBTPS2
Código: GEN_000481
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: IGA SECRETORA LAGRIMAS (INMUNOGLOBULINA IGA LAGRIMAS)
Código: IGALA
Técnica: Nefelometría
Unidades: mg/dL
Plazo: 5 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 0.5 mL Lagrimas en frasco esteril
Valores de referencia: (3 - 30)

Descripción: IGA SECRETORA MOCO NASAL (INMUNOGLOBULINA IGA-S MOCO NASAL)
Código: IGAMOCO
Técnica: Nefelometría
Unidades: mg/dL
Plazo: 7 días
Tubo:
Comentario adicional: Muestra de moco nasal.
Valores de referencia: (Sup. 3.0)

Descripción: IGA SECRETORA SALIVA (INMUNOGLOBULINA IGA SALIVA)
Código: IGASA
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: mcg/mL
Plazo: 9 días
Tubo: Saliva
Comentario adicional: 1mL Saliva en frasco esteril congelada
Valores de referencia: (40 - 170)

Descripción: IgE ESPECÍFICA MULTIPLEX (ALEX TEST), SUERO
Código: ALEX
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 10 días

Descripción: IgE ESPECÍFICA MULTIPLEX (ALEX TEST), SUERO
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL Suero
Valores de referencia:

Descripción: IGE MOCO NASAL (INMUNOGLOBULINA IGE MOCO NASAL)
Código: IGEMOCO
Técnica: CLIA
Unidades: UI/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional: Lavado nasal.
Refrigerar
Valores de referencia: (Inf. 10)

Descripción: IGF-1 (SOMATOMEDINA C)
Código: SOMATOC
Técnica: Quimioluminiscencia
Unidades: ng/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero.
Alternativa: plasma de heparina de Na o Li

Fines de semana: enviar suero congelado

Descripción:	IGF-1 (SOMATOMEDINA C)
Descripción:	IGF-1 (SOMATOMEDINA C)
	(69.4 - 200) Hombre 15 años - 2 años
	(60.4 - 164) Hombre 25 años - 3 años
	(41.8 - 106) Hombre 36 años - 4 años
	(51.4 - 129) Hombre 46 años - 5 años
	(49.6 - 128) Hombre 57 años - 6 años
	(47.4 - 121) Hombre 67 años - 7 años
	(83.3 - 318) Mujer 7 años - 8 años

Descripción: IGFBP-3 SUERO (IGF BINDING PROTEIN-3)

Código:	IGFBP3
Técnica:	Técnica Inmunoluminiscencia
Unidades:	mcg/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero.
Valores de referencia:	(0.64 - 3.75) 1 año - 2 años

(0.88 - 4.73) 2 años - 4 años
(0.95 - 5.56) 4 años - 6 años
(1.50 - 6.42) 6 años - 8 años
(1.89 - 7.25) 8 años - 10 años
(2.55 - 8.42) 10 años - 12 años
(3.23 - 10.17) 12 años - 14 años
(3.51 - 9.23) 14 años - 16 años
(3.13 - 8.57) 16 años - 18 años
(2.81 - 7.32) 18 años - 20 años
(3.37 - 7.33) 20 años - 30 años
(3.59 - 6.68) 30 años - 40 años
(3.42 - 6.83) 40 años - 50 años
(3.36 - 6.87) 50 años - 60 años
(3.28 - 6.46) 60 años - 64 años
(2.79 - 5.54) 64 años - 80 años

Descripción:	IGF-II
Código:	IGFII
Técnica:	EIA
Unidades:	ng/mL
Plazo:	23 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	(350 - 1000)

Descripción: IGG 4ESPECIFICA A DACTYLIS GLOMERATA (GRAMA,C

Código:	G03IGG4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	10 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción: IGG ESPECIFICA A ACAROS DERMATOPHAGOIDES FARINAE

Código:	D02IGG
	(79.3 - 207) Hombre 45 años - 50 años

Descripción: IGG ESPECIFICA A ACAROS DERMATOPHAGOIDES FARINAE
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A ACAROS DERMATOPHAGOIDES MICRO CERAS
Código: D03IGG
Técnica: CAP SYSTEM- Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A ACAROS DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS
Código: D01IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A ALIMENTOS BACALAO (PESCADO)
Código: F03IGG
Técnica: CAP SYSTEM- Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A ALIMENTOS CLARA DE HUEVO
Código: F01IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A ALIMENTOS GLUTEN (TRIGO)
Código: F79IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal

Descripción: IGG ESPECIFICA A ALIMENTOS GLUTEN (TRIGO)

Comentario adicional:

Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A ALIMENTOS OVOALBUMINA

Código: F232IGG

Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis

Unidades: mg/L

Plazo: 10 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional:

Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A ALIMENTOS OVOMUCOIDE

Código: F233IGG

Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis

Unidades: mg/L

Plazo: 10 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional:

Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A ANIMALES CASPA DE GATO

Código: E01IGG

Técnica: CAP SYSTEM- Fluoroinmunoanálisis

Unidades: mg/L

Plazo: 10 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional:

Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A ANIMALES CASPA DE PERRO

Código: E05IGG

Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis

Unidades: mg/L

Plazo: 10 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional:

Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A ANIMALES EPITELIO DE CONEJO

Código: E82IGG

Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis

Unidades: mg/L

Plazo: 10 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional:

Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A ANIMALES EXCREMENTO DE CANARIO

Código: E200IGG

Descripción: IGG ESPECIFICA A ANIMALES EXCREMENTO DE CANARIO

Técnica:

Unidades: mg/L

Plazo: 10 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional:

Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A ANIMALES LORO (plumas, excrems y prots

Código: GE92IGG

Técnica: Fluoroinmunoanálisis

Unidades: mg/L

Plazo: 10 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 1 mL SUERO. Refrigerar si se envía hasta 24 h después de obtención. Congelar si se superan las 24 h.

Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A ANIMALES PLUMAS DE CANARIO

Código: RE201IGG

Técnica:

Unidades: mg/L

Plazo: 10 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional:

Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A APIS MELLIFERA (VENENO DE ABEJA)

Código: I01IGG

Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis

Unidades: mg/L

Plazo: 10 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional:

Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A ASPERGILLUS NIGER

Código: RM207IGG

Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis

Unidades: mg/L

Plazo: 10 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 1 mL

Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A BETA-LACTOGLOBULINA (F77)

Código: BETLACIGG

Técnica: FLUOROINMUNOANÁLISIS

Unidades: mg/L

Plazo: 10 días

Tubo: Suero Basal

Descripción: IGG ESPECIFICA A BETA-LACTOGLOBULINA (F77)
Comentario adicional: 1 mL
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A CASEINA (F78)
Código: CASEINAIGG
Técnica: FLUOROINMUNOANÁLISIS
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A ENTEROTOXINA A STAPHILOCOCCUS.
Código: M80IGG
Técnica: Fluoroimmunoanalisis (Cap System)
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A ENTEROTOXINA C STAPHILOCOCCUS
Código: M223IGG
Técnica: Fluoroimmunoanalisis (Cap System)
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A ENTEROTOXINA TSST STAPHILOCOCCUS.
Código: M226IGG
Técnica: Fluoroimmunoanalisis (Cap System)
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A EXCREMENTOS DE PERIQUITO
Código: E77IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroimmunoanalisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A INSECTOS BLATELLA GERMANICA (CUCARACHA)
Código: I06IGG

Descripción: IGG ESPECIFICA A INSECTOS BLATELLA GERMANICA (CUCARACHA)
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A MICROPOLYSPORA FAENI
Código: GM22IGG
Técnica: CAO SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS ASPERGILLUS FUMIGATUS
Código: M03IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS CANDIDA ALBICANS
Código: M05IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmuinoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS FUSARIUM MONILIFORME
Código: M09IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS MUCOR RACEMOSUS
Código: M04IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal

Descripción: IGG ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS MUCOR RACEMOSUS

Comentario adicional:

Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS PENICILLIUM NOTATUM

Código: M01IGG

Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroimmunoanálisis

Unidades: mg/L

Plazo: 10 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional:

Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A PALOMA (plumas, excrem y prots)

Código: GE91IGG

Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroimmunoanálisis

Unidades: mg/L

Plazo: 10 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional:

Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A PLUMAS DE PALOMA

Código: E215IGG

Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroimmunoanálisis

Unidades: mg/L

Plazo: 10 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional:

Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A PLUMAS DE PERIQUITO

Código: E78IGG

Técnica: CAP SYSTEM- Fluoroimmunoanálisis

Unidades: mg/L

Plazo: 10 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional:

Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A POLENES DA SECALE CEREALE (CENTENO)

Código: G12IGG

Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroimmunoanálisis

Unidades: mg/L

Plazo: 10 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional:

Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A POLENES DE ARBOLES CORYLUS AVELLANA

Código: T04IGG

Descripción: IGG ESPECIFICA A POLENES DE ARBOLES CORYLUS AVELLANA
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A POLENES DE ARBOLES PINUS STROBUS (PINO)
Código: T16IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroimmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A POLENES DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS (CIPRES
Código: T23IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroimmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A POLENES DE CYNODON DACTYLON (GRAMA MAYO
Código: G02IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroimmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A POLENES DE DACTYLIS GLOMERATA (GRAMA, C
Código: G03IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroimmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A POLENES DE FESTUCA ELATIOR (CAÑUELA, FE
Código: G04IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroimmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal

Descripción: IGG ESPECIFICA A POLENES DE FESTUCA ELATIOR (CAÑUELA, FE
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A POLENES DE FRAXINUS AMERICANA (FRESNO)
Código: T15IGG
Técnica: CAP SYSTEM- Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A POLENES DE GRAMINEAS ANTHOXANTHUM ODORATUM
Código: G01IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis.
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A POLENES DE HERBACEAS URTICA DIOICA (ORTIGA)
Código: W20IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A POLENES DE LOLIUM PERENNE (BALLICO)
Código: G05IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A POLENES DE PARIETARIA JUDAICA (PARIETAR
Código: W21IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A POLENES DE PHLEUM PRATENSE (HIERBA TIM
Código: G06IGG

Descripción: IGG ESPECIFICA A POLENES DE PHLEUM PRATENSE (HIERBA TIM
Técnica: CAP-SYSTEM-Fluoroimmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A POLENES DE PLANTAGO LANCEOLATA
Código: W09IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroimmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A POLENES DE PLATANUS ACERIFOLIA
Código: T11IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroimmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A POLENES DE POA PRATENSIS (ESPIGUILLA)
Código: G08IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroimmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A POLENES DE QUERCUS ALBA (ROBLE, ENCINA)
Código: T07IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroimmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A POLENES DE SALIX CAPREA (SAUCE)
Código: T12IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroimmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal

Descripción: IGG ESPECIFICA A POLENES DE SALIX CAPREA (SAUCE)
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A POLENES DE SALSOLA KALI (PESTIFER)
Código: W11IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroimmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A POLENES DE ULMUS AMERICANA (OLMO)
Código: T08IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroimmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A POLENES DE CHENOPODIUM ALBUM (CEÑIGO)
Código: W10IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroimmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A POLENES DE PARIETARIA OFFICINALIS
Código: W19IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroimmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A POLISTES SPP. (VENENO DE AVISPA)
Código: I04IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroimmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A VESPULA SPP (VENENO DE AVISPA)
Código: I03IGG

Descripción: IGG ESPECIFICA A VESPULA SPP (VENENO DE AVISPA)
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroimmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA ALFA-LACTOALBUMINA (F76)
Código: ALFLACTIGG
Técnica: FLUOROINMUNOANÁLISIS
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml
Valores de referencia:

Código: ASPERGIAC
Descripción: IGG ESPECIFICA ASPERGILLUS (PRECIPITINAS)
Técnica: Téc. Inmunodifusión Ouchterlony
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	M03IGG	26954-8		IGG ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS ASPERGILLUS FUMIGATUS	mg/L	
Prueba	RM207IGG	58914-3		IGG ESPECIFICA A ASPERGILLUS NIGER	mg/L	
Prueba	M36IGG	63166-3		IGG ESPECIFICA ASPERGILLUS TERREUS	mg/L	
Prueba	M228IGG	99476-4		IGG ESPECIFICA ASPERGILLUS FLAVUS	mg/L	

Descripción: IGG ESPECIFICA ASPERGILLUS TERREUS
Código: M36IGG
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA MOHOS Y HONGOS CLADOSPORIUM HERBARUM
Código: M02IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroimmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA POLENES DE ARTEMISIA VULGARIS (ARTEMISA)
Código: W06IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG EXCREMENTOS GALLINA EN SUERO
Código: SUEGALLIAC
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: U/mL
Plazo: 12 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ML SUERO
Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A ARBOLES SALIX CAPREA (SAUCE)
Código: T12IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A HERBACEAS SALSOLA KALI (PESTIFER)
Código: W11IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A ALFA-LACTOALBUMINA (LECHE DE VACA)
Código: F76IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A CASEINA (LECHE DE VACA)
Código: F78IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A CASEINA (LECHE DE VACA)
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A HERBACEAS ARTEMISIA VULGARIS (ARTEMIS
Código: W06IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A ACAROS ACARUS SIRO
Código: D70IGG4
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroimmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A ACAROS DERMATOPHAGOIDES FARINAE
Código: D02IGG4
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroimmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A ACAROS DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS
Código: D01IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A ACAROS LEPIDOLYPHUS DESTRUCTOR
Código: D71IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A AEDES COMMUNIS (MOSQUITO COMUN)
Código: I71IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A ALIMENTOS CACAHUETE
Código: F13IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A ALIMENTOS CLARA DE HUEVO
Código: F01IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A ALIMENTOS TRIGO
Código: F04IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A ALIMENTOS YEMA DE HUEVO
Código: F75IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A ALTERNARIA ALTERNATA (A. TENUIS)
Código: M06IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A ALTERNARIA ALTERNATA (A. TENUIS)
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A ANIMALES CASPA DE GATO
Código: E01IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A ANIMALES CASPA DE PERRO
Código: E05IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A ANIMALES EPITELIO DE CONEJO
Código: E82IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A ARBOLES CORYLUS AVELLANA (AVELLANO)
Código: T04IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 23 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A ARBOLES CUPRESSUS ARIZONICA
Código: T222IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A ARBOLES CUPRESSUS SEMPERVIRENS
Código: T23IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A ARBOLES FRAXINUS AMERICANA (FRESNO AM
Código: T15IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A ARBOLES OLEA EUROPAEA (OLIVO)
Código: T09IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A ARBOLES PINUS STROBUS (PINO)
Código: T16IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A ARBOLES QUERCUS ALBA (ROBLE,ENCINA)
Código: T07IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A ARBOLES ULMUS AMERICANA (OLMO)
Código: T08IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A ARBOLES ULMUS AMERICANA (OLMO)
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A BETA-LACTOGLOBULINA (LECHE DE VACA)
Código: F77IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A CANDIDA ALBICANS
Código: M05IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A CLADOSPORIUM HERBARUM (HORMODENDR
Código: M02IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A ENTEROTOXINA B STAPHILOC.
Código: M81IGG4
Técnica: Fluorinmunoanálisis (Cap System)
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A ENTEROTOXINA C STAPHILOC
Código: M223IGG4
Técnica: Fluoroanálisis (Cap System)
Unidades: mg/L
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A FESTUCA ELATIOR (CAÑUELA,FE
Código: G04IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A FUSARIUM MONILIFORME
Código: M09IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A GRAMINEAS CYNODON DACTYLON (GRAMA MAY
Código: G02IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A HERBACEAS CHENOPODIUM ALBUM (CEÑIGO)
Código: W10IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A HERBACEAS PARIETARIA JUDAICA (PARIETA
Código: W21IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A HERBACEAS PARIETARIA OFFICINALIS (PAR
Código: W19IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A HERBACEAS PARIETARIA OFFICINALIS (PAR
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A HERBACEAS PLANTAGO LANCEOLATA (LLANTE
Código: W09IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A LOLIUM PERENNE (BALLICO)
Código: G05IGG4
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroimmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS ASPERGILLUS FUMIGATUS
Código: M03IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A MUCOR RACEMOSUS
Código: M04IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A OVOALBUMINA
Código: RF232IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A OVOMUCOIDE
Código: RF233IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A PENICILLIUM NOTATUM
Código: M01IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A PHLEUM PRATENSE (HIERBA TIM
Código: G06IGG4
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A POA PRATENSIS (ESPIGUILLA)
Código: G08IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A POLISTES SPP. (VENENO DE AVISPA)
Código: I04IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A RECOMBINANTE rPhl p 1 Polen Hierba Timotea
Código: RG205G4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A RECOMBINANTE rPhl p 1 Polen Hierba Timotea
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: suero
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A RECOMBINANTE rPhl p2 Polen Hierba Timotea
Código: RG206G4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: suero
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A VESPULA SPP (VENENO DE AVISPA)
Código: I03IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA MEZCLA GX1(G3,G4,G5,G6,G8)
Código: GX1G4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA Pólen de Hierba timotea (nPhl p4)
Código: RG208G4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: suero
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA RECOMBINANTE rPhl p 12 H.timotea
Código: RG212G4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA RECOMBINANTE rPhl p 12 H.timotea
Código: RG212G4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero
Valores de referencia:

Descripción: IGG4ESPECIFICA A APIS MELLIFERA (VENENO DE ABEJA)
Código: I01IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4ESPECIFICA A SECALE CEREALE (CENTENO)
Código: G12IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGGESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS ALTERNARIA ALTERNATA
Código: M06IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGGESPECIFICA A POLENES DE OLEA EUROPAEA (OLIVO)
Código: T09IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGLON5 ANTICUERPOS LCR
Código: IGLON5LCR
Técnica: Inmunofluorescencia Indirecta (Células transfectadas)
Unidades:
Plazo: 32 días

Descripción: IGLON5 ANTICUERPOS LCR
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia: Título < 1:2 Negativo
Título > 1:2 Positivo

Descripción: IGLON5 ANTICUERPOS SUERO
Código: IGLON5
Técnica: Inmunofluorescencia Indirecta en células transfectadas
Unidades:
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero: refrigerar.
Valores de referencia: Valor de referencia indicativo: No se detecta

Descripción: IL28B rs8099917 SNP ligado a respuesta a peg-INF/RBV
Código: IL28B_SNP
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Código: IMIPRA
Descripción: IMIPRAMINA MAS DESIPRAMINA
Técnica: Cromatografía líquida /tanden masas (LC-MS/MS)
Comentario adicional: 2 mL suero

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	DESIPRA	3531-1		DESIPRAMINA (Perfil)	ng/mL	
Prueba	IMIDESI	9627-1		IMIPRAMINA (Perfil)	ng/mL	(150 - 250) Suma (Sup. 500) Tóxico - Suma

Descripción: INDICE ANDROGENICO LIBRE (TESTOSTERONA/SHBG)
Código: IANDROGELI
Técnica: Cálculo
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo:
Comentario adicional:
Valores de referencia: (0.7 - 8.7) Mujer 21 años - 49 años Premenopausia
(0.5 - 4.7) Mujer > 50 años Postmenopausia
(24.5 - 113.3) Hombre 21 años - 49 años
(19.3 - 118.4) Hombre > 50 años

Descripción: INDICE DE CALCIO/CREATININA EN ORINA
Código: ICA2_CREA2

Descripción: INDICE DE CALCIO/CREATININA EN ORINA
Técnica: Fórmula
Unidades: mg/mg
Plazo: 3 días
Tubo: Orina Bioquímica
Comentario adicional:
Valores de referencia: (0.032 - 0.19)

Descripción: INDICE DE EXCRECION DE CALCIO
Código: IEXCRECA2
Técnica:
Unidades: mg/dL de F.G.
Plazo: 3 días
Tubo: Orina Bioquímica
Comentario adicional:
Valores de referencia: (0.07 - 0.17)

Descripción: INDICE DE RETICULOCITOS INMADUROS
Código: IRF
Técnica: Citometría de flujo
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: 5 ml sangre total EDTA. Rogamos envío inmediato, evitar extracción viernes.
Valores de referencia: (Inf. 0.3)
(Sup. 0.3) Reti. inmaduros

Descripción: INDICE DE RIESGO DEFECTOS ABIERTOS DEL TUBO NEURAL
Código: INEURAL
Técnica: Fórmula
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: INDICE RIESGO PRENATAL SEGUNDO TRIMESTRE
Valores de referencia:

Descripción: INDICE DE RIESGO PRIMER TRIMESTRE
Código: INDIRIES1
Técnica: Fórmula
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Edad gestacional menor de 14 semanas
Valores de referencia:

Código: IRIESGO1
Descripción: INDICE DE RIESGO PRIMER TRIMESTRE
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	PAPP.A	32046-5		PROTEINA PLASMATICA A ASOCIADA A LA GESTACION	mUI/mL	0.28 mUI/mL-Embarazo-8 semanas 0.47 mUI/mL-Embarazo-9 semanas 0.90 mUI/mL-Embarazo-10 semanas 1.58 mUI/mL-Embarazo-11 semanas 2.51 mUI/mL-Embarazo-12 semanas 3.68 mUI/mL-Embarazo-13 semanas
Prueba	BETAHCGL	25373-2		HCG-BETA LIBRE SUERO	ng/mL	55.13 ng/ml -Embarazo - 8 semanas 72.55 ng/ml -Embarazo - 9 semanas 60.67 ng/ml-Embarazo - 10 semanas 44.54 ng/ml -Embarazo - 11 semanas 34.33 ng/ml-Embarazo - 12 semanas 28.82 ng/ml-Embarazo - 13 semanas
Prueba	INDIRIES1	43995-0		INDICE DE RIESGO PRIMER TRIMESTRE		
Prueba	SEMGEST			SEMANAS DE GESTACION	sem.gestación	
Prueba	PESOCORPO			PESO CORPORAL	kg	
Prueba	ALTURA			ALTURA	cm	
Prueba	EMBARAZOTI			TIPO DE EMBARAZO		
Prueba	F.U.R.			FECHA ULTIMA REGLA		
Prueba	FUMADORA			FUMADORA		
Prueba	DIABETES			DIABETES EMBARAZADA		
Prueba	CRIBADOTIP			CRIBADO TIPO		
Prueba	FECHAECO			FECHA ECOGRAFIA SEMANA 12		
Prueba	CRL			CRL LONGITUD CRANEO CAUDAL	mm	
Prueba	TN			TRANSLUCENCIA NUCAL	mm	
Prueba	HUESONASAL			HUESO NASAL AUSENTE		
Prueba	RAZA			RAZA		
Prueba	NFETOS			NUMERO DE FETOS		

Código:

PHIPROPSA

Descripción:

Indice de salud prostática- PHI (proPSA),Suero

Técnica:

Código:

PHIPROPSA

1 mL de suero

Comentario adicional:

El suero debe centrifugarse y separarse antes de 3 horas despues de la toma de la muestra.

Congelar

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	PHIPSA	2857-1		Perfil Indice de Salud Prostático PSA	ng/mL	(Inf. 4)
Prueba	PHIPSALIBR	10886-0		Perfil Indice de Salud Prostático PSA-Libre	ng/mL	
Prueba	PHIPSAPRO	97149-9		Perfil indice de salud prostático [-2] proPSA	pg/mL	
Prueba	INDICEPHI	97150-7		Perfil Indice de Salud Prostático resultado	Indice	(Inf. 20.99) Riesgo Bajo (21 - 40) Riesgo Moderado (Sup. 40) Riesgo Alto

Descripción:

INDICE DE SATURACION DE TRANSFERRINA

Código:

ISATUFE

Técnica:

Cálculo

Unidades:

%

Plazo:

3 días

Tubo:

Suero Basal

Comentario adicional:

Valores de referencia: (16 - 45)

Descripción:

INDICE DE TIBBLING RESULTADO

Código:

RESINTIBB

Técnica:

Fórmula

Unidades:**Plazo:**

4 días

Tubo:

Comentario adicional: 1 mL suero

1 mL LCR

Valores de referencia: (Inf. 0.80)

Descripción:

INDICE DE TIROXINA LIBRE

Código:

ITIROXLIBR

Técnica:

Inmunoanálisis

Unidades:**Plazo:**

5 días

Tubo:

Suero Basal

Comentario adicional: 1 mL suero. Refrigerar.

Valores de referencia: (4.2 - 14.3)

Descripción:

INDICE OMEGA 3 SANGRE TOTAL

Código:

IOM32AG

Técnica:

Cromatografía de Gases / Ionización de Llama.

Unidades:

%

Descripción: INDICE OMEGA 3 SANGRE TOTAL
Plazo: 13 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: 1 TUBO DE EDTA SANGRE TOTAL, Tubo protegido de la luz
 Volumen mínimo: 1,00 mL
 Conservación:Refrigerar
 Ayuno de 4 horas
Valores de referencia: (8 - 12)

Código: IRIESGO2
Descripción: INDICE RIESGO PRENATAL SEGUNDO TRIMESTRE
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	SEMGEST			SEMANAS DE GESTACION	sem.gestación	
Prueba	BETAHCGL	25373-2		HCG-BETA LIBRE SUERO	ng/mL	55.13 ng/ml -Embarazo - 8 semanas 72.55 ng/ml -Embarazo - 9 semanas 60.67 ng/ml-Embarazo - 10 semanas 44.54 ng/ml -Embarazo - 11 semanas 34.33 ng/ml-Embarazo - 12 semanas 28.82 ng/ml-Embarazo - 13 semanas
Perfil	A1FETO			ALFA-1-FETOPROTEINA SUERO		
Perfil	NEURAL			INDICE DE RIESGO PARA DEFECTOS		
Prueba	RAZA			RAZA		
Prueba	PESOCORPO			PESO CORPORAL	kg	
Prueba	ALTURA			ALTURA	cm	
Prueba	NFETOS			NUMERO DE FETOS		
Prueba	EMBARAZOTI			TIPO DE EMBARAZO		
Prueba	F.U.R.			FECHA ULTIMA REGLA		
Prueba	FUMADORA			FUMADORA		
Prueba	DIABETES			DIABETES EMBARAZADA		
Prueba	CRIBADOTIP			CRIBADO TIPO		
Prueba	FECHAECO			FECHA ECOGRAFIA SEMANA 12		
Prueba	CRL			CRL LONGITUD CRANEO CAUDAL	mm	

Código: ROMA
Descripción: INDICE ROMA
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	CA125	83082-8		CA 125 II SUERO	UI/mL	(Inf. 35)
Prueba	HE4	55180-4		HE4 (PROTEINA EPIDIDIMAL HUMANA)	pmol/L	(Inf. 70) Mujer > 14 años Premenopausia (Inf. 140) Mujer > 14 años Postmenopausia
Prueba	ROMAPRE	69569-2		INDICE ROMA PREMENOPAUSICA	%	(Inf. 7.4) Bajo Riesgo (Sup. 7.4) Alto Riesgo
Prueba	ROMAPOST	69570-0		INDICE ROMA POSTMENOPAUSICA	%	(Inf. 25.3) Bajo Riesgo (Sup. 25.3) Alto Riesgo

Descripción: INDICE TESTOSTERONA/EPITESTOSTERONA EN ORINA
Código: EPITESTOS
Técnica: cromatografía de gases -espectrometría de masas
Unidades: Índice
Plazo: 23 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 20 mL orina (micción aislada)
Valores de referencia: (Inf. 4) ;Observaciones: WADA Agosto 2004. Con la técnica utilizada se obtiene un resultado orientativo, sin validez legal.

Descripción: INESTABILIDAD DE MICROSATÉLITES (MSI) · A. FRAGMENTOS
Código: INEST_MICR
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Tejido tumoral y EDTA
ROTULAR:ONCO
Tejido parafinado. Tª ambiente
Valores de referencia:

Código: INFLIXIMAB
Descripción: INFLIXIMAB NIVELES SUERO Y AC. ANTI INFLIXIMAB
Técnica: FIA
Comentario adicional: 1 mL Suero. Toma de muestra antes de la administración de la próxima dosis.
Alternativa: Plasma

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.

Componentes						
Prueba	INFLIANTIC	90780-8		PERFIL INFLIXIMAB AC. SUERO	AU/mL	(Inf. 10) No se detectan
Prueba	INFLINIVE	86896-8		PERFIL INFLIXIMAB NIVELES SUERO	µg/mL	Límite de cuantificación 0.20 µg/mL. Los rangos óptimos terapéuticos son específicos de la enfermedad.

Descripción: INFLUENZA A ANTICUERPOS IGG

Código: INFLUAACG

Técnica: Técnica CLIA

Unidades:

Plazo: 4 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional:

Valores de referencia: (Inf. 0.90) Negativo
(0.91 - 1.10) Indeterminado
(Sup. 1.11) Positivo

Descripción: INFLUENZA A ANTICUERPOS IGG EN LCR

Código: INFLUAALCR

Técnica: Enzimoimmunoanálisis

Unidades:

Plazo: 9 días

Tubo: Líquidos Biológicos

Comentario adicional: 1 mL LCR. Se recomienda efectuar análisis simultáneo en suero y LCR

Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo
(Sup. 1) Positivo

Descripción: INFLUENZA A ANTICUERPOS IGM

Código: INFLUAACM

Técnica: Enzimoimmunoanálisis

Unidades: NTU

Plazo: 8 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 1 ml suero. Alternativo 1 ml de plasma de citrato sódico, y de heparina Litio.

Valores de referencia: (Inf. 9) Negativo

Descripción: INFLUENZA A Y B VIRUS GRIPE POR PCR

Código: GRIPEAH1N1

Técnica: RT-PCR

Unidades:

Plazo: 6 días

Tubo: Muestra Biología Molecular

Comentario adicional: 1ml Aspirado bronquial-REFRIGERAR
1ml Exudado nasal (escobillón con medio de transporte para virus)-REFRIGERAR
1ml Lavado broncoalveolar-REFRIGERAR
Frotis nasofaríngeo (escobillón con medio de transporte de virus9-REFRIGERAR

Valores de referencia:

Descripción: INFLUENZA B ANTICUERPOS IGG
Código: INFLUBACG
Técnica: Técnica CLIA
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 0.90) Negativo
(0.91 - 1.10) Indeterminado
(Sup. 1.11) Positivo

Descripción: INFLUENZA B ANTICUERPOS IGM
Código: INFLUBACM
Técnica: Técnica EIA
Unidades: NTU
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml suero. Alternativo 1 ml de plasma de citrato sódico, y de heparina Litio.
Valores de referencia: (Inf. 9) Negativo

Descripción: Informe compatibilidad genética (matching)-con coste
Código: INF_COMPAT
Técnica:
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: No requiere muestra adicional. Informe realizado a partir de los resultados de 2 test de compatibilidad genética (test de portadores)
Valores de referencia:

Descripción: Informe extra de ensayos clínicos
Código: ONCOTRIALS
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional: NO necesita muestra, solo TRF e informe
Contactar con Asesoría Genética para procedimiento
Valores de referencia:

Descripción: INHIBIDOR ACTIVIDAD TISULAR DEL PLASMINOGENO (PAI)
Código: PLASMIINH
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: ng/mL
Plazo: 9 días
Tubo: Plasma de Citrato congelado
Comentario adicional: 1 mL plasma (citrato) pobre en plaquetas (doble centrifugación a 2500 g/15min.) Aspirar parte superior. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO
Volumen mínimo
0.90 mL
Valores de referencia: (4 - 43)

Descripción:	INHIBIDORES DEL FACTOR XII EN PLASMA
Código:	INHIFXII
Técnica:	Téc. coagulométrico
Unidades:	U Bethesda
Plazo:	10 días
Tubo:	Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:	1 mL Plasma de Citrato Sódico (Congelado). Enviar congelado.
Valores de referencia:	Negativo

Descripción:	INHIBIDORES ESPECIFICOS FRENTE AL FACTOR IX EN PLASMA
Código:	INHIFIX
Técnica:	Téc. coagulométrica
Unidades:	U Bethesda
Plazo:	9 días
Tubo:	Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:	1 mL plasma citrato pobre en plaquetas (doble centrifugación 2500g/15 min) y congelar
Valores de referencia:	(Inf. 0.5)

Descripción:	INHIBIDORES ESPECIFICOS FRENTE AL FACTOR VIII EN PLASMA
Código:	INHIFVIII
Técnica:	Coagulométrica
Unidades:	U. Bethesda
Plazo:	7 días
Tubo:	Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:	2 mL plasma (citrato) pobre en plaquetas (doble centrifugación a 2500 g/15 min.) Aspirar parte superior. CONGELAR INMEDIATAMENTE Y ENVIAR CONGELADO
Valores de referencia:	La línea de corte mediante esta técnica se establece en 0.5 Unidades Bethesda

Descripción:	INHIBIDORES FRENTE AL FACTOR XI (PLASMA)
Código:	INHIFXI
Técnica:	Téc. coagulométrica
Unidades:	U Bethesda
Plazo:	7 días
Tubo:	Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:	1 mL plasma citrato pobre en plaquetas (doble centrifugación 2500g/15 min) y congelar
Valores de referencia:	(Inf. 0.5) Negativo

Descripción:	Inhibina A
Código:	INIBINAA
Técnica:	Quimioluminiscencia
Unidades:	pg/mL
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL de suero
	Volumen mínimo
	0.50 mL

Descripción: Inhibina A

Valores de referencia: (Inf. 2) Hombre
(1.80 - 90.30) Mujer Fase folicular
(2.70 - 97.50) Mujer Fase luteal
(16.90 - 91.80) Mujer Medio del ciclo
(Inf. 2.10) Mujer Menopausia

Descripción: INHIBINA B DIMERICA

Código: INHIBDIM

Técnica: EIA

Unidades: pg/mL

Plazo: 7 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: Suero

Valores de referencia: (25 - 325) Hombre
(Inf. 341) Mujer
(Inf. 273) Mujer Tercer día del ciclo
(Inf. 5.8) Mujer Postmenopausia
(Inf. 352) Niño
(Inf. 83) Niña

Descripción: INMUNOBLOT ANTICUERPOS IGG EPSTEIN BARR

Código: EPSTBLOT

Técnica: Inmunoblot

Unidades:

Plazo: 12 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 1 mL suero.

Valores de referencia:

Descripción: INMUNOCOMPLEJOS CIRCULANTES SUERO

Código: INMUNOCOM

Técnica: EIA

Unidades: mcg Eq/L

Plazo: 9 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 1ml

Valores de referencia: Inferior a 4.4 Negativo
4.4 - 10.8 Indeterminado
Superior a 10.8 Positivo

Descripción: Inmunodeficiencia combinada severa. Panel

Código: GEN_000484

Técnica:

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Inmunodeficiencia común variable. Panel NGS

Código: GEN_000485

Descripción:	Inmunodeficiencia común variable. Panel NGS
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Inmunodeficiencia ligada X déficit magnesio neoplasia. MAGT1
Código:	GEN_000486
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Inmunodeficiencia. Panel NGS
Código:	GEN_000487
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Inmunodeficiencias primarias. Panel NGS
Código:	GEN_000488
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	INMUNOELECTROFORESIS ORINA (INMUNOFIJACION)
Código:	INMUNO2
Técnica:	Inmunoelectroforesis
Unidades:	
Plazo:	6 días
Tubo:	ORINA INMUNOLOGIA
Comentario adicional:	25 mL orina 24 h
Valores de referencia:	

Descripción:	INMUNOELECTROFORESIS SUERO (INMUNOFIJACION)
Código:	INMUNO
Técnica:	Inmunofijacion
Unidades:	
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal

Descripción: INMUNOELECTROFORESIS SUERO (INMUNOFIJACION)
Comentario adicional: 1mℓ
Valores de referencia:

Código: TIPA_DEFIC
Descripción: INMUNOFENOTIPO DE INMUNODEFICIENCIA
Técnica:
Comentario adicional: 1 tubo de EDTA de 5mℓ

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Perfil	TMEMORIA			CELULAS NAIVE Y MEMORIA T CD45RO/RA		
Perfil	SUB_B			SUBPOBLACIONES LINFOIDES B		

Código: TIPA_DEFIC
Descripción: INMUNOFENOTIPO DE INMUNODEFICIENCIA
Técnica:
Comentario adicional: 1 tubo de EDTA de 5mℓ

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Perfil	TMEMORIA			CELULAS NAIVE Y MEMORIA T CD45RO/RA		
Perfil	SUB_B			SUBPOBLACIONES LINFOIDES B		

Descripción: INMUNOFENOTIPO DE LEUCEMIA AGUDA
Código: TIPA_AGUDA
Técnica: Citometria de flujo
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: 1 tubo de EDTA de 5mℓ
Valores de referencia:

Descripción: INMUNOFENOTIPO DE MASTOCITOSIS SISTÉMICA
Código: TIPA_MASTO
Técnica: Citometría de flujo
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: 1 tubo de EDTA de 5mℓ
Valores de referencia:

Descripción: INMUNOFENOTIPO DE MONOCITOS
Código: TIPA_MONOS
Técnica: Citometria de flujo
Unidades:
Plazo: 4 días

Descripción: INMUNOFENOTIPO DE MONOCITOS
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: 1 tubo de EDTA de 5ml
Valores de referencia:

Descripción: INMUNOFENOTIPO DE NEUTROPENIA
Código: TIPA_NEUTR
Técnica: Citometría de flujo
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: 1 tubo de EDTA de 5ml
Valores de referencia:

Descripción: INMUNOFENOTIPO DE SINDROME MIELODISPLÁSICO
Código: TIPAJE_SMD
Técnica: Citometría de flujo
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: 1 tubo de EDTA de 5ml
Valores de referencia:

Descripción: INMUNOFENOTIPO HEMOGLOBINURIA PAROXÍSTICA NOCTURNA
Código: TIPAJE_HPNI
Técnica:
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: 1 tubo de EDTA de 5ml
Valores de referencia:

Descripción: INMUNOFENOTIPO LEUCOCITARIO EN MEDULA OSEA
Código: TIPALEUMO
Técnica:
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: Medula ósea recogida en tubo de EDTA
Valores de referencia:

Descripción: INMUNOFENOTIPO LIQUIDO CEFALORRAQUÍDEO / LCR
Código: TIPAJE_LCR
Técnica:
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 tubo seco
Valores de referencia:

Descripción: INMUNOFENOTIPO MICOSIS FUNGOIDE SEZARY PAPULOSIS LINFO
Código: TIPA_SEZAR
Técnica: Citometría de flujo
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: 1 tubo de EDTA de 5mℓ
Valores de referencia:

Descripción: INMUNOFENOTIPO MICOSIS FUNGOIDE SEZARY PAPULOSIS LINFO
Código: TIPA_SEZAR
Técnica: Citometría de flujo
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: 1 tubo de EDTA de 5mℓ
Valores de referencia:

Descripción: INMUNOFENOTIPO MICOSIS FUNGOIDE SEZARY PAPULOSIS LINFO
Código: TIPA_SEZAR
Técnica: Citometría de flujo
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: 1 tubo de EDTA de 5mℓ
Valores de referencia:

Descripción: INMUNOFENOTIPO MICOSIS FUNGOIDE SEZARY PAPULOSIS LINFO
Código: TIPA_SEZAR
Técnica: Citometría de flujo
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: 1 tubo de EDTA de 5mℓ
Valores de referencia:

Descripción: INMUNOFENOTIPO MICOSIS FUNGOIDE SEZARY PAPULOSIS LINFO
Código: TIPA_SEZAR
Técnica: Citometría de flujo
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: 1 tubo de EDTA de 5mℓ
Valores de referencia:

Descripción: INMUNOFENOTIPO MICOSIS FUNGOIDE SEZARY PAPULOSIS LINFO
Código: TIPA_SEZAR
Técnica: Citometría de flujo
Unidades:
Plazo: 4 días

Descripción: INMUNOFENOTIPO MICOSIS FUNGOIDE SEZARY PAPULOSIS LINFO
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: 1 tubo de EDTA de 5ml
Valores de referencia:

Descripción: INMUNOFENOTIPO MIELOMA MULTIPLE / GAMMAPATÍA MONOCLONAL
Código: TIPAJE_MM
Técnica: Citometria de flujo
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: 1 tubo de EDTA de 5ml
Valores de referencia:

Descripción: INMUNOFENOTIPO SINDROME LINFOPROLIFERATIVO EN MÉDULA ÓSEA
Código: TIPA_LNHMO
Técnica:
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo:
Comentario adicional: 1 tubo de EDTA de 5ml
Valores de referencia:

Descripción: INMUNOFENOTIPO SINDROME LINFOPROLIFERATIVO EN SANGRE
Código: TIPA_LNHSP
Técnica:
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: 1 tubo de EDTA de 5ml
Valores de referencia:

Descripción: INMUNOFIJACION IgD SUERO
Código: IGDINMFIJ
Técnica: Inmunofijación
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml Suero.
Valores de referencia:

Descripción: Inmunoglobulina A (IgA)secretora en Heces
Código: IGAHECES
Técnica:
Unidades: µg/ml
Plazo: 15 días
Tubo: Heces No Microbiología
Comentario adicional: 2 g Heces (Congelado)
Valores de referencia: (510 - 2040)

Descripción:	INMUNOGLOBULINA IGA
Código:	IGA
Técnica:	Turbidimetría
Unidades:	mg/dL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 mL suero Alternativa plasma de EDTA/heparina.
Valores de referencia:	(70 - 400) > 12 años (Inf. 50) < 1 mes (Inf. 80) 1 mes - 9 meses (15 - 90) 9 meses - 12 meses (15 - 110) 1 año - 2 años (18 - 150) 2 años - 3 años (25 - 160) 3 años - 5 años (35 - 200) 5 años - 8 años (45 - 250) 8 años - 12 años

Descripción:	INMUNOGLOBULINA IGA EN LCR
Código:	IGALCR
Técnica:	Nefelometria
Unidades:	mg/dL
Plazo:	4 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1ml LCR
Valores de referencia:	(Inf. 0.6)

Descripción:	Inmunoglobulina IgA en orina
Código:	IGA2O
Técnica:	Nefelometria-Turbidimetria
Unidades:	mg/24 h
Plazo:	4 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	5 ML ORINA DE 24 HORAS. Indicar volumen de orina 24 horas
Valores de referencia:	(Inf. 10)

Descripción:	INMUNOGLOBULINA IGD
Código:	IGD
Técnica:	Turbidimetria
Unidades:	mg/dL
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	suero Alternativa: Plasma (EDTA o Heparina)
Valores de referencia:	(Inf. 13.2)

Descripción:	INMUNOGLOBULINA IGE TOTAL
Código:	IGE
Técnica:	Técnica FEIA
Unidades:	kU/L
Plazo:	5 días

Descripción:	INMUNOGLOBULINA IGE TOTAL
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	3 mL suero. Alternativa plasma de EDTA o heparina. Enviar muestra refrigerada hasta 7 días, sino, congelar inmediatamente.
Valores de referencia:	(Inf. 2.3) < 6 semanas (Inf. 4.1) 6 semanas - 3 meses (Inf. 7.3) 3 meses - 6 meses (Inf. 10) 6 meses - 9 meses (Inf. 13) 9 meses - 1 año (Inf. 23) 1 año - 2 años (Inf. 32) 2 años - 3 años (Inf. 40) 3 años - 4 años (Inf. 48) 4 años - 5 años (Inf. 56) 5 años - 6 años (Inf. 63) 6 años - 7 años (Inf. 71) 7 años - 8 años (Inf. 78) 8 años - 9 años (Inf. 85) 9 años - 10 años (Inf. 114) > 10 años

Descripción:	INMUNOGLOBULINA IGG
Código:	IGG
Técnica:	Turbidimetría
Unidades:	mg/dL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 mL suero Alternativa plasma EDTA/ heparina.
Valores de referencia:	(700 - 1600) > 6 años (250 - 900) < 1 mes (200 - 700) 1 mes - 5 meses (220 - 900) 5 meses - 9 meses (290 - 1070) 9 meses - 12 meses (340 - 1200) 1 año - 2 años (420 - 1200) 2 años - 3 años (460 - 1240) 3 años - 6 años

Descripción:	INMUNOGLOBULINA IGG EN LCR
Código:	IGGENLCR
Técnica:	Nefelometría
Unidades:	mg/dL
Plazo:	4 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 mL LCR. Refrigerar
Valores de referencia:	(Inf. 3.4)

Descripción:	INMUNOGLOBULINA IGG EN LCR TIBBLING Y TOURTELLOTE
Código:	IGGLCR
Técnica:	Nefelometría, , Standard IFCC/BCR/CAP-CRM 470
Unidades:	mg/dL
Plazo:	3 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1ML DE SUERO Y 1 ML DE LCR. REFRIGERAR.
Valores de referencia:	(Inf. 3.4)

Descripción: Inmunoglobulina IgG en orina
Código: IGG2O
Técnica: Nefelometria
Unidades: mg/24 h
Plazo: 4 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 5 ML ORINA DE 24 HORAS. Indicar volumen de 24 horas
Valores de referencia: (Inf. 10)

Descripción: INMUNOGLOBULINA IGG SUBCLASE 4 SUERO
Código: IGG4
Técnica: Turbidimetria
Unidades: mg/dL
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero. Alternativa Plasma.
Valores de referencia: (0.5 - 78.4) < 2 años
 (1 - 53.7) 2 años - 4 años
 (1.8 - 112.5) 4 años - 6 años
 (0.4 - 99.2) 6 años - 8 años
 (1.9 - 93.2) 8 años - 10 años
 (1.6 - 115) 10 años - 12 años
 (3.7 - 136.0) 12 años - 14 años
 (11 - 157) 14 años - 18 años
 (3.92 - 86.4) > 18 años

Descripción: INMUNOGLOBULINA IGM
Código: IGM
Técnica: Turbidimetría
Unidades: mg/dL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL suero
 Alternativa plasma EDTA/heparina.
Valores de referencia: (40 - 230) > 12 años
 (20 - 200) < 12 años

Descripción: INMUNOGLOBULINA IGM EN LCR
Código: IGMLCR
Técnica: nefelometria
Unidades: mg/dL
Plazo: 3 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1mL
Valores de referencia: (Inf. 0.08)

Descripción: Inmunoglobulina IgM en orina
Código: IGM2O
Técnica: Nefelometria
Unidades: mg/24 h
Plazo: 4 días

Descripción: Inmunoglobulina IgM en orina
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 5 ML ORINA DE 24 HORAS. Indicar volumen de orina 24 horas
Valores de referencia: (Inf . 10)

Descripción: INMUNOHISTOQUIMICA PDL1 22 C3
Código: PDL1_22C3
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo: TEJIDO PARAFINADO
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: INMUNOHISTOQUIMICA: CINTEC P16 HISTOLOGYC
Código: IHQHISTOLO
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo:
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Código: HISTOLOGYC
Descripción: INMUNOHISTOQUIMICA: CINTEC P16 HISTOLOGYC
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	IHQHISTOLO			INMUNOHISTOQUIMICA: CINTEC P16 HISTOLOGYC		
Prueba	DIAGNOST			DIAGNOST		
Prueba	PATOLOGO			PATOLOGO		
Prueba	NBIOP			Registro Biopsia		
Prueba	DMACRO			DMACRO		
Prueba	DMICRO			DMICRO		
Prueba	TBIOPSIA			Especimen		

Código: CITOLOGYC
Descripción: INMUNOHISTOQUIMICA: CINTECPLUS CITOLOGYC
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	IHQCITOLOG			INMUNOHISTOQUIMICA: CINTECPLUS CITOLOGYC		
Prueba	RESDIAG			Resumen Diagnóstico		

Componentes					
Prueba	CITOTECNIC			CITOTÉCNICO	
Prueba	PATO			PATÓLOGO	

Descripción: INMUNOHISTOQUIMICA: PDL-1

Código: IHQPDL1

Técnica:

Unidades:

Plazo:

Tubo:

Comentario adicional:

Valores de referencia:

Descripción: INMUNOHISTOQUIMICA: PHOSPHO HISTONE 3

Código: PHHISTON3

Técnica:

Unidades:

Plazo:

Tubo:

Comentario adicional:

Valores de referencia:

Descripción: INMUNOHISTOQUIMICA: PTEN

Código: PTEN

Técnica:

Unidades:

Plazo:

Tubo:

Comentario adicional:

Valores de referencia:

Descripción: INMUNOHISTOQUIMICA: ROS1

Código: ROS1

Técnica:

Unidades:

Plazo:

Tubo:

Comentario adicional:

Valores de referencia:

Descripción: INMUNOHISTOQUIMICA:HER2

Código: HER2

Técnica:

Unidades:

Plazo:

Tubo:

Comentario adicional:

Valores de referencia:

Descripción: INSULINA AC. SUERO
Código: INSULIAC
Técnica: ELISA
Unidades: U/mL
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: SUERO.0.5 mL
Valores de referencia: (Inf. 10.0) Negativo

Descripción: INSULINA LIBRE, SUERO
Código: INSLI
Técnica:
Unidades: mU/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional:
Valores de referencia: (2.90 - 19.00)

Descripción: INSULINA SUERO
Código: INSULIN
Técnica: Téc. ICMA
Unidades: mcU/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL suero
Valores de referencia: (2 - 15)

Descripción: INTERFERON GAMMA EN LCR
Código: INTERFELCR
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: UI/mL
Plazo: 17 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 mL LCR
Valores de referencia: (Inf. 0.30)

Descripción: INTERFERON GAMMA EN LIQUIDO PLEURAL
Código: INTERFLPE
Técnica: Enzimoinmunoanalisis
Unidades: UI/ml
Plazo: 10 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 ml liquido pleural
Valores de referencia: (Inf. 3.7) Valores compatibles con pleuritis no tuberculosa

Descripción: INTERFERON GAMMA EN SUERO
Código: INTERFGAMM
Técnica: EIA
Unidades: UI/mL

Descripción: INTERFERON GAMMA EN SUERO
Plazo: 12 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: Suero congelado.
Valores de referencia: (Inf. 0.58)

Descripción: INTERLEUCINA 4 SUERO
Código: IL4
Técnica: EIA
Unidades: pg/mL
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 ml de suero, congelado (Volumen mínimo 0.50 mL)
Valores de referencia: (Inf. 38.7)

Descripción: INTERLEUCINA -8(IL-8)
Código: IL8
Técnica: EIA
Unidades: pg/mL
Plazo: 14 días
Tubo: Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional: 1 mL de plasma (EDTA)
 CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO
Valores de referencia: (Inf. 50)

Descripción: INTERLEUCINA II RECEPTOR SOLUBLE (suero congelado)
Código: INTERLII
Técnica: Quimioluminiscencia
Unidades: U/mL
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: Suero congelar
 Volumen mínimo 0.5 mL
Valores de referencia: (158.00 - 623.00)

Descripción: INTERLEUCINA-1(IL-1 beta)
Código: IL1
Técnica: CLIA
Unidades: pg/mL
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 mL suero o plasma (EDTA)
 CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO
Valores de referencia: (Inf. 24.2)

Descripción: INTERLEUCINA-10 (IL-10)
Código: IL10
Técnica: CLIA
Unidades: pg/mL
Plazo: 7 días

Descripción: INTERLEUCINA-10 (IL-10)
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 mL suero
 Volumen mínimo 0.5 mL
 Alternativa: Plasma Heparina sódica o Heparina Litio
 CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO
Valores de referencia: (Inf. 5.90)

Descripción: INTERLEUCINA-2 (IL-2)
Código: IL2
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: pg/mL
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 mL suero. CONGELAR y ENVIAR CONGELADO
 Volume: 1.0 mL (volumen mínimo: 0.50 mL)
Valores de referencia: (Inf. 9.1)

Descripción: INTERLEUCINA-5
Código: IL5
Técnica: Enzimoinmunoanálisis.
Unidades: pg/mL
Plazo: 19 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 mL suero. Congelar y enviar congelado. Volumen 1.0 mL (MÍNIMO 0.50 mL)
Valores de referencia: (Inf. 4.0)

Descripción: INTERLEUCINA-6 (IL-6)
Código: IL6
Técnica: inmunoanálisis
Unidades: pg/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 mL de suero. Congelar y enviar congelado.
 Alternativa: 1mL de plasma EDTA/Heparina. Congelar y enviar congelado.
Valores de referencia: (Inf. 7)

Descripción: INTERLEUCINA-6 (IL-6) MUESTRA
Código: IL6MUESTRA
Técnica: INMUNOANÁLISIS
Unidades: pg/mL
Plazo: 5 días
Tubo:
Comentario adicional: Antes de enviar la muestra es necesario contactar con el laboratorio.
Valores de referencia:

Descripción: INTERLEUCIONA 17 EN SUERO
Código: IL17
Técnica:
Unidades: pg/mL
Plazo: 17 días

Descripción: INTERLEUCIONA 17 EN SUERO
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 mL suero o plasma (EDTA). CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.
Valores de referencia: (Inf. 1.4)

Descripción: Intolerancia a la Fructosa: gen ALDOB (NGS)
Código: FRUCTOSMUT
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Intolerancia a la lactosa de adulto: gen MCM6 (NGS)
Código: MCM6_MUTS
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.
Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: ISLOTES DE LANGERHANS AC. SUERO (CELULAS BETA PANCREATICAS)
Código: ISLOTESAC
Técnica: ICMA
Unidades: UI/mL
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ML de suero
Valores de referencia: (Inf. 30)

Código: ISOCIANATO
Descripción: ISOCIANATOS EN ORINA METABOLITOS
Técnica: Cromatografía de gases-Espectrometría de masas
10 ml orina (micción aislada) recogida inmediatamente después de la exposición. Orina final jornada. Refrigerar.
Comentario adicional: Volumen: 10.0 mL
Volumen mínimo: 2 mL

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	HDA	5010569		Perfil Isocianatos, 1,6-HEXAMETILEN DIAMINA	µg/g creat	(Inf. 15.0) Índice Biológico de Exposición orientativo (BAT) según DFG Personas expuestas (1,6-hexametilen diisocianato); Final de la jornada (VLB/ BAT-DFG)

Componentes						
Prueba	TDA2426	5017928		Perfil Isocianatos, 2,4-TDA+2.6-TDA	µg/g creat	(Inf. 5.0) Final jornada laboral en expuestos a TDI (orientativo) Índice Biológico de Exposición orientativo (BAT) según DFG
Prueba	MDA	27409-2		Perfil Isocianatos, 4,4-METILEN DIANILINA	µg/L	(Inf. 10) Valor Límite Biológico-VLB en personas expuestas a MDI (4,4-metilen difenilisocianato) Las aminos analizadas son metabolitos que aparecen en la orina de personas expuestas al diisocianato correspondiente (HDI, TDI, MDI) La relación entre concentración urinaria de HDA y TDA y efectos en la salud no está establecida, por lo que estos valores son útiles solamente como indicadores de nivel de exposición.

Código: LDHISO
Descripción: ISOENZIMAS DE LDH
Técnica: Electroforesis en agarosa
Comentario adicional: Suero. TA

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	LDH1	2536-1		LDH 1	%	(16.1 - 31.5)
Prueba	LDH2	2539-5		LDH 2	%	(29.2 - 41.6)
Prueba	LDH3	2542-9		LDH 3	%	(17 - 26.2)
Prueba	LDH4	2545-2		LDH 4	%	(5.9 - 12.3)
Prueba	LDH5	2548-6		LDH 5	%	(3.2 - 17.3)

Código: ISOHEMAGL
Descripción: ISOHEMAGLUTININAS perfil
Técnica: hemaglutinación
Comentario adicional: Sangre total EDTA 5 mL Refrigerar
 Alternativa: Suero 1 mL. refrigerarSangre total

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	ISOHEMAIGG			Isohemaglutininas anti A IgG		Interpretación según criterio clínico.

Componentes						
Prueba	ISOHEMAIGM			Isohemaglutininas anti A IgM		Interpretación según criterio clínico.
Prueba	ISOHEMBIGG			Isohemaglutininas anti B IgG		Interpretación según criterio clínico.
Prueba	ISOHEMBIGM			Isohemaglutininas anti B IgM		Interpretación según criterio clínico.

Descripción: ISONIAZIDA SUERO

Código: ISONIAZIDA

Técnica: Cromatografía líquida /Tanden masas (LC-MS/MS)

Unidades: mcg/mL

Plazo: 32 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 3 ml suero

Valores de referencia: (2 - 5) Valor terapéutico
(Sup. 20) Toxicidad
(2.6 - 3) Dosis 4mg/K Acetilador lento
(Sup. 3) Dosis 10mg/K Acetilador lento
(7.8 - 12) Dosis 15mg/K Acetilador lento
(Inf. 1.2) Dosis 4mg/K Acetilador rápido
(Inf. 2) Dosis 10mg/K Acetilador rápido
(2.5 - 4.9) Dosis 15mg/K Acetilador rápido

Descripción: Jo-1 AC. SUERO

Código: JO1AC

Técnica: Técnica Inmunoblot

Unidades:

Plazo: 5 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional:

Valores de referencia: Negativo

Descripción: Johanson Blizzard, Sd. Sec Gen: UBR1

Código: GEN_000489

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Joubert /Nefronoptosis juvenil fam,Sd. Sec Gen: NPHP1

Código: GEN_000490

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Joubert, Sd. y patologías relacionadas. Panel NGS
Código: GEN_000491
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Kabuki, Sd. Panel NGS
Código: GEN_000492
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Kallmann, Sd. Panel NGS
Código: GEN_000493
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Kenny-Caffey, Sd. Sec Gen: TBCE
Código: GEN_000494
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: KETAMINA CONFIRMACION EN SALIVA
Código: KETASAL
Técnica: LC-MS/MS
Unidades: ng/mL
Plazo: 10 días
Tubo: Saliva
Comentario adicional: Saliva recogida en kit ORAL-EZE. Solicitar kit en el almacén.
Valores de referencia:

Descripción: KETAMINA EN ORINA CONFIRMACION
Código: KETAMIN
Técnica: Cromatografía líquida - tándem masas LC-MS/MS
Unidades: ng/mL
Plazo: 7 días

Descripción: KETAMINA EN ORINA CONFIRMACION
Tubo: Orina Drogas de Abuso
Comentario adicional: 10 mL micción aislada. refrigerada
Valores de referencia: Límite de cuantificación 25 ng/mL
Incertidumbre de medida 5.1 ng/mL

Descripción: Kindler, Sd. Sec Gen: FERMT1
Código: GEN_000495
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Kingella kingae PCR Cualitativa
Código: TOXKINGELL
Técnica: Hibridación molecular con ampliación (PCR)
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional: 5 ml sangre (EDTA), suero, líquido sinovial...
Valores de referencia:

Descripción: KL-6 (KREBS VON DEN LUNGEN 6) SUERO
Código: KL6
Técnica: Inmunoanálisis
Unidades: U/mL
Plazo: 32 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1mL de suero
Valores de referencia: (Inf. 450) De manera orientativa hasta 450 U/mL

Descripción: Klippel-Feil tipo 1, Sd. Sec Gen: GDF6
Código: GEN_000496
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Krabbe, enfermedad de. Sec Gen: GALC
Código: GEN_000497
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: KS ANTICUERPOS(ASPARAGINIL-TRNA SINTETASA) EN SUERO
Código: KSAC
Técnica:
Unidades:
Plazo: 11 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero
Valores de referencia:

Descripción: Ku Ac. SUERO
Código: AC.KU
Técnica: tec. inmunoblot
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: Negativo

Descripción: LAB. CALDERON: Panel NGS Predisposición a Cáncer Hereditario
Código: CALDER_TOT
Técnica:
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Biología Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún apatario, y rotulado con BM.
Valores de referencia:

Descripción: LACOSAMIDA SUERO
Código: LACOSAMIDA
Técnica: Cromatografía líquida / Espectrometría de masas tándem (LC-MS / MS)
Unidades: mg/L
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 0.5 mL suero SIN gel separador
 Conservación: CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO
 Volumen mínimo: 0.2 mL
 No utilizar tubos con gel separador.
Valores de referencia: (1 - 10) Intervalo terapéutico
 (Inf. 0.5) Límite de cuantificación
 (Sup. 20) Toxicidad

Descripción: LACTICO EN LCR
Código: LACTLCR
Técnica: Espectrometría
Unidades: mg/dL
Plazo: 5 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1ml LCR
Valores de referencia: (10.8 - 18.9)

Descripción: LACTOFERRINA AC. SUERO
Código: LACTOFEAC
Técnica: Enzimoinmuanálisis
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL de suero con gel separador
Volumen mínimo: 0.3 mL
Valores de referencia: (Inf. 1.00) Negativo
(Sup. 1.00) Positivo

Descripción: LACTOFERRINA EN HECES
Código: LACTOFEHEC
Técnica: INMUNOCROMATOGRÁFICA
Unidades:
Plazo: 8 días
Tubo: heces especiales
Comentario adicional: 2gr DE HECES, REFRIGERAR
Valores de referencia: Valores de referencia: Negativo

Descripción: LACTOGENO PLACENTARIO EN SUERO
Código: HPL
Técnica: ENZIMOINMUNOANÁLISIS
Unidades: µg/mL
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml suero
Valores de referencia:

Descripción: LAMINA 332 ANTICUERPOS EN SUERO
Código: LAMININ332
Técnica: Cell Binding Assay, IFI
Unidades: Título
Plazo: 24 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL de suero refrigerado
Valores de referencia: Negativo <1/10

Descripción: LAMOTRIGINA SUERO
Código: LAMOTRIGIN
Técnica: Cromatografía líquida/Espectrometría de masas tandem (LC-MS/MS)
Unidades: mg/L
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: Tubo Suero Congelado SIN gel separador
Volumen: 0.5ml de suero congelado.
Volumen mínimo: 0.2mL de suero congelado
1 alícuota específica para este análisis.

Descripción: LAMOTRIGINA SUERO
Valores de referencia: (1 - 15) Intervalo terapéutico
 (Sup. 20) Toxicidad
 (Inf. 1) Límite de cuantificación

Descripción: Laron, Sd. Sec Gen: GHR
Código: GEN_000498
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: LATEX-FACTOR REUMATOIDE EN LIQUIDO PLEURAL
Código: LIQPLATEX
Técnica: Inmunoturbidimetria
Unidades: UI/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 40)

Descripción: LATEX-FR (FACTOR REUMATOIDE)
Código: LATEXFR
Técnica: Inmunoturbidimetria
Unidades: UI/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL suero. Alternativa: plasma de EDTA
Valores de referencia: (Inf. 14)

Descripción: LDH
Código: LDH
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: U/L a 37 °C
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL. También se realiza en líquidos biológicos. Suero y plasma heparina
Valores de referencia: (290 - 775) < 4 días
 (545 - 2000) 4 días - 10 días
 (180 - 430) 10 días - 2 años
 (110 - 295) 2 años - 12 años
 (Inf. 248) Hombre > 12 años
 (Inf. 247) Mujer > 12 años

Descripción: LDH EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
Código: LIQLCLDH
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: U/L

Descripción: LDH EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
Plazo:
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: LDL OXIDADA, SUERO
Código: LDLOXIDADA
Técnica: Enzimoinmunoanálisis.
Unidades: ng/mL
Plazo: 12 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 mL Suero (-8 °C - Congelar)
Valores de referencia: (57.7 - 133.2)
 (77.7 - 144.6) DM tipo 2 sin HTA
 (92.5 - 192.2) DM tipo 2
 (107.5 - 207.3) DM tipo 2 con HTA

Descripción: LDL OXIDADAS ANTICUERPOS
Código: LDLOXAC
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: Índice
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 mL Suero congelado
Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo

Descripción: LDL-COLESTEROL
Código: LDL
Técnica:
Unidades: mg/dL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 116) Para pacientes con riesgo CV bajo
 (Inf. 100) Para pacientes con riesgo CV moderado
 (Inf. 70) Para pacientes con riesgo CV elevado
 (Inf. 55) Para pacientes con riesgo CV muy elevado

Descripción: LEFLUNOMIDA
Código: LEFLUNOMID
Técnica: Cromatografía líquida - tandem masas (LC-MS/MS)
Unidades: mg/L
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml suero
Valores de referencia: (5.9 - 11.7) (A dosis de 5 mg)
 (8.4 - 27.6) (A dosis de 10 mg)
 (27 - 99) (A dosis de 25 mg)

Descripción: LEGIONELLA PNEUMOPHILA AC TOTALES
Código: LEGIOACTOT
Técnica: CLIA
Unidades: Indice
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 0.89) Negativo
 (0.90 - 1.10) Indeterminado
 (Sup. 1.11) Positivo

Descripción: LEGIONELLA PNEUMOPHILA AC. IGM SUERO
Código: LEGIONEACM
Técnica: CLIA
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL. También se realiza en líquidos biológicos.(serogrupo 1)
Valores de referencia: (Inf. 0.8) Negativo
 (0.8 - 1.1) Indeterminado
 (Sup. 1.1) Positivo

Descripción: Legionella pneumophila DNA PCR Cualitativa
Código: LEGIONEPCR
Técnica: Deteccion DNA Hibridacion Molecular con Amplificacion (PCR) a Tiempo Real
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional: Muestra respiratoria. De manera alternativa 2 mL suero o 2 mL orina
Valores de referencia:

Descripción: Leigh, Sd. Panel NGS
Código: GEN_000706
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: LEISHMANIA AC. IGM
Código: LEISHMAIGM
Técnica: Inmunofluorescencia Indirecta.
Unidades: Titulo
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL.
Valores de referencia: <1:100 Negativo
 = o >1:100 Positivo

Descripción: Leishmania DNA PCR Cualitativa
Código: LEISHMAPCR
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: 1ml Médula ósea EDTA-CONGELAR
1ml Sangre total EDTA-CONGELAR
Biopsia de piel (Suero fisiológico)-REFRIGERAR
Valores de referencia: Valor de referencia: No se detecta

Descripción: LEISHMANIA DONOVANI AC. IGG
Código: LEISHDOIGG
Técnica: Inmunofluorescencia Indirecta
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL de suero
Valores de referencia: Se consideran niveles significativos los títulos iguales o superiores a 1:320

Descripción: LEISHMANIOSIS AC. SUERO (LEISHMANIA INFANTUM)
Código: LEISHMAAC
Técnica: Técnica CLIA
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 0.89) Negativo
(0.90 - 1.1) Indeterminado
(Sup. 1.11) Positivo

Descripción: Léntigo múltiple; Leopard, Sd. Panel NGS
Código: GEN_000499
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: LEPTINA SUERO
Código: LEPTINA
Técnica: Técnica ELISA
Unidades: ng/mL
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ML SUERO refrigerado
Alternativa: plasma heparina de litio.

Descripción: LEPTINA SUERO

Valores de referencia: (Inf. 7.0) < 10 años
(Inf. 8.3) > 10 años Para IMC (18-25)
(Inf. 19.30) > 10 años Para IMC (25-30)
(Inf. 32.0) > 10 años Para IMC >30
Los valores aumentan en función de la masa corporal. Se recomienda realizar determinaciones periódicas, ya que no es valorable una determinación aislada.
El cálculo del IMC se realiza dividiendo el peso (kg) entre la altura (cm) al cuadrado.

Descripción: LEPTOSPIRA SPP. ANTICUERPOS IGG

Código: LEPTOSPACG

Técnica: ELISA

Unidades:

Plazo: 7 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 1 ml suero refrigerado
Alternativa: plasma heparina de litio

Valores de referencia: (Inf. 9) Negativo
(9 - 11) Indeterminado
(Sup. 11) Positivo

Descripción: LEPTOSPIROSIS ANTICUERPOS IGM

Código: LEPTOSPACM

Técnica: CLIA

Unidades:

Plazo: 4 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional:

Valores de referencia: (Inf. 0.9) Negativo
(0.9 - 1.1) Indeterminado
(Sup. 1.1) Positivo

Descripción: Leri-Weill, Sd. Sec Gen: SHOX

Código: GEN_000500

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Lesch-Nyhan, Sd. Sec Gen: HPRT1

Código: GEN_000501

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: LEUCEMIA AGUDA MIELOIDE · CEBPA · SANGER
Código: CEBPA_MUTS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO.
IMPORTANTE: REFRIGERADO SIEMPRE

NO PINCHAR VIERNES NI VÍSPERAS DE FESTIVOS: la sangre se empieza a procesar dentro de las primeras 48 horas desde la extracción

Valores de referencia:

Descripción: LEUCEMIA AGUDA MIELOIDE · DNMT3A (R882) · HOT SPOT
Código: DNMT3A_MUT
Técnica: SANGER - HOT SPOT
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: 4 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refrigerar] (Estabilidad: 4°C:1 Meses)
o 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refrigerar] (Estabilidad: 4°C:1 Meses)

Valores de referencia:

Descripción: LEUCEMIA AGUDA MIELOIDE · NPM1 · A.FRAGMENTOS
Código: NPM1
Técnica:
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO.
IMPORTANTE: REFRIGERADO SIEMPRE

NO PINCHAR VIERNES NI VÍSPERAS DE FESTIVOS: la sangre se empieza a procesar dentro de las primeras 48 horas desde la extracción

Valores de referencia:

Descripción: LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA · FLT3/ITD y D835 · A.FRAGMENTOS
Código: FLT3
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO.
IMPORTANTE: REFRIGERADO SIEMPRE

Valores de referencia:

Descripción: LEUCINAMINOPEPTIDASA (LAP)
Código: LAP
Técnica: Cinética
Unidades: U/L a 37 °C
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml de suero

Descripción: LEUCINAMINOPEPTIDASA (LAP)

Valores de referencia: (18 - 49)

Descripción: LEUCOCITOS EN EXUDADO

Código: LIQEXULEU

Técnica: Microscopía óptica

Unidades: /μL

Plazo:

Tubo: Líquidos Biológicos

Comentario adicional:

Valores de referencia:

Descripción: Leucodistrofia de adulto: gen LMNB1 (NGS)

Código: LMNB1_MUTS

Técnica:

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Leucodistrofias en adulto. Panel NGS (>10 genes)

Código: GEN_000502

Técnica:

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Leucoencefalop. sust. blanca evanescente: gen EIF2B1 (NGS)

Código: EIF2B1

Técnica: PCR y secuenciación

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Leucoencefalop. sust. blanca evanescente: gen EIF2B2 (NGS)

Código: EIF2B2

Técnica: PCR y secuenciación

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Leucoencefalop. sust. blanca evanescente: gen EIF2B3 (NGS)
Código: EIF2B3
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Leucoencefalop. sust. blanca evanescente: gen EIF2B4 (NGS)
Código: EIF2B4
Técnica: NGS Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Leucoencefalop. sust. blanca evanescente: gen EIF2B5 (NGS)
Código: EIF2B5
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Leucoencefalopatía con sustancia blanca evanescente. Panel
Código: GEN_000503
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Leucoencefalopatía. Panel NGS
Código: GEN_000504
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: LEVETIRACETAM (KEPPRA)
Código: LEVETIR

Descripción: LEVETIRACETAM (KEPPRA)
Técnica: Enzimoinmunoensayo (EIA)
Unidades: mg/L
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL Suero separado y alicuotado.
 Alicuota específica para este análisis.
 Alternativa: Edta potásico, Heparina sodio, Heparina litio.

Tomar la muestra en estado estable (nivel mínimo, antes de la administración) para garantizar una correcta monitorización terapéutica del levetiracetam.

Valores de referencia: (6.00 - 46.00)

Descripción: LEVODOPA
Código: LEVODOPA
Técnica: Cromatografía Líquida/Tándem masas (LC-MS/MS)
Unidades: mcg/mL
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 2 mL. Congelar y enviar congelado. Toma de muestra 2 horas después de administración del medicamento.
Valores de referencia: (1.5 - 2.5) A las dos horas de la administración del medicamento

Descripción: LGI 1 ANTICUERPOS SUERO
Código: LGI1
Técnica: Inmunofluorescencia Indirecta
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero
Valores de referencia:

Descripción: LH
Código: LH
Técnica: Técnica ICMA
Unidades: mU/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (1.80 - 11.78) Mujer > 14 años F. Folicular
 (7.59 - 89.08) Mujer > 14 años Ovulación
 (0.56 - 14.00) Mujer > 14 años F. Luteínica
 (5.16 - 61.99) Mujer > 14 años Post-menopausia
 (0.57 - 12.07) Hombre > 14 años

Descripción: Li Fraumeni, Sd. Panel NGS
Código: GEN_000718
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: LICOPENO EN SUERO
Código: LICOP
Técnica: Cromatografía líquida de alta eficacia
Unidades: µg/L
Plazo: 12 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1mL de suero congelado.
 Separar y congelar inmediatamente.
 Proteger de la luz.
Valores de referencia: (10 - 280)

Descripción: LIDOCAINA SUERO
Código: LIDOCAINA
Técnica: Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectrometría de masas.
Unidades: µg/mL
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL Suero (Refrigerado)
Valores de referencia: (1.50 - 5.00)

Descripción: Li-Fraumeni tipo 2, Sd. Sec Gen: CHEK2
Código: GEN_000505
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Li-Fraumeni, síndrome de. Gen: TP53. Sec completa
Código: TP53_GERMI
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: 2 tubos EDTA T^a ambiente exclusivos para esta determinación rotulados con BM
Valores de referencia:

Descripción: Lig X inmuno de reg-poliendocrinopat-enteropat S IPEX. FOXP3
Código: GEN_000720
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Linaje vía materno judicial (ADN mitocon 1 indiv adicional)
Código: MATLINAJEA
Técnica:

Descripción: Linaje vía materno judicial (ADN mitocon 1 indiv adicional)

Unidades:

Plazo: 21 días

Tubo: Muestra Biología Molecular

Comentario adicional: Lleva KIT especial con cadena de custodia, solicitar a asesoría genética, Enviar con las muestras a Alfonso XII

Muestra: mucosa bucal con Hisopo sin medio

Esta prueba es para añadir algún familiar a la prueba MATLINAJE

Valores de referencia:

Descripción: Linaje vía materno judicial (ADN mitocon 1 indiv adicional)

Código: MATLINAJEA

Técnica:

Unidades:

Plazo: 21 días

Tubo: Muestra Biología Molecular

Comentario adicional: Lleva KIT especial con cadena de custodia, solicitar a asesoría genética, Enviar con las muestras a Alfonso XII

Muestra: mucosa bucal con Hisopo sin medio

Esta prueba es para añadir algún familiar a la prueba MATLINAJE

Valores de referencia:

Descripción: Linaje vía materno judicial (ADN mitocon 1 indiv adicional)

Código: MATLINAJEA

Técnica:

Unidades:

Plazo: 21 días

Tubo: Muestra Biología Molecular

Comentario adicional: Lleva KIT especial con cadena de custodia, solicitar a asesoría genética, Enviar con las muestras a Alfonso XII

Muestra: mucosa bucal con Hisopo sin medio

Esta prueba es para añadir algún familiar a la prueba MATLINAJE

Valores de referencia:

Descripción: Linaje vía materno judicial (ADN mitocon, 2 individuos)

Código: MATLINAJE

Técnica:

Unidades:

Plazo: 21 días

Tubo: Muestra Biología Molecular

Comentario adicional: Lleva KIT especial con cadena de custodia, solicitar a asesoría genética, Enviar con las muestras a Alfonso XII

Muestra: mucosa bucal con Hisopo sin medio

Esta prueba es para 2 individuos, abuela nieta por ejemplo padres recomendables y gratuitos

Valores de referencia:

Descripción: Linaje vía materno judicial (ADN mitocon, 2 individuos)

Código: MATLINAJE

Técnica:

Unidades:

Plazo: 21 días

Tubo: Muestra Biología Molecular

Descripción: Linaje vía materno judicial (ADN mitocon, 2 individuos)
Comentario adicional: Lleva KIT especial con cadena de custodia, solicitar a asesoría genética, Enviar con las muestras a Alfonso XII
Muestra: mucosa bucal con Hisopo sin medio
 Esta prueba es para 2 individuos, abuela nieta por ejemplo padres recomendables y gratuitos

Valores de referencia:

Descripción: Linaje vía materno judicial (ADN mitocon, 2 individuos)
Código: MATLINAJE
Técnica:
Unidades:
Plazo: 21 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Lleva KIT especial con cadena de custodia, solicitar a asesoría genética, Enviar con las muestras a Alfonso XII
Muestra: mucosa bucal con Hisopo sin medio
 Esta prueba es para 2 individuos, abuela nieta por ejemplo padres recomendables y gratuitos

Valores de referencia:

Descripción: Linaje vía paterna judicial (chr Y 1 individuo adicional)
Código: PATLINAJEA
Técnica:
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Lleva KIT especial con cadena de custodia, solicitar a asesoría genética, Enviar con las muestras a Alfonso XII
Muestra: mucosa bucal con Hisopo sin medio
 Esta prueba es para añadir algún familiar masculino a la prueba PATLINAJE

Valores de referencia:

Descripción: Linaje vía paterna judicial (cromosoma Y, 2 individuos)
Código: PATLINAJE
Técnica:
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Lleva KIT especial con cadena de custodia, solicitar a asesoría genética, Enviar con las muestras a Alfonso XII
Muestra: mucosa bucal con Hisopo sin medio
 Esta prueba es para 2 individuos: abuelo/nieto por ejemplo

Valores de referencia:

Descripción: Linaje vía paterna judicial (cromosoma Y, 2 individuos)
Código: PATLINAJE
Técnica:
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Lleva KIT especial con cadena de custodia, solicitar a asesoría genética, Enviar con las muestras a Alfonso XII
Muestra: mucosa bucal con Hisopo sin medio
 Esta prueba es para 2 individuos: abuelo/nieto por ejemplo

Valores de referencia:

Descripción: Linaje vía paterna judicial (cromosoma Y, 2 individuos)
Código: PATLINAJE

Descripción: Linaje vía paterna judicial (cromosoma Y, 2 individuos)

Técnica:

Unidades:

Plazo: 10 días

Tubo: Muestra Biología Molecular

Comentario adicional: Lleva KIT especial con cadena de custodia, solicitar a asesoría genética, Enviar con las muestras a Alfonso XII

Muestra: mucosa bucal con Hisopo sin medio

Esta prueba es para 2 individuos: abuelo/nieto por ejemplo

Valores de referencia:

Descripción: LINDANO EN ORINA

Código: LINDANOOR

Técnica: Cromatografía de gases/Espectrofotometría de masas

Unidades: µg/L

Plazo: 23 días

Tubo: Orina pruebas referencia

Comentario adicional: 10 ml de orina (micción aislada)

Valores de referencia: (Inf. 1) Personal no expuesto. (Baselt RC.Biological Monitoring Methods for Industrial Chemicals)

Descripción: LINDANO SUERO (Hexaclorociclohexano)

Código: LINDANO

Técnica: Cromatografía de Gases / Espectrometría Masas.

Unidades: µg/L

Plazo: 23 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 3 ml suero CON gel separador, al final de la jornada laboral
Conservación: REFRIGERAR

Valores de referencia: (Inf. 25) Índice Biológico de Exposición orientativo (BAT) según DFG
(Final jornada laboral)
Personal expuesto a LINDANO

Descripción: LINEZOLID PLASMA

Código: LINEZOLID

Técnica: LC-MS/MS

Unidades: mcg/mL

Plazo: 4 días

Tubo: Plasma EDTA Refrigerado

Comentario adicional: 1 mL plasma (EDTA), también es válida muestra de suero.

Valores de referencia: (1.3 - 8.0) Valores de referencia orientativos
(Sup. 10) Toxicidad

Descripción: Linfedema - distiquiasis, Sd. Sec Gen: FOXC2

Código: GEN_000506

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Biología Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Linfedema hereditario: gen FLT4 (NGS)
Código: FLT4_MUTS
Técnica: NGS con TSOE Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Muestras de tejido tumoral y sangre.
Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: LINFOCITOS B NAIVE
Código: LBNAIVE
Técnica:
Unidades: % sobre CD19
Plazo: 4 días
Tubo:
Comentario adicional:
Valores de referencia: (54 - 88.4) 2 años - 5 años
(47.3 - 77) 5 años - 10 años
(51.3 - 82.5) 10 años - 16 años
(48.4 - 79.7) > 16 años

Descripción: LINFOCITOS B TRANSICIONALES
Código: TRANSICIO
Técnica:
Unidades: % sobre CD19
Plazo: 4 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional:
Valores de referencia: (3.1 - 12.3) 2 años - 5 años
(4.6 - 8.3) 5 años - 10 años
(1.4 - 13) 10 años - 16 años
(0.9 - 5.7) > 16 años

Código: CELULASNK
Descripción: LINFOCITOS NATURAL KILLER SANG
Técnica: Citometría de flujo
Comentario adicional: 5 mL sangre total EDTA

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	CELULASNK1	5011449		LINFOCITOS NATURAL KILLER SANGRE		
Prueba	CD56NKH1	8133-1		CELULAS KILLER CD56(NKH-1)	%	
Prueba	CD56NKHT	14113-5		CELULAS NATURAL KILLER TOTALES	/μL	
Prueba	NOTATIP			NOTA TIPAJE LEUCOCITOS SANGRE PERIFERICA		
Prueba	LINFOTOT	30364-4		LINFOCITOS TOTALES (POBLACIONES LINFOCITARIAS)	/μL	(1000 - 4500)
Prueba	CELNK1TOT	53936-1		CELULAS NK TOTALES	/μL	

Descripción: LINFOCITOS T ACTIVADOS
Código: CD3DR
Técnica: Citometría de flujo
Unidades: %
Plazo: 4 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: 5 mL sangre total EDTA a temperatura ambiente
Valores de referencia:

Código: LINFOTB1
Descripción: LINFOCITOS T Y B EN SANGRE TOTAL
Técnica: Citometría de flujo
Comentario adicional: 5 mL sangre total EDTA

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	LINFOTOT	30364-4		LINFOCITOS TOTALES (POBLACIONES LINFOCITARIAS)	/μL	(1000 - 4500)
Prueba	CD3	8124-0		MARCADORES LINFOIDES (CD3)	%	
Prueba	CD3T	8122-4		LINFOCITOS CD3 TOTALES	/μL	
Prueba	CD19	8117-4		MARCADORES LINFOIDES CD19	%	
Prueba	CD19T	8116-6		LINFOCITOS CD19 TOTALES	/μL	
Prueba	NOTATIP			NOTA TPAJE LEUCOCITOS SANGRE PERIFERICA		

Código: T4T8
Descripción: LINFOCITOS T4/T8 (COCIE)
Técnica:
Comentario adicional: 1 tubo de EDTA de 5ml
 Envío inmediato a temperatura ambiente

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	LINFOTOT	30364-4		LINFOCITOS TOTALES (POBLACIONES LINFOCITARIAS)	/μL	(1000 - 4500)
Prueba	CD3	8124-0		MARCADORES LINFOIDES (CD3)	%	
Prueba	CD3T	8122-4		LINFOCITOS CD3 TOTALES	/μL	
Prueba	CD4	8123-2		CD4 (T4)	%	(25 - 66) 2 años - 5 años (26 - 61) 5 años - 10 años (20 - 65) 10 años - 16 años (28 - 64) > 16 años
Prueba	CD4T	24467-3		CD4 (T4) TOTAL	/μL	(500 - 2700) 2 años - 5 años (400 - 2500) 5 años - 10 años (400 - 2100) 10 años - 16 años (500 - 2000) > 16 años

Componentes						
Prueba	CD8	8101-8		CD8 (T8)	%	(9 - 49) 2 años - 5 años (13 - 47) 5 años - 10 años (14 - 40) 10 años - 16 años (12 - 40) > 16 años
Prueba	CD8T	14135-8		CD8 (T8) TOTAL	/μL	(200 - 1800) 2 años - 5 años (200 - 1700) 5 años - 10 años (300 - 1300) 10 años - 16 años (200 - 1200) > 16 años
Prueba	COCIENTE	54218-3		COCIENTE T4/T8		
Prueba	NOTATIP			NOTA TIPAJE LEUCOCITOS SANGRE PERIFERICA		

Código: CI_CELIAQU
Descripción: LINFOGRAMA DUODENAL EN ENFERMEDAD CELIACA
Técnica: Citometria de flujo
Comentario adicional: Muestra de Biopsia de Bulbo duodenal/segunda porción duodenal en tubo estéril suspendido en 5 ml de suero salino o PBS

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	LINFO_EPIT			LINFOCITOS INTRAEPITELIALES	%	(Inf. 12) El porcentaje se expresa sobre la celularidad total
Prueba	LTGD			LINFOCITOS T GAMMA/DELTA	%	(Inf. 1) El porcentaje se expresa sobre la celularidad total
Prueba	LTGD_EPI			LINFOCITOS T GAMMA/ DELTA	%	(Inf. 10) El porcentaje se expresa sobre linfocitos intraepiteliales
Prueba	CD3_CD103			LINFOCITOS CD3-CD103+ (I-NK)	%	(Sup. 10) El porcentaje se expresa sobre linfocitos intraepiteliales
Prueba	NOTA_DUODE			NOTA LINFOGRAMA DUODENAL		

Descripción: Linfohistiocitosis hemofagocítica fam. Sec Gen: PRF1
Código: GEN_000508
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Linfohistiocitosis hemofagocítica familiar. Panel NGS
Código: GEN_000507
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción:

Linfohistiocitosis hemofagocítica familiar. Panel NGS

Comentario adicional:

Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción:

LIPASA

Código:

LIPA

Técnica:

Enzimática/colorimétrica

Unidades:

U/L

Plazo:

3 días

Tubo:

Suero Basal

Comentario adicional:

0.5 mL suero
Alternativa plasma heparina Li

Valores de referencia:

(Inf. 67) > 18 años
(Inf. 8) < 1 año
(5 - 31) 1 año - 10 años
(7 - 39) 10 años - 18 años

Código:

LIPIDOGRAMA

Descripción:

LIPIDOGRAMA SUERO

Técnica:

Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	PREALFA	15121-7		PREALFA, LIPIDOGRAMA	%	(22 - 46)
Prueba	PREBETA	15123-3		PREBETA, LIPIDOGRAMA	%	(1 - 27)
Prueba	BETA_LIP	15122-5		BETA, LIPIDOGRAMA	%	(47 - 71)
Prueba	BETA_ALFA	44717-7		COCIENTE BETA/ALFA DEL LIPIDOGRAMA		(1.1 - 3.1) beta+pre beta/alfa
Prueba	BETA_PRE	56777-6		COCIENTE BETA/PREBETA EN EL LIPIDOGRAMA		(2.2 - 6.2) beta/pre beta

Descripción:

LIPIDOS TOTALES

Código:

LIP

Técnica:

Unidades:

mg/dL

Plazo:

3 días

Tubo:

Suero Basal

Comentario adicional:

.

Valores de referencia:

(Inf. 800)

Descripción:

Lipodistrofia congénita generalizada. Panel NGS

Código:

GEN_000509

Técnica:

Unidades:

Plazo:

30 días

Tubo:

EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional:

Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Lipofucinosis cerioide neuronal. Panel NGS
Código: GEN_000510
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Lipofuscinosis neuronal cerioidea: gen PPT1 (NGS)
Código: LIPOFUSMUT
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Lipogranulomatosis de Farber. Sec Gen: ASAH1
Código: GEN_000511
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: LIPOPROTEINA (A) SUERO
Código: LPA
Técnica: Téc. Turbidimetría
Unidades: mg/dL
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL Suero
 Alternativa: plasma de EDTA, heparina.
Valores de referencia: (Inf. 30)

Descripción: LIPOPROTEINA MEMBRANA HEPATICA (LSP) AC.SUERO
Código: ANTILSP
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL SUERO
Valores de referencia: Negativo <1/40
 Positivo >1/40

Descripción: LIPOPROTEINA X
Código: LPX

Descripción: LIPOPROTEINA X
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: mg/dL
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL de suero
Valores de referencia: (Inf. 50) < 6 meses
 (Inf. 10) > 6 meses

Descripción: LIPOSCALE: TEST AVANZADO DE LIPOPROTEINAS (RMN)
Código: LIPOSCALE
Técnica: RMN
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia:

Código: SEMENCUL
Descripción: LIQUIDO SEMINAL CULTIVO, IDENT
Técnica: Cultivo en medios apropiados
Comentario adicional: 1 mL semen

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Perfil	CULTIVO		SEMEN	CULTIVO GENERAL en ESTUDIO MICROBIOLOGICO DE LIQUIDO SEMINAL		

Descripción: LIQUIDO SINOVIAL CRISTALES
Código: LIQSICRIS
Técnica: Microscopía luz polarizada
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: Líquido sinovial (heparina sódica)5
 Volumen 5.0 mL
 Volumen mínimo 2 mL
Valores de referencia:

Descripción: LIQUIDOS Y EXUDADOS LDH
Código: LIQEXULDH
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: U/L a 37 °C
Plazo: 3 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: LIQUIDOS Y EXUDADOS PH
Código: LIQEXUPH
Técnica: Tira reactiva
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: LIQUIDOS Y EXUDADOS RECUENTO CELULAR
Código: LIQEXUCE
Técnica: Microscopía óptica
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Lisencefalia ligada al X tipo 1. Sec Gen: DCX
Código: GEN_000513
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Lisencefalia: >10 genes (NGS)
Código: LISENCEFAL
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Valores de referencia: Alternativas: Heparina y Citrato.

Descripción: LISOZIMA EN LCR
Código: LISOZLCR
Técnica: Turbidimetría
Unidades: mg/L
Plazo: 9 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 ml
Valores de referencia: (Inf. 2)

Descripción: LISOZIMA EN LIQUIDO PLEURAL
Código: LISOZLIQPL
Técnica: Turbidimetría
Unidades: mg/L

Descripción: LISOZIMA EN LIQUIDO PLEURAL
Plazo: 9 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 15)

Descripción: LISOZIMA EN MUESTRAS BIOLÓGICAS
Código: LISOZIMA
Técnica: Turbidimetría
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional: También se realiza en líquidos biológicos.
Valores de referencia:

Descripción: LISOZIMA ORINA (MURAMIDASA)
Código: LISOZI2
Técnica: Turbidimetría
Unidades: mg/L
Plazo: 6 días
Tubo: Orina basal
Comentario adicional: 10 ml de orina aislada
Valores de referencia: (Inf. 2)

Descripción: LISOZIMA SUERO (MURAMIDASA)
Código: LISOZI
Técnica: Turbidimetría
Unidades: mg/L
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1mL de suero CON gel separador
 Conservación: refrigerar
 Volumen mínimo: 0.5 mL
Valores de referencia: (2.5 - 8.0)

Descripción: LISTERIA MONOCYTOGENES 1/2A Y/O 4B AC IGG
Código: LISTEAC
Técnica: Fijación del Compelemento
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml de suero, no mandar tubo con gel separador
Valores de referencia: Se consideran valores significativos los título superiores a 1:100

Descripción: LISTERIA MONOCYTOGENES (TIPO4B) AC IgM, SUERO
Código: LIS4M
Técnica:
Unidades: Titulo
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal

Descripción: LISTERIA MONOCYTOGENES (TIPO4B) AC IgM, SUERO
Comentario adicional: SUERO refrigerado
Valores de referencia: Título <1/100 No se detectan

Descripción: LITIO
Código: LI
Técnica: ESPECTROFOTOMETRÍA
Unidades: mmol/L
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (0.6 - 1.2) Niveles terapéuticos

Descripción: LITIO EN ORINA
Código: LITIO2
Técnica:
Unidades: mmol/24 h
Plazo: 3 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 5 mL orina 24h. Indicar diuresis 24h
Valores de referencia: Valores terapéuticos indicativos:
 En terapia crónica con litio 10-40 mmol/24h. Recomendamos análisis en suero

Descripción: LITIO ERITROCITOS
Código: LIERI
Técnica: ESPECTROMETRÍA DE MASAS/PLASMA ACOPLADO INDUCTIVAMENTE
Unidades: mmol/L
Plazo: 4 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 2 mL sangre total (EDTA) y 1 mL de plasma (EDTA).
 Se separa el plasma y se envía los dos tubos
Valores de referencia: (0.2 - 0.45) LITIO ERITROCITOS
 (0.8 - 1.4) LITIO PLASMA
 (0.3 - 0.6) INDICE ERITOC/PLASM

Descripción: LKM AC. SUERO
Código: LKMAC
Técnica: Inmunofluorescencia indirecta
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: Negativo <1/40
 Positivo >1/40

Descripción: LMC, RESISTENCIA INHIBIDORES KINASA · T315I · HOT SPOT
Código: BCRABLT315
Técnica: RT-PCR - Sanger
Unidades:
Plazo: 7 días

Descripción:	LMC, RESISTENCIA INHIBIDORES KINASA · T315I · HOT SPOT
Tubo:	TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional:	Recomendada: 9 mL Médula ósea (2 x Tubo PAXGENE) [Tªambiente] (Estabilidad: 20°C:3 Días 4°C:5 Días -20°C:1 Meses) Vol.Min. 5 mL o 9 mL Sangre total (2 x Tubo PAXGENE) [Tªambiente] (Estabilidad: 20°C:3 Días 4°C:5 Días -20°C:1 Meses) Vol.Min. 5 mL Alternativa: 9 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refrigerar] (Estabilidad: 4°C:48 Horas) Vol.Min. 5 mL o 9 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refrigerar] (Estabilidad: 4°C:48 Horas) Vol.Min. 5 mL

Valores de referencia:

Descripción:	LONGITUD TELOMÉRICA, SANGRE TOTAL
Código:	TELCRI
Técnica:	FISH
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	Sangre EDTA
Comentario adicional:	10 mL Sangre total EDTA. Kit específico.REFRIGERAR. Realizar la extracción de lunes a jueves laborables. Enviar inmediatamente después de la extracción No enviar muestras de sangre que presenten hemólisis ni coágulos. Kit Ref SAP: 550000523 Consentimiento informado específico de la medición de longitud telomérica (MPP9) Cuestionario específico que el paciente debe cumplimentar on line (www. lifelength-questionnaire.com). En el kit se proporciona usuario y contraseña específicos para acceder al cuestionario on line.

Valores de referencia:

Descripción:	LORAZEPAM SUERO
Código:	LORAZEPAM
Técnica:	LC-MS/MS
Unidades:	µg/L
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	2 mL
Valores de referencia:	(20 - 250) Intervalo terapéutico (300 - 500) Concentración tóxica (Inf. 5) Límite de cuantificación

Descripción:	LORMETAZEPAM SUERO
Código:	LORMETAZEP
Técnica:	Cromatografía Líquida de Alta Eficacia- Espectrometría de masas
Unidades:	ng/mL
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL Suero. Refrigerado.
Valores de referencia:	(5 - 25) Rango terapéutico

Descripción:	Lowe, Sd. Sec Gen: OCRL
Código:	GEN_000514
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Descripción: Lowe, Sd. Sec Gen: OCRL

Valores de referencia:

Descripción: Lp-PLA2 (Lipoprotein associated phospholipase A2)

Código: LPPLA2

Técnica: CLIA

Unidades: ng/mL

Plazo: 21 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: Suero

Valores de referencia:

Descripción: LRP4 (Low density lipopr receptor relat protein 4) AC. SUERO

Código: LRP4AC

Técnica: Técnica inmunocitoquímica con células transfectadas

Unidades:

Plazo: 26 días

Tubo: Suero Congelado

Comentario adicional: 1 ml suero. CONGELAR

Valores de referencia: Valor de referencia: Negativo

Descripción: LSD EN ORINA

Código: LSD

Técnica: EIA

Unidades:

Plazo: 4 días

Tubo: Orina basal

Comentario adicional: 5 mL orina (micción aislada). REFRIGERAR.

Valores de referencia: Valor de referencia indicativo: Negativo
El valor discriminante de la técnica es 0,50 ng/mL

Descripción: Lujan-Fryns, Sd. Sec Gen: MED12

Código: GEN_000708

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: LUTEINA Y ZEAXANTINA EN SUERO

Código: LUTEI

Técnica: Cromatografía líquida de alta eficacia

Unidades: µg/L

Plazo: 12 días

Tubo: Suero Congelado

Comentario adicional: 1 mL suero congelado
Separar y congelar inmediatamente.
Proteger de la luz.

Valores de referencia: (100 - 500)

Descripción: M3 MITOCONDRIALES AC.
Código: AMA3
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml suero
Valores de referencia: Negativo <1/40
 Positivo >1/40

Descripción: M4 MITOCONDRIALES AC.
Código: AMA4
Técnica: Téc, IFI
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: Negativo <1/40
 Positivo >1/40

Descripción: M9 MITOCONDRIALES AC.
Código: AMA9
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL
Valores de referencia: Negativo <1/80
 Positivo >1/80

Descripción: MACRO AST SUERO
Código: MACROGOT
Técnica: PRECIPITACIÓN-ENZIMÁTICA
Unidades: % no precipit
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 2 mL.
Valores de referencia: (Inf. 27) Presencia de Macro AST

Descripción: MACRO TSH SUERO
Código: MACROTSH
Técnica: PRECIPITACIÓN-INMUNOLUMINISCENCIA
Unidades: %
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 2 mL Suero.
Valores de referencia:

Descripción: MACRO VITAMINA B12, SUERO
Código: MVB12

Descripción:	MACRO VITAMINA B12, SUERO
Técnica:	precipitación con polietilenglicol
Unidades:	% recuperación
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero, 2 mL. Refrigerar.
Valores de referencia:	Valores de referencia orientativos: Se considera presencia de Macro Vitamina B12, cuando el porcentaje de recuperación en el sobrenadante es inferior al 40 %.

Descripción:	MACROAMILASA
Código:	MACROAMI
Técnica:	Precipitación enzimática
Unidades:	%
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero Volumen mínimo: 0.3 mL
Valores de referencia:	(Sup. 27) Ausencia de Macroamilasa

Descripción:	MACROGLOBULINEMIA DE WALDENSTROM · CXCR4(S338X) · HOT SPOT
Código:	CXCR4_MUTS
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional:	Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO. IMPORTANTE: SIEMPRE REFRIGERADO Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	MACROGLOBULINEMIA DE WALDENSTROM · MYD88(L265P) · HOT SPOT
Código:	MYD88_MUTS
Técnica:	PCR y secuenciación
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional:	Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO. IMPORTANTE: REFRIGERADO SIEMPRE
Valores de referencia:	

Descripción:	MACROPROLACTINA SUERO
Código:	MACROPROLA
Técnica:	
Unidades:	% recuperación
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción: Macrotrombocitopenia sordera neurosensorial progresiva. MYH9
Código: GEN_000516
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: MAF TEST
Código: MAFTEST
Técnica: FISH
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Tejido parafinado Tª ambiente
Valores de referencia:

Descripción: MAG (MYELIN ASSOCIATED GLYCOPROTEIN) ANTICUERPOS IgM
Código: MAGACM
Técnica: Immunoblot
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero
Valores de referencia: Negativo: Título <1/100

Descripción: MAG AC. IGM LCR (Glucoproteína asociada a mielina)
Código: MAGACMLCR
Técnica: Técnica Cell Binding Assay IFI
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: LIQUIDO LCR INMUNO
Comentario adicional: 1mL .
Valores de referencia:

Descripción: MAGNESIO
Código: MG
Técnica:
Unidades: mmol/L
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (0.62 - 0.91) 2 días - 4 días
(0.70 - 0.95) 5 meses - 6 años
(0.70 - 0.86) 6 años - 12 años
(0.70 - 0.91) 12 años - 20 años
(0.66 - 1.07) > 20 años

Descripción: MAGNESIO EN PLASMA SEMINAL
Código: MGSEMEN
Técnica: AAS
Unidades: mg/dL
Plazo: 5 días
Tubo: Semen
Comentario adicional:
Valores de referencia: (1.3 - 42.9)

Descripción: MAGNESIO ERITROCITOS
Código: MGERI
Técnica: Absorción atómica/llama
Unidades: mg/L
Plazo: 7 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: Sangre total EDTA Dipotásico (libre trazas metales). Refrigerar
 Cantidad: 1 tubo
 Tubo Sangre EDTA metales traza
 Volumen: 1.0 mL
 Volumen mínimo: 0.35 mL
 Se puede hacer con muestra en tubo libre de metales y anticoagulante Heparina Sódica.
Valores de referencia: (35 - 55)

Descripción: MAGNESIO ORINA
Código: MG2
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: mmol/24h
Plazo: 3 días
Tubo: Orina 24 Horas
Comentario adicional:
Valores de referencia: (3 - 5)

Descripción: Malformac cavernosa cerebral hereditaria 1. Gen: KRIT1
Código: GEN_000518
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Malformac. venosas cutáneas y mucosas. Sec Gen: TEK
Código: GEN_000519
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Malformación cavernosa cerebral hereditaria. Panel NGS
Código: GEN_000517
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Malformaciones del Sistema Nervioso Central (SNC) panel
Código: PHARMALP12
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Imprescindible enviar la historia clínica y formulario de petición de genética o consentimiento informado

Valores de referencia:

Descripción: MALONDIALDEHÍDO PLASMA (TBARS)
Código: MALONDI
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: µmol/L
Plazo: 13 días
Tubo: Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional: 1 mL plasma (EDTA). CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO
Plasma EDTA separar y congelar rápidamente.
Valores de referencia: (2.3 - 4)

Descripción: MammaPrint + BluePrint - Expresión génica
Código: MAMMAPRINT
Técnica: Expresión génica
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Bloque de tejido tumoral. Tª ambiente
Tumor INFILTRANTE
Entregar a Asesoría Genética

Valores de referencia:

Descripción: MANGANESO EN SANGRE
Código: MANGANESO
Técnica: ICP-MS
Unidades: µg/L
Plazo: 6 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: Sangre total EDTA Dipotásico (libre trazas metales)
Valores de referencia: (5.0 - 15.0) .Valores de referencia orientativos.

Descripción: MANGANESO ORINA
Código: MN2
Técnica: ICP-MS
Unidades: µg/g creatinina
Plazo: 6 días
Tubo: Orina Final de Jornada
Comentario adicional: Al menos 5 ml orina final de la semana laboral o del periodo de exposición.

La muestra se contamina fácilmente. Partículas de polvo del ambiente, piel o ropa del trabajador pueden contaminarla (por ello es conveniente que el trabajador se quite la ropa de trabajo y se lave las manos antes de recoger la muestra).

No recolectar muestras de orina en un ambiente en el que sea más probable que ocurra la exposición. Es importante evitar que el polvo de la ropa pueda interferir en el contenido de la muestra.

No recoger la orina en recipientes con base de metal, como urinarios o sartenes de metal. Recoger la orina en tubos de polipropileno inoculturo libre de metales sin tapones de colores. Cuando esto no sea posible, usar para la recogida de orina un envase

Valores de referencia: (Inf. 1) .en personas sin exposición.
 (Inf. 40) .valor límite biológico (VLB) adaptado de ACGIH.

Descripción: MANGANESO SUERO
Código: MN
Técnica: Espectrometría de Masas con Plasma acoplado inductivamente (ICP-MS)
Unidades: µg/L
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: La muestra idónea es contenedor Suero (libre trazas metales). De forma alternativa se puede usar tubo de suero normal y Plasma Heparina litio o Tubo Sangre Heparina litio metales traza

No se puede realizar de plasma de EDTA.

Se rechazarán muestra hemolizadas. La lipémia e ictericia no afectan.
 Volumen mínimo: 0,2 mL

Valores de referencia: (Inf. 1.5) Valores de referencia orientativos. Límite de cuantificación: <1.2 µg/L

Descripción: MANTOUX INTRADERMOREACCION
Código: MANTOUX
Técnica:
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional:
Valores de referencia: NEGATIVO

Descripción: MAPFRE Test compatibilidad parejas y Matching
Código: MAPFREPORT
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Sangre EDTA rotulada con BM
 rellenar consentimiento informado y hoja de matching

Valores de referencia:

Descripción: MAPROTILINA EN SUERO
Código: MAPROTI
Técnica: Cromatografía líquida de alta resolución
Unidades: µg/L

Descripción: MAPROTILINA EN SUERO

Plazo: 8 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 0.5 mL Suero SIN gel separador
Volumen mínimo: 0.1 mL

El contenedor recomendado es el tubo seco (sin gel separador) para evitar procesos de adsorción del fármaco. En caso de no disponer de tubo seco, la extracción se puede realizar en tubo con gel separador, separando el suero dentro de las 2 horas poste

Valores de referencia: (75 - 130) Intervalo terapéutico
(Sup. 220) Toxicidad
(Inf. 12) Límite de cuantificación

Descripción: Marfan, enfermedad de, y aneurismas. Panel NGS

Código: GEN_000345

Técnica:

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Marinesco-Sjögren, Sd. Sec Gen: SIL1

Código: GEN_000520

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: MASTOCITOSIS SISTÉMICA/LAM · KIT(D816V) · HOT SPOT

Código: KIT_D816V

Técnica: PCR y secuenciación

Unidades:

Plazo: 7 días

Tubo: TUBO ONCOGENETICA

Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO.

IMPORTANTE: REFRIGERADO SIEMPRE
Alternativas: Citrato.
Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente

Valores de referencia:

Descripción: McArdle, enf.Glucogenosis tipo 5 Sec Gen: PYGM

Código: GEN_000331

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: MDA5 AC.SU (CORTACTINA/CADM140/TIF1-GAMMA/P155)
Código: MDA5
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: Negativo

Descripción: MDMA (EXTASIS) ORINA SCREENING
Código: TIRAEXTASI
Técnica: Inmunoensayo
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Orina Drogas de Abuso
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: MEDICION LDL ENZIMÁTICO DIRECTO
Código: DIRECTOLDL
Técnica: Enzimática directa
Unidades: mg/dL
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml de suero
Valores de referencia: (Inf. 55) Prevención secundaria y riesgo cardiovascular
(Inf. 70) Riesgo cardiovascular alto
(Inf. 100) Riesgo cardiovascular medio
(Inf. 116) Riesgo cardiovascular bajo

Descripción: Melanoma familiar - susceptibilidad. Sec Gen: MC1R
Código: GEN_000522
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: MELANOMA HEREDITARIO. Panel NGS >10 genes
Código: MELANOMH
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: MELAS (encefalopatía mitocondrial): mtDNA (NGS)
Código: MELAS_MUTS

Descripción: MELAS (encefalopatía mitocondrial): mtDNA (NGS)
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: MELATONINA EN SALIVA (sin especificar hora recogida)
Código: MELATONISA
Técnica:
Unidades: pg/mL
Plazo: 11 días
Tubo: Saliva
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 9.9) Día
 (10.1 - 61.4) Noche

Descripción: MELATONINA EN SUERO
Código: MELATONINA
Técnica: Técnica RIA
Unidades: pg/mL
Plazo: 13 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
 Para muestra nocturna la extracción debe realizarse entre las 0:00 y las 4:00 horas.
Valores de referencia: (Inf. 30) De día
 (Inf. 150) De noche
 Los niveles de Melatonina en suero tienen un marcado ritmo nictemeral teniendo interés el control del citado ritmo más que una determinación aislada.

Descripción: MEMBRANA BASAL GLOMERULAR AC. SUERO
Código: MEMBRANAAC
Técnica: EIA
Unidades: U/mL
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL
Valores de referencia: (Inf. 7) Negativo
 (7 - 10) Indeterminado

Descripción: MEMBRANA HEPATICA (LMA) AC. SUERO
Código: MEMBRAHEAC
Técnica: IFI
Unidades: TITULO
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: Negativo <1/40

Descripción: Meningioma. Sec Gen: PDGFB
Código: GEN_000525
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: MERCURIO EN PELO
Código: MERCURPELO
Técnica: ESPECTROMETRÍA EMISIÓN ATÓMICA/ESPECTROMETRÍA MASAS
Unidades: mcg/g
Plazo: 9 días
Tubo:
Comentario adicional: 200 mg pelo aprox. Cabello de la zona inferior a la coronilla, agrupar mechón del grosor de un lápiz y cortar con tijeras tan cerca de la raíz como sea posible.
Valores de referencia: (Inf. 2.0)

Descripción: MERCURIO INORGANICO SANGRE (EDTA ESPECIAL)
Código: HGINORGANI
Técnica: Espectrofotometria de masas-plasma acoplado inductivamente (ICP/MS)
Unidades: µg/L
Plazo: 5 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: Tubo especial traza metales en sangre total
Al final de la semana laboral
VOLUMEN: 1 mL. VOLUMEN MÍNIMO: 0.150 mL
Valores de referencia: (Inf. 10) Valor Límite Biológico-VLB® (INSST)

Descripción: MERCURIO INORGANICO TOTAL ORINA
Código: HGINORGAN2
Técnica: Espectrometria de masas-plasma acoplado inductivamente (ICP/MS)
Unidades: mcg/g creatin.
Plazo: 5 días
Tubo: Orina Final de Jornada
Comentario adicional: 1 mL orina (micción aislada inicio de jornada laboral)
Valores de referencia: (Inf. 30) Valor Límite Biológico-VLB® (INSST).
Límite de cuantificación: 5,00 µg/L

Descripción: MERCURIO TOTAL ORINA AISLADA
Código: HG2
Técnica: ESPECTROMETRÍA DE MASAS CON PLASMA ACOPLADO INDUCTIVAMENTE (ICP-MS)
Unidades: mcg/g creatin.
Plazo: 7 días
Tubo: Orina Final de Jornada
Comentario adicional: 1 mL orina micción aislada (inicio/final jornada)
Volumen mínimo: 0.5mL
Valores de referencia: (Inf. 25) BAT (MAK&BAT): (Mercurio elemental y compuestos inorgánicos)

Descripción: MERCURIO TOTAL SANGRE (EDTA ESPECIAL)
Código: HG
Técnica: Espectrometría de emisión atómica-Espectrometría de masas
Unidades: µg/L
Plazo: 5 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: Contenedor libre de metales. EDTA dipotásico. Al final de la semana laboral

Volumen mínimo
0.15 mL

Valores de referencia: (Inf. 6.4) < 14 años Para valores superiores, se recomienda consejo dietético. Para valores superiores a 20 µg/L se recomienda evaluación médica y consejo dietético
(Inf. 20) > 14 años Valores sin riesgo asociado. En niños/as hasta los 18 años valores superiores a 20 µg/L se recomienda evaluación médica y consejo dietético
(20 - 40) > 14 años Se recomienda consejo dietético. Para valores superiores a 40 µg/L se recomienda evaluación médica y consejo dietético
(Inf. 12) > 14 años Adultos con riesgo cardiovascular o renal. Para valores superiores, se recomienda consejo dietético.
(Inf. 6.4) Mujer > 14 años Mujeres embarazadas, en periodo de lactancia o con planificación de gestación. Para valores superiores, se recomienda consejo dietético.

Descripción: MERRF (epilepsia mioclónica mitocondrial): mtDNA (NGS)
Código: MERRF_MUTS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: MESOTELINA SOLUBLE (MESOMARK) EN SUERO
Código: MESOTELINA
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: nmol/L
Plazo: 23 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: (Inf. 1.5)

Descripción: Metabolismo deficiente de fármacos. Sec Gen: CYP2C19
Código: GEN_000526
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Descripción: Metabolismo deficiente de fármacos. Sec Gen: CYP2C19

Valores de referencia:

Descripción: METABOLISMO ESTROGENICO EN ORINA HOMBRE

Código: METESTROG2

Técnica: Cromatografía líquida/Tándem Masas (LC-MS/MS)

Unidades:

Plazo: 32 días

Tubo: Orina basal

Comentario adicional: 10 mL de orina de la primera micción de la mañana. Descartar primera fracción.

CONSIDERACIONES PREVIAS A LA TOMA DE LA MUESTRA:

- No ingerir líquidos a partir de las 20h del día anterior a la recolección de la muestra
- Se puede realizar la recogida de muestra en cualquier día.
- En caso de tratamiento hormonal (testosterona, DHEA...), debe anotarlo en observaciones para tenerlo en cuenta en la interpretación de los resultados.

Valores de referencia:

Descripción: METABOLISMO ESTROGENICO EN ORINA MUJER (MENOPAUSIA)

Código: METESTMUM2

Técnica: Cromatografía líquida/Tándem Masas (LC-MS/MS)

Unidades:

Plazo: 32 días

Tubo: Orina basal

Comentario adicional: 10 mL de orina de la primera micción de la mañana. Descartar primera fracción.

CONSIDERACIONES PREVIAS A LA TOMA DE LA MUESTRA:

- No ingerir líquidos a partir de las 20h del día anterior a la recolección de la muestra.
- Se puede realizar la recogida de muestra en cualquier día.
- En caso de tratamiento hormonal (anticonceptivos, progesterona, testosterona...), debe anotarlo en observaciones para tenerlo en cuenta en la interpretación de los resultados.

Valores de referencia:

Descripción: METABOLISMO ESTROGENICO EN ORINA MUJER (PREMENOPAUSIA)

Código: METESTMUP2

Técnica: Cromatografía líquida/Tándem Masas (LC-MS/MS)

Unidades:

Plazo: 32 días

Tubo: Orina basal

Comentario adicional: 10 mL de orina de la primera micción de la mañana. Descartar primera fracción.

CONSIDERACIONES PREVIAS A LA TOMA DE LA MUESTRA:

- No ingerir líquidos a partir de las 20h del día anterior a la recolección de la muestra.
- No recoger la muestra mientras este con la menstruación.
- En pacientes con ciclos regulares, se recomienda recoger la muestra en la fase lútea del ciclo menstrual (entre el día 18 a 24 desde el inicio de la menstruación).
- En pacientes con ciclos irregulares o amenorrea o histerectomía, se puede realizar la recogida de muestra en cualquier día.
- En caso de tratamiento hormonal (anticonceptivos, progesterona, testosterona...), debe anotarlo en observaciones para tenerlo en cuenta en la interpretación de los resultados.

Valores de referencia:

Descripción: METABOLITOS DE ANFETAMINA ORINA CONFIRMACION

Código: ANFETACONF

Técnica: Cromatografía de gases - Espectrometría de masas

Unidades:

Plazo: 6 días

Tubo: Orina pruebas referencia

Descripción: METABOLITOS DE ANFETAMINA ORINA CONFIRMACION
Comentario adicional: 10 ml orina aislada
Valores de referencia:

Descripción: METABOLITOS DE BARBITURICOS ORINA CONFIRMACION
Código: BARBI2CONF
Técnica: Cromatografía líquida/Tándem masas (LC-MS/MS)
Unidades: ng/mL
Plazo: 14 días
Tubo: Orina Drogas de Abuso
Comentario adicional: Orina. Contenedor de 70 mL. Refrigerar.
Valores de referencia: (Inf. 25) Límite de cuantificación
 (Inf. 5) Incertidumbre de medida

Descripción: METABOLITOS DE CANNABIS ORINA CONFIRMACION
Código: CANNACONF
Técnica: Cromatografía líquida/Tándem masas
Unidades:
Plazo: 8 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 10 ml orina aislada
Valores de referencia:

Descripción: METABOLITOS DE COCAINA ORINA CONFIRMACION
Código: COCACONF
Técnica: Cromatografía de gases - Espectrometría de masas
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: METABOLITOS DE OPIACEOS ORINA CONFIRMACION
Código: OPICONF
Técnica: Cromatografía Líquida - Espectrometría de masas tándem
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: METABOLITOS ORGANICOS Y MICOTOXINAS EN ORINA (DISB. INTES.)
Código: DISBIOSIS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 16 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: Orina bote especial (PEDIR KIT ESPECIAL AL ALMACEN)
 Recoger la primera orina de la mañana (preferentemente en ayunas) en un recipiente limpio.
 Llenar el frasco con tapón amarillo con una parte de la orina obtenida. (El frasco contiene un conservante. Mantenerlo fuera del alcance de los niños)
 Cerrar herméticamente el frasco e introducirlo en la bolsa de plástico adjunta y guardarlo en nevera hasta el envío.

Descripción: METABOLITOS ORGANICOS Y MICOTOXINAS EN ORINA (DISB. INTES.)

Valores de referencia:

Descripción: Metabолопатías y respuesta a fármacos. Panel NGS

Código: GEN_000527

Técnica:

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: METACUALONA ORINA

Código: METAQUALON

Técnica: Cromatografía de gases - Espectrometría de masas

Unidades: ng/mL

Plazo: 8 días

Tubo: Orina pruebas referencia

Comentario adicional: 10 mL orina (2-8 °C - Refrigerar)

Valores de referencia: (Inf. 10)

Descripción: METADONA CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SALIVA

Código: COMETSA

Técnica:

Unidades: ng/mL

Plazo: 7 días

Tubo: Saliva

Comentario adicional: Saliva. Refrigerar.
(1 mL)

Valores de referencia: (Inf. 10) Valor de corte recomendado
(Inf. 2.2) Incertidumbre de medida

Descripción: METADONA ORINA CONFIRMACION

Código: METADOCONF

Técnica: LC-MS/MS

Unidades:

Plazo: 7 días

Tubo: Orina Drogas de Abuso

Comentario adicional: 10 mL. Micción aislada.REFRIGERAR

Valores de referencia: (Inf. 25) Límite de cuantificación
(Inf. 4.3) Incertidumbre de medida
Se utiliza como criterio de Positividad que la concentración sea superior o igual al valor del límite de cuantificación más el valor de incertidumbre del ensayo. En caso contrario, el resultado es Negativo.

Descripción: METAHEMOGLOBINA

Código: METAHB

Técnica: Espectrometría de absorción molecular

Unidades: % Hb total

Plazo: 5 días

Descripción: METAHEMOGLOBINA
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: 5 mL Sangre total EDTA
Valores de referencia: (Inf. 1.5) Exposición a Nitrobencono o Inductores de Metahemoglobina

Código: METANEP
Descripción: METANEFRIAS EN PLASMA
Técnica: EIA
 1 ml plasma (EDTA). Congelar y enviar congelado.
 Volumen 1.0 mL
Comentario adicional: Volumen mínimo: 1.00 mL
 Separar el plasma y congelar inmediatamente después de la extracción.
 Mantener al paciente en reposo 30 minutos previos a la extracción.

Medicamentos como agentes antihipertensivos, antiagregantes, antipépticos, simpatomiméticos y L-DOPA pueden influir en los niveles plasmáticos de Metanefrinas. Las bebidas con cafeína, la nicotina y los fármacos que mejoran el estado de ánimo también.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	METAN	29141-9		Perfil, Metanefrina en plasma	pg/mL	(Inf. 100)
Prueba	NORMETAN	2669-0		Perfil, Normetanefrina en plasma	pg/mL	(Inf. 216)

Código: METANEFR
Descripción: METANEFRIAS ORINA 24 HORAS
Técnica: Cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) acoplada a detector electroquímico
 ALÍCUOTA DE ORINA DE 24 HORAS ACIDIFICADA (Identificar tubo con el comentario +ácido)
 Preservar la orina con HCl 6N (20 mL) pH=1 - 3
Comentario adicional: Cumplimentar dieta

Suspender toda la medicación que interfiera (bajo prescripción médica). Evitar cualquier tipo de ejercicio físico no habitual . Evitar el estrés. (3 días antes de la toma de muestra)

No ingerir 5 días antes de la recolección de la orina; té, café, plátano, chocolate, vainilla, queso, bebidas carbonatadas ni ningún tipo de medicamento especialmente de salicilatos, medicación hipotensora y contrastes con yodo.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	METANE	19049-6		PERFIL METANEFRIAS ORINA 24 HORAS METANEFRIAS	µg/24h	(Inf. 375) Hombre Límite de cuantificación: 52.0 µg/L (Inf. 276) Mujer Límite de cuantificación: 52.0 µg/L
Prueba	NORMETA	2671-6		PERFIL METANEFRIAS ORINA 24 HORAS NORMETANEFRIAS	µg/24h	(Inf. 550) Mujer 18 años - 40 años Límite de cuantificación: 60.5 µg/L (Inf. 660) Hombre 18 años - 40 años Límite de cuantificación: 60.5 µg/L (Inf. 632) Mujer 41 años - 60 años Límite de cuantificación: 60.5 µg/L (Inf. 779) Hombre 41 años - 60 años Límite de cuantificación: 60.5 µg/L (Inf. 669) Mujer 60 años - 120 años Límite de cuantificación: 60.5 µg/L (Inf. 824) Hombre 60 años - 120 años Límite de cuantificación: 60.5 µg/L
Prueba	VOL_ORINA			Volumen de orina mL	c.c.	

Componentes					
Prueba	HORAS_VOL			VOLUMEN DE ORINA: HORAS	

Descripción: METANOL (ALCOHOL METILICO) EN ORINA

Código: METANOL2

Técnica: Cromatografía de gases - Ionización de llama

Unidades: mg/L

Plazo: 7 días

Tubo: Orina Final de Jornada

Comentario adicional: Orina final jornada

Volumen: 10.0 mL

Volumen mínimo: 5 mL

Valores de referencia: (Inf. 15) Final del turno

Descripción: METILETILACETONA

Código: METILACETO

Técnica: Cromatografía de gases

Unidades: mg/L

Plazo: 7 días

Tubo: Orina Final de Jornada

Comentario adicional: 10 mL orina final de la jornada laboral.

Valores de referencia: (Inf. 2) al final de la jornada laboral (exposición a METILETILACETONA) VLB-INSHT

Descripción: METILFORMAMIDA ORINA

Código: METILFORMA

Técnica: Téc. cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC/MS)

Unidades: mg/L

Plazo: 9 días

Tubo: Orina Final de Jornada

Comentario adicional: 10 mL Orina final jornada (2-8 °C - Refrigerar)

Refrigerar

Volumen mínimo: 5 mL

Valores de referencia: (Inf. 15) Final de jornada. Valor límite biológico (VLB-INSHT).
Personas expuestas a Dimetilformamida

Descripción: METILISOBUTIL CETONA ORINA

Código: METISOBUCE

Técnica: Cromatografía de gases/ionización de llama

Unidades: mg/L

Plazo: 7 días

Tubo: Orina Final de Jornada

Comentario adicional: 10 mL orina (micción aislada) al final de la jornada laboral

Valores de referencia: (Inf. 1) al final de la jornada laboral (exposición a METILISOBUTILCETONA)

Descripción: METOTREXATO

Código: METOTRE

Técnica: Inmunofluorescencia de polarización

Unidades: mcmol/L

Descripción: METOTREXATO
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Enviar suero protegido de la luz
Valores de referencia: (Inf. 5) A LAS 24 HORAS
 (Inf. 0.5) A LAS 48 HORAS
 (Sup. 5) Tóxico - A LAS 24 HORAS
 (Sup. 0.5) Tóxico - A LAS 48 HORAS

Descripción: MGLUR1 ANTICUERPOS LCR (METABOTROPIIC GLUTAMATE RECEPTOR1)
Código: MGLUR1LCR
Técnica: Inmunofluorescencia indirecta (Cell Bindig Assay)
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 mL LCR
Valores de referencia:

Descripción: MGLUR1 ANTICUERPOS NEURONALES (METABOTROPIC GLUTAMATE R.)
Código: MGLUR1AC
Técnica: Inmunohistoquímica
Unidades:
Plazo: 32 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: suero
Valores de referencia:

Descripción: MGLUR5 ANTICUERPOS LCR (METABOTROPIIC GLUTAMATE RECEPTOR5)
Código: MGLUR5LCR
Técnica: Inmunofluorescencia indirecta (Cell Bindig Assay)
Unidades:
Plazo: 23 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 mL LCR
Valores de referencia:

Descripción: MGLUR5 ANTICUERPOS NEURONALES (METABOTROPIC GLUTAMATE R.)
Código: MGLUR5AC
Técnica: Inmunohistoquímica
Unidades:
Plazo: 23 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1mL de suero refrigerado
Valores de referencia:

Descripción: MHPG ORINA (3-METOXI-4-HIDROXIFENILETILENGLICOL)
Código: MHPG
Técnica: HPLC
Unidades: mg/24 h
Plazo: 9 días

Descripción: MHPG ORINA (3-METOXI-4-HIDROXIFENILETILENGLICOL)
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 10 ML DE ORINA 24, PH: 3
Valores de referencia: (0.9 - 2.4)

Descripción: Mi-1/Mi-2 AC. SUERO
Código: MI1MI2AC
Técnica: Técnica Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: Negativo

Descripción: MIA (Melanoma Inhibitory Activity)
Código: MIA
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: pg/mL
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 ml.congelar y enviar congelado
Valores de referencia: (620 - 1508)

Descripción: MIANSERINA EN SUERO
Código: MIANSERINA
Técnica: Cromatografía líquida/Espectrometría de masas en tándem (LC-MS/MS)
Unidades: µg/L
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL suero SIN gel separador
Volumen mínimo: 0.1 mL
Muestra alternativa: Plasma EDTA

El contenedor recomendado es el tubo seco (sin gel separador) para evitar procesos de adsorción del fármaco. En caso de no disponer de tubo seco, la extracción se puede realizar en tubo con gel separador, separando el suero dentro de las 2 horas poste

Valores de referencia: (15 - 70) Intervalo terapéutico
(Inf. 4) Límite de cuantificación
(Sup. 140) Toxicidad

Descripción: MICELIO CANDIDA ALBICANS AC. IGG
Código: MICECANDID
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL de suero
Valores de referencia: Título >1:160 Niveles significativos

Descripción: MICROALBUMINA ORINA
Código: MICROALB
Técnica:
Unidades: mg/L

Descripción: MICROALBUMINA ORINA
Plazo: 3 días
Tubo: Orina Bioquímica
Comentario adicional:
Valores de referencia: Interpretación según criterio clínico

Descripción: Microangiopatía cerebral con quistes y calcificaciones. CTC1
Código: GEN_000528
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Microbioma Intestinal Básico Test myBIOME (sin consulta)
Código: MYBIO
Técnica: Secuenciación metagenómica shotgun
Unidades:
Plazo: 37 días
Tubo: heces especiales
Comentario adicional: Heces tubo especial Copan FloqSwab HDNA Free, estabilidad 4 semanas T.A.
Valores de referencia:

Descripción: MICROBIOMA VAGINAL, ESTUDIO METAGENOMICO
Código: EMMV
Técnica: PCR + Secuenciación Metagenómica Shotgun
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Exudado vaginal en contenedor Copan eNAT. Temperatura ambiente.

Alternativa: exudado vaginal en contenedor Omnigene Vaginal (OMR-130). Temperatura ambiente.

Exudado vaginal recogido en kit específico (Sistema de Copan e NAT) facilitado por el laboratorio.
Seguir instrucciones de toma de muestra facilitadas en el kit.
No obtener la muestra durante la menstruación
La paciente no debe tomar antibióticos, ni utilizar soluciones antisépticas vaginales, óvulos ni pomadas al menos un mes antes de la toma de muestra.
Las pacientes que se hayan sometido a tratamientos antibióticos deben esperar al menos 1 mes antes de realizar la toma de muestra.
Valores de referencia:

Código: MICOREAV
Descripción: MICROBIOTA INTESTINAL AVANZADA
Técnica:
Comentario adicional: 2 contenedores estériles de heces sin medio

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	ZONULINA	99399-8		ZONULINA EN HECES	ng/mL	(Inf. 107)
Prueba	CONSULESP			CONSULTA CON ESPECIALISTA		
Prueba	MICORE			MICROBIOTA INTESTINAL CORE VIVOLABS		

Descripción:	MICROBIOTA INTESTINAL CORE VIVOLABS
Código:	MICORE
Técnica:	NGS, secuenciación 16S-V3-V4
Unidades:	
Plazo:	20 días
Tubo:	heces especiales
Comentario adicional:	Heces recogidas en contenedor estéril sin medio.

La recogida debe realizarse únicamente de domingo a martes, y entregarse en el BCP en un plazo máximo de 12 a 16 horas tras la toma.

No tomar antibióticos, antifúngicos ni inmunosupresores durante las 6 semanas anteriores a la obtención de la muestra.

- En caso de haberse sometido a tratamientos de radioterapia, quimioterapia o tratamiento hormonal, esperar al menos 6 semanas antes de realizar la obtención de la muestra.
- No tomar probióticos durante las 3 semanas anteriores a la obtención de la muestra.
- Si se ha sometido a un tratamiento de fertilidad, debe esperar 4 semanas antes de la obtención de la muestra.
- No realizar la toma de muestra si hay sangrado activo por hemorroides o menstruación o si presenta un brote de enfermedad inflamatoria intestinal.

* No se recomienda realizar TEST DE MICROBIOTA INTESTINAL en niños menores de 5 años. Si los padres o tutores legales de niños menores de 5 años desean realizar el test, se requiere su prescripción por parte de un profesional de la salud que se haga cargo de la supervisión de los resultados.

Valores de referencia:

Descripción:	MICROBIOTA VAGINAL PCR, ESTUDIO
Código:	AMMV
Técnica:	RT-PCR
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	Muestra Citogenética
Comentario adicional:	

Exudado vaginal recogido en kit específico (Sistema de Copan e NAT) facilitado por el laboratorio (código SAP: 550000007). Seguir instrucciones de toma de muestra facilitadas en el kit.

La paciente no debe tomar antibióticos, ni utilizar soluciones antisépticas vaginales, óvulos ni pomadas al menos un mes antes de la toma de muestra.

Las pacientes que se hayan sometido a tratamientos antibióticos deben esperar al menos 1 mes antes de realizar la toma de muestra.

Valores de referencia:

Descripción:	Microcefalia primaria autosómico recesiva. Panel NGS
Código:	GEN_000530
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	

Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción:	Microcefalia primaria: gen ASPM (NGS)
Código:	MCPH5_GEN
Técnica:	PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Microcefalia primaria: gen ASPM (NGS)
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
 Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Microcefalia primaria: gen MCPH1 (NGS)
Código: MICROCEFAL
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
 Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Microcefalia. Panel Ampliado NGS
Código: GEN_000529
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
 Valores de referencia:

Descripción: Microdeleciones cromosoma Y en AZF
Código: DELCROM_Y
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
 Valores de referencia:

Descripción: Microftalmia / Anoftalmia. Panel
Código: GEN_000531
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
 Valores de referencia:

Descripción: MICROSOMALES AC. SUERO (ANTI-TPO)
Código: MICROSOAC
Técnica: Téc. Inmunoensayo Magnético Quimioluminiscente
Unidades: UI/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
 Valores de referencia: (Inf . 5.61)

Descripción: MIDAZOLAM EN SUERO
Código: MIDAZOLAM
Técnica: Cromatografía Líquida/Tándem Masas
Unidades: ng/mL
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 2 mL suero
Valores de referencia: (50 - 600)

Descripción: MIELINA ANTICUERPOS EN SUERO
Código: MIELINAC
Técnica: Téc. Inmunofluorescencia Indirecta
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL .
Valores de referencia:

Descripción: MIELINA PROTEINA BASICA EN LCR
Código: MIELINALCR
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: ng/mL
Plazo: 32 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 ml de LCR. Congelar y enviar congelado.
Valores de referencia: (Inf. 5.5)

Descripción: MIELOPEROXIDASA AC.
Código: MPO
Técnica: EIA
Unidades: IU/mL
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml
Valores de referencia: (Inf. 3.5) Negativo
 (3.5 - 5.0) Indeterminado

Descripción: MIELOPROLIFERATIVO CRONICO · MPL(W515L/K) · HOT SPOT
Código: MPL_W515LK
Técnica: PCR y Secuenciación
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación rotulado con ONCO.
 También sirve médula ósea
 IMPORTANTE: REFRIGERADO SIEMPRE
Valores de referencia:

Descripción: Migraña hemipléjica familiar: <10 genes (NGS)
Código: MIGRAÑA

Descripción: Migraña hemipléjica familiar: <10 genes (NGS)
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Migraña hemipléjica familiar 1: gen CACNA1A (NGS)
Código: MIGRAÑA_1
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Migraña hemipléjica familiar tipo 2. Sec Gen: ATP1A2
Código: GEN_000532
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Milroy, enfermedad de. Sec Gen: FLT4
Código: GEN_000533
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Miocardiopat con defectos en la conducción / DCM+CCD. Panel
Código: GEN_000535
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Miocardiopatía arritmogénica ventrículo derecho/ARVC. Panel
Código: GEN_000534
Técnica:
Unidades:

Descripción:	Miocardiopatía arritmogénica ventrículo derecho/ARVC. Panel
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	
Descripción:	Miocardiopatía arritmogénica y m. súbita: >10 genes (NGS)
Código:	ARRITMIA
Técnica:	PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:	
Descripción:	Miocardiopatía dilatada fam. aislada. Sec Gen: BAG3
Código:	GEN_000536
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	
Descripción:	Miocardiopatía dilatada tipo 1M. Sec Gen: CSRP3.
Código:	GEN_000537
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	
Descripción:	Miocardiopatía dilatada tipo 1R. Sec Gen: ACTC1
Código:	GEN_000538
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	
Descripción:	Miocardiopatía dilatada. Sec Gen: MYH7
Código:	GEN_000539
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Descripción: Miocardiopatía dilatada. Sec Gen: MYH7

Valores de referencia:

Descripción: Miocardiopatía dilatada: >10 genes (NGS)

Código: MCD

Técnica: PCR, secuenciación y MLPA

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Alternativas: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Miocardiopatía dilatada: gen DES (NGS)

Código: DES

Técnica: PCR, secuenciación y MLPA

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Miocardiopatía dilatada: gen TNNT2 (NGS)

Código: TNNT2

Técnica: PCR, secuenciación y MLPA

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Miocardiopatía estructural panel genes

Código: PHARMALAP1

Técnica: NGS

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación y rotulado con BM.

Alternativas: Citrato.

Imprescindible enviar la historia clínica y formulario de petición de genética o consentimiento informado

Valores de referencia:

Descripción: Miocardiopatía hipertrófica familiar: >10 genes (NGS)

Código: MCH

Técnica: Secuenciación masiva (NGS)

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Miocardiopatía hipertrófica familiar: >10 genes (NGS)

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Alternativas: Citrato.

Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente

Valores de referencia:

Descripción: Miocardiopatía hipertrófica familiar: gen MYBPC3 (NGS)

Código: MYBPC3

Técnica: PCR, secuenciación y MLPA

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Miocardiopatía hipertrófica familiar: gen TTN (NGS)

Código: TTN

Técnica: PCR y secuenciación

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Miocardiopatía hipertrófica. Proteínas sarcoméricas. Panel

Código: GEN_000540

Técnica:

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Miocardiopatía no compactada: >10 genes (NGS)

Código: MCNC

Técnica: NGS

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Valores de referencia:

Descripción: Miocardiopatía restrictiva / RCM. Panel NGS

Código: GEN_000541

Técnica:

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Miocardiopatía restrictiva / RCM. Panel NGS
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: MIOGLOBINA ORINA
Código: MIOGLO2
Técnica: Nefelometría - Turbidimetría
Unidades: µg/L
Plazo: 4 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 5 mL
 Volumen mínimo: 1 mL
 Refrigerar la muestra.
 Días de montaje: L, X, V.
Valores de referencia: (Inf. 25)

Descripción: MIOGLOBINA SUERO
Código: MIOGLO
Técnica: Inmunoturbidimetría
Unidades: ng/mL
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL suero, alternativo plasma de EDTA y Heparina
Valores de referencia: (19 - 51) Mujer
 (19 - 72) Hombre

Descripción: Miopatía con déficit de ISCU. Sec Gen: ISCU
Código: GEN_000544
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Miopatía cuerpos inclusión, Paget demencia frontotemp. VCP
Código: GEN_000543
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Miopatía de Brody. Sec Gen: ATP2A1
Código: GEN_000545
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Miopatía de Brody. Sec Gen: ATP2A1
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Miopatía de Salih. Sec Gen: TTN
Código: GEN_000546
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Miopatía distal de Laing. Sec Gen: MYH7
Código: GEN_000547
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Miopatía distal de Miyoshi. Sec Gen: DYSF
Código: GEN_000548
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Miopatía hereditaria con cuerpos de inclusión 2. Gen: GNE
Código: GEN_000549
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Miopatía miofibrilar alfa-B cristalina: gen CRYAB (NGS)
Código: CRYAB
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Miopatía miofibrilar. Panel NGS
Código: GEN_000550
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Miopatía miotubular centronuclear ligada al X. Sec Gen: MTM1
Código: GEN_000551
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Miopatía mitocondrial anemia sideroblástica. Sec Gen: PUS1
Código: GEN_000552
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Miopatía nemalínica tipo 3. Sec Gen: ACTA1
Código: GEN_000553
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Miopatías hereditarias: >10 genes (NGS)
Código: MIOPAT_GEN
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Miotilinoopatía. Sec Gen: MYOT
Código: GEN_000554
Técnica:
Unidades:

Descripción:	Miotilinoopatía. Sec Gen: MYOT
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Miotonía agravada por potasio. Sec Gen: SCN4A
Código:	GEN_000555
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Miotonía congénita: gen CLCN1 (NGS)
Código:	MIOTO_CONG
Técnica:	PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	Miotonías no distróficas. Panel NGS
Código:	GEN_000557
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	MIRTAZAPINA EN SUERO
Código:	MIRTAZAPIN
Técnica:	LC-MS/MS (2/2/2012)Cromatografía Líquida de Alta Resolución.
Unidades:	µg/l
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Muestra: Suero Cantidad: 1 tubo Contenedor: Tubo suero sin gel separador Volumen: 0.5 mL Conservación: Refrigerar Volumen mínimo: 0,1 mL Alternativa Muestra: Plasma EDTA Cantidad: 1 tubo Contenedor: Tubo sangre EDTA

Observaciones: El contenedor recomendado es el tubo seco (sin gel separador) para evitar procesos de adsorción del fármaco. En caso de no disponer de tubo seco, la extracción se puede realizar en tubo con gel separador, separando el suero dentro de la

Descripción: MIRTAZAPINA EN SUERO
Valores de referencia: (30.0 - 80)
(Sup. 160) Toxicidad

Descripción: MITOCONDRIALES AC. (AMA) MUESTRA HUMANA
Código: AMAMUES
Técnica:
Unidades: Titulo
Plazo: 5 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: MITOCONDRIALES AC. SUERO
Código: AMA
Técnica: Técnica IFI
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: Negativo <1/40
Positivo >1/40

Descripción: MITOTANO
Código: MITOTANO
Técnica: Cromatografía líquida de alta resolución
Unidades: mcg/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: (14.0 - 20.0)

Descripción: MLL/AF4 · RT-PCR
Código: MLL_AF4
Técnica: RT-PCR
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Recomendada:
9 mL Médula ósea (2 x Tubo PAXGENE) [Tªambiente] (Estabilidad: 20°C:3 Días 4°C:5 Días -20°C:1 Meses) Vol.Min. 5 mL
o 9 mL Sangre total (2 x Tubo PAXGENE) [Tªambiente] (Estabilidad: 20°C:3 Días 4°C:5 Días -20°C:1 Meses) Vol.Min. 5 mL
Alternativa:
9 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refrigerar] (Estabilidad: 4°C:48 Horas) Vol.Min. 5 mL
o 9 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refrigerar] (Estabilidad: 4°C:48 Horas) Vol.Min. 5 mL
Valores de referencia:

Descripción: MLPA de METILACIÓN Análisis de 1 mutación de cualquier gen
Código: MLPA_METIL
Técnica: MLPA
Unidades:
Plazo: 20 días

Descripción: MLPA de METILACIÓN Análisis de 1 mutación de cualquier gen

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: MLPA SALSA nueva

Código: NUEVOMLPA

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: Muestra Biología Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación y rotulado con BM.

Valores de referencia:

Descripción: MOCA (4,4' METILENBIS CLORANILINA) ORINA

Código: MOCA

Técnica: LC-MS/MS

Unidades: µg/g creatinina

Plazo: 23 días

Tubo: Orina Final de Jornada

Comentario adicional: 10 mL de orina final de jornada (OFJ).
Identificar tubo con etiqueta pequeña sin código de barras, con el tapón marcado y con la palabra OFJ en el lateral del tubo. Añadir 100 µl HCl concentrado.

Valores de referencia: (Inf. 12) **personas expuestas a MOCA** al final de la jornada laboral.
VLB publicado por el **INSHT**

Descripción: Modificador de albinismo oculocután 2. Sec Gen: MC1R

Código: GEN_000558

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: MOG AC. (MIELINA OLIGODENDROCITO GLICOPROTEINA) EN SUERO

Código: MOGAC

Técnica: Inmunofluorescencia indirecta

Unidades:

Plazo: 7 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 1 mL Suero (Refrigerado)
Alt. 1 mL Plasma Citrato sódico (Refrigerado)
Alt. 1 mL Plasma EDTA Dipotásico (Refrigerado)
Alt. 1 mL Plasma Heparina litio (Refrigerado)

Valores de referencia: Negativo <1/10
Positivo >1/10

Descripción: MOLIBDENO EN ORINA

Código: MOLIBDENOO

Técnica: ICP-MS

Descripción:	MOLIBDENO EN ORINA
Unidades:	µg/L
Plazo:	7 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	OFJ en caso de exposición laboral, identificada correctamente conforme a protocolo. En otro caso, orina aislada.
Valores de referencia:	(Inf. 150) .Valores de referencia orientativos.

Descripción:	MOLIBDENO SUERO
Código:	MOLIBDENO
Técnica:	ICP-MS
Unidades:	µg/L
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero. La muestra idónea es contenedor libre de metales. Refrigerar. Volumen: 1.0 mL Volumen mínimo: 0.2 mL
Valores de referencia:	(Inf. 3) Valores de referencia orientativos. Límite de cuantificación: 1.8 µg/L

Descripción:	MONONUCLEOSIS AC. HETEROFILOS
Código:	HETEROAC
Técnica:	Aglutinación
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	Morfina en suero
Código:	MORFINA
Técnica:	Cromatografía líquida/Tándem masas
Unidades:	µg/L
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(10 - 100) Rango terapéutico

Descripción:	Mowat-Wilson, Sd. Sec Gen: ZEB2
Código:	GEN_000559
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Mucopolipidosis. Panel NGS
Código:	GEN_000560
Técnica:	

Descripción:	Mucopolipidosis. Panel NGS
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	
Descripción:	MUCOPOLISACARIDOS ORINA 24 HORAS
Código:	MUCOPOL2
Técnica:	Electroforesis de agarosa
Unidades:	mg/mmol crea
Plazo:	8 días
Tubo:	Orina 24 Horas
Comentario adicional:	10 mL orina 24 horas. ANOTAR EL VOLUMNE DE 24H.REFRIGERAR.
Valores de referencia:	Valor de referencia: Negativo Esta técnica es de "screening" siendo indispensable efectuar método de confirmación en los casos de anormalidad
Descripción:	Mucopolisacaridosis III: genes HGSNAT, NAGLU y SGSH (NGS)
Código:	SANFILIPPO
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	
Descripción:	Mucopolisacaridosis tipo 2 (enf. Hunter): gen IDS (NGS)
Código:	HUNTER
Técnica:	PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:	
Descripción:	Mucopolisacaridosis. Panel NGS
Código:	GEN_000561
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	
Descripción:	Muenke, Sd. Sec Gen: FGFR3
Código:	GEN_000562
Técnica:	

Descripción: Muenke, Sd. Sec Gen: FGFR3
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: MUESTRA BIOLOGICA INMUFENOTIPO LEUCOCITARIO
Código: INMFENOMUE
Técnica: Citometría de flujo
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 tubo de EDTA de 5ml
Valores de referencia:

Descripción: MULTIMEROS DEL FACTOR VON WILLEBRAND
Código: WILLEMULT
Técnica: Electroforesis
Unidades:
Plazo: 44 días
Tubo: Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional: 2.7 ml plasma citrato sódico congelado
 Aportar resultados de Antígeno y Actividad (ristocetina) de FvW
 Resultados afectados por hemolisis
Valores de referencia:

Descripción: MUP44 (CN-1A)(CITOSOLICO 5 NUCLEOTIDASA 1A)ANTICUERPOS SUERO
Código: MUP44CN1A
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 11 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia:

Descripción: MUSCULO CARDIACO AC. SUERO
Código: MUSCARDIAC
Técnica: Técnica IFI
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero.
 Alternativa: plasma con EDTA, heparina o citrato
Valores de referencia: Títulos significativos a partir de 1:100

Descripción: MUSCULO ESTRIADO AC. SUERO
Código: MUSESTRIAC
Técnica: IFI
Unidades:

Descripción:	MUSCULO ESTRIADO AC. SUERO
Plazo:	10 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL de suero refrigerado. Alternativa: plasma con EDTA, heparina o citrato
Valores de referencia:	Títulos significativos a partir de 1:100

Descripción:	MUSCULO LISO AC. SUERO (SMA)
Código:	MUSLISOAC
Técnica:	Técnica IFI
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	Negativo <1/80 Positivo >1/80

Descripción:	Mutac. Somaticas Pulmon 23 genes
Código:	ONCOTISP23
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:	Solicitar kit especial.Contactar con asesoría genética antes de tomar la muestra. Bloque parafina o portas
Valores de referencia:	

Descripción:	Mutac. Somaticas Pulmon 50 genes
Código:	ONCOTISP50
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:	Solicitar kit especial.Contactar con asesoría genética antes de tomar la muestra. Bloque parafina o portas
Valores de referencia:	

Descripción:	Mutac. Somaticas Pulmon15 genes
Código:	ONCOTISP15
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:	Solicitar kit especial.Contactar con asesoría genética antes de tomar la muestra. Bloque parafina o portas
Valores de referencia:	

Descripción:	MUTACION DEL GEN DE LA CADENA PESADA DE LAS INMUNOGLO (IGHV)
Código:	IGHV
Técnica:	PCR y Secuenciación
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	TUBO ONCOGENETICA

Descripción: MUTACION DEL GEN DE LA CADENA PESADA DE LAS INMUNOGLO (IGHV)

Comentario adicional:

Al menos 3 ml de Médula Ósea o Sangre Periférica en tubo EDTA. Tubo exclusivo para esta determinación (tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO).

IMPORTANTE: SIEMPRE REFRIGERADO

Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.

Valores de referencia:

Descripción: Mutaciones en DNA mitocondrial: mtDNA (NGS)

Código: DNAMT_MUTS

Técnica:

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Mutaciones en el gen BRAF V600X

Código: BRAF_MUTS

Técnica: PCR

Unidades:

Plazo: 15 días

Tubo: Muestra Anatomía Patológica

Comentario adicional: Muestras: sangre en tubo EDTA.
Laboratorio Oncogenética

Valores de referencia:

Descripción: Mutaciones gen HCN4 (NGS)

Código: HCN4_MUTS

Técnica:

Unidades:

Plazo:

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Alternativas: Heparina y Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Mutaciones somáticas gen BRAF (V600X)

Código: BRAF_SOMAT

Técnica:

Unidades:

Plazo: 15 días

Tubo: Muestra Anatomía Patológica

Comentario adicional: Muestra: Tejido tumoral parafinado. Tª ambiente

Valores de referencia:

Descripción: Mutaciones somáticas gen PDGFRA

Código: PDGFRA

Técnica:

Unidades:

Plazo: 15 días

Tubo: Muestra Anatomía Patológica

Descripción: Mutaciones somáticas gen PDGFRA

Comentario adicional: Tejido tumoral
ROTULAR: ONCO

Valores de referencia:

Descripción:	MY BIOME Panel NGS (Next Generation Sequencing)
Código:	MYBCON
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	heces especiales
Comentario adicional:	Heces recogidas en kit específico (Ref. 550000530) facilitado por el laboratorio. Seguir instrucciones facilitadas en el kit. No tomar antibióticos, antifúngicos ni inmunosupresores durante las 6 semanas anteriores a la obtención de la muestra. En caso de haberse sometido a tratamientos de radioterapia, quimioterapia o tratamiento hormonal, esperar al menos 6 semanas antes de la obtención de la muestra. No se recomienda realizar el test GENE200 en niños menores de 12 años. Si los padres o tutores legales de niños menores de 12 años desean realizar el test, se requiere su prescripción por parte de un profesional de la salud que se haga cargo de la su En caso de pacientes embarazadas, el test deberá ser solicitado bajo la supervisión de un especialista médico.

Valores de referencia:

Descripción:	MYBIOME + A200 (Microbioma Intestinal Plus)
Código:	MYBA200
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	SUERO Y HECES EN DISPOSITIVO ESPECIAL
Comentario adicional:	Heces en kit específico (Temperatura ambiente) y suero (refrigerado). IMPRESCINDIBLE REMITIR AMBAS MUESTRAS. Heces recogidas en kit específico (Ref. 550000530) facilitado por el laboratorio. Seguir instrucciones facilitadas en el kit. No tomar antibióticos, antifúngicos ni inmunosupresores durante las 6 semanas anteriores a la obtención de la muestra. En caso de haberse sometido a tratamientos de radioterapia, quimioterapia o tratamiento hormonal, esperar al menos 6 semanas antes de la obtención de la muestra. En caso de pacientes embarazadas, el test deberá ser solicitado bajo la supervisión de un especialista médico. No se recomienda realizar el test GENE200 en niños menores de 12 años. Si los padres o tutores legales de niños menores de 12 años desean realizar el test, se requiere su prescripción por parte de un profesional de la salud que se haga cargo de la su

Valores de referencia:

Descripción:	MYBIOME + PARASITOS (Microbioma Intestinal Avanzado)
Código:	MYBPA
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	heces especiales
Comentario adicional:	Heces recogidas en kit específico (Ref. 550000530) facilitado por el laboratorio. Seguir instrucciones facilitadas en el kit. 3 MUESTRAS DE HECES PARA ESTUDIO DE PARASITOS.Recipiente con medio Alcorfix (fijador parásitos)

Valores de referencia:

Descripción:	MYBIOME + PARASITOS+SEROLOGIA CELIAQUIA (Completo)
Código:	MYBCEL
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	SUERO Y HECES EN DISPOSITIVO ESPECIAL

Descripción:	MYBIOME + PARASITOS+SEROLOGIA CELIAQUIA (Completo)
Comentario adicional:	Tubo Copan heces (FlogSwabs HDNAFree;pedir a almacén) + 3 tubos parásitos (COPROPACK FIX S.FIJA. PARASIT) + Suero. IMPRESCINDIBLE REMITIR TODAS LAS MUESTRAS. Heces recogidas en kit específico (Ref. 550000530) facilitado por el laboratorio. Seguir instrucciones facilitadas en el kit. No tomar antibióticos, antifúngicos ni inmunosupresores durante las 6 semanas anteriores a la obtención de la muestra. En caso de haberse sometido a tratamientos de radioterapia, quimioterapia o tratamiento hormonal, esperar al menos 6 semanas antes de la obtención de la muestra. En caso de pacientes embarazadas, el test deberá ser solicitado bajo la supervisión de un especialista médico. No se recomienda realizar el test BIONECHO en niños menores de 12 años. Si los padres o tutores legales de niños menores de 12 años desean realizar el test, se requiere su prescripción por parte de un profesional de la salud que se haga cargo de la su

Valores de referencia:

Descripción:	Mycobacterium spp PCR y resistencias a M.Tuber. Complex
Código:	MYCOB_PCR
Técnica:	RT-PCR
Unidades:	
Plazo:	6 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:	1ml esputo_REFRIGERAR 1ml BAL-REFRIGERAR 1ml BAS-REFRIGERAR 1ml Humor vitreo/acuoso-REFRIGERAR 1ml Orina-REFRIGERAR Biopsia-TA

Valores de referencia:

Descripción:	MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS AC. IGG EN SUERO
Código:	MYCOBACACG
Técnica:	Técnica EIA
Unidades:	
Plazo:	17 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 0.90) Ausencia de anticuerpos

Descripción:	MYCOPLASMA HOMINIS AC. IGG
Código:	MYCOHOMAC
Técnica:	IFI
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Contenedor: Tubo suero con separador. Conservación: Refrigerar Volumen: 1.0 mL Volumen mínimo: 0.20 mL

Valores de referencia: Se consideran niveles significativos a partir de título 1:32

Descripción:	MYCOPLASMA HOMINIS AC. IGM
Código:	MYCOHOMACM
Técnica:	IFI
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal

Descripción: MYCOPLASMA HOMINIS AC. IGM
Comentario adicional: Suero.
 Volumen 1.0 mL
 Volumen mínimo 0.20 mL
Valores de referencia: Se consideran niveles significativos a partir de título 1:32

Descripción: Mycoplasma Hominis en muestra por PCR
Código: MYCOPCR
Técnica: Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR)
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra envíos externos
Comentario adicional: 5ml orina (primera micción)-REFRIGERAR
 Exudado-REFRIGERAR
 1ml LCR-CONGELAR
 Lavado seminal-CONGELAR
 Secreción prostática-REFRIGERAR
Valores de referencia: Valor de referencia: No se detecta

Descripción: MYCOPLASMA PNEUMONIAE AC. IgA SUERO
Código: MYCOPLAACA
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: <1/12 Título <1/12 Negativo
 >1/12 Título >1/12 Positivo

Descripción: MYCOPLASMA PNEUMONIAE AC. IGG EN LCR
Código: MYCOPACGLC
Técnica: Téc. Enzimoinmunoanálisis.
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 mL LCR.Refrigerar,
Valores de referencia: Interpretación según criterio clínico

Descripción: MYCOPLASMA PNEUMONIAE AC. IGG SUERO
Código: MYCOACG
Técnica: Inmunoensayo quimioluminiscencia
Unidades: UA/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 10) Negativo
 (Sup. 10) Positivo

Descripción: MYCOPLASMA PNEUMONIAE AC. IgM EN LCR
Código: MYCOPACMLC
Técnica: EIA

Descripción: MYCOPLASMA PNEUMONIAE AC. IgM EN LCR
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 mL LCR.refrigerar
Valores de referencia: Interpretación según criterio clínico

Descripción: MYCOPLASMA PNEUMONIAE AC. IgM SUERO
Código: MYCOPLAACM
Técnica: Inmunoensayo de quimioluminiscencia
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 10) Probable ausencia de infección
(Sup. 10.0) Probable infección aguda

Descripción: Mycoplasma pneumoniae DNA PCR Cualitativa
Código: MYCOPNPCR
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: 0,3ml Esputo-REFRIGERAR
0,3ml Lavado broncoalveolar-REFRIGERAR
0,35ml Líquido pleural -REFRIGERAR
Otros: LCR, Líquido articular, Líquido amniótico
Valores de referencia: Valor de referencia: No se detecta

Descripción: MYCOPLASMAS GENITALES EN EXUDADO
Código: MYCOVAGI
Técnica: Cultivo
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Microbiología
Comentario adicional: Torunda con medio de transporte
Valores de referencia:

Descripción: N.METIL ACETAMIDA EN ORINA
Código: METILCETAM
Técnica: Cromatografía líquida/Espectrometría de masas tandem (LC-MS/MS)
Unidades: mg/g creatinina
Plazo: 17 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: Orina (micción aislada) al final de la semana laboral
Volumen: 10.0 mL
Volumen mínimo: 5 mL
Valores de referencia: (Inf. 30.0) Al final de la semana laboral (exposición a DIMETILACETAMIDA) VLB-INSHT

Descripción: NAG ORINA (N-ACETIL BETA D-GLUCOSAMINIDASA)
Código: NAG
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: U/g creatinina
Plazo: 7 días
Tubo: Orina basal
Comentario adicional: 5 mL orina. refrigerar
Valores de referencia: (0.7 - 5.7)

Descripción: Nefrolitiasis/osteoporosis hipofosfatémica 1. Gen: SLC34A1
Código: GEN_000564
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Nefrolitiasis: enfermedad de Dent 1. Sec Gen: CLCN5
Código: GEN_000563
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Nefronoptosis tipo 4. Sec Gen: NPHP4
Código: GEN_000565
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Nefronoptosis. Sec Gen: INVS
Código: GEN_000566
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Nefropatía quística medular tipo 1. Sec Gen: MUC1
Código: GEN_000567
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días

Descripción:	Nefropatía quística medular tipo 1. Sec Gen: MUC1
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Nefropatías y enfermedad renal. Panel NGS
Código:	GEN_000569
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Neisseria gonorrhoeae DNA PCR Cualitativa
Código:	NEISSERPCR
Técnica:	PCR
Unidades:	
Plazo:	10 días
Tubo:	Muestra envios externos
Comentario adicional:	FROTIS/ESCOBILLON SECO-REFRIGERAR exudado bucal.escobillon seco-REFRIGERAR exudado recta. escobillon seco-REFRIGERAR exudado vaginal-REFRIGERAR orina primera miccion-REFRIGERAR
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta

Descripción:	NEISSERIA MENINGITIDIS AC IGG (POSTVACUNACIÓN)
Código:	MENINGIGG
Técnica:	Téc. Enzimoimmunoanálisis
Unidades:	
Plazo:	19 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL (mínimo 0.57mL)
Valores de referencia:	(Sup. 1.0) Positivo (Inf. 1) o igual a 1 Negativo

Descripción:	Neisseria meningitidis DNA PCR en Sangre
Código:	MENINGPCR
Técnica:	PCR
Unidades:	
Plazo:	12 días
Tubo:	Muestra envios externos
Comentario adicional:	2 mL de sangre total (EDTA)
Valores de referencia:	

Descripción:	Neoplasia endocrina múltiple tipo 1: gen MEN1 (NGS)
Código:	MEN1
Técnica:	PCR, secuenciación, y MLPA
Unidades:	
Plazo:	30 días

Descripción: Neoplasia endocrina múltiple tipo 1: gen MEN1 (NGS)

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Neoplasia endocrina múltiple tipo 2: gen RET (NGS)

Código: MEN2

Técnica: PCR y secuenciación

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Neoplasia endocrina múltiple. Panel NGS

Código: GEN_000570

Técnica:

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Neoplasia endocrina múltiple tipo 4: gen CDKN1B (NGS)

Código: MEN4

Técnica: PCr, secuenciación y MLPA

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS (LLC, SMD, LAM) · TP53 · SANGER

Código: TP53

Técnica: PCR y Secuenciación

Unidades:

Plazo: 10 días

Tubo: TUBO ONCOGENETICA

Comentario adicional: Al menos 1 ml de Médula Ósea en tubo EDTA o al menos 5 ml de Sangre Periférica en tubo EDTA. Tubo exclusivo para esta determinación (tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO).
IMPORTANTE: SIEMPRE REFRIGERADO
Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.

Valores de referencia:

Descripción: NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS (LMA, SMD) · RUNX1 · SANGER

Código: RUNX1_MUTS

Técnica: SANGER

Unidades:

Plazo: 7 días

Descripción:	NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS (LMA, SMD) · RUNX1 · SANGER		
Tubo:	TUBO ONCOGENETICA		
Comentario adicional:	4 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refrigerar]	(Estabilidad: 4°C:1 Meses)	
	o 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refrigerar]	(Estabilidad: 4°C:1 Meses)	

Valores de referencia:

Descripción:	NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS (LMA/LMMC/SMD) · SRSF2 · SANGER		
Código:	SRSF2_MUTS		
Técnica:	SANGER		
Unidades:			
Plazo:	7 días		
Tubo:	TUBO ONCOGENETICA		
Comentario adicional:	4 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refrigerar]	(Estabilidad: 4°C:1 Meses)	
	o 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refrigerar]	(Estabilidad: 4°C:1 Meses)	

Valores de referencia:

Descripción:	NEOPLASIAS MIELOIDES · IDH1(R132H), IDH2(R172W, R140Q)		
Código:	IDH1_IDH2		
Técnica:	PCR		
Unidades:			
Plazo:	7 días		
Tubo:	TUBO ONCOGENETICA		
Comentario adicional:	Muestras de tejido tumoral y sangre. Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO.		
	IMPORTANTE: REFRIGERADO SIEMPRE		

Valores de referencia:

Descripción:	NEOPTERINA ORINA		
Código:	NEOPT2		
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis		
Unidades:	mcmol/molcreat		
Plazo:	14 días		
Tubo:	Orina congelada		
Comentario adicional:	10 mL Orina.congelar. Proteger de la luz		
Valores de referencia:	(Inf. 220.0)		

Descripción:	NEOPTERINA SUERO		
Código:	NEOPT2		
Técnica:	LC-MS/MS		
Unidades:	ng/mL		
Plazo:	23 días		
Tubo:	Suero Basal		
Comentario adicional:	1 ml suero		
Valores de referencia:	(Inf. 3)		

Descripción:	Netherton, Sd. Sec Gen: SPINK5		
Código:	GEN_000571		
Técnica:			
Unidades:			
Plazo:	25 días		

Descripción: Netherton, Sd. Sec Gen: SPINK5
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: NETILMICINA
Código: NETILMI
Técnica: Inmunoensayo enzimático homogéneo (EMIT)
Unidades: mcg/mL
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (6 - 10) Pico
(Sup. 16) Pico - TOXICIDAD
(0.5 - 2) Valle
(Sup. 4) Valle - TOXICIDAD

Descripción: NEUMOCOCO EN ORINA
Código: NEUMOCOCO
Técnica: Inmunocromatografía
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Muestra Microbiología
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Neuroacantocitosis. Sec Gen: XK
Código: GEN_000572
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Neurodeg acumulación cerebral hierro: Aceruloplasminemia. CP
Código: GEN_000573
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Neurodeg. con depósitos de hierro: <10 genes (NGS)
Código: PANK2_MUTS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Neurodeg. con depósitos de hierro: <10 genes (NGS)
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Neurodegeneración déficit de pantotenato quinasa. Gen: PANK2
Código: GEN_000574
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Neuroferritinopatía. Sec Gen: FTL
Código: GEN_000575
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Neurofibromatosis tipo 1: gen NF1 (NGS)
Código: NF1_DNA
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Neurofibromatosis tipo 2: gen NF2 (NGS)
Código: NF2_DNA
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato
Valores de referencia:

Descripción: NEUROFILAMENTO LIGHT(NF-L) SUERO
Código: NEUROFIL
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: pg/mL
Plazo: 14 días
Tubo: Plasma EDTA Congelado

Descripción: NEUROFILAMENTO LIGHT(NF-L) SUERO

Comentario adicional: Plasma de EDTA en tubo de polipropileno.
Volumne mínimo: 0.5 mL

Alternativa: Suero en tubo de polipropileno. Congelar.

Valores de referencia: (Inf. 9.40) 18 años - 29 años
(Inf. 9.60) 29 años - 39 años
(Inf. 13.30) 39 años - 49 años
(Inf. 21.20) 49 años - 59 años
(Inf. 28.10) 59 años - 69 años
(Inf. 46.80) 69 años - 90 años

Descripción: NEUROMIELITIS OPTICA (ACUAPORINA 4) ANTICUERPOS IGG

Código: ANTINMO

Técnica: INMUNOFLUORESCENCIA

Unidades:

Plazo: 7 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 1 mL Suero (Refrigerado)
Alt. 1 mL Plasma Citrato sódico (Refrigerado)
Alt. 1 mL Plasma EDTA Dipotásico (Refrigerado)
Alt. 1 mL Plasma Heparina litio (Refrigerado)

Valores de referencia: Negativo <1/10
Positivo >1/10

Código: NEURACLCR

Descripción: NEURONALES DE SUPERFICIE ANTICUERPOS MOSAICO LCR

Técnica: Cell Binding Assay IFI

Comentario adicional: 1 mL LCR.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	LGI1ACLCR	90831-9		PERFIL LGI1 AC. LCR		
Prueba	AMPA1_2LCR			PERFIL AMPA 1/ AMPA 2 RECEPTORES ANTICUERPOS EN LCR		
Prueba	DPPXLCR			PERFIL DPPX ANTICUERPOS LCR		
Prueba	CASPR2LCR	90821-0		PERFIL CASPR2 AC. ANTI RECEPTOR LCR		
Prueba	GABAACLCR	90825-1		PERFIL GABA B AC. ANTI RECEPTOR LCR		
Prueba	NMDAACLCR			PERFIL NMDA AC. ANTI RECEPTOR LCR		

Código: MOSANEURO

Descripción: NEURONALES DE SUPERFICIE ANTICUERPOS MOSAICO SUERO

Técnica:

Comentario adicional: Suero

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	NMDAACSUER	80221-5		NMDA AC. ANTI RECEPTOR SUERO		Negativo: Título <1/10

Componentes					
Prueba	AMPA1_2			AMPA 1/ AMPA 2 RECEPTORES ANTICUERPOS EN SUERO	
Prueba	ANTIGABA	95602-9		GABA B (Subunid GABARB1/B2) AC.antireceptor, Suero	Negativo: Título < 1/10
Prueba	CASPR2	95600-3		AC. ANTI CASPR2 SUERO	Negativo: Título <1/100
Prueba	LGI1	95601-1		LGI 1 ANTICUERPOS SUERO	
Prueba	DPPXAC	95599-7		DPPX AC. (Dipeptidil Aminopeptidasa like Protein-6) SUERO	Negativo: Título <1/10

Descripción: Neuronopatía óptica-sordera-distonía, Sd. Sec Gen: TIMM8A
Código: GEN_000577
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Neuropatía ataxia retinosis pigmentosa. MTATP6. Mut. T8993G
Código: GEN_000580
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Neuropatía atáxica sensitiva-disartria-oftalmoplejia. POLG
Código: GEN_000578
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Neuropatía axonal gigante. Sec Gen: GAN
Código: GEN_000579
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Neuropatía con ataxia y retinosis pigmentosa. Gen: MTATP6
Código: GEN_000581
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Neuropatía motora distal hereditaria 2A: gen HSPB8 (NGS)
Código: HSPB8_MUTS
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Neuropatía motora distal hereditaria 2C: gen HSPB3 (NGS)
Código: HSPB3_MUTS
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Neuropatía óptica hereditaria de Leber: 3 mutaciones mtDNA
Código: LHON_DNA
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente
Valores de referencia:

Descripción: Neuropatía sensitiva con demencia sordera. Sec Gen: DNMT1
Código: GEN_000582
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Neuropatías hereditarias panel de genes
Código: PHARMALAP7

Descripción: Neuropatías hereditarias panel de genes
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
 Imprescindible enviar la historia clínica y formulario de petición de genética o consentimiento informado

Valores de referencia:

Descripción: Neuropatías motoras sensoriales hereditarias. Panel NGS
Código: GEN_000583
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
 Valores de referencia:

Descripción: Neuropatías motoras y sens. agenesia cuerpo calloso. LC12A6
Código: GEN_000584
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
 Valores de referencia:

Descripción: Neuropatías sensitivas y autonómicas hereditarias. Panel NGS
Código: GEN_000585
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
 Valores de referencia:

Descripción: NEUROPEPTIDO Y EN SUERO
Código: NEUROPEPTY
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: pg/mL
Plazo: 19 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 0.5 mL de suero CONGELADO
 CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.
 Se ruega el envío de un tubo independiente para esta determinación.
 Volumen mínimo: 0.3 mL
 Valores de referencia: (173.0 - 1033.0)

Código: NEUOTRLCR
Descripción: NEUROTRANSMISORES LCR

Código:

NEUOTRLCR

Técnica:

Cromatografía Líquida - Tandem masas (LC-MS/MS)

Comentario adicional:

1 mL LCR. Recubrir tubo con papel de plata para proteger de la luz. Congelar y enviar congelado. Imprescindible enviar informe clínico.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	OMDLCR	34596-7		3-ORTOMETILDOPA EN LCR	nmol/L	(81.3 - 299.5) 0-3 meses (27.0 - 119.0) 4-12 meses (5.3 - 66.9) 1-4 años (5.3 - 66.9) 4-11 años (5.3 - 66.9) 11-18 años
Prueba	MHPGLCR	47538-4		MHPG LCR	nmol/L	(89 - 242) 0-3 meses (38 - 129) 4-12 meses (38 - 129) 1-4 años (38 - 129) 4-11 años (38 - 129) 11-18 años
Prueba	OHTRPLCR	47546-7		5HIDROXITRIPTOFANO LCR	nmol/L	(7.3 - 29.7) 0-3 meses (7.3 - 29.7) 4-12 meses (6.1 - 20.7) 1-4 años (6.1 - 20.7) 4-11 años (6.1 - 20.7) 11-18 años
Prueba	HIAALCR	47544-2		5-HIDROXIINDOLACETICO EN LCR	nmol/L	(419 - 955) 0-3 meses (185 - 570) 4-12 meses (122 - 257) 1-4 años (65 - 211) 4-11 años (47 - 127) 11-18 años
Prueba	HVALCR	40846-8		HOMOVANILICO EN LCR	nmol/L	(415 - 1379) 0-3 meses (325 - 843) 4-12 meses (302 - 582) 1-4 años (173 - 590) 4-11 años (82 - 291) 11-18 años
Prueba	HVAHIAALCR	5004303		RATIO HVA/5-HIAA LCR		(0.9 - 2.6) 0-3 meses (0.9 - 2.6) 4-12 meses (1.2 - 4.0) 1-4 años (1.2 - 4.0) 4-11 años (1.2 - 4.0) 11-18 años
Prueba	HVAMHPGLCR	5004304		RATIO HVA/MHPG LCR		(2.3 - 8.5) 0-3 meses (2.3 - 8.5) 4-12 meses (2.3 - 8.5) 1-4 años (2.3 - 8.5) 4-11 años (1.1 - 4.0) 11-18 años

Descripción:

Neutropenia aloinmune neonatal. Sec Gen: FCGR3B

Código:

GEN_000586

Técnica:

Unidades:

Plazo:

25 días

Tubo:

EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional:

Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción:

Neutropenia congénita 1: gen ELANE (NGS)

Código:

NEUTROPENI

Técnica:

NGS con TSOE de Illumina

Unidades:

Plazo:

30 días

Descripción: Neutropenia congénita 1: gen ELANE (NGS)
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Neutropenia congénita severa AR tipo 3. Sec Gen: HAX1
Código: GEN_000587
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: NFERMEDAD MEDIBLE RESIDUAL (EMR) LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA
Código: EMR_LMA
Técnica: Citometria de flujo
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: 1 tubo de EDTA de 5ml
Valores de referencia:

Descripción: Niemann-Pick. Panel NGS
Código: GEN_000589
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Nijmegen, Sd. Sec Gen: NBN
Código: GEN_000590
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: NIQUEL ORINA
Código: NIQUEL2
Técnica: ICP-MS
Unidades: µg/l
Plazo: 7 días
Tubo: Orina Final de Jornada

Descripción:	NIQUEL ORINA
Comentario adicional:	Al menos 5 ml de orina al final de la semana laboral.
	No recolectar muestras de orina en un ambiente en el que sea más probable que ocurra la exposición. Es importante evitar que el polvo de la ropa pueda interferir en el contenido de la muestra.
	No recoger la orina en recipientes con base de metal, como urinarios o sartenes de metal. Recoger la orina en tubos de polipropileno inoculados libres de metales sin tapones de colores. Cuando esto no sea posible, usar para la recogida de orina un envase
Valores de referencia:	(Inf. 5.0) personas expuestas a sales insolubles de Níquel y Níquel metálico (Orina final semana laboral) (BEI-ACGIH). (Inf. 30.0) personas expuestas a sales solubles de Níquel (Orina final semana laboral) (BEI-ACGIH). (Inf. 2) Límite de cuantificación

Descripción:	NIQUEL SUERO
Código:	NIQUEL
Técnica:	ICP-MS
Unidades:	µg/l
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero. La muestra idónea es contenedor libre de metales. De forma alternativa se puede usar tubo de suero.
Valores de referencia:	(Inf. 2) Valores de referencia orientativos para personas no expuestas. (Inf. 10) Valores de referencia orientativos para personas expuestas (propuesto por Basel RC. Biological Monitoring Methods for Industrial Chemicals).

Descripción:	Nistagmus congénito AD y ligado a X: <10 genes (NGS)
Código:	NISTAGMUS
Técnica:	NGS TSOE Illumina
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	NITRAZEPAM SUERO (MOGADON)
Código:	NITRAZEPAM
Técnica:	LC-MS/MS
Unidades:	ng/mL
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(30 - 90)

Descripción:	NKCD56+CD16+
Código:	NKCD56CD16
Técnica:	
Unidades:	% sobre NK
Plazo:	4 días
Tubo:	Sangre EDTA
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(91 - 99)

Descripción: NMDA AC. ANTI RECEPTOR SUERO
Código: NMDAACSUER
Técnica: Inmunocitoquímica (Cell Based Assay).
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL de suero refrigerado
Valores de referencia: Negativo: Título <1/10

Descripción: NOCARDIA SPP DNA, MUESTRA BIOLÓGICA
Código: NOCARDIPCR
Técnica: HIBRIDACIÓN MOLECULAR CON AMPLIFICACIÓN (PCR)
Unidades:
Plazo: 8 días
Tubo: Muestra envíos externos
Comentario adicional: Muestra biológica:

Líquido pericardico. Refrigerar. 4°C: 48 Horas;-20°C: 1 Meses
 Líquido pleural. Refrigerar. 4°C: 48 Horas;-20°C: 1 Meses
 LCR: Refrigerar. 4°C: 48 Horas;-20°C: 1 Meses
 Humor vitreo/acuoso: Refrigerar. 4°C: 48 Horas;-20°C: 1 Meses
 Espudo: Refrigerar. 4°C: 48 Horas;-20°C: 1 Meses
 Biopsia de piel en suero fisiologico: Refrigerar. 4°C: 48 Horas;-20°C: 1 Meses
 Lavado broncoalveolar: Refrigerar. 4°C: 48 Horas;-20°C: 1 Meses
 Raspado corneal: Refrigerar. 4°C: 48 Horas;-20°C: 1 Meses

Muestras respiratorias profundas, muestras de biopsias cutáneas o de estudios cutáneos, o muestras de biopsias cerebrales o de líquido cefalorraquídeo. Líquido pleural, líquido pericárdico, aspirado de colección purulenta, raspado corneal, humor vitreo

Valores de referencia: Valor de referencia: No se detecta

Código: NODALPARA
Descripción: NODAL-PARANODAL ANTICUERPOS (NEUROFASCINA) SUERO
Técnica:
Comentario adicional: 1 mL SUERO

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	CONTACTIN	101448-9		Contactina-1		
Prueba	NEUROF155			Neurofascina-155		
Prueba	NEUROF186			Perfil,Neurofascina-186		
Prueba	CASPR1	95600-3		CASPR1 (CONTACTIN-ASSOC.PROTEIN-1) SUERO		

Descripción: Non invasive PGT aneuploidias pack (1-8 embriones)
Código: NIPGT
Técnica:
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional: Medio de cultivo embrionario en kit especial. Consultar Asesoría Genética

Descripción: Non invasive PGT aneuploidias pack (1-8 embriones)

Valores de referencia:

Descripción: NOR-90 AC. SUERO

Código: NOR90AC

Técnica: Inmunoblot

Unidades:

Plazo: 7 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional:

Valores de referencia: Negativo

Descripción: Norovirus RNA PCR muestra

Código: NOROVIRPCR

Técnica: HIBRIDACIÓN MOLECULAR CON AMPLIFICACIÓN a TIEMPO REAL RT-PCR

Unidades:

Plazo: 9 días

Tubo: heces especiales

Comentario adicional: Heces y vómitos. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO

Valores de referencia:

Descripción: NOTA ACLARACIÓN INFORME TEST ESPIRADO

Código: NOTAALI

Técnica:

Unidades:

Plazo: 7 días

Tubo:

Comentario adicional:

Valores de referencia:

Descripción: NT-PRO-BNP (NT-PRO-PEPTIDO NATRIURETICO CEREBRAL)

Código: PROBNP

Técnica: CMIA

Unidades: pg/mL

Plazo: 5 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: Suero.

Tubo alternativo: plasma de EDTA y heparina.

Valores de referencia: (Inf. 125) < 50 años Cuadro no agudo: IC improbable

(Sup. 600) < 50 años Cuadro no agudo: IC probable

(Inf. 300) Cuadro agudo: IC improbable

(Sup. 450) < 50 años Cuadro agudo: IC probable

(Sup. 900) 50 años - 75 años Cuadro agudo: IC probable

(Sup. 1800) > 75 años Cuadro agudo: IC probable

Descripción: NUCLEARES AC SUERO

Código: ANA

Técnica: Técnica IFI

Unidades:

Plazo: 5 días

Tubo: Suero Basal

Descripción: NUCLEARES AC SUERO
Comentario adicional: Suero
Valores de referencia: Negativo <1/160

Descripción: NUMERO TOTAL HEMATIES
Código: HEMATIES
Técnica:
Unidades: 10⁶/μL
Plazo: 3 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional:
Valores de referencia: (4.60 - 6.20) Hombre
 (4.20 - 5.40) Mujer

Descripción: NUMERO TOTAL LEUCOCITOS
Código: LEUCOCITOS
Técnica:
Unidades: 10³/μL
Plazo: 3 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional:
Valores de referencia: (4.00 - 11.00)

Descripción: NUMERO TOTAL PLAQUETAS
Código: PLAQ
Técnica:
Unidades: 10³/μL
Plazo: 3 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional:
Valores de referencia: (130 - 450)

Descripción: NXP2 AC.SUERO
Código: NXP2
Técnica:
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: Negativo

Descripción: Obesidad monogénica no sindrómica: <10 genes (NGS)
Código: OBESI_MUTS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Obesidad mórbida. Sec Gen: MC4R
Código: GEN_000592
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Obesidad. Panel NGS
Código: GEN_000591
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Obesidad. Sec Gen: PPARG
Código: GEN_000593
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Oftalmoplejia ext. crónica progresiva AD tipo 4. Gen: POLG2
Código: GEN_000594
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Oftalmoplejia externa progresiva AR. Sec Gen: POLG
Código: GEN_000595
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: OJ AC. SUERO
Código: OJAC
Técnica:
Unidades:
Plazo: 7 días

Descripción: OJ AC. SUERO
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: Negativo

Descripción: OLANZAPINA SUERO
Código: OLANZAPINA
Técnica: Cromatografía Líquida/Tándem masas.
Unidades: µg/L
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: Suero congelado. 0.5 mL
 Alternativa: plasma de edta congelado.

La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis.

Valores de referencia: (20 - 80) Índice terapéutico
 (Sup. 100) Toxicidad
 (Inf. 5) Límite de cuantificación

Descripción: OLIGOSACARIDOS ORINA
Código: OLIGOSACAR
Técnica: LC-MS/MS
Unidades:
Plazo: 23 días
Tubo: Orina congelada
Comentario adicional: 10 ml de orina (micción aislada)
 CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO

Valores de referencia:

Código: OMALIZUMAB
Descripción: OMALIZUMAB Y AC. ANTI OMALIZUMAB
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Comentario adicional: 2 ml de suero. Toma de muestra antes de la administración de la próxima dosis.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	OMALIZ			OMALIZUMAB (P. PERFIL)	mcg/mL	
Prueba	OMALIZAC			ANTI OMALIZUMAB (P. PERFIL)		

Descripción: Omenn. Panel NGS
Código: GEN_000596
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: ONCONEURONALES LCR(CV2,PNMA2,Recov, SOX1,Gad,Titina,Zic4,etc
Código: ACAAGNENUC
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: LIQUIDO LCR INMUNO
Comentario adicional: 1 mL LCR.
 Adjuntar un breve informe clínico para la interpretación de resultados.
Valores de referencia: Mediante este técnica se indentifican anticuerpos frente a: anti Hu, Yo, Ri ,CV2, PNMA2 (Ma2/Ta), Amfifisina, Recoverina, SOX1, TITINA, ZIC4, GAD64/65 Y Tr(DNER)

Código: ANNA
Descripción: ONCONEURONALES(CV2,PNMA2,Ri,Yo,Hu,Amph,Recov,Titin,SOX,ZIC)
Técnica: Inmunoblot
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	AMPHIPHY	57749-4		PERFIL ANNA AMPHIPHYSINA AC. SUERO		Negativo
Prueba	CV2	47402-3		PERFIL ANNA CV2 AC. SUERO		Negativo
Prueba	ACYO	12853-8		PERFIL ANNA Yo AC. SUERO		Negativo
Prueba	ACHU	41769-1		PERFIL ANNA Hu AC. SUERO		Negativo
Prueba	ACRI	33008-4		PERFIL ANNA Ri AC. SUERO		Negativo
Prueba	PNMA2	56720-6		PERFIL ANNA PNMA2 (Ma2/Ta) AC. SUERO		Negativo
Prueba	TRANTICUER	63440-2		PERFIL ANNA ANTI Tr AC. (SUERO)		Negativo
Prueba	RECOVERIN	101226-9		PERFIL ANNA RECOVERINA AC. SUERO		Negativo
Prueba	SOX1	82444-1		PERFIL ANNA SOX1 AC. SUERO		Negativo
Prueba	TITINA	82449-0		PERFIL ANNA TITINA AC. SUERO		Negativo
Prueba	ZICAC	38915-5		PERFIL ANNA ZIC 4 AC. SUERO		Negativo

Descripción: Oncoproteína HER-2/neu en suero
Código: HER2NEU
Técnica: EIA
Unidades: ng/mL
Plazo: 12 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: Congelar inmediatamente
Valores de referencia: (Inf. 15)

Descripción: Oncotype: expresión génica Cáncer de Mama
Código: ONCOTYPE
Técnica: RT-PCR
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica

Descripción: Oncotype: expresión génica Cáncer de Mama
Comentario adicional: Bloque de tejido tumoral mama. Tª ambiente
 Informe de anatomía patológica y del oncología
 Tumor INFILTRANTE
 Entregar a Asesoría Genética

Valores de referencia:

Descripción: OPIACEOS
Código: OPIA
Técnica: Inmunoensayo
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Orina Drogas de Abuso

Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: OPIACEOS CONFIRMACION EN SALIVA
Código: OPIASAL
Técnica: LC-MS/MS
Unidades: ng/mL
Plazo: 10 días
Tubo: Saliva
Comentario adicional: Saliva recogida en kit ORAL-EZE. Solicitar kit en el almacén.
Valores de referencia:

Descripción: OPIACEOS EN PELO CONFIRMACION
Código: OPIAPELO
Técnica: Cromatografía líquida/Tanden masas (LC-MS/MS)
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional: PEDIR KIT ESPECIAL: almacen@ctes.eurofinseu.com
 PEDIR PROTOCOLO DE TOMA DE MUESTRA: calidad@ctes.eurofinseu.com
 -Análisis Informativo: incluye kit de toma de muestra y formulario de solicitud
-Cadena custodia: En caso de solicitar el análisis con validez judicial, solicitar al almacén también documentación de cadena custodia (acta de toma de muestra y hoja de seguimiento). El protocolo de cadena custodia debe solicitarse a calidad@ctes.eur
 En el caso de cadena custodia debe recogerse la muestra por duplicado.

Valores de referencia:

Descripción: Organoides derivados del paciente PDO
Código: ONCOPDO
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: Muestra envíos externos
Comentario adicional: Muestra de biopsia fresca que NO tiene que pasar por laboratorio central, va directamente a Megalab Alemania.
 Debe de enviarse refrigerada a 4°C.

Valores de referencia:

Descripción: ORO EN SUERO
Código: ORO
Técnica:

Descripción:	ORO EN SUERO
Unidades:	mcg/L
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 0.1) Individuos no expuestos Valores terapéuticos indicativos: Estado estacionario tras 50 mg semanales de Aurotiomalato de sodio intramuscular: aproximadamente 3000-5000 mcg/L Estado estacionario tras 6 mg diarios de Auranofina: aproximadamente 500-700 mcg/L
Descripción:	ORTO CRESOL EN ORINA (Exposicion a Tolueno)
Código:	ORTOCRESOL
Técnica:	Técnica HPLC
Unidades:	mg/g creatin.
Plazo:	11 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	orina (micción aislada) al final de la jornada laboral. enviar refrigerada. Volumen: 5.0 mL Volumen mínimo: 2 mL
Valores de referencia:	(Inf. 0.6) Final de jornada (exposición TOLUENO) Límite de cuantificación: 0.1 mg/L
Descripción:	OSMOLALIDAD ORINA
Código:	OSMOLAL2
Técnica:	Osmometría
Unidades:	mOsm/Kg
Plazo:	3 días
Tubo:	Orina 24 Horas
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(300 - 1000) > 1 año (50 - 600) < 1 año
Descripción:	OSMOLALIDAD SUERO
Código:	OSMOLALI
Técnica:	Osmometría
Unidades:	mOsm/Kg
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 ml suero
Valores de referencia:	(275 - 300)
Descripción:	OSTEOCALCINA SUERO
Código:	OSTEOCAL
Técnica:	Inmunoensayo por quimioluminiscencia
Unidades:	ng/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero.

Descripción: OSTEOCALCINA SUERO

Valores de referencia: (4.6 - 65.4) Hombre
(6.5 - 42.3) Mujer Premenopausia
(5.4 - 59.1) Mujer Posmenopausia

Descripción: Osteocondromatosis 1 y 2: <10 genes (NGS)

Código: OSTEOCONDR

Técnica:

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Osteodisplasia poliq. leucoencefalopatía esclerosant. Panel

Código: GEN_000597

Técnica:

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Osteogénesis imperfecta ampliado. Panel NGS

Código: GEN_000598

Técnica:

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Osteogénesis imperfecta: genes COL1A1 y COL1A2 (NGS)

Código: OSTEOG_IMP

Técnica: NGS y MLPA

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Osteopetrosis infantil maligna. Sec Gen: CLCN7

Código: GEN_000599

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Osteopetrosis; Albers-Schonberg, Sd. Panel NGS
Código: GEN_000600
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: OVARIO AC. SUERO
Código: OVARIOAC
Técnica: Inmunofluorescencia Indirecta.
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero CON gel separador
Volumen mínimo: 0.3 mL
Valores de referencia: Negativo <1/20
Positivo >1/20

Descripción: OXAZEPAM
Código: OXAZEPAM
Técnica: LC-MS/MS
Unidades: µg/L
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero SIN gel separador
Volumen mínimo: 0.57 mL
Valores de referencia: (200 - 1500)
(Inf. 25) Límite de cuantificación
(Sup. 2000) Toxicidad
(Sup. 3000) Elevada toxicidad

Código: OXCARBA
Descripción: OXCARBAZEPINA Y SU METABOLITO
Técnica: Cromatografía líquida/Espectrometría de masas tandem (LC-MS/MS)
Comentario adicional: 1 mL suero sin gel separador. CONGELAR
La extracción de la muestra se debe realizar inmediatamente antes de la toma de la siguiente dosis, es decir, es pre-dosis.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	OXCAR	72659-6		NIVEL OX. SUERO	mg/L	(0.40 - 2.00) Índice terapéutico (Inf. 0.08) Límite de cuantificación
Prueba	HIDROXICAR	31019-3		METABOLITO ACTIVO DE OXCARBAZEPINA	mg/L	(5 - 30) Índice terapéutico (Inf. 1) Límite de cuantificación

Descripción: OXIDO NITRICO, SUERO
Código: OXNIT

Descripción: OXIDO NITRICO, SUERO
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: µmol/L
Plazo: 15 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: Suero
Volumen
1.0 mL
Conservación
Congelar
Volumen mínimo
0.50 mL
Valores de referencia: (Inf. 154) Límite orientativo

Descripción: OXIHMOGLOBINA
Código: OXIHB
Técnica:
Unidades: %
Plazo: 9 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:
Valores de referencia: (94 - 99) Adultos

Descripción: OXITOCINA EN SANGRE
Código: OXITOCINA
Técnica:
Unidades: pg/mL
Plazo: 11 días
Tubo: Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional: plasma de edta separado y congelado
Valores de referencia: (Inf. 700)

Descripción: p155-p140 (TIF1 GAMMA) ANTICUERPOS SUERO
Código: P155P140
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: Negativo

Descripción: P16:gen CDKN2A. Cancer pancreas (NGS)
Código: P16_MUTS
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Biología Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Código: RECEPTENDO

Descripción: Pack Endometriome + Eready (receptividad endometrial)

Técnica:

Comentario adicional: El perfil lleva 2 KITS.
Solicitar a Asesoría Genética previamente

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	DISBIENDOM			Evaluacion del microbioma endometrial (Endometriome)		
Prueba	EReady			Test de receptividad endometrial (ventana de implantación)		

Código: PFARMASUPL

Descripción: Pack Farmacogenética + Test genético suplementos y vitaminas

Técnica:

Comentario adicional: Muestra: sangre EDTA BM
Cumplimentar Hoja de solicitud Wellness

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	FARMAGEN75			Estudio genético de respuesta a 113 fármacos		
Prueba	SUPLEMEN			Estudio genético para suplementos alimenticios y vitaminas		

Código: NUTRIPLUS

Descripción: Pack Nutrigenética + Intolerancias + Suplementos

Técnica:

Comentario adicional: Muestra EDTA rotulada con BM y hoja de petición especial (wellness)

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	NUTRIGEN			T. genetico nutricion y metabolismo		
Prueba	INTALIGEN			Test genético intolerancia gluten, lactosa y fructosa		
Prueba	SUPLEMEN			Estudio genético para suplementos alimenticios y vitaminas		

Descripción: Paget del hueso, enfermedad de. Sec Gen: TNFRSF11A

Código: GEN_000601

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción:	Pallister-Hall, Sd. Sec Gen: GLI3
Código:	GEN_000602
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	P-AMINO FENOL (ANILINA) EN ORINA
Código:	P.AMINOFEN
Técnica:	Espectrometría
Unidades:	mg/L
Plazo:	14 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	10 mL orina fin de jornada laboral (micción aislada)
Valores de referencia:	(Inf. 50) Personas expuestas a ANILINA. Valor Límite Biológico (VLB-INSST). Al final de la jornada laboral. Observaciones: La ingesta de paracetamol puede interferir en el resultado. (Inf. 20) Límite de cuantificación

Descripción:	Pancreatitis crónica hereditaria. Sec Gen: CTRC
Código:	GEN_000603
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Pancreatitis hereditaria. Sec Gen: CFTR
Código:	GEN_000604
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Pancreatitis hereditaria: gen PRSS1 (NGS)
Código:	PRSS1
Técnica:	PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción: Pancreatitis hereditaria: gen SPINK1 (NGS)
Código: SPINK1
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: PANEL AMPLIO DIAGNÓSTICO, TERAPIA Y PRONÓSTICO (DNA y RNA)
Código: TSOTOTAL
Técnica:
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Muestras: tejido incluido en parafina.
Laboratorio Oncogenética
Valores de referencia:

Descripción: Panel avanzado de trombofilia: 23 genes
Código: TROMBO_AVA
Técnica:
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Código: TROMBO_BAS
Descripción: Panel básico de trombofilias: FII, FV Leiden y MTHFR
Técnica: Estudio de genotipado con sondas TaqMan mediante PCR en tiempo real (Real-Time PCR)
Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Comentario adicional: **Alternativas:** Heparina o Citrato.
El tiempo estimado para cada prueba se contará desde el día de entrada de la muestra en el laboratorio central (días laborables).
Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	FACIIMUT	24475-6		Trombofilia: mutación G20210A gen F2 Factor II		
Prueba	FACV_LEI	91712-0		Trombofilia: mutación G1691A (R506Q) gen F5 Factor V Leiden		
Prueba	MTHFRMUT			Trombofilia: mutaciones C677T y A1298C gen MTHFR		

Código: TROMBO_BAS
Descripción: Panel básico de trombofilias: FII, FV Leiden y MTHFR
Técnica: Estudio de genotipado con sondas TaqMan mediante PCR en tiempo real (Real-Time PCR)

Código:

TROMBO_BAS

Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Comentario adicional:

Alternativas: Heparina o Citrato.
El tiempo estimado para cada prueba se contará desde el día de entrada de la muestra en el laboratorio central (días laborables).
Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	FACIIMUT	24475-6		Trombofilia: mutación G20210A gen F2 Factor II		
Prueba	FACV_LEI	91712-0		Trombofilia: mutación G1691A (R506Q) gen F5 Factor V Leiden		
Prueba	MTHFRMUT			Trombofilia: mutaciones C677T y A1298C gen MTHFR		

Descripción:

PANEL CUSTOM ONCOHEMATOLOGÍA 3 - 10 GENES

Código:

CUSHEM3_10

Técnica:

NGS

Unidades:

Plazo:

15 días

Tubo:

TUBO ONCOGENETICA

Comentario adicional:

4 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refrigerar] (Estabilidad: 4°C:1 Meses)
o 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refrigerar] (Estabilidad: 4°C:1 Meses)

Valores de referencia:

Descripción:

PANEL CUSTOM ONCOHEMATOLOGÍA +25 GENES

Código:

CUSHEMAS25

Técnica:

NGS

Unidades:

Plazo:

15 días

Tubo:

TUBO ONCOGENETICA

Comentario adicional:

4 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refrigerar] (Estabilidad: 4°C:1 Meses)
o 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refrigerar] (Estabilidad: 4°C:1 Meses)

Valores de referencia:

Descripción:

PANEL CUSTOM ONCOHEMATOLOGÍA 1 - 2 GENES

Código:

CUSHEM1_2

Técnica:

NGS

Unidades:

Plazo:

15 días

Tubo:

TUBO ONCOGENETICA

Comentario adicional:

4 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refrigerar] (Estabilidad: 4°C:1 Meses)
o 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refrigerar] (Estabilidad: 4°C:1 Meses)

Valores de referencia:

Descripción:

PANEL CUSTOM ONCOHEMATOLOGÍA 1 - 2 GENES

Código:

CUSHEM1_2

Técnica:

NGS

Unidades:

Plazo:

15 días

Tubo:

TUBO ONCOGENETICA

Descripción: PANEL CUSTOM ONCOHEMATOLOGÍA 1 - 2 GENES
Comentario adicional: 4 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refrigerar] (Estabilidad: 4°C:1 Meses)
 o 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refrigerar] (Estabilidad: 4°C:1 Meses)

Valores de referencia:

Descripción: PANEL CUSTOM ONCOHEMATOLOGÍA 11 - 25 GENES · PANEL · NGS
Código: CUSHE11_25
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: 4 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refrigerar] (Estabilidad: 4°C:1 Meses)
 o 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refrigerar] (Estabilidad: 4°C:1 Meses)

Valores de referencia:

Descripción: PANEL CUSTOM TEJIDO 1 - 2 GENES · PANEL · NGS
Código: CUSSOL1_2
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: 1 Pieza/s Tejido parafinado [Tªambiente] (Estabilidad: 20°C:1 Años)

Valores de referencia:

Descripción: PANEL CUSTOM TEJIDO 3 – 10 GENES · PANEL · NGS
Código: CUSSOL3_10
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: 1 Pieza/s Tejido parafinado [Tªambiente] (Estabilidad: 20°C:1 Años)

Valores de referencia:

Descripción: Panel customizado NGS <10 genes
Código: NGSINFCUST
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: CONSULTAR SIEMPRE ANTES A ASESORÍA GENÉTICA
 Tubo exclusivo para esta determinación rotulado con BM.

Valores de referencia:

Descripción: Panel customizado NGS >10 genes
Código: NGSSUPCUST
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Panel customizado NGS >10 genes
Comentario adicional: CONSULTAR SIEMPRE ANTES A ASESORÍA GENÉTICA
 Tubo exclusivo para esta determinación rotulado con BM

Valores de referencia:

Descripción: Panel de 10 expansiones
Código: EXPAN_10
Técnica: PCR, TP-PCR, y análisis de fragmentos
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
 Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Panel de 11 expansiones
Código: EXPAN_11
Técnica: PCR, TP-PCR, y análisis de fragmentos
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
 Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Panel de riesgo genético
Código: PANERIESGO
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
 Alternativas: Citrato.
 Se puede hacer en saliva, previo envío de kit de recolección de saliva

Valores de referencia:

Código: TROMBO_PAN
Descripción: Panel de trombofilias: FII, FV Leiden, MTHFR y FXII
Técnica: Estudio de genotipado con sondas TaqMan mediante PCR en tiempo real (Real-Time PCR)
 Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
 Alternativas: Heparina o Citrato.
Comentario adicional: El tiempo estimado para cada prueba se contará desde el día de entrada de la muestra en el laboratorio central (días laborables).
 Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	FACIIMUT	24475-6		Trombofilia: mutación G20210A gen F2 Factor II		
Prueba	FACV_LEI	91712-0		Trombofilia: mutación G1691A (R506Q) gen F5 Factor V Leiden		
Prueba	MTHFRMUT			Trombofilia: mutaciones C677T y A1298C gen MTHFR		

Componentes					
Prueba	FACXIIMUT	58937-4		Trombofilia: mutación C46T gen F12 Factor XII	

Código: TROMBO_PAN

Descripción: Panel de trombofilias: FII, FV Leiden, MTHFR y FXII

Técnica: Estudio de genotipado con sondas TaqMan mediante PCR en tiempo real (Real-Time PCR)
Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Comentario adicional: **Alternativas: Heparina o Citrato.**
El tiempo estimado para cada prueba se contará desde el día de entrada de la muestra en el laboratorio central (días laborables).
Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.

Componentes					
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades
Prueba	FACIIMUT	24475-6		Trombofilia: mutación G20210A gen F2 Factor II	
Prueba	FACV_LEI	91712-0		Trombofilia: mutación G1691A (R506Q) gen F5 Factor V Leiden	
Prueba	MTHFRMUT			Trombofilia: mutaciones C677T y A1298C gen MTHFR	
Prueba	FACXIIMUT	58937-4		Trombofilia: mutación C46T gen F12 Factor XII	

Descripción: Panel diagnóstico terapia y pronóstico (DNA y RNA 53 fus)

Código: TSO500

Técnica:

Unidades:

Plazo: 15 días

Tubo: Muestra Anatomía Patológica

Comentario adicional: Muestras: tejido parafinado
Laboratorio Oncogenética

Valores de referencia:

Descripción: PANEL FILM ARRAY ARTICULAR

Código: FILMARTIC

Técnica:

Unidades:

Plazo: 3 días

Tubo: Líquidos Biológicos

Comentario adicional:

Valores de referencia:

Descripción: PANEL FILM ARRAY GASTROINTESTINAL PCR PARASITOS VIRUS Y BACT

Código: FILMGASTRO

Técnica: FILM ARRAY (PCR)

Unidades:

Plazo: 3 días

Tubo: Tubo Especial

Comentario adicional: Muestras recogidas en Fecal Swab (media Cary Blair). Solicitar dicho medio al laboratorio CENTRAL o en el lab de Nuestra señora del Rosario.
649275087

Valores de referencia:

Descripción: PANEL FILM ARRAY MENINGITIS
Código: FILMMENIN
Técnica:
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: PANEL FILM ARRAY RESPIRATORIO
Código: FILMRESP
Técnica:
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: PANEL FILM ARRAY SEPSIS
Código: FILMSEPSIS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Panel fusiones completo
Código: TSORNAPAN
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Muestras:tejido incluido en parafina.
Laboratorio Oncogenética
Valores de referencia:

Descripción: PANEL FUSIONES genes de fusión oncología mediante NGS
Código: NGS_FUSION
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: para sólido:Bloque parafina. Tª ambiente
para sangre: 2 tubos de EDTA rotulados con ONCO y refrigerados
Valores de referencia:

Descripción: Panel germinal NGS <10 genes
Código: NGSINF10
Técnica:

Descripción: Panel germinal NGS <10 genes
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: CONSULTAR SIEMPRE ANTES A ASESORÍA GENÉTICA

Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Alternativas: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Panel germinal NGS >10 genes
Código: NGSSUP10
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: CONSULTAR SIEMPRE ANTES A ASESORÍA GENÉTICA

Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Alternativas: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Panel global de cardiopatías
Código: PHARMALAP5
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.

Imprescindible enviar la historia clínica y formulario de petición de genética o consentimiento informado

Valores de referencia:

Descripción: PANEL HOMOLOGUS RECOMBINATION (HRD)
Código: PANEL_HRD
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Comentario tipo tubo: Muestras: tejido tumoral incluido en parafina temperatura ambiente.

Valores de referencia:

Descripción: PANEL LINFOIDE: mut somaticas mediante NGS
Código: NGS_LINFOI
Técnica:
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO.
Alternativas: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: PANEL MIELOIDE: mut somaticas mediante NGS
Código: NGS_MIELOI
Técnica:
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO,.
IMPORTANTE: MUESTRA REFRIGERADA
Alternativas: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: PANEL ONCOHEMATOLÓGICO (LINFOMAS Y MIELOMAS) · PANEL · NGS
Código: NGS_ONCOHE
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO.
IMPORTANTE: MUESTRA REFRIGERADA

Valores de referencia:

Descripción: Panel oncología terapia pronóstico y fusiones mediante NGS
Código: TRAPRO_FUS
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Bloque parafina. Tª ambiente
Valores de referencia:

Código: TERA_FUS
Descripción: Panel oncología terapia y fusiones mediante NGS
Técnica: NGS
Comentario adicional: Bloque parafina. Tª ambiente

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	TUMOR_MUT			BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS BÁSICO · PANEL · NGS		

Descripción: Panel oncológico terapia y pronóstico completo
Código: TSODNA
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Muestras:tejido incluido en parafina.
Laboratorio Oncogenética

Valores de referencia:

Descripción: PANEL SOMÁTICO CÁNCER COLORRECTAL AMPLIADO
Código: NGS_COL1S
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Muestra: tejido tumoral incluido en parafina. Temperatura ambiente
Valores de referencia:

Descripción: PANEL SOMÁTICO CÁNCER COLORRECTAL BÁSICO
Código: PANELCOLON
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Muestra: tejido tumoral incluido en parafina. Temperatura ambiente
Valores de referencia:

Descripción: PANEL SOMÁTICO CÁNCER COLORRECTAL COMPLETO
Código: NGS_COL2S
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Muestra: tejido tumoral incluido en parafina. Temperatura ambiente
Valores de referencia:

Descripción: PANEL SOMÁTICO CÁNCER DE MAMA AMPLIADO
Código: NGS_MAMA2
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Muestra: tejido tumoral incluido en parafina. Temperatura ambiente
Valores de referencia:

Descripción: PANEL SOMÁTICO CÁNCER DE MAMA Y OVARIO
Código: BRCA_SOMAT
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Muestra: tejido tumoral incluido en parafina. Temperatura ambiente
Valores de referencia:

Descripción: PANEL SOMÁTICO CÁNCER DE PULMÓN BÁSICO
Código: PANELPULMO
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 15 días

Descripción: PANEL SOMÁTICO CÁNCER DE PULMÓN BÁSICO
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Muestra: tejido tumoral incluido en parafina. Temperatura ambiente
Valores de referencia:

Descripción: PANEL SOMÁTICO CÁNCER DE PULMÓN COMPLETO
Código: NGS_PULM2S
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Muestra: tejido tumoral incluido en parafina. Temperatura ambiente
Valores de referencia:

Código: PGLIMUTS
Descripción: PANEL SOMÁTICO GLIOMA BÁSICO
Técnica:
Comentario adicional: Muestra: tejido tumoral incluido en parafina. Temperatura ambiente

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	MGMT			BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · MGMT(METILACION PROMOTOR)		
Prueba	IDH1_IDH2			NEOPLASIAS MIELOIDES · IDH1(R132H), IDH2(R172W, R140Q)		
Prueba	MDFISHSRD			FISH ganacia gen SRD (región: 1p36, región control: Cen1)		
Prueba	MDFISH19Q			Alteraciones de la región 19q13. Reord/Amplificación		

Descripción: PANEL SOMÁTICO GLIOMA BÁSICO
Código: GLI1_MUTS
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Muestra: tejido tumoral incluido en parafina. Temperatura ambiente
Valores de referencia:

Descripción: PANEL SOMÁTICO GLIOMA COMPLETO
Código: NGS_SNC2
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Muestra: tejido tumoral incluido en parafina. Temperatura ambiente
Valores de referencia:

Descripción: PANEL SOMÁTICO HEPATOBILIAR (COLANGIOCARCINOMAS) AMPLIADO
Código: NGS_HIGS2
Técnica: NGS

Descripción: PANEL SOMÁTICO HEPATOBILIAR (COLANGIOCARCINOMAS) AMPLIADO
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Comentario tipo tubo: Muestras: tejido tumoral incluido en parafina temperatura ambiente.
Valores de referencia:

Descripción: PANEL SOMÁTICO HEPATOBILIAR (COLANGIOCARCINOMAS) BÁSICO
Código: NGS_HIGS
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Comentario tipo tubo: Muestras: tejido tumoral incluido en parafina temperatura ambiente.
Valores de referencia:

Descripción: PANEL SOMÁTICO PRÓSTATA, VEJIGA, UROTELIAL BÁSICO
Código: NGS_PROS
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Muestras: tejido tumoral incluido en parafina temperatura ambiente.
Valores de referencia:

Descripción: PANEL SOMÁTICO TIROIDES COMPLETO
Código: NGS_TIROI2
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Comentario tipo tubo: Muestras: tejido tumoral incluido en parafina temperatura ambiente
Valores de referencia:

Descripción: PANEL TERAPIA Y PRONOSTICO. Mutaciones somáticas por NGS
Código: TRAT_PRON
Técnica:
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Bloque parafina. Tª ambiente
Valores de referencia:

Descripción: Panel triple negativo cáncer mama
Código: TRIPLENEG
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Descripción: Panel triple negativo cáncer mama

Valores de referencia:

Descripción: PAPERAS AC. IGG SUERO

Código: PAPERASACG

Técnica: CLIA

Unidades: UI/mL

Plazo: 3 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 1 mL Suero. Las pruebas realizadas confirman que es posible utilizar EDTA potásico y heparina sódica como anticoagulantes

Valores de referencia: (Sup. 11) Positivo

Descripción: PAPERAS AC. IGM SUERO

Código: PAPERASACM

Técnica: Técnica EIA

Unidades:

Plazo: 3 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional:

Valores de referencia: (0.9 - 1.1) Indeterminado
(Inf. 0.9) Negativo

Descripción: PAPERAS IGG EN LCR

Código: PAPERASGLC

Técnica: Enzimoinmunoanálisis

Unidades:

Plazo: 6 días

Tubo: Líquidos Biológicos

Comentario adicional: 1 mL LCR.

Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo
(Sup. 1) Positivo

Descripción: PAPERAS IGM EN LCR

Código: PAPERASMLC

Técnica: Téc. Enzimoinmunoanálisis

Unidades:

Plazo: 6 días

Tubo: Líquidos Biológicos

Comentario adicional: 1 mL LCR

Valores de referencia: (Inf. 1.0) Negativo

Descripción: PAPILOMAVIRUS ANTICUERPOS IGG SUERO

Código: PAPILOIGG

Técnica: ENZIMOINMUNOANÁLISIS

Unidades:

Plazo: 6 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 1 mL.

Valores de referencia: (Sup. 1) ó =1 Positivo
(Inf. 1) Negativo

Descripción: Paquioniquia congénita. Panel NGS
Código: GEN_000607
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: PARACETAMOL EN SUERO
Código: PARACETA
Técnica: EIA
Unidades: µg/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (10 - 25) ..Nivel terapéutico
(Sup. 200) ..Toxicidad-pico máximo-(a las 4 h.de la toma)
(Sup. 50) ..Nivel tóxico a las 12 h.
(Inf. 120) ..Niveles tolerables a las 4 h. post-ingestión

Descripción: PARAINFLUENZA 1-3 IGA ANTICUERPOS
Código: PARAINFLUA
Técnica: EIA
Unidades: Índice
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero
Alt: plasma (citrato, heparina)
Valores de referencia: (Inf. 9) Negativo
(9 - 11) Indeterminado

Descripción: PARAINFLUENZA 1-3 IGG ANTICUERPOS
Código: PARAINFLUG
Técnica: EIA
Unidades: Índice
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero
Alt (heparina, citrato)
Valores de referencia: (Inf. 9) Negativo
(9 - 11) Indeterminado

Descripción: Parálisis periódica hipercalémica 1. Sec Gen: SCN4A
Código: GEN_000608
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Descripción: Parálisis periódica hipercalémica 1. Sec Gen: SCN4A

Valores de referencia:

Descripción: Parálisis periódica hipocal.: genes CACNA1S y SCN4A (NGS)

Código: PARHIPOCAL

Técnica: NGS Illumina

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Parálisis periódica hipocalémica 1 y 2. Panel NGS

Código: GEN_000609

Técnica:

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Paramiotonía congénita. Sec Gen: SCN4A

Código: GEN_000610

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: PARA-NITROFENOL EN ORINA

Código: PNITFEN

Técnica: Cromatografía de Gases / Espectrometría Masas.

Unidades: mg/g creatin.

Plazo: 11 días

Tubo: Orina Final de Jornada

Comentario adicional: Orina final de jornada
Volumen 1.0 mL

Valores de referencia: (Inf. 0.50) Fin de la jornada laboral (Exposición a Paratión)
(VLB-INSST)
(Inf. 5.00) Fin de la semana laboral (Exposición a Nitrobenceno)
(VLB-INSST)

Descripción: Paraparesia espástica hereditaria panel de genes

Código: PHARMALAP8

Técnica: NGS

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Paraparesia espástica hereditaria panel de genes
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
 Imprescindible enviar la historia clínica y formulario de petición de genética o consentimiento informado

Valores de referencia:

Descripción: Paraplejia espástica 11 (SPG11): gen SPG11 (NGS)
Código: SPG11_MUTS
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Paraplejia espástica 2 (SPG2): gen PLP1 (NGS)
Código: SPG2_MUTS
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Paraplejia espástica 30 (SPG30): gen KIF1A (NGS)
Código: SPG30
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 40 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Paraplejia espástica 31 (SPG31): gen REEP1 (NGS)
Código: REEP1_MUTS
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Paraplejia espástica 3A (SPG3A): gen SPG3A (NGS)
Código: SPG3A_MUTS
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días

Descripción: Paraplejía espástica 3A (SPG3A): gen SPG3A (NGS)
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Paraplejía espástica 4 (SPG4): gen SPAST (NGS)
Código: SPG4_MUTS
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Paraplejía espástica 6 (SPG6): gen NIPA1 (NGS)
Código: SPG6_MUTS
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Paraplejía espástica 7 (SPG7): gen SPG7 (NGS)
Código: SPG7_MUTS
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Paraplejía espástica hereditaria. Panel NGS
Código: GEN_000611
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Paraplejía espástica ligada al X 1. Sd. Masa y Crash. L1CAM
Código: GEN_000612
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Paraplejía espástica ligada al X 1. Sd. Masa y Crash. L1CAM

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Paraplejía espástica ligada al X tip 2. Sec Gen: PLP1

Código: GEN_000613

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Paraplejía espástica: >10 genes (NGS)

Código: SPG_TOTAL

Técnica: NGS con TSO de Illumina y MLPA para algunos genes

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Muestras de tejido tumoral y sangre.
Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: PARASITOS HECES

Código: PARAS

Técnica: Microscopia optica

Unidades:

Plazo: 3 días

Tubo: Heces Microbiología

Comentario adicional: Muestra de heces (preferentemente de 3 días consecutivos) recogida en recipiente estéril adecuado

Valores de referencia:

Código: VPHP

Descripción: PARASITOS Y VIRUS EN HECES POR PCR

Técnica:

Comentario adicional: Heces recogidas en Kit específico: FECAL DNA/RNA SHIELD R1101-E. Código: 600063505. Solicitar al Almacén.
Conservar a temperatura ambiente.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	PCNOGI	54905-5		Perfil VPHP PCR NOROVIRUS GI		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	PCNGII	54906-3		Perfil VPHP PCR NOROVIRUS GII		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	PCROTA	92693-1		Perfil VPHP PCR ROTAVIRUS A		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	PCADNV	92690-7		Perfil VPHP PCR ADENOVIRUS 40+41		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	PCASTR	92691-5		Perfil VPHP PCR ASTROVIRUS		Valor de referencia: No se detecta

Componentes						
Prueba	PCSAPO	92694-9		Perfil VPHP PCR SAPOVIRUS		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	PCGILA			perfil PCR GLIARDIA LAMBLIA HECES		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	PCENHI			perfil PCR ENTAMOEBA HISTOLYTICA HECES		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	PCCRYT			perfil PCR Cryptosporidium spp. HECES		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	PCBLAST			perfil PCR BLASTOCYSTIS HOMINIS HECES		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	PCDIFR			perfil PCR DIENTAMOEBA FRAGILIS HECES		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	PCCYCA			perfil PCR CICLOSPORA CAYETANENSIS HECES		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	PCASC			perfil PCR ASCARIS SPP HECES		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	PCTAE			perfil PCR TAENIA SPP HECES		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	PCEEN			perfil PCR ENTEROCYTOZON SPP/ENCEPHALITIZON SPP HECES		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	PCEV			perfil PCR ENTEROBIUS VERMICULARIS HECES		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	PCSTR			perfil STRONGILOIDES SPP HECES		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	PCTT			perfil PCR TRICHURIS TRICHIURA HECES		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	PCNAM			perfil PCR NECATOR AMERICANUSHECES		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	PCANC			perfil PCR ANCYLOSTOMA SPP HECES		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	PCHYM			perfil PCR HYMENOLEPIS SPP HECES		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	VPHP_S			PARASITOS Y VIRUS EN HECES POR PCR		

Descripción: PARATHORMONA INTACTA

Código: PTHINTAC

Técnica:

Unidades: pg/mL

Plazo: 3 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: Congelar si no se envía en el día.
Alternativo, plasma de EDTA.

Valores de referencia: (18.32 - 87.71) Adultos

Descripción: Parechovirus, determinación cualitativa
Código: PARECHOVIR
Técnica:
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Biología Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Valores de referencia:

Descripción: Parkinson, enfermedad de. Panel NGS
Código: GEN_000615
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Biología Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: PAROXETINA
Código: PAROXETINA
Técnica: Cromatografía líquida/Espectrometría de masas tandem (LC-MS/MS)
Unidades: µg/L
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 ml tubo de suero SIN gel separador
Volumen mínimo: 0.1 mL
Alternativa: Muestra de EDTA

El contenedor recomendado es el tubo seco (sin gel separador) para evitar procesos de adsorción del fármaco. En caso de no disponer de tubo seco, la extracción se puede realizar en tubo con gel separador, separando el suero dentro de las 2 horas poste

Valores de referencia: (20 - 65) Intervalo terapéutico
(Inf. 5) Límite de cuantificación
(Sup. 120) Toxicidad

Descripción: PARVOVIRUS AC. Ig G EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
Código: PARVOACIGG
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 0.5 ml de LCR
Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo
(Sup. 1) Positivo

Descripción: PARVOVIRUS AC. Ig M EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
Código: PARVOACIGM
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:

Descripción: PARVOVIRUS AC. Ig M EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo
 (Sup. 1) Positivo

Descripción: PARVOVIRUS B19 AC. IGG SUERO
Código: PARVB19ACG
Técnica: Técnica CLIA (Hasta fecha 15/11/2011 Técnica ELISA)
Unidades: UI/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero. Alternativa: plasma (EDTA, citrato y heparina)
Valores de referencia: (Inf. 2) Negativo
 (2.01 - 2.49) Indeterminado
 (Sup. 2.50) Positivo

Descripción: PARVOVIRUS B19 AC. IGM SUERO
Código: PARVB19ACM
Técnica: Técnica CLIA (Hasta 15/11/2011 Técnica EIA)
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero. Alternativa: plasma (citrato, plasma, heparina)
Valores de referencia: (Inf. 0.9) Negativo
 (0.9 - 1.1) Indeterminado
 (Sup. 1.1) Positivo

Descripción: Parvovirus B19 DNA PCR Cualitativa
Código: PARVOIDNA
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional: 2ml Lavado broncoalveolar-CONGELAR
 2ml LCR-CONGELAR
 2 ml Médula ósea-REFRIGERAR
 2 ml Plasma de EDTA-CONGELAR
 2ml Sangre total EDTA-REFRIGERAR
Valores de referencia:

Descripción: Paternidad Prenatal no invasiva
Código: PATERPREN
Técnica:
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional: sangre materna e hisopo bucal presunto padre. Kit especial. Pedir a Asesoría genética.
Valores de referencia:

Descripción: Patología esquelética hereditaria. Panel NGS
Código: GEN_000616
Técnica:
Unidades:

Descripción:	Patología esquelética hereditaria. Panel NGS
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Patología muscular hereditaria. Panel NGS
Código:	GEN_000617
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Patología renal quística hereditaria del adulto. Panel NGS
Código:	GEN_000618
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Patologías de la Retina. Panel
Código:	GEN_000619
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Patologías del espectro branquio-oto-renal. Panel NGS
Código:	GEN_000620
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Patologías del tejido conectivo. Panel NGS
Código:	GEN_000621
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción: PCA-2 (CITOPLASMA DE CELULAS DE PURKINJE TIPO 2 AC.SUERO
Código: PCA2
Técnica: Inmunofluorescencia Indirecta
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero
Valores de referencia: Negativo <1:60

Descripción: P-CLOROBENCENO ORINA(EXPOSICION A)
Código: P.CLOROFEN
Técnica: Técnica HPLC
Unidades: mg/g creatin.
Plazo: 23 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 10 ml orina aislada al final de la semana laboral
Valores de referencia: (Inf. 20.0) Final Jornada laboral en personas expuestas a CLOROBENCENO. (Valor límite biológico -BEI-ACGIH)

Descripción: PCNA (PROLIFERATING CELL NUCLEAR ANTIGEN) AC.
Código: AC.PCNA
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL
Valores de referencia: Negativo

Descripción: PCR - Ultrasensible
Código: PCRULTRA
Técnica: Inmunoquímica
Unidades: mg/L
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL suero o plasma heparina
Valores de referencia: (Inf. 1) Riesgo cardiovascular bajo
(1 - 3) Riesgo cardiovascular moderado
(Sup. 3) Riesgo cardiovascular alto

Descripción: PCR EN RESTOS ABORTIVOS
Código: PCRABORT
Técnica:
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Muestra Citogenética
Comentario adicional: Muestra en medio de cultivo. Refrigerada.
Contactar con genetica@megalab.es para envío de medio
Valores de referencia:

Descripción: PDF aliento SIBO / Intolerancia
Código: PDF_ALIENT
Técnica:
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Test Aliento
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: PDGFR AC.SUERO
Código: PDGFR
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: Negativo

Descripción: Pendred, Sd. Panel NGS
Código: GEN_000622
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Pepsinogeno I en suero
Código: PEPSINOG
Técnica: Técnica Enzimoinmunoanálisis
Unidades: ng/mL
Plazo: 13 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 ml suero
Valores de referencia: Volumen mínimo
0.57 mL
(25 - 200)

Descripción: PEPTIDO C EN ORINA
Código: PEPTIDCORI
Técnica: Inmunoluminiscencia
Unidades: mcg/24 h
Plazo: 3 días
Tubo: Orina 24 Horas
Comentario adicional: 10 ml orina 24. Indicar volumen 24 h. refrigerar.
Valores de referencia: (23.70 - 207.00)

Descripción: PEPTIDO C SUERO
Código: PEPTIC

Descripción: PEPTIDO C SUERO
Técnica: Téc. ICMA
Unidades: ng/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: suero o plasma heparina
Valores de referencia: (0.8 - 5.2)

Descripción: PEPTIDO CICLICO CITRULINADO AC. SUERO
Código: PEPCITRU
Técnica: Téc..ICMA
Unidades: U/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero/ Plasma Heparina/ Plasma EDTA tripotásico.
Valores de referencia: (Inf. 5) Negativo

Descripción: PEPTIDO INTESTINAL VASOACTIVO PLASMA (VIP)
Código: VIP
Técnica: Radioinmunoanálisis
Unidades: pmol/L
Plazo: 14 días
Tubo: Plasma trasylol/aprotinina
Comentario adicional: 1 mL plasma Aprotinina (Sangre total EDTA con Aprotinina)CONGELADO
 Alternativa: 1 mL plasma EDTA congelado
 Volumen mínimo: 0.5 mL
Valores de referencia: (7.30 - 25.4)

Descripción: Peptido Liberador de Pro-Gastrina (Pro-GRP) en suero
Código: GRP
Técnica: Técnica Quimioluminiscencia
Unidades: pg/mL
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 mL de SUERO. CONGELAR.
 Volumen: 400.0 uL
 Volumen mínimo: 200 uL
 Alternativa: PLASMA DE EDTA, PLASMA HEPARINA SÓDICA, PLASMA HEPARINA DE LITIO. CONGELAR.
Valores de referencia: (Inf. 36.7)

Descripción: PEPTIDO NATRIURETICO CEREBRAL PLASMA
Código: BNP
Técnica: CLIA
Unidades: pg/mL
Plazo: 6 días
Tubo: Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional: 1 mL plasma EDTA congelado

Descripción:	PEPTIDO NATRIURETICO CEREBRAL PLASMA
Valores de referencia:	(Inf. 100) En pacientes con sospecha de insuficiencia cardiaca (IC) aguda, valores de BNP inferiores a 100 pg/mL, proporcionan un alto valor predictivo negativo (VPN) para excluir la presencia de IC. Los valores de BNP superiores a 400 pg/mL presentan un alto valor predictivo positivo (VPP).
Descripción:	PÉPTIDO RELACIONADO CON EL GEN DE CALCITONINA (CRGP), PLASMA
Código:	CGRP
Técnica:	EIA
Unidades:	ng/mL
Plazo:	13 días
Tubo:	Plasma trasylol/aprotinina
Comentario adicional:	Plasma EDTA Aprotinina. Congelar.
Valores de referencia:	(Inf. 2.8)
Descripción:	PEPTIDOS DE GLUTEN EN HECES
Código:	GLUTHECES
Técnica:	EIA
Unidades:	µg GIP/gr
Plazo:	9 días
Tubo:	HECES CONGELADAS
Comentario adicional:	1 g heces. Congelar y enviar congelado. No es necesario estar en ayunas ni preparación especial. Evitar contacto con orina o agua durante la obtención de la muestra.
Valores de referencia:	(Inf. 0.16) Resultados positivos indican la presencia de péptidos del gluten, compatible con su ingesta
Descripción:	PERAMPANEL (FYCOMPA)
Código:	PERAMPANEL
Técnica:	Cromatografía Líquida -Tándem Masas
Unidades:	ng/mL
Plazo:	12 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	(180 - 980)
Descripción:	PERFIL 14 HIDROXI-TAMOXIFENO
Código:	OHTAMOXI
Técnica:	HPLC-Espectrometría de masas
Unidades:	µg/L
Plazo:	10 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(1.10 - 6.50)
Descripción:	PERFIL 17-CETOESTEROIDES (ETIOCOLANOLONA) ORINA24H
Código:	ETIOCOL2
Técnica:	
Unidades:	mg/24 h

Descripción: PERFIL 17-CETOESTEROIDES (ETIOCOLANOLONA) ORINA24H
Plazo: 11 días
Tubo:
Comentario adicional:
Valores de referencia: (2.50 - 5.00) Hombre
 (1.50 - 3.50) Mujer

Código: EPIDERMAC
Descripción: PERFIL ACS. EPIDERMIS (MEMBRANA BASAL Y SUBST. INTER.)
Técnica: Inmunofluorescencia indirecta
Comentario adicional: 1 ml suero

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	EPIDERAC	57737-9		PERFIL EPIDERMAC (ANTI MEMBRANA BASAL)	Titulo	Negativo <1:10
Prueba	SUBSINTER	57737-9		PERFIL EPIDERMAC (SUBSTANCIA INTERCELULAR)	Titulo	Negativo <1:10

Código: EPIDERMAC
Descripción: PERFIL ACS. EPIDERMIS (MEMBRANA BASAL Y SUBST. INTER.)
Técnica: Inmunofluorescencia indirecta
Comentario adicional: 1 ml suero

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	EPIDERAC	57737-9		PERFIL EPIDERMAC (ANTI MEMBRANA BASAL)	Titulo	Negativo <1:10
Prueba	SUBSINTER	57737-9		PERFIL EPIDERMAC (SUBSTANCIA INTERCELULAR)	Titulo	Negativo <1:10

Código: EPIDERMAC
Descripción: PERFIL ACS. EPIDERMIS (MEMBRANA BASAL Y SUBST. INTER.)
Técnica: Inmunofluorescencia indirecta
Comentario adicional: 1 ml suero

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	EPIDERAC	57737-9		PERFIL EPIDERMAC (ANTI MEMBRANA BASAL)	Titulo	Negativo <1:10
Prueba	SUBSINTER	57737-9		PERFIL EPIDERMAC (SUBSTANCIA INTERCELULAR)	Titulo	Negativo <1:10

Descripción: PERFIL AMPA 1/ AMPA 2 RECEPTORES ANTICUERPOS EN LCR
Código: AMPA1_2LCR
Técnica:

Descripción: PERFIL AMPA 1/ AMPA 2 RECEPTORES ANTICUERPOS EN LCR
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: LIQUIDO LCR INMUNO
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: PERFIL ANNA Ri AC. SUERO
Código: ACRI
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: Negativo

Descripción: PERFIL ANNA Yo AC. SUERO
Código: ACYO
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: Negativo

Descripción: PERFIL ANNA ZIC 4 AC. SUERO
Código: ZICAC
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: Negativo

Descripción: PERFIL ARABINOSA EN ORINA
Código: ARABINOSA
Técnica: Cromatografía de gases
Unidades: mg/g creatinina
Plazo: 23 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 15 mL primera orina de la mañana
Valores de referencia: (Inf. 25)

Descripción: PERFIL ARABITOL EN ORINA
Código: ARABITOL
Técnica: Cromatografía de gases
Unidades: mg/g creatin.
Plazo: 23 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 15 mL primera orina de la mañana

Descripción: PERFIL ARABITOL EN ORINA

Valores de referencia: (Inf. 50)

Descripción: PERFIL CASPR2 AC. ANTI RECEPTOR LCR

Código: CASPR2LCR

Técnica: Cell Binding Assay IFI

Unidades:

Plazo: 15 días

Tubo: LIQUIDO LCR INMUNO

Comentario adicional: 1 mL LCR.

Valores de referencia:

Código: CF_SMA

Descripción: Perfil CF delta508 + SMN1/2 Family Health

Técnica:

Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Comentario adicional: Alternativas: Heparina o Citrato

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	UNA_MUTACI			Análisis de 1 mutacion de cualquier gen (sec. Sanger)		
Prueba	SMN_PCR			Atrofia muscular espinal: deleciones en SMN1 y SMN2		

Código: CITOVAG

Descripción: PERFIL CITOLOGÍA VAGINAL

Técnica:

Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	NREGCIT			NREGCIT		
Prueba	ESTHORM			ESTHORM		
Prueba	CATCALIDAD			CATCALIDAD		
Prueba	ESTMICRO			ESTMICRO		
Prueba	ASPMORG			Aspecto Morfológico		
Prueba	RESDIAG			Resumen Diagnóstico		
Prueba	NOTACITO			Nota Citologia		
Prueba	SNOMEDC			SNOMED Citologías		
Prueba	PATO			PATÓLOGO		
Prueba	TDMVAGINAL			TIPO DE MUESTRA VAGINAL		
Prueba	CITOTECNIC			CITOTÉCNICO		

Código: MICROINMAV

Descripción: Perfil Citometria Microinmunoterapia Avanzado

Técnica:

Comentario adicional: 1 tubo de EDTA de 5ml

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	LINFOTOT	30364-4		LINFOCITOS TOTALES (POBLACIONES LINFOCITARIAS)	/μL	(1000 - 4500)
Prueba	CD3	8124-0		MARCADORES LINFOIDES (CD3)	%	
Prueba	CD3T	8122-4		LINFOCITOS CD3 TOTALES	/μL	
Prueba	CD4	8123-2		CD4 (T4)	%	(25 - 66) 2 años - 5 años (26 - 61) 5 años - 10 años (20 - 65) 10 años - 16 años (28 - 64) > 16 años
Prueba	CD4T	24467-3		CD4 (T4) TOTAL	/μL	(500 - 2700) 2 años - 5 años (400 - 2500) 5 años - 10 años (400 - 2100) 10 años - 16 años (500 - 2000) > 16 años
Prueba	CD8	8101-8		CD8 (T8)	%	(9 - 49) 2 años - 5 años (13 - 47) 5 años - 10 años (14 - 40) 10 años - 16 años (12 - 40) > 16 años
Prueba	CD8T	14135-8		CD8 (T8) TOTAL	/μL	(200 - 1800) 2 años - 5 años (200 - 1700) 5 años - 10 años (300 - 1300) 10 años - 16 años (200 - 1200) > 16 años
Prueba	CD8_CD57			Linfocitos Citotoxicos (CD8+CD57-)	%	(12 - 24) sobre población linfoide
Prueba	CD8_CD57T			Linfocitos Citotoxicos (CD8+CD57-) Totales	/μL	(256 - 777)
Prueba	CD8CD57			Linfocitos Supresores (CD8+CD57+)	%	(1.7 - 12) sobre población linfoide
Prueba	CD8CD57T			Linfocitos Supresores (CD8+CD57+) Totales	/μL	(60 - 447)
Prueba	COCCD857			Cociente Linfocitos Citotoxicos/Supresores		(1.00 - 4.00)
Prueba	COCIENTE	54218-3		COCIENTE T4/T8		
Prueba	CD3DR	18408-5		LINFOCITOS T ACTIVADOS	%	
Prueba	CD3DRT	26568-6		CD3DR TOTALES	/μL	
Prueba	CD19	8117-4		MARCADORES LINFOIDES CD19	%	
Prueba	CD19T	8116-6		LINFOCITOS CD19 TOTALES	/μL	
Prueba	CD19CD5			Linfocitos B1 (CD19+CD5+)	%	(0 - 2.5) sobre población linfoide

Componentes						
Prueba	CD19CD5T			Linfocitos B1 (CD19+CD5+) Totales	/μL	(0 - 60)
Prueba	CD3_5616	8112-5		CD3-CD56+CD16+	%	(4 - 16)
Prueba	CD3_5616T	9728-7		CD3-CD56+CD16+ TOTALES	/μL	
Prueba	CD4CD45RA	13336-3		LINFOCITOS T4 NAÏVE (CD4+/CD45RA+)	% sobre CD4	(33 - 66)
Prueba	CD4CD45RAT			LINFOCITOS T4 (CD4+/CD45RA+) TOTALES	/μL	(83 - 675)
Prueba	T4REGULADO			Perfil T4 Reguladores (CD4+CD25+CD127 low) %	%	(1 - 3) sobre población linfoide
Prueba	T4REGULATO			Perfil T4 Reguladores(CD4+CD25+CD127 low) TOTALES	cel/mm3	(25 - 74)
Prueba	CD4CD29			LINFOCITOS T HELPER (CD4 + CD29+)	%	
Prueba	CD4CD29T			LINFOCITOS T HELPER (CD4 + CD29+) TOTALES	/μL	
Prueba	CR4CDR			Coexpresión CD4+CDR+	%	(3 - 5) Mujer
Prueba	CD4CDRA			Linfocitos T4 activados (CD4+DR+)	/μL	(55 - 142) Mujer (55 - 142) Hombre
Prueba	CD8DR			CD8+DR+	% sobre CD8	
Prueba	CD8DRT			CD8+DR+ TOTALES	/μL	
Prueba	CD3CD56	17135-5		CD3+CD56+	%	(Inf. 13)

Código: CLOBAZAMN
Descripción: perfil CLOBAZAM + NORCLOBAZAM EN SUERO
Técnica:
Comentario adicional: 2 ML DE SUERO

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	CLOBAZAM	59632-0		PERFIL CLOBAZAM SUERO	ng/mL	(30 - 300) Rango terapéutico (AGNP 2017)
Prueba	NORCLOBAZA	35107-2		PERFIL NORCLOBAZAM SUERO	ng/mL	(300 - 3000) Rango terapéutico (AGNP 2017)

Código: CLOZAPINAS
Descripción: PERFIL CLOZAPINA Y DESMETILCLOZAPINA
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.

Componentes						
Prueba	CLOZAPINA	6896-5		PERFIL CLOZAPINA EN SUERO	µg/L	(350 - 600) I. Terapéutico
Prueba	DESCLOZAPI	10992-6		PERFIL DESMETILCLOZAPINA (o norclozapina)	µg/L	(100 - 300) (Inf. 24) Límite de cuantificación

Descripción: Perfil Confirmación de Cocaína en sangre por LC-MS/MS

Código: COCASAN

Técnica: LC-MS/MS

Unidades: ng/mL

Plazo: 7 días

Tubo: Tubo fluoruro

Comentario adicional: 10 mL Sangre total Oxalato/Fluoruro (1 x Tubo sangre EDTA) [Refrigerar]

Valores de referencia: (Inf. 1.3) Incertidumbre de medida
(Inf. 8) Límite de cuantificación

Código: COXACKAGL

Descripción: PERFIL COXSACKIE A AC. IgG EN LCR

Técnica: IFI

Comentario adicional: 1 mL LCR. Se recomienda efectuar análisis simultáneo de suero y LCR

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	COXACKA9GL	56621-6		PERFIL COXSACKIE A9 AC. IgG EN LCR		Positivo título>1:1
Prueba	COXACKA7GL	22219-0		PERFIL COXSACKIE A7 AC. IgG EN LCR		Positivo título>1:1
Prueba	COXACA16GL	22214-1		PERFIL COXSACKIE A16 AC. IgG EN LCR		Positivo título>1:1
Prueba	COXACA24GL			PERFIL COXSACKIE A24 AC. IgG EN LCR		Positivo título>1:1

Código: COXACKAG

Descripción: PERFIL COXSACKIE A AC. IgG EN SUERO

Técnica: Inmunofluorescencia indirecta

Comentario adicional: 1 mL suero. Refrigerado.

Volumen mínimo: 0.15 mL

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	COXACKIA9G	58792-3		PERFIL COXSACKIE A9 AC. IGG EN SUERO		Negativo título<1:100
Prueba	COXACKIA7G	59584-3		PERFIL COXSACKIE A7 AC. IGG EN SUERO		Negativo título<1:100
Prueba	COXACKA16G	59583-5		PERFIL COXSACKIE A16 AC. IGG EN SUERO		Negativo título<1:100

Componentes						
Prueba	COXACKA24G	59582-7		PERFIL COXSACKIE A24 AC. IGG EN SUERO		Negativo título<1:100

Código: COXACKAML

Descripción: PERFIL COXSACKIE A AC. IgM EN LCR

Técnica: IFI

Comentario adicional: 1 mL LCR.Se recomienda efectuar análisis simultáneo de suero y LCR

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	COXACKA9ML	5006649		PERFIL COXSACKIE A9 AC. IgM EN LCR		Positivo título>1:1
Prueba	COXACKA7ML	22219-0		PERFIL COXSACKIE A7 AC. IgM EN LCR		Positivo título>1:1
Prueba	COXACA16ML	22214-1		PERFIL COXSACKIE A16 AC. IgM EN LCR		Positivo título>1:1
Prueba	COXACA24ML			PERFIL COXSACKIE A24 AC. IgM EN LCR		Positivo título>1:1

Código: COXACKAM

Descripción: PERFIL COXSACKIE A AC. IgM EN SUERO

Técnica: Inmunofluorescencia indirecta.

Comentario adicional: 1 mL suero. refrigerar.
Volumen mínimo: 0.15 mL

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	COXACKIA9M	58791-5		PERFIL COXSACKIE A9 AC. IGM EN SUERO		Negativo título < 1:10
Prueba	COXACKIA7M	59581-9		PERFIL COXSACKIE A7 AC. IGM EN SUERO		Negativo título < 1:10
Prueba	COXACKA16M	59580-1		PERFIL COXSACKIE A16 AC. IGM EN SUERO		Negativo título < 1:10
Prueba	COXACKA24M	59579-3		PERFIL COXSACKIE A24 AC. IGM EN SUERO		Negativo título < 1:10

Código: DERMAELISA

Descripción: Perfil DERMA AC:BP180,BP230,DESMOGL,COLAG,ENVOPLAQ)

Técnica:

Comentario adicional: Suero
Alternativa: Plasma de EDTA, citrato, heparina

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	BP180	57738-7		ANTICUERPOS BP180 (BPAG2)	Ratio	(Inf. 1) Negativo

Componentes						
Prueba	BP230	5004450		BP230 (PENFIGOIDE BULLOSO) AC. SUERO	Ratio	(Inf. 1) Negativo
Prueba	DESMOGL1	57411-1		DESMOGLEINA-1 (Dsg-1) AC. SUERO	Ratio	(Inf. 1.00) Negativo
Prueba	DESMOGL3	57412-9		DESMOGLEINA-3 (Dsg-3) AC. SUERO	Ratio	(Inf. 1.00) Negativo
Prueba	ENVOPLAQ			ENVOPLAQUINA ANTICUERPOS SUERO	Ratio	(Inf. 1) Negativo
Prueba	COLAGTVII	94096-5		COLAGENO TIPO VII NC1 ANTICUERPOS SUERO	Ratio	(Inf. 1) Negativo

Código: DERMAELISA
Descripción: Perfil DERMA AC:BP180,BP230,DESMOGL,COLAG,ENVOPLAQ)
Técnica:
Comentario adicional: Suero
 Alternativa: Plasma de EDTA, citrato, heparina

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	BP180	57738-7		ANTICUERPOS BP180 (BPAG2)	Ratio	(Inf. 1) Negativo
Prueba	BP230	5004450		BP230 (PENFIGOIDE BULLOSO) AC. SUERO	Ratio	(Inf. 1) Negativo
Prueba	DESMOGL1	57411-1		DESMOGLEINA-1 (Dsg-1) AC. SUERO	Ratio	(Inf. 1.00) Negativo
Prueba	DESMOGL3	57412-9		DESMOGLEINA-3 (Dsg-3) AC. SUERO	Ratio	(Inf. 1.00) Negativo
Prueba	ENVOPLAQ			ENVOPLAQUINA ANTICUERPOS SUERO	Ratio	(Inf. 1) Negativo
Prueba	COLAGTVII	94096-5		COLAGENO TIPO VII NC1 ANTICUERPOS SUERO	Ratio	(Inf. 1) Negativo

Descripción: PERFIL DERMATÁN SULFATO
Código: DERMATAN
Técnica: Cromatografía líquida/Tándem masas (LC-MS/MS)
Unidades: mg/g creatinina
Plazo: 17 días
Tubo: Orina congelada
Comentario adicional: 10 mL orina. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.INDISPENSABLE enviar historia clínica
Valores de referencia: (Inf. 22) < 3 años
 (Inf. 18) 4 años - 13 años
 (Inf. 9) > 13 años

Descripción: PERFIL DIAZEPAM (DIAZEPAM)
Código: DIAZEPAM
Técnica: LC-MS/MS
Unidades: mcg/mL
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 3 mL de suero
Valores de referencia:

Descripción: PERFIL DPPX ANTICUERPOS LCR
Código: DPPXLCR
Técnica:
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Código: DIPCANONCO
Descripción: Perfil ensayo DIPCAN oncogenética
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
	NGSDIPCANS					
	NGSDIPCANF					

Código: PEADRENAL
Descripción: PERFIL ESTRES ADRENAL EN SALIVA CORTISOL /DEHA-S
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
 1 mL de Saliva por toma. Toma de muestras de 8h, 12h, 16h, y 24h en tubos especiales (salivette).

En la hora previa a la toma de la muestra: No tomar ningún alimento, bebida, medicamento, masticar chicle ni aplicar ningún producto en los labios.

Tampoco se lave los dientes ni utilice ningún colutorio para enjuagarse la boca.

Comentario adicional: INSTRUCCIONES:

-Destapar el tubo correspondiente (1, 2, 3 o 4) según la hora, y, con las manos limpias y la punta de los dedos, extraer la torunda el tubo.

-Introducir la torunda en la boca, mantenerla 2 minutos por debajo de la lengua, para que quede totalmente empapada de saliva. Deberá realizar ligeros movimientos de mandíbula espaciados en el tiempo, durante esos 2 minutos, para estimular la salivación.

-Volver a introducir la torunda (impregnada en saliva) en el tubo pequeño y taparlo correctamente.

Conservar refrigeradas todas las muestras hasta la entrega en el laboratorio.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	PEACORT8	58674-3		PERFIL ESTRES ADRENAL SALIVA CORTISOL 8H	ng/mL	(3.00 - 9.00)
Prueba	PEACORT12	58642-0		PERFIL ESTRES ADRENAL SALIVA CORTISOL 12H	ng/mL	(1.50 - 3.00)
Prueba	PEACORT16	58668-5		PERFIL ESTRES ADRENAL SALIVA CORTISOL 16H	ng/mL	(1.00 - 3.00)
Prueba	PEACORT24	58644-6		PERFIL ESTRES ADRENAL SALIVA CORTISOL 24H	ng/mL	(0.80 - 1.20)
Prueba	PEADEHAS12			PERFIL ESTRES ADRENAL SALIVA DEHA-S 12	ng/mL	(3.00 - 10.00)
Prueba	PEADEHAS16			PERFIL ESTRES ADRENAL SALIVA DEHA-S 16	ng/mL	(3.00 - 10.00)
Prueba	PEACP			PERFIL ESTRES ADRENAL SALI VALOR PROMEDIO CORTISOL (12H-16H)	ng/mL	

Componentes					
Prueba	PEADP			PERFIL ESTRES ADRENAL SALIVA VALOR PROMEDIO DHEA-S (12H-16H)	ng/mL
Prueba	PEAGRAFI			PERFIL ESTRES ADRENAL SALIVA GRAFICO	

Descripción: PERFIL GABA B AC. ANTI RECEPTOR LCR

Código: GABAACLCR

Técnica: Cell Binding Assay IFI

Unidades:

Plazo: 15 días

Tubo: LIQUIDO LCR INMUNO

Comentario adicional: 1 mL LCR.

Valores de referencia:

Descripción: PERFIL GD1B AC. IgG LCR (GANGLIOSIDO GD1B)

Código: GANGGD1B

Técnica: EIA

Unidades:

Plazo: 15 días

Tubo: LIQUIDO LCR INMUNO

Comentario adicional: 1 ml LCR
Se recomienda realizar analisis simultaneo en suero y LCR

Valores de referencia:

Descripción: PERFIL GENÉTICO RIESGO OSTEOPOROSIS

Código: OSTEOPGENE

Técnica:

Unidades:

Plazo: 15 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: 5 Ml de sangre EDTA
SE DERIVA A VIVOLABS

Valores de referencia:

Descripción: Perfil genómico tumoral ampliado (ADN + ARN)

Código: CGP_PANEL

Técnica: NGS

Unidades:

Plazo: 15 días

Tubo: Muestra Anatomía Patológica

Comentario adicional: Muestra: tejido tumoral incluido en parafina. Temperatura ambiente

Valores de referencia:

Descripción: PERFIL GQ1B AC. IgG LCR (GANGLIOSIDO GQ1B)

Código: GANGGQ1B

Técnica: EIA

Unidades:

Plazo: 15 días

Descripción: PERFIL GQ1B AC. IgG LCR (GANGLIOSIDO GQ1B)
Tubo: LIQUIDO LCR INMUNO
Comentario adicional: Se recomienda realizar análisis simultaneo en suero y LCR
Valores de referencia:

Descripción: PERFIL HEPARÁN SULFATO
Código: HEPARAN
Técnica: Cromatografía líquida/Tándem masas (LC-MS/MS)
Unidades: mg/g creatinina
Plazo: 17 días
Tubo: Orina congelada
Comentario adicional: 10 mL orina. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.INDISPENSABLE enviar historia clínica
Valores de referencia: (Inf. 10) < 3 años
 (Inf. 8) 4 años - 13 años
 (Inf. 5) > 13 años

Descripción: PERFIL LGI1 AC. LCR
Código: LGI1ACLCR
Técnica: Cell Binding Assay Inmunofluorescencia indirecta
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: LIQUIDO LCR INMUNO
Comentario adicional: 1 mL LCR.
Valores de referencia:

Código: TH1Y2_TH17
Descripción: PERFIL LINFOCITARIO Th1/Th2/Th17/Tfh, SANGRE TOTAL
Técnica: Citofluorimetría de flujo
Comentario adicional: 1 mL Sangre total (anticoagulante: EDTA)

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	LINF_TFH			Perfil Linf Tfh CXCR5+, % LT CD4+	% LT CD4+	(0.12 - 1.16) < 1 año (1.49 - 5.03) 1 año - 6 años (1.65 - 8.11) 6 años - 19 años (3.59 - 10.45) > 19 años
Prueba	LINF_TH1			Perfil Linf Th1 (CXCR3+CCR6-), % LT CD4+	% LT CD4+	(3 - 17) < 2 años (6 - 17) 2 años - 4 años (8 - 18) 4 años - 6 años (6 - 22) 6 años - 8 años (9 - 21) 8 años - 13 años (11 - 28) > 14 años
Prueba	LINF_TH2			Perfil Linf Th2 (CXCR3-CCR6-), %LT CD4+	% LT CD4+	(5 - 14) < 2 años (6 - 15) 2 años - 4 años (7 - 19) 4 años - 6 años (5 - 14) 6 años - 8 años (8 - 14) 8 años - 13 años (7 - 16) > 14 años
Prueba	LINF_TH17			Perfil Linf Th17 (CXCR3-CCR6+), % LT CD4+	% LT CD4+	(1 - 8) < 2 años (3 - 7) 2 años - 4 años (4 - 11) 4 años - 6 años (3 - 10) 6 años - 8 años (5 - 11) 8 años - 13 años (6 - 14) > 13 años

Componentes						
Prueba	LINF_TH1_7			Perfil Linf Th 1/17 (CXCR3+CCR6+), % LT CD4+	% LT CD4+	(1 - 6) < 2 años (2 - 7) 2 años - 4 años (3 - 10) 4 años - 8 años (4 - 14) 8 años - 13 años (7 - 19) > 13 años

Descripción: perfil LINFOCITOS T CD8 DE MEMORIA CENTRAL (CD45RO+ CCR7+)

Código: T8CM

Técnica:

Unidades: % sobre CD8

Plazo: 4 días

Tubo: Sangre EDTA

Comentario adicional:

Valores de referencia: (3 - 15) < 2 años
(2 - 13) 2 años - 4 años
(4 - 11) 4 años - 6 años
(2 - 12) 6 años - 8 años
(2 - 15) 8 años - 13 años
(3 - 12) > 13 años

Código: LYMECD57NK

Descripción: PERFIL LYME CITOMETRÍA (CD57+NK CÉLULAS)

Técnica: Citometría de flujo

Comentario adicional: 5 ml de EDTA. Envío inmediato

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	LINFOTOT	30364-4		LINFOCITOS TOTALES (POBLACIONES LINFOCITARIAS)	/μL	(1000 - 4500)
Prueba	LYMECD57	8134-9		PERFIL LYME CD57	%	(2 - 23)
Prueba	LYMECD57T	21017-9		PERFIL LYME CD57 TOTALES	/μL	(40 - 500)
Prueba	LYMECD3NO	73904-5		PERFIL LYME CD57 CD3- (NK CÉLULAS)	%	(2 - 60)
Prueba	LYMECD3NT	73902-9		PERFIL LYME CD57 CD3- (NK CÉLULAS)	/μL	(100 - 360)

Código: MFENIDRITA

Descripción: PERFIL METILFENIDATO Y ACIDO RITALINICO SUERO

Técnica: Cromatografía líquida de alta eficacia-Espectrometría de masas

Comentario adicional: 1 mL suero/ alternativa 1 mL plasma Heparina litio. Refrigerar

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	MFENIDATO	3807-5		PERFIL METILFENIDATO EN SUERO	μg/L	(13.00 - 22.00)
Prueba	RITALINICO			PERFIL A• CIDO RITALI• NICO EN SUE	μg/L	(10 - 260)

Código: MFENITRIT2

Descripción: PERFIL METILFENIDATO Y ACIDO RITANILICO EN ORINA

Código: MFENITRIT2
Técnica: Cromatografía de gases -Espectrometría de masas
Comentario adicional: 5 ML DE ORINA REFRIGERADA

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	MFENIDATO2	3809-1		PERFIL METILFENIDATO EN ORINA	ng/mL	(Inf. 1.00)
Prueba	RITANILIC2			PERFIL ACIDO RITALINICO EN ORINA	ng/mL	(Inf. 100)

Descripción: PERFIL N-DESMETIL-TAMOXIFENO

Código: NDESMETILT

Técnica: HPLC-Espectrometría de masas

Unidades: µg/L

Plazo: 10 días

Tubo: Suero Congelado

Comentario adicional:

Valores de referencia: (120 - 240)

Código: NKVERDADE

Descripción: PERFIL NK VERDADEROS CITOMETRIA

Técnica: Citometría de flujo

Comentario adicional: 5 ML DE EDTA ENVIO INMEDIATO

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Perfil	NKT			CELULAS NKT (CELULAS LGL/T) SUBPOBLACIONES		
Prueba	CD56DIM94			CD56 POSITIVAS DIM CD94 POSITIVAS	%	(40 - 75) Porcentaje respecto a NK CD56+
Prueba	CD56BRCD94			CD56 POSITIVO BRIGHT CD94 POSITIVO		(90 - 100) Porcentaje respecto a NK CD56+

Descripción: PERFIL NMDA AC. ANTI RECEPTOR LCR

Código: NMDAACLRCR

Técnica: Inmunocitoquímica (Cell Based Assay).

Unidades:

Plazo: 15 días

Tubo: LIQUIDO LCR INMUNO

Comentario adicional: 1 mL LCR.

Valores de referencia:

Descripción: Perfil ORGANICO2: ACIDO METILMALONICO

Código: METILMALON

Técnica:

Unidades: mmol/mol crea

Plazo: 8 días

Descripción: Perfil ORGANICO2: ACIDO METILMALONICO
Tubo: Orina basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf . 2)

Código: PANELANCA
Descripción: PERFIL PANEL ANCA
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	ANCAPR3	69957-9		Perfil PANEL ANCA, Ac IgG anti-PR3	Ratio	(Inf . 1.0)
Prueba	ANCAMPO	81787-4		Perfil PANEL ANCA, Ac IgG MPO	Ratio	(Inf . 1.0)
Prueba	ANTIBPI	33573-7		Perfil PANEL ANCA, Ac. IgG anti-BPI	Ratio	(Inf . 1.0)
Prueba	ANCACATEP			Perfil PANEL ANCA, Ac IgG anticatapsina-G	Ratio	(Inf . 1.0)
Prueba	ANCAELASTA	85086-7		Perfil PANEL ANCA, Ac IgG antielastasa	Ratio	(Inf . 1.0)
Prueba	ANCALACTOF			Perfil PANEL ANCA,Ac IgG antilactoferrina	Ratio	(Inf . 1.0)
Prueba	ANCALISOZI			Perfil PANEL ANCA, Ac IgG antilisozima	Ratio	(Inf . 1.0)

Código: POOLNACOV
Descripción: Perfil Pool Nasal Coronavirus SARS COV 2 RT PCR
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	POOLNASCOV			Pool Nasal Coronavirus SARS 2 RT-PCR		
Prueba	COVNASRES			RESULTADO SARS-COV2 RT-PCR NASAL		
Prueba	COV_CT			Resultado interno COVID Ct		
Prueba	COENVIO			ENVIO COVID LAB EXTERNO		

Código: POOLSACOV
Descripción: Perfil Pool Saliva Coronavirus SARS COV 2 RT PCR
Técnica:
Comentario adicional: Muestra saliva (solicitar al almacén Valderribas)

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	POOLSALCOV			Pool Saliva Coronavirus SARS 2 RT-PCR		
Prueba	COVSALRES			RESULTADO SARS-COV2 RT-PCR SALIVA		
Prueba	COV_CT			Resultado interno COVID Ct		
Prueba	COENVIO			ENVIO COVID LAB EXTERNO		

Código: PORCENTUMO
Descripción: Perfil porcentaje tumoral
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
	ADN_TUMOR					
Prueba	ENRIQ_MUES			Enriquecimiento de la muestra		

Descripción: PERFIL QUERATÁN SULFATO
Código: QUERATAN
Técnica: Cromatografía líquida/Tándem masas (LC-MS/MS)
Unidades: mg/g creatinina
Plazo: 17 días
Tubo:
Comentario adicional: 10 mL orina. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.INDISPENSABLE enviar historia clínica
Valores de referencia: (Inf. 20) < 3 años
 (Inf. 10) 4 años - 13 años
 (Inf. 5) > 13 años

Código: BAMILOPLA
Descripción: PERFIL RATIO BETA AMILOIDE 1-42/1-40 EN PLASMA
Técnica:
Comentario adicional: 1 mL plasma (EDTA)en tubo de polipropileno (pedir a Almacen). CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	BETAAMIL42	70073-2		perfil BETA AMILOIDE 1-42 EN PLASMA	pg/mL	
Prueba	BETAAMIL40	33200-7		perfil BETA AMILOIDE 1-40 EN PLASMA	pg/mL	
Prueba	RATIOAMILP			perfil RATIO BETA AMILOIDE 1-42/1-40 EN PLASMA		

Código: T3UP
Descripción: PERFIL T3 CAPTACION+INDICE TBC
Técnica: Quimioluminiscencia
Comentario adicional: 1mL suero CON gel separador.
 Volumen mínimo: 0.2mL

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	ITBC	74795-6		PERFIL T3UP: INDICE TBC (THYROID BINDING CAPACITY)	Índice	(0.87 - 1.13) TBC (Thyroid Binding Capacity)
Prueba	T3U	3055-1		PERFIL T3UP: T3 CAPTACION SUERO	%	(24 - 35) %T3 Captación

Código: LINFT4R
Descripción: Perfil T4 REGULADORES CD4+CD25+CD127 low
Técnica:
Comentario adicional: 1 tubo de EDTA de 5ml

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	T4REGULADO			Perfil T4 Reguladores (CD4+CD25+CD127 low) %	%	(1 - 3) sobre población linfoide
Prueba	T4REGULATO			Perfil T4 Reguladores(CD4+CD25+CD127 low) TOTALES	cel/mm3	(25 - 74)

Descripción: Perfil T4 Reguladores(CD4+CD25+CD127 low) TOTALES
Código: T4REGULATO
Técnica:
Unidades: cel/mm3
Plazo: 7 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:
Valores de referencia: (25 - 74)

Código: METABTAMOX
Descripción: PERFIL TAMOXIFENO Y METABOLITOS
Técnica: HPLC-Espectrometría de masas
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	TAMOXI			PERFIL TAMOXIFENO	µg/L	(100 - 200)
Prueba	OHTAMOXI			PERFIL 14 HIDROXI-TAMOXIFENO	µg/L	(1.10 - 6.50)
Prueba	NDESMETILT			PERFIL N-DESMETIL-TAMOXIFENO	µg/L	(120 - 240)
Prueba	ENDOXIFENO			PERFIL ENDOXIFENO	µg/L	(5.10 - 12.4)
Prueba	RATOTAMOX			PERFIL RATIO N-DESMETIL-TAMOXIFENO/ENDOXIFENO		(Inf. 50)

Código: H2FRUCTOS
Descripción: PERFIL Test de Aire Espirado: Intolerancia a la FRUCTOSA
Técnica: uGC TCD (Thermal Conductivity Detector)
referencia C0802181 o C0802079 (tubo de tapón verde para la muestra basal preferiblemente) y referencia C0802092 ó C0802012(para el resto de los puntos de la curva preferiblemente)
Comentario adicional: Esta prueba está contraindicada si existe intolerancia hereditaria a la fructosa o fructosemia (en estos casos puede ser potencialmente mortal).
Consentimiento informado debe guardarlo centro donde se hace test aire espirado o donde cliente coge kit para autotoma (en caso de que lo deje en otro centro diferente, este centro deberá guardarlo).

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	H2FRUCTOSA			Test de Aire Espirado: Intolerancia a la FRUCTOSA		

Componentes					
Perfil	H2CH4CO2			Gases test aliento espirado	
Prueba	RESULINTOL			RESULTADO INTOLERANCIA	

Código: H2LACTOS

Descripción: PERFIL Test de aire espirado: Intolerancia a la LACTOSA

Técnica: uGC TCD (Thermal Conductivity Detector)
referencia C0002101 o C0002079 (tubo de tapón verde para la muestra basal preferiblemente) y referencia C0002092 ó C0002012(para el resto de los puntos de la curva preferiblemente).

Comentario adicional: consentimiento informado debe guardarlo centro donde se hace test aire espirado o donde cliente coge kit para autotoma (en caso de que lo deje en otro centro diferente, este centro deberá guardarlo).

Componentes					
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	V. ref.
Prueba	H2LACTOSA			Test de Aire Espirado: Intolerancia a la LACTOSA	
Perfil	H2CH4CO2			Gases test aliento espirado	
Prueba	RESULINTOL			RESULTADO INTOLERANCIA	

Código: H2SACAROS

Descripción: PERFIL Test de aire espirado: Intolerancia a SACAROSA

Técnica: uGC TCD (Thermal Conductivity Detector)
referencia C0002101 o C0002079 (tubo de tapón verde para la muestra basal preferiblemente) y referencia C0002092 ó C0002012(para el resto de los puntos de la curva preferiblemente).

Comentario adicional: Esta prueba está contraindicada si existe intolerancia hereditaria a la fructosa o fructosemia (en estos casos puede ser potencialmente mortal).
consentimiento informado debe guardarlo centro donde se hace test aire espirado o donde cliente coge kit para autotoma (en caso de que lo deje en otro centro diferente, este centro deberá guardarlo).

Componentes					
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	V. ref.
Prueba	H2SACAROSA			Test de Aire Espirado: Intolerancia a la SACAROSA	
Perfil	H2CH4CO2			Gases test aliento espirado	
Prueba	RESULINTOL			RESULTADO INTOLERANCIA	

Código: H2XILOS

Descripción: PERFIL Test de Aire Espirado: Intolerancia a XILOSA

Técnica: uGC TCD (Thermal Conductivity Detector)
referencia C0002101 o C0002079 (tubo de tapón verde para la muestra basal preferiblemente) y referencia C0002092 ó C0002012(para el resto de los puntos de la curva preferiblemente).

Comentario adicional: consentimiento informado debe guardarlo centro donde se hace test aire espirado o donde cliente coge kit para autotoma (en caso de que lo deje en otro centro diferente, este centro deberá guardarlo).

Componentes					
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	V. ref.
Prueba	H2XILOSA			Test de Aire Espirado: Intolerancia a la XILOSA	
Perfil	H2CH4CO2			Gases test aliento espirado	
Prueba	RESULINTOL			RESULTADO INTOLERANCIA	

Código: H2SORBITO

Descripción: PERFIL Test de Aire Espirado: Intolerancia al SORBITOL

Técnica: uGC TCD (Thermal Conductivity Detector)

Código:

H2SORBITO

referencia C0002101 o C0002079 (tubo de tapón verde para la muestra basal preferiblemente) y referencia C0002092 ó C0002012(para el resto de los puntos de la curva preferiblemente)

Comentario adicional:

Consentimiento informado debe guardarlo centro donde se hace test aire espirado o donde cliente coge kit para autotoma (en caso de que lo deje en otro centro diferente, este centro deberá guardarlo).

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	H2SORBITOL			Test de Aire Espirado: Intolerancia a la SORBITOL		
Perfil	H2CH4CO2			Gases test aliento espirado		
Prueba	RESULINTOL			RESULTADO INTOLERANCIA		

Código:

H2SORBIFR

Descripción:

PERFIL Test de Aire Espirado: Intolerancia SORBITOL+FRUCTOSA

Técnica:

uGC TCD (Thermal Conductivity Detector)

referencia C0002101 o C0002079 (tubo de tapón verde para la muestra basal preferiblemente) y referencia C0002092 ó C0002012(para el resto de los puntos de la curva preferiblemente)

Comentario adicional:

Esta prueba está contraindicada si existe intolerancia hereditaria a la fructosa o fructosemia (en estos casos puede ser potencialmente mortal).
Consentimiento informado debe guardarlo centro donde se hace test aire espirado o donde cliente coge kit para autotoma (en caso de que lo deje en otro centro diferente, este centro deberá guardarlo).

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	H2SORBIFRU			Test de Aire Espirado: Intolerancia al SORBITOL + FRUCTOSA		
Perfil	H2CH4CO2			Gases test aliento espirado		
Prueba	RESULINTOL			RESULTADO INTOLERANCIA		

Código:

H2GALACT

Descripción:

PERFIL Test de Aire Espirado: Intolerancia a GALACTOSA

Técnica:

uGC TCD (Thermal Conductivity Detector)

referencia C0002101 o C0002079 (tubo de tapón verde para la muestra basal preferiblemente) y referencia C0002092 ó C0002012(para el resto de los puntos de la curva preferiblemente)

Comentario adicional:

Consentimiento informado debe guardarlo centro donde se hace test aire espirado o donde cliente coge kit para autotoma (en caso de que lo deje en otro centro diferente, este centro deberá guardarlo).

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	H2GALACTO			Test de Aire Espirado: Intolerancia a la GALACTOSA		
Perfil	H2CH4CO2			Gases test aliento espirado		
Prueba	RESULINTOL			RESULTADO INTOLERANCIA		

Código:

TORRESIDENT

Descripción:

PERFIL TORRES DENTAL - BACTERIAS PERIODONTALES

Técnica:

Comentario adicional:

Muestra exclusiva para esta determinación: sangre o puntas de papel (recogidas por el periodoncista en consulta).

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	PERIOCUAN			Bacterias periodontales DNA PCR Cuantitativa		

Componentes						
Prueba	IL1ABMUTS			Polimorfismos C889T y C3953T de genes IL-1A y IL-1B respect.		

Descripción: PF4-HEPARINA AC.SUERO (FACTOR PLAQUETARIO 4-HEP)
Código: PF4AC
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Plasma de Citrato congelado
Comentario adicional: 2 mL plasma(citrato) pobre en plaquetas(doble centrifugación a 2500g/15min.Aspirar parte superior).CONGELAR INMEDIATAMENTE Y ENVIAR CONGELADO.
Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo

Descripción: PGT aneuploidías pack (1-8 embriones)
Código: PGTA
Técnica:
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: BIOPSIA ESPECIAL
Comentario adicional: Biopsia embrionaria en kit especial. Consultar Asesoría Genética
Valores de referencia:

Descripción: PGT monogénicas pack (1-8 embriones)
Código: PGTM
Técnica:
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: BIOPSIA ESPECIAL
Comentario adicional: Biopsia embrionaria en kit especial. Consultar Asesoría Genética
Valores de referencia:

Descripción: PGT reordenamientos pack (1-8 embriones)
Código: PGTSR
Técnica:
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: BIOPSIA ESPECIAL
Comentario adicional: Biopsia embrionaria en kit especial. Consultar Asesoría Genética
Valores de referencia:

Descripción: PGT-Informatividad enfermedades frecuentes
Código: PGTINFREC
Técnica:
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: EDTA Biología Molecular
Comentario adicional: Consultar Asesoría Genética
Valores de referencia:

Descripción: PGT-Informatividad enfermedades no frecuentes
Código: PGTINFNOF
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Consultar Asesoría Genética
Valores de referencia:

Descripción: Picnodisostosis. Sec Gen: CTSK
Código: GEN_000623
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Piebaldismo. Sec Gen: KIT
Código: GEN_000624
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Pierson, Sd. Sec Gen: LAMB2
Código: GEN_000625
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: PIK3CA (E542K, E545K/Q, H1047L/R) · HOT SPOT
Código: PIK3CA
Técnica:
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Tejido tumoral parafinado. Tª ambiente
ROTULAR: ONCO.
Valores de referencia:

Código: PIRIDINOLI
Descripción: PIRIDINOLINA Y DESOXIPIRIDINOLINA EN ORINA
Técnica: Cromatografía Líquida Alta Resolución

Código:PIRIDINOLI

2mL de orina (segunda micción). Volumen mínimo: 1mL

Comentario adicional:

Se aconseja realizar el análisis con la orina de la segunda orina matinal (entre las 10:00 y las 12:00h, atendiendo al ritmo circadiano de la eliminación de la piridinolina y desoxipiridinolina).

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	PIR	25129-8		Piridinolina	nmol/mmol crea.	(23 - 65) Hombre (25 - 83) Mujer
Prueba	DPIR	25095-1		Desoxipiridinolina	nmol/mmol crea.	(6 - 26) Hombre (6 - 23) Mujer

Descripción:PIRUVATO QUINASA ERITROCITOS

Código:PQERI

Técnica:Cinética - Espectrofotometría

Unidades:U/g Hb (37°C)

Plazo:9 días

Tubo:EDTA sangre total Referencia

Comentario adicional:1 mL sangre total Heparina . Envío inmediato
Alt. sangre total EDTA

Valores de referencia:(7.4 - 16.4)

Descripción:PIRUVICO A LOS 30 MINUTOS

Código:PIRUVICO30

Técnica:Cinetica- Espectrofotometria ultravioleta

Unidades:mg/dl

Plazo:4 días

Tubo:Tubo Especial

Comentario adicional:Preparación especifica de la muestra tubo especial con instrucciones adjuntas

Valores de referencia:

Descripción:PL-7/PL-12 AC. SUERO

Código:PL7PL12AC

Técnica:Técnica Inmunoblot

Unidades:

Plazo:7 días

Tubo:Suero Basal

Comentario adicional:

Valores de referencia:Negativo

Descripción:PLAQUETAS AC. SANGRE TOTAL

Código:PLAQUEAC

Técnica:Citometría de flujo

Unidades:%

Plazo:7 días

Tubo:Tubo Especial

Descripción: PLAQUETAS AC. SANGRE TOTAL
Comentario adicional: Volumen: 5.0 mL MUESTRA EXCLUSIVA PARA ESTA DETERMINACION

Es necesario contactar previamente con el laboratorio para programar el estudio.
 No realizar toma de muestras ni viernes ni vísperas de festivo. Mantener las muestras refrigeradas.
 Indicar día y hora de extracción de la muestra.

Valores de referencia:

Descripción: PLAQUETAS ANTICUERPOS SUERO
Código: ACPLAQUE
Técnica: Técnica IFI.
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero (mínimo 0.30 mL)
Valores de referencia: Negativo <1/10
 Positivo >1/10

Descripción: PLASMINOGENO EN PLASMA
Código: PLASMINOGE
Técnica: Técnica cromogénica
Unidades: %
Plazo: 8 días
Tubo: Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional: 3 mL Plasma Citrato Sódico congelado
Valores de referencia: (80 - 120)

Descripción: PLASMINOGENO ACTIVADOR TISULAR (tPA) PLASMA
Código: PLASMIACTI
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: ng/mL
Plazo: 19 días
Tubo: Plasma de Citrato congelado
Comentario adicional: 1 mL plasma (citrato).
 Conservación: Centrifugar inmediatamente después de la extracción. CONGELAR PLASMA Y ENVIAR CONGELADO.

Rogamos tubo independiente para este análisis.

Extracción con estasis venosa.

Valores de referencia: (2 - 12)

Descripción: Plasmodium DNA PCR Cualitativa
Código: MALARIAPCR
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: EDTA Biología Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinacion: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Valores de referencia:

Descripción: PLASMODIUM SPP ANTICUERPOS (MALARIA) SUERO
Código: PLASMOAC

Descripción:	PLASMODIUM SPP ANTICUERPOS (MALARIA) SUERO
Técnica:	EIA
Unidades:	
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero,alt (plasma de citrato, heparina)
Valores de referencia:	(Inf. 9) Negativo (9 - 11) Indeterminado (Sup. 11) Positivo

Descripción:	PLATA EN ORINA
Código:	AG2
Técnica:	ICP-MS
Unidades:	µg/L
Plazo:	7 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	10 ml de orina aislada
Valores de referencia:	(Inf. 1)

Descripción:	PLATA EN SUERO
Código:	PLATASUERO
Técnica:	Espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS)
Unidades:	µg/L
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml Suero (libre trazas metales) Tubo Suero metales traza Volumen mínimo: 0.35 mL
	Proteger la muestra de la luz.
Valores de referencia:	(Inf. 1) No expuestos (Inf. 1) Límite de cuantificación

Descripción:	PLATINO EN ORINA
Código:	CISPLAORIN
Técnica:	Téc. espectrometría de emisión atómica/espectrometría de masas
Unidades:	mcg/L
Plazo:	9 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 0.05) Valor orientativo

Descripción:	PLATINO SUERO (libre de metales)
Código:	PLATINO
Técnica:	Espectrometría de Emisión Atómica/Espectrometría de Masas (ICP-MS)
Unidades:	µg/L
Plazo:	11 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero (libre trazas metales). Refrigerar. Tubo Suero metales traza

Descripción: PLATINO SUERO (libre de metales)
Valores de referencia: (Inf. 0.20)

Descripción: PLATINO SUERO (libre de metales)
Código: PLATINO
Técnica:
Unidades: µg/L
Plazo: 11 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: _COMENTARIODT
Valores de referencia: (Inf. 0.20)

Descripción: PLOMO EN SANGRE
Código: PB
Técnica: ICP-MS
Unidades: µg/dL
Plazo: 6 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: Tubo de sangre total EDTA o tubo de EDTA libre de elementos traza. Enviar de forma independiente 1 tubo específico para elementos traza con el tapón marcado.
Momento de toma de muestra no es crítico
Valores de referencia: (Inf. 70) **Valor límite biológico recomendado por INSST.**
(30 - 70) Deberá procederse a **vigilancia médica periódica**, según INSST.
(Inf. 30) **Valor límite biológico recomendado por DIRECTIVA (UE) 2024/869.**
(Inf. 4.5) Se recomienda que los valores en **mujeres trabajadoras en edad fértil expuestas a plomo no superen el valor de la población general (4,5 µg/dL).**
(Inf. 4.5) **Personas no expuestas.**
(Inf. 1) Límite de cuantificación

Descripción: PLOMO ORINA
Código: PB2
Técnica: ICP-MS
Unidades: µg/L
Plazo: 6 días
Tubo: Orina Final de Jornada
Comentario adicional: Al menos 5 mL orina OFJ (Orina Final de Jornada) correctamente identificada (tapón marcado, etiquetas pequeñas sin código de barras y la palabra OFJ en el lateral del tubo).

No recolectar muestras de orina en un ambiente en el que sea más probable que ocurra la exposición. Es importante evitar que el polvo de la ropa pueda interferir en el contenido de la muestra.
No recoger la orina en recipientes con base de metal, como urinarios o sartenes de metal. Recoger la orina en tubos de polipropileno inocuidos libres de metales sin tapones de colores. Cuando esto no sea posible, usar para la recogida de orina un envase

Valores de referencia: (Inf. 50) al final de la jornada laboral en **personas expuestas a TETRAETIL PLOMO y/o TETRAMETIL PLOMO.** Valor límite biológico adaptado de **DFG**

Descripción: PM-1 Ac. SUERO
Código: PM.1
Técnica: Técnica Fluoroenzimoensayo
Unidades: U/mL
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal

Descripción: PM-1 Ac. SUERO
Comentario adicional: Suero. Alternativa Plasma
Valores de referencia: (Inf. 7) Negativo
 (7 - 10) Indeterminado

Descripción: PM75 (PM/SCL75) ANTICUERPOS
Código: PM.75
Técnica:
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero. Alternativa Plasma
Valores de referencia: Negativo

Descripción: PNEUMOCYSTIS JIROVECI (CARINII) IF LIQ. BIOLOGICO
Código: PNECARAG
Técnica: Tinción plata-metenamina
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: Lavado brocoalveolar, esputo.
 Volumen 15 ml
Valores de referencia:

Descripción: Pneumocystis jirovecii DNA PCR cualitativa
Código: PNEUMODNA
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Tejido pulmonar-REFRIGERAR
 2ml BAL-REFRIGERAR
 2 ml esputo-REFRIGERAR
Valores de referencia: Valor de referencia: No se detecta

Descripción: POLE (P286R, V411L, S297F, A456P, S459F) · HOT SPOT
Código: POLE_SOMAT
Técnica:
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Tejido parafinado. Tª ambiente
Valores de referencia:

Descripción: Poliarteritis nodosa. Deficiencia de adenosin deaminasa-2. ADA2
Código: GEN_000626
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Biología Molecular

Descripción: Poliarteritis nodosa. Deficiencia de adenosina deaminasa-2. ADA2

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: POLICITEMIA VERA · JAK2 (EXÓN 12) · HOT SPOT

Código: JAK2_EX.12

Técnica: PCR y secuenciación

Unidades:

Plazo: 7 días

Tubo: TUBO ONCOGENETICA

Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO.

IMPORTANTE: REFRIGERADO SIEMPRE

Valores de referencia:

Descripción: Poliendocrinopatía autoinmune tipo 1. Sec Gen: AIRE

Código: GEN_000627

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Polimorfismo FSHR: respuesta estimulación ovárica

Código: FSHRPOLIM

Técnica: NGS

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Sangre EDTA Tª ambiente. Rotulado con BM
Tubo exclusivo para esta determinación

Valores de referencia:

Descripción: Polimorfismo rs4149056 asociado a miopatías inducidas por estatinas

Código: SLCO1B1

Técnica: PCR y secuenciación

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente

Valores de referencia:

Descripción: Polimorfismo rs738409 asociado a hígado graso no alcohólico

Código: PNPLA3_SNP

Técnica: PCR y secuenciación

Unidades:

Plazo: 10 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Polimorfismo rs738409 asociado a hígado graso no alcohólico

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Alternativas: Citrato

Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente

Valores de referencia:

Descripción: Polimorfismos C889T y C3953T de genes IL-1A y IL-1B respect.

Código: IL1ABMUTS

Técnica: PCR y digestión

Unidades:

Plazo: 7 días

Tubo: Muestra Biología Molecular

Comentario adicional: Muestra exclusiva para esta determinación: puntas de papel (recogidas por el periodoncista en consulta).-REFRIGERAR

Valores de referencia:

Descripción: Polineuropatía amiloide familiar: secuenciación gen TTR

Código: ANDRADE

Técnica: PCR y secuenciación

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Alternativas: Heparina o Citrato.

Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente

Valores de referencia:

Descripción: Polineuropatía, sordera, ataxia, ret. pig. catarata. ABHD12

Código: GEN_000629

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Polioma virus (JC-BK) deteccion DNA en MUESTRA por PCR

Código: POLIOLCR

Técnica: Q-PCR

Unidades:

Plazo: 7 días

Tubo: Muestra envios externos

Comentario adicional: 1 mL LCR- congelado
sangre total (EDTA) refrigerado
orina (micción aislada) refrigerada

Valores de referencia:

Descripción: POLIOVIRUS ANTICUERPOS EN SUERO

Código: POLIOVAC

Técnica: EIA

Unidades:

Descripción: POLIOVIRUS ANTICUERPOS EN SUERO
Plazo: 19 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL Suero (Refrigerado)
Valores de referencia: Valor de referencia indicativo: Negativo

Descripción: POLIPEPTIDO PANCREATICO
Código: PPANCREATI
Técnica: RIA
Unidades: pmol/L
Plazo: 32 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 ml suero congelar inmediatamente
Valores de referencia: (Inf. 100)

Descripción: Poliposis adenomatosa familiar (cáncer colon): gen APC (NGS)
Código: APC_MUT
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Poliquistosis renal Ampliado. Panel NGS
Código: GEN_000635
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Poliquistosis renal auto. dom: genes PKD1 y PKD2 (NGS)
Código: ADPKD
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Poliquistosis renal autos recesiva: gen PKHD1 (NGS)
Código: ARPKD
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Poliquistosis renal autos recesiva: gen PKHD1 (NGS)
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Poliquistosis renal. Panel NGS
Código: GEN_000634
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Pool Nasal Coronavirus SARS 2 RT-PCR
Código: POOLNASCOV
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Muestra nasal
Valores de referencia:

Descripción: Pool Saliva Coronavirus SARS 2 RT-PCR
Código: POOLSALCOV
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Muestra saliva (solicitar al almacén Valderribas)
Valores de referencia:

Descripción: Porfiria cutánea tarda. Sec Gen: UROD
Código: GEN_000637
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Porfiria eritropoyética congénita. Sec Gen: UROS
Código: GEN_000638
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción:

Porfiria hepática aguda. Sec Gen: ALAD

Código:

GEN_000639

Técnica:

Unidades:

Plazo:

25 días

Tubo:

EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional:

Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción:

Porfiria intermitente aguda: gen HMBS (NGS)

Código:

PORFIRIA

Técnica:

NGS con TSOE Illumina y MLPA

Unidades:

Plazo:

30 días

Tubo:

EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional:

Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción:

Porfiria variegata. Sec Gen: PPOX

Código:

GEN_000640

Técnica:

Unidades:

Plazo:

25 días

Tubo:

EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional:

Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción:

Porfiria. Panel NGS

Código:

GEN_000641

Técnica:

Unidades:

Plazo:

30 días

Tubo:

EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional:

Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Código:

PORFIHECES

Descripción:

PORFIRINAS EN HECES

Técnica:

HPLC

Comentario adicional:

5 gr de heces congeladas.
SE recomienda evitar la luz directa.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	COPROH	40627-2		COPROPORFIRINAS EN HECES	mcg/g heces	(Inf. 5)
Prueba	UROH	56484-9		UROPORFIRINAS EN HECES	mcg/g heces	(Inf. 1.2)
Prueba	PROTOH	58932-5		PROTOPORFIRINAS EN HECES	mcg/g heces	(Inf. 8)
Prueba	HEPTAH	34313-7		HEPTACARBOXILPORFIRINAS EN HECES	mcg/g heces	(Inf. 0.5)

Código: PORFIFRA2
Descripción: PORFIRINAS FRACCIONADAS EN ORI
Técnica: Cromatografía líquida de alta resolución

10 ml de orina de 24 h.
 Indicar volumen de 24h.

Comentario adicional: Evitar luz directa.

Para incrementar la fiabilidad del diagnóstico, hay que evitar los factores que conducen a niveles elevados de porfirina, como, por ejemplo, el consumo de alcohol, ingesta de fármacos inductores de enzimas y situaciones de estrés.

Preservar la orina con Carbonato sódico pH = 6.0 - 9.0

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	COPROP	6877-5		Perfil COPROPORFIRINAS I EN ORINA	µg/24 h	(Inf. 24)
Prueba	COPROP3	6878-3		Perfil COPROPORFIRINAS III EN ORINA	µg/24h	(10 - 65)
Prueba	HEXAC	9527-3		Perfil HEXACARBOXILPORFIRIN EN ORINA	µg/24h	(Inf. 2) Límite de cuantificación: 1.7 µg/L
Prueba	HEPTAC	24462-4		Perfil HEPTACARBOXILPORFIRI EN ORINA	µg/24h	(Inf. 3) Límite de cuantificación: 1.1 µg/L
Prueba	PENTA	9730-3		Perfil PENTACARBOXILPORFIRI EN ORINA	µg/24h	(Inf. 4) Límite de cuantificación: 1.2 µg/L
Prueba	UROP	3113-8		Perfil UROPORFIRINAS EN ORINA	µg/24h	(Inf. 24)

Código: PORFIRFRAC
Descripción: PORFIRINAS FRACCIONADAS EN PLASMA
Técnica: HPLC

Plasma Heparina litio
 Volumen

Comentario adicional: 2.0 mL
 Conservación
 Congelar

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	COPROPFRAC	14157-2		PERFIL PORFIRFRAC, COPROPORFIRINA I en plasma	µg/L	(Inf. 6.40)
Prueba	CP3P			PERFIL PORFIRFRAC, COPROPORFIRINA III en plasma	µg/L	(Inf. 8)
Prueba	HPCPP			PERFIL PORFIRFRAC, HEPTACARBOXIPORFIRINA en plasma	µg/L	(Inf. 3.80)
Prueba	HXCPP			PERFIL PORFIRFRAC, HEXACARBOXIPORFIRINA en plasma	µg/L	(Inf. 1.30)

Componentes						
Prueba	PECPP			PERFIL PORFIRFRAC, PETACARBOXIPORFIRINAS en plasma	µg/L	(Inf. 1.20)
Prueba	UROPP			PERFIL PORFIRFRAC, UROPORFIRINAS en plasma	µg/L	(Inf. 11.80)
Prueba	PORFTP			PERFIL PORFIRFRAC, PORFIRIAS TOTALES en plasma	µg/L	(Inf. 32.50)

Descripción: PORFOBILINOGENO DESAMINASA ERITROCITOS
Código: PORFOBGDES
Técnica: Análisis por inyección de flujo (FIA)
Unidades: nmol/s/L
Plazo: 12 días
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional: 2 ml de sangre total HeparinaLi.refrigerar,
Valores de referencia: (7.30 - 15.80) Actividad normal

Descripción: PORFOBILINOGENO EN ORINA DE 24 HORAS
Código: PORFOBILI
Técnica: Espectrometría
Unidades: mg/24 h
Plazo: 8 días
Tubo: Orina congelada
Comentario adicional: Proteger de la luz
Orina 24h. (alícuota)
Preferible enviar congelado
Valores de referencia: (Inf. 1.7) .Límite de cuantificación: <0.80 mg/L

Descripción: POTASIO
Código: K
Técnica:
Unidades: mmol/L
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (3.5 - 5.1)

Descripción: POTASIO ORINA
Código: K2
Técnica: Potenciometría directa
Unidades: mmol/24h
Plazo: 3 días
Tubo: Orina 24 Horas
Comentario adicional:
Valores de referencia: (25 - 100)

Descripción: PREALBUMINA SUERO
Código: PREALB
Técnica: Turbidimetría

Descripción: PREALBUMINA SUERO
Unidades: mg/dL
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL suero
Valores de referencia: (20 - 40)

Descripción: PRECIPITINAS THERMOACTINOMYCES VULGARIS
Código: TERMOVUL
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: U/mL
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero refrigerado(2-8°C)
Valores de referencia: (Inf. 1.00) Negativo

Descripción: PREGABALINA (LYRICA) SUERO
Código: PREGABALIN
Técnica: Cromatografía Líquida Tándem Masas.
Unidades: mg/L
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 mL Suero. Congelar
 No utilizar tubos con gel separador.
Valores de referencia: (2 - 8.0) Intervalo terapéutico
 (Sup. 10) Toxicidad
 (Inf. 0.5) Límite de cuantificación

Descripción: PREGNANDIOL ORINA
Código: PREGNANDI
Técnica: Cromatografía gases - Ionización de llama
Unidades: mg/24 h
Plazo: 12 días
Tubo: Orina 24 Horas
Comentario adicional: 25 mL de orina de 24 h.
Valores de referencia: (Inf. 0.1) < 2 años
 (Inf. 0.3) 2 años - 5 años
 (Inf. 0.5) 5 años - 9 años
 (0.1 - 0.70) Hombre 9 años - 15 años
 (0.1 - 1.90) Hombre > 15 años
 (0.1 - 1.2) Mujer 9 años - 15 años
 (0.1 - 2.6) Mujer Folicular
 (2.6 - 10.60) Mujer Luteínica
 (10 - 100) Mujer Embarazo

Descripción: PREGNANTRIOL ORINA
Código: PREGNANTRI
Técnica: Cromatografía gases - Ionización de llama
Unidades: mg/24 h
Plazo: 12 días
Tubo: Orina 24 Horas

Descripción: PREGNANTRIOL ORINA
Comentario adicional: 25 mL orina de 24 h.
Valores de referencia: (Inf. 0.10) < 5 años
 (Inf. 0.30) 5 años - 9 años
 (0.20 - 0.60) Hombre 9 años - 15 años
 (0.40 - 2.5) Hombre > 15 años
 (0.10 - 0.60) Mujer 9 años - 15 años
 (0.10 - 1.80) Mujer Fase folicular
 (0.90 - 2.20) Mujer Fase luteínica

Descripción: PREGNENOLONA SUERO
Código: PREGNE
Técnica: EIA
Unidades: ng/mL
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL Suero.
 Fines de semana: enviar suero congelado
Valores de referencia: (0.1 - 3.4) Hombre
 (0.1 - 3.8) Mujer

Descripción: PRIMIDONA SUERO
Código: PRIMI
Técnica: Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectroscopía de masas (LC-MS/MS)
Unidades: mg/L
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 0.5 mL Suero SIN gel separador
 Conservación: Congelar
 Volumen mínimo: 0.2 mL
Valores de referencia: (5 - 10) Intervalo terapéutico
 (Inf. 1) Límite de cuantificación
 (Sup. 25) Toxicidad

Descripción: PROCALCITONINA
Código: PROCALCITO
Técnica: Técnica ICMA
Unidades: ng/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: Suero congelado (tubo con o sin gel)
 Alt. plasma EDTA, o plasma heparina de litio.

Descripción:	PROCALCITONINA
Valores de referencia:	(Inf. 0.5) > 4 días Riesgo bajo de sepsis y/o shock séptico. Debe tenerse en cuenta que concentraciones < 0,5 ng/mL no permiten descartar una infección, ya que en algunas infecciones localizadas pueden aparecer concentraciones bajas. También pueden reflejar una infección generalizada en sus etapas muy iniciales (< 6 horas desde el debut). < 4 días < 2.0 ng/mL a 0-6h de nacer < 4 días <8.0 ng/mL a 6-12h de nacer < 4 días <15.0 ng/mL a 12-18h de nacer < 4 días <21.0 ng/mL a 18-30h de nacer < 4 días <15.0 ng/mL a 30-36h de nacer < 4 días <8.0 ng/mL a 36-42 h de nacer

Descripción:	PROCOLAGENO I PROPEPTIDO AMINOTERMINAL (P1NP) SUERO
Código:	PROCOLAIAM
Técnica:	CLIA
Unidades:	ng/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. Alternativa: Plasma (heparina, edta)
Valores de referencia:	(21 - 78) Hombre (15.1 - 58.6) Mujer Adultas (14.3 - 58.9) Postmenopausia con tratamiento hormonal (20.3 - 76.3) Postmenopausia sin tratamiento hormonal

Descripción:	PROCOLAGENO III PROPEPTIDO AMINOTERMINAL SUERO
Código:	PROCOLAIII
Técnica:	Téc. RIA
Unidades:	U/mL
Plazo:	14 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL de suero. Volumen: 1.0 mL (0.15 mL mínimo)
Valores de referencia:	(0.33 - 0.79) (0.34 - 6.10) < 10 años (0.64 - 1.70) 10 años - 15 años (0.37 - 1.80) 15 años - 20 años

Descripción:	PRODUCTOS DEGRADACION FIBRINOGENO
Código:	PDF
Técnica:	Inmunoensayo automatizado de aglutinación de látex
Unidades:	mg/L
Plazo:	3 días
Tubo:	Plasma de Citrato congelado
Comentario adicional:	Plasma de citrato congelado
Valores de referencia:	(Inf. 5)

Descripción:	PROGESTERONA
Código:	PROGES
Técnica:	ICMA
Unidades:	ng/mL

Descripción: PROGESTERONA
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL suero
 Alternativo plasma con EDTA
Valores de referencia: (Inf. 0.5) Hombre > 14 años
 (Inf. 0.5) Mujer > 14 años Folicular
 (1.2 - 15.9) Mujer > 14 años Luteínica
 (Inf. 0.5) Mujer > 14 años Post menopausia

Descripción: PROINSULINA SUERO
Código: PROINSU
Técnica: CLIA
Unidades: pg/mL
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: Suero congelado
Valores de referencia: (Inf. 180)

Descripción: PROLACTINA
Código: PRL
Técnica: Técnica ICMA
Unidades: ng/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (3.46 - 19.40) Hombre
 (5.18 - 26.53) Mujer
 (1.8 - 20.3) Mujer Post-menopausia

Descripción: Pronóstico cáncer de próstata
Código: PROSTATYPE
Técnica: RT-qPCR
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: kit especial
 hacerselo llegar a anatomía patológica
Valores de referencia:

Descripción: PROPOXIFENO CRIBADO, ORINA
Código: PROPOXIOR
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 10 mL Orina
Valores de referencia:

Descripción: PROSIGNA: expresión génica
Código: PROSIGNA

Descripción: PROSIGNA: expresión génica
Técnica:
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Bloque de tejido tumoral mama. Tª ambiente
 Tumor INFILTRANTE
 Entregar a Asesoría genética

Valores de referencia:

Descripción: PROTAGLANDINA E2 PLASMA
Código: PGE2
Técnica: EIA
Unidades: pg/mL
Plazo: 25 días
Tubo: Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional: 3 ml plasma EDTA. Separar y congelar inmediatamente. Como alternativa suero o plasma heparina
Valores de referencia: (Inf. 2297)

Descripción: Prostaglandina E2, orina
Código: PGE22
Técnica: RIA
Unidades: pg/mL
Plazo: 10 días
Tubo: Orina congelada
Comentario adicional: 10mL orina aislada. CONGELAR INMEDIATAMENTE.
Valores de referencia: (Inf. 1850)

Descripción: PROTEINA 14.3.3 (ENCEFALOPATIAS) LCR
Código: PROT14.3.3
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: UA/mL
Plazo: 18 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: LCR. REFRIGERAR.
Valores de referencia: (Inf. 20000) La positividad de la prueba en un contexto clínico compatible es altamente sugestiva de enfermedad de Creutzfeldt-Jacob. Sin embargo, en otras situaciones de destrucción neuronal severa como ictus, encefalitis o crisis generalizadas repetidas o bien por la presencia de hematíes la prueba puede ser también positiva (falso positivo) por lo que esta positividad se ha de valorar en el contexto del enfermo y resultados de la analítica básica de LCR. Si persisten las dudas diagnósticas recomendamos repetir la determinación en 2 - 3 semanas La negatividad de la prueba no descarta el diagnóstico de la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob, pero lo hace más improbable. Si persisten las dudas diagnósticas recomendamos repetir la determinación en 2 - 3 semanas.

Código: BTLB
Descripción: PROTEINA BETA AMILOIDE/TAU, LCR
Técnica:

Código: BTLB

Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	TAUPROLCR	30160-6		PROTEINA TAU (LCR)	pg/mL	(Inf. 404)
Prueba	TAUFOSFO	72260-3		TAU FOSFORILADA LCR	pg/mL	(Inf. 56.5)
Perfil	BAMILOIDE			PERFIL BETA AMILOIDE 1-42/1-40, LCR		

Descripción: PROTEINA C ACTIVIDAD PLASMA

Código: PROTEINA.C

Técnica: Espectrofotometría

Unidades: %

Plazo: 3 días

Tubo: Coagulación - Plasma Citrato

Comentario adicional: 1 mL plasma

Valores de referencia: (70 - 130)

Descripción: PROTEINA C ANTIGENICA PCAG

Código: PROTCAG

Técnica: EIA

Unidades: %

Plazo: 10 días

Tubo: Coagulación - Plasma Citrato

Comentario adicional: 1 mL de plasma. Separar y congelar.

Valores de referencia: (70 - 140) . En recién nacidos el valor de la proteína C es bajo por inmadurez hepática.

Descripción: PROTEINA C REACTIVA SUERO

Código: PCR

Técnica: Inmunoturbidimetría

Unidades: mg/dL

Plazo: 3 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 1mL
NO HACER EN EDTA

Valores de referencia: (Inf. 0.5)

Descripción: PROTEINA CATIONICA EOSINOFILA MUESTRA

Código: PROCATEOMU

Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroimmunoanálisis

Unidades: µg/L

Plazo: 9 días

Tubo:

Comentario adicional: Muestra moco nasal/Lavado nasal

Valores de referencia: (5.0 - 46.0) Moco nasal
(3.0 - 31.0) Lavado nasal

Descripción: PROTEINA CATIONICA EOSINOFILA SUERO
Código: PROCATIOEO
Técnica: FEIA. Fluoroinmunoensayo.
Unidades: mcg/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Alt. plasma EDTA
Valores de referencia: (Inf. 13)

Descripción: PROTEINA EOSINOFILICA X EN HECES (EPX)
Código: PREOXH
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: ng/g heces
Plazo: 14 días
Tubo: HECES CONGELADAS
Comentario adicional: Heces 5g. Preferible enviar heces congeladas
Valores de referencia: (Inf. 1358)

Descripción: PROTEINA PLASMATICA A ASOCIADA A LA GESTACION
Código: PAPP.A
Técnica: Electroquimioluminiscencia
Unidades: mUI/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero. No emplear plasma
Valores de referencia: 0.28 mUI/mL-Embarazo-8 semanas
0.47 mUI/mL-Embarazo-9 semanas
0.90 mUI/mL-Embarazo-10 semanas
1.58 mUI/mL-Embarazo-11 semanas
2.51 mUI/mL-Embarazo-12 semanas
3.68 mUI/mL-Embarazo-13 semanas

Descripción: PROTEINA RELACIONADA CON LA PTH
Código: PTHRP
Técnica: RIA
Unidades: pmol/L
Plazo: 32 días
Tubo: Plasma trasylol/aprotinina
Comentario adicional: 2 mL plasma-EDTA con aprotinina (TRASYLOL). CONGELAR INMEDIATAMENTE Y ENVIAR CONGELADO. Envío en tubo independiente del resto de pruebas. Tubos especiales a su disposición
Valores de referencia: (Inf. 4.2)

Descripción: PROTEINA S ACTIVIDAD PLASMA
Código: PROTSACTI
Técnica: Coagulométrico
Unidades: %
Plazo: 6 días
Tubo: Plasma de Citrato congelado
Comentario adicional: 1 mL plasma citrato congelado. Se requiere contactar con el laboratorio central previamente a la extracción.

centrifugar la sangre a 2000g durante 10 minutos. Separar 3/4 partes superiores del plasma con pipeta (no decantar) y trasvasarlo a otro tubo. Centrifugar una segunda vez el plasma trasvasado al tubo, a 2000g durante 10 minutos. Separar el sobrenadante

Descripción: PROTEINA S ACTIVIDAD PLASMA
Valores de referencia: (77 - 143) Hombre
 (55 - 123) Mujer

Descripción: PROTEÍNA S ANTICUERPOS IgG SUERO
Código: PROTSIGG
Técnica: ELISA
Unidades: Índice
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL Suero
Valores de referencia: (1.00 - 1.75) Zona límite
 (1.76 - 3.70) Positivo débil
 (Sup. 3.70) Positivo

Descripción: PROTEINA S LIBRE ANTIGÉNICA PLASMA
Código: PROTSLIBRE
Técnica: Inmuno-turbidimétrico
Unidades: %
Plazo: 3 días
Tubo: Plasma de Citrato congelado
Comentario adicional: 5 mL de Plasma Citrato
Valores de referencia: (70 - 148) Hombre
 (50 - 134) Mujer

Descripción: PROTEINA S TOTAL ANTIGENICA PSAG
Código: PROTEINA.S
Técnica: EIA
Unidades: %
Plazo: 10 días
Tubo: Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional: 1 mL Plasma Citrato Sódico. Separar plasma y congelar inmediatamente.
Valores de referencia: (75 - 140) Hombre
 (60 - 140) Mujer

Descripción: PROTEINA S-100B SUERO
Código: PROTS100
Técnica: CLIA
Unidades: µg/L
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 mL suero no hemolizado congelado
Valores de referencia: (Inf. 0.15)

Descripción: PROTEINA TAU FOSFORILADA 181 EN PLASMA
Código: TAUFOFOPPL
Técnica: Inmunoensayo quimioluminiscente (CLEIA)
Unidades: pg/mL
Plazo: 24 días
Tubo: Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional: 1 mL plasma (EDTA) separado y congelado en tubo de polipropileno (especial a su disposición). CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.

Descripción:	PROTEINA TAU FOSFORILADA 181 EN PLASMA
Valores de referencia:	(Inf. 2) Concentraciones superiores a 2,00 pg/mL deben ser consideradas en el algoritmo diagnóstico de enfermedad de Alzheimer(EA). Concentraciones inferiores a 2,00 pg/mL con un cociente beta amiloide 1-42/1-40 en plasma inferior a 0,083, deben ser consideradas en el diagnóstico de EA.

Descripción:	PROTEINA TAU FOSFORILADA 181 EN PLASMA
Código:	TAUFOSFOPL
Técnica:	Inmunoensayo quimioluminiscente (CLEIA)
Unidades:	pg/mL
Plazo:	24 días
Tubo:	Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional:	1 mL plasma (EDTA) separado y congelado en tubo de polipropileno (especial a su disposición). CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.
Valores de referencia:	(Inf. 2) Concentraciones superiores a 2,00 pg/mL deben ser consideradas en el algoritmo diagnóstico de enfermedad de Alzheimer(EA). Concentraciones inferiores a 2,00 pg/mL con un cociente beta amiloide 1-42/1-40 en plasma inferior a 0,083, deben ser consideradas en el diagnóstico de EA.

Descripción:	PROTEINA TAU FOSFORILADA 217 EN PLASMA
Código:	TAUFOSF217
Técnica:	Enzimoinmunoensayo quimioluminiscente (CLEIA)
Unidades:	pg/mL
Plazo:	17 días
Tubo:	Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional:	1 mL plasma (EDTA)en tubo de polipropileno (pedir a Almacen). CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.
Valores de referencia:	(Inf. 0.18) Concentración de biomarcador no sugestivo de enfermedad de Alzheimer con sensibilidad y especificidad del 95%. (0.18 - 0.35) Concentración de biomarcador no concluyente que recomienda continuar con el estudio del/la paciente. (Sup. 0.35) Concentración de biomarcador compatible con enfermedad de Alzheimer con sensibilidad y especificidad del 95%. Accuracy and clinical applicability of plasma tau 181 and 217 for Alzheimer's disease diagnosis in a memory clinic cohort. (Sarto et al, 2025)

Descripción:	PROTEINA TAU FOSFORILADA 217 EN PLASMA
Código:	TAUFOSF217
Técnica:	Enzimoinmunoensayo quimioluminiscente (CLEIA)
Unidades:	pg/mL
Plazo:	17 días
Tubo:	Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional:	1 mL plasma (EDTA)en tubo de polipropileno (pedir a Almacen). CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.

Descripción:	PROTEINA TAU FOSFORILADA 217 EN PLASMA
Valores de referencia:	(Inf. 0.18) Concentración de biomarcador no sugestivo de enfermedad de Alzheimer con sensibilidad y especificidad del 95%. (0.18 - 0.35) Concentración de biomarcador no concluyente que recomienda continuar con el estudio del/la paciente. (Sup. 0.35) Concentración de biomarcador compatible con enfermedad de Alzheimer con sensibilidad y especificidad del 95%. Accuracy and clinical applicability of plasma tau 181 and 217 for Alzheimer's disease diagnosis in a memory clinic cohort. (Sarto et al, 2025)

Descripción:	PROTEINAS ORINA 24HORAS
Código:	PT2
Técnica:	Espectrometría
Unidades:	mg/24 h
Plazo:	3 días
Tubo:	Orina 24 Horas
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 100)

Descripción:	PROTEINAS TOTALES LCR
Código:	LIQLCPT
Técnica:	Espectrofotometría
Unidades:	mg/dL
Plazo:	3 días
Tubo:	Líquido Bioquímica
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(15 - 45)

Descripción:	PROTEINAS TOTALES SUERO
Código:	PT
Técnica:	
Unidades:	g/dL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(6 - 8.3)

Descripción:	PROTEINASA-3 AC.
Código:	PR3
Técnica:	EIA
Unidades:	IU/mL
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL
Valores de referencia:	(Inf. 2.0) Negativo (2.0 - 3.0) Indeterminado

Descripción:	Proteus, Sd. Sec Gen: AKT1
Código:	GEN_000642
Técnica:	
Unidades:	

Descripción: Proteus, Sd. Sec Gen: AKT1
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Protoporfiria ligada al X. Panel NGS
Código: GEN_000644
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Protoporfiria ligada al X. Sec Gen: ALAS2
Código: GEN_000643
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: PROTOPORFIRINA LIBRE SANGRE
Código: PROTOLIBRE
Técnica: Fluorimetria
Unidades: µg/dL
Plazo: 6 días
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional: 5 mL sangre total Heparina Na.Refrigerado.
 Altyernativa: 5 mL sangre total EDTA. Refrigerado.
Valores de referencia: (Inf. 55)

Descripción: PROTROMBINA AC. IGG SUERO
Código: PROTROMIGG
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 14 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1mL de suero refrigerado
Valores de referencia: (Inf. 10) Negativo
 (Sup. 10) Positivo

Descripción: PROTROMBINA AC. IGM SUERO
Código: PROTROMIGM
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 14 días

Descripción: PROTROMBINA AC. IGM SUERO
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1mL de suero refrigerado
Valores de referencia: (Inf. 10) Negativo
 (Sup. 10) Positivo

Descripción: PROTROMBINA CAPILAR
Código: INRC
Técnica:
Unidades:
Plazo: 1 días
Tubo:
Comentario adicional:
Valores de referencia: 2 - 3

Descripción: Prueba de paternidad/ maternidad probatoria-judicial
Código: PATERNIDA2
Técnica:
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Lleva KIT especial con cadena de custodia (solicitar kit) a Asesoría genética.

Este código incluye 2 individuos: padre o madre + hijo/a, pero también puede ir el 2do progenitor gratis (y serían 3 muestras por el mismo precio)

Enviar kit completo a la Att. C/Alfonso XII, Carmen del Palacio

Valores de referencia:

Código: PFLACT
Descripción: PRUEBA FUNCIONAL AC.LACTICO TRAS EJERCICIO
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	LACTICO	14118-4		ACIDO LACTICO (LACTATO) PLASMA	mg/dL	(5.7 - 22)
Prueba	TPOEJERC			TIEMPO DE EJERCICIO	minutos	
Prueba	LACTICO1	57356-8		ACIDO LACTICO TRAS 1 MINUTO DE EJERCICIO	mg/dL	
Prueba	LACTICO3	57361-8		ACIDO LACTICO TRAS 3 MINUTOS DE EJERCICIO	mg/dL	
Prueba	LACTICO5	57363-4		ACIDO LACTICO TRAS 5 MINUTOS DE EJERCICIO	mg/dL	

Descripción: Prueba interna - Informe PDF
Código: INFORMEPDF
Técnica:
Unidades:
Plazo:

Descripción: Prueba interna - Informe PDF
Tubo:
Comentario adicional: Prueba interna laboratorio
Valores de referencia:

Descripción: Prueba No Treponémica (RPR)
Código: VDRLMICRO
Técnica: Aglutinación
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia:

Descripción: Prueba parentesco judicial entre 2 individuos
Código: PARENTESCO
Técnica:
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Lleva KIT especial con cadena de custodia, solicitar a asesoría genética, Enviar con las muestras a Alfonso XII
Muestra: mucosa bucal con Hisopo sin medio
 Esta prueba es para 2 individuos pero también puede ir la madre gratis (y serían 3 muestras por el mismo precio)

Valores de referencia:

Descripción: PSA LIBRE SUERO
Código: PSALIBRE
Técnica: ICMA
Unidades: ng/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: PSA SUERO (ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO)
Código: PSA
Técnica: ICMA
Unidades: ng/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 4) Hombre
 (Inf. 0.03) Mujer

Descripción: PSA-LIBRE/PSA-TOTAL RATIO
Código: PSARATIO
Técnica: ICMA + Cálculo
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal

Descripción: PSA-LIBRE/PSA-TOTAL RATIO

Comentario adicional:

Valores de referencia:

Descripción: P-SELECTINA SOLUBLE, SUERO

Código: PSELES

Técnica:

Unidades: ng/mL

Plazo: 22 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: Suero refirgerado

Valores de referencia: (36 - 140)

Descripción: Pseudoacondroplasia. Sec Gen: COMP

Código: GEN_000645

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Pseudohipoaldosteronismo. Panel NGS

Código: GEN_000646

Técnica:

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Pseudohipoparatiroidismo primario: gen GNAS (NGS)

Código: GNAS_MUTS

Técnica: NGS y MLPA

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.
Alternativa: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Pseudoxantoma elástico. Panel NGS

Código: GEN_000647

Técnica:

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Pseudoxantoma elástico: gen ABCC6 (NGS)
Código: ABCC6_MUTS
Técnica: NGS y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.
Alternativa: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Pterigion múltiple, Sd. Sec Gen: CHRNG
Código: GEN_000649
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Pterigion múltiple. Panel NGS
Código: GEN_000650
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: PURINAS Y PIRIMIDINAS EN ORINA
Código: PURPIRORIN
Técnica: CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN
Unidades: mmol/mol crea
Plazo: 24 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 10 mL orina (micción aislada). CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.
Valores de referencia:

Descripción: Púrpura trombocitopénica trombótica. Sec Gen: ADAMTS13
Código: GEN_000651
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: PV/MF IDIOPÁTICA/TE · JAK2(V617F) · HOT SPOT
Código: JAK2_V617F
Técnica: PCR
Unidades:

Descripción: PV/MF IDIOPÁTICA/TE · JAK2(V617F) · HOT SPOT
Plazo: 7 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación rotulado con ONCO.
 También sirve médula ósea
 IMPORTANTE: REFRIGERADO SIEMPRE

Valores de referencia:

Descripción: QT corto, Sd. Panel NGS
Código: GEN_000652
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Código: QUANTIFERO
Descripción: QUANTIFERON TB GOLD PLUS
Técnica: Quimioluminiscencia
 QUANTIFERON TB-GOLD PLUS kit nuevo
 4 Tubos para la recogida de sangre
 (Nil, TB1 Antigen, TB2 Antigen, Mitogen).
 Se llena cada tubo con sangre hasta la zona central de la MARCA NEGRA (1 mL).
 Sacudir los tubos con energía durante 5 seg (10 veces).
 Incubar 37°C durante 16-24 horas en posición vertical.
Comentario adicional: Centrifugar los tubos (2000-3000 g durante 15 min), asegurando la separación del plasma.
 Enviar los tubos para su análisis en su envase original.

- SI ES ENVIADO DESDE MADRID: PUEDEN ENVIAR LOS TUBOS SIGUIENDO LA PREPARACIÓN REALIZANDO LOS PASOS HASTA JUSTO ANTES DE LA INCUBACIÓN. NECESARIO ENVIAR ANTES DE 6 H TRAS LA EXTRACCIÓN. ENVIAR DE LUNES A JUEVES.

- SI ES ENVIADO DESDE PROVINCIAS: ES NECESARIO QUE TENGAN ESTUFA Y HAGAN LA PREPARACIÓN HASTA EL FINAL.

la marca negra en la etiqueta de los tubos indica el rango válido de llenado de los mismos (0.8-1.2 ml).

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	NULOQFT	71776-9		Control Negativo del paciente	UI/mL	
Prueba	TB1QFT	46217-6		TB1	UI/mL	
Prueba	TB2QFT	88518-6		TB2	UI/mL	
Prueba	INTERPQFT	71773-6		INTERPRETACION QFT		
Prueba	MITQFT	71772-8		Control positivo MITOGEN QUANTIFERON-TB	UI/mL	
Prueba	NULO25#			Control negativo QUANTIFERON-TB (25%)		
Prueba	TB1QFT#	64084-7		TB1-NULO	UI/mL	
Prueba	TB2QFT#	88517-8		TB2-NULO	UI/mL	
Prueba	MITQFT#	71774-4		MITQFT-NULOQFT	UI/mL	

Descripción: QUERATINA AC. IgG SUERO
Código: QUERAACG
Técnica: IFI

Descripción: QUERATINA AC. IgG SUERO

Unidades:

Plazo: 23 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional:

Valores de referencia: <1:10 Negativo
>1:10 Positivo

Descripción: Queratocono tipo 1. Sec Gen: VSX1

Código: GEN_000653

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Queratodermia palmoplantar epidermolítica. Sec Gen: KRT9

Código: GEN_000654

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Queratosis palmoplantar estriada. Panel NGS

Código: GEN_000655

Técnica:

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Querubinismo. Sec Gen: SH3BP2

Código: GEN_000656

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: QUETIAPINA

Código: QUETIAPINA

Técnica: Cromatografía líquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)

Unidades: µg/L

Plazo: 9 días

Tubo: Suero Basal

Descripción: QUETIAPINA
Comentario adicional: Volumen 0.5 mL (Volumen mínimo 0,1 mL)
 Tubo suero sin gel separador

Muestra alternativa: Plasma EDTA.

Valores de referencia: (100 - 500)
 (Sup. 1000) Toxicidad

Descripción: QUIMOTRIPSINA HECES
Código: QUIMOTRIP
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: U/g
Plazo: 8 días
Tubo: heces especiales
Comentario adicional: 5 g heces en un tubo. REFRIGERAR
 Se recomienda suspender toda medicación como mínimo 5 días antes.
Valores de referencia: (Sup. 6.0) Se consideran valores normales
 (3.0 - 6.0) Indeterminado

Descripción: QUINASA ESPECIFICA MUSCULAR (MuSK) AC. SUERO
Código: AC.MUSK
Técnica: EIA
Unidades: U/mL
Plazo: 15 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 0.40)

Descripción: Quitotriosidasa (E. Gaucher), sangre seca
Código: QUITOTRIO
Técnica: Fluorimetría
Unidades: $\mu\text{mol/L} \times \text{Hora}$
Plazo: 17 días
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional: Recoger gotas de sangre SIN ANTICOAGULANTE en 2 a 4 círculos de papel filtro (Solicitar a almacen). Dejar secar al aire libre durante 1 hora. Guardar en nevera en bolsa de plástico cerrada hasta el envío.
 Enviar a temperatura ambiente.
 INDISPENSABLE informe clínico y antecedentes familiares.
Valores de referencia: (14.0 - 186.0)

Descripción: QUITOTRIOSIDASA SUERO
Código: QUITOTRI
Técnica: Cinética
Unidades: nmol/h/mL
Plazo: 47 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 3 mL suero. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO. Indicar fecha nacimiento e historia clínica.
Valores de referencia: (19 - 208)

Descripción: RABIA VIRUS AC. CONTROL VACUNACION SUERO
Código: RABIAC
Técnica: Enzimoinmunoanálisis

Descripción: RABIA VIRUS AC. CONTROL VACUNACION SUERO
Unidades: UI/mL
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero refrigerado
Volumen mínimo 0.50 mL
Valores de referencia: (Sup. 0.50) Protección efectiva

Descripción: Raquitismo hereditario. Panel NGS
Código: GEN_000657
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Raquitismo hipofosfatémico ligado cr. X. Sec Gen: PHEX
Código: GEN_000447
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Raquitismo hipofosfatémico. Panel NGS
Código: GEN_000658
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Raquitismo y alopecia, Sd. Sec Gen: VDR
Código: GEN_000659
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Rasopatías. Panel NGS
Código: GEN_000660
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción:

Rasopatías. Panel NGS

Comentario adicional:

Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:**Código:**

RAST_1

Descripción:

RAST (IGE ESPECÍFICA) A MEDICAMENTOS

Técnica:

Suero.

Comentario adicional:

Alternativa: plasma EDTA

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	C234	5000204		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS PRILOCAINA	U/mL	(Inf. 0.35)
Prueba	Q01	7108-4		IGE ESPECIFICOA ACIDO ACETILSALICILICO (ASPIRINA) SUERO	KU/L	
Prueba	Q02	50033-0		IGE ESPECIFICA A CEFALOSPORINA	KU/L	
Prueba	Q04	56778-4		IGE ESPECIFICA A ARTICAINA (ULTRACAIN)	KU/L	
Prueba	C308	16568-8		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS CEFUROXIMA	KU/L	
Prueba	Q06	48783-5		IGE ESPECIFICA A DIPIRONA(METAMIZOL) SUERO	KU/L	
Prueba	Q07	11171-6		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS ERITROMICINA SUERO	KU/L	
Prueba	Q08	54913-9		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS GENTAMICINA	KU/L	
Prueba	Q09	5000165		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS INDOMETACINA(C282)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	Q10			IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS LIDOCAINA (XILOCAINA)	KU/L	
Prueba	Q11	56877-4		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS MEPIVACAINA (SCANDICAIN)	KU/L	
Prueba	Q12	6711-6		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS PARACETAMOL SUERO	KU/L	
Prueba	Q13	49864-2		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS PROCAINA (NOVOCAINA)	KU/L	
Prueba	Q14	50031-4		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS SULFAMETOXAZOL	KU/L	
Prueba	Q15	49855-0		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS TETRACICLINA	KU/L	
Prueba	Q16	18258-4		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS TRIMETOPRIM (C242)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	Q17	56696-8		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS CLOXACILINA SUERO	KU/L	
Prueba	Q84	56711-5		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS ACIDO BENZOICO	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	Q20	56699-2		IGE ESPECIFICA A BUPIVACAINA (SVEDOCAIN)	KU/L	
Prueba	Q21			IGE ESPECIFICA A ACIDO CLAVULANICO	KU/L	
Prueba	X43	57313-9		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS PIRAZOLONAS	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	Q23	56700-8		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS NAPROXENO	KU/L	
Prueba	Q24	56701-6		IGE ESPECIFICA A DICLOFENAC (VOLTAREN)	KU/L	
Prueba	Q25	56702-4		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS CIPROFLOXACINA	KU/L	

Componentes						
Prueba	Q26	11171-6		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS ESTREPTOMICINA (C295)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	Q27	56878-2		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS FENILBUTAZONA (BUTAZOLIDINA)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	Q28	58903-6		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS NEOMICINA SUERO	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	Q29	5003801		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS FLUORESCEINA SODICA	KU/L	
Prueba	Q30	54912-1		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS FOSFOMICINA	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	Q31	5000178		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS LINCOMICINA SUERO	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	Q33	56703-2		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS PIROXICAM	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	Q34	5000180		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS RIFAMPICINA	KU/L	
Prueba	Q35	5000181		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS TETRACAINA	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	Q37	56705-7		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS TOBRAMICINA	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	Q38	5000184		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS VITAMINA B1 SUERO	KU/L	
Prueba	Q39	5000185		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS VITAMINA B6	KU/L	
Prueba	Q40	5000186		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS VITAMINA B12 SUERO	KU/L	
Prueba	Q41	54923-8		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS PROPIFENAZONA (CIBALGINA)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	Q42	5006669		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS BROMHEXINA SUERO	KU/L	
Prueba	Q43	56706-5		IGE ESPECIFICA MEDICAMENTOS DOXICICLINA (C216)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	Q47	56708-1		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS METRONIDAZOL	KU/L	
Prueba	Q49	56879-0		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS LACTOSA SUERO	KU/L	
Prueba	Q50	56709-9		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS TARTRAZINA	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	Q56	56711-5		RAST A MEDICAMENTOS BENZOATO SODICO SUERO	KU/L	
Prueba	Q57	49868-3		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS IBUPROFENO	KU/L	
Prueba	Q58	5000196		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS NORFLOXACINA	KU/L	
Prueba	Q59	42894-6		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS CLINDAMICINA	KU/L	
Prueba	Q60	5000197		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS CLORANFENICOL SUERO	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	Q61	5000198		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS KETOPROFENO SUERO	KU/L	
Prueba	Q62	5006676		IGE ESPECIFICA A ACIDO MEFENÁMICO (COSLAN) SUERO	KU/L	
Prueba	Q63	98052-4		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS MINOCICLINA	KU/L	
Prueba	Q64	56710-7		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS CLARITROMICINA	KU/L	
Prueba	Q66	5000201		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS EPINEFRINA	KU/L	(Inf. 0.35)

Componentes						
Prueba	Q67	5006667		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS ACETILCISTEINA	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	Q71	5000202		IGE ESPECIFICO A MEDICAMENTOS AC ASCORBICO	U/mL	(Inf. 0.35)
Prueba	Q72			IGE ESPECIFICO A AMARILLO NARANJA	KU/L	
Prueba	Q74	56712-3		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS DEXAMETASONA	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	Q78	5006673		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS TEOFILINA	KU/L	
Prueba	Q80	5009875		IGE ESPECIFICA A CLORURO DE COBRE	KU/L	
Prueba	Q83	5001301		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS BENZOCAINA	KU/L	
Prueba	Q85	5009865		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS AMIDOTRIZOATO DE MEGLUMINA	KU/L	
Prueba	Q86	5006677		IGE ESPECIFICA A AMIDOTRIZOATO DE SODIO	KU/L	
Prueba	Q90	5009870		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS PREDNISOLONA	KU/L	
Prueba	Q92	5001845		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS VANCOMICINA	KU/L	
Prueba	Q94	56747-9		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS AZITROMICINA (X04)	KU/L	
Prueba	X09	5010565		IGE ESPECIFICA A CLORURO DE ALUMINIO	KU/L	
Prueba	X51	5009871		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS TETRAZEPAM	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	X41			IGE ESPECIFICA A ASPARTAMO	KU/L	
Prueba	C260	5002634		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS MORFINA	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	X56	5009869		IGE ESPECIFICO A MEDICAMENTOS NITROFURANTOÍNA	KU/L	
Prueba	X22	5003798		IGE ESPECIFCO A MEDICAMENTOS ALOPURINOL	KU/L	
Prueba	X24			IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS CAPTOPRIL	KU/L	
Prueba	X47			IGE ESPECIFICO A ACIDO MOLIBDICO	KU/L	
Prueba	C70	6149-9		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS INSULINA PORCINA	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	C71			IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS INSULINA BOVINA	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	X52	5005738		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS OMEPRAZOL	KU/L	
Prueba	X55	5009868		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS LEVOTIROXINA	KU/L	
Prueba	Q91	5003907		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS TIOMERSAL	KU/L	
Prueba	Q73	5003799		IGE ESPECIFICO A MEDICAMENTOS AMBROXOL	KU/L	
Prueba	X12	5003804		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS FUROSEMIDA	KU/L	
Prueba	X14			IGE ESPECIFICO A MEDICAMENTOS HIDROCLOROTIAZIDA	KU/L	
Prueba	X38	5011561		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS OFLOXACINO SUERO	KU/L	

Código: RAST
Descripción: RAST (IGE ESPECÍFICA)
Técnica: CAP-SYSTEM

Código: RAST
 Comentario adicional: Suero
 Alternativa: Plasma de edta

Componentes						V. ref.
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	
Prueba	D205	63463-4		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rDer p 10 Tropomiosina D. pt	KU/L	(Inf. 0.10) No se detectan
Prueba	C05	6712-4		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS AMPICILINA SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	C06	6829-6		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS AMOXICILINA	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	C08	66717-0		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS CLORHEXIDINA	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	C308	16568-8		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS CEFUROXIMA	KU/L	
Prueba	E214	13833-9		IGE ESPECIFICA A ANIMALES PLUMAS PINZON	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	C71			IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS INSULINA BOVINA	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	C73	6148-1		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS INSULINA HUMANA	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	C74	7332-0		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS GELATINA	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E102	58772-5		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rCAn f 2 Perro	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E226	64973-1		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rCan f 5 perro	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	D01	6096-2		IGE ESPECIFICA A ACAROS DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	D02	6095-4		IGE ESPECIFICA A ACAROS DERMATOPHAGOIDES FARINAE SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	D03	14036-8		IGE ESPECIFICA A ACAROS DERMATOPHAGOIDES MICRO CERAS SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	D202	88708-3		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rDer p 1 D. Pteronyssimus	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	D203	63457-6		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rDer p 2 D. Pteronyssimus	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	D70	6254-7		IGE ESPECIFICA A ACAROS ACARUS SIRO SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)

Componentes						
Prueba	D71	6160-6		IGE ESPECIFICA A ACAROS LEPIDOGLYPHUS DESTRUCTOR SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	D72	6256-2		IGE ESPECIFICA A ACAROS TYROPHAGUS PUTRESCENTIAE SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	D73	6126-7		IGE ESPECIFICA A ACAROS GLYCYPHAGUS DOMESTICUS SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	D74	6114-3		IGE ESPECIFICA A ACAROS EUROGLYPHUS MAYNEI SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E01	6833-8		IGE ESPECIFICA A ANIMALES CASPA DE GATO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E203	10943-9		IGE ESPECIFICA A ANIMALES VISON	KU/L	(Inf. 0.10) No se detectan
Prueba	E03	6143-2		IGE ESPECIFICA A ANIMALES CASPA DE CABALLO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E04	6091-3		IGE ESPECIFICA A ANIMALES CASPA DE VACA	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E05	6098-8		IGE ESPECIFICA A ANIMALES CASPA DE PERRO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E06	6134-1		IGE ESPECIFICA A ANIMALES EPITELIO DE COBAYA	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E07	6217-4		RAST A ANIMALES EXCREMENTO DE PALOMA	KU/L	(Inf. 0.1)
Prueba	E101	58773-3		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rCan f 1Canis familiaris Perro	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E228	64976-4		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rFel d 4 gato	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E229			IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rCan f 4 Perro	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E200	16535-7		IGE ESPECIFICA A ANIMALES EXCREMENTO DE CANARIO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RE230			IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rCan f 6 Perro	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E70	6129-1		IGE ESPECIFICA A ANIMALES PLUMAS DE OCA SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E71	6179-6		IGE ESPECIFICA A ANIMALES EPITELIO DE RATON SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E72	6181-2		IGE ESPECIFICA A ANIMALES PROTEINAS DE ORINA DE RATON	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E73	6224-0		IGE ESPECIFICA A ANIMALES EPITELIO DE RATA SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E74	6226-5		IGE ESPECIFICA A ANIMALES PROTEINAS DE ORINA DE RATA SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)

Componentes						
Prueba	E75	6225-7		IGE ESPECIFICA A ANIMALES PROTEINAS SERICAS DE RATA	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E76	6180-4		IGE ESPECIFICA A ANIMALES PROTEINAS SERICAS DE RATON SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E77	6304-0		IGE ESPECIFICA A ANIMALES EXCREMENTOS DE PERIQUITO SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E78	6030-1		IGE ESPECIFICA A ANIMALES PLUMAS DE PERIQUITO (E78)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E80	6127-5		IGE ESPECIFICA A ANIMALES EPITELIO DE CABRA SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E81	6243-0		IGE ESPECIFICA A ANIMALES EPITELIO DE OVEJA (LANA)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E82	6223-2		IGE ESPECIFICA A ANIMALES EPITELIO DE CONEJO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E83	6262-0		IGE ESPECIFICA A ANIMALES EPITELIO DE CERDO SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E84	6135-8		IGE ESPECIFICA A ANIMALES EPITELIO DE HAMSTER	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E85	6070-7		IGE ESPECIFICA A ANIMALES PLUMAS DE POLLO SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E86	6100-2		IGE ESPECIFICA A ANIMALES PLUMAS DE PATO SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E87	19753-3		IGE ESPECIFICA A ANIMALES RATA	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E88	19751-7		IGE ESPECIFICA A ANIMALES RATON SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E89	7753-7		IGE ESPECIFICA A ANIMALES PLUMAS DE PAVO SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E94	64975-6		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rFel d1 Gato	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E227	64974-9		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE Equ c 1 Caballo	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	EX1	30185-3		IGE ESPECIFICA A CASPA ANIMALES MEZCLA (e1, e2, e4, e5)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	EX2	82047-2		IGE ESPECIFICA A ANIMALES MEZCLA (e1, e5, e6, e87, e88)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	F01	6106-9		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CLARA DE HUEVO SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F02	7258-7		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS LECHE DE VACA SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F03	6082-2		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS BACALAO (PESCADO) SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)

Componentes						
Prueba	F04	6276-0		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS TRIGO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F05	7674-5		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CENTENO SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F06	6037-6		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CEBADA SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F07	6190-3		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS AVENA SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F08	6087-1		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MAIZ SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F09	6230-7		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS ARROZ SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F10	6242-2		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS SEMILLA DE SESAMO SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F11	6054-1		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS TRIGO SARRACENO (ALFORFON)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F12	6204-2		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS GUISANTES SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F13	6206-7		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CACAHUETE SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F14	6248-9		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS SOJA SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F15	6279-4		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS JUDIA BLANCA SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F17	6136-6		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS AVELLANA SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F18	6050-9		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS NUEZ DE BRASIL SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F20	6019-4		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS ALMENDRA SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F23	6092-1		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CANGREJO DE MAR SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F54	7627-3		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS BONIATO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F24	6246-3		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CAMARON (LANGOSTINO) SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F25	6266-1		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS TOMATE SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F26	6219-0		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CARNE DE CERDO SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)

Componentes						
Prueba	G211	31000-3		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rPhl p 11 Hierba timotea	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F27	6039-2		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CARNE DE VACA (TERNERA)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F272	11202-9		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS ESTRAGON	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F277	7280-1		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS ENELDO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F288	7152-2		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS ARANDANO AZUL SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F301	10947-0		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CAQUI SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F31	6061-6		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS ZANAHORIA	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F316	11195-5		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS SEMILLA DE COLZA SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	G216	65775-9		IGE ESPECIFICA A NATIVO nCyn d 1 GRAMA (Cynodon dactylon)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RG208	30997-1		IGE ESPECIFICA A NATIVO nPhl p 4 polen HIERBA TIMOTEA	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F33	6194-5		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS NARANJA SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F333	7312-2		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS LINAZA SEMILLA DE LINO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F35	6220-8		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS PATATA SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F352	63477-4		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rAra h 8 PR-10 Cacahuete	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F36	6081-4		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS COCO SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F353	63476-6		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rGly m 4 PR-10, Soja	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F37	6048-3		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEJILLON SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F40	6270-3		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS ATUN SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F41	6237-2		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS SALMON SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F416	58752-7		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rTri a 19 Omega-5 Gliadina	KU/L	(Inf. 0.10)

Componentes						
Prueba	F420	59391-3		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rPru p3 (LTP) Melocoton	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F421	58775-8		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rPru p 4 profilina Melocoton	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F422	58779-0		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rAra h 1 Cacahuete	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F423	58778-2		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rAra h 2 Cacahuete	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F424	58777-4		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rAra h 3 Cacahuete	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F427	64965-7		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rAra h 9 (LTP) Cacahuete	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F430	64959-0		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rAct d8 PR-10 Kiwi	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F44	6257-0		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS FRESA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F45	6287-7		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS SACCHAROMYCES CEREVISIAE	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F47	6122-6		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS AJO SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F48	6193-7		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CEBOLLA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F49	6021-0		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MANZANA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RG209	30998-9		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rPhl p 6 Polen Hierba Timotea	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F55	6175-4		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MIJO COMUN SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F58	14038-4		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CALAMAR DEL PACIFICO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F59	10944-7		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS PULPO SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F60	11184-9		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS JUREL SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F75	6107-7		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS YEMA DE HUEVO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F76	7445-0		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS ALFA-LACTOALBUMINA (LECHE)	kU/L	(Inf. 0.10)

Componentes						
Prueba	F77	41397-1		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS BETA-LACTOGLOBULINA (LECHE)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F78	6062-4		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CASEINA (LECHE DE VACA) SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F79	6125-9		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS GLUTEN (TRIGO) SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F80	6165-5		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS BOGAVANTE SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F81	6067-3		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS QUESO (TIPO CHEDAR)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F82	6068-1		IGE ESPECIFICA A QUESO (CAMB.BRIE.GORG.ROQF)	KU/L	
Prueba	F83	6071-5		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CARNE DE POLLO SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F84	6154-9		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS KIWI SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F85	6065-7		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS APIO SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F86	6203-4		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS PEREJIL SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F87	57884-9		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MELON SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F88	6155-6		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CARNE DE CORDERO SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F89	6185-3		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MOSTAZA SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F90	6166-3		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MALTA SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F91	6167-1		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MANGO SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F92	6035-0		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS PLATANO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F93	6080-6		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CACAO SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F94	6207-5		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS PERA SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F95	6205-9		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MELOCOTON SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F98	82583-6		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS GLIADINA	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F426	63473-3		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rGad c 1; Parvalbumina Bacalao	KU/L	(Inf. 0.10)

Componentes						
Prueba	F433	64966-5		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rTri a 14 LTP Trigo	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F96	6033-5		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS AGUACATE SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	FX1	46708-4		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEZCLA (f13, f17, f18, f20, f36)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX14	75005-9		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEZCLA (f25, f214, f216, f218)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX15	69958-7		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEZCLA (f33, f49, f92, f95)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX16	82059-7		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEZCLA (f44, f94, f208, f210)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX2	46712-6		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEZCLA (f40, f3, f24, f37, f41)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX21	82098-5		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEZCLA (f210, f92, f84, f87, f95)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX3	52972-7		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEZCLA (f4, f7, f8, f10, f11)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX5E	30187-9		IGE ESPECIFICA A ALIMENTO MEZCLA (f1, f2, f3, f4, f13, f14)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX70	73712-2		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEZCLA (f272, f273, f274, f275)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX71	73714-8		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEZCLA (f265, f266, f267, f268)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX73	69922-3		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEZCLA (F83, F26, F27)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	I211	66714-7		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rVes v 1 Fosfolipasa A1 Avispa	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	G01	6261-2		IGE ESPECIFICA A POLENES DE GRAMINEAS ANTHOXANTHUM ODORATUM	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	G02	6041-8		IGE ESPECIFICA A POLENES DE GRAMINEAS CYNODON DACTYLON	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	G03	6195-2		IGE ESPECIFICA A POLENES DE GRAMINEAS DACTYLIS GLOMERATA	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	G04	6169-7		IGE ESPECIFICA A POLENES DE GRAMINEAS FESTUCA ELATIOR	KU/L	(Inf. 0.10)

Componentes						
Prueba	G05	7369-2		IGE ESPECIFICA A POLENES DE GRAMINEAS LOLIUM PERENNE	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	G06	6265-3		IGE ESPECIFICA A POLENES DE GRAMINEAS PHLEUM PRATENSE	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	G07	6855-1		IGE ESPECIFICA A POLENES DE GRAMINEAS PHRAGMITES COMMUNIS	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	G08	6153-1		IGE ESPECIFICA A POLENES DE GRAMINEAS POA PRATENSIS	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	G09	6228-1		IGE ESPECIFICA A POLENES DE GRAMINEAS AGROSTIS STOLONIFERA	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	G10	6152-3		IGE ESPECIFICA A POLENES DE GRAMINEAS SORGHUM HALEPENSE	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	G11	6053-3		IGE ESPECIFICA A POLENES DE GRAMINEAS BROMUS INERMIS	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	G12	6236-4		IGE ESPECIFICA A P. DE GRAMINEAS SECALE CEREALE (CENTENO)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	G13	6272-9		IGE ESPECIFICA A P. DE GRAMINEAS HOLCUS LANATUS (HENO B.)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	G14	6093-9		IGE ESPECIFICA A P. DE GRAMINEAS AVENA SATIVA (AVENA)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	G15	6277-8		IGE ESPECIFICA A P. DE GRAMINEAS TRITICUM SATIVUM (TRIGO)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	G16	6170-5		IGE ESPECIFICA A P. DE GRAMINEAS ALOPECURUS PRATENSIS	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	G17	6034-3		IGE ESPECIFICA A P. DE GRAMINEAS PASPALUM NOTATUM (H. BAHIA)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	G70	16922-7		IGE ESPECIFICA A P. DE GRAMINEAS ELYMUS TRITICOIDES	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	G71	6058-2		IGE ESPECIFICA A PHALARIS ARUNDINACEA (ALPISTE)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	GX1	30189-5		IGE ESPECIFICA A POLENES GRAMINEA MEZCLA(g3, g4, g5, g6, g8)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	GX2	30188-7		IGE ESPECIFICA A POLEN GRAMINEA MEZCLA(g2 g5,g6,g8,g10,g17)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	GX4	69960-3		IGE ESPECIFICA A POLEN GRAMINEAS MEZCLA(g1,g5,g7,g12,g13)	KU/L	(Inf. 0.35)

Componentes						
Prueba	H01	9828-5		IGE ESPECIFICA A POLVOS DE CASA (GREER)	KU/L	
Prueba	H02	7425-2		IGE ESPECIFICA A POLVOS DE CASA (HOLLISTER-STIER)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	HX2	37987-5		IGE ESPECIFICA A POLVO CASA MEZCLA (h2,d1,d2,i6)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	I01	6844-5		IGE ESPECIFICA A INSECTOS APIS MELLIFERA (VENENO DE ABEJA)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	I02	6280-2		IGE ESPECIFICA A INSECTOS DOLICHOVESPUA MACULATA SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	I03	6740-5		IGE ESPECIFICA A INSECTOS VESPUA SPP. (VENENO DE AVISPA)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	I04	6198-6		IGE ESPECIFICA A INSECTOS POLISTES SPP. (VENENO DE AVISPA)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	I05	6288-5		IGE ESPECIFICA A INSECTOS DOLICHOVESPUA ARENARIA (AVISPA)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	I06	6078-0		IGE ESPECIFICA A INSECTOS BLATELLA GERMANICA (CUCARACHA)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	I08	7502-8		IGE ESPECIFICA A INSECTOS GUSANO/MARIPOSA DE SEDA	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	I216	94276-3		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rApi m 5 Apis mellifera	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	I208	60421-5		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rApi m 1 Fosfolipasa A2 Abeja	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	I209	60240-9		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rVes v 5 Avispa	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	I214	79167-3		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rApi m 2 Abeja	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	I217	82613-1		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rApi m 10 Abeja	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	I210	63436-0		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rPol d 5 Avispa papel	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	I70	6117-6		IGE ESPECIFICA A INSECTOS SOLENOPSIS INVICTA (HORMIGA ROJA)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	I71	6177-0		IGE ESPECIFICA A INSECTOS AEDES COMMUNIS (MOSQUITO) SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	K202	10923-1		IGE ESPECIFICA A ENZIMAS BROMELINA Ananas comosus	KU/L	(Inf. 0.10)

Componentes						
Prueba	I73	6047-5		IGE ESPECIFICA A INSECTOS CHIRONOMUS THUMMI SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	I75	15342-9		IGE ESPECIFICA A INSECTOS AVISPÓN (VESPA CABRO)SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	I76	15339-5		IGE ESPECIFICA A INSECTOS TROGODERMA ANGUSTUM (ESCARABAJO)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	I77	58804-6		IGE ESPECIFICA A INSECTOS POLISTES DOMINULUS/ VENENO AVISPA	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	IGEPENIG	6851-0		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS PENICILINA G (PENICILOIL G)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	IGEPENIV	6210-9		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS PENICILINA V (PENICILOIL V)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	K215	50646-9		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rHev b1 Latex	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	K217	56595-2		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rHev b3 Latex	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RK204	11185-6		IGE ESPECIFICA A ENZIMAS MAXATASA Bacillus licheniformis	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	K224	50647-7		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rHev b 11 Latex	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	W13	6077-2		IGE ESPECIFICA A P. DE HERBACEAS XANTHIUM COMMUNE	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	W230	65782-5		IGE ESPECIFICA A NATIVO nAmb a 1 Ambrosía elatior	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	K72	6150-7		IGE ESPECIFICA A ALERGENOS OCUPACIONALES ISPAGHULA SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T25	60238-3		IGE ESPECIFICA A P. DE ARBOLES FRAXINIUS EXCELSIOR	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T73	6032-7		IGE ESPECIFICA A P. DE ARBOLES CASUARINA/PINO AUSTRALIANO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	K75	7431-0		IGE ESPECIFICA A ALERGENOS OCUPACIONALES ISOCIANATO TDI	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	K76	7430-2		IGE ESPECIFICA A ALERGENOS OCUPACIONALES ISOCIANATO MDI	KU/L	(Inf. 0.10)

Componentes						
Prueba	K77	7429-4		IGE ESPECIFICA A ALERGENOS OCUPACIONALES ISOCIANATO HDI	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	K78	6112-7		IGE ESPECIFICA A ALERGENOS OCUPACIONALES OXIDO DE ETILENO	KUA/L	(Inf. 0.10)
Prueba	K79	7601-8		IGE ESPECIFICA A ALERGENOS OCUPACIONALES ANHIDRIDO FTALICO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	K80	6119-2		IGE ESPECIFICA A ALERGENOS OCUPACIONALES FORMALDEHIDO SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	K81	6116-8		IGE ESPECIFICA A ALERGENOS OCUPACIONALES FICUS SPP SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	K82	6158-0		IGE ESPECIFICA A ALERGENOS OCUPACIONALES LATEX SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	K83	6089-7		IGE ESPECIFICA A ALERGENOS OCUPACIONALES SEMILLA DE ALGODON	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	K84	6258-8		IGE ESPECIFICA A ALERGENOS OCUPACIONALES SEMILLA DE GIRASOL	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T214	7275-1		IGE ESPECIFICA A P. DE ARBOLES P. CANARIENSIS (DATILERA)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T217	6213-3		IGE ESPECIFICA A ARBOLES PIMENTERO (Schinus molle)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	K87	7073-0		IGE ESPECIFICA A ALERGENOS OCUPACIONALES ALFA-AMILASA	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	M01	6212-5		IGE ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS PENICILLIUM NOTATUM SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	M02	6075-6		IGE ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS CLADOSPORIUM HERBARUM	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	M03	6025-1		IGE ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS ASPERGILLUS FUMIGATUS	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	M04	6182-0		IGE ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS MUCOR RACEMOSUS SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)

Componentes						
Prueba	M05	6059-0		IGE ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS CANDIDA ALBICANS SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	M06	6020-2		IGE ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS ALTERNARIA ALTERNATA	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	M07	6049-1		IGE ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS BOTRYTIS CINEREA SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	M08	6138-2		IGE ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS HELMINTHOSPORIUM HALODES	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	M09	6121-8		IGE ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS FUSARIUM MONILIFORME SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	M10	6252-1		IGE ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS STEMPHYLIUM BOTRYOSUM	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	M11	6229-9		IGE ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS RHIZOPUS NIGRICANS SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	M12	6029-3		IGE ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS AUREOBASIDIUM PULLULANS	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	M13	6216-6		IGE ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS PHOMA BETAE SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	M14	6111-9		IGE ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS EPICOCCUM PURPURASCENS	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	M15	6267-9		IGE ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS TRICHODERMA VIRIDE SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	M16	6094-7		IGE ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS CURVULARIA LUNATA SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	M205	6860-1		IGE ESPECIFICA A TRICHOPHYTON RUBRUM	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	M229	58774-1		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rAlt a 1 Alternaria alternata	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	W231	63458-4		IGE ESPECIFICA A NATIVO nArt v 1 Artemisia	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	M80	25821-0		IGE ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS STAPHYLOCOCCAL ENTEROTOXIN A	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	M81	25822-8		IGE ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS STAPHYLOCOCCAL ENTEROTOXIN B	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	MX1	41742-8		IGE ESPECIFICA A MOHOS MEZCLA (m1, m2, m3, m6)	KU/L	(Inf. 0.35)

Componentes						
Prueba	MX2	30183-8		IGE ESPECIFICA A MOHOS MEZCLA (m1, m2, m3, m5, m6,m8)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	MX4	51529-6		IGE ESPECIFICA MOHOS MEZCLA (m3, m207, m36, m228)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	O70	6240-6		IGE ESPECIFICA A FLUIDO SEMINAL SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	P01	6022-8		IGE ESPECIFICA A PARASITOS ASCARIS SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	P04	10919-9		IGE ESPECIFICA A PARASITOS ANISAKIS (EN PESCADO)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T218	6164-8		IGE ESPECIFICA A P. ÁRBOLES QUERCUS VIRGINIANA	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	PHADIAT	57036-6		SCREENING DE NEUMOALERGENOS	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	T222	11168-2		IGE ESPECIFICA A P. DE ARBOLES CUPRESSUS ARIZONICA	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T225	82572-9		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rBbet v 6 POLEN ABEDUL	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T227	65779-1		IGE ESPECIFICA A NATIVO nOle e 7 (LTP) Olivo	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T240	65780-9		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rOle e 9 (Glucanasa) Olivo	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	M204	11204-5		IGE ESPECIFICA A MOHOS ULOCLADIUM CHARTARUM	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	M211	25801-2		IGE ESPECIFICA A TRICHOPHYTON MENT. VAR INTERDIGITALE	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RBETV1	30984-9		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rbet v1 Polen Abedul	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RBETV2	30985-6		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rbet v2 profilina Polen Abedul	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RC202	11201-1		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS SUXAMETHONIUM (SUCCINILCOLINA)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	M227	51857-1		IGE ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS MALASSEZIA SPP	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RC7	19733-5		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS CEFACLOX	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RD201	10921-5		IGE ESPECIFICA A ACAROS BLOMIA TROPICALIS	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RE201	7171-2		IGE ESPECIFICA A ANIMALES PLUMAS DE CANARIO	KU/L	(Inf. 0.10)

Componentes						
Prueba	RE204	10922-3		IGE ESPECIFICA A ANIMALES BSA (SUERO DE ALBUMINA BOVINA)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RE206	10960-3		IGE ESPECIFICA A ANIMALES SUERO DE CONEJO SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RE208	30987-2		IGE ESPECIFICA A ANIMALES EPITELIO DE CHINCHILLA	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RE209	7334-6		IGE ESPECIFICA A ANIMALES GERBO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RE211	10961-1		IGE ESPECIFICA A PROTEINA ORINA DE CONEJO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RE213	6202-6		IGE ESPECIFICA A ANIMALES PLUMAS DE LORO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RE215	10948-8		IGE ESPECIFICA A ANIMALES PLUMAS DE PALOMA	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RE217	11172-4		IGE ESPECIFICA A ANIMALES EPITELIO DE HURON	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RE218	19734-3		IGE ESPECIFICA A ANIMALES EXCREMENTO DE POLLO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RE219	6836-1		IGE ESPECIFICA A PROTEINAS DE SUERO DE POLLO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RE220	19732-7		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rFel d 2 Albúmina sérica gato	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RE221	19738-4		IGE ESPECIFICA A NATIVO nCan F3 SEROALBÚMINA PERRO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RE222	19759-0		IGE ESPECIFICA A ANIMALES ALBUMINA SERICA PORCINA	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF201	6208-3		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS NUEZ LISA (PACANA) SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF202	6718-1		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS NUEZ DE ACAJU (ANACARDO) SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF203	7613-3		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS PISTACHO SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF204	6268-7		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS TRUCHA	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF205	6139-0		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS ARENQUE SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF206	7474-0		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CABALLA	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF207	6076-4		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS ALMEJA SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF208	6159-8		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS LIMON SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)

Componentes						
Prueba	RF209	6131-7		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS POMELO SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF210	6218-2		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS PIÑA SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF211	7151-4		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MORA SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF212	6848-6		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CHAMPIÑON SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF213	7642-2		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CARNE DE CONEJO SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF214	6856-9		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS ESPINACA SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF215	6161-4		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS LECHUGA SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF216	7169-6		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS COL (REPOLLO) SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF217	7160-5		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS COLES DE BRUSELAS SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF218	7563-0		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS PIMIENTA ROJA/PIMENTON/PIMIENTO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF220	6837-9		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CANELA SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF221	6083-0		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CAFE SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RM36	6026-9		IGE ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS ASPERGILLUS TERREUS	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF225	6854-4		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CALABAZA SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF226	11193-0		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS SEMILLA DE CALABAZA SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF227	24165-3		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS SEMILLA DE REMOLACHA (F319) SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF231	10940-5		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS LECHE HERVIDA SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF232	7556-4		IGE ESPECIFICA A NATIVO nGal d 2, Ovoalbumina huevo	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF233	7557-2		IGE ESPECIFICA A NATIVO nGal d1, Ovomucoide huevo	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF234	7756-0		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS VAINILLA	KU/L	(Inf. 0.10)

Componentes						
Prueba	RF235			IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS LENTEJAS SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF236	7774-3		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS SUERO DE LA LECHE SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF237	7091-2		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS ALBARICOQUE SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF242	6719-9		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CEREZA SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF244	6724-9		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS PEPINO SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF245	7291-8		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS HUEVO ENTERO SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF246	10933-0		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS GUAR (CYAMOPSIS TETRAGONOLOBUS)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF247	7412-0		RAST A ALIMENTOS MIEL SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF253	10954-6		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS PIÑONES (PONUS EDULES) SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF255	6853-6		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CIRUELA SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF256	6273-7		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS NUEZ DE NOGAL SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF258	6858-5		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CALAMAR SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF259	6841-1		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS UVA	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF260	6052-5		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS BRECOL SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF261	7099-5		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS ESPARRAGO SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF262	7296-7		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS BERENJENA SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF263	6852-8		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS PIMIENTA VERDE	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RM228	6024-4		IGE ESPECIFICA A ASPERGILLUS FLAVUS	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF268	7234-8		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CLAVO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF269	7118-3		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS ALBAHACA SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)

Componentes						
Prueba	RF270	7335-3		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS JENGIBRE SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF271	7081-3		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS ANIS (PIPINELLA ANISUM)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF273	7737-0		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS TOMILLO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF276	10928-0		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS HINOJO FRESCO SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF278	7125-8		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS HOJA DE LAUREL SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	O215	73837-7		IGE ESPECIFICA A NATIVO nGal-Alpha 1,3 Gal TG bovine	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF280	6045-9		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS PIMIENTA NEGRA SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF281	7270-2		IGE ESPECIFICA A CURRY SUERO	KU/L	(Inf. 0.1)
Prueba	RF282	6188-7		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS NUEZ MOSCADA SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF283	7552-3		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS OREGANO SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF284	6271-1		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CARNE DE PAVO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF286	10936-3		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS LECHE DE YEGUA SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF287	7129-0		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS JUDIA PINTA	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF289	31002-9		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS DATIL SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF290	7558-0		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS OSTRA SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF291	6835-3		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS COLIFLOR SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RO214	58984-6		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE CCD; MUXF3 DE BROMELIA	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF293	6850-2		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS PAPAYA SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF294	10946-2		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MARACUYA SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF296	7179-5		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS ALGARROBA SUERO (E 410)	KU/L	(Inf. 0.10)

Componentes						
Prueba	RF297	7382-5		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS GOMA ARABIGA (E 414)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	U254			IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS ROCURONIO SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF299	6259-6		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CASTAÑA SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF300	7340-3		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS LECHE DE CABRA SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	I215	94275-5		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rApi m 3 Fosfatasa ác. Abeja	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF302	7731-3		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MANDARINA SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF303	6842-9		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS HALIBUT/ FLETAN SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF304	6249-7		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS LANGOSTA SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF306	7464-1		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS LIMA SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF307	19741-8		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MERLUZA SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF308	11197-1		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS SARDINA SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF309	7573-9		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS GARBANZO SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	W203	6084-8		RAST A POLENES HERBACEAS BRASSICA NAPUS (COLZA)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF311	10939-7		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS GALLO (PESCADO) SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF312	7728-9		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS EMPERADOR (PEZ ESPADA) SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF313	7079-7		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS ANCHOA (BOQUERON) SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF314	11200-3		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CARACOL SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF315	6831-2		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS JUDIA VERDE SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF317	16650-4		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CILANTRO SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)

Componentes						
Prueba	RF319	19728-5		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS REMOLACHA SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF320	7265-2		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CANGREJO DE RIO SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF323	25615-6		IGE ESPECIFICA A NATIVO nGal d3; Conalbumina huevo	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RLEPD2	64981-4		IGE ESPECIFICA Lepidoglyphus destructor (rLep d 2)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF325	19756-6		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS LECHE DE OVEJA SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF326	19757-4		IGE ESPECIFICA A SUERO DE LECHE DE OVEJA	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF328	11173-2		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS HIGO SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF329	7770-1		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS SANDIA SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF331	19755-8		IGE ESPECIFICA A AZAFRAN SUERO	KU/L	(Inf. 0.1)
Prueba	RF332	11190-6		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MENTA	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E231R	94278-9		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rFel d 7gato	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF335	50650-1		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS ALTRAMUZ SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF338	7691-9		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS VIEIRA	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF340	25609-9		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS EXTRACTO DE COCHINILLA (E 120)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF342	21428-8		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS OLIVA (ACEITUNA)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF343	7656-2		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS FRAMBUESA SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F51	10920-7		IGE ESPECIFICA A BAMBU MOSO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF345	11183-1		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS NUEZ DE MACADAMIA	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF351	58986-1		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rPen a 1 Tropomiosina Camarón	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RG201	7116-7		IGE ESPECIFICA A P. DE GRAMINEAS HORDEUM VULGARE (CEBADA)	KU/L	(Inf. 0.10)

Componentes						
Prueba	RG202	7248-8		IGE ESPECIFICA A POLENES DE GRAMINEAS ZEA MAYS (MAIZ)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RG205	30994-8		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rPhl p 1 Polen Hierba Timotea	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RG206	30995-5		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rPhl p2 Polen Hierba Timotea	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RG210	30999-7		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rPhl p 7 Polen Hierba Timotea	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RG212	34428-3		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rPhl p 12 profilina H. Timotea	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RG213	34429-1		IGE ESPECIFICA RECOMBINANTE rPhl p1+rPhl p5b Hierba Timotea	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	RG214	34430-9		IGE ESPECIFICA RECOMBINANTE rPhl p7+rPhl p12 Hierba Timotea	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	RG215	58981-2		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rPhl p5b Polen Hierba Timotea	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RI203	10938-9		IGE ESPECIFICA A INSECTOS MARIPOSA DE LA HARINA	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RI204	6144-0		IGE ESPECIFICA A INSECTOS TABANO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RI205	6056-6		IGE ESPECIFICA A INSECTOS ABEJORRO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RI206	30170-5		IGE ESPECIFICA A INSECTOS PERIPLANETA AMERICANA	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F124	33002-7		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS ESCANDA (TRITICUM SPELTA)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F222	6264-6		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS TE	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F224	7623-2		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS SEMILLA DE AMAPOLA SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RK208	11182-3		IGE ESPECIFICA A NATIVO nGal d 4; Lisoizima huevo de gallina	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F254	10959-5		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS PLATILJA	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F274	10937-1		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEJORANA SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F337	7709-9		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS LENGUADO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F347	25743-6		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS QUINOA SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)

Componentes						
Prueba	F355	66445-8		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rCyp c1; Parvalbumina Carpa	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RK218	56596-0		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rHev b 5 Latex	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F413	11191-4		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CARBONERO SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RK220	50649-3		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rHev b 6,02 Latex	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RK221	56597-8		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rHev b 8 Profilina Latex	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F414			IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS TILAPIA	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F417	64960-8		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rApi g 1.01 PR-10 Apio	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RM201	14104-4		IGE ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS USTILAGO NUDA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F419	58776-6		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rPru p1 (PR-10) Melocotón	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RM207	6830-4		IGE ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS ASPERGILLUS NIGER SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RM208	7200-9		IGE ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS CHAETOMIUM GLOBOSUM	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RM209	11187-2		IGE ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS PENICILLIUM FREQUENTANS	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RM218	30986-4		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rAsp f 1 Aspergillus fumigatus	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RM219	30990-6		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rAsp f 2 Aspergillus fumigatus	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RM220	30991-4		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rAsp f 3 Aspergillus fumigatus	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RM221	30992-2		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rAsp f 4 Aspergillus fumigatus	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RM222	30993-0		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rAsp f 6 Aspergillus fumigatus	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RM223	25824-4		IGE ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS STAPHYLOCOCCAL ENTEROTOXIN C	kU/L	(Inf. 0.10)

Componentes						
Prueba	RM226	51856-3		IGE ESPECIFICA A ENTEROTOXINA TSST STAPHYLOC. SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F425	58753-5		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rCor a 8 LTP Avellana	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F428	69421-6		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rCor a 1 PR-10 Avellana	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F432	65772-6		IGE ESPECIFICA A NATIVO nGly m 6 Glicinina Soja	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RO209			IGE ESPECIFICA A PITYROSPORUM ORBICULARE (M70)	KU/L	
Prueba	RO213	91122-2		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE MALTOSA-BINDING PROTEIN	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RS201	5010112		IGE ESPECIFICA A NYLON	KU/L	
Prueba	RS204	7251-2		IGE ESPECIFICA A ALGODON (TRATADO FIBRA) O1 SUERO	KU/L	(Inf. 0.1)
Prueba	RS205	6245-5		IGE ESPECIFICA LANA TRATADA (K20)	U/mL	
Prueba	RS210	6187-9		IGE ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS NEUROSPORA SITOPHILA SUERO	KU/L	
Prueba	RS211	5010189		RAST A ANIMALES SUERO DE PALOMA	KU/L	
Prueba	F434	64961-6		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rMal d 1 PR-10 MANZANA	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RS221	54916-2		RAST A ALIMENTOS RAPE (PESCADO) SUERO	KU/L	
Prueba	F435	81791-6		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rMal d 3 LTP MANZANA	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F439	81788-2		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rCor A 14 AVELLANA	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RS225	6162-2		IGE ESPECIFICO ARBOLES SYRINGA VULGARIS (POLEN LILA) (T250)	KU/L	
Prueba	RS226			IGE ESPECIFICA A TERYLENE	KU/L	
Prueba	RS227	7719-8		IGE ESPECIFICA A STAPHYLOCOCCUS AUREUS ENTERO TSST	KU/L	
Prueba	F440	65765-0		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rCor A 9 AVELLANA	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RS231	54909-7		RAST A INSECTOS CULEX PIPIENS (MOSQUITO)	KU/L	
Prueba	RS233	49715-6		IGE ESPECIFICA A ANIMALES MOSCA DOMESTICA	KU/L	

Componentes						
Prueba	RS236	21471-8		RAST A ALIMENTOS GRANADA SUERO	KU/L	
Prueba	RS237	7094-6		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS ALCACHOFA SUERO (F358)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	RS238	16101-8		RAST A ALIMENTOS COMINO	KU/L	
Prueba	RS239	6073-1		RAST A ALIMENTOS CHOCOLATE SUERO	KU/L	
Prueba	RS240	7523-4		RAST A NECTARINA	KU/L	
Prueba	RS241	56746-1		RAST A ALIMENTOS PUERRO SUERO	KU/L	
Prueba	RS242	5007007		RAST A ALIMENTOS ACELGA SUERO	KU/L	
Prueba	RS243	54930-3		RAST A ALIMENTOS HABA SUERO	KU/L	
Prueba	RS244	5003909		RAST A ALIMENTOS LUBINA SUERO	KU/L	
Prueba	F441	81790-8		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rJug r 1 Nuez	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RS246	7718-0		RAST A ALIMENTOS CALABACIN	KU/L	
Prueba	F442	81789-0		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rJug r 3 LTP Nuez	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RS249	7596-0		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS PIMIENTA BLANCA	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RT201	6857-7		IGE ESPECIFICA A POLENES DE ARBOLES PICEA EXCELSA (ABETO)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RT203	7220-7		IGE ESPECIFICA A P. DE ARBOLES AESCULUS HIPPOCASTANUM	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RT205	6108-5		IGE ESPECIFICA A POLENES DE ARBOLES SAMBUCUS NIGRA (SAUCO)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RT206	6069-9		IGE ESPECIFICA A P. DE ARBOLES CASTANEA SATIVA (CASTAÑO)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RT208	11179-9		IGE ESPECIFICA A POLENES DE ARBOLES TILIA CORDATA (TILO)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RT209	7416-1		IGE ESPECIFICA A P. DE ARBOLES CARPINUS BETULUS (CARPE)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RT210	7632-3		IGE ESPECIFICA A P. DE ARBOLES LIGUSTRUM VULGARE	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RT212	26049-7		IGE ESPECIFICA A P. DE ARBOLES LIBOCEDRUS DECURRENS	KU/L	(Inf. 0.10)

Componentes						
Prueba	RT213	7609-1		IGE ESPECIFICA A PINUS RADIATA	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RW204	7726-3		IGE ESPECIFICA A P. DE HERBACEAS HELIANTHUS ANNUUS (GIRASOL)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F454			IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rPru p 7 Melocoton	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T01	7155-5		IGE ESPECIFICA A P. DE ARBOLES ACER NEGUNDO (ARCE, SICOMORO)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T02	15284-3		IGE ESPECIFICA A P. DE ARBOLES ALNUS INCANA (ALISO GRIS)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T03	15283-5		IGE ESPECIFICA A P. DE ARBOLES BETULA VERRUCOSA (ABEDUL)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T04	6137-4		IGE ESPECIFICA A P. DE ARBOLES CORYLUS AVELLANA (AVELLANO)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T05	6038-4		IGE ESPECIFICA A POLENES DE ARBOLES FAGUS GRANDIFOLIA (HAYA)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T06	6178-8		IGE ESPECIFICA A P. DE ARBOLES JUNIPERUS SABINOIDES (SABINA)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T07	6189-5		IGE ESPECIFICA A P. DE ARBOLES QUERCUS ALBA (ROBLE, ENCINA)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T08	6109-3		IGE ESPECIFICA A POLENES DE ARBOLES ULMUS AMERICANA (OLMO)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T09	6192-9		IGE ESPECIFICA A POLENES DE ARBOLES OLEA EUROPAEA (OLIVO)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T10	33982-0		IGE ESPECIFICA A P. DE ARBOLES JUGLANS CALIFORNIA (NOGAL)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T11	15285-0		IGE ESPECIFICA A P. DE ARBOLES PLATANUS ACERIFOLIA (PLATANO)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T12	6285-1		IGE ESPECIFICA A POLENES DE ARBOLES SALIX CAPREA (SAUCE)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T14	6090-5		IGE ESPECIFICA A P. DE ARBOLES POPULUS DELTOIDES	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T15	6278-6		IGE ESPECIFICA A P. DE ARBOLES FRAXINUS AMERICANA	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T16	6282-8		IGE ESPECIFICA A POLENES DE ARBOLES PINUS STROBUS (PINO)	KU/L	(Inf. 0.10)

Componentes						
Prueba	T17	14035-0		IGE ESPECIFICA A P. DE ARBOLES CRYPTOMERIA JAPONICA	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T18	6113-5		IGE ESPECIFICA A P. DE ARBOLES EUCALYPTUS SPP (EUCALIPTUS)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T19	6015-2		IGE ESPECIFICA A P. DE ARBOLES ACACIA LONGIFOLIA (ACACIA)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T20	6173-9		IGE ESPECIFICA A P. DE ARBOLES PROSOPIS JULIFLORA (MEZQUITE)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T21	6171-3		IGE ESPECIFICA A P. DE ARBOLES MELALEUCA LEUCADENDRON	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T211	6260-4		IGE ESPECIFICA A P. DE ARBOLES AMBAR	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T22	6209-1		IGE ESPECIFICA A P. DE ARBOLES CARYA PECAN (NOGAL AMERICANO)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T220	34250-1		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rBet v4 Polcalcina Abedul	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T223	40790-8		IGE ESPECIFICA A POLENES DE ARBOLES ELAIS GUINEENSIS PALMERA	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T241	64969-9		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE nPla a 1 Platanus	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T224	58754-3		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rOle e 1Polen Olivo	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T226	65778-3		IGE ESPECIFICA A NATIVO nCup a 1 Cipres	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T23	6151-5		IGE ESPECIFICA A P. DE ARBOLES CUPRESSUS SEMPERVIRENS	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T70	6281-0		IGE ESPECIFICA A POLENES DE ARBOLES MORUS ALBA (MORERA)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T72	6222-4		IGE ESPECIFICA A P. DE ARBOLES ARECASTRUM ROMANZOFFIANUM	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF341	7262-9		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS ARANDANO ROJO SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	TX5	69959-5		IGE ESPECIFICA A POLEN ARBOLES MEZCLA(t2,t4,t8,t12,t14)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	TX7	30182-0		IGE ESPECIFICA A POLEN ARBOL MEZCLA(t9,t12,t16,t18,t19,t21)	KU/L	(Inf. 0.35)

Componentes						
Prueba	W01	6085-5		IGE ESPECIFICA A P. DE HERBACEAS AMBROSIA ELATIOR	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	W02	6275-2		IGE ESPECIFICA A P. DE HERBACEAS AMBROSIA PSILOSTACHYA	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	W03	6124-2		IGE ESPECIFICA A P. DE HERBACEAS AMBROSIA TRIFIDA	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	W04	6115-0		IGE ESPECIFICA A P. DE HERBACEAS FRANSERIA ACANTHICARPA	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	W05	6286-9		IGE ESPECIFICA A P. DE HERBACEAS A. ABSINTHIUM (AJENJO)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	W06	6183-8		IGE ESPECIFICA A P. DE HERBACEAS A. VULGARIS (ARTEMISA)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	W07	6196-0		IGE ESPECIFICA A P. DE HERBACEAS CHRYSANTHEMUM LEUCANTHEMUM	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	W08	6097-0		IGE ESPECIFICA A P. DE HERBACEAS TARAXACUM VULGARE	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	W09	6110-1		IGE ESPECIFICA A P. DE HERBACEAS PLANTAGO LANCEOLATA	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	W10	6156-4		IGE ESPECIFICA A P. DE HERBACEAS CHENOPODIUM ALBUM (CEÑIGO)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	W11	6234-9		IGE ESPECIFICA A P. DE HERBACEAS SALSOLA KALI	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	W12	6128-3		IGE ESPECIFICA A P. DE HERBACEAS SOLIDAGO VIRGAUREA	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	W14	7604-2		IGE ESPECIFICA A P. DE HERBACEAS AMARANTHUS RETROFLEXUS	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	W15	6239-8		IGE ESPECIFICA A P. DE HERBACEAS ATRIPLEX LENTIFORMIS	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	W207	11180-7		IGE ESPECIFICA A POLENES HERBACEAS LUPINO(LUPINUS SPP)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	W16	6232-3		IGE ESPECIFICA A POLENES DE HERBACEAS IVA CILIATA (GILDE)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	W17	6118-4		IGE ESPECIFICA A POLENES DE HERBACEAS KOCHIA SCOPARIA	KU/L	(Inf. 0.10)

Componentes						
Prueba	W18	6244-8		IGE ESPECIFICA A P. DE HERBACEAS RUMEX ACETOSELLA	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	W19	6200-0		IGE ESPECIFICA A P. DE HERBACEAS PARIETARIA OFFICINALIS	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	W20	6186-1		IGE ESPECIFICA A POLENES DE HERBACEAS URTICA DIOICA (ORTIGA)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	W206	6057-4		IGE ESPECIFICA A MATRICARIA CHAMOMILLA (MANZANILLA)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	W21	6199-4		IGE ESPECIFICA A POLENES DE HERBACEAS PARIETARIA JUDAICA	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	W211	56882-4		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rPar j 2 LTP P. judaica	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	W232	65784-1		IGE ESPECIFICA A NATIVO nSal k 1 Salsola	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	W233	65783-3		IGE ESPECIFICA A NATIVO nArt v 3 (LTP) Artemisia	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	WX1	24480-6		IGE ESPECIFICA A POLEN HERBACEAS MEZCLA(w1,w6,w9,w10,w11)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	WX2	24493-9		IGE ESPECIFICA A POLEN HERBACEA MEZCLA(w2,w6,w9,w10,w15)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	WX5	63197-8		IGE ESPECIFICA A POLEN HERBACEA MEZCLA(w1,w6,w7,w8,w12)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	F61	30989-8		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS SARDINA JAPONESA SUERO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F431	73719-7		IGE ESPECIFICA A NATIVO nGly m 5 (Betaconglucina) Soja	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F354	64963-2		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rBer e 1 Nuez de Brasil	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	W234	64972-3		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rPla l 1 Plantago lanceolata	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	D209	96278-7		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rDer p 23 D. Pteronyssinus	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F447	90880-6		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rAra h 6 CACAHUETE	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F443	82539-8		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rAna o 3 Anacardo	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	O211			IGE ESPECIFICA A INSECTOS GUSANO DE LA HARINA	KU/L	(Inf. 0.10)

Componentes						
Prueba	RS258			IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS PANGA (PESCADO) SUERO	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	RS250	5003088		RAST A ALIMENTOS SEPIA (PESCADO) SUERO	KU/L	
Prueba	RS254	5003910		RAST A ALIMENTOS DORADA (PESCADO) SUERO	KU/L	
	RS256					
Prueba	ALMOREIGE			RAST A ALMOREJO	KU/L	
Prueba	F248	30043-4		IgE ESPECÍFICA Romero (Rosmarinus officinalis) suero	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	I207	25611-5		IgE ESPECÍFICA Cucaracha oriental (blatta orientalis)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	RS257	5004918		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS PARAGUAYO SUERO	KU/L	
Prueba	X45	5009873		IGE ESPECIFICA A CROMO	KU/L	
Prueba	RS252	7304-9		IGE ESPECIFICO A ALIMENTOS ENDIVIA SUERO	KU/L	
Prueba	X09	5010565		IGE ESPECIFICA A CLORURO DE ALUMINIO	KU/L	
Prueba	X41			IGE ESPECIFICA A ASPARTAMO	KU/L	
Prueba	X28	5003802		IGE ESPECIFICA A ACIDO SORBICO	KU/L	
Prueba	X32			IGE ESPECIFICA A XILENO	KU/L	
Prueba	X34			IGE ESPECIFICA A ISOPROPANOL	KU/L	
Prueba	X47			IGE ESPECIFICO A ACIDO MOLIBDICO	KU/L	
Prueba	F219	10929-8		IgE ESPECÍFICA Hinojo semilla SUERO	KU/L	(Inf. 0.1)

Código: RAST_2
Descripción: RAST A MEZCLAS DE ALERGENOS
Técnica: CAP-SYSTEM
Comentario adicional: Suero.
 Alternativa: plasma EDTA

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	EX72	73713-0		IGE ESPECIFICA A PLUMAS AVES MEZCLA (e201, e213, e214, e78)	KUI/L	(Inf. 0.35)
Prueba	EX1	30185-3		IGE ESPECIFICA A CASPA ANIMALES MEZCLA (e1, e2, e4, e5)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX13	69931-4		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEZCLA (f12,f15,f31,f35)	KU/L	(Inf. 0.35)

Componentes						
Prueba	FX17	46714-2		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEZCLA (f49, f92, f94, f95)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX20	46713-4		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEZCLA (f4, f5, f6, f9)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX74	51828-2		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEZCLA (f3, rf205, rf206, rf254)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	TX1	30184-6		IGE ESPECIFICA A POLEN ARBOLES MEZCLA(t1,t3,t7,t8,t10)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	WX3	82041-5		IGE ESPECIFICA A POLEN HERBACEA MEZCLA(w6,w9,w10,w12,w20)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	WX7	82045-6		IGE ESPECIFICA A POLEN HERBACEA MEZCLA(w7,w8,w9,w10,w12)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX25	82582-8		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEZCLA (f10, f45, f47, f85)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	EX2	82047-2		IGE ESPECIFICA A ANIMALES MEZCLA (e1, e5, e6, e87, e88)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	EX70	71370-1		IGE ESPECIFICA A ANIMALES MEZCLA(e6, e82, e84, e87, e88)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX27			IGE ESPECIFICA ALIMENTOS MEZCLA (f3, f4, f14, f17)	KU/L	
Prueba	EX71	72279-3		IGE ESPECIFICA A PLUMAS AVES MEZCLA (e70, e85, e86,e89)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX1	46708-4		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEZCLA (f13, f17, f18, f20, f36)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX2	46712-6		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEZCLA (f40, f3, f24, f37, f41)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX3	52972-7		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEZCLA (f4, f7, f8, f10, f11)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX5E	30187-9		IGE ESPECIFICA A ALIMENTO MEZCLA (f1, f2, f3, f4, f13, f14)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX7	47302-5		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEZCLA (f25,f45,f47,f48,f85)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX14	75005-9		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEZCLA (f25, f214, f216, f218)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX15	69958-7		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEZCLA (f33, f49, f92, f95)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX16	82059-7		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEZCLA (f44, f94, f208, f210)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX18	73711-4		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEZCLA (f12,f13,f14)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX21	82098-5		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEZCLA (f210, f92, f84, f87, f95)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX22	46707-6		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEZCLA (f256, f202, 203, 201)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX24	50655-0		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEZCLA (f17,f24,f84,f92)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX70	73712-2		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEZCLA (f272, f273, f274, f275)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX71	73714-8		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEZCLA (f265, f266, f267, f268)	KU/L	(Inf. 0.35)

Componentes						
Prueba	GX1	30189-5		IGE ESPECIFICA A POLENES GRAMINEA MEZCLA(g3, g4, g5, g6, g8)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	GX2	30188-7		IGE ESPECIFICA A POLEN GRAMINEA MEZCLA(g2 g5,g6,g8,g10,g17)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	GX3	50654-3		IGE ESPECIFICA A POLEN GRAMINEAS MEZCLA (g1,g5,g6,g12,g13)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	GX4	69960-3		IGE ESPECIFICA A POLEN GRAMINEAS MEZCLA(g1,g5,g7,g12,g13)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	HX2	37987-5		IGE ESPECIFICA A POLVO CASA MEZCLA (h2,d1,d2,i6)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	RX1	82103-3		IGE ESPECIFICA A OTRAS MEZCLAS REGIONALES(g6,t3,w6,w9,w21)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	RX2	82105-8		IGE ESPECIFICA A OTRAS MEZCLAS REGIONALES(d2,e1,e3,e5,m6)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	RX3	82107-4		IGE ESPECIFICA A MEZCLAS REGIONALES(g2,g5,g17,w1,w9,w10)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	RX5	37988-3		IGE ESPECIFICA A OTRAS MEZCLAS REGIONALES(d1,e1,i6,m3)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	TX4	24491-3		IGE ESPECIFICA A POLEN ARBOLES MEZCLA(t7,t8,t11,t12,t14)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	TX5	69959-5		IGE ESPECIFICA A POLEN ARBOLES MEZCLA(t2,t4,t8,t12,t14)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	TX6	82035-7		IGE ESPECIFICA A POLEN ARBOLES MEZCLA(t1,t3,t5,t7,t10)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	TX7	30182-0		IGE ESPECIFICA A POLEN ARBOL MEZCLA(t9,t12,t16,t18,t19,t21)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	TX8	50653-5		IGE ESPECIFICA A POLEN ARBOLES MEZCLA(t1,t3,t4,t7,t11)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	TX9	71371-9		IGE ESPECIFICA A POLEN ARBOLES MEZCLA(t2,t3,t4,t7,t12)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	WX1	24480-6		IGE ESPECIFICA A POLEN HERBACEAS MEZCLA(w1,w6,w9,w10,w11)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	WX2	24493-9		IGE ESPECIFICA A POLEN HERBACEA MEZCLA(w2,w6,w9,w10,w15)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	WX5	63197-8		IGE ESPECIFICA A POLEN HERBACEA MEZCLA(w1,w6,w7,w8,w12)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	WX6	63198-6		IGE ESPECIFICA A POLENES HERBACEAS MEZCLA (w9-w10-w11-w18)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	MX1	41742-8		IGE ESPECIFICA A MOHOS MEZCLA (m1, m2, m3, m6)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	MX2	30183-8		IGE ESPECIFICA A MOHOS MEZCLA (m1, m2, m3, m5, m6,m8)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX73	69922-3		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEZCLA (F83, F26, F27)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	PHADIAT	57036-6		SCREENING DE NEUMOALERGENOS	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	PHADIAINFA	57742-9		SCREENING NEUMOALERGENOS INFANTIL	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	RG213	34429-1		IGE ESPECIFICA RECOMBINANTE rPhl p1+rPhl p5b Hierba Timotea	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	RG214	34430-9		IGE ESPECIFICA RECOMBINANTE rPhl p7+rPhl p12 Hierba Timotea	KU/L	(Inf. 0.35)

Componentes						
Prueba	T221	51524-7		IGE ESPECIFICA RECOMBINANTE Rbet v 2+rbet v ABEDUL	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	GX6	82100-9		RAST A POLENES DE GRAMINEAS MEZCLA (g2,g5,g10,g11 g13,g17)	KU/L	
Prueba	MX4	51529-6		IGE ESPECIFICA MOHOS MEZCLA (m3, m207, m36, m228)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	ALEX			IgE ESPECÍFICA MULTIPLEX (ALEX TEST), SUERO		

Descripción: REABSORCION TUBULAR DE FOSFATOS
Código: REABFOS
Técnica: Fórmula
Unidades: %
Plazo: 3 días
Tubo: Orina 24 Horas
Comentario adicional: Se requiere orina de 24 horas y suero
Valores de referencia: (82 - 95)

Descripción: REACCION EOSINOFILICA EN ESPECIMEN
Código: EOSINESP
Técnica: Microscopía óptica
Unidades:
Plazo:
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: RECEPTOR ACETILCOLINA AC. SUERO
Código: RECEPACEAC
Técnica: ELISA
Unidades: nmol/L
Plazo: 12 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 0.45) Negativo

Descripción: Receptor hormona de crecimiento: gen GH (NGS)
Código: GHRECEPTOR
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: RECEPTOR SOLUBLE TRANSFERRINA SUERO
Código: RECSOLTRAN

Descripción: RECEPTOR SOLUBLE TRANSFERRINA SUERO
Técnica: Inmunoturbidimetría
Unidades: mg/L
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero refrigerado.
 Volumen: 1.0 mL
 Volumen mínimo: 0.50 mL
Valores de referencia: (0.76 - 1.76)

Descripción: RECEPTORES DE TSH ANTICUERPOS (TSI)
Código: LATS
Técnica: Electroquimioluminiscencia
Unidades: UI/L
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL Suero
Valores de referencia:

Descripción: RECEPTORES INSULINA AC. SUERO
Código: RECINSUAC
Técnica: RIA
Unidades: ng/mL
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 ml suero (CONGELADO)
Valores de referencia: (Inf. 58.4) Negativo

Descripción: Recogida de muestras en turno de tarde
Código: RECOGTARDE
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo:
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: RECuento CELULAR ASPIRADO BRONQUIAL
Código: RCASPBRONQ
Técnica: Microscopía óptica
Unidades:
Plazo:
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: RECuento DE AEROBIOS MESÓFILOS EN SUPERFICIE
Código: AEROBIOSU
Técnica: MÉTODO BASADO EN LA ISO 18593
Unidades: ufc/cm ^2

Descripción: RECuento DE AEROBIOS MESÓFILOS EN SUPERFICIE
Plazo: 6 días
Tubo:
Comentario adicional: 1 PLACA ESPECIAL PARA AEROBIOS
Valores de referencia: (Inf. 0) Ausencia de crecimiento(calificación:excelente)
 (Inf. 1) Contaminación leve(Calificación : Buena)
 (1 - 10) Contaminación moderada(Calificación:moderada)
 (Sup. 10) Contaminación fuerte(Calificación deficiente)

Descripción: RECuento DE EOSINOFILOS
Código: EOSINOFIRE
Técnica: tinción frotis
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Citología
Comentario adicional: Torunda
Valores de referencia:

Descripción: RECuento DE EOSINOFILOS
Código: EOSINOREC
Técnica:
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo:
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: RECuento DE EOSINOFILOS EN EXUDADO CONJUNTIVAL
Código: EOSCONJ
Técnica: Microscopía óptica
Unidades:
Plazo:
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: RECuento DE RETICULOCITOS
Código: RETI
Técnica: Citometría de flujo
Unidades: %
Plazo: 3 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: EDTA
Valores de referencia: (0.5 - 2)

Descripción: REDUCTORES EN ORINA
Código: REDUCTO2
Técnica: Espectrometría
Unidades:
Plazo: 5 días

Descripción: REDUCTORES EN ORINA
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 10 mL Orina. Refirgerar.
Valores de referencia: Valor de referencia: No se detecta

Descripción: Reevaluación Exoma completo en trío
Código: REEVALTRIO
Técnica:
Unidades:
Plazo: 40 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Reevaluación panel NGS
Código: REEVALNGS
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo:
Comentario adicional: Reevaluación panel NGS ya realizado.
Avisar a biomol@megalab.es
Valores de referencia:

Descripción: Reevaluación VUS
Código: REEVALVUS
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo:
Comentario adicional: Reevaluación VUS en estudio ya realizado.
Prueba sin coste. Avisar a biomol@megalab.es
Valores de referencia:

Descripción: Refsum, enfermedad de. Panel NGS
Código: GEN_000661
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: REM (RECUPERACIÓN DE ESPERMATOZOIDES MÓVILES)
Código: REM
Técnica:
Unidades: millones
Plazo: 6 días
Tubo: Semen

Descripción: REM (RECUPERACIÓN DE ESPERMATOZOIDES MÓVILES)

Comentario adicional:

Valores de referencia:

Descripción: RENINA ACTIVIDAD PLASMA
Código: RENINA
Técnica: RIA
Unidades: ng/mL/h
Plazo: 6 días
Tubo: Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional: Plasma de EDTA. Congelar y enviar congelado., NO refrigerar. No muestras con plasma heparina ni plasma citrato
Volumen: 1.0 mL
Volumen mínimo: 0.20 mL
Valores de referencia: (0.32 - 1.84) > 17 años P.supina
(0.60 - 4.18) > 17 años P.ortostática
(1.40 - 7.80) < 2 años
(1.50 - 3.50) 2 años - 5 años
(0.80 - 2) 5 años - 8 años
(0.90 - 2.90) 8 años - 11 años
(1.20 - 2.40) 11 años - 17 años

Descripción: RENINA DIRECTA PLASMA
Código: DIRERENINA
Técnica: CLIA
Unidades: mcUI/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Plasma EDTA Pruebas Especiales
Comentario adicional: 1 mL Plasma EDTA. NO refrigerar ni la jeringa ni al centrifugar.
CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.
CONDICIONES RECOLECCION DE LA MUESTRA:
Recoger la sangre a media mañana, después de que el paciente se haya levantado (centado, de pie o acostado) durante al menos 2 horas y después haya estado sentado durante 5-15 min. Mezclar la sangre con cuidado, evitando la espuma y la hemólisis
Valores de referencia: (2.8 - 39.9) P. supina
(4.4 - 46.1) P. ortostática

Descripción: REORDENAMIENTO CUANTITATIVO · BCR/ABL1(p190,p210) · RT-PCR
Código: BCR_ABL1
Técnica: RT-PCR
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Al menos 1 ml de Médula Ósea en tubo EDTA o al menos 5 ml de Sangre Periférica en tubo EDTA. Tubo exclusivo para esta determinación (tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO).
IMPORTANTE: SIEMPRE REFRIGERADO Y NO PINCHAR VIERNES NI VÍSPERAS DE FESTIVOS: la sangre se empieza a procesar dentro de las primeras 48 horas desde la extracción.
Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.

Valores de referencia:

Descripción: Reordenamiento de gen FUS (16p11).
Código: MDFISHFUS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Heparina Litio

Descripción: Reordenamiento de gen FUS (16p11).
Comentario adicional: 5-20 ml sangre periférica.
 min 2 ml médula ósea.
 Muestra alternativa: tejido fresco o fijado/parafinado

Valores de referencia:

Descripción: Reordenamientos genes NTRK1, NTRK2 y NTRK3
Código: REORD_NTRK
Técnica:
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Muestras: tejido incluido en parafina o EDTA
 Rotular ONCO.

Valores de referencia:

Descripción: Resistencia a estrógenos. Sec Gen: ESR1
Código: GEN_000662
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Resistencia a la hormona tiroidea. Sec Gen: THRB
Código: GEN_000663
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Resistencia a la insulina. Sec Gen: INSR
Código: GEN_000664
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: RESISTENCIA A LA PROTEINA C ACTIVADA
Código: RESACTPC
Técnica: Coagulación
Unidades: segundos
Plazo: 6 días
Tubo: Plasma de Citrato congelado
Comentario adicional: 5 mL de Plasma Citrato

Descripción: RESISTENCIA A LA PROTEINA C ACTIVADA

Valores de referencia: (120 - 300)

Descripción: RESISTENCIA DE CMV A ANTIVIRICOS (GENES UL97 Y UL54)

Código: RESISTCMV

Técnica: RT-PCR y Secuenciación

Unidades:

Plazo: 9 días

Tubo: EDTA sangre total Referencia

Comentario adicional: 5 mL sangre (EDTA). También aceptable plasma (EDTA) congelado. Carga viral positiva (mínimo 1000 copias/mL).

Valores de referencia:

Descripción: RESISTENCIA GLOBULAR OSMOTICA

Código: RESIOSMO

Técnica: Lisis osmótica

Unidades:

Plazo: 4 días

Tubo: EDTA sangre total Referencia

Comentario adicional: 5 mL sangre total EDTA. Rogamos envío inmediato(max. 24h), Extracción de Lunes a Jueves.

Se requiere una muestra del paciente y muestra de control de envío de sangre. Esta muestra de control de envío debe de ser de una persona normal (sana), no emparentada (Marcar el tubo "control normal")

Valores de referencia:

Descripción: Respuesta a tratamiento con Metformina. Gen IRS1

Código: IRS1_METFO

Técnica: NGS

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Biología Molecular

Comentario adicional: Sangre EDTA Tª ambiente. Rotulado con BM
Tubo exclusivo para esta determinación

Valores de referencia:

Descripción: RETICULINA AC. IGA SUERO

Código: RETICUACA

Técnica: Inmunofluorescencia indirecta

Unidades:

Plazo: 3 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 1 mL suero.

Valores de referencia: Negativo <1/10
Positivo >1/10

Descripción: RETICULINA AC. IGG SUERO

Código: RETICUACG

Técnica: Inmunofluorescencia Indirecta

Unidades:

Plazo: 3 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 1 mL suero.

Descripción: RETICULINA AC. IGG SUERO

Valores de referencia: Negativo <1/10
Positivo >1/10

Descripción: Retinitis punctata albescens. Panel NGS

Código: GEN_000665

Técnica:

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Retinoblastoma. Sec Gen: RB1

Código: GEN_000666

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: RETINOL PROTEINA FIJADORA SUERO

Código: RETINOLPF

Técnica: Turbidimetría

Unidades: mg/dL

Plazo: 4 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 1 mL suero.
Las muestras con presencia de fibrina deben centrifugarse.

Valores de referencia: (3 - 6)

Descripción: Retinosis pigmentaria 2, ligado al X. Sec Gen: RP2

Código: GEN_000667

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Retinosis pigmentaria 3: gen RPGR (NGS)

Código: RPGR_MUTS

Técnica:

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Retinosis pigmentaria tipo 4, AD/AR. Sec Gen: RHO
Código: GEN_000668
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Retinosis pigmentaria: >10 genes (NGS)
Código: RETIN_MUTS
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.
Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Retinosis pigmentaria: gen RP1 (NGS)
Código: RP1_RETPIG
Técnica: NGS con TSO Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación sin abrir, marcado con BM.
Alternativa: citrato
Valores de referencia:

Descripción: Retinosis punctata albescens. Sec Gen: RDH5
Código: GEN_000669
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Retinosquiasis, ligada al cromosoma X. Sec Gen: RS1
Código: GEN_000670
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Retraso en el desarrollo. Panel NGS
Código: GEN_000672
Técnica:

Descripción: Retraso en el desarrollo. Panel NGS

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Retraso mental ligado al X. Sec Gen: SOX3

Código: GEN_000671

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Rett atípico, Sd. Sec Gen: CDKL5

Código: GEN_000674

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Rett, Sd. Sec Gen: FOXP1

Código: GEN_000673

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: RHINOVIRUS PCR

Código: RHINOVIPCR

Técnica: PCR

Unidades:

Plazo: 14 días

Tubo: Tubo Especial

Comentario adicional: Aspirado nasofaríngeo
Envío inmediato a 4°C

Valores de referencia:

Descripción: Ri (ANNA-2) AC. LCR

Código: ACRI LCR

Técnica: Técnica Inmunoblot

Unidades:

Plazo: 15 días

Tubo: LIQUIDO LCR INMUNO

Descripción: Ri (ANNA-2) AC. LCR
Comentario adicional: 1 mL LCR
Valores de referencia:

Descripción: RIBAVIRINA SUERO
Código: RIBAVIRINA
Técnica: LC-MS/MS
Unidades: mcg/mL
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.
Valores de referencia: (2.5 - 3.0)

Descripción: RIBONUCLEOPROTEINA AC. SUERO
Código: RNPAC
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml suero.
Valores de referencia: Negativo

Descripción: RIBOSOMAL P AC. SUERO
Código: AC.RIBOSOM
Técnica: EIA
Unidades: U/mL
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: (Inf. 7) Negativo
 (7 - 10) Indeterminado

Descripción: RICKETTSIA AC. SUERO (WEIL-FELIX SEROAGLUTINACION)
Código: WEILFELIAC
Técnica: Aglutinación
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: NEGATIVO

Descripción: RICKETTSIA CONORII AC. IGG SUERO (FIEBRE BOTONOSA)
Código: RICCONOACG
Técnica: CLIA
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero/Plasma

Descripción: RICKETTSIA CONORII AC. IGG SUERO (FIEBRE BOTONOSA)
Valores de referencia: (Inf. 0.9) Negativo
 (0.9 - 1.1) Indeterminado
 (Sup. 1.1) Positivo

Descripción: RICKETTSIA CONORII AC. IGM SUERO (FIEBRE BOTONOSA)
Código: RICCONOACM
Técnica: CLIA
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL
Valores de referencia: (Inf. 0.9) Negativo
 (0.9 - 1.1) Indeterminado
 (Sup. 1.1) Positivo

Descripción: RICKETTSIA RICKETSII AC. IGG SUERO
Código: RICRICKACG
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Volumen: 1.0 mL
 Volumen mínimo: 0.15 mL
Valores de referencia: <1:64 Título <1/64 Negativo
 >1:64 Título > o = 1/64 Positivo

Descripción: RICKETTSIA RICKETSII AC.IGM SUERO
Código: RICRICKACM
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Volumen: 1.0 mL
 Volumen mínimo: 0.15 mL
Valores de referencia: <1:64 Título < 1/64 Negativo
 >1:64 Titulo > o = 1/64 Positivo

Descripción: RICKETTSIA SPP DNA (PCR)
Código: RICKSPPPCR
Técnica: Hibridación molecular (PCR)
Unidades:
Plazo: 8 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 5 ml sangre total EDTA-REFRIGERAR
 5 ml suero- REFRIGERAR
 1 ml LCR- REFRIGERAR
 Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO
Valores de referencia: Valor de referencia: No se detecta

Descripción: RICKETTSIA TYPHI AC. IGG (MOOSERI)
Código: RICMOOACG
Técnica: IFI
Unidades: Titulo
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero (Volumen mínimo 0.30 mL)
 Refrigerar.
Valores de referencia: <1/64 Ausencia de inmunidad

Descripción: RICKETTSIA TYPHI AC. IGM (MOOSERI)
Código: RICMOOACM
Técnica: IFI
Unidades: Titulo
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
 Refrigerar
 Volumen 1.0 mL (volumen mínimo 0.30 mL)
Valores de referencia: <1/64 Negativo

Descripción: RIFAMPICINA SUERO
Código: RIFAMPICIN
Técnica: LC-MS/MS
Unidades: mcg/mL
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 2 mL suero. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO. Toma de muestra 2h después de la administración del medicamento.
Valores de referencia: (8.0 - 24.0) (A las dos horas de la administración del medicamento)

Código: RISPER
Descripción: RISPERIDONA MAS 9-HIDROXIRISPERIDONA
Técnica: LC-MS/MS
Comentario adicional: 2 mL

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	RISP	9393-0		Perfil RISPERIDONA	ng/mL	
Prueba	HIDROXIRIS	9383-1		9- HIDROXIRIS	ng/mL	
Prueba	RISHIDROX	9394-8		Perfil RISPERIDONA+HIDROXRISPERIDONA	ng/mL	(20 - 60)

Descripción: RNA POLIMERASA AC. SUERO
Código: RNAPOLI
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades:
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL

Descripción: RNA POLIMERASA AC. SUERO

Valores de referencia: (Inf. 20) Negativo
(20 - 40) Positivo débil
(40 - 80) Positivo moderado
(Sup. 80) Positivo fuerte

Descripción: RNA VIRUS HEPATITIS A (PCR)

Código: VHAPCR

Técnica:

Unidades:

Plazo: 14 días

Tubo: Suero Congelado

Comentario adicional: 1 mL suero separado lo antes posible del coágulo. Evitar hemólisis. CONGELAR INMEDIATAMENTE Y ENVIAR CONGELADO.
Alternativas: Plasma y Heces (congeladas)

Valores de referencia:

Descripción: Roberts, Sd. Sec Gen: ESCO2

Código: GEN_000675

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Robinow, Sd. Gen: ROR2. MLPA

Código: GEN_000676

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: ROSA DE BENGALA

Código: ROSABEN

Técnica: Aglutinación de Ac anti Brucella (Ag Rosa de Bengala)

Unidades:

Plazo: 5 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 1 mL suero

Valores de referencia: Test de despistaje inicial. Ante resultados positivos, debería completarse el estudio mediante realización de aglutinaciones de Brucella y test de COOMBS de Brucella.

Descripción: ROTAVIRUS HECES

Código: ROTAVI

Técnica: Inmunocromatografía

Unidades:

Plazo: 3 días

Tubo: Heces No Microbiología

Descripción: ROTAVIRUS HECES

Comentario adicional: 2 días a 8°C

Valores de referencia:

Descripción: ROTAVIRUS RNA PCR

Código: ROTAVIRPCR

Técnica: Hibridación Molecular (PCR)

Unidades:

Plazo: 9 días

Tubo: Muestra envíos externos

Comentario adicional: Muestra: LCR, HECES, otras muestras biológicas. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.

Valores de referencia:

Descripción: Rothmund-Thomson, Sd. Sec Gen: RECQL4

Código: GEN_000677

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: RUBEOLA AC. IGG

Código: RUBEACG

Técnica: CMIA

Unidades: UI/mL

Plazo: 3 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 1 ml suero

Valores de referencia: (Sup. 10) Inmunidad adquirida

Descripción: RUBEOLA AC. IGM

Código: RUBEACM

Técnica: CMIA

Unidades:

Plazo: 3 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional:

Valores de referencia: (Inf. 1.20) Negativo
(1.21 - 1.59) Indeterminado

Descripción: RUBEOLA AVIDEZ IGG

Código: AVIDEZRUBE

Técnica: EIA

Unidades: %

Plazo: 8 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 1 mL de suero

Volumen mínimo: 0.15 mL

Descripción:	RUBEOLA AVIDEZ IGG
Valores de referencia:	(Inf. 40) Baja Avidéz. Compatible con primoinfección adquirida en los últimos 2 meses. (40 - 60) Moderada Avidéz. No permite distinguir infección reciente de antigua. (Sup. 60) Alta Avidéz. Compatible con infección o reinfección pasada.

Descripción: RUBEOLA RNA (PCR) LÍQUIDO AMNIÓTICO

Código:	RUBEAMNPCR
Técnica:	Hibridación molecular (PCR)
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	10 mL Líquido Amniótico
Valores de referencia:	

Descripción: Rubeola RNA PCR Cualitativa

Código:	RUBEOLAPCR
Técnica:	HIBRIDACIÓN MOLECULAR (PCR)
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	Muestra envíos externos
Comentario adicional:	Sangre total (EDTA), LCR, orina. También válidas otros tipos de muestras (excepto líquido amniótico). Evitar muestra de suero.

PARA LÍQUIDO AMNIÓTICO HAY QUE SOLICITAR LA PRUEBA RUBEAMNPCR

Valores de referencia:

Descripción: Rubinstein-Taybi, Sd. Sec Gen: CREBBP

Código:	GEN_000678
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Biología Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción: RUFINAMIDA SUERO

Código:	RUFINAMIDA
Técnica:	CROMATOGRFÍA LÍQUIDA/TÁNDEM MASAS (LC-MS/MS)
Unidades:	mcg/mL
Plazo:	12 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero.
Valores de referencia:	(5 - 45)

Descripción: RUNX1(AML1)/RUNX1T1(ETO)(t(8;21)(q21;q22.1)) · RT-PCR

Código:	AML1_ETO
Técnica:	RT-PCR
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	TUBO ONCOGENETICA

Descripción: RUNX1(AML1)/RUNX1T1(ETO)(t(8;21)(q21;q22.1)) · RT-PCR

Comentario adicional: 3 tubos de EDTA exclusivos para esta determinación: tubo sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO.

Muestra: sangre periférica o médula ósea

NO PINCHAR VIERNES NI VÍSPERAS DE FESTIVOS: la sangre se empieza a procesar dentro de las primeras 48 horas desde la extracción

Valores de referencia:

Descripción: S de Noonan: >10 genes (NGS)

Código: NOONAN

Técnica: NGS Illumina

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: S. de hiperinmunoglob. y fiebre periódica: gen MVK (NGS)

Código: HIDS

Técnica: NGS Illumina

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: S. Hemolítico urémico atípico: >10 genes (NGS)

Código: SHUA_COMPL

Técnica:

Unidades:

Plazo: 20 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.

Alternativa: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: S. Hiper IgE autosómico dominante: gen STAT3 (NGS)

Código: STAT3

Técnica: NGS con TSO Illumina

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación sin abrir, marcado con BM.

Alternativa: citrato

Valores de referencia:

Descripción: S. QT corto: genes KCNH2, KCNQ1 y KCNJ2 (NGS)

Código: QT_CORTO

Técnica: NGS y MLPA

Descripción: S. QT corto: genes KCNH2, KCNQ1 y KCNJ2 (NGS)
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.
Alternativa: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: S. QT Largo: >10 genes (NGS)
Código: QT_LARGO
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 40 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: SACCHAROMYCES CEREVISIAE AC. IGA
Código: ASCA
Técnica: Técnica ELISA
Unidades: U/mL
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero. Alternativo plasma de EDTA o plasma de Citrato
Valores de referencia: (Inf. 7) Negativo
 (7 - 10) Indeterminado

Descripción: SACCHAROMYCES CEREVISIAE AC. IGG
Código: ASCAG
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: U/mL
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: (Inf. 7) Negativo
 (7 - 10) Indeterminado

Descripción: SAE1 AC SUERO
Código: SAE1
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: Negativo

Descripción: Saethre-Chotzen, Sd. Sec Gen: TWIST1
Código: GEN_000679
Técnica:

Descripción:	Saethre-Chotzen, Sd. Sec Gen: TWIST1
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	SALMONELLA PARATIFICA B AGLUTINACIONES
Código:	PARATIFI_B
Técnica:	Aglutinación
Unidades:	Titulo
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	

Descripción:	SALMONELLA PARATIFICA A AGLUTINACIONES
Código:	PARATIFI_A
Técnica:	Aglutinación
Unidades:	Titulo
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero.
Valores de referencia:	

Descripción:	SALMONELLA TIPHY H AGLUTINACIONES
Código:	TIFICA_H
Técnica:	Aglutinación
Unidades:	Titulo
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	

Descripción:	SALMONELLA TIPHY O AGLUTINACIONES
Código:	TIFICA_O
Técnica:	Aglutinación
Unidades:	Titulo
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	

Descripción:	Sandhoff, enfermedad de. Sec Gen: HEXB
Código:	GEN_000680
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Descripción: Sandhoff, enfermedad de. Sec Gen: HEXB

Valores de referencia:

Descripción: SANGRE EN ORINA

Código: SANGRE

Técnica:

Unidades: /µL

Plazo: 3 días

Tubo: Orina basal

Comentario adicional:

Valores de referencia: Negativo

Descripción: SANGRE EN ORINA

Código: SANGRE

Técnica:

Unidades: /µL

Plazo: 3 días

Tubo: Orina basal

Comentario adicional:

Valores de referencia: Negativo

Código: SANIPULMON

Descripción: SANITAS. Panel cáncer de pulmón

Técnica:

Comentario adicional: Perfil solo para proyecto Sanitas.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	EGFR_MUTS			BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · EGFR(18-21) · HOT SPOT		
Prueba	KRAS_MUTS			BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · KRAS(2, 3, 4) · HOT SPOT		
Prueba	BRAF_SOMAT			Mutaciones somáticas gen BRAF (V600X)		
Prueba	MDFISH	78040-3		FISH sonda no especificada		
Prueba	IHQPD1			INMUNOHISTOQUIMICA: PDL-1		
Prueba	REORD_NTRK			Reordenamientos genes NTRK1, NTRK2 y NTRK3		
Prueba	INEST_MICR			INESTABILIDAD DE MICROSATÉLITES (MSI) · A. FRAGMENTOS		
Prueba	FISH_TSALK			BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · ALK (2p23)		
Prueba	FISH_TSMET			BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · MET (7q31)		
Prueba	FISH_TROS1			BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · ROS1 (6q22)		
Prueba	ERBB2_MUTS			BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · ERBB2 (20) · HOT SPOT		

Descripción: Sapovirus RNA PCR muestra

Código: SAPOVIRPCR

Descripción: Sapovirus RNA PCR muestra
Técnica: HIBRIDACIÓN MOLECULAR CON AMPLIFICACIÓN a TIEMPO REAL RT-PCR
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo:
Comentario adicional: Heces y vómitos. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO
Valores de referencia:

Descripción: SARAMPION AC. IgG EN L.C.R
Código: SARAMGLC
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 ml LCR
Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo
(Sup. 1) Positivo

Descripción: SARAMPION AC. IGG SUERO
Código: SARAMACG
Técnica: CLIA
Unidades: UI/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml suero
En el ensayo puede emplearse suero o plasma humanos. Las pruebas realizadas confirman que es posible utilizar EDTA potásico y heparina sódica como anticoagulantes.
Valores de referencia: (Inf. 13.5) Negativo
(13.6 - 16.4) Indeterminado
(Sup. 16.5) Positivo

Descripción: SARAMPION AC. IgM EN L.C.R
Código: SARAMMLC
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Líquido Bioquímica
Comentario adicional: 1 ml LCR
Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo
(Sup. 1) Positivo

Descripción: SARAMPION AC. IGM SUERO
Código: SARAMACM
Técnica: CLIA
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL Suero
Las pruebas realizadas confirman que es posible utilizar EDTA potásico, heparina, citrato sódico como anticoagulantes.

Descripción: SARAMPION AC. IGM SUERO

Valores de referencia: (Inf. 0.9) Negativo
(0.9 - 1.1) Indeterminado
(Sup. 1.1) Positivo

Descripción: Sarcoidosis de aparición temprana. Sec Gen: NOD2

Código: GEN_000681

Técnica:

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: SCC EN LIQUIDO PLEURAL (AG. CARCINOMA DE CEL. ESCAMOSAS)

Código: SCCLIQPL

Técnica: Inmunoluminiscencia

Unidades: ng/mL

Plazo: 4 días

Tubo: Líquidos Biológicos

Comentario adicional: 1 mL de Líquido Pleural

Valores de referencia: (Inf. 2.5)

Descripción: SCC (ANTÍGENO ASOCIADO AL CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS)

Código: SCC

Técnica: Inmunoluminiscencia (hasta 2011 Enzimoinmunoanálisis)

Unidades: ng/mL

Plazo: 5 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 1 mL

Valores de referencia: (Inf. 2.5)

Descripción: SCHISTOSOMA (BILHARZIOSIS) EN ORINA

Código: SCHISTORIN

Técnica: Microscopía óptica

Unidades:

Plazo: 5 días

Tubo: Muestra Microbiología

Comentario adicional:

Valores de referencia:

Descripción: SCHISTOSOMA SP. AC IGG (BILHARZIOSIS)

Código: SCHISTOSOM

Técnica: EIA

Unidades: Índice

Plazo: 8 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 1 mL suero

Descripción: SCHISTOSOMA SP. AC IGG (BILHARZIOSIS)
Valores de referencia: (Inf. 0.8) Negativo
(0.8 - 1.1) Indeterminado
(Sup. 1.1) Positivo

Descripción: SCHISTOSOMA SPP, DNA PCR
Código: SCHISTOPCR
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 2 ml sangre total (EDTA), (haematobium orina), (mansoni heces refrigeradas).También puede hacerse con muestra parafinada (blocc o al menos de 10 a 15 cortes). En LCR sospecha clínica esquistosomiasis espinal.
Valores de referencia:

Descripción: Scl-70 AC. SUERO (TOPOISOMERASA I)
Código: SCL70AC
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL
Valores de referencia: Negativo

Descripción: Screening adicional a PGT embrion 1
Código: PGTSRAD1EM
Técnica:
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: BIOPSIA ESPECIAL
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Screening cáncer de próstata. Biomarcadores en orina
Código: SELECTMDX
Técnica:
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: ORINA ONCOGENETICA
Comentario adicional: Kit especial (UrNCollect)con Tubo UrNCollect, etiquetas, formulario solicitud (enviar cumplimentado), instrucciones para preparación y obtención orina.
SE PUEDE TOMAR LA MUESTRA DE LUNES A MIERCOLES PARA QUE LLEGUE A CENTRAL EL JUEVES MÁXIMO
Valores de referencia:

Código: MPX
Descripción: SCREENING HIV, VHC Y VHB POR RT-PCR (MPX)
Técnica: RT-PCR
Comentario adicional: 1 Tubo DE EDTA IDENTIFICADOS COMO "MPX"
NO ENVIAR VIERNES NI VÍSPERAS DE FESTIVO

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.

Componentes						
Prueba	HIVMPX			HIV EN MPX TEST		Valor de referencia: No se detecta Límites de detección: VIH-1 grupo M : 25.7 UI/ml VIH-1 grupo 0 : 8.2 copias/ml VIH-2 : 4 UI/ml
Prueba	HVBMPX			HVB EN MPX TEST		Valor de referencia: No se detecta Límite de detección: 1.4 UI/mL Genotipos A-H
Prueba	HVCMPX			HVC EN MPX TEST		Valor de referencia: No se detecta Límite de detección: 7 UI/mL Genotipos: 1a, 1b, 2, 2a, 2a/c, 2b, 3a, 3a/b, 4, 4a, 4b/4c, 5, 5a, 6, 6a

Descripción: Sd hiperornitinemia-hiperamonemia-homocitrulinuria. SLC25A15

Código: GEN_000701

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Sd. ectrodactilia-Aplasia Tibial. Sec Gen: BHLHA9

Código: GEN_000695

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Sd. espasmo infantil ligado al cr. X. Sec Gen: ARX

Código: GEN_000697

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Sd. espasmo infantil ligado al cr. X. Sec Gen: CDKL5

Código: GEN_000696

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Sd. espasmo infantil ligado al X. Panel NGS
Código: GEN_000698
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd. Hiper-IgM ligado al X. Sec Gen: CD40LG
Código: GEN_000700
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd. hipoplasia y aplasia pelvis focomegalia Schinzel. WNT7A
Código: GEN_000702
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd. insensibilidad a andrógenos. Sec Gen: AR.
Código: GEN_000704
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd. Malformac. capilar-arteriovenosa. Sec Gen: RASA1
Código: GEN_000709
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd. nodo enfermo. Panel NGS
Código: GEN_000716
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días

Descripción:	Sd. nodo enfermo. Panel NGS
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	
Descripción:	Sd. prematuridad e ictiosis. Sec Gen: SLC27A4
Código:	GEN_000710
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	
Descripción:	Sd. radio ausente y trombocitopenia. Sec Gen: RBM8A
Código:	GEN_000711
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	
Descripción:	Sd.cardiofaciocutáneo. Panel NGS
Código:	GEN_000690
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	
Descripción:	Sd.cardiofaciocutáneo. Sec Gen: BRAF
Código:	GEN_000691
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	
Descripción:	Sd.cuerno occipital. Sec Gen: ATP7A
Código:	GEN_000715
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Sd.hemolítico urémico atípico. Panel NGS
Código:	GEN_000717
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Sd.I carcinoma basocelular nevoide. Sec Gen: PTCH1
Código:	GEN_000714
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Sd.LIG4. Sec Gen: LIG4
Código:	GEN_000719
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Sd.mano-pie-genital. Sec Gen: HOXA13
Código:	GEN_000722
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Sd.miasténico congénito. Panel NGS
Código:	GEN_000723
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Sd.nefrótico congénito tipo finlandés. Sec Gen: NPHS1
Código:	GEN_000724
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días

Descripción: Sd.nefrótico congénito tipo finlandés. Sec Gen: NPHS1
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd.oral-facio-digital tipo 1. Sec Gen: OFD1
Código: GEN_000726
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd.oto-facio-cervical. Sec Gen: PAX1
Código: GEN_000728
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd.oto-palato-digital. Gen: FLNA. MLPA
Código: GEN_000727
Técnica:
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd.papilo-renal. Sec Gen: PAX2
Código: GEN_000729
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd.periódicos asocia. a la criopirina. Sec Gen: NLRP3
Código: GEN_000732
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd.por déficit de creatina. Panel NGS
Código: GEN_000733
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd.tricorrinofalángico. Sec Gen: TRPS1
Código: GEN_000730
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd.Uña-rótula. Sec Gen: LMX1B
Código: GEN_000705
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sec. gen SF3B1 (NGS)
Código: GEN_SF3B1
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO,.
IMPORTANTE: MUESTRA REFRIGERADA
Valores de referencia:

Descripción: Secuenciación del producto de amplificación de 1 amplicón
Código: AMPLICON1
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Secuenciación del producto de amplificación de 11 amplicón
Código: AMPLICON11
Técnica:
Unidades:

Descripción: Secuenciación del producto de amplificación de 11 amplicón
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Secuenciación del producto de amplificación de 12 amplicón
Código: AMPLICON12
Técnica:
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Secuenciación del producto de amplificación de 14 amplicón
Código: AMPLICON14
Técnica:
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Secuenciación del producto de amplificación de 15 amplicón
Código: AMPLICON15
Técnica:
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Secuenciación del producto de amplificación de 16 amplicón
Código: AMPLICON16
Técnica:
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Secuenciación del producto de amplificación de 18 amplicón
Código: AMPLICON18
Técnica:
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Secuenciación del producto de amplificación de 2 amplicones
Código: AMPLICON2
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Secuenciación del producto de amplificación de 35 amplicón
Código: AMPLICON35
Técnica:
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Secuenciación del producto de amplificación de 5 amplicón
Código: AMPLICON5
Técnica:
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Secuenciación del producto de amplificación de 6 amplicón
Código: AMPLICON6
Técnica:
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Secuenciación del producto de amplificación de 7 amplicón
Código: AMPLICON7
Técnica:
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Secuenciación del producto de amplificación de 8 amplicón
Código: AMPLICON8
Técnica:
Unidades:
Plazo: 15 días

Descripción: Secuenciación del producto de amplificación de 8 amplicón
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Secuenciación del producto de amplificación de 9 amplicón
Código: AMPLICON9
Técnica:
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Secuenciación gen CRC1 (NGS)
Código: CRC1_MUTS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Secuenciación gen GLMN (NGS)
Código: GLMN_MUTS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación
Valores de referencia:

Descripción: Secuenciación Sanger a partir de oligos
Código: OLI_SANGER
Técnica:
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Nos mandan producto de PCR con los primers para confirmar mutaciones de NGS
Valores de referencia:

Descripción: SELENIO EN ORINA
Código: SE2
Técnica: ICP-MS
Unidades: µg/L
Plazo: 7 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 5 ml de orina (micción aislada)
Valores de referencia: (Inf. 40) Individuos no expuestos

Descripción: Selenio en suero
Código: SE
Técnica: ICP-MS
Unidades: µg/L
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero.

Suero (libre trazas metales)
Valores de referencia: (65 - 160)

Descripción: SELENIO ERITROCITARIO EN SANGRE TOTAL
Código: SESG
Técnica: ICP-MS
Unidades: µg/L
Plazo: 6 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: Sangre total EDTA Dipotásico (libre trazas metales)
Valores de referencia: (100 - 340)
 (Inf. 2.60) Límite de cuantificación

Descripción: Senior-Loken, Sd. Panel NGS
Código: GEN_000682
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sensibilidad a los ultravioleta. Sec Gen: ERCC4
Código: GEN_000683
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: SENSIBILIDAD A 155 ALIMENTOS OVO-LACTO-VEGETARIANA
Código: SENS150
Técnica: Microarray
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: SENSIBILIDAD A 204 ALIMENTOS
Código: SENS200

Descripción: SENSIBILIDAD A 204 ALIMENTOS
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 tubo de suero
Valores de referencia:

Descripción: SENSIBILIDAD ALIMENTARIA A ADITIVOS
Código: SENADITIVO
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: SEROTONINA (5-HIDROXITRIPTAMINA) SUERO
Código: SEROTO
Técnica: EIA
Unidades: ng/mL
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 2 mL suero, separar y enviar congelado.
Valores de referencia: (20 - 206)

Descripción: SEROTONINA EN PLASMA RICO EN PLAQUETAS
Código: SEROTOPLAQ
Técnica: EIA
Unidades: ng/10⁹ plaq
Plazo: 5 días
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional: 2 mL plasma rico en plaquetas. (Centrifugar la sangre anticoagulada con EDTA durante 10 minutos a 200 g). Enviar conteo de plaquetas(debe ser superior a 350.000/mcL)
Valores de referencia: EVITAR CONGELACIÓN MUESTRA. Enviar asimismo 5 mL de sangre (EDTA).
(500 - 950)

Descripción: SEROTONINA ORINA (5-HIDROXITRIPTAMINA)
Código: SEROTO2
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: mcg/24 h
Plazo: 5 días
Tubo: Orina 24 Horas
Comentario adicional: 10 mL de orina de 24h con 0.1 mL de ác. clorhidrico conc. Indicar volumen total.
Valores de referencia: (9 - 193)

Descripción: SERTRALINA SUERO
Código: SERTRALI
Técnica: LC-MS/MS
Unidades: µg/L
Plazo: 9 días

Descripción: SERTRALINA SUERO
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 2 mL suero.
Valores de referencia: (10 - 150) Niveles terapéuticos
 (Sup. 290) Niveles de toxicidad
 (Inf. 3) Límite de cuantificación

Descripción: SHBG (Sex hormone binding globulin)
Código: SHBG
Técnica: CMIA
Unidades: nmol/L
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero/alternativo Heparina
 NO UTILIZAR PLASMA EDTA
Valores de referencia: (13.5 - 71.14) Hombre > 14 años
 (19.8 - 155.2) Mujer > 14 años
 (26.4 - 118) Mujer > 50 años Postmenopausia

Descripción: Sialidosis. Sec Gen: NEU1
Código: GEN_000684
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: SIALOTRANSFERRINA ISOFORMAS EN SUERO
Código: SIALOTRF
Técnica: Electroforesis capilar
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero. Evitar muestra de plasma
Valores de referencia:

Descripción: Sialuria. Sec Gen: GNE
Código: GEN_000685
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: SILICIO
Código: SILICIO
Técnica: ICP-MS/MS
Unidades: µg/L
Plazo: 9 días

Descripción: SILICIO

Tubo: Plasma EDTA Refrigerado

Comentario adicional: 1 mL PLASMA/EDTA. Realizar la extracción en un tubo de EDTA VACUTAINER (5 mL). Centrifugar y transferir el plasma a un tubo de polipropileno o poliestireno (inmediatamente).

Valores de referencia: ENVIAR PLASMA SEPARADO E IDENTIFICADO COMO SILICIO (200 - 500)

Descripción: Simpson-Golabi-Behmel, Sd. Sec Gen: GPC3

Código: GEN_000686

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: SINAPTOFISINA AC.

Código: SINAPTOFIS

Técnica: IFI

Unidades:

Plazo: 33 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 1 mL suero

Valores de referencia: Positivo >1/10

Descripción: Sindactilia tipo 2. Sec Gen: FBLN1

Código: GEN_000687

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Síndr. Blefarofimosis, Ptosis, y Epicantus: gen FOXL2 (NGS)

Código: FOXL2_MUT

Técnica: PCR, secuenciación y MLPA

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Síndr. feocromocitoma paragang. heredit.: >10 genes (NGS)

Código: SDH_MUTS

Técnica:

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Síndr. feocromocitoma paragang. heredit.: >10 genes (NGS)
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Síndr. feocromocitoma paraganglioma heredit.: gen SDHB (NGS)
Código: SDHB_MUTS
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Síndr. feocromocitoma paraganglioma heredit.: gen SDHD (NGS)
Código: SDHD_MUTS
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Síndr. Rubinstein-Taybi: genes CREBBP y EP300 (NGS)
Código: RUBI_TAYBI
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativa: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Alport: gen COL4A5 (NGS)
Código: ALPORT
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Alström: gen ALMS1 (NGS)
Código: ALMS1_MUTS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Síndrome de Alström: gen ALMS1 (NGS)
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.
Alternativa: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Angelman: test de metilación y MLPA gen SNRPN
Código: ANGELMAN
Técnica: PCR y MLPA
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Apert: gen FGFR2 (NGS)
Código: APERT
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 40 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Bartter 3: gen CLCNKB (NGS)
Código: BARTTER_3
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Bartter 4A: gen BSND (NGS)
Código: BARTTER_4A
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Beals: gen FBN2 (NGS)
Código: BEALS_FBN2
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Síndrome de Beals: gen FBN2 (NGS)
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Beckwith-Wiedemann: región 11p15 por MLPA
Código: BECKWITH_W
Técnica: MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Birt-Hogg-Dube: gen FLCN (NGS)
Código: BIRTHOGGDU
Técnica: NGS y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.
Alternativa: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Brugada: >10 genes (NGS)
Código: S_BRUGADA
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.
Alternativa: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Candle: gen PSMB8 (NGS)
Código: PSMB8_MUTS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.
Alternativa: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Charge: gen CHD7 (NGS)
Código: CHARGE_MUT
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Síndrome de Charge: gen CHD7 (NGS)
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.
Alternativa: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Cowden: gen PTEN (NGS)
Código: PTEN_MUTS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.
Alternativa: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Gitelman: gen SLC12A3 (NGS)
Código: S_GITELMAN
Técnica: NGS y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Gorlin: genes PTCH1, PTCH2 y SUFU (NGS)
Código: GORLIN_MUT
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Hajdu-Cheney (acro-ostelosis): gen NOTCH2 (NGS)
Código: HAJDU_CHEN
Técnica: NGS Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Kallmann: > 10 genes (NGS)
Código: KALLMANN
Técnica:
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Síndrome de Kallmann: > 10 genes (NGS)
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Legius: gen SPRED1 (NGS)
Código: SPRED1_MUT
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Leigh: <10 genes (NGS)
Código: SIND_LEIGH
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Loeys-Dietz: sec. <10 genes (NGS)
Código: LOEYSDIETZ
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Marfan: gen FBN1 (NGS)
Código: MARFAN
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Morquio: gen GALNS (NGS)
Código: MORQUIO
Técnica: NGS con TSO Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción:	Síndrome de Morquio: gen GALNS (NGS)
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación sin abrir, marcado con BM. Alternativa: citrato
Valores de referencia:	
Descripción:	Síndrome de Noonan: gen PTPN11 (NGS)
Código:	PTPN11_MUT
Técnica:	PCR y secuenciación
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:	
Descripción:	Síndrome de Peutz-Jeghers: gen STK11 (NGS)
Código:	PEUTZ_JEGH
Técnica:	PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:	
Descripción:	Síndrome de Prader-Willi: test metilación y MLPA gen SNRPN
Código:	PRADER.W
Técnica:	PCR y MLPA
Unidades:	
Plazo:	20 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato
Valores de referencia:	
Descripción:	Síndrome de Rett: gen MECP2 (NGS)
Código:	RETT_PCR
Técnica:	PCR, secuenciación, y MLPA
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina y Citrato.
Valores de referencia:	
Descripción:	Síndrome de Shwachman-Diamond: gen SBDS (NGS)
Código:	SBDS_MUTS
Técnica:	NGS
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Síndrome de Shwachman-Diamond: gen SBDS (NGS)
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.
Alternativa: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Silver-Russell: análisis MS-MLPA
Código: SILVER_RUS
Técnica: PCR y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Sotos: gen NSD1 (NGS)
Código: SOTOS_NS1
Técnica: NGS Illumina y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Stickler: <10 genes (NGS)
Código: STICKLER
Técnica: NGS Illumina y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Usher: >10 genes (NGS)
Código: SIND_USHER
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Waardenburg: <10 genes (NGS)
Código: WAARDENBUR
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Síndrome de Waardenburg: <10 genes (NGS)
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Williams: micodelección región WBSCR por MLPA
Código: WILLIAMS
Técnica: MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Síndrome Hipoventilacion Central: gen PHOX2B (NGS)
Código: PHOX2B
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: SÍNDROME MIELODISPLÁSICO · ASXL1 (EXON 12, 13) · HOT SPOT
Código: ASXL1_MUTS
Técnica: SANGER - HOT SPOT
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: 4 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refrigerar] (Estabilidad: 4°C:1 Meses)
o 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refrigerar] (Estabilidad: 4°C:1 Meses)

Valores de referencia:

Descripción: SÍNDROME MIELODISPLÁSICO · SF3B1 (EXONES 12-15) · HOT SPOT
Código: SF3B1_MUTS
Técnica: SANGER - HOT SPOT
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: 4 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refrigerar] (Estabilidad: 4°C:1 Meses)
o 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refrigerar] (Estabilidad: 4°C:1 Meses)

Valores de referencia:

Descripción: SÍNDROME MIELOPROLIFERATIVO · MPL (EXON 10) · HOT SPOT
Código: MPL_E10
Técnica: SANGER - HOT SPOT
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA

Descripción: SÍNDROME MIELOPROLIFERATIVO · MPL (EXON 10) · HOT SPOT

Comentario adicional: 4 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refrigerar] (Estabilidad: 4°C:1 Meses)
o 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refrigerar] (Estabilidad: 4°C:1 Meses)

Valores de referencia:

Descripción: SÍNDROME MIELOPROLIFERATIVO · MPL(S505N) · HOT SPOT

Código: MPL_S505N

Técnica: SANGER - HOT SPOT

Unidades:

Plazo: 7 días

Tubo: TUBO ONCOGENETICA

Comentario adicional: 4 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refrigerar] (Estabilidad: 4°C:1 Meses)
o 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refrigerar] (Estabilidad: 4°C:1 Meses)

Valores de referencia:

Descripción: Síndrome nefrótico 2: gen NPHS2 (NGS)

Código: NPFS2_MUTS

Técnica: PCR y secuenciación

Unidades:

Plazo: 40 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Síndrome Opitz Gbb: <10 genes (NGS)

Código: OPITZ_GBB

Técnica:

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Síndrome X Frágil

Código: XFRAGPCR

Técnica: PCR, TP-PCR y análisis de fragmentos

Unidades:

Plazo: 20 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.

Valores de referencia:

Descripción: Síndromes autoinflamatorios. Panel NGS

Código: GEN_000731

Técnica:

Unidades:

Plazo: 30 días

Descripción:	Síndromes autoinflamatorios. Panel NGS
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Síndromes de delección 22q11.2 (MLPA)
Código:	DEL_22Q11
Técnica:	MLPA
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	Síndromes de miastenia congénita: >10 genes (NGS)
Código:	MASTENIA
Técnica:	NGS TSO Illumina
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación sin abrir, marcado con BM. Alternativa: citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Síndromes febriles recurrentes hereditarios: >10 genes (NGS)
Código:	F_RECURREN
Técnica:	PCR y secuenciación
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	2 tubos de EDTA exclusivos para esta determinación: tubos primarios sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulados con BM.
Valores de referencia:	

Descripción:	Sinfalangismo proximal. Sec Gen: NOG
Código:	GEN_000734
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	SIROLIMUS EN SANGRE
Código:	SIROLIMUS
Técnica:	Cromatografía líquida/ Tándem masas
Unidades:	ng/mL
Plazo:	6 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia

Descripción: SIROLIMUS EN SANGRE

Comentario adicional: 3 mL sangre total (EDTA). Refrigerar
Volumen min: 1 mL

Valores de referencia: (5 - 10) Trasplante renal-combinación con esteroides y micofenolato de mofetilo
(8 - 12) Trasplante renal-combinación con esteroides sin micofenolato de mofetilo
(4 - 12) Trasplante renal- terapia triple con Ciclosporina A, corticosteroides y sirolimus
(12 - 20) Trasplante renal-terapia dual con corticosteroides y sirolimus
(3 - 6) Trasplante hígado-terapia con Ciclosporina A o tacrolimus, sirolimus y, en caso necesario, corticosteroides
(5 - 8) Trasplante hígado-terapia con sirolimus y, en caso necesario, corticosteroides
Límite de cuantificación: 2 ng/mL

Código: DRAS

Descripción: SISTEMATICO DE ORINA (ESTUDIO

Técnica:

Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	DENSIDAD	53326-5		DENSIDAD DE ORINA		(1.000 - 1.040)
Prueba	PH	50560-2		PH ORINA		(4.5 - 7.5)
Prueba	PROTEINAS	50561-0		PROTEINAS EN ORINA	mg/dL	Negativo
Prueba	SED1			SEDIMENTO EN ORINA		Normal
Prueba	GLUCOSA	53328-1		GLUCOSA EN ORINA	g/L	Negativo
Prueba	CETONICOS	50557-8		ACETONA EN ORINA	mg/dL	Negativo
Prueba	BILIRRUBIN	53327-3		BILIRRUBINA EN ORINA	mg/dl	Negativo
Prueba	SANGRE	50559-4		SANGRE EN ORINA	/μL	Negativo
Prueba	NITRITOS	50558-6		NITRITOS EN ORINA		Negativo
Prueba	UROBILIGEN	50563-6		UROBILIGENO EN ORINA	mg/dL	Negativo
Prueba	LEUCOCITOO	58805-3		LEUCOCITOS EN ORINA	/μL	Negativo

Descripción: Sitosterolemia. Panel NGS

Código: GEN_000735

Técnica:

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Sjogren-Larsson, Sd. Sec Gen: ALDH3A2

Código: GEN_000736

Técnica:

Unidades:

Descripción:	Sjogren-Larsson, Sd. Sec Gen: ALDH3A2
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	SMIT AC. SUERO (ANTI-SM)
Código:	SMITAC
Técnica:	Inmunoblot
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL
Valores de referencia:	Negativo

Descripción:	Smith-Lemli-Opitz. Def. 7-deshidrocolesterol reductas. DHCR7
Código:	GEN_000737
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Sobrecrecimiento. Panel NGS
Código:	GEN_000738
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	SODIO
Código:	NA
Técnica:	
Unidades:	mmol/L
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(136 - 146)

Descripción:	SODIO ORINA
Código:	NA2
Técnica:	Potenciometría directa
Unidades:	mmol/24h
Plazo:	3 días
Tubo:	Orina 24 Horas
Comentario adicional:	10 mL de orina de 24 horas
Valores de referencia:	(80 - 260)

Descripción: SOMATOSTATINA EN PLASMA
Código: SOMATOST
Técnica: RIA
Unidades: pmol/L
Plazo: 18 días
Tubo: Plasma trasylol/aprotinina
Comentario adicional: Plasma EDTA Aprotinina. CONGELAR.
 Separar y congelar inmediatamente.
Valores de referencia: (Inf. 16)

Descripción: Sordera con aplasia de laberinto, microtía microdoncia. FGF3
Código: GEN_000739
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: SRP (SIGNAL RECOGNITION PARTICLE) AC. SUERO
Código: SRPAC
Técnica: Técnica Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: Negativo

Descripción: SS-A AC. SUERO (RO)
Código: SSAAC
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml suero
Valores de referencia: Negativo

Descripción: SSA-52 AC. SUERO (RO52)
Código: RO52
Técnica: Fluoroenzimoinmunoensayo
Unidades: U/mL
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero. refirgerar.
 Alternativa: plasma
Valores de referencia: (Inf. 7) Negativo
 (7 - 10) Indeterminado
 (Sup. 10) Positivo

Descripción: SS-B AC. SUERO (LA)
Código: SSBAC
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL
Valores de referencia: Negativo

Descripción: SS-DNA AC. SUERO CADENA SENCILLA
Código: SSDNAAC
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: U/mL
Plazo: 12 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: (Inf. 7) Negativo
 (7 - 10) Indeterminado
 (Sup. 10) Positivo

Descripción: Stargardt tipo 4, enfermedad de. Sec Gen: PROM1
Código: GEN_000741
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Stargardt, enfermedad de. Panel NGS
Código: GEN_000742
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: STHAPYLOCOCUS AUREUS METICILIN-RESISTENTE
Código: METICIRES
Técnica: Cultivo
Unidades:
Plazo:
Tubo: Microbiología
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: STREPTOCOCCUS AGALACTIAE GRUPO B PCR
Código: SAGALACPCR
Técnica: RT-PCR

Descripción:	STREPTOCOCCUS AGALACTIAE GRUPO B PCR
Unidades:	
Plazo:	6 días
Tubo:	Muestra envios externos
Comentario adicional:	Frotis nasofaríngeo: escobillon seco.Refrigerar. estabilidad: 4°C: 5 Días; Exudado uretral. escobillón seco. Refrigerar. Estabilidad: 4°C: 3 Semanas Exudado vaginal: escobillón seco.Refrigerar. Estabilidad: 4°C: 3 Semanas; LCR: Tubo estéril. Congelar. Estabilidad: -20°C: 7 Días Esputo: contenedor estéril. Refrigerar. Estabilidad: 4°C: 5 Días;-20°C: 7 Días
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta

Descripción:	Streptococcus pneumoniae DNA PCR en LCR
Código:	STNELCRPCR
Técnica:	PCR
Unidades:	
Plazo:	12 días
Tubo:	Muestra envios externos
Comentario adicional:	2 ml LCR
Valores de referencia:	

Descripción:	Streptococcus pneumoniae DNA PCR en Sangre
Código:	STREPNEPCR
Técnica:	PCR
Unidades:	
Plazo:	12 días
Tubo:	Muestra envios externos
Comentario adicional:	2 mL sangre total EDTA
Valores de referencia:	

Descripción:	STREPTOCOCO A ANTÍGENO (TEST DIRECTO)
Código:	STREP.A.AG
Técnica:	Inmunocromatográfica
Unidades:	
Plazo:	1 días
Tubo:	Microbiología
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	STREPTOCOCO PNEUMONIAE AC.IGG EN SUERO
Código:	PNEUMOAC
Técnica:	Enzimoimmunoanálisis
Unidades:	mcg/mL
Plazo:	12 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero:1.0 mL. Refrigerar Volumen mínimo 0.57mL
Valores de referencia:	(Inf. 9.7) Ausencia de inmunización (9.7 - 270) Inmunización intermedia (Sup. 270) Inmunización óptima

Descripción: STRONGYLOIDES STERCORALIS IGG ANTICUERPOS
Código: STRONGYLOI
Técnica: CLIA
Unidades: Índice
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero.
 Alternativa: plasma citrato o heparina
Valores de referencia: (Inf. 0.64) Negativo
 (0.64 - 0.80) Indeterminado

Código: IGA1Y2
Descripción: SUBCLASE 1 Y 2 DE LA INMUNOGLOBULINA A
Técnica: Turbidimetría
Comentario adicional: 1 mL suero

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	IGA1	6886-6		IGA SUBCLASE 1 SUERO	mg/dL	(76.08 - 328.20)
Prueba	IGA2	6939-3		IGA SUBCLASE 2 SUERO	mg/dL	(6.89 - 114.25)

Código: IGGSUB
Descripción: SUBCLASES DE IGG (téc. Turbidimetría)
Técnica: Turbidimetría
Comentario adicional: 1 mL suero

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	IGG1	2466-1		INMUNOGLOBULINA IGG SUBCLASE 1 SUERO	mg/dL	(194 - 842) < 2 años (315 - 945) 2 años - 4 años (306 - 945) 4 años - 6 años (288 - 918) 6 años - 8 años (432 - 1020) 8 años - 10 años (423 - 1060) 10 años - 12 años (342 - 1150) 12 años - 14 años (315 - 855) 14 años - 18 años (382.4 - 928.6) > 18 años
Prueba	IGG2	2467-9		INMUNOGLOBULINA IGG SUBCLASE 2 SUERO	mg/dL	(22.5 - 300) < 2 años (36 - 225) 2 años - 4 años (60.5 - 345) 4 años - 6 años (44 - 375) 6 años - 8 años (72 - 430) 8 años - 10 años (76 - 355) 10 años - 12 años (100 - 455) 12 años - 14 años (64 - 495) 14 años - 18 años (241.8 - 700.3) > 18 años
Prueba	IGG3	2468-7		INMUNOGLOBULINA IGG SUBCLASE 3 SUERO	mg/dL	(18.6 - 85.3) < 2 años (17.3 - 67.6) 2 años - 4 años (9.9 - 122.1) 4 años - 6 años (15.5 - 85.3) 6 años - 8 años (12.7 - 85.3) 8 años - 10 años (17.3 - 173) 10 años - 12 años (28.3 - 125) 12 años - 14 años (23 - 196) 14 años - 18 años (21.8 - 176.6) > 18 años

Componentes						
Prueba	IGG4	2469-5		INMUNOGLOBULINA IGG SUBCLASE 4 SUERO	mg/dL	(0.5 - 78.4) < 2 años (1 - 53.7) 2 años - 4 años (1.8 - 112.5) 4 años - 6 años (0.4 - 99.2) 6 años - 8 años (1.9 - 93.2) 8 años - 10 años (1.6 - 115) 10 años - 12 años (3.7 - 136.0) 12 años - 14 años (11 - 157) 14 años - 18 años (3.92 - 86.4) > 18 años

Descripción: Substancia P en plasma (Sustancia)
Código: SUBSTANP
Técnica: EIA
Unidades: pg/mL
Plazo: 21 días
Tubo: Plasma trasylol/aprotinina
Comentario adicional: Tubos especiales 2 ml plasma-EDTA con aprotinina (TRASYLOL). congelar

Recoger 5 mL de sangre total en un tubo vacutainer frío de EDTA K3 con 250 KIU de Trasylol (Aprotinina).

Enfriar el tubo con la sangre recién extraída en un baño de hielo durante 10 minutos.

Separar el plasma por centrifugación a 4°C.

El plasma debe congelarse en un plazo máximo de 1 hora y conservarse congelado hasta que sea analizado.

Valores de referencia: (799 - 4764)

Descripción: SUBUNIDAD ÁCIDA LÁBIL (ALS)
Código: ALS
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: mcg/mL
Plazo: 32 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero. Alternativa plasma (EDTA/HEPARINA)
Valores de referencia: (0.3 - 9.3) < 2 años
(1.9 - 10.5) 2 años - 6 años
(2.3 - 13.0) 6 años - 10 años
(4.2 - 14.0) 10 años - 14 años
(5.6 - 14.5) 14 años - 16 años
(7.7 - 20.4) > 16 años

Descripción: SUBUNIDAD ALFA LIBRE SUERO
Código: SUBALFALI
Técnica: RIA
Unidades: ng/mL
Plazo: 23 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 mL suero CONGELADO
Valores de referencia: (0.11 - 0.34) Hombre
(0.11 - 0.34) Mujer Premenopausia
(0.22 - 0.97) Mujer Menopausia

Descripción: SUCCINILACETONA
Código: SUCCINACE
Técnica: GC-MS

Descripción: SUCCINILACETONA
Unidades: mg/L
Plazo: 23 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 3 ml suero, congelar y enviar congelado
Valores de referencia: (Inf. 0.05)

Descripción: SUCCINIL-ACETONA EN ORINA
Código: SUCCINACE2
Técnica: Cromatografía de Gases-Espectrometría de Masas
Unidades: mg/g creatin.
Plazo: 23 días
Tubo: Orina basal
Comentario adicional: 10 mL de orina (micción aislada). Congelar y enviar congelada.
Valores de referencia: (Inf. 1.40)

Descripción: SULFATOS CONJUGADOS ORINA
Código: SULFCONJOR
Técnica: Cromatografía de gases
Unidades: mg/g creatinina
Plazo: 9 días
Tubo: Orina Final de Jornada
Comentario adicional: 10 mL de orina final de jornada (OFJ).
Identificar tubo con etiqueta pequeña sin código de barras, con el tapón marcado y con la palabra OFJ en el lateral del tubo.
Valores de referencia: (Inf. 210)

Descripción: SULFITOS EN ORINA
Código: SULFITEST
Técnica: Colorimetría
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Orina congelada
Comentario adicional: 10 ML DE ORINA CONGELADA
 Puede ser orina 24 h. o micción aislada.
Valores de referencia:

Descripción: SULPIRIDE SUERO
Código: SULPIRIDE
Técnica: Cromatografía líquida/Tándem masas (LC-MS/MS)
Unidades: ng/mL
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL.
Valores de referencia: (50 - 750)

Descripción: SULTIAM SUERO
Código: SULTIAM
Técnica: Cromatografía Líquida/Tándem Masas (LC-MS/MS)
Unidades: mg/l
Plazo: 6 días

Descripción: SULTIAM SUERO
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 2 mL de suero.
 Alt. 1 mL Plasma EDTA Tripotásico (Refrigerado)
Valores de referencia: (0.5 - 12.5) Rango Terapéutico.

Descripción: Superactividad fosforribosilpirofosfato sintetasa. PRPS1
Código: GEN_000743
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Superoxido Dismutasa
Código: SOD
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: ng/mL
Plazo: 18 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 ml de suero. Congelar
Valores de referencia: (0.10 - 104)

Descripción: SUSCEPTIBILIDAD/RESISTENCIA A HIV CCR5(59029A/G y 59353C/T)
Código: G18008
Técnica: Hot Spot
Unidades:
Plazo: 22 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo de sangre total EDTA. refrigerar
Valores de referencia:

Descripción: SUSCEPTIBILIDAD/RESISTENCIA A HIV CCR5(59029A/G y 59353C/T)
Código: G18008
Técnica: Hot Spot
Unidades:
Plazo: 22 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo de sangre total EDTA. refrigerar
Valores de referencia:

Descripción: SUSCEPTIBILIDAD/RESISTENCIA A HIV CCR5(59029A/G y 59353C/T)
Código: G18008
Técnica: Hot Spot
Unidades:
Plazo: 22 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo de sangre total EDTA. refrigerar
Valores de referencia:

Descripción: SUSCEPTIBILIDAD/RESISTENCIA A HIV CCR5(59029A/G y 59353C/T)
Código: G18008
Técnica: Hot Spot
Unidades:
Plazo: 22 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo de sangre total EDTA. refrigerar
Valores de referencia:

Descripción: SUSCEPTIBILIDAD/RESISTENCIA A HIV CCR5(59029A/G y 59353C/T)
Código: G18008
Técnica: Hot Spot
Unidades:
Plazo: 22 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo de sangre total EDTA. refrigerar
Valores de referencia:

Descripción: T. genetico nutricion y metabolismo
Código: NUTRIGEN
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: Muestra EDTA rotulada con BM y hoja de petición especial (wellness)
Valores de referencia:

Descripción: T. genetico origen ancestros
Código: ANCESTROS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 45 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Muestra EDTA rotulada con BM y hoja de petición especial (wellness)
Valores de referencia:

Descripción: T. genetico predisposicion rendimiento deportivo
Código: DEPORGEN
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: Muestra EDTA rotulada con BM y hoja de petición especial (wellness)
Valores de referencia:

Descripción: T. genetico tratamiento facial y cosmetico
Código: DERMAGEN
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días

Descripción: T. genetico tratamiento facial y cosmetico
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Muestra EDTA rotulada con BM y hoja de petición especial (wellness)
Valores de referencia:

Descripción: T3
Código: T3
Técnica: ICMA
Unidades: ng/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero. alternativa plasma de EDTA y plasma de hepatina sodio, y litio
Valores de referencia: (0.35 - 1.93)

Descripción: T3 (TRIYODOTIRONINA) AC. SUERO
Código: AC.TRIYODO
Técnica: Radioinmunoprecipitación
Unidades:
Plazo: 11 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL Suero refrigerado
Valores de referencia: Valor de referencia orientativo: Negativo

Descripción: T3 LIBRE SUERO (TRIYODOTIRONINA LIBRE)
Código: FT3
Técnica: Técnica ICMA
Unidades: pg/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero.
 Alternativa: heparina de sodio, heparina de litio y Edta potásico.
Valores de referencia: (1.58 - 3.91)

Descripción: T3 REVERSE (RT3) EN SUERO
Código: RT3
Técnica: CLIA
Unidades: ng/mL
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL de suero refrigerado.
Valores de referencia: (0.31 - 0.95)

Descripción: T4
Código: T4
Técnica: Técnica ICMA
Unidades: µg/dL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (4.87 - 11.72)

Descripción: T4 (TIROXINA) AC. SUERO
Código: AC.TIROXIN
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: % p.f.
Plazo: 21 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 2 mL de suero
Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo
 (Sup. 1) Positivo

Descripción: T4 LIBRE (TIROXINA LIBRE)
Código: FT4.
Técnica:
Unidades: ng/dL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (0.70 - 1.48)

Descripción: T4/TBG índice en suero
Código: T4_TBG
Técnica: Inmunoanálisis
Unidades: Índice
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL Suero (Refrigerado)
Valores de referencia: (2.3 - 6.2)

Descripción: TACROLIMUS
Código: TACROLIMUS
Técnica: Enzimoinmunoanálisis de micropartículas
Unidades: ng/mL
Plazo: 7 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: SANGRE TOTAL EDTA
Valores de referencia: (9.0 - 13.0) Transplante renal. Terapia inicial.
 (4.0 - 9.0) Transplante renal. Terapia mantenimiento.
 (9.0 - 13.0) Transplante hígado. Terapia inicial.
 (4.0 - 9.0) Transplante hígado. Terapia mantenimiento.
 (9.0 - 15.0) Transplante corazón. Terapia inicial.
 (7.0 - 13.0) Transplante corazón. Terapia mantenimiento.

Descripción: TAENIA SOLIUM AC .IGG SUERO (CISTICERCOSIS)(TENIA)
Código: CISTICERAC
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml de suero refrigerado.
 Alternativa: plasma heparina sódica o de litio

Descripción: TAENIA SOLIUM AC .IGG SUERO (CISTICERCOSIS)(TENIA)
Valores de referencia: (Inf. 9) Negativo
 (9 - 11) Indeterminado

Descripción: TAENIA SOLIUM AC.IGG EN LCR (CISTICERCOSIS)
Código: CISTICELCR
Técnica: Enzimoimmunoanálisis
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1mL LCR
Valores de referencia: (Sup. 1) Positivo

Descripción: TAENIA SOLIUM CONFIRMACION E IDENTIFICACION AC.CISTICERCOSIS
Código: CISTICCONF
Técnica: Immunoblot
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero.
Valores de referencia: Negativo

Descripción: TAENIA SOLIUM POR PCR
Código: TAENIAPCR
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 18 días
Tubo: Muestra envíos externos
Comentario adicional: 2 mL sangre total EDTA, LCR, heces.
Valores de referencia:

Descripción: Talasemia beta: gen HBB (sec. Sanger)
Código: BTALA_SEC
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Biología Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún apatario, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Talasemia beta-delta: sec y MLPA HBB, HBG1 y HBG2
Código: BDTALA_SEC
Técnica:
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Biología Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún apatario, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente

Descripción: Talasemia beta-delta: sec y MLPA HBB, HBG1 y HBG2

Valores de referencia:

Descripción: Talasemina alfa: deleciones en HBA1 y HBA2 gen alfa-globina

Código: ATALA_PCR

Técnica: PCR

Unidades:

Plazo: 20 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Talasemina alfa: gen alfa-globina HBA1 y HBA2 (sec. Sanger)

Código: ATALA_SEC

Técnica: PCR y secuenciación

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: TALIO EN ORINA

Código: TALIO2

Técnica: Espectrometría de Masas-Plasma acoplado Inductivamente

Unidades: µg/L

Plazo: 7 días

Tubo: Orina Final de Jornada

Comentario adicional: Orina final de semana laboral identificada conforme a protocolo (preferiblemente)

Valores de referencia: (Inf. 1) en personas no expuestas.
(Inf. 5.0) VLB exposición a TALIO (Baselt RC.Biological Monitoring Methods for Industrial Chemicals)

Descripción: TALIO SANGRE TOTAL

Código: TALIOSAN

Técnica: ICP-MS

Unidades: µg/l

Plazo: 6 días

Tubo: EDTA sangre total Referencia

Comentario adicional: Sangre total EDTA Dipotásico (libre trazas metales)

Valores de referencia: (Inf. 2)

Descripción: Talla baja. Panel NGS

Código: GEN_000744

Técnica:

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Descripción: Talla baja. Panel NGS

Valores de referencia:

Descripción: TAPENTADOL SUERO

Código: TAPENTAD

Técnica: Cromatografía líquida/Tándem masas

Unidades: µg/l

Plazo: 8 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 1 mL suero (2-8°C- refrigerar)
Alternativa 1 mL Plasma EDTA Dipotásico ((2-8°C- refrigerar)

Valores de referencia: (50.0 - 130) Rango terapéutico

Descripción: Taquicardia ventricular catecol.: <10 genes (NGS)

Código: TAQ_VENTRI

Técnica: NGS

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.
Alternativa: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Taquicardia ventricular polimórfica catecolinérgica. CASQ2

Código: GEN_000745

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: TAU FOSFORILADA LCR

Código: TAUFOFOSFO

Técnica: Enzimoinmunoanálisis

Unidades: pg/mL

Plazo: 18 días

Tubo: Líquido cefalorraquídeo congelado

Comentario adicional: Descartar las primeras 20 gotas y recoger aproximadamente 2-5 mL de LCR en un tubo de polipropileno. Congelar inmediatamente. No se aceptan muestras refrigeradas.

Valores de referencia: (Inf. 56.5)

Descripción: TBG SUERO (THYROXINE BINDING GLOBULIN)

Código: TBG

Técnica: Quimioluminiscencia

Unidades: mcg/mL

Plazo: 3 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 1 mL suero
Volumen mínimo: 0.20 mL

Descripción: TBG SUERO (THYROXINE BINDING GLOBULIN)
Valores de referencia: (14.0 - 31.0)
 (27.0 - 66.0) Gestación

Descripción: TCF3(E2A)/PBX1 · RT-PCR
Código: TCF3_PBX1
Técnica:
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO.
Alternativas: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: TDICOM + microbiota avanzada (KYBERLPSZO)
Código: TDIPLUS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 23 días
Tubo: Muestra envíos externos
Comentario adicional:

- 1 tubos de 3 mL de sangre total EDTA K2 (protegido de la luz, por ejemplo, envolver en papel de aluminio)
- 1 tubos de 3 mL de sangre total EDTA K2 (centrifugar, separar 1 alícuota y congelar - marcar tubo como PLEC) para TIOTOT
- 1 tubo de gelosa suero de 8,5 mL (centrifugar, separar 1 alícuota y congelarla) para CQ10
- 1 tubo de SUET (libre de metales) de 5 mL Refrigerada 3 días / Congelada 1 mes
- 1 muestra heces (refrigerar, estabilidad 4C: 3 días) para KYBERLPSZO

Valores de referencia:

Descripción: TEICOPLANINA
Código: TEICOPLANI
Técnica: Cromatografía Líquida/Tándem Masas (LC-MS/MS)
Unidades: mcg/mL
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 2 mL
Valores de referencia: 5.0-60.0 mcg/mL

Descripción: TELOPEPTIDO AMINOTERMINALES (N-TERMINAL, NTX) DE COLAGENO I
Código: TELOPEPI
Técnica: ICMA
Unidades: nmol/mmol Creat
Plazo: 9 días
Tubo: ORINAS ENVIOS EXTERNOS
Comentario adicional: 10 mL orina. 2º micción matutina.
Valores de referencia: (21 - 83) Hombre
 (17 - 94) Mujer Premenopáusicas
 (26 - 124) Mujer Postmenopáusicas

Descripción:	Temblor esencial hereditario tipo 4. Sec Gen: FUS
Código:	GEN_000746
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	TEOFILINA
Código:	TEOFI
Técnica:	Inmunoensayo
Unidades:	µg/mL
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(10 - 20) Adulto (5 - 10) Apnea neonatal

Descripción:	TEOFILINA SALIVA (AMINOFILINA)
Código:	TEOFISALIV
Técnica:	Inmunoanálisis
Unidades:	mcg/mL
Plazo:	5 días
Tubo:	Saliva
Comentario adicional:	1 mL saliva
Valores de referencia:	(6 - 12)

Descripción:	TEST DE AC. CONTRA RECEPTOR ACIDO FOLICO (FRAT TEST)
Código:	ARAF
Técnica:	EIA
Unidades:	
Plazo:	77 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	2 alícuotas de suero CONGELADO de 1'5 ml cada una como mínimo Y CORREO ELECTRÓNICO A Ugmp.Barcelona@ctes.eurofinseu.com indicando el número de petición. Las muestras deben llegar a Valderribas antes del Jueves.

Los pacientes no deben tomar ácido fólico ni 5 MTHF, ni alimentos suplementados con ácido fólico durante las 48 horas previas a la extracción de sangre. Se recomienda realizar ayuno durante al menos 4 horas.

Hay que entregar formulario específico debidamente cumplimentado

Revisar y enviar el suero congelado (petaca) al laboratorio. Es imprescindible mantener la correcta temperatura de la muestra en todo momento (no se debe congelar y descongelar). En caso de utilizar petaca, esta deberá haber sido mantenida en el con

Valores de referencia:

Descripción:	Test de Aire Espirado SIBO LACTULOSA/LACTITOL
Código:	H2SOBREBAC
Técnica:	Cromatografía de gases
Unidades:	
Plazo:	10 días
Tubo:	Test Aliento

Descripción: Test de Aire Espirado SIBO LACTULOSA/LACTITOL
Comentario adicional: TEST HIDROGENO Y METANO ESPIRADO SOBRECRECIMIENTO BACTERIANO LACTULOSA/LACTITOL
 Muestras de aire espirado a los tiempos establecidos

Valores de referencia:

Descripción: Test de Aire Espirado, Valoracion del TRÁNSITO INTESTINAL
Código: H2TRANSITO
Técnica: Cromatografía de gases
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Test Aliento
Comentario adicional: Muestras de aire espirado en los tiempos establecidos
 Valores de referencia:

Descripción: Test de Aire Espirado: Sobrecrecimiento Bacteriano GLUCOSA
Código: H2SOBREGLU
Técnica: Cromatografía de gases
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Test Aliento
Comentario adicional: Muestras de aire espirado a los tiempos establecidos
 Valores de referencia:

Descripción: Test de Aire Espirado: Intolerancia a la FRUCTOSA
Código: H2FRUCTOSA
Técnica: Cromatografía de gases
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Test Aliento
Comentario adicional:
 Valores de referencia:

Descripción: Test de Aire Espirado: Intolerancia a la LACTOSA
Código: H2LACTOSA
Técnica: Cromatografía de gases
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Test Aliento
Comentario adicional: Muestras de aire espirado en los tiempos establecidos
 Valores de referencia:

Descripción: Test de Aire Espirado: Intolerancia a la SACAROSA
Código: H2SACAROSA
Técnica: Cromatografía de gases
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Test Aliento
Comentario adicional: Kit especial. TEST DE AIRE ESPIRADO PARA INTOLERANCIA A SACAROSA.
 Muestras de aire espirado en los tiempos establecidos.
 Valores de referencia:

Descripción: Test de Aire Espirado: Intolerancia a la SORBITOL
Código: H2SORBITOL
Técnica: Cromatografía de gases
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Test Aliento
Comentario adicional: Kit especial. TEST DE AIRE ESPIRADO PARA INTOLERANCIA A SORBITOL. Muestras de aire espirado en los tiempos establecidos.
Valores de referencia:

Descripción: Test de Aire Espirado: Intolerancia a la XILOSA
Código: H2XILOSA
Técnica: Cromatografía de gases
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Test Aliento
Comentario adicional: Kit especial. TEST DE AIRE ESPIRADO PARA INTOLERANCIA A XILOSA. Muestras de aire espirado en los tiempos establecidos.
Valores de referencia:

Descripción: TEST DE COOMBS DIRECTO
Código: COOMBSD
Técnica: Columna gel
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: 1 mL sangre total EDTA
Valores de referencia: NEGATIVO

Descripción: TEST DE COOMBS INDIRECTO
Código: COOMBSI
Técnica: Columna gel
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia:

Descripción: TEST DE DESGRANULACION DE BASOFILOS
Código: TDBH
Técnica: Observación Microscópica
Unidades: % cel. desgr.
Plazo: 4 días
Tubo: ALICUOTAS EDTA SECCION PRUEBAS ESPECIALES
Comentario adicional: 10 mL sangre total EDTA. Extracción tres semanas después de reacción alérgica.
Aportar comprimido del fármaco a estudio. También se puede enviar viales de medicación líquida, siempre y cuando estas sean medicaciones inyectables.
Valores de referencia: (Sup. 30) Positivo
 (Inf. 30) Negativo

Descripción: TEST DE EMBARAZO ORINA
Código: GRAVINDEX
Técnica: Inmunocromatografía
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Orina Test embarazo
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Test de farmacogenética - Dolor crónico
Código: FARMADOLOR
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: Muestra sangre EDTA rotulada con BM y hoja de petición especial (wellness)
Valores de referencia:

Descripción: Test de farmacogenética - Neuropsiquiatría
Código: FARMANEURO
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: Muestra sangre EDTA rotulada con BM y hoja de petición especial (wellness)
Valores de referencia:

Descripción: TEST DE GRAHAM
Código: GRAHAM
Técnica: Microscopía óptica
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional: Cinta adhesiva transparente segun hoja de instrucciones
Valores de referencia:

Descripción: Test de Hidrogeno y Metano Espirado: INTOLERANCIA AZUCARES
Código: H2AZUCARES
Técnica: Cromatografía de gases
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Test Aliento
Comentario adicional: Muestras de aire espirado en los tiempos establecidos
Valores de referencia:

Descripción: TEST DE PERMEABILIDAD INTESTINAL
Código: PERMEABIL
Técnica: LC-MS/MS
Unidades:
Plazo: 17 días

Descripción:	TEST DE PERMEABILIDAD INTESTINAL
Tubo:	Orina basal
Comentario adicional:	PEDIR INSTRUCCIONES Y KIT A ALMACEN
	Recoger orina durante las 6 horas posteriores a la administración de lactulosa y manitol. Volumen 20.0 mL
	Volumen mínimo 10 mL
	En mujeres, no obtener la muestra durante la menstruación.
	Conservar y enviar refrigerada. Es necesario estar en ayunas (8h) y no tomar medicación (consultar con su médico antes de suspender cualquier medicación) ni hacer ejercicio que requiera esfuerzo.

Valores de referencia:

Descripción:	Test de receptividad endometrial (ventana de implantación)
Código:	EReady
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	17 días
Tubo:	BIOPSIA ESPECIAL
Comentario adicional:	Solicitar kit especial. Contactar con asesoría genética antes de tomar la muestra.
Valores de referencia:	

Descripción:	TEST DE SAICAR (ADENILSUCCINATO LIASA)
Código:	SAICAR.CAN
Técnica:	Espectrometría de absorción molecular
Unidades:	
Plazo:	12 días
Tubo:	Orina congelada
Comentario adicional:	10 mL de orina CONGELADA. puede usarse aislada o de 24 horas IMPRESCINDIBLE INFORME CLINICO

Valores de referencia:

Descripción:	TEST DE SUDOR (CLORO)
Código:	SUDOR
Técnica:	Potenciometría
Unidades:	mmol/L
Plazo:	3 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	Sudor
Valores de referencia:	(Inf. 40) Negativo

Descripción:	TEST DIETA INFLAMATORIA CON CONSULTA
Código:	TDIC
Técnica:	VARIOS
Unidades:	
Plazo:	13 días
Tubo:	Muestra envíos externos
Comentario adicional:	1 tubo de SUEF (libre de metales) de 5 mL + 1 tubo de gelosa suero de 5 mL (centrifugar) + 2 tubos de 3 mL de sangre total EDTA K2 (uno de ellos protegido de la luz, por ejemplo, envolver en papel de aluminio)
Valores de referencia:	

Descripción:	TEST DIETA INFLAMATORIA SIN CONSULTA
Código:	TDII

Descripción:TEST DIETA INFLAMATORIA SIN CONSULTA

Técnica:VARIAS

Unidades:

Plazo:13 días

Tubo:Muestra envíos externos

Comentario adicional:1 tubo de SUET (libre de metales) de 5 ml + 1 tubo de gelosa suero de 5 ml (centrifugar) + 2 tubos de 3 ml de sangre total EDTA K2 (uno de ellos protegido de la luz, por ejemplo, envolver en papel de aluminio)

Valores de referencia:

Código:ETSPLUS

Descripción:TEST ETS PLUS

Técnica:

Comentario adicional:MPX: 1 tubo EDTA
ETS14_PCR: torunda genital u orina
HPV_ROCHE: Mujer - muestra endocervical; Hombre - torunda genital u orina.
VDRL: 1 tubo SUERO

(OJO: muestras separadas opara ETS y HPV)

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	VDRL	63464-2		ANTICUERPOS ANTI TREPONEMA PALLIDUM (SYPHILIS TP)	Indice	(Inf. 0.99) Negativo
Prueba	QPAP			PAPILOMAVIRUS (HPV) DNA DETECCIÓN/TIPIFICACIÓN		Valor de referencia: No se detecta Este método permite la detección de los siguientes serotipos: VPH de bajo riesgo: 6,11 VPH de alto riesgo: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,6
Perfil	MPX			SCREENING HIV, VHC Y VHB POR RT-PCR (MPX)		
Perfil	ETS14PCR			ETS 14 PCR		

Descripción:Test genético de farmacogenética en oncología, 25 fármacos

Código:FARMAGEN25

Técnica:

Unidades:

Plazo:25 días

Tubo:Sangre EDTA

Comentario adicional:Muestra EDTA rotulada con BM y hoja de petición especial (wellness)

Valores de referencia:

Descripción:Test genético intolerancia gluten, lactosa y fructosa

Código:INTALIGEN

Técnica:

Unidades:

Plazo:25 días

Tubo:Sangre EDTA

Descripción: Test genético intolerancia gluten, lactosa y fructosa
Comentario adicional: Muestra EDTA rotulada con BM y hoja de petición especial (wellness)
Valores de referencia:

Descripción: TEST GESTIÓN DEL PESO CON CONSULTA
Código: GEDI
Técnica: Array - SNPs
Unidades:
Plazo: 32 días
Tubo: Muestra envíos externos
Comentario adicional: 2 tubos de K2 EDTA de 3 ML + 1 tubo de gelosa suero de 8,5 mL (centrifugarlo) +1 tubo de gelosa suero de 4 mL [centrifugar y separar en 1 alícuota (congelar SOLO si el transporte de la muestra es >48h)]
El paciente debe rellenar y escanearse el cuestionario específico
Valores de referencia:

Descripción: TEST GESTIÓN DEL PESO SIN CONSULTA
Código: GEPE
Técnica: ARRAY-SNPs
Unidades:
Plazo: 32 días
Tubo: Muestra envíos externos
Comentario adicional: 2 tubos de K2 EDTA de 3 ML + 1 tubo de gelosa suero de 8,5 mL (centrifugarlo) +1 tubo de gelosa suero de 4 mL [centrifugar y separar en 1 alícuota (congelar SOLO si el transporte de la muestra es >48h)]
Nota: importante, el paciente debe rellenar y escanearse el cuestionario específico adjunto
Valores de referencia:

Descripción: TEST OWLIVER: DETECCIÓN ESTEATOHEPATITIS NO ALCOHOLICA
Código: OWLIVER
Técnica: UHPLC/MS
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: Suero congelado
Valores de referencia:

Descripción: Test portadores GeneScreen: Ampliación panel 1 nivel
Código: AMP1LEVGS
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 22 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Test portadores GeneScreen: Añadir 1 gen
Código: GENEXTRAGS
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo:
Tubo: EDTA Biología Molecular
Comentario adicional: Prueba creada para añadir el análisis de un gen a un estudio de GeneScreen hecho anteriormente.

Descripción: Test portadores GeneScreen: Añadir 1 gen

Valores de referencia:

Código: HARMONY

Descripción: TEST PRENATAL HARMONY

Técnica:

Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	HARMONSEXO	75693-2		HARMONY TEST PRENATAL CON SEXO FETAL		
Prueba	HARMONMONX	88571-5		HARMONY TEST PRENATAL CON MONOSOMÍA X		
Prueba	HARMONANEU	73821-1		HARMONY TEST PRENATAL CON ANEUPLOIDIAS SEXUALES		
Prueba	HARMOBASIC	73967-2		HARMONY TEST PRENATAL (T21, T18, T13)		
Prueba	EDADGSEMAN	49051-6		EDAD GESTACIONAL: SEMANAS (HARMONY)		
Prueba	EDADGDIAS	49052-4		EDAD GESTACIONAL: DIAS (HARMONY)		
Prueba	FECUNHMY	47224-1		TIPO DE FECUNDACIÓN (HARMONY)		
Prueba	EDADOVULOS	68327-6		EDAD ÓVULOS: PROPIOS O DONANTE (HARMONY)		
Prueba	NFETOSHMY	55281-0		NUMERO DE FETOS (HARMONY)		

Código: HARMOBAS

Descripción: TEST PRENATAL HARMONY (TRISOMÍAS Y SEXO)

Técnica:

Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	HARMONSEXO	75693-2		HARMONY TEST PRENATAL CON SEXO FETAL		
Prueba	HARMOBASIC	73967-2		HARMONY TEST PRENATAL (T21, T18, T13)		
Prueba	EDADGSEMAN	49051-6		EDAD GESTACIONAL: SEMANAS (HARMONY)		
Prueba	EDADGDIAS	49052-4		EDAD GESTACIONAL: DIAS (HARMONY)		
Prueba	FECUNHMY	47224-1		TIPO DE FECUNDACIÓN (HARMONY)		
Prueba	EDADOVULOS	68327-6		EDAD ÓVULOS: PROPIOS O DONANTE (HARMONY)		
Prueba	NFETOSHMY	55281-0		NUMERO DE FETOS (HARMONY)		

Código: TRCOVIDAC

Descripción: TEST RÁPIDO COVID-19 ANTICUERPOS

Técnica:

Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.

Componentes					
Prueba	TRCOVIGG	94507-1		COVID19 IGG (TEST RÁPIDO)	
Prueba	TRCOVIGM	94508-9		COVID19 IGM (TEST RÁPIDO)	

Descripción: TEST RAPIDO DE MALARIA

Código: MALARIATES

Técnica: Inmunocromatografía

Unidades:

Plazo: 4 días

Tubo: Sangre EDTA

Comentario adicional:

Valores de referencia:

Descripción: TEST RÁPIDO PARA CRYPTOSPORIDIUM

Código: CRYPTOSAG

Técnica: Inmunocromatografía

Unidades:

Plazo: 3 días

Tubo: Heces No Microbiología

Comentario adicional:

Valores de referencia:

Descripción: TESTOSTERONA EN ORINA

Código: TESTOS2

Técnica: INMUNOLUMINISCENCIA

Unidades: mcg/24 h

Plazo: 12 días

Tubo: Orina 24 Horas

Comentario adicional: 10 mL. Indicar volumen 24h. Se recomienda efectuar esta determinación en suero

Valores de referencia: (25 - 125) Hombre
(5 - 35) Mujer

Descripción: TESTOSTERONA LIBRE

Código: TESTOSLI

Técnica: CLIA

Unidades: pg/mL

Plazo: 6 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 1 mL suero.

Valores de referencia: (4.5 - 42) Hombre
(Inf. 9) Mujer

Descripción: TESTOSTERONA LIBRE EN SALIVA

Código: TESTLSAL

Técnica: EIA

Unidades: pg/mL

Plazo: 8 días

Tubo: Saliva

Descripción:	TESTOSTERONA LIBRE EN SALIVA
Comentario adicional:	1.0 mL de saliva en tubo sin aditivos. Se puede usar Salivetes Durante los 30 minutos antes de obtener la muestra de saliva no ingiera alimentos, no beba, no fume ni mastique chicle.
Valores de referencia:	(36.30 - 117.91) Hombre 20 años - 29 años (28.57 - 83.93) Hombre 29 años - 39 años (27.20 - 81.83) Hombre 39 años - 49 años (27.12 - 77.15) Hombre 49 años - 59 años (21.63 - 73.04) Hombre 59 años - 69 años (7.35 - 42.50) Mujer 20 años - 29 años (7.10 - 42.50) Mujer 29 años - 39 años (6.50 - 42.50) Mujer 39 años - 49 años (5.80 - 42.50) Mujer 49 años - 59 años (5.25 - 34.20) Mujer 59 años - 69 años

Descripción:	TESTOSTERONA TOTAL
Código:	TESTOS
Técnica:	Inmunoquimioluminiscencia
Unidades:	ng/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(0.47 - 9.80) Hombre 18 años - 50 años (1.27 - 10.20) Hombre > 50 años (Inf. 0.30) Hombre 7 años - 18 años Tanner I (Inf. 2.82) Hombre 7 años - 18 años Tanner II (0.086 - 6.81) Hombre 7 años - 18 años Tanner III (0.18 - 7.85) Hombre 7 años - 18 años Tanner IV (0.13 - 9.06) Hombre 7 años - 18 años Tanner V (0.07 - 0.79) Mujer 18 años - 50 años (0.08 - 0.37) Mujer > 50 años (0.058 - 0.33) Mujer 7 años - 18 años Tanner I (0.043 - 0.23) Mujer 7 años - 18 años Tanner II (0.069 - 0.43) Mujer 7 años - 18 años Tanner III (0.15 - 0.53) Mujer 7 años - 18 años Tanner IV (0.15 - 1.02) Mujer 7 años - 18 años Tanner V

Descripción:	Tetra-Amelia, Sd. Sec Gen: WNT3
Código:	GEN_000747
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Tetracloroetileno (Percloroetileno) en sangre
Código:	PERCLOETIL
Técnica:	Cromatografía de Gases/captura de electrones
Unidades:	mg/L
Plazo:	13 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia

Descripción:	Tetracloroetileno (Percloroetileno) en sangre
Comentario adicional:	3 ml de sangre total al principio de la última jornada de la semana laboral. Refrigerar Volumen mínimo: 1 mL
Valores de referencia:	(Inf. 0.4) Principio de última jornada de semana laboral. Valor límite biológico- VLB (INSST) (Inf. 0.5) Principio de última jornada de semana laboral. Biológicas exposure indices-BEIs (ACGIH)

Descripción:	TETRAHIDROFURANO EN ORINA
Código:	TETRAHFUR
Técnica:	Cromatografía de gases/Ionización de Llama
Unidades:	mg/L
Plazo:	7 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	10 ml de orina (micción aislada) al final de la jornada laboral.
Valores de referencia:	(Inf. 2.0) Personas expuestas (Tetrahidrofurano); Final de la jornada (VLB-INSHT)

Descripción:	TGF-BETA 1 PLASMA
Código:	TGFBETA1
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	ng/mL
Plazo:	50 días
Tubo:	Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional:	1 mL Plasma EDTA Tripotásico congelado
Valores de referencia:	(1.40 - 8.20)

Descripción:	TH/TO AC. SUERO
Código:	TH.TOAC
Técnica:	Inmunoblot
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	Negativo

Descripción:	TIAPRIDA SUERO
Código:	TIAPRIDA
Técnica:	Cromatografía Líquida/Tándem Masas
Unidades:	µg/mL
Plazo:	17 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	(1.0 - 2.0)

Código:	PFA100
Descripción:	TIEMPO DE OBTURACION
Técnica:	Adhesión plaquetaria en flujo
Comentario adicional:	¡CITAR PRUEBA EN EL LABORATORIO!

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	PFA100EPI	24471-5		TIEMPO DE OBTURACION-EPINEFRINA	segundos	(84 - 160)
Prueba	PFA100ADP	24472-3		TIEMPO DE OBTURACION-ADP	segundos	(68 - 121)

Descripción: TIEMPO DE PROTOMBINA CAPILAR

Código: TP.C

Técnica: Coagulación

Unidades: segundos

Plazo: 1 días

Tubo:

Comentario adicional:

Valores de referencia:

Código: TP

Descripción: TIEMPO DE PROTROMBINA PLASMA

Técnica: Coagulométrica

Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	TP.	5902-2		TIEMPO DE PROTROMBINA	segundos	
Prueba	QUICK	5894-1		INDICE DE QUICK	%	(78 - 121)
Prueba	INR	6301-6		INR TIEMPO PROTROMBINA		(0.9 - 1.1)
Prueba	RATIO	5003181		RATIO T. PROTOMBINA		

Descripción: TIEMPO DE REPTILASE

Código: TREPTIS

Técnica:

Unidades: sg

Plazo: 5 días

Tubo: Coagulación - Plasma Citrato

Comentario adicional: 1 ml plasma (citrato) pobre en plaquetas (doble centrifugación a 2500 g/15 min.)Aspirar parte superior. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.

Volumen mínimo

0.45 mL

Valores de referencia: (12 - 22)

Código: TROMBINA

Descripción: TIEMPO DE TROMBINA

Técnica:

Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	TROMBHALLA	3243-3		TIEMPO DE TROMBINA	segundos	(Inf. 21)

Componentes						
Prueba	TROMCONTRO	5955-0		TIEMPO DE TROMBINA: TIEMPO CONTROL	segundos	

Descripción: TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA

Código: TTP

Técnica: Coagulometría

Unidades: segundos

Plazo: 3 días

Tubo: Coagulación - Plasma Citrato

Comentario adicional:

Valores de referencia: (20 - 39)

Código: TTP.

Descripción: TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA Y RATIO

Técnica:

Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	TTP	14979-9		TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA	segundos	(20 - 39)
Prueba	RATIO.TTP	63561-5		RATIO TTP		(0.8 - 1.2)

Descripción: Timidin Quinasa en suero

Código: TIMIDINQUI

Técnica: Quimioluminiscencia

Unidades: U/L

Plazo: 8 días

Tubo: Suero Congelado

Comentario adicional: 1 mL suero. Congelar y enviar congelado.

Volumen: 1.0 mL

Volumen mínimo: 0.20 mL

Valores de referencia: (2.0 - 7.5)

Descripción: Timothy, Sd. Sec Gen: CACNA1C

Código: GEN_000748

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: TINCION DE GRAM

Código: GRAM

Técnica: Observación microscópica

Unidades:

Descripción: TINCION DE GRAM

Plazo: 3 días

Tubo: Microbiología

Comentario adicional:

Valores de referencia:

Descripción: TINCION DE ZIEHL-NEELSEN

Código: ZIEHL

Técnica: Tinción Ziehl-Neelsen para bacilos ácido-alcohol resistentes

Unidades:

Plazo: 3 días

Tubo: Muestra Microbiología

Comentario adicional: Muestras de orina, esputo y otros especímenes en recipiente estéril adecuado

Valores de referencia:

Descripción: TIOCIANATOS, ORINA

Código: TIOCIANATO

Técnica: Espectrofotometría

Unidades: mg/L

Plazo: 12 días

Tubo: Orina pruebas referencia

Comentario adicional: 1.0 mL orina micción aislada.
100 µl

Valores de referencia: (1.0 - 4.0) No fumadores
(7.0 - 17) Fumadores

Descripción: TIOLES TOTALES, PLASMA

Código: TIOLES

Técnica: Espectrofotometría

Unidades: µmol/L

Plazo: 20 días

Tubo: Plasma EDTA Congelado

Comentario adicional: PLASMA DE EDTA SEPARADO Y CONGELADO

Valores de referencia: (204 - 309)

Descripción: TIOPENTAL SUERO

Código: TIOPENTAL

Técnica: Cromatografía líquida/Tándem masas

Unidades: mcg/mL

Plazo: 4 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 2 mL suero

Valores de referencia: (1 - 5) Hipnosia
(30 - 100) Coma terapéutico
(7 - 130) Anestesia

Descripción: TIOPURINA METIL-TRANSFERASA (Azatioprina)

Código: TPMT

Técnica: HPLC

Unidades: U/mL

Descripción: TIOPURINA METIL-TRANSFERASA (Azatioprina)
Plazo: 18 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: Sangre Total EDTA
 Volumen: 5.0 mL (mínimo 2mL)

Evitar recogida vísperas de festivo.
Valores de referencia: (Inf. 5.0) No administrar
 (5.1 - 13.7) 0.5 mg/kg/d de Azatioprina
 (13.8 - 18) 1.5 mg/kg/d de Azatioprina
 (18.1 - 26) 2.5 mg/kg/d de Azatioprina
 (26.1 - 40) 3 mg/kg/d de Azatioprina

Descripción: TIPAJE LEUCOCITOS SANGRE PERIFERICA

Código: TIPAJEC
Técnica: Citometría de flujo
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 10 mL de sangre total EDTA
Valores de referencia:

Descripción: TIROGLOBULINA

Código: TG
Técnica: Téc. ICMA
Unidades: ng/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero.
 Alternativa plasma de EDTA K2 y EDTA Na2, Heparina de litio.
Valores de referencia: (Inf. 2) Personas tiroidectomizadas
 (Inf. 64.15) Personas aparentemente sanas (percentil 97.5)

Descripción: TIROGLOBULINA AC. SUERO

Código: TIROGLOAC
Técnica: Técnica CMIA
Unidades: UI/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 4.11)

Descripción: TIROSINCINASA-1 SOLUBLE TIPO FMS (sFlt-1)

Código: SFLT1
Técnica: Técnica ECLIA
Unidades: pg/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: suero refrigerado 48h, sino suero congelado

Descripción:	TIROSINCINASA-1 SOLUBLE TIPO FMS (sFlt-1)
Valores de referencia:	(652 - 2501) Mujer 10-14 sem.gestación (708 - 2807) Mujer 15-19 sem.gestación (572 - 2997) Mujer 20-23 sem.gestación (618 - 3205) Mujer 24-28 sem.gestación (773 - 5165) Mujer 29-33 sem.gestación (992 - 7363) Mujer 34-36 sem.gestación (1533 - 9184) Mujer 37 sem.gestación-parto

Descripción:	Tirosinemia. Panel NGS
Código:	GEN_000749
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	TITANIO SUERO
Código:	TITANIO
Técnica:	Espectrometría de masas-Plasma acoplado inductivamente
Unidades:	mcg/L
Plazo:	9 días
Tubo:	Tubo Especial
Comentario adicional:	INSTRUCCIONES OBTENCIÓN DE LA MUESTRA: Se extraen 6 ml de sangre en el tubo de tapón blanco. Invertir de 5 a 10 veces y poner el tubo en posición vertical hasta que la sangre se haya coagulado totalmente. (60 min. como mínimo)

Se centrifuga a 1800 g (aproximadamente 3000 rpm, en función de la centrifuga) durante 10 min. y se transfiere el sobrenadante (suero) al tubo de tapón amarillo. No apurar al pipetear el suero para evitar hemólisis.

	SE ENVIA SOLO EL TUBO DE TAPON AMARILLO
Valores de referencia:	(Inf. 7.5)

Descripción:	TOBRAMICINA
Código:	TOBRA
Técnica:	Inmunoanálisis
Unidades:	mcg/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(5 - 10) Pico (Sup. 10) Pico - TOXICIDAD (1 - 2) Valle (Sup. 2) Valle - TOXICIDAD

Descripción:	TOLUENO EN ORINA (EXPOSICIÓN A TOLUENO)
Código:	TOLUENO2
Técnica:	Cromatografía de gases/ionización de llama
Unidades:	mg/L
Plazo:	12 días
Tubo:	Orina Final de Jornada

Descripción: TOLUENO EN ORINA (EXPOSICIÓN A TOLUENO)
Comentario adicional: 2 ml de orina (micción aislada) al final de la jornada laboral. Enviar refrigerada.
Valores de referencia: (Inf. 0.08) Final de jornada laboral (exposición TOLUENO).VLB-INSST

Descripción: TOLUENO EN SANGRE
Código: TOLUENO
Técnica: Téc. Cromatografía de Gases / Ionización de Llama.
Unidades: mg/L
Plazo: 12 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 2 tubos de sangre total EDTA, al principio de la última jornada laboral. Refrigerar
 Volumen mínimo: 3.00 mL
Valores de referencia: (Inf. 0.05) VLB Principio de la última jornada de la semana (INSHT)

Descripción: TOPIRAMATO EN SUERO
Código: TOPIRAMATO
Técnica: LC-MS/MS
Unidades: µg/mL
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL de suero. Alternativa plasma de heparina.
Valores de referencia: (2 - 10) (AGNP 2017)

Descripción: Tortuosidad arterial, Sd. Sec Gen: SLC2A10
Código: GEN_000750
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Townes-Brocks, Sd. Sec Gen: SALL1
Código: GEN_000751
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: TOXINA CLOSTRIDIUM A +B DIFFICILE EN HECES
Código: TOXICLOS
Técnica: Inmunoanálisis
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Heces No Microbiología
Comentario adicional: Heces

Descripción: TOXINA CLOSTRIDIUM A +B DIFFICILE EN HECES

Valores de referencia:

Descripción: TOXINA TETANICA AC. IGG SUERO

Código: TETANOSACG

Técnica: Técnica EIA

Unidades: UI/mL

Plazo: 4 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 1 mL suero

Valores de referencia: (0.01 - 0.1) Protección no efectiva
(0.1 - 0.5) Protección efectiva. Corto plazo
(0.5 - 5.0) Protección efectiva. Largo plazo

Descripción: TOXOCARA CANIS AC. IGG SUERO

Código: TOXOCIGG

Técnica: Enzimoinmunoanálisis

Unidades:

Plazo: 8 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 1 mL suero. Alternativo 1 mL de plasma de citrato sódico

Valores de referencia: (Inf. 0.8) Negativo

Descripción: TOXOPLASMA GONDII AC. IgA

Código: TOXOACA

Técnica: EIA

Unidades: Índice

Plazo: 9 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 1 mL suero. REFRIGERAR

Valores de referencia: (Inf. 0.8) Negativo
(0.8 - 1.1) Indeterminado

Descripción: TOXOPLASMA GONDII AC. IGG

Código: TOXOACG

Técnica: CLIA

Unidades: UI/mL

Plazo: 3 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional:

Valores de referencia: (Inf. 1.59) Negativo
(1.6 - 2.99) Indeterminado

Descripción: TOXOPLASMA GONDII AC. IGG CONFIRMACION SUERO

Código: TOXOACGCON

Técnica: IMMUNOBLOT

Unidades:

Plazo: 12 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 1 mL suero.

Descripción: TOXOPLASMA GONDII AC. IGG CONFIRMACION SUERO

Valores de referencia:

Descripción: TOXOPLASMA GONDII AC. IGG EN LCR

Código: TOXOGLC

Técnica: Quimioluminiscencia

Unidades: Indice

Plazo: 5 días

Tubo: Líquidos Biológicos

Comentario adicional: 1 mL LCR.
Se recomienda realizar análisis simultáneo en suero y LCR.

Valores de referencia: No se dispone de valores de referencia. Valorar a criterio clínico.

Descripción: TOXOPLASMA GONDII AC. IGM

Código: TOXOACM

Técnica: CLIA

Unidades:

Plazo: 3 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional:

Valores de referencia: (Inf. 0.50) Negativo
(0.51 - 0.59) Indeterminado

Descripción: TOXOPLASMA GONDII AC. IGM CONFIRMACION SUERO

Código: TOXOACMCON

Técnica: Inmunoblot

Unidades:

Plazo: 12 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 1 mL suero

Valores de referencia:

Descripción: TOXOPLASMA GONDII AC. IGM EN LCR

Código: TOXOMLC

Técnica: Quimioluminiscencia

Unidades: UI/mL

Plazo: 5 días

Tubo: Líquidos Biológicos

Comentario adicional: 0.5 mL LCR.

Valores de referencia: No se dispone de valores de referencia. Valorar a criterio clínico.

Descripción: TOXOPLASMA GONDII AVIDEZ AC. IGG

Código: AVIDEZTOXO

Técnica: Técnica CLIA (Enzimoinmunoanálisis quimioluminiscente)

Unidades: %

Plazo: 9 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional:

Descripción: TOXOPLASMA GONDII AVIDEZ AC. IGG
Valores de referencia: (Inf. 50) Baja Avidéz. Valorar en el contexto clínico y con resto de marcadores serológicos
 (50 - 59.9) Avidéz zona límite
 (Sup. 60) Alta Avidéz. Compatible con infección pasada por Toxoplasma gondii, adquirida hace más de 4 meses

Descripción: TOXOPLASMA GONDII DNA MUESTRA BIOLÓGICA

Código: TOXOPCR

Técnica: Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR)

Unidades:

Plazo: 6 días

Tubo: Muestra Biología Molecular

Comentario adicional: 1 ml LCR-CONGELAR
 1 ml líquido amniótico-CONGELAR
 200 ml humor vítro/acuoso-CONGELAR
 2 ML SANGRE TOTAL EDTA- REFRIGERADO
 Biopsia parafina-TA

NO SE ACEPTA PLASMA

Valores de referencia:

Descripción: TPA SUERO (ANTIGENO POLIPEPTIDICO TISULAR)

Código: TPA

Técnica: Quimioluminiscencia

Unidades: U/L

Plazo: 7 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 1 mL de suero

Volumen mínimo
 0.6 mL

Valores de referencia: (Inf. 75)

Descripción: TPHA LCR (TREPONEMA PALLIDUM AC HEMAGLUTINACION)

Código: TPHA LCR

Técnica: Hemaglutinación Indirecta

Unidades:

Plazo: 5 días

Tubo: Líquidos Biológicos

Comentario adicional: 1 ml LCR

Valores de referencia: <1/80 Negativo
 >1/80 Positivo

Descripción: TPHA SUERO (TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS HEMAGLUTINACION)

Código: TPHA

Técnica: Hemaglutinación

Unidades:

Plazo: 7 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 1 mL suero

Descripción: TPHA SUERO (TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS HEMAGLUTINACION)
Valores de referencia: <1/80 Negativo
 >1/80 Positivo

Descripción: TPS (Antígeno Tisular Polipeptido Especifico)
Código: TPS
Técnica: Enzimoimmunoanálisis
Unidades: U/L
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml
Valores de referencia: (Inf. 80)

Descripción: Tr ANTICUERPOS LCR
Código: TRACLCR
Técnica: Técnica Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: LIQUIDO LCR INMUNO
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Tr. almacen ac siálico. Enf. Salla. Sec Gen: SLC17A5
Código: GEN_000754
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Tr.otopalatodigitales con FLNA. Sec Gen: FLNA
Código: GEN_000756
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: TRAMADOL EN SUERO
Código: TRAMADOL
Técnica: Cromatografía líquida/Tándem masas
Unidades: µg/L
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero. refrigerar. 0.5 ml
 Alternativa: Plasma de EDTa refrigerado.

La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis.

Descripción: TRAMADOL EN SUERO
Valores de referencia: (100 - 1000) Índice terapéutico
 (Sup. 1000) Toxicidad
 (Inf. 25) Límite de cuantificación

Descripción: TRANSAMINASA GOT (AST)
Código: GOT
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: U/L a 37 °C
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL suero
Valores de referencia: (25 - 75) < 10 días
 (15 - 60) 10 días - 24 meses
 (Inf. 35) Mujer > 24 meses
 (Inf. 50) Hombre > 24 meses

Descripción: TRANSAMINASA GPT (ALT)
Código: GPT
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: U/L a 37 °C
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL suero
Valores de referencia: (Inf. 50) Hombre > 1 año
 (Inf. 35) Mujer > 1 año
 (13 - 45) < 1 año

Descripción: TRANCORTINA EN SUERO
Código: TRANCORT
Técnica: RIA
Unidades: µg/mL
Plazo: 22 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1mL SUERO. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.
Valores de referencia: (22.00 - 55.00) Hombre
 (40.00 - 154.00) Mujer

Descripción: TRANSFERRINA
Código: TRANSF
Técnica: Turbidimetría
Unidades: mg/dL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero
 Alternativa: Plasma de EDTA o heparina
Valores de referencia: (200 - 360)

Descripción: TRANSFERRINA DEFICIENTE EN CARBOHIDRATOS
Código: TRANSFDEF
Técnica: Nefelometría
Unidades: %

Descripción: TRANSFERRINA DEFICIENTE EN CARBOHIDRATOS
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero
 Volumen 1.0 mL
 Volumen mínimo 0.30 mL
Valores de referencia: (Inf. 2.47) Normal

Descripción: TRANSGLUTAMINASA AC. IGA
Código: TRANACIGA
Técnica: CAP SYSTEM
Unidades: U/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 6.9) Negativo
 (7 - 9.9) Indeterminado

Descripción: TRANSGLUTAMINASA AC. IGG
Código: TRANSLIGG
Técnica: CAP SYSTEM
Unidades: U/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL
Valores de referencia: (Inf. 6.9) Negativo
 (7 - 9.9) Indeterminado

Descripción: Translocación t(14;16)(q32;q23). Gen de fusión IGH/MAF
Código: MDFISH1416
Técnica:
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional: 5-20 ml sangre periférica.
 min 2 ml médula ósea.
 Muestra alternativa: tejido fresco o fijado/parafinado
Valores de referencia:

Descripción: TRANSPORTADOR DE ZINC 8 ANTICUERPOS (ZNT8)
Código: TRANSZN8
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: U/mL
Plazo: 12 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 ml suero (Volumen mínimo 0.5 mL)
Valores de referencia: (Inf. 10) Negativo

Código: TRANSKETOL
Descripción: TRANSQUETOLASA ERITROCITARIA
Técnica: Espectrofotometría de absorción molecular

Código:TRANSKETOL

5 mL sangre total (heparina). Alternativa: EDTA.

Comentario adicional:ENVIAR DE LUNES A MARTES (No enviar visperas de festivo)

Rogamos avisar previamente .

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	TRANSQACT	34609-8		Perfil TRANSKETOL: TRANSQUETOLASA ACTIVIDAD	UI/gHb	(0.30 - 0.80)
Prueba	TRANSQTPP	34609-8		Perfil TRANSKETOL: TRANSQUETOLASA ACTIVIDAD + VIT B1 (TPP)	UI/gHb	(0.30 - 0.90)
Prueba	COEFACTK			Perfil TRANSKETOL: COEFICIENTE DE ACTIVIDAD TRANSQUETOLASA		(Inf. 1.16) Indican actividad de TK adecuada con valores de tiamina en rango. (1.16 - 1.24) Indican riesgo moderado de clínica derivada de la deficiencia de actividad de TK por descenso de tiamina. (Sup. 1.24) Indican alto riesgo de clínica derivada de la deficiencia de actividad de TK por descenso de tiamina.

Descripción:Transtornos del ciclo de la urea. Panel NGS

Código:GEN_000752

Técnica:

Unidades:

Plazo:30 días

Tubo:EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional:Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción:Trastornos asociados a POLG: genes POLG1 y POLG2 (NGS)

Código:POLG

Técnica:NGS y MLPA

Unidades:

Plazo:30 días

Tubo:EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional:Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción:Trastornos de la coagulación. Panel NGS

Código:GEN_000753

Técnica:

Unidades:

Plazo:30 días

Tubo:EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional:Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Descripción: Trastornos de la coagulación. Panel NGS

Valores de referencia:

Descripción: Trastornos del desarrollo panel de genes

Código: PHARMALP13

Técnica: NGS

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación y rotulado con BM.

Alternativas: Citrato.

Imprescindible enviar la historia clínica y formulario de petición de genética o consentimiento informado

Valores de referencia:

Descripción: Trastornos del desarrollo sexual. Panel NGS

Código: GEN_000755

Técnica:

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Trastornos del movimiento panel de genes

Código: PHARMALP10

Técnica: NGS

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación y rotulado con BM.

Alternativas: Citrato.

Imprescindible enviar la historia clínica y formulario de petición de genética o consentimiento informado

Valores de referencia:

Descripción: TRAZODONA EN SUERO

Código: TRAZODONA

Técnica: Cromatografía Líquida/Tándem Masas

Unidades: µg/l

Plazo: 8 días

Tubo: Suero Basal

Descripción: TRAZODONA EN SUERO

Comentario adicional: Muestra: Suero
 Cantidad: 1 tubo
 Contenedor: Tubo suero sin gel separador
 Volumen: 0.5 mL
 Conservación: Refrigerar
 Volumen mínimo: 0,1 mL
 * Alternativa
 Muestra: Plasma EDTA
 Cantidad: 1 tubo
 Contenedor: Tubo sangre EDTA
 Volumen: 0.5 mL
 Conservación: Refrigerar
 Volumen mínimo: 0,1 mL

* *

Valores de referencia: (700 - 1000)
 (Sup. 1200) Toxicidad

Descripción: Treacher Collins, Sd. Panel NGS

Código: GEN_000757

Técnica:

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: TREPONEMA PALLIDUM AC. IGA SUERO

Código: TREPOACA

Técnica: Inmunofluorescencia indirecta

Unidades:

Plazo: 9 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 1 mL suero

Valores de referencia: <1:10 Negativo
 > 0 = 1:10 Positivo

Descripción: TREPONEMA PALLIDUM AC. IGG LCR

Código: TREPOACGLC

Técnica: ENZIMOINMUNOANÁLISIS.

Unidades: Índice

Plazo: 5 días

Tubo: Líquidos Biológicos

Comentario adicional: 1 mL LCR

Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo

Descripción: TREPONEMA PALLIDUM AC. IGG SUERO

Código: TREPOACG

Técnica: EIA

Unidades: Índice

Plazo: 6 días

Descripción: TREPONEMA PALLIDUM AC. IGG SUERO
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 0.8) Negativo
 (0.8 - 1.1) Indeterminado

Descripción: TREPONEMA PALLIDUM AC. IGM LCR
Código: TREPOACMLC
Técnica: ENZIMOINMUNOANÁLISIS
Unidades: Índice
Plazo: 5 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 mL LCR
Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo

Descripción: TREPONEMA PALLIDUM AC. IGM SUERO
Código: TREPOACM
Técnica: EIA
Unidades: Índice
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 0.8) Negativo
 (0.8 - 1.1) Indeterminado

Descripción: Treponema pallidum DNA PCR Cualitativa
Código: TREPOPCR
Técnica:
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Exudado genital (escobillón seco)
 -Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO
 2ml Sangre total EDTA- REFRIGERAR
 Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO
 5ml orina-CONGELAR
 1ml humor vitreo / acuoso-CONGELAR
 1ml LCR-CONGELAR

 Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
 Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
Valores de referencia: Valor de referencia: No se detecta

Descripción: Treponema pallidum DNA PCR Cualitativa
Código: TREPOPCR
Técnica:
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra Biología Molecular

Descripción:	Treponema pallidum DNA PCR Cualitativa
Comentario adicional:	Exudado genital (escobillón seco) -Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO 2ml Sangre total EDTA- REFRIGERAR Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO 5ml orina-CONGELAR 1ml humor vitreo / acuoso-CONGELAR 1ml LCR-CONGELAR Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta

Descripción:	Treponema pallidum DNA PCR Cualitativa
Código:	TREPOPCR
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:	Exudado genital (escobillón seco) -Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO 2ml Sangre total EDTA- REFRIGERAR Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO 5ml orina-CONGELAR 1ml humor vitreo / acuoso-CONGELAR 1ml LCR-CONGELAR Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta

Descripción:	Treponema pallidum DNA PCR Cualitativa
Código:	TREPOPCR
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:	Exudado genital (escobillón seco) -Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO 2ml Sangre total EDTA- REFRIGERAR Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO 5ml orina-CONGELAR 1ml humor vitreo / acuoso-CONGELAR 1ml LCR-CONGELAR Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta

Descripción:	Treponema pallidum DNA PCR Cualitativa
Código:	TREPOPCR
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	7 días

Descripción: Treponema pallidum DNA PCR Cualitativa
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Exudado genital (escobillón seco)
 -Humor vítreo/acuoso-REFRIGERADO
 2ml Sangre total EDTA- REFRIGERAR
 Humor vítreo/acuoso-REFRIGERADO
 5ml orina-CONGELAR
 1ml humor vítreo / acuoso-CONGELAR
 1ml LCR-CONGELAR

 Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
 Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
Valores de referencia: Valor de referencia: No se detecta

Descripción: Treponema pallidum DNA PCR Cualitativa
Código: TREPOPCR
Técnica:
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Exudado genital (escobillón seco)
 -Humor vítreo/acuoso-REFRIGERADO
 2ml Sangre total EDTA- REFRIGERAR
 Humor vítreo/acuoso-REFRIGERADO
 5ml orina-CONGELAR
 1ml humor vítreo / acuoso-CONGELAR
 1ml LCR-CONGELAR

 Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
 Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
Valores de referencia: Valor de referencia: No se detecta

Descripción: Treponema pallidum DNA PCR Cualitativa
Código: TREPOPCR
Técnica:
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Exudado genital (escobillón seco)
 -Humor vítreo/acuoso-REFRIGERADO
 2ml Sangre total EDTA- REFRIGERAR
 Humor vítreo/acuoso-REFRIGERADO
 5ml orina-CONGELAR
 1ml humor vítreo / acuoso-CONGELAR
 1ml LCR-CONGELAR

 Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
 Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
Valores de referencia: Valor de referencia: No se detecta

Descripción: Treponema pallidum DNA PCR Cualitativa
Código: TREPOPCR
Técnica:
Unidades:

Descripción:	Treponema pallidum DNA PCR Cualitativa
Plazo:	7 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:	Exudado genital (escobillón seco) -Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO 2ml Sangre total EDTA- REFRIGERAR Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO 5ml orina-CONGELAR 1ml humor vitreo / acuoso-CONGELAR 1ml LCR-CONGELAR Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta

Descripción:	Treponema pallidum DNA PCR Cualitativa
Código:	TREPOPCR
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:	Exudado genital (escobillón seco) -Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO 2ml Sangre total EDTA- REFRIGERAR Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO 5ml orina-CONGELAR 1ml humor vitreo / acuoso-CONGELAR 1ml LCR-CONGELAR Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta

Descripción:	Treponema pallidum DNA PCR Cualitativa
Código:	TREPOPCR
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:	Exudado genital (escobillón seco) -Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO 2ml Sangre total EDTA- REFRIGERAR Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO 5ml orina-CONGELAR 1ml humor vitreo / acuoso-CONGELAR 1ml LCR-CONGELAR Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta

Descripción:	Treponema pallidum DNA PCR Cualitativa
Código:	TREPOPCR
Técnica:	

Descripción:	Treponema pallidum DNA PCR Cualitativa
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:	Exudado genital (escobillón seco) -Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO 2ml Sangre total EDTA- REFRIGERAR Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO 5ml orina-CONGELAR 1ml humor vitreo / acuoso-CONGELAR 1ml LCR-CONGELAR Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta

Descripción:	Treponema pallidum DNA PCR Cualitativa
Código:	TREPOPCR
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:	Exudado genital (escobillón seco) -Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO 2ml Sangre total EDTA- REFRIGERAR Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO 5ml orina-CONGELAR 1ml humor vitreo / acuoso-CONGELAR 1ml LCR-CONGELAR Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta

Descripción:	Treponema pallidum DNA PCR Cualitativa
Código:	TREPOPCR
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:	Exudado genital (escobillón seco) -Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO 2ml Sangre total EDTA- REFRIGERAR Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO 5ml orina-CONGELAR 1ml humor vitreo / acuoso-CONGELAR 1ml LCR-CONGELAR Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta

Descripción:	Treponema pallidum DNA PCR Cualitativa
Código:	TREPOPCR

Descripción:	Treponema pallidum DNA PCR Cualitativa
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:	Exudado genital (escobillón seco) -Humor vítreo/acuoso-REFRIGERADO 2ml Sangre total EDTA- REFRIGERAR Humor vítreo/acuoso-REFRIGERADO 5ml orina-CONGELAR 1ml humor vítreo / acuoso-CONGELAR 1ml LCR-CONGELAR Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta

Descripción:	Treponema pallidum DNA PCR Cualitativa
Código:	TREPOPCR
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:	Exudado genital (escobillón seco) -Humor vítreo/acuoso-REFRIGERADO 2ml Sangre total EDTA- REFRIGERAR Humor vítreo/acuoso-REFRIGERADO 5ml orina-CONGELAR 1ml humor vítreo / acuoso-CONGELAR 1ml LCR-CONGELAR Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta

Descripción:	Treponema pallidum DNA PCR Cualitativa
Código:	TREPOPCR
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:	Exudado genital (escobillón seco) -Humor vítreo/acuoso-REFRIGERADO 2ml Sangre total EDTA- REFRIGERAR Humor vítreo/acuoso-REFRIGERADO 5ml orina-CONGELAR 1ml humor vítreo / acuoso-CONGELAR 1ml LCR-CONGELAR Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta

Descripción:	Treponema pallidum DNA PCR Cualitativa
Código:	TREPOPCR
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:	Exudado genital (escobillón seco) -Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO 2ml Sangre total EDTA- REFRIGERAR Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO 5ml orina-CONGELAR 1ml humor vitreo / acuoso-CONGELAR 1ml LCR-CONGELAR Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta

Descripción:	Treponema pallidum DNA PCR Cualitativa
Código:	TREPOPCR
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:	Exudado genital (escobillón seco) -Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO 2ml Sangre total EDTA- REFRIGERAR Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO 5ml orina-CONGELAR 1ml humor vitreo / acuoso-CONGELAR 1ml LCR-CONGELAR Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta

Descripción:	Treponema pallidum DNA PCR Cualitativa
Código:	TREPOPCR
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:	Exudado genital (escobillón seco) -Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO 2ml Sangre total EDTA- REFRIGERAR Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO 5ml orina-CONGELAR 1ml humor vitreo / acuoso-CONGELAR 1ml LCR-CONGELAR Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta

Descripción:	Treponema pallidum DNA PCR Cualitativa
Código:	TREPOPCR
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:	Exudado genital (escobillón seco) -Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO 2ml Sangre total EDTA- REFRIGERAR Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO 5ml orina-CONGELAR 1ml humor vitreo / acuoso-CONGELAR 1ml LCR-CONGELAR Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta

Descripción:	Treponema pallidum DNA PCR Cualitativa
Código:	TREPOPCR
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:	Exudado genital (escobillón seco) -Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO 2ml Sangre total EDTA- REFRIGERAR Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO 5ml orina-CONGELAR 1ml humor vitreo / acuoso-CONGELAR 1ml LCR-CONGELAR Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta

Descripción:	Treponema pallidum DNA PCR Cualitativa
Código:	TREPOPCR
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:	Exudado genital (escobillón seco) -Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO 2ml Sangre total EDTA- REFRIGERAR Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO 5ml orina-CONGELAR 1ml humor vitreo / acuoso-CONGELAR 1ml LCR-CONGELAR Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta

Descripción:	Treponema pallidum DNA PCR Cualitativa
Código:	TREPOPCR
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:	Exudado genital (escobillón seco) -Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO 2ml Sangre total EDTA- REFRIGERAR Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO 5ml orina-CONGELAR 1ml humor vitreo / acuoso-CONGELAR 1ml LCR-CONGELAR Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta

Descripción:	Treponema pallidum DNA PCR Cualitativa
Código:	TREPOPCR
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:	Exudado genital (escobillón seco) -Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO 2ml Sangre total EDTA- REFRIGERAR Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO 5ml orina-CONGELAR 1ml humor vitreo / acuoso-CONGELAR 1ml LCR-CONGELAR Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta

Descripción:	TREPONEMA PALLIDUM IGG IMMUNOBLOT SUERO
Código:	TREPLOTIG
Técnica:	Inmunoblot
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	TREPONEMA PALLIDUM IGM INMUNOBLOT
Código:	TREPLOTIM
Técnica:	Inmunoblott.
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero

Descripción: TREPONEMA PALLIDUM IGM INMUNOBLOT

Valores de referencia:

Código: THROMBOINC

Descripción: TRHOMBOINC CODE

Técnica: Array

Comentario adicional: 2 tubos de sangre EDTA junto con el consentimiento, todo en un sobre que ponga INCODE

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	THROMBPMF			THROMBOINC CODE POLIMORFISMOS		
Prueba	THROMBRIES			THROMBOINC CODE RIESGO		

Descripción: TRICHINELLA SPIRALIS AC. IGG SUERO (TRIQUINOSIS)

Código: TRIQUINAAC

Técnica: EIA

Unidades:

Plazo: 12 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 1 ml suero. Alternativo 1 ml de plasma de citrato sódico, y de heparina Litio.

Valores de referencia: (Inf. 0.9) Negativo

Descripción: TRICHOMONA

Código: TRICHOMONA

Técnica: Microscopía óptica

Unidades:

Plazo:

Tubo: Microbiología

Comentario adicional:

Valores de referencia:

Descripción: Trichomonas DNA PCR

Código: TRICOMOPCR

Técnica: PCR

Unidades:

Plazo: 7 días

Tubo: Muestra envíos externos

Comentario adicional: 1ml Orina-REFRIGERAR
Exudado uretral(ESCOBILLON SECO)-REFRIGERAR
Exudado genital(ESCOBILLON SECO)-REFRIGERAR
1ml Lavado seminal-CONGELAR
1ml LCR-CONGELAR
1ml secreción prostática-CONGELAR
1ml semen-CONGELAR
Tejido parafinado-TA

Valores de referencia: Valor de referencia: No se detecta

Descripción: TRICLOROETANOL SANGRE

Código: TRIETANOLL

Técnica: Cromatografía de gases/Captura electrónica

Descripción:	TRICLOROETANOL SANGRE
Unidades:	mg/L
Plazo:	12 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	3 mL sangre total (EDTA) final de la semana laboral. Refrigerar Volumen mínimo 1,00 mL
Valores de referencia:	(Inf. 0.5) VLB (INSST) Exposición a Tricloroetileno, al final de la semana laboral.

Descripción:	TricotioDistr. 4 no fotosensible. Sec Gen: C7ORF11
Código:	GEN_000758
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Tricotiodistrofia. Sec Gen: GTF2H5
Código:	GEN_000759
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	TRIGLICERIDOS
Código:	TRI
Técnica:	
Unidades:	mg/dL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 150) Tras ayuno de 8 - 10 horas (Inf. 175) Sin ayuno de 8 - 10 horas

Descripción:	Trigonocefalia. Sec Gen: FGFR1
Código:	GEN_000760
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Código:	TRIMETILAM
Descripción:	TRIMETILAMINA Y TRIMETILAMINA N-OXIDO EN ORINA
Técnica:	LC-MS/MS

Código: TRIMETILAM

Comentario adicional: 10 mL orina (1ª micción). CONGELAR INMEDIATAMENTE Y ENVIAR CONGELADA.

Componentes						V. ref.
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	
Prueba	TMA			TRIMETILAMINA (TMA) EN ORINA	mmol/mol crea	(0.33 - 1.94) < 6 meses (0.10 - 0.62) 6 meses - 12 meses (0.08 - 1.51) 1 año - 14 años (0.10 - 0.84) > 14 años
Prueba	TMAO			TRIMETILAMINA N-ÓXIDO	mmol/mol crea	(4.50 - 99.12) < 6 meses (9.50 - 60.50) 6 meses - 12 meses (15.40 - 186.90) 1 año - 14 años (25.27 - 188.90) > 14 años
Prueba	TMA_TMAO			TMA/TMAO EN ORINA		(0.014 - 0.110) < 6 meses (0.006 - 0.050) 6 meses - 12 meses (0.002 - 0.043) 1 año - 14 años (0.002 - 0.020) > 14 años
Prueba	TMAO%			TMAO PORCENTAJE		(89.9 - 99) < 6 meses (97.3 - 99.4) 6 meses - 12 meses (98.4 - 99.8) 1 año - 14 años (97.6 - 99.8) > 14 años

Descripción: Trimetilaminuria: gen FMO3 (NGS)

Código: FMO3

Técnica: NGS Illumina

Unidades:

Plazo: 20 días

Tubo:

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Triple A, síndrome. Sec Gen: AAAS

Código: GEN_000761

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: TRIPSINA SUERO

Código: TRIPSINA

Técnica: Radioinmunoanálisis

Unidades: ng/mL

Plazo: 8 días

Tubo: Suero Congelado

Comentario adicional: 1 mL Suero
Volumen mínimo 0.10 mL

Valores de referencia: (153 - 738)

Descripción: TRIPTASA EN SUERO
Código: TRIPTASA
Técnica: Técnica FEIA
Unidades: µg/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Alt. plasma EDTA

Las muestras de sangre deben recogerse lo más cerca posible de la reacción, preferiblemente en el plazo de 4 h del período sintomático. Debe extraerse una muestra de sangre adicional
 al menos 24 horas después de la resolución completa de todos los síntomas clínicos, para confirmar la vuelta a los niveles iniciales. Debe anotarse el tiempo entre la reacción y la recogida de la muestra. Ante la sospecha de niveles basales elevados o

Valores de referencia: (Inf. 11.40)

Descripción: TRIPTASA MUESTRA
Código: TRIPTASAMU
Técnica: FLUOROINMUNOANÁLISIS (CAP-SYSTEM)
Unidades: µg/L
Plazo: 6 días
Tubo:
Comentario adicional: Antes de realizar la prueba, solicitar información sobre el tipo de muestras que se aceptan.
Valores de referencia:

Descripción: TROMB. ESENCIA/MIELOFIBROSIS PRIMARIA · CALR(9) · FRAGMENTOS
Código: CALR
Técnica: HRM
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: IMPORTANTE: REFRIGERADO SIEMPRE
 Muestras: Sangre EDTA exclusivo para esta determinación y rotulado con ONCO o Médula ósea

Valores de referencia:

Descripción: Trombifilia: gen APOB mutación R3500Q (sec. Sanger)
Código: R3500Q
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
 Alternativas: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Trombocitopenia ligada al X. Sec Gen: WAS
Código: GEN_000762
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Trombofilia. Déficit Antitrombina 3. Sec Gen: SERPINC1
Código: GEN_000171
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Trombofilia. Sec Gen: ACE. Polimorfismo I/D
Código: GEN_000393
Técnica:
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Trombofilia. Sec Gen: SERPINA1
Código: GEN_000764
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Trombofilia. Sec Gen: SERPINA1. mutaciones E264V, E342K
Código: GEN_000763
Técnica:
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Trombofilia: gen F13B Factor XIII mutación V34L
Código: FXIII_V34L
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente
Valores de referencia:

Descripción: Trombofilia: gen F7 Factor VII (NGS)
Código: FAC7_MUT
Técnica:

Descripción: Trombofilia: gen F7 Factor VII (NGS)

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Trombofilia: gen FGB mutación 455G>A (sec. Sanger)

Código: FGB_455GA

Técnica: PCR y secuenciación

Unidades:

Plazo: 15 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente

Valores de referencia:

Descripción: Trombofilia: gen PAI1 secuencia 4G/5G en el promotor

Código: PAI1_PROM

Técnica: PCR y secuenciación

Unidades:

Plazo: 15 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente

Valores de referencia:

Descripción: Trombofilia: gen SERPINC1 mutación p.A384S (sec. Sanger)

Código: AT3_A384S

Técnica: PCR y secuenciación

Unidades:

Plazo: 15 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente

Valores de referencia:

Descripción: Trombofilia: gen ZPI mutación G1277A

Código: PZI_G1277A

Técnica: PCR y secuenciación

Unidades:

Plazo: 15 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo de esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción:	Trombofilia: mutación C46T gen F12 Factor XII
Código:	FACXIIMUT
Técnica:	Estudio de genotipado con sondas TaqMan mediante PCR en tiempo real (Real-Time PCR)
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato. El tiempo estimado para cada prueba se contará desde el día de entrada de la muestra en el laboratorio central (días laborables). Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.

Valores de referencia:

Descripción:	Trombofilia: mutación G1691A (R506Q) gen F5 Factor V Leiden
Código:	FACV_LEI
Técnica:	Estudio de genotipado con sondas TaqMan mediante PCR en tiempo real (Real-Time PCR)
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato. El tiempo estimado para cada prueba se contará desde el día de entrada de la muestra en el laboratorio central (días laborables). Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.

Valores de referencia:

Descripción:	Trombofilia: mutación G20210A gen F2 Factor II
Código:	FACIIMUT
Técnica:	Estudio de genotipado con sondas TaqMan mediante PCR en tiempo real (Real-Time PCR)
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato. El tiempo estimado para cada prueba se contará desde el día de entrada de la muestra en el laboratorio central (días laborables). Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.

Valores de referencia:

Descripción:	Trombofilia: mutación p.Agr306Thr gen F5 Factor V Cambridge
Código:	FACV_CAM
Técnica:	PCR y secuenciación
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato. Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente

Valores de referencia:

Descripción:	Trombofilia: mutación p.Arg306Gly gen F5 Factor V Hong Kong
Código:	FACV_HONG
Técnica:	PCR y secuenciación
Unidades:	

Descripción: Trombofilia: mutación p.Arg306Gly gen F5 Factor V Hong Kong
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
 Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente

Valores de referencia:

Descripción: Trombofilia: mutación p.His1299Arg gen F5 Factor V R2
Código: FACV_R2
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
 Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente

Valores de referencia:

Descripción: Trombofilia: mutaciones C677T y A1298C gen MTHFR
Código: MTHFRMUT
Técnica: Estudio de genotipado con sondas TaqMan mediante PCR en tiempo real (Real-Time PCR)
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
 El tiempo estimado para cada prueba se contará desde el día de entrada de la muestra en el laboratorio central (días laborables).
 Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.

Valores de referencia:

Descripción: Tropheryma whippelii DNA PCR Cualitativa
Código: T.WHIPPLEI
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 8 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: 1g heces-Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO
 10ml orina-Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO
 Otros tipo de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envio

Valores de referencia:

Descripción: TROPISMO CXCR4 CCR5 HIV PLASMA
Código: TROPVIH
Técnica: Hibridación molecular (PCR)
Unidades:
Plazo: 32 días
Tubo:
Comentario adicional: 2 mL plasma (EDTA). CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO

Valores de referencia:

Descripción:	TROPONINA I ALTA SENSIBILIDAD ABBOTT
Código:	TROPOIHSA
Técnica:	CMIA
Unidades:	pg/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	300 mcL SUERO
Valores de referencia:	(Inf. 1.9) Baja probabilidad IAM (Inf. 34) Hombre Límite de decisión diagnóstico (p99 población sana) (Inf. 16) Mujer Límite de decisión diagnóstico (p99 población sana)

Descripción:	TROPONINA I EN SUERO
Código:	TROPONINA
Técnica:	Técnica ELFA
Unidades:	mcg/L
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	alternativo plasma Heparina Litio y plasma de EDTA
Valores de referencia:	(Inf. 0.034)

Descripción:	TROPONINA T ALTA SENSIBILIDAD (HS-CTNT), SUERO
Código:	HSTNT
Técnica:	Electroquimioluminiscencia
Unidades:	ng/L
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	Suero congelado
Valores de referencia:	(Inf. 9) Mujer (Inf. 16) Hombre Punto de corte utilizado: percentil 99 de población de referencia separado por sexos

Descripción:	Troyer, Sd. Sec Gen: SPG20
Código:	GEN_000765
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	TRYPANOSOMA BRUCEI AC. IGG
Código:	TRYPABRACG
Técnica:	Inmunofluorescencia indirecta
Unidades:	
Plazo:	13 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	Negativo

Descripción: TRYPANOSOMA BRUCEI AC. IGM
Código: TRYPABRACM
Técnica: INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA
Unidades:
Plazo: 13 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: Negativo

Descripción: TRYPANOSOMA BRUCEI GAMBIENSE/ RHODESIENSE PCR
Código: TRYPBRPCR
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: 5 mL sangre total EDTA
Valores de referencia:

Descripción: TRYPANOSOMA BRUCEI GAMBIENSE/ RHODESIENSE PCR
Código: TRYPBRPCR
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: 5 mL
Valores de referencia:

Descripción: TRYPANOSOMA CRUZI (ENFERMEDAD CHAGAS) DNA, SANGRE TOTAL
Código: TRYPANOPCR
Técnica: Reacción en Cadena de la Polimerasa
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: 1 tubo EDTA total. Refrigerar.
 No remitir muestras heparinizadas, inhiben la polimerasa de la PCR
Valores de referencia: Valor de referencia indicativo: No se detecta

Descripción: TRYPANOSOMA CRUZI AC. IGM
Código: TRYPACIGM
Técnica: Inmunofluorescencia Indirecta.
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero CON gel separador
Valores de referencia: Negativo <1/12
 Positivo >1/12

Descripción: TRYPANOSOMA CRUZI ANTICUERPOS
Código: TRYPANOSOM

Descripción: TRYPANOSOMA CRUZI ANTICUERPOS
Técnica: Quimioluminiscencia
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: IgG+ IgM
Valores de referencia: (Sup. 1.1) Positivo
 (0.9 - 1.1) Indeterminado
 (Inf. 0.9) Negativo

Descripción: TSH
Código: TSH
Técnica:
Unidades: µUI/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (0.35 - 4.94) > 14 años
 (0.1 - 2.5) Mujer 14 años - 50 años En embarazadas 1º trimestre
 (0.2 - 3.0) Mujer 14 años - 50 años En embarazadas 2º trimestre
 (0.3 - 3.0) Mujer 14 años - 50 años En embarazadas 3º trimestre

Descripción: UGT1A1*28 (irinotecan)
Código: UGT1A1_28
Técnica:
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO.
Valores de referencia:

Descripción: Un individuo adicional legal:Pruebas paternidad y parentesco
Código: PATER2HIJ2
Técnica:
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Lleva KIT especial con cadena de custodia, solicitar a asesoría genética, Enviar con las muestras a Alfonso XII
Muestra: mucosa bucal con Hisopo sin medio
 Esta prueba es para 1 individuo adicional tanto para paternidad como parentesco
Valores de referencia:

Descripción: Unverricht-Lundborg, enfermedad de. Sec Gen: CSTB
Código: GEN_000766
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Biología Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: URANIO EN ORINA
Código: URANI2
Técnica: ICP-MS
Unidades: µg/l
Plazo: 12 días
Tubo: Orina Final de Jornada
Comentario adicional: 10 mL orina final de jornada
Valores de referencia: (Inf. 200) Valor límite biológico (BEI-ACGIH) en orina final de jornada
 (Inf. 40) Indicativo de exposición anterior
 (Sup. 100) Indicativo de exposición reciente

Descripción: UREA ORINA
Código: UREA2
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: g/24h
Plazo: 3 días
Tubo: Orina 24 Horas
Comentario adicional:
Valores de referencia: (20 - 40)

Descripción: UREA.
Código: UREA
Técnica:
Unidades: mg/dL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (15 - 43) 1 año - 17 años
 (17 - 51) Hombre > 17 años
 (13 - 45) Mujer > 17 años

Descripción: UREAPLASMA sp
Código: UREAPLAS
Técnica: Cultivo
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Microbiología
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: UREAPLASMA UREALYTICUM AC. IGG
Código: UREAPAC
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero.
 Volumen 1.0 mL
 Volumen mínimo 0.20 mL

Descripción: UREAPLASMA UREALYTICUM AC. IGG
Valores de referencia: Se consideran niveles significativos a partir de título 1:32

Descripción: UREAPLASMA UREALYTICUM AC. IGM
Código: UREAPACM
Técnica: Inmunofluorescencia indirecta
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero.
 Volumen 1.0 mL
 Volumen mínimo 0.20 mL
Valores de referencia: Se consideran niveles significativos a partir de título 1:32

Descripción: Ureaplasma urealyticum/parvum DNA PCR cualitativa
Código: UREAPLPCR
Técnica: Hibridación molecular
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra envíos externos
Comentario adicional: Citología líquida-REFRIGERAR
 Exudado cervical (escobillón seco)-REFRIGERAR
 Exudado uretral (escobillón seco)-REFRIGERAR
 Exudado vaginal (escobillón seco)-REFRIGERAR
 4ml Orina (primera micción)-CONGELAR
 1ml Lavado seminal-CONGELAR
 1ml LCR-CONGELAR
 1ml Líquido amniótico-CONGELAR
 1ml secreción prostática-CONGELAR
Valores de referencia: Valor de referencia: No se detecta

Descripción: UROBILIGENO EN ORINA
Código: UROBILIGEN
Técnica:
Unidades: mg/dL
Plazo: 3 días
Tubo: Orina basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: Negativo

Descripción: UROPORFIRINA ISOMEROS (I-III) ORINA
Código: UROISOME
Técnica: Cromatografía líquida de alta resolución
Unidades: mcg/24h
Plazo: 9 días
Tubo: Orina 24 Horas
Comentario adicional: 10 mL orina 24 h. Indicar volumen 24 h.
Valores de referencia: (Inf. 46) UROPORFIRINA I
 (Inf. 46) UROPORFIRINA III

Descripción: Usher tipo 1D / F, digénico. Panel NGS
Código: GEN_000767

Descripción: Usher tipo 1D / F, digénico. Panel NGS

Técnica:

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Usher tipo 2C, digénico. Panel NGS

Código: GEN_000768

Técnica:

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Código: USTEKINUM

Descripción: USTEKINUMAB Y ANTICUERPOS EN SUERO PERFIL

Técnica:

Comentario adicional: 1 mL suero. Toma de muestras antes de la administración de la próxima dosis.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	USTEKINUMA	87408-1		USTEKINUMAB EN SUERO	mcg/mL	
Prueba	USTEKINUAC	87409-9		USTEKINUMAB ANTICUERPOS	Indice	(Sup. 1)

Descripción: Van der Woude, Sd. Sec Gen: IRF6

Código: GEN_000769

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: VANADIO EN ORINA

Código: VANADOR

Técnica: ICP-MS

Unidades: µg/g creatinina

Plazo: 7 días

Tubo: Orina Final de Jornada

Comentario adicional: 10 mL orina al final de la semana laboral

Valores de referencia: (Inf. 50) .Valor límite biológico recomendado por el INSHT al final de la semana laboral tras exposición al pentóxido de vanadio.
(Inf. 7) Límite de cuantificación

Descripción: VANADIO EN SUERO

Código: VANADIO

Descripción:	VANADIO EN SUERO
Técnica:	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado
Unidades:	µg/l
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	La muestra idónea es contenedor Tubo Suero metales traza. De forma alternativa se puede usar tubo de suero normal. Volumen 1.0 mL Volumen mínimo 0.2 mL
Valores de referencia:	(Inf. 5) .En prótesis e implantes, no existe desgaste. (Inf. 1.2) .Valores de referencia orientativos.

Descripción:	VANCOMICINA
Código:	VANCOMI
Técnica:	Inmunoanálisis
Unidades:	mcg/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(30 - 40) Pico (Sup. 80) Tóxico - Pico (10 - 20) Valle (Sup. 20) Tóxico - Valle (20 - 25) Perfusión continua Las concentraciones terapéuticas se deben individualizar según la situación clínica del paciente.

Descripción:	Variantes c.-13910 C/T y c.-22018 G/A en el gen MCM6
Código:	LACTASAMUT
Técnica:	PCR y secuenciación
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato. Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente

Valores de referencia:

Descripción:	VARICELA ZOSTER AC. IgG EN L.C.R
Código:	VARICGLC
Técnica:	EIA
Unidades:	Título
Plazo:	5 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	LCR. REFRIGERAR.
Valores de referencia:	Título <1/2 Negativo Título > o = 1/2 Positivo

Descripción:	VARICELA ZOSTER AC. IGG SUERO (HERPES ZOSTER)
Código:	VARICEACG
Técnica:	CLIA
Unidades:	mUI/mL

Descripción:	VARICELA ZOSTER AC. IGG SUERO (HERPES ZOSTER)
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. Alternativa: plasma (EDTA, citrato y heparina)
Valores de referencia:	(Inf. 150) Negativo (Sup. 150) Positivo

Descripción:	VARICELA ZOSTER AC. IgM EN LCR
Código:	VARICMLC
Técnica:	EIA
Unidades:	Titulo
Plazo:	5 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	Título <1/2 Negativo Título > o =1/2 Positivo

Descripción:	VARICELA ZOSTER AC. IGM SUERO (HERPES ZOSTER)
Código:	VARICEACM
Técnica:	CLIA
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. Alternativa: plasma (EDTA, citrato y heparina)
Valores de referencia:	(Inf. 0.9) Negativo (0.9 - 1.1) Indeterminado (Sup. 1.1) Positivo

Descripción:	VARICELA ZOSTER ANTICUERPOS IGA, SUERO
Código:	VZA
Técnica:	
Unidades:	Titulo
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero refrigerado
Valores de referencia:	Título <1/10 Negativo

Descripción:	Varicela-zoster DNA PCR Cualitativa
Código:	DNAVARIC
Técnica:	PCR
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:	1ml LCR-CONGELAR Exudado genital (escobillón seco)-REFRIGERAR Frotis (escobillón seco)-REFRIGERAR Lesión de piel -REFRIGERAR 1 ml BAL-REFRIGERAR 1ml DNA extraído-CONGELAR 1ml humor vitreo/acuoso-CONGELAR 2ml Sangre total EDTA-REFRIGERAR

Descripción: Varicela-zoster DNA PCR Cualitativa

Valores de referencia:

Descripción: VASOPRESINA (ADH)

Código: ADH

Técnica: RIA

Unidades: pmol/L

Plazo: 10 días

Tubo: Plasma EDTA Congelado

Comentario adicional: Plasma EDTA; Separar plasma y congelar
Volumen 2.5 mL plasma EDTA (2 TUBOS EDTA)
Volumen mínimo 1.7 mL

Paciente: Evitar el estrés el día de la recogida.

Se recomienda que el paciente esté en reposo al menos una hora antes de la extracción.

Valores de referencia: (Inf. 13)

Descripción: VCAM-1 SOLUBLE (sCD106), SUERO

Código: VCAM1S

Técnica:

Unidades: ng/mL

Plazo: 34 días

Tubo: Suero Congelado

Comentario adicional: Suero congelado

Valores de referencia: (162 - 492)

Descripción: VDRL LCR

Código: VDRLLCR

Técnica: Aglutinación

Unidades:

Plazo: 5 días

Tubo: Líquidos Biológicos

Comentario adicional: Volumen 2.0 mL (mínimo 0.1 mL)

Valores de referencia: Negativo

Descripción: VELOCIDAD DE SEDIMENTACION A 1 HORA

Código: V1HORA

Técnica: Fotometría capilar

Unidades: mm

Plazo: 3 días

Tubo: Sangre EDTA

Comentario adicional: 1 mL sangre total EDTA

Valores de referencia: (Inf. 21) Mujer < 50 años
(Inf. 32) Mujer > 50 años
(Inf. 15) Hombre < 50 años
(Inf. 18) Hombre > 50 años

Descripción: VENEREAL RESEARCH LABORATORY (VDRL) SUERO

Código: VDRLTRUE

Técnica: Aglutinación de partículas

Unidades:

Descripción: VENEREAL RESEARCH LABORATORY (VDRL) SUERO
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: Negativo

Código: VENLAFAXIN
Descripción: VENLAFAXINA SUERO
Técnica: Cromatografía líquida/Tándem masas
Suero refrigerado.

Comentario adicional: La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis.
Realizar extracción a las 2 horas tras la toma del fármaco.
Alternativa: Plasma de EDTA. Refrigerado.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	VENLAFTOT	62849-5		Perfil Venlafaxina Total	µg/L	(100 - 400)
Prueba	VENLAF1	9630-5		Perfil Venlafaxina	µg/L	<10 µg/L Límite de cuantificación
Prueba	VENLAF2	9628-9		Perfil Desmetilvenlafaxina	µg/L	<10 µg/L Límite de cuantificación
Prueba	VENLAFCOC			Perfil Cociente Orto-Desvenlafaxina/Venlafaxina		(2.7 - 7.7)

Descripción: Ventrículo izquierdo no compactado / LVNC. Panel NGS
Código: GEN_000770
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: VIBRIO CHOLERAЕ EN HECES, PCR
Código: COLERAPCR
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: heces especiales
Comentario adicional: 5 g heces. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO
Valores de referencia:

Descripción: VIGABATRINA SUERO
Código: VIGABATRIN
Técnica: Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectroscopía de masas
Unidades: mg/L
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Congelado

Descripción: VIGABATRINA SUERO
Comentario adicional: 1 mL Suero. Congelar.

La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis.

No utilizar tubos con gel separador.

Valores de referencia: (2 - 10) Rango Terapéutico
 (Sup. 20) Toxicidad
 Límite de cuantificación: 1 mg/L

Descripción: VIH 1/2 AC. INMUNOBLOT SUERO
Código: WESTERNAC
Técnica: INMUNOBLOT
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1mL de suero.
 Alternativa: plasma de EDTA, citrato o heparina.

Valores de referencia:

Descripción: VIH 1+2 AC. Y ANTIGENO P24 LCR
Código: VIHLCR
Técnica: CLIA
Unidades: Índice
Plazo: 7 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 mL LCR (Refrigerado)
Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo

Descripción: VIH AC. Y ANTÍGENO P24
Código: VIHAC
Técnica: Técnica ICMA
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: (Inf. 0.99) Negativo

Descripción: VIH1 DNA Proviral PCR Cualitativa
Código: VIH1DNA
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 8 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
 Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia: NEGATIVO Negativo

Descripción: VIH1 DNA Proviral Semen PCR Cualitativa
Código: VIH1SDNA
Técnica: PCR
Unidades:

Descripción: VIH1 DNA Proviral Semen PCR Cualitativa
Plazo: 10 días
Tubo: Semen
Comentario adicional: Semen fresco y lavado o solo fresco
 Hablar con Diagnóstico Molecular antes de hacer el envío. Condiciones especiales.
 Las muestras tienen que enviarse congeladas en nieve carbónica.
Valores de referencia: Valor de referencia: No se detecta

Código: VIH1S
Descripción: VIH1 perfil semen RT-PCR Cualitativa
Técnica: RT-PCR
 Las muestras tienen que enviarse congeladas en nieve carbónica o hielo seco.
Comentario adicional: Semen y semen lavado o solo semen.
 Hablar con Diagnóstico Molecular antes de hacer el envío. Para clínicas de la comunidad de Madrid se puede enviar refrigeradas en petaca.
 Muestra de semen congelada. Enviadas de lunes a jueves.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	VIH1SDNA	77368-9		VIH1 DNA Proviral Semen PCR Cualitativa		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	VIH1SRNA	77369-7		VIH1 RNA Semen RT-PCR Cualitativa		Valor de referencia: No se detecta

Descripción: VIH-1 RNA RT-PCR Cuantitativa
Código: VIH1CUAN
Técnica: RT-PCR cuantitativa
Unidades: copias/mL
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: TUBO DE EDTA. Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Valores de referencia: (Inf. 13.2) Límite de detección
 (20 - 100000000) Rango de medida

Descripción: VIH1 RNA Semen RT-PCR Cualitativa
Código: VIH1SRNA
Técnica: RT-PCR
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Semen
Comentario adicional: Semen fresco y lavado o solo fresco
 Hablar con Diagnóstico Molecular antes de hacer el envío. Condiciones especiales.
 Las muestras tienen que enviarse congeladas en nieve carbónica.
Valores de referencia: Valor de referencia: No se detecta

Descripción: VIH2 RNA PLASMA
Código: VIH2RNA
Técnica: RT-PCR
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Plasma EDTA Congelado

Descripción: VIH2 RNA PLASMA
Comentario adicional: 2 mL Plasma de EDTA. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO
Valores de referencia:

Descripción: VIMENTINA CTRULINADA ANTICUERPOS
Código: VIMENTINAC
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 1.00) Negativo
 (Sup. 1.00) Positivo

Descripción: VINCULINA AC SUERO
Código: VINCULINA
Técnica: Inmunofluorescencia indirecta
Unidades: Titulo
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: Se consideran niveles significativos los títulos superiores a 1:80

Descripción: VIRUS INFLUENZA A+B EN MUESTRA
Código: INFLUENZAG
Técnica: Inmunocromatografía
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: VIRUS LINFOTROPICO T AC en LCR
Código: HTLVLCR
Técnica: Inmunoanálisis
Unidades: Índice
Plazo: 4 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 mL LCR
Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo
 (Sup. 1) Positivo

Descripción: VIRUS OESTE DEL NILO (WEST NILE VIRUS), PCR
Código: NILOOEPCR
Técnica: Hibridación molecular (PCR)
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional: 1 mL plasma(EDTA), suero, CONGELADO
 LCR (volumen mínimo 0.2 mL)

Descripción: VIRUS OESTE DEL NILO (WEST NILE VIRUS), PCR

Valores de referencia:

Descripción: Virus Parotiditis (Paperas) muestra PCR Cualitativa

Código: PAROPCR

Técnica: RT- PCR

Unidades:

Plazo: 6 días

Tubo: Muestra envios externos

Comentario adicional: Saliva, Suero, Orina, LCR, Hisopo faríngeo seco con gotas de suero fisiológico...etc.

Valores de referencia:

Descripción: VIRUS PAROTIDITIS (PAPERAS) POR PCR MUESTRA

Código: PAROPCRORI

Técnica: Hibridación molecular con Amplificación (PCR)

Unidades:

Plazo: 17 días

Tubo: Orina pruebas referencia

Comentario adicional: Saliva, Suero, Orina, LCR, Hisopo faríngeo seco con gotas de suero fisiológico...etc.

Valores de referencia:

Descripción: VIRUS RESP.(Influenza,VRS)+CORONAVIRUS SARSCOV2 RNA

Código: PGCO

Técnica: PCR-Real Time

Unidades:

Plazo: 3 días

Tubo: Muestra envios externos

Comentario adicional: Exudado faríngeo:
 Contenedor
 Escobillón con medio de transporte para virus
 Conservación
 Refrigerar
 Exudado nasal:
 Contenedor
 Escobillón con medio de transporte para virus

Valores de referencia:

Descripción: VIRUS RESP.(Influenza,VRS)+CORONAVIRUS SARSCOV2 RNA

Código: PGCO

Técnica: PCR-Real Time

Unidades:

Plazo: 3 días

Tubo: Muestra envios externos

Comentario adicional: Exudado faríngeo:
 Contenedor
 Escobillón con medio de transporte para virus
 Conservación
 Refrigerar
 Exudado nasal:
 Contenedor
 Escobillón con medio de transporte para virus

Valores de referencia:

Descripción: VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL AC. IGG SUERO
Código: VRSACG
Técnica: CLIA
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 0.9) Negativo
 (0.9 - 1.1) Dudoso
 (Sup. 1.1) Positivo

Descripción: VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL AC. IGM SUERO
Código: VRSACM
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero.
 Alternativa: Plasma (Citrato, Heparina)
Valores de referencia: (Inf. 0.8) Negativo
 (0.8 - 1.1) Indeterminado
 (Sup. 1.1) Positivo

Descripción: VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL ANTIGENO EN MUESTRA
Código: VRSAG
Técnica: INMUNOCROMATOGRAFÍA
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional: Muestra de aspirado NASOFARINGEO.
Valores de referencia: Negativo

Descripción: Virus Respiratorio Sincitial(VRS) PCR
Código: VRSINCP
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional: Aspirado nasofaríngeo, lavado broncoalveolar, otras muestras.
Valores de referencia:

Descripción: Virus Zika, RT-PCR en muestra
Código: ZIKAVIRUS
Técnica: Q-PCR
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional: 5 mL sangre total (EDTA), suero, saliva. También orina, LCR, semen, líquido amniótico.
Valores de referencia:

Descripción: VISCOSIDAD EN SUERO
Código: VISCOSUERO
Técnica:
Unidades: relativo al H₂O
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 3 mL suero. INDISPENSABLE MUESTRA 3 mL de SUERO.
Valores de referencia: (1.40 - 1.80)

Descripción: VISCOSIDAD EN SUERO
Código: VISCOSUERO
Técnica:
Unidades: relativo al H₂O
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 3 mL suero. INDISPENSABLE MUESTRA 3 mL de SUERO.
Valores de referencia: (1.40 - 1.80)

Descripción: VITAMINA A SUERO (RETINOL)
Código: VITAA
Técnica: Cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) acoplada a detector UV
Unidades: mg/L
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero.
 Alternativamente se puede usar tanto plasma de EDTA como plasma de Heparina.
Valores de referencia: (0.19 - 0.49) < 12 años
 (0.26 - 0.75) 12 años - 19 años
 (0.29 - 0.80) > 19 años

Descripción: VITAMINA B1 (TIAMINA) SANGRE TOTAL EDTA
Código: VITAB1
Técnica: HPLC/Fluorimetría
Unidades: µg/dL
Plazo: 8 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: Sangre total EDTA. Refrigerar.
 Muestra protegida de la luz
 Volumen:1.0 mL
 Volumen mínimo: 0.5 mL
Valores de referencia: (3.60 - 9.70)

Descripción: VITAMINA B12
Código: VITAB12
Técnica:
Unidades: pg/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (187 - 883)

Descripción: VITAMINA B2 EN SANGRE TOTAL (EDTA)
Código: VITAB2
Técnica: HPLC
Unidades: µg/L
Plazo: 8 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 2 ml de sangre total EDTA. (Volumen mínimo 1 mL)
 Proteger de la luz
Valores de referencia: (137 - 370)

Descripción: Vitamina B3 (Nicotinamida) en suero
Código: VITAMINAB3
Técnica: LC-MS/MS
Unidades: µg/L
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 3 mL Suero. Congelar y enviar congelado.
 Muestra protegida de la luz
Valores de referencia: (10 - 65)

Descripción: Vitamina B5 (Acido Pantoténico) en suero
Código: PANTOTENIC
Técnica: Cromatografía Líquida/Tándem Masas
Unidades: µg/L
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 2mL Suero refrigerado
 Proteger de la luz.
 Volumen mínimo: 0.5mL
Valores de referencia: (23 - 125)

Descripción: VITAMINA B6 (PIRIDOXAL FOSFATO)
Código: VITAB6
Técnica: Cromatografía líquida de alta eficacia/Fluorimetria
Unidades: µg/L
Plazo: 7 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: EDTA TOTAL. Proteger de la luz
 Volumen mínimo: 0.50 mL
Valores de referencia: (16 - 64)

Descripción: VITAMINA C PLASMA HEPARINA (ACIDO ASCORBICO)
Código: VITAC
Técnica: Cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) acoplada a detector UV
Unidades: mg/L
Plazo: 6 días
Tubo: Sang T. Heparina Congelada

Descripción:	VITAMINA C PLASMA HEPARINA (ACIDO ASCORBICO)
Comentario adicional:	Plasma de heparina lisis. Debe ser centrifugado antes de 2 horas después de la extracción (antes de 30 minutos preferiblemente). Proteger muestra de la luz una vez centrifugado, separar plasma y congelar inmediatamente. Enviar muestra congelada. NO VALEN MUESTRAS DE PLASMA EDTA
Valores de referencia:	(4 - 15)

Descripción:	VITAMINA D 1,25 DIHIDROXI SUERO
Código:	VITD1.25
Técnica:	RIA
Unidades:	pg/mL
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 mL suero CONGELADO Alternativa: Plasma de EDTA, plasma de heparina Volumen mínimo:0.50 mL
Valores de referencia:	(18 - 108)

Descripción:	VITAMINA D 25 HIDROXI SUERO
Código:	VITAD25
Técnica:	Técnica CMIA
Unidades:	ng/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(30 - 96) Valores recomendados

Descripción:	VITAMINA E SUERO (ALFA-TOCOFEROL)
Código:	VITAE
Técnica:	Cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) acoplada a detector UV
Unidades:	µg/mL
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. Alternativamente se puede usar tanto plasma de EDTA como plasma de Heparina.
Valores de referencia:	(5.5 - 18.0) > 19 años (3.0 - 9.0) < 12 años (6.0 - 14.2) 12 años - 19 años

Descripción:	Vitamina K1 en suero
Código:	VITAK1
Técnica:	Cromatografía Líquida Alta Resolución / Fluorimetría.
Unidades:	µg/L
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	3 mL suero. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO Volumen: 1.5 mL Volumen mínimo:1,00 mL Proteger de la luz
Valores de referencia:	(0.1 - 1.6)

Descripción:	VITAMINA K2 EN SUERO
Código:	VITAK2
Técnica:	Cromatografía líquida/Espectrometría de masas tandem (LC-MS/MS)

Descripción: VITAMINA K2 EN SUERO
Unidades: µg/L
Plazo: 13 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1.5 ml de Suero CONGELAADO
 Conservación: Congelar
Valores de referencia: (0.10 - 0.82)

Descripción: Vitreoretinopatía de Wagner. Sec Gen: VCAN
Código: GEN_000771
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Vitroretinopatía exudativa familiar. Panel NGS
Código: GEN_000772
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: VLDL-COLESTEROL
Código: VLDL
Técnica: Fórmula
Unidades: mg/dL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: .
Valores de referencia: (Inf. 40)

Descripción: VORICONAZOL
Código: VORICONAZO
Técnica: Cromatografía líquida/Tandem masas (LC-MS/MS)
Unidades: mcg/mL
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 2 ml de suero congelado
Valores de referencia: (Sup. 0.5) Profilaxis antimicótica
 (Sup. 2.0) Terapia antimicótica
 (Sup. 6.0) Toxicidad

Descripción: VORTIOXETINA
Código: VORTIOXETI
Técnica: LC-MS/MS
Unidades: ng/mL

Descripción: VORTIOXETINA
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (5.4 - 7.4) Dosis 5 mg/día
(13.0 - 25.0) Dosis 20 mg/día

Código: VSG
Descripción: VSG SANGRE (VELOCIDAD DE SEDIM
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	V1HORA	30341-2		VELOCIDAD DE SEDIMENTACION A 1 HORA	mm	(Inf. 21) Mujer < 50 años (Inf. 32) Mujer > 50 años (Inf. 15) Hombre < 50 años (Inf. 18) Hombre > 50 años
Prueba	V2HORA	18184-2		VELOCIDAD DE SEDIMENTACION A 2 HORAS	mm	(Inf. 50) Mujer < 50 años (Inf. 76) Mujer > 50 años (Inf. 36) Hombre < 50 años (Inf. 43) Hombre > 50 años
Prueba	KATZ	30341-2		INDICE DE KATZ	Índice	

Descripción: Waardenburg y albinismo digénico. Panel NGS
Código: GEN_000773
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Wagner, Sd. Sec Gen: VCAN
Código: GEN_000774
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Walker-Warburg, Sd. Sec Gen: POMT1
Código: GEN_000775
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Warburg Micro, Sd. Panel NGS
Código: GEN_000712
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Weill-Marchesani, Sd. Panel NGS
Código: GEN_000776
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: WELLNESS CHECK- test envejecimiento saludable
Código: NHBA
Técnica: RT-PCR
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Raspado Bucal.
 SE NECESITA KIT ESPECIFICO.
 Enviar a temperatura ambiente.
 Sangre total EDTA.

Valores de referencia:

Descripción: Werner, Sd. Sec Gen: WRN
Código: GEN_000777
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: West, Sd. Panel NGS
Código: GEN_000713
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Wolcott-Rallison (WRS), Sd. Sec Gen: EIF2AK3
Código: GEN_000778

Descripción:	Wolcott-Rallison (WRS), Sd. Sec Gen: EIF2AK3
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	
Descripción:	Wolff-Parkinson-White (WPW), Sd. Sec Gen: PRKAG2
Código:	GEN_000779
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	
Descripción:	Wolfram tipo 2, Sd. Sec Gen: CISD2
Código:	GEN_000780
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	
Descripción:	Wolfram, Sd. Panel NGS
Código:	GEN_000781
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	
Descripción:	Wolfram, Sd. Sec Gen: WFS1
Código:	GEN_000782
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	
Descripción:	WUCHERERIA BANCROFTI ANTIGENO SUERO
Código:	WUCHEAG
Técnica:	EIA
Unidades:	
Plazo:	17 días
Tubo:	Suero Basal

Descripción: WUCHERERIA BANCROFTI ANTIGENO SUERO
Comentario adicional: 1 mL.
Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo
 (Sup. 1) Positivo

Descripción: Xantomatosis cerebrotendinosa. Sec Gen: CYP27A1
Código: GEN_000783
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Xeroderma pigmentoso. Panel NGS
Código: GEN_000784
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: XILOSA ORINA
Código: XILO2
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: g
Plazo: 5 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: Estímulo: 0.5 g de XILOSA/kg de peso (máximo 25 g) en solución acuosa al 10%
 Muestras a obtener: Vaciar la vejiga antes de la ingesta de la D-Xilosa
 Adultos: Recoger todas las orinas emitidas durante las cinco horas siguientes a la ingestión de la D-Xilosa. Extraer muestra de sangre a las 2 horas tras la ingesta.
 Niños: Extraer muestra de sangre después de 1 hora tras ingesta. Si el médico lo solicita, se recogerán las orinas emitidas durante las cinco horas siguientes tras la ingesta.
Valores de referencia: (5 - 8) (20 -32% de dosis ingerida)

Descripción: XILOSA SUERO
Código: XILO
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: mg/dL
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Sup. 25) 1-2 h tras toma

Descripción: YERSINIA DNA PCR MUESTRA BIOLOGICA
Código: YERSENPCR
Técnica: Hibridación Molecular con Ampliación (PCR)
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Muestra envíos externos

Descripción:	YERSINIA DNA PCR MUESTRA BIOLOGICA
Comentario adicional:	Heces, Refrigerar. Sangre total edta, refrigerar
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta Se incluye la detección de Yersinia enterocolítica, Yersinia pestis y Yersinia pseudotuberculosis.
Descripción:	YERSINIA ENTEROCOLITICA ANTICUERPOS IgM, SUERO
Código:	YERENM
Técnica:	EIA
Unidades:	U/mL
Plazo:	11 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. refrigerado.
Valores de referencia:	(Inf. 24) Negativo
Descripción:	YERSINIA SP. AC.IGG SUERO
Código:	YERSIAC
Técnica:	ELISA
Unidades:	U/mL
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero o plasma (EDTA, citrato, heparina.
Valores de referencia:	(Inf. 10) Negativo (10 - 15) Indeterminado
Descripción:	YODO CONCENTRACION EN ORINA
Código:	IODO_MG
Técnica:	ICP-MS
Unidades:	µg/L
Plazo:	7 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	2mL de Orina reciente.Refrigerar.
Valores de referencia:	(Inf. 20) Déficit grave de yodo (20 - 50) Déficit moderado de yodo (50 - 100) Déficit leve de yodo (100 - 200) Ingesta suficiente de yodo (200 - 300) Posible riesgo de ingesta de yodo superior a la necesaria (Sup. 300) Riesgo de problemas de salud por exceso
Descripción:	YODO EN ORINA 24H
Código:	IODO
Técnica:	Espectrometría de masas-Plasma acoplado inductivamente (ICP-MS)
Unidades:	µg/24h
Plazo:	7 días
Tubo:	Orina 24 Horas
Comentario adicional:	Orina 24h. (alícuota) Volumen: 2mL Volumen mínimo 0.8 mL Indicar diuresis
Valores de referencia:	(100 - 199) Ingesta suficiente de yodo

Descripción:	YODUROS SUERO
Código:	YODURO
Técnica:	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)
Unidades:	µg/L
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Contenedor: Tubo suero con separador. Conservación: Refrigerar Volumen: 2.0 mL Volumen mínimo: 0.50 mL
Valores de referencia:	(40 - 80)

Descripción:	ZIKA AC. IGG
Código:	ZIKAIGG
Técnica:	CLIA
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 0.9) Negativo (0.9 - 1.1) Indeterminado

Descripción:	ZIKA AC. IGM
Código:	ZIKAIGM
Técnica:	CLIA
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 0.9) Negativo (0.9 - 1.1) Indeterminado (Sup. 1.1) Positivo

Descripción:	ZINC EN ORINA AISLADA
Código:	ZN2MG
Técnica:	ICP-MS
Unidades:	ug/g creatinina
Plazo:	7 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	OFJ en caso de exposición laboral. Orina aislada.

No recoger muestras de orina en un ambiente en el que sea más probable que ocurra la exposición. Es importante evitar que el polvo de la ropa pueda interferir en el contenido de la muestra.

No recoger la orina en recipientes con base de metal, como urinarios o sartenes de metal. Recoger la orina en tubos de polipropileno inocoloro libre de metales sin tapones de colores. Cuando esto no sea posible, usar para la recogida de orina un envase

Valores de referencia:	(89 - 910) .Valores de referencia orientativos.
------------------------	---

Descripción:	ZINC ERITROCITARIO SANGRE
Código:	ZNW
Técnica:	Técnica Espectrometría Absorción Atómica / Llama
Unidades:	mg/l
Plazo:	6 días

Descripción:	ZINC ERITROCITARIO SANGRE
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	Sangre total EDTA Dipotásico (libre trazas metales) Muestra alternativa: Heparina sódica Momento de toma de muestra no es crítico
Valores de referencia:	(7.80 - 16.30) .Valores de referencia orientativos.
Descripción:	ZINC ORINA DE 24 HORAS
Código:	ZN2
Técnica:	ICP-MS
Unidades:	µg/24h
Plazo:	6 días
Tubo:	Orina 24 Horas
Comentario adicional:	5 mL orina 24 horas. Indicar diuresis en el tubo/bote que se envíe 24 h. Evitar el contacto de la muestra con tapones de goma.REFRIGERAR. Son válidas las orinas acidificadas.
Valores de referencia:	(150 - 1000) Normal (Inf. 30) Límite de cuantificación
Descripción:	ZINC SEMEN
Código:	ZNSEMEN
Técnica:	ESPECTROFOTOMETRÍA
Unidades:	mg/L
Plazo:	7 días
Tubo:	Semen
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(50 - 500)
Descripción:	ZINC SUERO
Código:	ZN
Técnica:	Espectrofotometría
Unidades:	µg/dL
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero tubo especial Zinc
Comentario adicional:	1 mL suero en tubo libre de metales (tapón azul) Realizar extracción en tubo libre de metales (tapón azul), pudiéndose utilizar el sistema vacutainer. Es necesario esperar a retracción del coágulo, centrifugar y transferir el suero con pipeta de plástico desechable a un tubo de alícuota. Marcar el tubo. Antes de realizar una extracción solicitar los tubos especiales y el protocolo a seguir.
Valores de referencia:	(60 - 125)
Descripción:	ZIRCONIO EN PLASMA (CIRCONIO)
Código:	ZIRCONIO
Técnica:	Espectrometría de Masas-Plasma acoplado inductivamente
Unidades:	ng/L
Plazo:	9 días
Tubo:	Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 275) Valores de referencia orientativos: Población normal sin prótesis de Zr
Descripción:	ZO ANTICUERPOS (FENILALANIL-TRNA SINTETASA) EN SUERO
Código:	ZOAC

Descripción: ZO ANTICUERPOS (FENILALANIL-TRNA SINTETASA) EN SUERO
Técnica:
Unidades:
Plazo: 11 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: SUERO
Valores de referencia:

Descripción: ZOLPIDEM SUERO
Código: ZOLPIDEM
Técnica:
Unidades: µg/L
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 ml suero SIN gel separador
 Volumen mínimo: 0.10 mL

 No utilizar tubos con gel separador.
Valores de referencia: (80 - 160) Intervalo terapéutico
 (Inf. 12) Límite de cuantificación
 (Sup. 320) Toxicidad

Descripción: ZONISAMIDA
Código: ZONISA
Técnica: CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA/TÁNDEM MASAS (LC-MS/MS)
Unidades: mg/L
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 2 ml de suero.
Valores de referencia: (10.0 - 40)

Descripción: ZONULINA EN HECES
Código: ZONULINA
Técnica: EIA
Unidades: ng/mL
Plazo: 12 días
Tubo: Heces No Microbiología
Comentario adicional: Heces recogidas en bote estéril. La cantidad necesaria es equivalente a "tres nueces".
 La estabilidad de la muestra refrigerada o a temperatura ambiente es de 4 días. Para periodos más largos, congelar la muestra.
Valores de referencia: (Inf. 107)

Descripción: ZONULINA EN SUERO
Código: ZONUSUERO
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: ng/mL
Plazo: 32 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 ml suero. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.
Valores de referencia: (20 - 48)

Descripción:	ZOPICLONA SUERO
Código:	ZOPICLONA
Técnica:	Cromatografía líquida/Tándem masas (LC-MS/MS)
Unidades:	ng/mL
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO. Toma de muestra 1,5 - 2 horas después de la administración del medicamento.
Valores de referencia:	(10 - 70) Valores terapéuticos recomendados
