CATÁLOGOS ANÁLISIS CLÍNICOS

CATÁLOGO PRUEBAS MEGALAB.....PAG 2

CATÁLOGO PRUEBAS SNB.....PAG 821

CATÁLOGO DE PRUEBAS

EUROFINS MEGALAB

Edición: 27/10/2026

Catálogo actualizado semanalmente.
Consulte siempre la versión más reciente.

Esperamos que nuestro catálogo de pruebas le resulte útil, en él encontrará las pruebas solicitadas con mayor frecuencia, no obstante, si no encontrase alguna prueba o tuviese alguna duda póngase en contacto con nosotros:

91 429 62 87

Los plazos de entrega indicados en este catálogo (días laborables) se establecen desde la llegada de la muestra al laboratorio hasta la validación de los resultados (disponibles mediante acceso online^*).

**Los centros que soliciten los análisis impresos deben sumar 24 horas a estos plazos de entrega.*

CATÁLOGO DE PRUEBAS ED 27_10_2026

Descripción:	21-HIDROXILASA ANTICUERPOS
Código:	HIDROXILA
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	U/mL
Plazo:	17 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 ml Suero congelado Separar y congelar inmediatamente. Tubo suero con separador.
Valores de referencia:	(Inf. 0.40)

Descripción:	ADAMTS-13 actividad en plasma
Código:	ADAMTS13
Técnica:	Electroforesis en Agarosa
Unidades:	%
Plazo:	19 días
Tubo:	Plasma de Citrato congelado
Comentario adicional:	1 mL de plasma de citrato. Congelar
Valores de referencia:	(11 - 100) Valores de referencia indicativos

Descripción:	ANTICUERPOS ANTI RECEPTORES DE GLICINA EN MUESTRA
Código:	GLICINACLC
Técnica:	Cell Binding Assay Inmunofluorescencia indirecta
Unidades:	
Plazo:	46 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 ml de muestra
Valores de referencia:	

Descripción:	Detección de la expansión (CAG) del gen ATXN2
Código:	SCA2_EXPA
Técnica:	PCR, TP-PCR, y análisis de fragmentos
Unidades:	
Plazo:	20 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	Gardnerella vaginalis DNA PCR Cualitativa
Código:	GARDNELPCR
Técnica:	PCR
Unidades:	
Plazo:	8 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular

Descripción: Gardnerella vaginalis DNA PCR Cualitativa
Comentario adicional: Muestra exclusiva para esta determinación: torunda sin medio y rotulada con BM.
Otras muestras: orina, torunda genital (Glande, uretra),cérvix (torunda), semen, etc.
Valores de referencia: Valor de referencia: No se detecta

Descripción: INMUNOFENOTIPO LAVADO BRONCOALVEOLAR / BAL
Código: TIPAJE_BAL
Técnica:
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 tubo seco
Valores de referencia:

Descripción: INTOLERANCIA ALIMENTARIA + MICROBIOTA
Código: B200N
Técnica:
Unidades:
Plazo: 22 días
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional: Heces refrigeradas recogidas en kit especial (550000528)
Suero refrigerado
Plasma de EDTA
Valores de referencia:

Descripción: Muestra adicional compleja
Código: MUESTRCMPL
Técnica:
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Prueba para complementar precio de las paternidades/paresntescos en muestras biológicas complejas como son uñas, colillas, cepillos, ropa…
Valores de referencia:

Código: BAMILOIDE
Descripción: PERFIL BETA AMILOIDE 1-42/1-40, LCR
Técnica: EIA
Comentario adicional: 1 mL LCR. Congelar la muestra inmediatamente.
Se requiere recoger la muestra de LCR en tubo de polipropileno.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	PEPBETA140	70072-4		Perfil Péptido Beta-Amiloide(1-40), LCR	pg/mL	(7755 - 16715)
Prueba	PEPBETAMIL	33203-1		PERFIL PEPTIDO BETA-AMILOIDE(1-42), LCR	pg/mL	(Sup. 600)
Prueba	INDICEAMIL			Perfil Indice Amiloide (Peptido 1-42/Peptido 1-40)		(Sup. 0.07)

Descripción:	PERFIL ENDOXIFENO
Código:	ENDOXIFENO
Técnica:	HPLC-Espectrometría de masas
Unidades:	µg/L
Plazo:	10 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(5.10 - 12.4)

Descripción:	Perfil T4 Reguladores (CD4+CD25+CD127 low) %
Código:	T4REGULADO
Técnica:	Citometría de flujo
Unidades:	%
Plazo:	7 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	5 ml de EDTA a Tª ambiente
Valores de referencia:	(1 - 3) sobre población linfoide

Descripción:	PERFIL TAMOXIFENO
Código:	TAMOXI
Técnica:	HPLC-Espectrometría de masas
Unidades:	µg/L
Plazo:	10 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(100 - 200)

Descripción:	Test genético de riesgo de diabetes tipo II
Código:	RIESGDIABE
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	Sangre EDTA
Comentario adicional:	Muestra EDTA rotulada con BM y hoja de petición especial (wellness)
Valores de referencia:	

Descripción:	Yo Ac. LCR
Código:	ACYO.LCR
Técnica:	Técnica Inmunoblot
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	LIQUIDO LCR INMUNO
Comentario adicional:	1mL LCR
Valores de referencia:	

Descripción:	1,2-DICLOROBENCENO
Código:	DICLOROBEN
Técnica:	Cromatografía de gases-head space
Unidades:	mcg/L
Plazo:	17 días

Descripción:	1,2-DICLOROBENCENO
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 140) Personas expuestas. Valor límite biológico (BAT-DFG). Al final de la jornada laboral

Descripción:	11-DESOXICORTISOL SUERO
Código:	DESOX11
Técnica:	RIA
Unidades:	ng/mL
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	Volumen 1.0 mL (mínimo 0.20 mL). Suero congelado
Valores de referencia:	(0.43 - 7.56) Sin estímulo (Sup. 69.3) Después de metopirona

Descripción:	14 DROGAS EN PELO
Código:	PELODAO14
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	17 días
Tubo:	
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	17 BETA ESTRADIOL ULTRASENSIBLE, SUERO
Código:	BE2US
Técnica:	EIA
Unidades:	pg/mL
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero refrigerado.
Valores de referencia:	(Inf. 27.60) Mujer Fase folicular (27.90 - 239.30) Mujer Fase ovulatoria (44.60 - 282.30) Mujer Fase luteal (14.40 - 126.30) Mujer Postmenopausia (1112.00 - 22997.00) Mujer Embarazadas (segundo trimestre) (3551.00 - 25039.00) Mujer Embarazadas (tercer trimestre) (14.30 - 119.50) Hombre

Código:	CETO17.F2
Descripción:	17-CETOSTEROIDES FRACCCIONADOS ORINA
Técnica:	Cromatografía de gases
Comentario adicional:	30 ml orina 24 h.(alícuota).Indicar diuresis

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	ANDROST2			PERFIL 17-CETOESTEROIDES (ANDROSTERONA) ORINA24H	mg/24 h	(3.20 - 5.87) Hombre (1.60 - 3.20) Mujer

Componentes						
Prueba	ETIOCOL2	2268-1		PERFIL 17-CETOESTEROIDES (ETIOCOLANOLONA) ORINA24H	mg/24 h	(2.50 - 5.00) Hombre (1.50 - 3.50) Mujer
Prueba	H2EPIAND2			PERFIL 17-CETOESTEROIDES (DEHIDROEPIANDROSTERONA ORINA24H	mg/24 h	(Inf. 0.09) < 5 años (Inf. 0.20) 6 años - 9 años (Inf. 0.40) 10 años - 15 años (1.00 - 3.11) Hombre > 16 años (0.50 - 1.43) Mujer > 16 años

Código: HIDRO17.F

Descripción: 17-HIDROXICORTICOIDES FRACCIONADOS (cromatografía capa fina)

Técnica: Cromatografía capa fina

Comentario adicional: 10 mL Orina 24h. (alícuota) (Refrigerado).Se requiere la diuresis.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	CORTISONA	14044-2		PERFIL 17-HIDROXICORTICOIDES FRACCIONADOS CORTISONA	mcg/24 h	(15.99 - 128.16)
Prueba	CORT	14158-0		PERFIL 17-HIDROXICORTICOSTEROIDES FRACC. CORTISOL	mcg/24 h	(9.80 - 90.90)

Descripción: 17-HIDROXICORTICOIDES TOTALES

Código: HIDRO17.T

Técnica: Cromatografía de Intercambio Iónico / Espectrometría.

Unidades: mg/24 h

Plazo: 6 días

Tubo: Orina 24 Horas

Comentario adicional: 10 mL orina 24 h. Indicar volumen 24 h
Para su conservación se debe acidificar con HCl concentrado hasta pH =3 - 6.

Valores de referencia: (3 - 10) Hombre
(2 - 8) Mujer

Descripción: 17-HIDROXIPREGNENOLONA EN SUERO

Código: PREGNENO

Técnica: Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectrometría de masas.

Unidades: ng/mL

Plazo: 14 días

Tubo: Suero Congelado

Comentario adicional: 2 mL Suero SUEROCONG

Descripción:	17-HIDROXIPREGNENOLONA EN SUERO
Valores de referencia:	(2.29 - 31.04) Hombre 1 mes - 5 meses (2.11 - 19.81) Hombre 5 meses - 1 año (0.35 - 7.12) Hombre 1 año - 2 años (0.16 - 2.76) Hombre 2 años - 6 años (Inf. 1.87) Hombre 6 años - 9 años (Inf. 3.92) Hombre 9 años - 12 años (0.32 - 4.78) Hombre 12 años - 17 años (2.29 - 31.04) Mujer 1 mes - 5 meses (2.11 - 19.81) Mujer 5 meses - 1 año (0.35 - 7.12) Mujer 1 año - 2 años (0.16 - 2.76) Mujer 2 años - 6 años (Inf. 2.12) Mujer 6 años - 9 años (Inf. 3.98) Mujer 9 años - 12 años (Inf. 4.23) Mujer 12 años - 17 años (Inf. 4.55) Hombre > 17 años (Inf. 4.55) Mujer > 17 años

Descripción:	18-OH CORTICOSTERONA
Código:	OHCORTI
Técnica:	Téc. Cromatografía líquida/Tándem Masas
Unidades:	ng/dL
Plazo:	34 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	3 mL suero. Separar y congelar.
Valores de referencia:	(12 - 55)

Descripción:	2-FENIL-2PROPANOL EN ORINA (CUMENO-ISOPROPIL BENCENO)
Código:	CUMENO
Técnica:	Espectroscopía de RMN de protón
Unidades:	mg/g creatin.
Plazo:	20 días
Tubo:	Orina congelada
Comentario adicional:	2 tubos de Orina aislada recogida al final de la jornada laboral congelada
Valores de referencia:	(Inf. 7) VLB (valor límite biológico) al final de la jornada laboral. Indicador biológico de exposición al Cumeno

Descripción:	2-HIDROXI-N-METILSUCCINIMIDA
Código:	HMS
Técnica:	
Unidades:	mg/g creatin.
Plazo:	17 días
Tubo:	Orina basal
Comentario adicional:	Orina 10 ml. Refrigerar.
Valores de referencia:	(Inf. 20)

Descripción:	3-METILHISTIDINA SUERO
Código:	METILHISTI
Técnica:	Cromatografía líquida-Tándem masas
Unidades:	mcmol/L
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal

Descripción:	3-METILHISTIDINA SUERO
Comentario adicional:	3 mL suero.
Valores de referencia:	(Inf. 10)

Descripción:	3-METOXITIRAMINA EN ORINA
Código:	METOXITIRA
Técnica:	Cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) acoplada a detector electroquímico
Unidades:	µg/24h
Plazo:	8 días
Tubo:	Orina 24 Horas
Comentario adicional:	Alícuota acidificada de orina de 24 horas.Identificar diuresis en el tubo (imprescindible). No ingerir 5 días antes de la recolección de la orina; té, café, plátano, chocolate, vainilla, queso, bebidas carbonatadas ni ningún tipo de medicamento especialmente de salicilatos, medicación hipotensora y contrastes con yodo. Preservar la orina con HCl 6N (30 ml) pH=1 Suspender toda la medicación. Evitar cualquier tipo de ejercicio físico no habitual . Evitar el estrés. (3 días antes de la toma de muestra)
Valores de referencia:	(Inf. 460) 18 años - 40 años Límite de cuantificación: 37.0 µg/L (Inf. 426) 41 años - 60 años Límite de cuantificación: 37.0 µg/L (Inf. 385) > 60 años Límite de cuantificación: 37.0 µg/L

Descripción:	3-NITROTIROSINA (3NT), SANGRE TOTAL
Código:	NTL
Técnica:	
Unidades:	µg/L
Plazo:	10 días
Tubo:	Sangre EDTA
Comentario adicional:	Sangre total EDTA. refrigerar.
Valores de referencia:	(Inf. 1)

Descripción:	4-CLOROCATECOL EN ORINA
Código:	CLOROCAT
Técnica:	
Unidades:	mg/g creatinina
Plazo:	23 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	10 mL orina (micción aislada) al final de la semana laboral
Valores de referencia:	(Inf. 100) Final jornada laboral (exposición Clorobenceno); VLB (BEI-ACGIH)

Descripción:	5 DROGAS EN PELO
Código:	PELODAO5
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	17 días
Tubo:	
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	5-ALA DEHIDRATASA ERITROCITARIA
Código:	ALADEHID
Técnica:	Espectrofotometría de absorción molecular
Unidades:	UE/L
Plazo:	10 días

Descripción:	5-ALA DEHIDRATASA ERITROCITARIA
Tubo:	Sang T. Heparina Congelada
Comentario adicional:	5 ml de sangre total de Heparina Litio.CONGELADA Tubo de EDTA interfiere en la técnica.
Valores de referencia:	(Sup. 20.0) (Sup. 6.0) V.L.B. (Personas expuestas a Plomo)

Descripción:	5-HIDROXI-N-METIL-2-PIRROLIDONA ORINA
Código:	OHPIRROL
Técnica:	Cromatografía líquida-tandem masas (LC-MS/MS)
Unidades:	mg/g creatinina
Plazo:	17 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	10 mL de una orina recogidsa entre 2 y 4 horas después del final de la exposición
Valores de referencia:	(Inf. 70) Entre 2 y 4 horas después del final de la exposición.Exposixión a N-METIL-2-PIRROLIDONA(NMP)(VLB-INSHT)

Descripción:	5-METILENTETRAHIDROFOLATO EN LCR
Código:	MTHFLCR
Técnica:	Cromatografía líquida/Tándem masas (LC-MS/MS)
Unidades:	nmol/L
Plazo:	17 días
Tubo:	Liquido cefalorraquideo congelado
Comentario adicional:	1 mL LCR. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO. Proteger de la luz con papel de aluminio.
Valores de referencia:	(59 - 205) < 3 meses (44 - 171) 3 meses - 2 años (27 - 107) 2 años - 18 años

Descripción:	5'NUCLEOTIDASA
Código:	NUCLEO5
Técnica:	Espectrometría
Unidades:	U/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero. Volumne mínimo: 0.5 mL
Valores de referencia:	(Inf. 10)

Descripción:	6 DROGAS EN PELO
Código:	PELODAO6
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	17 días
Tubo:	
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Código:	TGNMMP
Descripción:	6-TIOGUANINA NUCLEOTIDO+6-METILMERCAPTOPURINA EN SANGRE
Técnica:	Cromatografía líquida de alta resolución.
Comentario adicional:	3 mL Sangre Total (EDTA)

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	TIOGUANIN			PERFIL TGNMMP (6-TIOGUANINA NUCLEOTIDO EN SANGRE)		(235 - 450) pmol/8x10(8) eritrocitos
Prueba	METILMERP			PERFIL TGNMMP (6-MERCAPTOPURINA EN SANGRE)		< 5700 pmol/8x10(8) eritrocitos

Descripción:	8-Hidroxi-2-Deoxiguanosina en orina
Código:	DEOXYGUAN
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	µg/g creatinina
Plazo:	13 días
Tubo:	Orina basal
Comentario adicional:	1 mL orina (micción aislada). Refrigerado. Para su conservacion, la orina se debe acidificar hasta ph 6-8
Valores de referencia:	(6 - 14)

Descripción:	9 DROGAS EN PELO
Código:	PELODAO9
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	17 días
Tubo:	
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	Abetalipoproteinemia. Sec Gen: MTTP
Código:	GEN_000001
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	AC ANTI MOG (MIELINA OLIGODENDROCITO) LCR
Código:	MOGLCR
Técnica:	Cell Binding Assay IFI
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	LIQUIDO LCR INMUNO
Comentario adicional:	1 ml LCR
Valores de referencia:	Se recomienda efectuar análisis simultaneo en suero y LCR

Descripción:	AC METOXIACETICO (EXP. 2-METOXIETANOL/ACETATO 2-METOXIETILO
Código:	METOXIACE

Descripción:	AC METOXIACETICO (EXP. 2-METOXIETANOL/ACETATO 2-METOXIETILO
Técnica:	Cromatografía de gases ionizacion de llama
Unidades:	mg/g creatinina
Plazo:	12 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	5 mL orina (micción aislada) al final de la semana laboral después de al menos 2 semanas de trabajo. (Para conservación añadir 0.1mL de ac. clorhídrico conc.)
Valores de referencia:	(Inf. 8) Final de la semana laboral (exposición 2-METOXIETANOL y/o ACETATO DE 2-METOXIETILO) VLB-INSHT

Descripción:	AC. ANTI CAPSULAS SUPRARRENALES
Código:	SUPRARREAC
Técnica:	IFI
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. Alternativa: plasma con EDTA, heparina o citrato.
Valores de referencia:	Títulos significativos a partir de 1:10

Descripción:	AC. ANTI CASPR2 SUERO
Código:	CASPR2
Técnica:	Inmunocitoquímica (Cell Based Assay)
Unidades:	
Plazo:	17 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	Negativo: Título <1/100

Descripción:	AC. ANTI CELULAS PARIETALES (MUCOSA GASTRICA)
Código:	CELPARIEAC
Técnica:	IFI
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	Negativo <1/40 Positivo >1/40

Descripción:	AC. ANTI CENTROMERO
Código:	CENTROAC
Técnica:	Técnica IFI
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	Negativo

Descripción:	AC. ANTI GAD 64/65K EN LCR
Código:	GADACLCR
Técnica:	Inmunoblot

Descripción:	AC. ANTI GAD 64/65K EN LCR
Unidades:	
Plazo:	6 días
Tubo:	LIQUIDO LCR INMUNO
Comentario adicional:	1 ml de LCR
Valores de referencia:	

Descripción:	AC. IGG ANTI NEUROMIELITIS OPTICA (ACUAPORINA/NMO) EN LCR
Código:	ANTINMOLCR
Técnica:	Cell Binding Assay Inmunofluorescencia indirecta
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	LIQUIDO LCR INMUNO
Comentario adicional:	1 mL LCR
Valores de referencia:	Se recomienda efectuar análisis simultaneo en suero y LCR

Descripción:	AC. IGG HUMAN ANTI-MOUSE ANTIBODY (ANTI RATÓN)
Código:	HAMA
Técnica:	ENZIMOINMUNOANÁLISIS
Unidades:	
Plazo:	32 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero.
Valores de referencia:	(Inf. 1.0) Negativo

Descripción:	AC. RECEPTOR 3 FGF (FGFR3) SUERO
Código:	ACR3FGF
Técnica:	EIA
Unidades:	U/mL
Plazo:	11 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero refrigerado
Valores de referencia:	(Inf. 12)

Descripción:	ACANTHAMOEBA Y AMEBAS LIBRE (ENVIO MICROBIOL ESPECIAL)
Código:	ACANTCULT
Técnica:	Cultivo
Unidades:	
Plazo:	45 días
Tubo:	Microbiología
Comentario adicional:	Muestra ocular a Temperatura ambiente. En caso de agujas o bisturis dejar un tiempo en suero fisiologico o agua esteril retirandolo antes de que desprenda herrumbre
Valores de referencia:	

Descripción:	ACANTHAMOEBA, NAEGLERIA ,BALAMUTHIA (ENVIO MICROBIO ESPECIAL
Código:	ACANTPCR
Técnica:	PCR
Unidades:	
Plazo:	20 días
Tubo:	Microbiología

Descripción:	ACANTHAMOEBA, NAEGLERIA ,BALAMUTHIA (ENVIO MICROBIO ESPECIAL
Comentario adicional:	Muestra ocular a Temperatura ambiente. En caso de agujas o bisturis dejar un tiempo en suero fisiologico o agua esteril retirandolo antes de que desprenda herrumbre
Valores de referencia:	

Descripción:	Acetilcolinesterasa, líquido amniótico
Código:	COLINESLA
Técnica:	Electroforesis
Unidades:	
Plazo:	14 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 mL líquido amniótico.
Valores de referencia:	

Descripción:	ACETOACETATO SUERO
Código:	ACETOASUER
Técnica:	Espectrofotometria
Unidades:	mmol/L
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 ml suero congelado
Valores de referencia:	(0.01 - 0.20)

Descripción:	ACETONA en orina (exposicion a ACETONA)
Código:	ACETONA
Técnica:	Cromatografía de Gases / Ionización de Llama.
Unidades:	mg/L
Plazo:	7 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	Orinal Final de Jornada. Refrigerar Volumen: 10.0 mL Volumen mínimo: 5 mL
Valores de referencia:	(Inf. 50) Final de la jornada laboral (exposición a ACETONA) VLB-INSHT (Inf. 40) Final de la semana laboral (exposición a ISOPROPANOL) VLB-INSHT

Descripción:	ACETONA EN SANGRE TOTAL
Código:	ACETOSAN
Técnica:	Cromatografía de gases-Ionización de Llama
Unidades:	mg/L
Plazo:	7 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	1 mL sangre total tubo EDTA
Valores de referencia:	(Inf. 25) VLB final jornada laboraL-BAT (MAK&BAT)

Descripción:	Acidemia glutárica tipo 2. Panel
Código:	GEN_000004
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Acidemia glutárica tipo 2. Panel
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Acidemia glutárica. Panel
Código: GEN_000005
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Acidemia isovalérica. Sec Gen: IVD.
Código: GEN_000006
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Acidemia metilmalónica. Panel
Código: GEN_000007
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Acidemia propiónica. Panel
Código: GEN_000008
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Acidemia propiónica. Sec Gen: PCCA.
Código: GEN_000009
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción:	Acidemia propiónica. Sec Gen: PCCB.
Código:	GEN_000010
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Acidemia y aciduria metilmalónica. Panel
Código:	GEN_000011
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Acidez titulable, orina
Código:	ACIDEZ2
Técnica:	Volumetría
Unidades:	mmol/24 h
Plazo:	3 días
Tubo:	Orina 24 Horas
Comentario adicional:	10 mL Orina 24h. (alicuota). Se requiere la diuresis (Volumen 24 horas)
Valores de referencia:	(20 - 50) Acidez titulable.

Descripción:	ACIDO 1,2 DIHIDROXI BUTILMERCAPTURICO ORINA
Código:	BUTILMERCA
Técnica:	Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectrometría de masas
Unidades:	mg/g creatin.
Plazo:	17 días
Tubo:	ORINA OFJ CONGELADA
Comentario adicional:	10 mL orina final de jornada laboral CONGELADA.
Valores de referencia:	(Inf. 1.6) Final de la jornada laboral (exposición a 1,3 Butadieno); VLB-INSST Límite de cuantificación: 0.6 mg/L

Descripción:	ACIDO 2-ETOXIACETICO EN ORINA
Código:	ETOXIACE
Técnica:	Cromatografía de gases/ionización en llama
Unidades:	mg/L
Plazo:	12 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	Volumen 1.0 mL Orina (micción aislada) al final de la jornada laboral.
Valores de referencia:	(Inf. 50) Valor Límite Biológico-VLB® (INSHT)

Descripción:	ACIDO 5-HIDROXINDOLACETICO 24H ORINA
Código:	OHINDOLACE

Descripción:	ACIDO 5-HIDROXINDOLACETICO 24H ORINA
Técnica:	HPLC/Electroquímica
Unidades:	mg/24 h
Plazo:	8 días
Tubo:	Orina 24 Horas
Comentario adicional:	10 ml orina 24 horas acidificada con 0.1 ml HCl 6N (pH= 2 - 3). Volumen mínimo: 5mL Indicar volumen de 24 horas. No ingerir alimentos que contengan serotonina (ciruelas, piñas, bananas, berenjenas, tomates, aguacates, nueces) durante tres días antes de la prueba. Ver instrucciones de dieta en ficha de preparación del paciente
Valores de referencia:	(2.00 - 8.00) (Inf. 2) Límite de cuantificación

Descripción:	ACIDO ACETILASPARTICO ORINA (ENF. CANAVAN)
Código:	ACETILASPA
Técnica:	CROMATOGRAFIA DE GASES- ESPECTROMETRÍA MASAS CON MONITORIZACION DE IONES
Unidades:	mmol/molcrea
Plazo:	17 días
Tubo:	Orina congelada
Comentario adicional:	10 mL orina. Congelar y enviar congelado. Se recomienda que la muestra corresponda a una fase de crisis. Indicar información clínica.
Valores de referencia:	(4.0 - 25.0)

Descripción:	ACIDO BUTOXIACÉTICO TOTAL EN ORINA
Código:	BUTOXIACET
Técnica:	Cromatografía de Gases / Ionización de Llama.
Unidades:	mg/g creat
Plazo:	12 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	3 mL de orina (micción aislada) al final de la jornada laboral. Refrigerar. Volumen mínimo: 0.5 mL
Valores de referencia:	(Inf. 200) Final jornada de la semana laboral (exposición a 2-Butoxietanol); VLB-INSST Límite de cuantificación: 10 mg/L

Descripción:	ACIDO CITRICO (CITRATO) EN ORINA
Código:	CITRICO24
Técnica:	Espectrofotometria
Unidades:	mg/24 h
Plazo:	4 días
Tubo:	Orina citrico
Comentario adicional:	2 ml de orina
Valores de referencia:	(116 - 924) Hombre (250 - 1160) Mujer

Descripción:	ACIDO CITRICO (CITRATO) PLASMA SEMINAL
Código:	CITRICOSEM
Técnica:	Enzimática
Unidades:	mg/dL

Descripción:	ACIDO CITRICO (CITRATO) PLASMA SEMINAL
Plazo:	4 días
Tubo:	SEMEN CONGELADO
Comentario adicional:	1 mL plasma seminal. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.
Valores de referencia:	(200 - 600)

Descripción:	ACIDO CITRICO (CITRATO) SUERO
Código:	CITRICO
Técnica:	Cromatografía gases-Espectrometría masas
Unidades:	mg/dL
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1mL de suero. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO
Valores de referencia:	(1.3 - 3.7)

Descripción:	ACIDO DELTA-AMINOLEVULINICO ORINA (ALA)
Código:	DELTAALA
Técnica:	Espectrometría de absorción molecular
Unidades:	mg/g creatin.
Plazo:	7 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	5 mL de orina (micción aislada)
Valores de referencia:	(Inf. 5) (Inf. 20) Exposición a Plomo. Valor límite químico (B.O.E. 24 abril 1986)

Descripción:	ACIDO FITANICO SUERO
Código:	FITANICO
Técnica:	Cromatografía de gases
Unidades:	mcg/mL
Plazo:	23 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	3 ml suero. Separar y congelar lo antes posible.
Valores de referencia:	(Inf. 5)

Descripción:	ACIDO FOLICO B9
Código:	FOLICO
Técnica:	Téc. ICMA
Unidades:	ng/mL
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 mL suero.
Valores de referencia:	(3 - 20)

Descripción:	ACIDO FOLICO ERITROCITARIO
Código:	FOLICOERI
Técnica:	Quimioluminiscencia
Unidades:	ng/mL
Plazo:	5 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia

Descripción:	ACIDO FOLICO ERITROCITARIO
Comentario adicional:	1.5 ml de sangre total EDTA. Refrigerado
Valores de referencia:	(126.00 - 651.10) Valores de referencia indicativos

Descripción:	ACIDO FORMICO (METABOLITO DE METANOL) EN ORINA
Código:	FORMICO
Técnica:	Cromatografía de Gases / Ionización de Llama
Unidades:	mg/g creatinina
Plazo:	9 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	Orina final jornada. Refrigerar Volumen: 5mL Volumen mínimo: 2mL
Valores de referencia:	(Inf. 80) Personas expuestas (Metanol); Biological Exposure Indices (BEI) ACGIH® (Inf. 50) Personas no expuestas

Descripción:	ACIDO FUROICO ORINA
Código:	FUROICO
Técnica:	GC/ionización de llama
Unidades:	mg/L
Plazo:	12 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	10 ml de orina (micción aislada) al final de la jornada laboral. refrigerar.
Valores de referencia:	(Inf. 200) VLB final de jornada (exposición a Furfural)

Descripción:	ACIDO GAMMA AMINOBUTIRICO ORINA
Código:	GABA2
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	µg/g creatinina
Plazo:	17 días
Tubo:	Orina congelada
Comentario adicional:	10 ml orina. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADA
Valores de referencia:	(206 - 1548)

Descripción:	ACIDO GLICOLICO EN ORINA
Código:	GLICOLICO2
Técnica:	Cromatografía de gases
Unidades:	mg/g creatinina
Plazo:	23 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	10 mL Orina (micción aislada)
Valores de referencia:	(Inf. 60)

Descripción:	ACIDO HIALURONICO
Código:	HIALURAC
Técnica:	EIA
Unidades:	µg/L
Plazo:	36 días
Tubo:	Suero Basal

Descripción:	ACIDO HIALURONICO
Comentario adicional:	1 mL de suero
Valores de referencia:	(2.50 - 80)

Descripción:	ACIDO HIALURONICO LIQUIDO PLEURAL
Código:	HIALURONIC
Técnica:	EIA
Unidades:	mg/L
Plazo:	32 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 10.0)

Descripción:	ACIDO HIALURONICO LIQUIDO SINOVIAL
Código:	LIQSIHIALU
Técnica:	ENZIMOINMUNOANÁLISIS
Unidades:	mg/L
Plazo:	32 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 mL Líquido Sinovial.
Valores de referencia:	De manera orientativa, superior a 350.0 mg/dL.

Descripción:	ACIDO HIPURICO ORINA
Código:	HIPURICO
Técnica:	Cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) acoplada a detector UV
Unidades:	g/g creatinina
Plazo:	8 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	10 mL de orina final de jornada (OFJ). Identificar tubo con etiqueta pequeña sin código de barras, con el tapón marcado y con la palabra OFJ en el lateral del tubo.
Valores de referencia:	(Inf. 1.6) al final de la jornada laboral. **VLB** publicado por el **INSHT (2016) hasta 2018. Desde 2018, para la exposición a TOLUENO, el INSST recomienda la valoración del o-Cresol en orina, Tolueno en orina o Tolueno en sangre (INSST 2018).**

Descripción:	ACIDO HOMOGENTISICO ORINA (ALCAPTONURIA)
Código:	HOMOGEN
Técnica:	HPLC
Unidades:	mg/24 h
Plazo:	26 días
Tubo:	Orina 24 Horas
Comentario adicional:	10 mL orina 24 h REFRIGERAR. Añadir 0.5 mL de ácido clorhídrico concentrado
Valores de referencia:	(Inf. 10)

Descripción:	ACIDO HOMOVANILICO ORINA (HVA)
Código:	HOMOVANI
Técnica:	HPLC - Electroquímica
Unidades:	mg/24 h
Plazo:	8 días
Tubo:	Orina 24 Horas

Descripción:	ACIDO HOMOVANILICO ORINA (HVA)
Comentario adicional:	10 mL orina 24 h Volumen mínimo 5 mL Preservar la orina con HCl 6N (20 ml), pH = 1 - 3 Indicar volumen 24 h No ingerir 5 días antes de la recolección de la orina; té, café, plátano, chocolate, vainilla, queso, bebidas carbonatadas ni ningún tipo de medicamento especialmente de salicilatos, medicación hipotensora y contrastes con yodo. Evitar cualquier tipo de ejercicio físico no habitual . Evitar el estrés. (3 días antes de la toma de muestra)
Valores de referencia:	(1.8 - 6.9) > 16 años

Descripción:	ACIDO LACTICO (LACTATO) PLASMA
Código:	LACTICO
Técnica:	Téc. enzimática UV
Unidades:	mg/dL
Plazo:	4 días
Tubo:	Tubo fluoruro
Comentario adicional:	Plasma de tubo de Fluoruro oxalato, separado y refrigerado (El tubo de GLUCOSA). Rellenar mínimo la mitad del tubo fr Fluoruro de sangre total. Alternativa: 1 mL plasma EDTA. Separar inmediatamente y enviar congelado.
Valores de referencia:	(5.7 - 22)

Descripción:	Acido lactico(lactato), líquido sinovial
Código:	LACTICOSIN
Técnica:	Téc. enzimática UV
Unidades:	mg/dL
Plazo:	4 días
Tubo:	Tubo fluoruro
Comentario adicional:	1 mL.Fluoruro/EDTA.
Valores de referencia:	(Inf. 25)

Descripción:	ACIDO MANDELICO + FENIL GLIOXILICO EN 2ª ORINA
Código:	MANDELI2M
Técnica:	Cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) acoplada a detector UV
Unidades:	mg/g creatinina
Plazo:	6 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	10 mL de orina final de jornada (OFJ) para personas expuestas a ESTIRENO y 10 ml de orina al final de la semana laboral para personas expuestas a etilbenceno. Identificar tubo con etiqueta pequeña sin código de barras, con el tapón marcado y con la palabra OFJ en el lateral del tubo.
Valores de referencia:	(Inf. 400) al final de la jornada laboral (exposición a ESTIRENO) VLB-INSHT (Inf. 700) al final de la jornada laboral (exposición a ETILBENCENO) VLB-INSHT

Descripción:	ACIDO MANDELICO+FENIL GLIOXILICO EN ORINA
Código:	MANDELI2
Técnica:	Cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) acoplada a detector UV
Unidades:	mg/g creatinina
Plazo:	10 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	10 mL de orina final de jornada (OFJ) para personas expuestas a ESTIRENO y 10 ml de orina al final de la semana laboral para personas expuestas a etilbenceno. Identificar tubo con etiqueta pequeña sin código de barras, con el tapón marcado y con la palabra OFJ en el lateral del tubo.

Descripción:	ACIDO MANDELICO+FENIL GLIOXILICO EN ORINA
Valores de referencia:	(Inf. 400) al final de la jornada laboral (exposición a ESTIRENO) VLB-INSHT (Inf. 700) al final de la semana laboral (exposición a ETILBENCENO) VLB-INSHT

Descripción:	ACIDO METIL MALONICO EN SUERO
Código:	METILMALO
Técnica:	Cromatografía líquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)
Unidades:	µmol/L
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	Tubo Suero CON gel separador Volumen: 1mL suero congelado Volumen mínimo: 0.3mL
Valores de referencia:	(0.10 - 0.30) 1 año - 12 años (0.10 - 0.35) 12 años - 18 años (0.10 - 0.40) 18 años - 65 años (0.12 - 0.46) > 65 años

Descripción:	ACIDO METILHIPURICO ORINA (metabolito del Xileno)
Código:	METILHIP
Técnica:	Cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) acoplada a detector UV
Unidades:	g/g creatinina
Plazo:	8 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	10 mL de orina final de jornada (OFJ). Identificar tubo con etiqueta pequeña sin código de barras, con el tapón marcado y con la palabra OFJ en el lateral del tubo.
Valores de referencia:	(Inf. 1.0) al final de la jornada laboral (exposición a XILENO) VLB-INSHT

Descripción:	ACIDO METILIMIDAZOLACÉTICO
Código:	METILIMI
Técnica:	Cromatografía de Gases-Espectrometría de Masas
Unidades:	mg/24 h
Plazo:	17 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	10 mL orina 24 h.
Valores de referencia:	(Inf. 4.5)

Descripción:	ACIDO METILMALONICO EN ORINA
Código:	METILMALOO
Técnica:	LC-MS/MS
Unidades:	µmol/g creat
Plazo:	9 días
Tubo:	Orina congelada
Comentario adicional:	1 ml orina micción aislada. Congelar. Preferible orina primera de la mañana
Valores de referencia:	(1.80 - 26.50)

Descripción:	ACIDO MEVALONICO, ORINA
Código:	ACMEVALON
Técnica:	Cromatografía de gases - Espectrometría de masas.

Descripción:	ACIDO MEVALONICO, ORINA
Unidades:	mmol/mol crea
Plazo:	17 días
Tubo:	Orina congelada
Comentario adicional:	10-20 mL Orina (-8 ºC - Congelar)
Valores de referencia:	(0.1 - 11.4)

Descripción:	ACIDO MICOFENOLICO
Código:	MICOFENOLI
Técnica:	LC-MS/MS
Unidades:	mg/L
Plazo:	6 días
Tubo:	Plasma EDTA Pruebas Especiales
Comentario adicional:	1 ml plasma de EDTA refrigerado. Se recomienda obtener la muestra previamente a la administracion del farmaco. Usualmente se determina la concentración del inmunosupresor en periodos matinal y en ayunas volumen mínimo: 0.6 mL
Valores de referencia:	(Sup. 1.3) > 12 años Transplante renal. MPA con medicación de Ciclosporina A (Sup. 1.9) > 12 años Transplante renal. MPA con medicación de Tacrolimus (Sup. 1.3) < 12 años Transplante renal. (1.0 - 3.5) Transplante higado (Sup. 2.0) Transplante de corazón. MPA con medicación con inhibidores de la Calcineurina y Glucocorticoides Límite de cuantificación: 0.4 mg/L

Descripción:	ACIDO OROTICO ORINA
Código:	OROTICO
Técnica:	Cromatografía de gases - Espectrometría de masas
Unidades:	mg/g creatinina
Plazo:	23 días
Tubo:	Orina congelada
Comentario adicional:	10 mL de orina (micción aislada) Congelar
Valores de referencia:	(Inf. 8)

Descripción:	ACIDO OXALICO (CONCENTRACION EN ORINA)
Código:	OXAL2_MG
Técnica:	Espectrofotometría
Unidades:	mg/dL
Plazo:	2 días
Tubo:	orina oxalico
Comentario adicional:	3 ml de orina Es recomendable que el paciente no tome alimentos ricos en Vitamina C durante al menos 48 horas, pues el exceso de ácido ascórbico pudiera interferir de manera “negativa”, es decir infravalorando los resultados de oxalato.
Valores de referencia:	

Descripción:	ACIDO OXALICO EN SUERO
Código:	OXAL
Técnica:	EIA
Unidades:	µmol/L
Plazo:	12 días

Descripción: ACIDO OXALICO EN SUERO
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 2 mL suero congelado (mínimo 1 mL)
Valores de referencia: (Inf. 2)

Código: OXALICO2
Descripción: ACIDO OXALICO ORINA (OXALATO)
Técnica: Enzimática
Comentario adicional: 3 ml de orina.
Se debe restringir de la dieta alimentos ricos en vitamina C o suplementos las 48h previas a la toma de la muestra

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	OXAL2_MG	2700-3		ACIDO OXALICO (CONCENTRACION EN ORINA)	mg/dL	
Prueba	OXALICO24	27222-9		ACIDO OXALICO ORINA (OXALATO)	mg/24 h	(17.5 - 35.1)

Descripción: ÁCIDO PIPECÓLICO EN SUERO
Código: PIPECOLSUE
Técnica: Cromatografía Líquida-Tándem Masas(LC-MS/MS)
Unidades: mcmol/L
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 2 ml de suero. Congelar y enviar congelado
Valores de referencia: (0 - 6) 0-6 meses
(0 - 5.9) 6 meses-12 meses
(0 - 4.3) 1 año-17 años
(0 - 7.4) Más de 17 años

Descripción: ÁCIDO PIRÚVICO (PIRUVATO) EN LCR
Código: PIRULCR
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: mg/dL
Plazo: 6 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 2 ml LCR
Valores de referencia: (0.50 - 1.70)

Descripción: ACIDO PIRUVICO (PIRUVATO) SANGRE
Código: PIRUVICO
Técnica: Cinética enzimática
Unidades: mg/dL
Plazo: 6 días
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional: EXTRACCION DE LAS MUESTRAS: -Al tubo que contiene 4 ml de ácido perclórico al 8%, añadir 2 ml de sangre directamente de la jeringa de extracción. -Vortex 30 segundos -Incubar en frio durante 10 min -Centrifugar 15 min a 3000 g -Separar sobrenadante (1

-Conservar refrigerado por 8 días, si por tiempo superior congelar.
Preferible en ayunas y en reposo.

Mantener refrigerado y enviar REFRIGERADO.

Descripción:	ACIDO PIRUVICO (PIRUVATO) SANGRE
Valores de referencia:	(0.3 - 0.7)

Descripción:	ACIDO PRISTANICO
Código:	PRISTANICO
Técnica:	Cromatografía de Gases-Espectrometría de Masas
Unidades:	mcg/ml
Plazo:	23 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	3 mL suero, Congelar y enviar congelado
Valores de referencia:	(Inf. 0.8)

Descripción:	ACIDO SALICILICO (SALICILATO)
Código:	SALICILICO
Técnica:	Inmunoanálisis
Unidades:	mg/dL
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	(15 - 30) Rango terapéutico (Sup. 30) Nivel tóxico

Descripción:	ÁCIDO TIOTIAZOLIDIN CARBOXILICO (DISULFURO DE CARBONO) TTCA
Código:	DISULCARB
Técnica:	HPLC
Unidades:	mg/g creatinina
Plazo:	13 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	10 mL orina OFJ. Refrigerar Toma de muestra final de la jornada laboral
Valores de referencia:	(Inf. 1.5) Final de jornada (exposición a DISULFURO DE CARBONO)

Descripción:	ACIDO TRICLOROACETICO EN ORINA
Código:	TRICLOAC
Técnica:	Cromatografía de Gases / Captura Electrónica
Unidades:	mg/L
Plazo:	9 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	Volumen: 5.0 mL Volumen mínimo: 50 uL Conservación: Refrigerar
Valores de referencia:	(Inf. 15) Personas expuestas (Tricloroetileno); Final de la semana laboral (BEI /ACGIH) (Inf. 15) Personas expuestas (Tricloroetileno); Final de la semana laboral (VLB/INHST)

Descripción:	ACIDO TTMUCONICO
Código:	MUCONICO
Técnica:	Cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) acoplada a detector UV
Unidades:	mg/L
Plazo:	12 días

Descripción:	ACIDO TTMUCONICO
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	10 mL de orina final de jornada (OFJ). Identificar tubo con etiqueta pequeña sin código de barras, con el tapón marcado y con la palabra OFJ en el lateral del tubo.
Valores de referencia:	(Inf. 2.0) al final de la jornada laboral.**VLB** publicado por el **INSHT (2017) hasta Marzo 2025. Desde Marzo 2025, para la exposición a BENCENO, el INSST recomienda la valoración del S-Fenilmercaptúrico en orina (INSST 2025).**

Descripción:	ACIDO URICO
Código:	URI
Técnica:	
Unidades:	mg/dL
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(2.6 - 6.0) Mujer (3.5 - 7.2) Hombre

Descripción:	ACIDO URICO ORINA
Código:	URI2
Técnica:	Espectrofotometría
Unidades:	g/24h
Plazo:	2 días
Tubo:	Orina 24 Horas
Comentario adicional:	10 mL orina Toma de muestra final de la jornada laboral
Valores de referencia:	(0.25 - 0.75)

Descripción:	ACIDO VALPROICO
Código:	VALPROICO
Técnica:	EIA
Unidades:	µg/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(50 - 100) Rango Terapeútico

Descripción:	ACIDO VALPROICO LIBRE
Código:	VALPROICOL
Técnica:	EIA
Unidades:	mg/L
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. Refrigerar.
Valores de referencia:	(5 - 20) Intervalo terapeútico

Descripción:	ACIDO VANILMANDELICO EN ORINA BASAL
Código:	VANILMBASA
Técnica:	HPLC
Unidades:	mg/g creatinina

Descripción:	ACIDO VANILMANDELICO EN ORINA BASAL
Plazo:	8 días
Tubo:	Orina basal
Comentario adicional:	5 ml orina (micción aislada), con 0.1 ml HCL conc. Suspender toda la medicación. Evitar cualquier tipo de ejercicio físico no habitual . Evitar el estrés. (3 días antes de la toma de muestra) No ingerir 5 días antes de la recolección de la orina; té, café, plátano, chocolate, vainilla, queso, bebidas carbonatadas ni ningún tipo de medicamento especialmente de salicilatos, medicación hipotensora y contrastes con yodo.
Valores de referencia:	(2.10 - 21.8) < 1 año (2.50 - 15.5) 1 año - 2 años (2.10 - 10.3) 2 años - 5 años (Inf. 7.60) 5 años - 10 años (Inf. 5.60) 10 años - 15 años (Inf. 4.60) > 15 años

Descripción:	ACIDO VANILMANDELICO ORINA (VMA) EN ORINA DE 24H
Código:	VANILMAN
Técnica:	HPLC
Unidades:	mg/24 h
Plazo:	8 días
Tubo:	Orina 24 Horas
Comentario adicional:	10 ml orina 24 horas acidificada con 0.1 ml HCl 6N (pH=1 - 3). Volumen mínimo: 5mL Indicar volumen de 24 horas. Evitar cualquier tipo de ejercicio físico no habitual . Evitar el estrés (3 días antes de la toma de muestra). No ingerir 5 días antes de la recolección de la orina; té, café, plátano, chocolate, vainilla, queso, bebidas carbonatadas ni ningún tipo de medicamento (consultar con su médico) especialmente de salicilatos, medicación hipotensora y contrastes con yo
Valores de referencia:	(1.60 - 7.30) (Inf. 2) Límite de cuantificación

Descripción:	ACIDOS BILIARES EN HECES
Código:	BILIAHECES
Técnica:	Espectrometría
Unidades:	µmol/100g heces
Plazo:	9 días
Tubo:	heces especiales
Comentario adicional:	Heces refrigeradas
Valores de referencia:	(84 - 655)

Descripción:	ACIDOS BILIARES TOTALES
Código:	BILIARES
Técnica:	Espectrofotometría
Unidades:	mcmol/L
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 mL suero Alt. Plasma EDTA Tripotásico
Valores de referencia:	(Inf. 10)

Código:	ACGRASOSCL
Descripción:	Acidos Grasos de cadena larga, Suero
Técnica:	Cromatografía de gases

Código: ACGRASOSCL

Comentario adicional: 3 ml de SUERO CONGELADO. Evitar hemólisis
Separar el suero lo antes posible.
Congelar la muestra inmediatamente.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	ACGRAC22	53859-5		Perfil ácido graso de cadena larga (C22)	mcg/mL	(Inf. 32.8)
Prueba	ACGRAC24	53860-3		Perfil ácido graso de cadena larga (C24)	mcg/mL	(Inf. 33.7)
Prueba	ACGRAC26	33403-7		Perfil ácido graso de cadena larga (C26)	mcg/mL	(0.09 - 0.35)
Prueba	ACGRC24	1773-1		Perfil ácido graso de cadena larga indice (C24/22)		(0.55 - 0.89)
Prueba	ACGRC26	1774-9		Perfil ácido graso de cadena larga indice (C26/22)		(Inf. 0.02)
Prueba	ACGRACOM	33478-9		Comentario acidos grasos de cadena muy larga		

Código: ACGRASFRA

Descripción: ACIDOS GRASOS FRACCIONES (OMEGA3Y6), SUERO

Técnica: GC-FID

Comentario adicional: 2 mL de suero.(vol. mínimo: 0.25 ml) Proteger de la luz. Refrigerar.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	MIRISTICO	35157-7		Perfil Acidos grasos fracciones: AC. MIRISTICO	µg/mL	(15.00 - 60.00)
Prueba	PALMITICO	2719-3		Perfil Acidos grasos fracciones: AC. PALMITICO	µg/mL	(320.00 - 1075.00)
Prueba	ESTEARICO	35149-4		Perfil Acidos grasos fracciones: AC. ESTEARICO	µg/mL	(127.00 - 305.00)
Prueba	PALMITOLEI	5006440		Perfil Acidos grasos fracciones: AC. PALMITOLEICO	µg/mL	(33.00 - 125.00)
Prueba	OLEICO	2673-2		Perfil Acidos grasos fracciones: AC. OLEICO	µg/mL	(260.00 - 1250.00)
Prueba	LINOLEICO	2564-3		Perfil Acidos grasos fracciones: AC. LINOLEICO	µg/mL	(576.00 - 1300.00)
Prueba	DHGAMALINO	5006534		Perfil Acidos grasos fracciones: AC. DH-GAMA-LINOLENICO	µg/mL	(38.00 - 105.00)
Prueba	ARAQUIDONI	1889-5		Perfil Acidos grasos fracciones: AC. ARAQUIDONICO	µg/mL	(108.00 - 422.00)
Prueba	GAMALINOLE	5009409		Perfil Acidos grasos fracciones: AC. GAMA-LINOLENICO	µg/mL	(4.00 - 42.00)
Prueba	ALFALINOLE	5006442		Perfil Acidos grasos fracciones AC. ALFA-LINOLENICO	µg/mL	(3.00 - 21.00)
Prueba	EICOSAPENT	5006443		Perfil Acidos grasos fracciones: AC. EICOSAPENTANOICO	µg/mL	(5.00 - 73.00)
Prueba	DOCOSAHEXA	5006444		Perfil Acidos grasos fracciones: AC. DOCOSAHEXAENOICO	µg/mL	(35.00 - 160.00)

Componentes						
Prueba	ELAIDICO			Perfil ácidos grasos fraccionados: AC. ELAIDICO	µg/mL	(Inf. 10)
Prueba	COCN3N6			Perfil ácidos grasos fraccionados Cociente n6/n3 en suero		(5 - 10)

Descripción:	ACIDOS GRASOS LIBRES (NEFA)
Código:	NEFA
Técnica:	Colorimetría
Unidades:	mmol/L
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 ml suero congelado
Valores de referencia:	(0.1 - 0.6) (ayunas) (Inf. 0.3) (dos horas post-prandial)

Código:	ACGERITRO
Descripción:	ACIDOS GRASOS, ERITROCITOS (CUANTIFICACIÓN)
Técnica:	Cromatografía de gases
Comentario adicional:	10 mL Sangre total EDTA (2-8 ºC - Refrigerar) Proteger de la luz. 12 horas de ayuno

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	AGE.PALMIT			Perfil AG eritrocitarios: Acido Palmitoleico (C161n7)	%	(0.10 - 0.30)
Prueba	AGE.OLEICO			Perfil AG eritrocitarios: Acido Oleico (C18:1n9)	%	(14.70 - 19.80)
Prueba	AGE.ALINOL			Perfil AG eritrocitarios: Acido alfa-Linolenico (C18:3n3)	%	(0.04 - 0.16)
Prueba	AGE.EICOSA	90912-7		Perfil AG eritrocitarios: Acido Eicosapentanoico (C20:5n3)	%	(0.60 - 2.30)
Prueba	AGE.DECOSA	90914-3		Perfil AG eritrocitarios:Acido Docosahexanoico (C22:6n3)	%	(3.10 - 8.50)
Prueba	AGE.LINOLE	90917-6		Perfil AG eritrocitarios: Acido Linoleico (C18:2n6)	%	(8.60 - 13.20)
Prueba	AGE.GLINOL			Perfil AG eritrocitarios: Acido gamma-Linolenico (C18:3n6)	%	(0.04 - 0.50)
Prueba	AGE.DGLINO			Perfil AG eritrocitarios: Acido DH-G Linolenico (C20:3n6)	%	(0.95 - 2.00)
Prueba	AGE.ARAQUI	90913-8		Perfil AG eritrocitarios:Acido Araquidonico (C20:4n6)	%	(10.00 - 16.00)
Prueba	AGE.MIRIST			Perfil AG eritrocitarios: Acido Miristico (C14:0)	%	(0.13 - 0.67)
Prueba	AGE.PALMIL			Perfil AG eritrocitarios: Acido Palmitico (C16:0)	%	(25.00 - 32.80)
Prueba	AGE.ESTEAR			Perfil AG eritrocitarios: Acido Estearico (C18:0):	%	(17.00 - 21.45)

Componentes						
Prueba	AGE.ELAIDI			Perfil AG eritrocitarios: Acido Elaidico (t-C18:1n9):	%	(Inf. 0.95)
Prueba	AGE.N6N3			Perfil AG eritrocitarios: Indice n6/n3		(2.70 - 6.00)
Prueba	AGE.PDF			AGE. INFORME EN PDF		

Descripción: ACIDOS ORGANICOS EN LCR
Código: ORGANILCR
Técnica: téc. cromatografía de gases/espectrometría de masas
Unidades:
Plazo: 23 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Código: ORGANICO2
Descripción: ACIDOS ORGANICOS EN ORINA
Técnica:
Comentario adicional: 10 ml de orina. Congelar y enviar congelado.Es recomnedable que la muestra corresponda a una fase de crisis.Indicar informacion clínica.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	HGLUTARICO			Perfil ORGANICO2: ACIDO 2 HIDROXIGLUTARICO	mmol/mol crea	(Inf. 16)
Prueba	OXOGLUTARI			Perfil ORGANICO2: ACIDO OXOGLUTARICO	mmol/mol crea	(Inf. 152)
Prueba	BUTIRICO			Perfil ORGANICO2: ACIDO 3 HIDROXI BUTIRICO	mmol/mol crea	(Inf. 3)
Prueba	PROPIONICO			Perfil ORGANICO2: ACIDO 3 HIDROXI PROPIONICO	mmol/mol crea	(Inf. 10)
Prueba	VALERICO			Perfil ORGANICO2: ACIDO 3 HIDROXIVALÉRICO	mmol/mol crea	(Inf. 2)
Prueba	MGLUTARICO			Perfil ORGANICO2: ACIDO 3 METILGLUTÁRICO	mmol/mol crea	(Inf. 7)
Prueba	HBUTIRICO			Perfil ORGANICO2: ACIDO 4 HIDROXIBUTIRICO	mmol/mol crea	(Inf. 2)
Prueba	ETILMALONI			Perfil ORGANICO2: ACIDO ETILMALONICO	mmol/mol crea	(Inf. 7)
Prueba	FUMARICO			Perfil ORGANICO2: ACIDO FUMARICO	mmol/mol crea	(Inf. 2)
Prueba	GLICERICO			Perfil ORGANICO2: ACIDO GLICERICO	mmol/mol crea	(Inf. 9)
Prueba	GLICOLICO			Perfil ORGANICO2: ACIDO GLICOLICO	mmol/mol crea	(Inf. 103)
Prueba	GLUTARICO			Perfil ORGANICO2: ACIDO GLUTARICO	mmol/mol crea	(Inf. 10)
Prueba	HOMOVALINI			Perfil ORGANICO2: ACIDO HOMOVANILICO	mmol/mol crea	(Inf. 12)
Prueba	ALACTICO			Perfil ORGANICO2: ACIDO LACTICO	mmol/mol crea	(Inf. 250)
Prueba	METILMALON			Perfil ORGANICO2: ACIDO METILMALONICO	mmol/mol crea	(Inf. 2)

Componentes						
Prueba	NACETILASP			Perfil ORGANICO2: ACIDO N ACETILASPARTICO	mmol/mol crea	(Inf. 2)
Prueba	AOROTICO			Perfil ORGANICO2: ACIDO OROTICO	mmol/mol crea	(Inf. 11)
Prueba	ASUBERICO			Perfil ORGANICO2: ACIDO SUBERICO	mmol/mol crea	(Inf. 8)
Prueba	SUCCACETON			Perfil ORGANICO2: SUCCINILACETONA	mmol/mol crea	(Inf. 2)
Prueba	HEXAGLICI			Perfil ORGANICO2: HEXANOILGLICINA	mmol/mol crea	(Inf. 2)
Prueba	TIGLILGLIC			Perfil ORGANICO2: TIGLILGLICINA	mmol/mol crea	(Inf. 2)
Prueba	ORGANCOMEN			Perfil ORGANICO2; COMENTARIO		

Descripción:	ACIDOS ORGANICOS EN SUERO
Código:	ORGANICO
Técnica:	Cromatografía de gases - Espectrometría de masas
Unidades:	
Plazo:	16 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	2 mL Suero congelado
Valores de referencia:	La relación de ácidos orgánicos estudiados corresponde al siguiente perfil: Ácido Adípico, Ácido 2-Ceto-isovalérico, Ácido Cítrico, Ácido Etilmalónico, Ácido Fumárico, Ácido Glicólico, Ácido Glutárico, Ácido 2-hidroxibutírico, Ácido 3-hidroxibutírico, Ácido 4-Hidroxifenilacético, Ácido 2-Hidroxi-isovalérico, Ácido 3-Hidroxi-3-metilglutárico, Ácido Láctico, Ácido Malónico, Ácido Metilmalónico, Ácido Orótico, Ácido Oxálico, Ácido Sebácico, Ácido Subérico, Ácido Succínico.

Descripción:	Acidosis láctica infantil letal. Sec Gen: SUCLG1.
Código:	GEN_000012
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Acidosis tubular renal distal. Sec Gen: SLC4A1.
Código:	GEN_000013
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Acidosis tubular renal proximal AR. Sec Gen: SLC4A4.
Código:	GEN_000014
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días

Descripción: Acidosis tubular renal proximal AR. Sec Gen: SLC4A4.
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Aciduria 3-Metilglutacónica. Panel
Código: GEN_000015
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Aciduria alfa metil acetoacetil. Sec Gen: ACAT1.
Código: GEN_000016
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Aciduria argininosuccínica. Sec Gen: ASL.
Código: GEN_000017
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Aciduria glutárica tipo 1. Sec Gen: GCDH.
Código: GEN_000003
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Aciduria L-2-hidroxiglutárica. Sec Gen: L2HGDH.
Código: GEN_000018
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Aciduria malónica y metilmalónica combi. Sec Gen: ACSF3.
Código: GEN_000019
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Aciduria orótica. Sec Gen: UMPS.
Código: GEN_000020
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Código: ACILCARNIT
Descripción: ACILCARNITINAS
Técnica: LC-MS/MS
Comentario adicional: 1 mL PLASMA HEPARINA/SUERO, congelar y enviar congelado. INDISPENSABLE ENVIAR INFORMACIÓN CLÍNICA

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	CARNITINAL	30191-1		Perfil Acilcarnitinas: CARNITINA LIBRE	mcmol/L	(10.63 - 56.00) < 1 mes (16.17 - 60.74) 1 mes - 1 año (17.60 - 49.12) 1 año - 8 años (19.00 - 60.70) > 8 años
Prueba	ACETILCAR	30191-1		Perfil Acilcarnitinas: ACETIL CARNITINA	mcmol/L	(2.98 - 14.44) < 1 mes (4.61 - 16.33) 1 mes - 1 año (3.99 - 15.67) 1 año - 8 años (3.90 - 14.11) > 8 años
Prueba	PROPIOCAR	30551-6		Perfil Acilcarnitinas:PROPIONIL CARNITINA	mcmol/L	(0.12 - 0.73) < 1 mes (0.22 - 1.02) 1 mes - 1 año (0.23 - 0.92) 1 año - 8 años (0.20 - 0.82) > 8 años
Prueba	BUTIRILCAR	35655-0		Perfil Acilcarnitinas: BUTIRIL CARNITINA	mcmol/L	(0.06 - 0.31) < 1 mes (0.09 - 0.33) 1 mes - 1 año (0.09 - 0.35) 1 año - 8 años (0.07 - 0.38) > 8 años
Prueba	VALERILCAR	39009-6		Perfil Acilcarnitinas: VALERIL CARNITINA	mcmol/L	(0.04 - 0.31) < 1 mes (0.04 - 0.19) 1 mes - 1 año (0.04 - 0.20) 1 año - 8 años (0.04 - 0.20) > 8 años
Prueba	GLUTARICAR	30349-5		Perfil Acilcarnitinas: GLUTARIL CARNITINA	mcmol/L	(0.03 - 0.09) < 1 mes (0.02 - 0.11) 1 mes - 1 año (0.02 - 0.09) 1 año - 8 años (0.02 - 0.11) > 8 años
Prueba	HEXANOICAR	30358-6		Perfil Acilcarnitinas: HEXANOICAR	mcmol/L	(0.01 - 0.11) < 1 mes (0.03 - 0.11) 1 mes - 1 año (0.02 - 0.08) 1 año - 8 años (0.02 - 0.09) > 8 años

Componentes						
Prueba	OCTANOICAR	30540-9		Perfil Acilcarnitinas: OCTANOIL CARNITINA	mcmol/L	(0.03 - 0.15) < 1 mes (0.03 - 0.21) 1 mes - 1 año (0.04 - 0.20) 1 año - 8 años (0.03 - 0.27) > 8 años
Prueba	DECANOICAR	30327-1		Perfil Acilcarnitinas: DECANOIL CARNITINA	mcmol/L	(0.02 - 0.20) < 1 mes (0.05 - 0.25) 1 mes - 1 año (0.06 - 0.36) 1 año - 8 años (0.05 - 0.45) > 8 años
Prueba	LAUROILCAR	30331-3		Perfil Acilcarnitinas: LAUROIL CARNITINA	mcmol/L	(0.02 - 0.13) < 1 mes (0.01 - 0.15) 1 mes - 1 año (0.02 - 0.13) 1 año - 8 años (0.01 - 0.11) > 8 años
Prueba	MISTIROCAR	30565-6		Perfil Acilcarnitinas: MISTIROIL CARNITINA	mcmol/L	(0.01 - 0.07) < 1 mes (0.01 - 0.07) 1 mes - 1 año (0.01 - 0.06) 1 año - 8 años (0.01 - 0.04) > 8 años
Prueba	PALMITOCAR	30356-0		Perfil Acilcarnitinas: PALMITOIL CARNITINA (C16)	mcmol/L	(0.05 - 0.26) < 1 mes (0.04 - 0.17) 1 mes - 1 año (0.05 - 0.19) 1 año - 8 años (0.04 - 0.15) > 8 años
Prueba	OCTADECAR	30560-7		Perfil Acilcarnitinas: OCTADECANOIL CARNITINA	mcmol/L	(0.02 - 0.06) < 1 mes (0.01 - 0.07) 1 mes - 1 año (0.02 - 0.06) 1 año - 8 años (0.02 - 0.07) > 8 años
Prueba	NOTACAR	46252-3		Perfil Acilcarnitinas:COMENTARIO ACILCARNITINAS		

Descripción:	ACLARAMIENTO DE ACIDO URICO
Código:	CLEARANURI
Técnica:	Espectrofotometría
Unidades:	mL/min
Plazo:	3 días
Tubo:	Orina 24 Horas
Comentario adicional:	1 mL Suero Indicar diuresis
Valores de referencia:	(Sup. 10)

Descripción:	ACLARAMIENTO DE ALFA-1 ANTITRIPSINA FECAL
Código:	ACLARATT
Técnica:	Nefelometría
Unidades:	mL/24 h
Plazo:	5 días
Tubo:	heces especiales
Comentario adicional:	1 mL suero y 5 g heces. Indispensable indicar peso de heces/24 h o 72 h. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO
Valores de referencia:	(Inf. 20)

Descripción:	ACLARAMIENTO DE CREATININA
Código:	CLEARANCEC
Técnica:	Espectrofotometría
Unidades:	mL/min
Plazo:	3 días
Tubo:	Orina 24 Horas

Descripción:	ACLARAMIENTO DE CREATININA
Comentario adicional:	Suero y diuresis
Valores de referencia:	(70 - 120)

Descripción:	ACLARAMIENTO DE UREA
Código:	CLEARANCEU
Técnica:	Espectrofotometria
Unidades:	mL/min
Plazo:	3 días
Tubo:	Orina 24 Horas
Comentario adicional:	Suero y diuresis
Valores de referencia:	(59 - 94) Depuración Estandar (70 - 170) Depuración máxima

Descripción:	Acondrogénesis tipo 2. Sec Gen: COL2A1.
Código:	GEN_000021
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Acondroplasia: mutaciones G380R y G375C gen FGFR3
Código:	ACONDROPLA
Técnica:	PCR y secuenciación
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	Acrodisostosis. Sec Gen: PRKAR1A.
Código:	GEN_000022
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Acromatopsia. Panel
Código:	GEN_000023
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Descripción: Acromatopsia. Panel
Valores de referencia:

Descripción: ACTH (H.ADRENOCORTICOTROPA) PLASMA
Código: ACTH
Técnica: Técnica ICMA
Unidades: pg/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Plasma EDTA Pruebas Especiales
Comentario adicional: Plasma EDTA separado y congelado. Enviar congelado.
Valores de referencia: (Inf. 48.8)

Descripción: ACTIVIDAD ANTI FACTOR Xa
Código: ACTIVIDFXA
Técnica: método cronométrico
Unidades: UI/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional: Separa plasma y congelar inmediatamente y enviar congelado al laboratorio
Valores de referencia: (0.6 - 1.0) Rango terapeútico HBPM cada 12 horas
(1.0 - 2.0) Rango terapeútico HBPM cada 24 horas
HBPM: Heparinas de bajo peso molecular

Código: ADALIMUMAB
Descripción: ADALIMUMAB NIVELES SUERO Y AC. ANTIADALIMUMAB
Técnica: FIA
Comentario adicional: 2 mL Suero
Alternativa: plasma
Toma de muestras antes de la administración de la próxima dosis.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	ADALIMUNIV	74117-3		PERFIL ADALIMUMAB NIVELES SUERO	µg/mL	Límite de cuantificación 0.20 µg/mL. Los rangos óptimos terapeúticos son específicos de la enfermedad.
Prueba	ADALIMUAC	74116-5		PERFIL ADALIMUMAB AC. SUERO	AU/mL	(Inf. 10) No se detectan

---

Descripción: Adams-Oliver tipo 5, Sd. Sec Gen: NOTCH1
Código: GEN_000693
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: ADAMTS-13 anticuerpos en plasma
Código: ADAMTS13AC

Descripción:	ADAMTS-13 anticuerpos en plasma
Técnica:	EIA
Unidades:	
Plazo:	17 días
Tubo:	Plasma de Citrato congelado
Comentario adicional:	2 mL Plasma Citrato sódico, CONGELAR.
Valores de referencia:	

Descripción:	ADDIS RECUENTO ORINA
Código:	ADDIS
Técnica:	Microscopía óptica
Unidades:	/24h
Plazo:	3 días
Tubo:	ADDIS orina 24 horas
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 1000000) Hematíes (Inf. 2000000) Leucocitos (Inf. 5000) C. Hialinos

Descripción:	Adenocarcinoma de pulmón. Sec Gen: ERBB2.
Código:	GEN_000024
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Adenomas aislados de hipófisis familiar. Sec Gen: AIP.
Código:	GEN_000025
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	ADENOSINA DESAMINASA (ADA) EN MUESTRA
Código:	ADAMUES
Técnica:	
Unidades:	U/L
Plazo:	4 días
Tubo:	Muestra envios externos
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	ADENOSINA DESAMINASA (ADA) SUERO
Código:	ADASU
Técnica:	Cinética - Espectrofotometria
Unidades:	U/L

Descripción:	ADENOSINA DESAMINASA (ADA) SUERO
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero Alternativa: plasma de heparina. Centrifugar inmediatamentey mantener cerrado herméticamente.
Valores de referencia:	(0.0 - 15.0)

Descripción:	ADENOSINA DESAMINASA LCR
Código:	ADALCR
Técnica:	Cinetica - Espectrofotometria
Unidades:	U/L
Plazo:	4 días
Tubo:	Liquido cefalorraquideo congelado
Comentario adicional:	LCR de aspecto claro obtenido en tubo estéril sin anticoagulante. Centrifugar la muestra, separar y congelar sobrenadante. Enviar sobrenadante congelado. Volumen mínimo 200 mcl.
Valores de referencia:	(Inf. 9)

Descripción:	ADENOVIRUS AC. IGG
Código:	ADENOACG
Técnica:	Técnica CLIA
Unidades:	Indice
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 0.8) Negativo (0.8 - 1.1) Indeterminado (Sup. 1.1) Positivo

Descripción:	ADENOVIRUS AC. IgG EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
Código:	ADENOACGLC
Técnica:	Tec. EIA
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 1) Negativo (Sup. 1) Positivo

Descripción:	ADENOVIRUS AC. IGM
Código:	ADENOACM
Técnica:	EIA
Unidades:	
Plazo:	10 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero Alternativa Plasma (citrato, heparina)
Valores de referencia:	(Inf. 9) Negativo (9 - 11) Indeterminado (Sup. 11) Positivo

Descripción:	ADENOVIRUS AC. IgM EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
Código:	ADENOACMLC
Técnica:	TEC. EIA
Unidades:	
Plazo:	10 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 1) Negativo (Sup. 1) Positivo

Descripción:	ADENOVIRUS ANTÍGENO EN HECES
Código:	ADENOVI
Técnica:	Inmunocromatografía
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Heces No Microbiología
Comentario adicional:	5 g de heces
Valores de referencia:	

Descripción:	ADENOVIRUS ANTÍGENO EN MUESTRA NASO-FARINGEAS
Código:	ADENORESP
Técnica:	Aglutinación
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Microbiología
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	Adenovirus DNA PCR Cualitativa
Código:	PCRADENOV
Técnica:	Q-PCR
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	Muestra envios externos
Comentario adicional:	LCR, aspirado nasofaríngeo, BAL, hisopo conjuntival, orina, sangre totaL, biopsia y heces.
Valores de referencia:	

Descripción:	ADIPONECTINA
Código:	ADIPONECTI
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	µg/mL
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 ml Suero CON gel separador. Conservación: CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO Volumen mínimo: 0.5 mL
Valores de referencia:	(3.40 - 19.50) IMC < 25 (2.60 - 13.70) IMC 25-30 (1.80 - 9.40) IMC > 30

Descripción: ADN CAPILAR: CARGA GENETICA ASOCIADA A ALOPECIA
Código: ADNCAPILAR
Técnica:
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional: Kit especial. Solicitar a almacén
Valores de referencia:

Descripción: Adrenoleucodistrofia ligada al X: gen ABCD1 (NGS)
Código: ABCD1_MUTS
Técnica: NGS con TSOE de Illumina y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Muestras de tejido tumotal y sangre.
Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Afibrinogenemia congénita. Panel
Código: GEN_000026
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Afibrinogenemia congénita. Sec Gen: FGG.
Código: GEN_000027
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Agamaglobulinemia ligada al X. Sec Gen: BTK.
Código: GEN_000028
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Agenesia renal. Sec Gen: UPK3A.
Código: GEN_000029
Técnica:

Descripción:	Agenesia renal. Sec Gen: UPK3A.
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	AGLUTININA ANTI-A
Código:	AGLUANTIA
Técnica:	Columna gel
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Sangre EDTA
Comentario adicional:	Plasma EDTA, alternativo suero
Valores de referencia:	NEGATIVO

Descripción:	AGLUTININA ANTI-B
Código:	AGLUANTIB
Técnica:	Columna gel
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Sangre EDTA
Comentario adicional:	Plasma EDTA, alternativo suero
Valores de referencia:	NEGATIVO

Descripción:	AGOMELATINA SUERO
Código:	AGOMELATIN
Técnica:	CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA-TÁNDEM MASAS
Unidades:	ng/mL
Plazo:	17 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(7 - 300) 1-2 h después de 50 mg (AGNP 2017)

Descripción:	Alagille. Panel
Código:	GEN_000030
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Albinismo cutáneo. Panel
Código:	GEN_000031
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Descripción: Albinismo cutáneo. Panel
Valores de referencia:

Descripción: Albinismo ocular ligado al cr. X. Sec Gen: GPR143.
Código: GEN_000032
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Albinismo oculocutáneo. Panel
Código: GEN_000033
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Albinismo oculocutáneo: gen TYR (NGS)
Código: TYROSINASA
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: ALBUMINA
Código: ALB
Técnica:
Unidades: g/dL
Plazo: 2 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:
(2.8 - 4.4) 1 dia - 4 dias
(3.8 - 5.4) 4 dias - 14 años
(3.5 - 5.2) 14 años - 60 años
(3.2 - 4.6) 60 años - 90 años
(2.9 - 4.5) > 90 años

Descripción: ALBUMINA EN LCR
Código: ALBLCR
Técnica: Nefelometría
Unidades: mg/dL
Plazo: 4 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: LCR. refrigerar.

Descripción:	ALBUMINA EN LCR
Valores de referencia:	(Inf. 35)

Descripción:	Alcaptonuria. Sec Gen: HGD.
Código:	GEN_000034
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	ALCOHOL (ETANOL) EN ORINA
Código:	ALCOHOLOR
Técnica:	Enzimática
Unidades:	mg/dL
Plazo:	2 días
Tubo:	Orina Drogas de Abuso
Comentario adicional:	Orina. Micción aislada
Valores de referencia:	(Inf. 10.0) Límite de detección de la técnica

Descripción:	ALCOHOL (ETANOL)
Código:	ALCOHOL
Técnica:	Enzimática
Unidades:	g/L
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Tubo de suero.Durante la extracción no utilizar alcohol etílico para desinfectar la zona. Rotular el tubo con la palabra "ETANOL". Tubo exclusivo para esta determinación.
Valores de referencia:	(Inf. 0.1) No detectable (0.1 - 0.5) Ligera euforia (0.5 - 1.0) Rubor, retardo de reflejos (1.0 - 2.0) Depresión SNC (Sup. 2.0) Intoxicación severa (Sup. 3.5) Coma

Descripción:	Alcohol metilico (metanol) en sangre
Código:	METANOL
Técnica:	Cromatografía gases-Detección con ionización de llama
Unidades:	mg/L
Plazo:	7 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	2 mL sangre total (EDTA) refrigerado
Valores de referencia:	(Inf. 5) Personas no expuestas

Descripción:	ALDOLASA
Código:	ALDOLASA
Técnica:	Cinética- Espectrofotometría
Unidades:	U/L a 37 ºC
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 mL suero o plasma citrato, oxalato o EDTA

Descripción:	ALDOLASA
Valores de referencia:	(Inf. 7.6)

Descripción:	ALDOSTERONA
Código:	ALDOS
Técnica:	CLIA
Unidades:	ng/dL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. Como alternativa se admite plasma EDTA
Valores de referencia:	(1.76 - 23.2) P. supina (2.52 - 39.2) P. erguida

Descripción:	ALDOSTERONA EN ORINA
Código:	ALDOS2
Técnica:	RIA
Unidades:	µg/24h
Plazo:	6 días
Tubo:	Orina 24 Horas
Comentario adicional:	10 mL orina de orina de 24 h. (alícuota) Refrigerar. Indicar volumen de 24h La ingestión excesiva de regaliz puede disminuir los niveles, ya que esa sustancia produce un efecto similar al de la aldosterona. El ejercicio agotador y el estrés pueden estimular las secreciones adrenocorticales y elevar el nivel de aldosterona. La postura, la dieta y el embarazo influyen en el resultado. Supender los fármacos que alteran el equilibrio de sodio, potasio y líquidos (p. ej., diuréticos, hipotensores, esteroides)
Valores de referencia:	(Inf. 18) La postura, la dieta y el embarazo influyen en el resultado.

Descripción:	ALERGIA METALES (UN METAL)
Código:	MELISA
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	23 días
Tubo:	Tubo Especial
Comentario adicional:	TUBOS ESPECIALES para prueba MELISA Pedir a almacen. (SUERO Y CITRATO ESPECIALES) Envío lunes-martes (laborables excepto vísperas de festivos). Enviar las muestras al laboratorio el mismo día de la obtención. No es necesario estar en ayunas. ENVIAR LAS MUESTRAS A TEMPERATURA AMBIENTE. NO REFRIGERAR.
Valores de referencia:	

Descripción:	Alexander, enfermedad de. Sec Gen: GFAP.
Código:	GEN_000035
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	ALFA 1 RECEPTOR ADRENÉRGICO ANTICUERPOS SUERO
Código:	ALFA1ADRE
Técnica:	EIA
Unidades:	U/mL
Plazo:	32 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero
Valores de referencia:	(Inf. 7) Negativo (7 - 11) Indeterminado

Descripción:	ALFA 2 RECEPTOR ADRENÉRGICO ANTICUERPOS SUERO
Código:	ALFA2ADRE
Técnica:	EIA
Unidades:	U/mL
Plazo:	32 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero
Valores de referencia:	(Inf. 15) Negativo

Descripción:	ALFA AMILASA EN SALIVA
Código:	AMISALIVA
Técnica:	ENZIMOINMUNOANÁLISIS
Unidades:	U/mL
Plazo:	8 días
Tubo:	Saliva
Comentario adicional:	1 mL de saliva.
Valores de referencia:	(3.1 - 423.1) Valores orientativos

Descripción:	ALFA AMINOADIPICO SEMIALDEHIDO ORINA
Código:	AMINOADIOR
Técnica:	Cromatografía Líquida Tándem-Masas (LC-MS/MS)
Unidades:	mmol/molcrea
Plazo:	47 días
Tubo:	Orina basal
Comentario adicional:	10 mL orina micción aislada. Indispensable fecha de nacimiento e historia clínica del paciente.
Valores de referencia:	(0.27 - 2.85)

Descripción:	ALFA CAROTENO, SUERO
Código:	ACA
Técnica:	EIA
Unidades:	µg/l
Plazo:	14 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	Suero. CONGELADO. Separar y congelar inmediatamente. Muestra protegida de la luz
Valores de referencia:	(Inf. 350)

Descripción:	ALFA GLUCOSIDASA PLASMA SEMINAL
Código:	GLUCOSIDSE

Descripción:	ALFA GLUCOSIDASA PLASMA SEMINAL
Técnica:	Espectrofotometria
Unidades:	mUI/mL
Plazo:	17 días
Tubo:	Semen
Comentario adicional:	1 ml de plasma seminal Congelar y enviar congelado Indicar volumen eyaculado
Valores de referencia:	Igual o superior a 20 mU/eyaculado Igual o superior a 6.35 mUI/mL

Descripción:	ALFA GLUCOSIDASA (E.POMPE) EDTA
Código:	GLUCOSISAN
Técnica:	Fluorimetría
Unidades:	nmol/h/mg prot
Plazo:	34 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	3.0 mL sangre total EDTA Coordinar previamente toma y envío de muestras con el laboratorio. Consultar con el laboratorio otro tipo de muestra.
Valores de referencia:	(6 - 32)

Descripción:	ALFA GLUCOSIDASA (E.POMPE) SANGRE SECA
Código:	GLUCOSISEC
Técnica:	Fluorimetrica
Unidades:	nmols/21hxdisco
Plazo:	32 días
Tubo:	Tubo Especial
Comentario adicional:	Sangre seca recogida en papel de filtro especial Pedir instrucciones Indispensable informe clinico y antecedentes familiares
Valores de referencia:	(0.47 - 8.27)

Descripción:	ALFA INTERFERON, SUERO
Código:	AITFS
Técnica:	EIA
Unidades:	UI/mL
Plazo:	25 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	Suero congelado
Valores de referencia:	(Inf. 2)

Descripción:	Alfa triptasemia hereditaria TPSAB1, TPSB2 (ddPCR)
Código:	TRIPTASEM
Técnica:	Ensayo de CNV por ddPCR
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	Alfa triptasemia hereditaria TPSAB1, TPSB2 (ddPCR)
Código:	TRIPTASEM
Técnica:	Ensayo de CNV por ddPCR
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	Alfa triptasemia hereditaria TPSAB1, TPSB2 (ddPCR)
Código:	TRIPTASEM
Técnica:	Ensayo de CNV por ddPCR
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	Alfa triptasemia hereditaria TPSAB1, TPSB2 (ddPCR)
Código:	TRIPTASEM
Técnica:	Ensayo de CNV por ddPCR
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	Alfa triptasemia hereditaria TPSAB1, TPSB2 (ddPCR)
Código:	TRIPTASEM
Técnica:	Ensayo de CNV por ddPCR
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	ALFA-1 ANTITRIPSINA FECAL
Código:	A1ATTFEC
Técnica:	Técnica Nefelometría-turbidimetría
Unidades:	mg/g heces hum.
Plazo:	5 días
Tubo:	heces especiales
Comentario adicional:	Volumen 0.5 g (mínimo 0.3 g)
Valores de referencia:	(Inf. 0.76)

Descripción:	ALFA-1-ANTITRIPSINA
Código:	A1ANTI
Técnica:	Turbidimetría
Unidades:	mg/dL
Plazo:	3 días

Descripción:	ALFA-1-ANTITRIPSINA
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 mL suero Alternativa: plasma de heparina
Valores de referencia:	(90 - 200)

Descripción:	Alfa-1-Antitripsina fenotipo en suero
Código:	A1ANTIFENO
Técnica:	isoelectroenfoque e inmunofijación
Unidades:	
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 mL. Separar y enviar congelado
Valores de referencia:	El déficit de alfa-1-antitripsina se asocia habitualmente al fenotipo Z, pero los fenotipos S y SZ presentan también niveles disminuidos de alfa-1-antitripsina. El resultado obtenido no descarta la presencia de variantes alélicas minoritarias, que pueden ocasionar, o no, niveles disminuidos de alfa-1-antitripsina, (Ejemplo: Fenotipo nulo).

Descripción:	ALFA-1-FETOPROTEINA
Código:	A1FETO.
Técnica:	CMIA
Unidades:	ng/mL
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Alternativo heparina de sodio y litio, EDTA.
Valores de referencia:	(Inf. 8.8) Observaciones: En los primeros meses de vida, los valores son mucho más elevados, descendiendo gradualmente

Descripción:	ALFA-1-FETOPROTEINA LIQUIDO AMNIOTICO
Código:	A1FETOLIQ
Técnica:	
Unidades:	ng/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	16410 Mediana semana 15 13380 Mediana semana 16 10910 Mediana semana 17 8890 Mediana semana 18 7250 Mediana semana 19 5910 Mediana semana 20 4820 Mediana semana 21

Descripción:	ALFA-1-FETOPROTEINALCR
Código:	A1FETOLCR
Técnica:	Inmunoluminiscencia
Unidades:	U/mL
Plazo:	8 días
Tubo:	Líquidos Biológicos

Descripción:	ALFA-1-FETOPROTEINALCR
Comentario adicional:	1 ml de LCR
Valores de referencia:	(Inf. 1.5) (Standard WHO 72/225)

Descripción:	ALFA-1-GLUCOPROTEINA ACIDA (OROSOMUCOIDE)
Código:	A1GLUCO
Técnica:	Inmunoturbidimetria
Unidades:	mg/dL
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. Alternativa plasma de heparina
Valores de referencia:	(50 - 120)

Descripción:	ALFA-1-MICROGLOBULINA (ORINA)
Código:	ALFA1MICRO
Técnica:	Nefelometría
Unidades:	mg/L
Plazo:	10 días
Tubo:	Orina basal
Comentario adicional:	Orina. Refrigerar.
Valores de referencia:	(Inf. 12)

Descripción:	ALFA2-ANTIPLASMINA EN PLASMA
Código:	ANTIPLASMI
Técnica:	Téc. Espectrometria de Absorción Molecular
Unidades:	%
Plazo:	14 días
Tubo:	Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:	2 mL Plasma Citrato Sódico congelado. TUBO INDEPENDIENTE PARA ESTE ANÁLISIS.
Valores de referencia:	(80 - 120)

Descripción:	Alfa-2-Macroglobulina
Código:	A2MACRO
Técnica:	Inmunonefelometría
Unidades:	mg/dL
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero. REFRIGERAR
Valores de referencia:	(130 - 300) Standard IFCC/BCR/CAP - CRM 470

Descripción:	ALFA-GALACTOSIDASA A, SUERO
Código:	ALFAGALAC
Técnica:	fluorometría
Unidades:	nmol/h/mL
Plazo:	19 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	2 mL suero, Congelar inmediatamente. Se requiere información clínica y fecha de nacimiento.
Valores de referencia:	(2.4 - 10.2)

Descripción: Alfa-manosidosis. Sec Gen: MAN2B1.
Código: GEN_000037
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Alfa-talasemia HBA. Del a3.7, a4.2, a20.5, aSEA, aFIL, aMED
Código: GEN_000038
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Alfa-talasemia. Sec Gen: HBA.
Código: GEN_000039
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Allan-Herndon-Dudley, Sd. Sec Gen: SLC16A2.
Código: GEN_000040
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Alport y nefropatía por membrana basal fina, Sd. Panel
Código: GEN_000041
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: ALPRAZOLAM
Código: ALPRAZOLAM
Técnica: LC-MS/MS
Unidades: µg/L
Plazo: 8 días

Descripción:	ALPRAZOLAM
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	(5 - 50) Niveles terapéuticos (Inf. 2) Límite de cuantificación: 2µg/l

---

Descripción:	Alteraciones de la región 19q13. Reord/Amplificación
Código:	MDFISH19Q
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Heparina Litio
Comentario adicional:	5-20 ml sangre periférica. min 2 ml médula ósea. Muestra alternativa: tejido fresco o fijado/parafinado
Valores de referencia:	

Descripción:	Alteraciones del gen EGFR (17p11). Reord/Amplificación.
Código:	MDFISHEGFR
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Heparina Litio
Comentario adicional:	5-20 ml sangre periférica. min 2 ml médula ósea. Muestra alternativa: tejido fresco o fijado/parafinado
Valores de referencia:	

Descripción:	Alteraciones del gen FGFR1 (8p11). Reord/Amplificación
Código:	MDFISHFGFR
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Heparina Litio
Comentario adicional:	5-20 ml sangre periférica. min 2 ml médula ósea. Muestra alternativa: tejido fresco o fijado/parafinado
Valores de referencia:	

Descripción:	Alteraciones del gen MET (7q31). Reord/Amplificación
Código:	MDFISHMET
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Heparina Litio
Comentario adicional:	5-20 ml sangre periférica. min 2 ml médula ósea. Muestra alternativa: tejido fresco o fijado/parafinado
Valores de referencia:	

Descripción:	Alteraciones numéricas del cromosoma 7
Código:	MDFISHCEN7

Descripción:	Alteraciones numéricas del cromosoma 7
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Heparina Litio
Comentario adicional:	5-20 ml sangre periférica. min 2 ml médula ósea. Muestra alternativa: tejido fresco o fijado/parafinado
Valores de referencia:	

Descripción:	Alteraciones numéricas del cromosoma 8 (Trisomía 8)
Código:	MDFISHCEN8
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Heparina Litio
Comentario adicional:	5-20 ml sangre periférica. min 2 ml médula ósea. Muestra alternativa: tejido fresco o fijado/parafinado
Valores de referencia:	

Descripción:	ALUMINIO
Código:	AL
Técnica:	Técnica ICP-MS
Unidades:	µg/L
Plazo:	6 días
Tubo:	especial aluminio
Comentario adicional:	Tubo especial de suero libre de elementos traza con instrucciones según protocolo (REF:368380).Pedir a almacén en caso de no disponer del tubo. De manera alternativa también se podrá procesar en plasma de heparina sódica libre de elementos traza (REF:456080) de o plasma EDTA libre de elementos traza (REF:368381).
Valores de referencia:	(Inf. 10) en población sin patología. (Inf. 20) en pacientes hemodializados. Valores de referencia adaptados de las guías K/DOQI (Inf. 60) .Valores superiores a 60 ug/L potencialmente tóxicos.

Descripción:	ALUMINIO EN ORINA FINAL DE JORNADA
Código:	AL2
Técnica:	ICP-MS
Unidades:	ug/g creatinina
Plazo:	6 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	10 mL orina (micción aislada). Al final del turno en exposición laboral.
Valores de referencia:	(Inf. 15) **personas no expuestas**. (Inf. 50) **personas expuestas a ALUMINIO**. Valor límite biológico **(BAT-DFG) al final de la semana laboral.** (Inf. 5) Límite de cuantificación

Descripción:	Alzheimer, enfermedad de. Panel
Código:	GEN_000044
Técnica:	
Unidades:	

Descripción:	Alzheimer, enfermedad de. Panel
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	AMANITINAS (AMATOXINAS) EN ORINA
Código:	AMANITINAS
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	ng/mL
Plazo:	5 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	10 mL de orina
Valores de referencia:	(Inf. 3)

Descripción:	Amaurosis congénita de Leber 13: gen RDH12 (NGS)
Código:	RDH12_MUTS
Técnica:	PCR y secuenciación
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	Amaurosis congénita de Leber: >10 genes (NGS)
Código:	LEBER_MUTS
Técnica:	NGS
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM. Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	AMIKACINA
Código:	AMIKA
Técnica:	FPIA
Unidades:	µg/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(20 - 25) Pico (5 - 10) Valle

Descripción:	AMILASA
Código:	AMI
Técnica:	Espectrofotometría
Unidades:	U/L a 37 ºC
Plazo:	2 días

Descripción:	AMILASA
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 mL suero También Líquidos biológicos
Valores de referencia:	(25 - 125) < 70 años (20 - 160) > 70 años

Descripción:	AMILASA ORINA
Código:	AMI2
Técnica:	Espectrofotometría
Unidades:	U/L
Plazo:	2 días
Tubo:	Orina Bioquímica
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(110 - 555)

Descripción:	AMILASA PANCREATICA
Código:	AMIPAN
Técnica:	Inhibición con anticuerpos - Enzimático colorimétrico
Unidades:	U/L
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 mL suero 0.5 ml plasma heparina litio alternativo
Valores de referencia:	(8 - 53)

Descripción:	AMILASA PANCREATICA EN LIQUIDO QUISTICO
Código:	AMILLIQQ
Técnica:	Cinética-inhibición: Inhibición por anticuerpos monoclonales (substrato etilideno G7 PNP)
Unidades:	U/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Líquido Bioquímica
Comentario adicional:	1 mL de líquido de quiste pancreático
Valores de referencia:	(Inf. 250)

Descripción:	AMILOIDE A (SAA-1) SUERO
Código:	AMILOIDEA
Técnica:	Nefelometría
Unidades:	mg/L
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Volumen 1.0 mL (mínimo 0.50 mL)
Valores de referencia:	(Inf. 6.4)

Descripción:	Amiloidosis. Panel NGS
Código:	AMILOID
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Amiloidosis. Panel NGS

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM.

Valores de referencia:

Código: AMINOLCR

Descripción: AMINOACIDOS EN LCR

Técnica: UHPLC

Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	ASPLCR	22655-5		PERFIL AA EN LCR: AC. ASPARTICO	mcmol/L	(Inf. 5) < 1 mes (Inf. 5) 1 mes - 2 años (Inf. 5) 2 años - 18 años (Inf. 5) > 18 años
Prueba	GLUTLCR	22652-2		PERFIL AA EN LCR: AC. GLUTAMICO	mcmol/L	(Inf. 15) < 1 mes (Inf. 15) 1 mes - 2 años (Inf. 15) 2 años - 18 años (Inf. 15) > 18 años
Prueba	ASPALCR	26603-1		PERFIL AA EN LCR: ASPARAGINA	mcmol/L	(4 - 21) < 1 mes (4 - 21) 1 mes - 2 años (4 - 21) 2 años - 18 años (4 - 21) > 18 años
Prueba	SERLCR	22644-9		PERFIL AA EN LCR: SERINA	mcmol/L	(20 - 66) < 1 mes (20 - 66) 1 mes - 2 años (20 - 66) 2 años - 18 años (20 - 66) > 18 años
Prueba	GLILCR	22650-6		PERFIL AA EN LCR: GLICINA	mcmol/L	(Inf. 21) < 1 mes (Inf. 21) 1 mes - 2 años (Inf. 21) 2 años - 18 años (Inf. 21) > 18 años
Prueba	TRELCR	22643-1		PERFIL AA EN LCR: TREONINA	mcmol/L	(3 - 80) < 1 mes (3 - 74) 1 mes - 2 años (3 - 74) 2 años - 18 años (3 - 72) > 18 años
Prueba	ARGLCR	22656-3		PERFIL AA EN LCR: ARGININA	mcmol/L	(4 - 31) < 1 mes (4 - 31) 1 mes - 2 años (4 - 31) 2 años - 18 años (4 - 45) > 18 años
Prueba	ALALCR	22657-1		PERFIL AA EN LCR: ALFA-ALANINA	mcmol/L	(24 - 61) < 1 mes (17 - 41) 1 mes - 2 años (16 - 40) 2 años - 18 años (16 - 40) > 18 años
Prueba	TAULCR	26614-8		PERFIL AA EN LCR: TAURINA	mcmol/L	(60 - 86) < 1 mes (60 - 86) 1 mes - 2 años (60 - 86) 2 años - 18 años (60 - 86) > 18 años
Prueba	TIRLCR	22642-3		PERFIL AA EN LCR: : TIROSINA	mcmol/L	(5 - 23) < 1 mes (5 - 23) 1 mes - 2 años (5 - 23) 2 años - 18 años (5 - 23) > 18 años
Prueba	METLCR	22648-0		PERFIL AA EN LCR: METIONINA	mcmol/L	(2 - 10) < 1 mes (2 - 7) 1 mes - 2 años (2 - 7) 2 años - 18 años (2 - 12) > 18 años
Prueba	VALLCR	22649-8		PERFIL AA EN LCR: VALINA	mcmol/L	(Inf. 30) < 1 mes (Inf. 30) 1 mes - 2 años (Inf. 30) 2 años - 18 años (Inf. 30) > 18 años

Componentes						
Prueba	TRIPLCR	26602-3		PERFIL AA EN LCR: TRIPTOFANO	mcmol/L	(12 - 23) < 1 mes (12 - 20) 1 mes - 2 años (12 - 20) 2 años - 18 años (12 - 26) > 18 años
Prueba	FENALALCR	22646-4		PERFIL AA EN LCR: FENILALANINA	mcmol/L	(6 - 29) < 1 mes (6 - 34) 1 mes - 2 años (6 - 34) 2 años - 18 años (6 - 36) > 18 años
Prueba	ISOLELCR	22659-7		PERFIL AA EN LCR: ISOLEUCINA	mcmol/L	(3 - 14) < 1 mes (3 - 14) 1 mes - 2 años (3 - 14) 2 años - 18 años (3 - 14) > 18 años
Prueba	LEULCR	9412-8		PERFIL AA EN LCR: LEUCINA	mcmol/L	(12 - 26) < 1 mes (12 - 23) 1 mes - 2 años (12 - 23) 2 años - 18 años (12 - 36) > 18 años
Prueba	ORNLCR	22647-2		PERFIL AA EN LCR: ORNITINA	mcmol/L	(2 - 13) < 1 mes (1.8 - 17) 1 mes - 2 años (1.8 - 17) 2 años - 18 años (2 - 23) > 18 años
Prueba	LISLCR	22651-4		PERFIL AA EN LCR: LISINA	mcmol/L	(10 - 35) < 1 mes (10 - 43) 1 mes - 2 años (10 - 43) 2 años - 18 años (10 - 43) > 18 años
Prueba	AAABLCR	26586-8		PERFIL AA LCR: ACIDO ALFA -AMINOBUTÍRICO	mcmol/L	(Inf. 11) < 1 mes (Inf. 7) 1 mes - 2 años (Inf. 7) 2 años - 18 años (Inf. 7) > 18 años
Prueba	ABABLCR	26590-0		PERFIL AA LCR: AC. BETA AMINOISOBUTÍRICO	mcmol/L	(Inf. 1) < 1 mes (Inf. 1) 1 mes - 2 años (Inf. 1) 2 años - 18 años (Inf. 1) > 18 años
Prueba	AGABLCR	26594-2		PERFIL AA LCR: ACIDO GAMMA AMINOBUTÍRICO	mcmol/L	(Inf. 2) < 1 mes (Inf. 2) 1 mes - 2 años (Inf. 2) 2 años - 18 años (Inf. 2) > 18 años
Prueba	ALLOILCR	22658-9		PERFIL AA LCR: ALLO-ISOLEUCINA	mcmol/L	(Inf. 1) < 1 mes (Inf. 1) 1 mes - 2 años (Inf. 1) 2 años - 18 años (Inf. 1) > 18 años
Prueba	ANSLCR	26588-4		PERFIL AA LCR: ANSERINA	mcmol/L	(Inf. 1) < 1 mes (Inf. 1) 1 mes - 2 años (Inf. 1) 2 años - 18 años (Inf. 1) > 18 años
Prueba	APPLCR	54327-2		PERFIL AA LCR: ACIDO PIPECÓLICO	mcmol/L	(Inf. 12) < 1 mes (Inf. 14) 1 mes - 2 años (Inf. 14) 2 años - 18 años (Inf. 24) > 18 años
Prueba	BALLCR	26589-2		PERFIL AA LCR: BETA-ALANINA	mcmol/L	(Inf. 2) < 1 mes (Inf. 2) 1 mes - 2 años (Inf. 2) 2 años - 18 años (Inf. 2) > 18 años
Prueba	CARLCR	26591-8		PERFIL AA LCR: CARNOSINA	mcmol/L	(Inf. 1) < 1 mes (Inf. 1) 1 mes - 1 año (Inf. 1) 2 años - 18 años (Inf. 1) > 18 años
Prueba	CISLCR	22653-0		PERFIL AA LCR: CISTINA	mcmol/L	(Inf. 5) < 1 mes (Inf. 5) 1 mes - 2 años (Inf. 5) 2 años - 18 años (Inf. 5) > 18 años

Componentes						
Prueba	CISTALCR	26592-6		PERFIL AA LCR: CISTATIONINA	mcmol/L	(Inf. 3) < 1 mes (Inf. 3) 1 mes - 2 años (Inf. 3) 2 años - 18 años (Inf. 3) > 18 años
Prueba	CITLCR	22654-8		PERFIL AA LCR: CITRULINA	mcmol/L	(Inf. 6) < 1 mes (Inf. 6) 1 mes - 2 años (Inf. 6) 2 años - 18 años (Inf. 6) > 18 años
Prueba	ETALCR	26593-4		PERFIL AA LCR: ETANOLAMINA	mcmol/L	(16 - 35) < 1 mes (7 - 84) 1 mes - 2 años (7 - 84) 2 años - 18 años (4 - 17) > 18 años
Prueba	FETALCR	26597-5		PERFIL AA LCR: FOSFOETANOLAMINA	mcmol/L	(Inf. 6) < 1 mes (Inf. 6) 1 mes - 2 años (Inf. 6) 2 años - 18 años (Inf. 6) > 18 años
Prueba	FOSLCR	26737-7		PERFIL AA LCR: FOSFOSERINA	mcmol/L	(Inf. 1) < 1 mes (Inf. 1) 1 mes - 2 años (Inf. 1) 2 años - 18 años (Inf. 1) > 18 años
Prueba	GTMLCR	22641-5		PERFIL AA LCR: GLUTAMINA	mcmol/L	(541 - 988) < 1 mes (281 - 1132) 1 mes - 2 años (370 - 886) 2 años - 18 años (370 - 886) > 18 años
Prueba	HIDLCR	26596-7		PERFIL AA LCR: HIDROXIPROLINA	mcmol/L	(Inf. 4) < 1 mes (Inf. 4) 1 mes - 2 años (Inf. 4) 2 años - 18 años (Inf. 4) > 18 años
Prueba	HILISLCR	26595-9		PERFIL AA LCR: HIDROXILISINA	mcmol/L	(Inf. 1) < 1 mes (Inf. 1) 1 mes - 2 años (Inf. 1) 1 año - 18 años (Inf. 1) > 18 años
Prueba	HISLCR	9453-2		PERFIL AA LCR: HISTIDINA	mcmol/L	(7 - 24) < 1 mes (3 - 37) 1 mes - 2 años (3 - 37) 2 años - 18 años (4 - 24) > 18 años
Prueba	HOMOLCR	22660-5		PERFIL AA LCR: HOMOCISTEÍNA	mcmol/L	(Inf. 1) < 1 mes (Inf. 1) 1 mes - 2 años (Inf. 1) 2 años - 18 años (Inf. 1) > 18 años
Prueba	HOMLCR	55875-9		PERFIL AA LCR: HOMOCITRULINA	mcmol/L	(Inf. 1) < 1 mes (Inf. 1) 1 mes - 2 años (Inf. 1) 2 años - 18 años (Inf. 1) > 18 años
Prueba	LCRACT	22651-4		PERFIL AA LCR: ACETILTIROSINA	mcmol/L	(Inf. 1) < 1 mes (Inf. 1) 1 mes - 2 años (Inf. 1) 2 años - 18 años (Inf. 1) > 18 años
Prueba	LCRADEH			PERFIL AA LCR: ADENOSILHOMOCISTEINA	mcmol/L	(Inf. 1) < 1 mes (Inf. 1) 1 mes - 2 años (Inf. 1) 2 años - 18 años (Inf. 1) > 18 años
Prueba	MTH_1LCR	26584-3		PERFIL AA LCR: 1-METIL HISTIDINA	mcmol/L	(Inf. 3) < 1 mes (Inf. 3) 1 mes - 2 años (Inf. 3) 2 años - 18 años (Inf. 3) > 18 años
Prueba	MTH_3LCR	26585-0		PERFIL AA LCR: 3-METIL HISTIDINA	mcmol/L	(Inf. 3) < 1 mes (Inf. 3) 1 mes - 2 años (Inf. 3) 2 años - 18 años (Inf. 3) > 18 años

Componentes						
Prueba	PROLCR	22645-6		PERFIL AA LCR: PROLINA	mcmol/L	(Inf. 1) < 1 mes (Inf. 1) 1 mes - 2 años (Inf. 1) 2 años - 18 años (Inf. 1) > 18 años
Prueba	SACLCR	81781-7		PERFIL AA LCR: SACAROPINA	mcmol/L	(Inf. 1) < 1 mes (Inf. 1) 1 mes - 2 años (Inf. 1) 2 años - 18 años (Inf. 1) > 18 años
Prueba	SARCOSI			PERFIL AA LCR : SARCOSINA	mcmol/L	(Inf. 2) < 1 mes (Inf. 2) 1 mes - 2 años (Inf. 2) 2 años - 18 años (Inf. 2) > 18 años
Prueba	SULLCR	54336-3		PERFIL AA LCR: SULFOCISTEÍNA	mcmol/L	(Inf. 2) < 1 mes (Inf. 2) 1 mes - 2 años (Inf. 2) 2 años - 18 años (Inf. 2) > 18 años
Prueba	AASLCR	40838-5		PERFIL AA LCR: ACIDO ARGININSUCCÍNICO	mcmol/L	(Inf. 1) < 1 mes (Inf. 1) 1 mes - 2 años (Inf. 1) 2 años - 18 años (Inf. 1) > 18 años
Prueba	AADLCR	26587-6		PERFIL AA LCR: ACIDO ALFA-AMINOADIPICO	mcmol/L	(Inf. 3) < 1 mes (Inf. 3) 1 mes - 2 años (Inf. 3) 2 años - 18 años (Inf. 3) > 18 años

Código: AMINOLCM2

Descripción: AMINOACIDOS ORINA (COMPLETO)

Técnica: Ultra cromatografía líquida de alta presión con espectrometría de masas en tandem (UHPLC-MS/MS)

Comentario adicional: 10 - 20 mL de orina. CONGELAR

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	HIDQUINU2			PERFIL AÁ ORINA: HIDROXIQUINURENINA	mmol/mol crea	(Inf. 5) < 1 mes (Inf. 3) 1 mes - 1 año (Inf. 1.5) 1 año - 3 años (Inf. 1) 3 años - 13 años (Inf. 1) > 13 años
Prueba	ACETILTIR2	25119-9		PERFIL AÁ ORINA: ACETILTIROSINA	mmol/mol crea	(Inf. 11) < 1 mes (Inf. 4) 1 mes - 1 año (Inf. 4) 1 año - 3 años (Inf. 4) 3 años - 13 años (Inf. 4) > 13 años
Prueba	ADESILHOM2	80176-1		PERFIL AÁ ORINA: ADENOSILHOMOCISTEINA	mmol/mol crea	(Inf. 1.5) < 1 mes (Inf. 1) 1 mes - 1 año (Inf. 1) 1 año - 3 años (Inf. 1) 3 años - 13 años (Inf. 1) > 13 años
Prueba	ACA2	22691-0		PERFIL AÁ ORINA: AC. ASPARTICO ORINA	mmol/mol crea	(Inf. 23) < 1 mes (Inf. 15) 1 mes - 1 año (Inf. 7) 1 año - 3 años (Inf. 4) 3 años - 13 años (Inf. 2) > 13 años

Componentes						
Prueba	ACG2	22711-6		PERFIL AÁ ORINA: AC. GLUTAMICO ORINA	mmol/mol crea	(Inf. 78) < 1 mes (Inf. 40) 1 mes - 1 año (Inf. 22) 1 año - 3 años (Inf. 16) 3 años - 13 años (Inf. 12) > 13 años
Prueba	ASP2	26577-7		PERFIL AÁ ORINA: ASPARAGINA ORINA	mmol/mol crea	(2 - 140) < 1 mes (8 - 68) 1 mes - 1 año (1 - 60) 1 año - 3 años (2 - 32) 3 años - 13 años (0.7 - 22) > 13 años
Prueba	SER2	22684-5		PERFIL AÁ ORINA:SERINA EN ORINA	mmol/mol crea	(17 - 425) < 1 mes (24 - 259) 1 mes - 1 año (15 - 171) 1 año - 3 años (2.3 - 116) 3 años - 13 años (0.5 - 83) > 13 años
Prueba	GLI2	22709-0		PERFIL AÁ ORINA: GLICINA ORINA	mmol/mol crea	(104 - 1845) < 1 mes (124 - 826) 1 mes - 1 año (120 - 784) 1 año - 3 años (58 - 588) 3 años - 13 años (28 - 360) > 13 años
Prueba	TRE2	22688-6		PERFIL AÁ ORINA: TREONINA ORINA	mmol/mol crea	(6 - 282) < 1 mes (5 - 96) 1 mes - 1 año (5 - 74) 1 año - 3 años (5 - 53) 3 años - 13 años (0.7 - 42) > 13 años
Prueba	ARG2	22697-7		PERFIL AÁ ORINA: ARGININA ORINA	mmol/mol crea	(Inf. 95) < 1 mes (Inf. 41) 1 mes - 1 año (Inf. 15) 1 año - 3 años (Inf. 13) 3 años - 13 años (Inf. 10) > 13 años
Prueba	ALA2	22698-5		PERFIL AÁ ORINA: ALANINA ORINA	mmol/mol crea	(41 - 276) < 1 mes (51 - 223) 1 mes - 1 año (38 - 188) 1 año - 3 años (14 - 106) 3 años - 13 años (9 - 47) > 13 años
Prueba	TIR2	22685-2		PERFIL AÁ ORINA: TIROSINA ORINA	mmol/mol crea	(Inf. 84) < 1 mes (Inf. 94) 1 mes - 1 año (Inf. 56) 1 año - 3 años (Inf. 34) 3 años - 13 años (Inf. 20) > 13 años
Prueba	MET2	22681-1		PERFIL AÁ ORINA: METIONINA ORINA	mmol/mol crea	(Inf. 12) < 1 mes (Inf. 12) 1 mes - 1 año (Inf. 5) 1 año - 3 años (Inf. 3.5) 3 años - 13 años (Inf. 2.5) > 13 años
Prueba	AAOXOP2	29522-0		PERFIL AÁ ORINA: OXOPROLINA	mmol/mol crea	(Inf. 85) < 1 mes (Inf. 76) 1 mes - 1 año (Inf. 76) 1 año - 3 años (Inf. 54) 3 años - 13 años (Inf. 41) > 13 años

Componentes						
Prueba	AAFENIL2	29522-0		PERFIL AÁ ORINA: FENILACETILGLUTAMINA	mmol/mol crea	(Inf. 842) < 1 mes (Inf. 640) 1 mes - 1 año (Inf. 816) 1 año - 3 años (Inf. 1044) 3 años - 13 años (Inf. 1084) > 13 años
Prueba	AAQUIN2	53507-0		PERFIL AÁ ORINA: QUINURENINA	mmol/mol crea	(Inf. 15) < 1 mes (Inf. 10) 1 mes - 1 año (Inf. 3) 1 año - 3 años (Inf. 2) 3 años - 13 años (Inf. 1.5) > 13 años
Prueba	VAL2	22692-8		PERFIL AÁ ORINA: VALINA ORINA	mmol/mol crea	(1 - 60) < 1 mes (1 - 52) 1 mes - 1 año (1 - 23) 1 año - 3 años (1 - 17) 3 años - 13 años (Inf. 9) > 13 años
Prueba	TRI2	25139-7		PERFIL AÁ ORINA:TRIPTOFANO ORINA	mmol/mol crea	(0.9 - 42) < 1 mes (3 - 42) 1 mes - 1 año (1 - 42) 1 año - 3 años (2 - 22) 3 años - 13 años (0.8 - 17) > 13 años
Prueba	FEN2	18475-4		PERFIL AÁ ORINA: FENILALANINA	mmol/mol crea	(4.6 - 32) < 1 mes (5 - 26) 1 mes - 1 año (6 - 28) 1 año - 3 años (3.4 - 23) 3 años - 13 años (1.6 - 11) > 13 años
Prueba	ISO2	22706-6		PERFIL AÁ ORINA: ISOLEUCINA	mmol/mol crea	(1.9 - 17) < 1 mes (1.7 - 13) 1 mes - 1 año (0.9 - 7) 1 año - 3 años (0.7 - 4) 3 años - 13 años (0.2 - 3.4) > 13 años
Prueba	LEU2	22693-6		PERFIL AÁ ORINA: LEUCINA ORINA	mmol/mol crea	(3.6 - 42) < 1 mes (2 - 34) 1 mes - 1 año (2 - 17) 1 año - 3 años (1 - 11) 3 años - 13 años (0.5 - 7) > 13 años
Prueba	ORN2	22682-9		PERFIL AÁ ORINA: ORNITINA ORINA	mmol/mol crea	(Inf. 31) < 1 mes (Inf. 20) 1 mes - 1 año (Inf. 10) 1 año - 3 años (Inf. 7) 3 años - 13 años (Inf. 5) > 13 años
Prueba	LIS2	22679-5		PERFIL AÁ ORINA: LISINA EN ORINA	mmol/mol crea	(12 - 256) < 1 mes (5 - 146) 1 mes - 1 año (7 - 89) 1 año - 3 años (4 - 58) 3 años - 13 años (2 - 39) > 13 años
Prueba	FOS2	25128-0		PERFIL AÁ ORINA: FOSFOSERINA	mmol/mol crea	(Inf. 12) < 1 mes (Inf. 7) 1 mes - 1 año (Inf. 6) 1 año - 3 años (Inf. 8.5) 3 años - 13 años (Inf. 5.5) > 13 años

Componentes						
Prueba	HID2	25110-8		PERFIL AÁ ORINA: HIDROXIPROLINA	mmol/mol crea	(Inf. 178) < 1 mes (Inf. 91) 1 mes - 1 año (Inf. 5) 1 año - 3 años (Inf. 3.4) 3 años - 13 años (Inf. 3.4) > 13 años
Prueba	FETA2	25122-3		PERFIL AÁ ORINA: FOSFOETANOLAMINA	mmol/mol crea	(Inf. 40) < 1 mes (Inf. 56) 1 mes - 1 año (Inf. 56) 1 año - 3 años (Inf. 31) 3 años - 13 años (Inf. 15) > 13 años
Prueba	HIS2	22703-3		PERFIL AÁ ORINA: HISTIDINA	mmol/mol crea	(67 - 433) < 1 mes (34 - 433) 1 mes - 1 año (64 - 457) 1 año - 3 años (42 - 285) 3 años - 13 años (11 - 180) > 13 años
Prueba	SUL2	33876-4		PERFIL AÁ ORINA: SULFOCISTEÍNA	mmol/mol crea	(Inf. 12.5) < 1 mes (Inf. 8) 1 mes - 1 año (Inf. 3.3) 1 año - 3 años (Inf. 3.6) 3 años - 13 años (Inf. 2.4) > 13 años
Prueba	MTH_32	26575-1		PERFIL AÁ ORINA: 3-METILHISTIDINA	mmol/mol crea	(Inf. 144) < 1 mes (Inf. 119) 1 mes - 1 año (Inf. 161) 1 año - 3 años (Inf. 130) 3 años - 13 años (Inf. 141) > 13 años
Prueba	TAU2	25138-9		PERFIL AÁ ORINA: TAURINA	mmol/mol crea	(8 - 900) < 1 mes (8 - 515) 1 mes - 1 año (8 - 383) 1 año - 3 años (8 - 397) 3 años - 13 años (7 - 288) > 13 años
Prueba	MTH_12	26574-4		PERFIL AÁ ORINA: 1-METILHISTIDINA	mmol/mol crea	(Inf. 76) < 1 mes (Inf. 50) 1 mes - 1 año (Inf. 61) 1 año - 3 años (Inf. 69) 3 años - 13 años (Inf. 41) > 13 años
Prueba	GTM2	22710-8		PERFIL AÁ ORINA: GLUTAMINA	mmol/mol crea	(18 - 383) < 1 mes (23 - 497) 1 mes - 1 año (34 - 242) 1 año - 3 años (13 - 187) 3 años - 13 años (4 - 93) > 13 años
Prueba	CAR2	26580-1		PERFIL AÁ ORINA: CARNOSINA	mmol/mol crea	(Inf. 115) < 1 mes (Inf. 120) 1 mes - 1 año (Inf. 76) 1 año - 3 años (Inf. 31) 3 años - 13 años (Inf. 7) > 13 años
Prueba	ANS2	26576-9		PERFIL AÁ ORINA: ANSERINA	mmol/mol crea	(Inf. 23) < 1 mes (Inf. 17) 1 mes - 1 año (Inf. 47) 1 año - 3 años (Inf. 15) 3 años - 13 años (Inf. 8) > 13 años

Componentes						
Prueba	ETA2	25098-5		PERFIL AÁ ORINA: ETANOLAMINA	mmol/mol crea	(Inf. 372) < 1 mes (Inf. 259) 1 mes - 1 año (Inf. 206) 1 año - 3 años (Inf. 121) 3 años - 13 años (Inf. 68) > 13 años
Prueba	AAS2	29878-6		PERFIL AÁ ORINA: ACIDO ARGININSUCCINICO	mmol/mol crea	(Inf. 8) < 1 mes (Inf. 8) 1 mes - 1 año (Inf. 7) 1 año - 3 años (Inf. 5) 3 años - 13 años (Inf. 3) > 13 años
Prueba	SAR2	25133-0		PERFIL AÁ ORINA: SARCOSINA	mmol/mol crea	(Inf. 31) < 1 mes (Inf. 31) 1 mes - 1 año (Inf. 4) 1 año - 3 años (Inf. 4.4) 3 años - 13 años (Inf. 3.1) > 13 años
Prueba	CIT2	22694-4		PERFIL AÁ ORINA: CITRULINA	mmol/mol crea	(Inf. 15) < 1 mes (Inf. 10) 1 mes - 1 año (Inf. 5) 1 año - 3 años (Inf. 3) 3 años - 13 años (Inf. 3) > 13 años
Prueba	BAL2	26578-5		PERFIL AÁ ORINA: BETA-ALANINA	mmol/mol crea	(Inf. 109) < 1 mes (Inf. 170) 1 mes - 1 año (Inf. 20) 1 año - 3 años (Inf. 20) 3 años - 13 años (Inf. 11) > 13 años
Prueba	HOM2	79592-2		PERFIL AÁ ORINA: HOMOCITRULINA	mmol/mol crea	(Inf. 17) < 1 mes (Inf. 17) 1 mes - 1 año (Inf. 14) 1 año - 3 años (Inf. 10) 3 años - 13 años (Inf. 4) > 13 años
Prueba	AGAB2	26581-9		PERFIL AÁ ORINA: ACIDO GAMMA AMINO BUTIRICO	mmol/mol crea	(Inf. 15) < 1 mes (Inf. 26) 1 mes - 1 año (Inf. 14) 1 año - 3 años (Inf. 8) 3 años - 13 años (Inf. 2.4) > 13 años
Prueba	AAD2	26601-5		PERFIL AÁ ORINA: AMINOADIPICO	mmol/mol crea	(Inf. 72) < 1 mes (Inf. 27) 1 mes - 1 año (Inf. 19) 1 año - 3 años (Inf. 21) 3 años - 13 años (Inf. 9) > 13 años
Prueba	PRO2	22690-2		PERFIL AÁ ORINA: PROLINA	mmol/mol crea	(2 - 200) < 1 mes (2 - 200) 1 mes - 1 año (Inf. 17) 1 año - 3 años (Inf. 9) 3 años - 13 años (Inf. 4) > 13 años
Prueba	ABAB2	25086-0		PERFIL AÁ ORINA: ACIDO BETA AMINOISOBTIRICO	mmol/mol crea	(Inf. 574) < 1 mes (Inf. 574) 1 mes - 1 año (Inf. 286) 1 año - 3 años (Inf. 64) 3 años - 13 años (Inf. 33) > 13 años

Componentes						
Prueba	HILIS_12	25109-0		PERFIL AÁ ORINA: HIDROXILISINA	mmol/mol crea	(Inf. 36) < 1 mes (Inf. 18) 1 mes - 1 año (Inf. 11) 1 año - 3 años (Inf. 6) 3 años - 13 años (Inf. 3) > 13 años
Prueba	CISTA2	25092-8		PERFIL AÁ ORINA: CISTATIONINA	mmol/mol crea	(Inf. 62) < 1 mes (Inf. 23) 1 mes - 1 año (Inf. 8) 1 año - 3 años (Inf. 7) 3 años - 13 años (Inf. 7) > 13 años
Prueba	AAAB2	26919-1		PERFIL AÁ ORINA: ACIDO ALFA AMINO BUTIRICO	mmol/mol crea	(Inf. 32) < 1 mes (Inf. 16) 1 mes - 1 año (Inf. 18) 1 año - 3 años (Inf. 7) 3 años - 13 años (Inf. 4) > 13 años
Prueba	CIS2	22687-8		PERFIL AÁ ORINA: CISTINA	mmol/mol crea	(Inf. 95) < 1 mes (Inf. 42) 1 mes - 1 año (Inf. 20) 1 año - 3 años (Inf. 11) 3 años - 13 años (Inf. 16) > 13 años
Prueba	APP2	47727-3		PERFIL AÁ ORINA: ACIDO PIPECOLICO	mmol/mol crea	(Inf. 15) < 1 mes (Inf. 5) 1 mes - 1 año (Inf. 2.5) 1 año - 3 años (Inf. 1) 3 años - 13 años (Inf. 1) > 13 años
Prueba	SAC2	79640-9		PERFIL AÁ ORINA: SACAROPINA	mmol/mol crea	(Inf. 7) < 1 mes (Inf. 5) 1 mes - 1 año (Inf. 3.5) 1 año - 3 años (Inf. 1.5) 3 años - 13 años (Inf. 1) > 13 años
Prueba	ALLOI2	22706-6		PERFIL AÁ ORINA: ALLO-ISOLEUCINA	mmol/mol crea	(Inf. 3) < 1 mes (Inf. 3) 1 mes - 1 año (Inf. 3) 1 año - 3 años (Inf. 3) 3 años - 13 años (Inf. 3) > 13 años
Prueba	HOMO2	26582-7		PERFIL AÁ ORINA: HOMOCISTEINA	mmol/mol crea	(Inf. 4) < 1 mes (Inf. 1.5) 1 mes - 1 año (Inf. 1.5) 1 año - 3 años (Inf. 1) 3 años - 13 años (Inf. 1) > 13 años
Prueba	CAMINO2	32296-6		COMENTARIO AMINOACIDOS ORINA		

Código:	AMINO30
Descripción:	AMINOACIDOS Plasma AAS (LC-MS/MS)
Técnica:	Cromatografía líquida/Tándem masas (LC-MS/MS)
Comentario adicional:	1 mL suero. CONGELAR INMEDIATAMENTE Y ENVIAR CONGELADO. INDISPENSABLE edad e historia clínica. Muestra alternativa: Plasma de heparina separado y congelado

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	BIO.TAURIN	20657-3		Perfil 30 AÁ: TAURINA	µmol/L	(25 - 300) < 1 mes (25 - 220) 1 mes - 12 meses (15 - 175) 12 meses - 10 años (15 - 175) > 10 años
Prueba	BIO.HLISIN	2442-2		Pérfil 30 AÁ: HIDROXILISINA	µmol/L	(0 - 5) < 1 mes (0 - 5) 1 mes - 12 meses (0 - 5) 12 meses - 10 años (0 - 5) > 10 años
Prueba	BIO.ORNIT	20652-4		Perfil 30 AÁ: ORNITINA	µmol/L	(30 - 200) < 1 mes (20 - 160) 1 mes - 12 meses (20 - 160) 12 meses - 10 años (20 - 160) > 10 años
Prueba	BIO.HISTID	20645-8		Perfil 30 AÁ: HISTIDINA	µmol/L	(40 - 170) < 1 mes (40 - 230) 1 mes - 12 meses (40 - 150) 12 meses - 10 años (40 - 200) > 10 años
Prueba	BIO.1METIL	20633-4		Perfil 30 AÁ: METILHISTIDINA	µmol/L	(0 - 33) < 1 mes (0 - 33) 1 mes - 12 meses (0 - 33) 12 meses - 10 años (0 - 33) > 10 años
Prueba	BIO.LISINA	20650-8		Perfil 30 AÁ: LISINA	µmol/L	(60 - 300) < 1 mes (60 - 280) 1 mes - 12 meses (80 - 270) 12 meses - 10 años (100 - 280) > 10 años
Prueba	BIO.ARGIN	20637-5		Perfil 30 AÁ: ARGININA	µmol/L	(25 - 90) < 1 mes (20 - 180) 1 mes - 12 meses (20 - 160) 1 año - 12 años (20 - 160) > 12 años
Prueba	BIO.ANSERI	1866-3		Perfil 30 AÁ: ANSERINA	µmol/L	(0 - 2) < 1 mes (0 - 2) 1 mes - 12 meses (0 - 2) 12 meses - 10 años (0 - 6) > 10 años
Prueba	BIO.CISTIN	22672-0		Perfil 30 AÁ: CISTINA	µmol/L	(3 - 100) < 1 mes (3 - 84) 1 mes - 12 meses (3 - 125) 12 meses - 10 años (3 - 100) > 10 años
Prueba	BIO.CISTAT	26607-2		Perfil 30 ÁA: CISTATIONINA	µmol/L	(0 - 33) < 1 mes (0 - 33) 1 mes - 12 meses (0 - 50) 12 meses - 10 años (0 - 50) > 10 años
Prueba	BIO.ASPARG	20638-3		Perfil 30 AÁ: ASPARAGINA	µmol/L	(20 - 130) < 1 mes (20 - 130) 1 mes - 12 meses (20 - 130) 1 año - 10 años (20 - 130) > 10 años
Prueba	BIO.GLUTAM	20643-3		Perfil 30 AÁ: GLUTAMINA	µmol/L	(285 - 950) < 1 mes (410 - 900) 1 mes - 12 meses (410 - 900) 12 meses - 10 años (410 - 900) > 10 años
Prueba	BIO.SERINA	20656-5		Perfil 30 AÁ: SERINA	µmol/L	(90 - 300) < 1 mes (90 - 300) 1 mes - 12 meses (60 - 200) 12 meses - 10 años (60 - 225) > 10 años
Prueba	BIO.GLICIN	20644-1		Perfil 30 AÁ: GLICINA	µmol/L	(150 - 500) < 1 mes (120 - 450) 1 mes - 12 meses (120 - 450) 12 meses - 10 años (120 - 400) > 10 años
Prueba	BIO.CITRUL	20640-9		Perfil 30 AÁ: CITRULINA	µmol/L	(5 - 50) < 1 mes (5 - 50) 1 mes - 12 meses (10 - 60) 1 año - 10 años (10 - 60) > 10 años

Componentes						
Prueba	BIO.SARCOS	26613-0		Perfil 30 AÁ: SARCOSINA	µmol/L	(0 - 12) < 1 mes (0 - 12) 1 mes - 12 meses (0 - 12) 12 meses - 10 años (0 - 12) > 10 años
Prueba	BIO.HIDROX	20647-4		Perfil 30 AÁ: HIDROXIPROLINA	µmol/L	(0 - 200) < 1 mes (0 - 200) 1 mes - 12 meses (0 - 200) 12 meses - 10 años (0 - 200) > 10 años
Prueba	BIO.TREONI	20658-1		Perfil 30 AÁ: TREONINA	µmol/L	(50 - 400) < 1 mes (50 - 300) 1 mes - 12 meses (60 - 200) 12 meses - 10 años (60 - 245) > 10 años
Prueba	BIO.BETAAL	26604-9		Perfil 30 ÁA: BETA-ALANINA	µmol/L	(0 - 20) < 1 mes (0 - 20) 1 mes - 12 meses (0 - 20) 12 meses - 10 años (0 - 20) > 10 años
Prueba	BIO.ALANIN	20636-7		Perfil 30 AÁ: ALANINA	µmol/L	(130 - 560) < 1 mes (150 - 570) 1 mes - 12 meses (150 - 570) 1 año - 10 años (150 - 600) > 10 años
Prueba	BIO.SULFON			perfil 30 AÁ: MET.SULFONA	µmol/L	(0 - 2) < 1 mes (0 - 2) 1 mes - 12 meses (0 - 2) 12 meses - 10 años (0 - 2) > 10 años
Prueba	BIO.ACGLUT	20642-5		Perfil 30 AÁ: ACIDO GLUTAMICO	µmol/L	(50 - 300) < 1 mes (25 - 270) 1 mes - 12 meses (10 - 190) 12 meses - 10 años (10 - 190) > 10 años
Prueba	BIO.PROLIN	20655-7		Perfil 30 AÁ: PROLINA	µmol/L	(100 - 400) < 1 mes (80 - 400) 1 mes - 12 meses (80 - 400) 12 meses - 10 años (50 - 350) > 10 años
Prueba	BIO.HOMOCI	25352-4		Pérfil AÁ: HOMOCISTINA	µmol/L	(0 - 2) < 1 mes (0 - 2) 1 mes - 12 meses (0 - 2) 12 meses - 10 años (0 - 2) > 10 años
Prueba	BIO.AAMNBU	20634-2		Perfil 30 ÁA: ACIDO AMINOBUTIRICO	µmol/L	(0 - 40) < 1 mes (0 - 40) 1 mes - 12 meses (0 - 40) 12 meses - 10 años (0 - 40) > 10 años
Prueba	BIO.AADIPI	26600-7		Pérfil 30 AÁ: AMINOADÍPICO	µmol/L	(0 - 5) < 1 mes (0 - 5) 1 mes - 12 meses (0 - 5) 12 meses - 10 años (0 - 5) > 10 años
Prueba	BIO.VALINA	20661-5		Perfil 30 AÁ: VALINA	µmol/L	(80 - 300) < 1 mes (80 - 300) 1 mes - 12 meses (100 - 300) 12 meses - 10 años (70 - 320) > 10 años
Prueba	BIO.METION	20651-6		Perfil 30 AÁ: METIONINA	µmol/L	(10 - 60) < 1 mes (10 - 60) 1 mes - 12 meses (14 - 50) 12 meses - 10 años (10 - 60) > 10 años
Prueba	BIO.TIROSI	20660-7		Perfil 30 AÁ: TIROSINA	µmol/L	(50 - 731) < 1 mes (30 - 160) 1 mes - 12 meses (30 - 130) 12 meses - 10 años (30 - 100) > 10 años
Prueba	BIO.ISOLEU	20648-2		Perfil 30 AÁ: ISOLEUCINA	µmol/L	(20 - 130) < 1 mes (20 - 130) 1 mes - 12 meses (30 - 130) 12 meses - 10 años (30 - 130) > 10 años

Componentes						
Prueba	BIO.LEUCIN	20649-0		Perfil 30 AÁ: LEUCINA	µmol/L	(50 - 200) < 1 mes (50 - 200) 1 mes - 12 meses (60 - 230) 12 meses - 10 años (60 - 230) > 10 años
Prueba	BIO.FENILA	14875-9		Perfil 30 AÁ: FENILALANINA	µmol/L	(30 - 120) < 1 mes (30 - 120) 1 mes - 12 meses (30 - 125) 12 meses - 10 años (30 - 110) > 10 años
Prueba	BIO.TRIPTO	20659-9		Perfil 30 AÁ: TRIPTOFANO	µmol/L	(15 - 100) < 1 mes (15 - 100) 1 mes - 12 meses (20 - 115) 12 meses - 10 años (20 - 130) > 10 años
Prueba	BIO.ASPART	20639-1		Perfil 30 AÁ: ACIDO ASPARTICO	µmol/L	(0 - 50) < 1 mes (0 - 40) 1 mes - 12 meses (0 - 35) 12 meses - 10 años (0 - 35) > 10 años
Prueba	BIO.COMENT	13500-4		Comentario		

Descripción: Amiodarona en suero
Código: AMIODARONA
Técnica: Cromatografía líquida de alta eficacia
Unidades: mg/L
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero. refrigerar.
No utilizar tubos con gel separador.
La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis.

Alternativa: Plasma de EDTA.
Valores de referencia: (0.5 - 2.0)
(Sup. 2.5) Toxicidad
(Inf. 0.2) Límite de cuantificación

Descripción: Amiotrofia escapuloperoneal: Kaeser, Sd. Sec Gen: DES.
Código: GEN_000045
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Código: QAMN
Descripción: AMITRIPTILINA / NORTRIPTILINA, SUERO
Técnica: LC-MS/MS
Comentario adicional: Suero refrigerado.
La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	AMITR	3333-2		AMITRIPTILINA EN SUERO	µg/l	<11µg/l Límite de cuantificación

Componentes						
Prueba	NORTR	3872.9		NORTRIPTILINA EN SUERO	µg/l	<12 µg/l Límite de cuantificación
Prueba	AMINORSUMA			AMITRIPTILINA + NORTEPITILINA		(175 - 300) Intervalo terapéutico (Imipramina+desimipramina)

Descripción:	AMONIACO (AMONIO) EN LCR
Código:	AMONLCR
Técnica:	Espectrofotometría ultravioleta
Unidades:	µg/dL
Plazo:	9 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 50)

Descripción:	AMONIO (AMONIACO) EN PLASMA
Código:	AMONIACO
Técnica:	Colorimetría
Unidades:	mcmol/L
Plazo:	3 días
Tubo:	Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional:	1 mL de plasma EDTA congelado (Alternativa: Plasma Heparina de litio separado y congelado)
Valores de referencia:	(9 - 30)

Descripción:	AMPA 1/ AMPA 2 RECEPTORES ANTICUERPOS EN SUERO
Código:	AMPA1_2
Técnica:	Técnica Cell Binding Assay IFI
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero refrigerado
Valores de referencia:	

Descripción:	AMP-CICLICO NEFROGENICO ORINA/PLASMA
Código:	AMPNEFRO
Técnica:	Radioisotópica
Unidades:	nmol/dL F.G.
Plazo:	32 días
Tubo:	Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional:	PLASMA EDTA CONGELADO Y ORINA 24H CONGELADA
Valores de referencia:	(0.3 - 3.8) filtrado glomerular

Descripción:	AMP-CICLICO ORINA 24 HORAS
Código:	AMPCI2
Técnica:	RIA
Unidades:	µmol/24h

Descripción:	AMP-CICLICO ORINA 24 HORAS
Plazo:	13 días
Tubo:	Orina congelada
Comentario adicional:	Alícuota de ORINA 24 H (1 mL). CONGELAR
Valores de referencia:	(2.26 - 10)

Descripción:	AMP-CICLICO PLASMA
Código:	AMPCI
Técnica:	Radioisotópica
Unidades:	nmol/L
Plazo:	23 días
Tubo:	Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional:	2 ml PLASMA EDTA CONGELADO
Valores de referencia:	(18 - 45.4)

Descripción:	AMPHIPHYSINA AC. EN LCR
Código:	AMPHILCR
Técnica:	Técnica Inmunoblot
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	LIQUIDO LCR INMUNO
Comentario adicional:	0.5 ml LCR
Valores de referencia:	

Descripción:	Ampliación a Everli Avanzado (NIPT) - ASEGURADORA
Código:	AMPEVERAVA
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	6 días
Tubo:	Prenatal
Comentario adicional:	NO REQUIERE MUESTRA. Prueba solo para facturar la ampliación a Everli Avanzado
Valores de referencia:	

Descripción:	Ampliación a Everli Plus (NIPT) - ASEGURADORA
Código:	AMPEVERPLU
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Prenatal
Comentario adicional:	NO REQUIERE MUESTRA. Prueba solo para facturar la ampliación a Everli Plus
Valores de referencia:	

Descripción:	Ampliación a Exoma Clínico en trío (muestras progenitores)
Código:	AMPLI_TSO
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	40 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Ampliación a Exoma Clínico en trío (muestras progenitores)
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Ampliación a Harmony Avzdo (NIPT) - ASEGURADORA
Código: AMPHARMAVA
Técnica:
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Prenatal
Comentario adicional: NO REQUIERE MUESTRA.
Prueba solo para facturar la ampliación a Harmony Avanzado
Valores de referencia:

Descripción: Ampliación a Harmony Plus (NIPT) - ASEGURADORA
Código: AMPHARMPLU
Técnica:
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Prenatal
Comentario adicional: NO REQUIERE MUESTRA.
Prueba solo para facturar la ampliación a Harmony Plus
Valores de referencia:

Descripción: Ampliación con STRs para cromosoma Y (2 individuos)
Código: PATERCRY
Técnica:
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Lleva KIT especial con cadena de custodia, solictar a asesoría genética, Enviar con las muestras a Alfonso XII
Muestra: mucosa bucal con Hisopo sin medio

Esta prueba es para 2 individuos adicionales tanto para paternidad como parentesco cuando hay que ampliar más marcadores sobre el cromosoma Y
Valores de referencia:

Descripción: Ampliación panel NGS
Código: AMPLINGS
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Ampliación de un estudio realizado previamente mirar comentarios
Valores de referencia:

Descripción: Amplificación del gen MDM2 (12q15).
Código: MDFISHMDM2
Técnica:
Unidades:
Plazo: 5 días

Descripción: Amplificación del gen MDM2 (12q15).
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional: 5-20 ml sangre periférica.
min 2 ml médula ósea.
Muestra alternativa: tejido fresco o fijado/parafinado
Valores de referencia:

Descripción: Análisis de 1 mutacion de cualquier gen (sec. Sanger)
Código: UNA_MUTACI
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente
Valores de referencia:

Descripción: Análisis de 1 mutación de cualquier gen Mitocondrial
Código: MUTACMITOC
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tipo de tubo. Edta rotulado con BM. Tubo exclusivo para esta determinación
Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente
Valores de referencia:

Descripción: Análisis de 1 mutación de cualquier gen por MLPA
Código: SOLO_MLPA
Técnica: MLPA
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Analisis de 2 mutaciones de cualquier gen/es (sec. Sanger)
Código: DOS_MUTACI
Técnica:
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente
Valores de referencia:

Descripción: Análisis de 3 mutaciones de cualquier gen/es (sec sanger)
Código: TRES_MUTAC

Descripción: Análisis de 3 mutaciones de cualquier gen/es (sec sanger)
Técnica: Secuenciación Sanger
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Sangre en 1 tubo de EDTA a temperatura ambiente.
Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente

Valores de referencia:

Descripción: Análisis de 3 mutaciones de cualquier gen/es (sec sanger)
Código: TRES_MUTAC
Técnica: Secuenciación Sanger
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Sangre en 1 tubo de EDTA a temperatura ambiente.
Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente

Valores de referencia:

Descripción: Análisis de 3 mutaciones de cualquier gen/es (sec sanger)
Código: TRES_MUTAC
Técnica: Secuenciación Sanger
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Sangre en 1 tubo de EDTA a temperatura ambiente.
Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente

Valores de referencia:

Descripción: Análisis de cualquier gen por MLPA 2 SALSAS
Código: DOS_MLPA
Técnica: MLPA
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina y Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Análisis del porcentaje de dd-cfDNA
Código: TRAC
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional: Tubo PAXgene y Streck a temperatura ambiente
Muestras para estudio transplante riñón. Contactar con laboratorio NIPT

Valores de referencia:

Descripción: Análisis tripletes gen TCF4
Código: TCF4_EXPAN

Descripción:	Análisis tripletes gen TCF4
Técnica:	PCR y analisis de fragmentos
Unidades:	
Plazo:	20 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Andersen-Tawil, Sd. Sec Gen: KCNJ2.
Código:	GEN_000046
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	ANDROSTANDIOL GLUCURONIDO
Código:	ANDROSGLU
Técnica:	EIA
Unidades:	ng/mL
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	2 mL suero. REFRIGERAR.
Valores de referencia:	(1.53 - 14.82) Hombre (0.51 - 4.03) Mujer Pubertad (0.22 - 4.64) Mujer Adultas (0.61 - 3.71) Mujer Post-menopausia

Descripción:	ANDROSTENDIONA DELTA 4
Código:	DELTA4
Técnica:	ICMA
Unidades:	ng/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(0.5 - 3.5) Hombre > 22 años (0.4 - 3.4) Mujer > 22 años Mujer premenopáusica (Inf. 2.1) Mujer > 22 años Mujer postmenopáusica (Inf. 0.29) Hombre 2 años - 7 años (Inf. 0.74) Hombre 7 años - 12 años (0.2 - 2.21) Hombre 12 años - 17 años (0.44 - 2.65) Hombre 17 años - 22 años (Inf. 0.34) Mujer 2 años - 7 años (Inf. 2.41) Mujer 7 años - 12 años (0.42 - 3.41) Mujer 12 años - 17 años (0.70 - 4.31) Mujer 17 años - 22 años

Descripción:	Anemia de células falciformes: gen HBB (sec. Sanger)
Código:	ANEM_FALCI
Técnica:	PCR y secuenciación

Descripción: Anemia de células falciformes: gen HBB (sec. Sanger)
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente
Valores de referencia:

Descripción: Anemia de Diamond-Blackfan. Panel
Código: GEN_000047
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Anemia de Fanconi: >10 genes (NGS)
Código: FANCONI
Técnica: MLPA y NGS Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Anemia diseritropoyética congénita. Panel
Código: GEN_000048
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Anemia megaloblástica respuesta tiamina. Sec Gen SLC19A2
Código: GEN_000049
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Anemia sideroblástica ligada al X. Panel
Código: GEN_000050
Técnica:
Unidades:

Descripción:	Anemia sideroblástica ligada al X. Panel
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Aneurisma aorta torácica: >10 genes (NGS)
Código:	ANEURIS_AO
Técnica:	NGS
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	ANEXINA V ANTICUERPOS IGG SUERO
Código:	ANEXINVACG
Técnica:	ENZIMOINMUNOANÁLISIS
Unidades:	U/mL
Plazo:	15 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	(Inf. 8) Negativo

Descripción:	ANEXINA V ANTICUERPOS IGM SUERO
Código:	ANEXINVACM
Técnica:	ENZIMOINMUNOANÁLISIS
Unidades:	U/mL
Plazo:	15 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero.
Valores de referencia:	(Inf. 8) Negativo

Descripción:	ANFETAMINA ORINA
Código:	ANFETA
Técnica:	Inmunoensayo
Unidades:	
Plazo:	2 días
Tubo:	Orina Drogas de Abuso
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	Angelman, Sd. Sec Gen: UBE3A.
Código:	GEN_000051
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Descripción: Angelman, Sd. Sec Gen: UBE3A.
Valores de referencia:

Descripción: Angioedema hereditario tipo 1. Sec Gen: SERPING1.
Código: GEN_000052
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Angiopatía amiloide cerebral. Panel
Código: GEN_000053
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: ANGIOTENSINA II PLASMA
Código: ANGIOTEN2
Técnica: Radioinmunoanálisis
Unidades: pmol/L
Plazo: 13 días
Tubo: Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional: 3 mL plasma (EDTA). Congelar y enviar congelado.
Valores de referencia: (19 - 38)

Descripción: ANGIOTENSINA,I PLASMA
Código: AT1
Técnica: RIA
Unidades: ng/mL
Plazo: 6 días
Tubo: Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional: Plasma de edta separado y congelado
Valores de referencia: (0.60 - 12.00)

Descripción: ANHIDRASA CARBONICA II AC. SUERO
Código: ANHCARBII
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 18 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia:

Descripción: ANION GAP
Código: ANIONGAP

Descripción: ANION GAP
Técnica: Cálculo
Unidades: mmol/L
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (10 - 20)

Descripción: Aniridia. Sec Gen: PAX6.
Código: GEN_000054
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: ANNA-3 ANTICUERPOS
Código: ANNA3
Técnica: Inmunofluorescencia indirecta/Inmunohistoquímica
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: Negativo <1/60
Positivo >1/60

Descripción: Anomalias del tejido conectivo panel genes
Código: PHARMALAP3
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Imprescindible enviar la historia clínica y formulario de petición de genética o consentimiento informado
Valores de referencia:

Descripción: ANTI NUCLEOSOMAS AC.
Código: AC.NUCLEOS
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: ANTI OXIDANTE GENETICO
Código: ANTIOXCOMP
Técnica:

Descripción: ANTI OXIDANTE GENETICO
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional: Kit especial. Solicitar a almacén
Valores de referencia:

Código: SINTETASA
Descripción: ANTI SINTETASA AC (Jo-1, SRP, PL-7 PL12, EJ,OJ)
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	SRPAC	63559-9		SRP (SIGNAL RECOGNITION PARTICLE) AC. SUERO		Negativo
Prueba	JO1AC	56731-3		Jo-1 AC. SUERO		Negativo
Prueba	PL7PL12AC			PL-7/PL-12 AC. SUERO		Negativo
Prueba	EJAC	82392-2		EJ AC. SUERO		Negativo
Prueba	OJAC	69557-7		OJ AC. SUERO		Negativo

Descripción: ANTIBIOGRAMA
Código: ATB
Técnica: Tarjetas con reactivos colorimétricos
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Microbiología
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Anticoagulante Lupico (dRVVT VÍBORA DE RUSSELL)
Código: ANTILUPICO
Técnica: Téc. coagulativa
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Plasma de Citrato congelado
Comentario adicional: 1 mL plasma citrato.
Se recomienda doble centrifugacion para eliminar las plaquetas del plasma: Primera centrifugación 15 minutos a 2000-2500 g. Separar el sobrenadante plasmático y centrifugarlo una segunda vez durante 15 minutos a 2000-2500 g. El número de plaquetas res

Enviar la muestra congelada.

Enviar congelado y rotulado como DOBLE CCENTRIFUGACION.

Valores de referencia: (Inf. 1.2) Negativo
(1.2 - 1.5) Positivo débil
(1.5 - 2) Positivo moderado
(Sup. 2) Positivo fuerte

Código: LUPISILICE
Descripción: ANTICOAGULANTE LUPICO ACTIVADO CON SILICE
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	PTT_LA	5007328		PTT_LA SCREEN	segundos	(33 - 45)
Prueba	PTT_LACONF	5007329		PTT_LA CONFIRMACION STACLOT LA	segundos	(Inf. 8) :Negativo (Sup. 8) :Positivo

Descripción: ANTICUERPOS ANTI DFS70 EN SUERO
Código: DFS70
Técnica: Téc. EIA
Unidades: U/mL
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero
Valores de referencia: (Inf. 7) Negativo
(7 - 10) Indeterminado

Descripción: ANTICUERPOS ANTI INMUNOGLOBULINA A SUERO
Código: IGAAC
Técnica: Inmunoanálisis
Unidades: U/mL
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml suero, alternativa plasma.
Valores de referencia: (Inf. 7) Negativo
(Sup. 10) Positivo
(7 - 10) Zona límite

Descripción: ANTICUERPOS ANTI TREPONEMA PALLIDUM (SYPHILIS TP)
Código: VDRL
Técnica: SYPHILIS TP
Unidades: Indice
Plazo: 2 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero.
Alternativa: plasma de EDTA
Valores de referencia: (Inf. 0.99) Negativo

Descripción: ANTICUERPOS ANTINUCLEARES EN LCR
Código: ANALCR
Técnica: Inmunofluorescencia indirecta
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Líquidos Biológicos

Descripción:	ANTICUERPOS ANTINUCLEARES EN LCR
Comentario adicional:	1 ml LCR
Valores de referencia:	

Descripción:	ANTICUERPOS BP180 (BPAG2)
Código:	BP180
Técnica:	EIA
Unidades:	Ratio
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 1) Negativo

Descripción:	ANTICUERPOS GP210
Código:	GP210
Técnica:	Inmunoblot
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml suero
Valores de referencia:	Negativo

Descripción:	ANTICUERPOS INHIBIDORES DEL FACTOR VII PLASMA
Código:	INHIFVII
Técnica:	Téc. Coagulométrica
Unidades:	U. Bethesda
Plazo:	7 días
Tubo:	Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:	1 mL plasma (citrato) pobre en plaquetas (doble centrifugación a 2500 g/15 min.) Aspirar parte superior. CONGELAR INMEDIATAMENTE Y ENVIAR CONGELADO.
Valores de referencia:	La línea de corte mediante esta técnica se establece en 0.5 Unidades Bethesda

Descripción:	ANTICUERPOS INHIBIDORES FRENTE AL FACTOR V EN PLASMA
Código:	INHIFV
Técnica:	Coagulométrica
Unidades:	U. Bethesda
Plazo:	7 días
Tubo:	Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:	2 mL plasma (citrato) pobre en plaquetas (doble centrifugación a 2500 g/15 min.) Aspirar parte superior. CONGELAR INMEDIATAMENTE Y ENVIAR CONGELADO
Valores de referencia:	

Descripción:	ANTICUERPOS INHIBIDORES FRENTE AL FACTOR V EN PLASMA
Código:	INHIFV
Técnica:	Coagulométrica
Unidades:	U. Bethesda
Plazo:	7 días
Tubo:	Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:	2 mL plasma (citrato) pobre en plaquetas (doble centrifugación a 2500 g/15 min.) Aspirar parte superior. CONGELAR INMEDIATAMENTE Y ENVIAR CONGELADO
Valores de referencia:	

Descripción:	ANTICUERPOS M2 MITOCONDRIALES SUERO
Código:	AMA2
Técnica:	Inmunoblot
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml suero
Valores de referencia:	Negativo

Descripción:	ANTICUERPOS Sp-100 SUERO
Código:	SP100
Técnica:	Téc. Inmunoblot
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml suero
Valores de referencia:	Negativo

Descripción:	ANTIDEPRESIVOS TRICICLICOS CONFIRMACION ORINA
Código:	ANTIDEPRE
Técnica:	LC-MS/MS
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	Orina Drogas de Abuso
Comentario adicional:	orina. Refrigerar
Valores de referencia:	

Descripción:	ANTIDEPRESIVOS TRICICLICOS CONFIRMACIÓN SUERO
Código:	ANPRETRIC
Técnica:	téc. HPLC
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	2 ml de suero
Valores de referencia:	

Descripción:	ANTIDIABÉTICOS ORALES EN ORINA
Código:	SULFONILU2
Técnica:	Cromatografía Líquida/Tándem masas
Unidades:	
Plazo:	6 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	10 mL orina, micción aislada
Valores de referencia:	

Descripción:	ANTIDIDIABÉTICOS ORALES EN SUERO
Código:	SULFONILU
Técnica:	Cromatografía Líquida/Tándem Masas
Unidades:	
Plazo:	7 días

Descripción:	ANTIDIDIABÉTICOS ORALES EN SUERO
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	

Descripción:	ANTI-DNA (CRITHIDIA LUCILIAE) AC.
Código:	ANTIDNACRI
Técnica:	IFI
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero
Valores de referencia:	Negativo < 1/10 Positivo > 1/10

Descripción:	ANTIESTREPTOLISINA O
Código:	ASLO
Técnica:	Turbidimetría
Unidades:	UI/mL
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 mL suero
Valores de referencia:	(Inf. 150) < 14 años (Inf. 200) > 14 años

Descripción:	ANTIFUNGIGRAMA
Código:	ANTIFUNGI
Técnica:	Tarjetas con reactivos colorimétricos
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	Microbiología
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	ANTIGENO BETA-D-GLUCANO SUERO
Código:	GLUCANO
Técnica:	Espectrofotometría
Unidades:	pg/mL
Plazo:	12 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1mL de suero separar y congelar inmediatamente.
Valores de referencia:	(Inf. 70) Negativo Esta técnica no detecta Cryptococcus, Zygomycetes ni Blastomyces dermatitidis

Descripción:	ANTIGENO DE ASPERGILLUS (GALACTOMANANO)
Código:	GALACTOMA
Técnica:	Técnica CLIA
Unidades:	Indice
Plazo:	9 días

Descripción:	ANTIGENO DE ASPERGILLUS (GALACTOMANANO)
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Se necesitan 600 µl de suero
Valores de referencia:	(Inf. 0.16) Negativo (0.16 - 0.19) Indeterminado (Sup. 0.19) Positivo

Descripción:	ANTIGENO DE ASPERGILLUS (GALACTOMANANO) BAL/BAS, ASPIR, BRON
Código:	GALACTOBAL
Técnica:	Técnica CLIA
Unidades:	Indice
Plazo:	6 días
Tubo:	Muestra Microbiología
Comentario adicional:	Aspirado, Lavado broncoalveolar
Valores de referencia:	(Inf. 0.16) Negativo (0.16 - 0.19) Indeterminado (Sup. 0.19) Positivo

Descripción:	Antígeno de Helicobacter pylori en heces
Código:	HELIAG
Técnica:	Inmunocromatografía
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	Heces No Microbiología
Comentario adicional:	Muestra: 2 g heces (Refrigerado)
Valores de referencia:	

Descripción:	ANTÍGENO SARS-CoV-2 TEST RAPIDO
Código:	AGCOVDETEC
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	1 días
Tubo:	TORUNDA AG. COVID (MICRO)
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	ANTIGENO SOLUBLE HEPATICO AC. SUERO
Código:	SLALPAC
Técnica:	Inmunoblot
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	Negativo

Descripción:	ANTIGRANULOCITOS AC. (NEUTROFILOS)
Código:	ANGRA
Técnica:	CITOMETRÍA DE FLUJO
Unidades:	
Plazo:	7 días

Descripción:	ANTIGRANULOCITOS AC. (NEUTROFILOS)
Tubo:	Tubo Especial
Comentario adicional:	15 mL SANGRE TOTAL EDTA y 1 ml SUERO. ENVIO A TEMPERATURA AMBIENTE. Evitar envío viernes y vísperas de festivo. Indispensable historia clínica En niños pequeños se aceptan 5 ml de EDTA y 0.5 mL de suero.
Valores de referencia:	

Descripción:	ANTIMONIO EN ORINA
Código:	ANTIMONIO2
Técnica:	ICP-MS
Unidades:	µg/g creatinina
Plazo:	7 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	Orina final de semana laboral preferiblemente. No recolectar muestras de orina en un ambiente en el que sea más probable que ocurra la exposición. Es importante evitar que el polvo de la ropa pueda interferir en el contenido de la muestra. No recoger la orina en recipientes con base de metal, como urinarios o sartenes de metal. Recoger la orina en tubos de polipropileno incoloro libre de metales sin tapones de colores. Cuando esto no sea posible, usar para la recogida de orina un envas
Valores de referencia:	(Inf. 1) en personas no expuestas (valores orientativos). (Inf. 35) en personas expuestas a ANTIMONIO (Indice de exposición orientativo adaptado de ACGIH).

Descripción:	ANTIMONIO SANGRE TOTAL (Tubo libre de metales)
Código:	ANTIMONIO
Técnica:	Técnica Absorción atómica
Unidades:	mcg/L
Plazo:	11 días
Tubo:	Sangre EDTA
Comentario adicional:	Sangre total EDTA Dipotásico (libre trazas metales). REFRIGERAR. Tubo Sangre EDTA metales traza
Valores de referencia:	(Inf. 6)

Descripción:	ANTINUCLEARES (ANA) AC. LIQUIDO PLEURAL
Código:	ANALP
Técnica:	IFI
Unidades:	Titulo
Plazo:	5 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	< 1/20 Negativo > 1/20 Positivo

Descripción:	ANTINUCLEARES AC. (ANA) MUESTRA HUMANA
Código:	ANAMUES
Técnica:	INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA
Unidades:	Titulo
Plazo:	4 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	Hay que indicar tipo de muestra.
Valores de referencia:	

Descripción:	ANTIOXIDANTES TOTALES
Código:	CAT

Descripción:	ANTIOXIDANTES TOTALES
Técnica:	Téc. espectrofotométrica
Unidades:	mmol/L
Plazo:	23 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 mL suero refrigerado.
Valores de referencia:	(1.30 - 1.77)

Descripción:	ANTITROMBINA III
Código:	ATIII
Técnica:	Sustrato cromogénico
Unidades:	%
Plazo:	3 días
Tubo:	Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(80 - 120)

Descripción:	ANTITROMBINA III (PROTEINA)
Código:	ATIIIPRO
Técnica:	Nefelometría
Unidades:	mg/dL
Plazo:	6 días
Tubo:	Plasma de Citrato congelado
Comentario adicional:	1 mL Plasma Citrato sódico Conservación: Separar y congelar inmediatamente. ENVIAR CONGELADO
Valores de referencia:	(19 - 31)

Descripción:	Añadir DNA mitocondrial a panel NGS
Código:	AÑADIRMT
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Añadir tipaje HLA a PGT
Código:	HLAPGTINFR
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	APIXABAN PLASMA
Código:	APIXABAN
Técnica:	Substrato cromogénico con anti Factor Xa
Unidades:	ng/mL

Descripción:	APIXABAN PLASMA
Plazo:	3 días
Tubo:	Plasma de Citrato congelado
Comentario adicional:	1 ml de plasma -citarto. Congelar y enviar congelado
Valores de referencia:	(59 - 321) Dosis 5 mg: Pico (2-3 horas) (22 - 230) Dosis 5 mg: Valle (previo siguiente dosis) ICSH guidance document for DOAC testing (2018)

Descripción:	APOLIPOPROTEINA A1
Código:	APOA
Técnica:	Turbidimetría
Unidades:	mg/dL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 mL suero.
Valores de referencia:	(105 - 175) Hombre (105 - 205) Mujer

Descripción:	APOLIPOPROTEINA B
Código:	APOB
Técnica:	Turbidimetría
Unidades:	mg/dL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 mL de suero
Valores de referencia:	(60 - 140) Hombre (55 - 130) Mujer

Descripción:	APOLIPOPROTEINA CII EN SUERO
Código:	APOCII
Técnica:	Inmunoturbidimetría
Unidades:	mg/L
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Muestra: Suero Cantidad: 1 tubo Contenedor: Tubo suero con separador. Volumen:: 1.0 mL Conservación: Refrigerar Volumen mínimo: 0.57 mL
Valores de referencia:	(15 - 40)

Descripción:	APOLIPOPROTEINA CIII EN SUERO
Código:	APOCIII
Técnica:	Inmunoanálisis
Unidades:	mg/L
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Basal

Descripción: APOLIPOPROTEINA CIII EN SUERO
Comentario adicional:
```
Muestra: Suero
Cantidad: 1 tubo
Contenedor: Tubo suero con separador.
Volumen: 1.0 mL
Conservación: Refrigerar
Volumen mínimo: 0.57 mL
```
Valores de referencia: (55 - 105)

Descripción: APOLIPOPROTEINA E
Código: APOE
Técnica: Nefelometría
Unidades: mg/L
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
```
1 mL suero. refrigerar
Volumne mínimo: 0.3 mL
```
Valores de referencia: (23 - 63)

Código: ARABI
Descripción: Arabinosa y Arabitol en orina
Técnica: Arabinosa y arabitol|Técnica GC
Comentario adicional: 15 mL primera orina de la mañana

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	ARABINOSA	79281-2		PERFIL ARABINOSA EN ORINA	mg/g creatinina	(Inf. 25)
Prueba	ARABITOL			PERFIL ARABITOL EN ORINA	mg/g creatin.	(Inf. 50)
Prueba	ARABIINTER			PERFIL ARABINOSA Y ARABITOL INTERPRETACIÓN		

Descripción: Aracnodactilia contractural congénita. Sec Gen: FBN2.
Código: GEN_000055
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: ARILSULFATASA A EN LEUCOCITOS
Código: ARILSULFA
Técnica: Enzimática
Unidades: nmol/17h/mg pro
Plazo: 90 días
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional: 10 mL SANGRE TOTAL (Heparina). INDISPENSABLE AVISAR PREVIAMENTE PARA PROGRAMACIÓN DEL ESTUDIO. Informe clínico. Envío de sangre control en idénticas condiciones.
Valores de referencia: (73.0 - 215.0)

Descripción: ARIPIPRAZOL SUERO
Código: ARIPIPRAZO
Técnica:
Unidades: ng/mL
Plazo: 13 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL
Valores de referencia: (150 - 250)

Descripción: ARN RIBOSOMAL (16S), MUESTRA BIOLÓGICA
Código: R16S
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: LIQUIDO CITOGENETICA
Comentario adicional:
```
Líquido Amniótico:
  Tubo esteril
  Volumen 0.5 mL,
  Conservación Refrigerar
  Volumen mínimo 0.5 mL
  Estabilidad 4ºC, 72 Horas

Líquido pleural :
 Tubo esteril
  Volumen 0.5 mL,
  Conservación Refrigerar
  Volumen mínimo 0.5 mL

Líquido Sinovial
 Tubo esteril heparinizado
  Volumen 0.5 mL
  Conservación Refrigerar
  Volumen mínimo 0.5 mL
  Estabilidad 4ºC 2 semanas, -20º 1 mes
```
Valores de referencia:

Descripción: Array 750k: restos abortivos
Código: CGHARRAYAB
Técnica:
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Citogenética
Comentario adicional:
```
Muestra en medio de cultivo. Refrigerada.
Contactar con genetica@megalab.es para envío de medio
```
Valores de referencia:

Descripción: Array CytoSNPs 850K
Código: ARRAY_850K
Técnica:
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción:	Array CytoSNPs 850K
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Array de exoma: Infinium OmniExpressExome-8 v1.4
Código:	ARRAYEXOMA
Técnica:	Array Infinium OmniExpressExome-8 v1.4
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM. Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	ARSENICO EN PELO
Código:	ARSENIPELO
Técnica:	Espectrometría de absorción atómica-generador hidruros
Unidades:	mcg/g
Plazo:	17 días
Tubo:	
Comentario adicional:	200 mg de pelo aprox.
Valores de referencia:	(Inf. 0.90)

Descripción:	ARSENICO EN SANGRE
Código:	ASSANGRE
Técnica:	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente
Unidades:	µg/L
Plazo:	6 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	Sangre total EDTA Dipotásico (libre trazas metales) Volumen mínimo 0.15 mL
Valores de referencia:	(Inf. 10)

Descripción:	ARSENICO INORGANICO Y SUS METABOLITOS METILADOS EN ORINA
Código:	ASINORG2
Técnica:	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)
Unidades:	µg/L
Plazo:	9 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	10 Orina (micción aislada) al final de la semana laboral. Refrigerar
Valores de referencia:	(Inf. 35) Valor Límite Biológico-VLB (INSST) Fin de la semana Laboral (exposición a Arsénico elemental y sus compuestos inorgánicos solubles)

Descripción:	Arteriopatía, infarto subcortical, leucoencefalopatía Panel
Código:	GEN_000056
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Arteriopatía, infarto subcortical, leucoencefalopatía Panel
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Artrogriposis. Panel
Código: GEN_000057
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Arts, Sd. Sec Gen: PRPS1.
Código: GEN_000058
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Código: ETS7_ASEGU
Descripción: Aseguradoras PCR de 7 patógenos de transmisión sexual
Técnica: Real-time PCR
Comentario adicional: Muestras de zona genital: torundas secas, tejido, orina y semen.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	CHLAMPCR	35729-3		Chlamydia trachomatis DNA PCR Cualitativa		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	NEISSERPCR	24111-7		Neisseria gonorrheae DNA PCR Cualitativa		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	TRICOMOPCR			Trichomonas DNA PCR		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	MYCOPCR	68546-1		Mycoplasma Hominis en muestra por PCR		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	MYCOGENIT	69935-5		Mycoplasma genitalium DNA PCR Cualitativa		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	UREAPLPCR	51988-4		Ureaplasma urealyticum/parvum DNA PCR cualitativa		Valor de referencia: No se detecta

---

Código: ETS7_ASEGU
Descripción: Aseguradoras PCR de 7 patógenos de transmisión sexual
Técnica: Real-time PCR
Comentario adicional: Muestras de zona genital: torundas secas, tejido, orina y semen.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	CHLAMPCR	35729-3		Chlamydia trachomatis DNA PCR Cualitativa		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	NEISSERPCR	24111-7		Neisseria gonorrheae DNA PCR Cualitativa		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	TRICOMOPCR			Trichomonas DNA PCR		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	MYCOPCR	68546-1		Mycoplasma Hominis en muestra por PCR		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	MYCOGENIT	69935-5		Mycoplasma genitalium DNA PCR Cualitativa		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	UREAPLPCR	51988-4		Ureaplasma urealyticum/parvum DNA PCR cualitativa		Valor de referencia: No se detecta

Descripción:	ASIALOGLICOPROTEINA RECEPTOR AC. SUERO
Código:	RECASIALO
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	
Plazo:	17 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml suero
Valores de referencia:	(Sup. 1) Positivo

Descripción:	Asociación VACTERL. Sec Gen: HOXD13.
Código:	GEN_000059
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	ASPARAGINASA ACTIVIDAD SUERO
Código:	ASPARAGINA
Técnica:	Enzimática
Unidades:	U/L
Plazo:	12 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 mL suero CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO
Valores de referencia:	(Sup. 100) Niveles terapeúticos

Descripción:	Aspartilglucosaminuria. Sec Gen: AGA
Código:	GEN_000060
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular

Descripción:	Aspartilglucosaminuria. Sec Gen: AGA
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	ASPECTO LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
Código:	LIQLCASP
Técnica:	Observación
Unidades:	
Plazo:	
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	ASPERGILLUS FUMIGATUS ANTICUERPOS
Código:	ASPERAC
Técnica:	Hemaglutinación
Unidades:	Titulo
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. Refrigerado.
Valores de referencia:	Título <1/320: Negativo

Descripción:	ASPERGILLUS SPP. DNA (PCR)
Código:	ASPERGIPCR
Técnica:	hibridación molecular con amplificación (PCR)
Unidades:	
Plazo:	17 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	2 ml sangre total y otras muestras.
Valores de referencia:	

Descripción:	ASTROVIRUS RNA PCR EN MUESTRA
Código:	ASTROVIPCR
Técnica:	HIBRIDACIÓN MOLECULAR CON AMPLIFICACIÓN (PCR)
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	Muestra envios externos
Comentario adicional:	Heces (10 mL o g) vómito (10 mL o g). Envío CONGELADO
Valores de referencia:	

Descripción:	Ataxia de Friedreich: gen FXN (NGS)
Código:	FRIEDR_SEC
Técnica:	PCR y secuenciación
Unidades:	
Plazo:	40 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción: Ataxia de Friedreich: gen FXN secuencia (GAA)n
Código: FRIEDREICH
Técnica: PCR, TP-PCR, y análisis de framgentos
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas:Citrato.
Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.
Valores de referencia:

Descripción: Ataxia episódica: >10 genes (NGS)
Código: ATAXIA_EPI
Técnica: NGS y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Ataxia espinocerebelosa 3: gen ATXN3 secuencia (CAG)n
Código: MACHADOJOS
Técnica: PCR, TP-PCR, y análisis de fragmentos
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Ataxia espinocerebelosa tipo 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, y 17
Código: ATAXIA_SP
Técnica: PCR, TP-PCR, y análisis de fragmentos
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas:Citrato.
Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.
Valores de referencia:

Descripción: Ataxia telangiectasia: gen ATM (NGS)
Código: TELANGIECT
Técnica: NGS con TSOE Illumina y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Muestras de tejido tumotal y sangre.
Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Descripción: Ataxia telangiectasia: gen ATM (NGS)
Valores de referencia:

Descripción: Ataxia y anemia sideroblástica lig. al X. Sec Gen ABCB7
Código: GEN_000061
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Ataxias autosómicas recesivas. Panel
Código: GEN_000062
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Ataxias hereditarias no dinámicas. Panel
Código: GEN_000063
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Ataxias hereditarias. Panel
Código: GEN_000064
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: ATOMOXETINA SUERO
Código: ATOMOXETIN
Técnica: Comotagrafia liquida /Tándem masas
Unidades: ng/dL
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (30 - 160) Tras toma 2x20 mg/dia
(503 - 915) Metabolizadores lentos(misma dosis)

Descripción: Atrofia dentatorrubro pálido-luisiana: gen DRPLA sec (CAG)n
Código: DRPLA_DNA

Descripción: Atrofia dentatorrubro pálido-luisiana: gen DRPLA sec (CAG)n
Técnica: PCR, TP-PCR y análisis de fragmentos
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.
Valores de referencia:

Descripción: Atrofia medular espinal: gen SMN1 (sec. Sanger)
Código: SMN1
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Atrofia muscular bulboespinal - Enf. Kennedy: sec (CAG)n AR
Código: KENNEDYPCR
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente
Valores de referencia:

Descripción: Atrofia muscular espinal. Panel
Código: GEN_000065
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Atrofia muscular espinal: deleciones en SMN1 y SMN2
Código: SMN_PCR
Técnica: PCR-RFLP y MLPA
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Atrofia óptica hereditaria: >10 genes (NGS)
Código: ATROFI_OPT
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Ausencia congénita conducto deferente. Sec Gen: CFTR
Código: GEN_000066
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Autismo y TDAH: >10 genes (NGS)
Código: AUTIS_TDAH
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM. Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: AUTOTOMA: Estudio de nutrigenética
Código: NUTRIGEN_A
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: kit especial (comprado vía web Megalab)
Valores de referencia:

Descripción: AUTOTOMA: Estudio genético de respuesta a 75 fármacos
Código: FARMAGEN_A
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: KIT DE ENSAYOS CLINICOS
Comentario adicional: kit especial (comprado vía web Megalab)
Valores de referencia:

Código: DEPORDUO_A
Descripción: AUTOTOMA: Estudio genético deporte + suplementos y vitaminas
Técnica:

Código: DEPORDUO_A

Comentario adicional: kit especial (comprado vía web Megalab)

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	SUPLEVIT_A			AUTOTOMA: Estudio genético para suplementos y vitaminas		
Prueba	DEPORGEN_A			AUTOTOMA: Estudio genetico rendimiento deportivo		

Descripción: AUTOTOMA: Estudio genetico rendimiento deportivo

Código: DEPORGEN_A

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: Muestra Biología Molecular

Comentario adicional: kit especial (comprado vía web Megalab)

Valores de referencia:

Descripción: AVIDEZ IGG EPSTEIN-BARR

Código: AVIDEZEPSB

Técnica: CLIA

Unidades: % avidez IgG

Plazo: 11 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 1 mL de Suero: Refrigerar.

Valores de referencia: (Inf. 40.0) Baja avidez. Compatible con infección aguda, primaria. Se recomienda efectuar pruebas adicionales para su confirmación.
(40.0 - 60.0) Avidez zona límite
(Sup. 60.0) Alta avidez

Descripción: AVIDEZ IGG VARICELA ZOSTER

Código: AVIDEZVARI

Técnica:

Unidades: % avidez IgG

Plazo: 7 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional:

Valores de referencia: (Inf. 40.0) Baja avidez. Compatible con infección aguda, primaria.
(40.0 - 60.0) Avidez zona límite
(Sup. 60.0) Alta avidez

Descripción: Axenfeld-Rieger, Sd. Sec Gen: FOXC1

Código: GEN_000067

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción:	AZATIOPRINA (6-MERCAPTOPURINA)
Código:	AZATI
Técnica:	LC-MS/MS (Cromatografia líquida /Tándem masas)
Unidades:	ng/mL
Plazo:	15 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	SUERO CONGELADO. Toma de muestra a 1-2 horas post-tratamiento
Valores de referencia:	(40 - 300)

Descripción:	BABESIA DIVERGENS (PIROPLASMOSIS) Ac IGG, SUERO
Código:	BABESIA
Técnica:	IFI
Unidades:	
Plazo:	11 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero (Refrigerado).
Valores de referencia:	Valor de referencia indicativo: Negativo

Descripción:	BABESIA SPP PCR SANGRE TOTAL
Código:	BABESPCR
Técnica:	HIBRIDACIÓN MOLECULAR PCR
Unidades:	
Plazo:	12 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	2 Ml SANGRE TOTAL EDTA.
Valores de referencia:	

Descripción:	BACILLUS ANTHRACIS (CARBUNCO) PCR
Código:	BACANTHR
Técnica:	Hibridación molecular (PCR)
Unidades:	
Plazo:	
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Carbunco cutáneo (pústula maligna):rascado de bordes de la lesión con torunda dacrón-no de alginato-).Septicemia:sangre EDTA no coagulada. Carbunco pulmonar: exudado respiratorio profundo.Gastrointestinal: heces.Refrigerada(pref.)menos 2 d.Conge.más 2
Valores de referencia:	

Descripción:	BACILOSCOPIA DE ESPUTO
Código:	BACILOES
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Esputo
Comentario adicional:	Esputo en frasco esteril
Valores de referencia:	

Descripción:	BACILOSCOPIA DE ORINA
Código:	BACILO2
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	3 días

Descripción: BACILOSCOPIA DE ORINA
Tubo: Muestra Microbiología
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: BACLOFENO
Código: BACLOFENO
Técnica: LC-MS/MS
Unidades: mcg/mL
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: (0.10 - 0.60)

Descripción: Bact. periodont. y polim.genes IL1A IL1B DNA PCR Cualitativa
Código: PERIO_IL1
Técnica: PCR y digestión
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Muestra exclcusiva para esta determinación: puntas de papel (recogidas por el periodoncista en consulta).-REFRIGERAR.

Las puntas de papel deben venir sin medio de transporte (secas). Mínimo 3 puntas de papel. Ideal: 6 puntas de papel.

Valores de referencia:

Descripción: Bacterias periodontales DNA PCR Cualitativa
Código: PERIODNA
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Muestra exclusiva para esta determinación: mucosa gingival en puntas de papel (recogidas por el periodoncista en consulta) que se envían en tubos estériles de tapón de rosca proporcionados por el laboratorio.-REFRIGERAR

Las puntas de papel deben venir sin ningún medio de transporte (secas). Mínimo 3 puntas de papel. Ideal, 6 puntas de papel.

Valores de referencia:

Descripción: Bacterias periodontales DNA PCR Cuantitativa
Código: PERIOCUAN
Técnica: PCR cuantitativa
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Muestra exclusiva para esta determinación: mucosa gingival en puntas de papel (recogidas por el periodoncista en consulta) que se envían en tubos estériles de tapón de rosca proporcionados por el laboratorio.-REFRIGERAR.

Las puntas de papel deben llegar sin medio (secas). Mínimo 3 puntas de papel. Ideal 6-7 puntas de papel.

Valores de referencia:

Descripción: Baller-Gerold, Sd. Sec Gen: RECQL4
Código: GEN_000068
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Baller-Gerold, Sd. Sec Gen: RECQL4
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Código: BANOLIGIGG
Descripción: BANDAS OLIGOCLONALES EN LCR IGG
Técnica:
Comentario adicional: LCR y suero

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	BANOLIGOLC	56764-4		BANDAS OLIGOCLONALES IGG LCR (Indispensable 1 ml de suero)		Valor de referencia: No se detecta presencia de bandas oligoclonales
Prueba	BANOLIGGSU			BANDAS OLIGOCLONALES IGG SUERO (1 ml de suero+LCR)		

Código: BANOLIGIGM
Descripción: BANDAS OLIGOCLONALES EN LCR IGM
Técnica: Isoelectroenfoque.
Comentario adicional: LCR y suero

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	BANOLIGOLM	56765-1		BANDAS OLIGOCLONALES IGM LCR (Indispensable enviar suero)		Valor de referencia: No se detecta presencia de bandas oligoclonales
Prueba	BANOLIGMSU			BANDAS OLIGOCLONALES IGM SUERO (1 ml de suero+LCR)		

Descripción: BANDAS OLIGOCLONALES IGG LCR (Indispensable 1 ml de suero)
Código: BANOLIGOLC
Técnica: Téc. Isoelectroenfoque/Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 11 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 mL de LCR. Indispensable enviar también 1 mL de suero.
Valores de referencia: Valor de referencia: No se detecta presencia de bandas oligoclonales

---

Descripción: BANDAS OLIGOCLONALES IGM LCR (Indispensable enviar suero)
Código: BANOLIGOLM
Técnica: ISOELECTROENFOQUE E INMUNODETECCIÓN CON FOSFATASA ALCALINA
Unidades:
Plazo: 32 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: Condiciones de la muestra: 3 alícuotas de 200 µL cada una de LCR y de suero, ambas congeladas. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADAS. Extracción LCR y suero el mismo día.
Valores de referencia: Valor de referencia: No se detecta presencia de bandas oligoclonales

Descripción:	BARBITURICOS EN PELO CONFIRMACION
Código:	BARBIPELO
Técnica:	Cromatografia líquida/Tanden masas (LC-MS/MS)
Unidades:	
Plazo:	17 días
Tubo:	Tubo Especial
Comentario adicional:	PEDIR KIT ESPECIAL: almacen@ctes.eurofinseu.com PEDIR PROTOCOLO DE TOMA DE MUESTRA: calidad@ctes.eurofinseu.com -Análisis Informativo: incluye kit de toma de muestra y formulario de solicitud -Cadena custodia: En caso de solicitar el análisis con validez judicial, solicitar al almacen tambien documentación de cadena custodia (acta de toma de muestra y hoja de seguimiento). El protocolo de cadena custodia debe solicitarse a calidad@ctes.eur En el caso de cadena custodia debe recogerse la muestra por duplicado.
Valores de referencia:	

Descripción:	BARBITURICOS ORINA (DETECCION DE METABOLITOS)
Código:	BARBITU2
Técnica:	EIA
Unidades:	
Plazo:	2 días
Tubo:	Orina Drogas de Abuso
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	Bardet-Biedl, Sd. Panel
Código:	GEN_000069
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	BARIO EN ORINA
Código:	BARIOORINA
Técnica:	Espectrometría de emisión atómica/Espectrometría de masas (ICP-MS)(Espectrofotometría de absorción atómica / Cámara de grafito hasta 3/09/2012)
Unidades:	mcg/L
Plazo:	9 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	10 mL orina (micción aislada)
Valores de referencia:	(3 - 6)

Descripción:	BARIO EN SUERO
Código:	BARIO
Técnica:	Espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS)
Unidades:	µg/L
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero (libre trazas metales) Tubo Suero metales traza Volumen mínimo: 0.35 mL

Descripción:	BARIO EN SUERO
Valores de referencia:	(Inf. 60) No expuestos (Inf. 1) Límite de cuantificación

Descripción:	BARTONELLA HENSELAE AC IGG
Código:	BARHEIGG
Técnica:	Técnica CLIA
Unidades:	Índice
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 mL suero. Alt: Plasma
Valores de referencia:	(Inf. 0.9) Negativo (0.9 - 1.1) Indeterminado

Descripción:	BARTONELLA HENSELAE AC IGM
Código:	BARHEIGM
Técnica:	Técnica CLIA
Unidades:	Índice
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 mL suero. Alt: Plasma
Valores de referencia:	(Inf. 0.9) Negativo (0.9 - 1.1) Indeterminado

Descripción:	Bartonella henselae DNA PCR Cualitativa
Código:	BARTONDNA
Técnica:	RT-PCR
Unidades:	
Plazo:	12 días
Tubo:	Muestra envios externos
Comentario adicional:	Escobillón seco, LCR, orina. En suero sólo recomendable en fase aguda.Aceptable sangre (EDTA).
Valores de referencia:	

Descripción:	BARTONELLA QUINTANA AC IGG SUERO (FIEBRE DE LAS TRINCHERAS)
Código:	BARQUIIGG
Técnica:	INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA
Unidades:	Titulo
Plazo:	12 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero.(Refrigerado).
Valores de referencia:	Negativo :Título <1:64

Descripción:	BARTONELLA QUINTANA AC IGM SUERO (FIEBRE DE LAS TRINCHERAS)
Código:	BARQUIIGM
Técnica:	Técnica IFI
Unidades:	Titulo
Plazo:	12 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	suero

Descripción: BARTONELLA QUINTANA AC IGM SUERO (FIEBRE DE LAS TRINCHERAS)
Valores de referencia: Negativo: Título <1:12

Descripción: Bartter, Sd. Panel
Código: GEN_000070
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: BCR/ABL1 MUTACIONES DOMINIO KINASA · HOT SPOT
Código: BCRABL_MUT
Técnica: RT-PCR y Secuenciación
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Al menos 1 ml de Médula Ósea en tubo EDTA o al menos 5 ml de Sangre Periférica en tubo EDTA. Tubo exclusivo para esta determinación (tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO).

IMPORTANTE: SIEMPRE REFRIGERADO Y NO PINCHAR VIERNES NI VÍSPERAS DE FESTIVOS: la sangre se empieza a procesar dentro de las primeras 48 horas desde la extracción.

Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.

Valores de referencia:

Descripción: Beckwith-Wiedemann, Sd. Sec Gen: CDKN1C
Código: GEN_000071
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: BENCENO EN SANGRE
Código: BENCENO
Técnica: Cromatografía de gases
Unidades: mcg/L
Plazo: 9 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 2 mL de sangre total EDTA al final de la jornada
Valores de referencia: (Inf. 5) Personas expuestas. Valor límite orientativo. Al final de la jornada laboral

---

Código: CDOH
Descripción: BENZODIACEPINAS CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), ORINA
Técnica:
Comentario adicional: Orina. Contenedor de 70 mL. refrigerar

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.

Componentes						
Prueba	CO7COR			Confirmación de 7-amino-clonazepam en orina por LC-MS/MS	ng/mL	(Inf. 25) Límite de cuantificación (Inf. 4.4) Incertidumbre de medida
Prueba	CO7FOR			Confirmación de 7-amino-flunitrazepam en orina por LC-MS/MS	ng/mL	(Inf. 25) Límite de cuantificación (Inf. 4.8) Incertidumbre de medida
Prueba	COALPOR			Confirmación de Alprazolam en orina por LC-MS/MS	ng/mL	(Inf. 25) Límite de cuantificación (Inf. 4.8) Incertidumbre de medida
Prueba	COCNZOR			Confirmación de Clonazepam en orina por LC-MS/MS	ng/mL	(Inf. 25) Límite de cuantificación (Inf. 5) Incertidumbre de medida
Prueba	CODIAOR			Confirmación de Diazepam en orina por LC-MS/MS	ng/mL	(Inf. 25) Límite de cuantificación (Inf. 3) Incertidumbre de medida
Prueba	COFLUOR			Confirmación de Flunitrazepam en orina por LC-MS/MS	ng/mL	(Inf. 25) Límite de cuantificación (Inf. 5) Incertidumbre de medida
Prueba	COLOROR			Confirmación de Lorazepam en orina por LC-MS/MS	ng/mL	(Inf. 25) Límite de cuantificación (Inf. 3.9) Incertidumbre de medida
Prueba	CONDZOR			Confirmación de Nordiazepam en orina por LC-MS/MS	ng/mL	(Inf. 25) Límite de cuantificación (Inf. 4.1) Incertidumbre de medida
Prueba	COOXZOR			Confirmación de Oxazepam en orina por LC-MS/MS	ng/mL	(Inf. 25) Límite de cuantificación (Inf. 3.8) Incertidumbre de medida

Descripción:	BENZODIACEPINAS CONFIRMACION EN SALIVA
Código:	BENZOSAL
Técnica:	LC-MS/MS
Unidades:	ng/mL
Plazo:	10 días
Tubo:	Saliva
Comentario adicional:	Saliva recogida en kit ORAL-EZE. Solicitar kit en el almacén.
Valores de referencia:	

Descripción:	BENZODIAZEPINAS ORINA (DETECCION DE METABOLITOS)
Código:	BENZODI2
Técnica:	Inmunoensayo
Unidades:	
Plazo:	2 días
Tubo:	Orina Drogas de Abuso
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	BENZODIAZEPINAS ORINA CONFIRMACION
Código:	BENZOCONF

Descripción:	BENZODIAZEPINAS ORINA CONFIRMACION
Técnica:	Cromatografía líquida/Tándem masas (LC-MS/MS)
Unidades:	
Plazo:	6 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	10 ml de orina (micción aislada)
Valores de referencia:	

Descripción:	BENZODIAZEPINAS SUERO
Código:	BENZODI
Técnica:	EIA
Unidades:	µg/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 0.3) Valor de corte

Descripción:	Berardinelli-Seip, Sd. Panel
Código:	GEN_000072
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	BERILIO EN ORINA
Código:	BERILIO2
Técnica:	ICP-MS
Unidades:	µg/L
Plazo:	6 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	10 mL orina (micción aislada) No recoger muestras de orina en un ambiente en el que sea más probable que ocurra la exposición. Es importante evitar que el polvo de la ropa pueda interferir en el contenido de la muestra. No recoger la orina en recipientes con base de metal, como urinarios o sartenes de metal. Recoger la orina en tubos de polipropileno incoloro libre de metales sin tapones de colores. Cuando esto no sea posible, usar para la recogida de orina un envase
Valores de referencia:	(Inf. 0.040) BGV recomendado (SCOEL)

Descripción:	BETA - NGF, SUERO
Código:	NGF
Técnica:	EIA
Unidades:	pg/mL
Plazo:	19 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	Suero. Congelado Separar y congelar inmediatamente.
Valores de referencia:	(Inf. 14)

Descripción:	BETA 1 RECEPTOR ADRENÉRGICO ANTICUERPOS SUERO
Código:	BETA1ADRE

Descripción:	BETA 1 RECEPTOR ADRENÉRGICO ANTICUERPOS SUERO
Técnica:	EIA
Unidades:	U/mL
Plazo:	32 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero
Valores de referencia:	(Inf. 15) Negativo

Descripción:	BETA 2 DEFENSINA EN HECES
Código:	B2DEFENSIN
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	ng/mL
Plazo:	15 días
Tubo:	heces especiales
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(8 - 60)

Descripción:	BETA 2 RECEPTOR ADRENÉRGICO ANTICUERPOS SUERO
Código:	BETA2ADRE
Técnica:	EIA
Unidades:	U/mL
Plazo:	32 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero
Valores de referencia:	(Inf. 8) Negativo (8 - 14) Indeterminado

Descripción:	BETA TRACE (FISTULA CEFALORRAQ. EN RINO/OTICO)
Código:	FISTULALCR
Técnica:	Inmunonefelometría
Unidades:	mg/L
Plazo:	8 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 mL LCR (2-8 ºC - Refrigerar) 1 mL Líquido biológico (2-8 ºC - Refrigerar) 1 mL Secreción nasal (2-8 ºC - Refrigerar) 1 mL Suero (2-8 ºC - Refrigerar)
Valores de referencia:	(8.89 - 25.90) LCR (Inf. 0.70) Suero Secreción nasal, ótica: (Inf. 0.70) , LCR en secreción improbable (Sup. 1.30) , LCR en secreción probable (0.70 - 1.29) , se recomienda valorar el cociente secreción/suero

Descripción:	BETA-2 GLICOPROTEINA I AC. IGA
Código:	B2GLICOA
Técnica:	EIA
Unidades:	U/mL
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL Suero (Refrigerado). Alternativa: plasma

Descripción:	BETA-2 GLICOPROTEINA I AC. IGA
Valores de referencia:	(Inf. 7) Negativo (7 - 10) Indeterminado

Descripción:	BETA-2 GLICOPROTEINA I AC. IGG
Código:	B2GLICOI
Técnica:	EIA
Unidades:	U/mL
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 7) Negativo (7 - 10) Indeterminado

Descripción:	BETA-2 GLICOPROTEINA I AC. IGM
Código:	B2GLICOM
Técnica:	EIA
Unidades:	U/mL
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 7) Negativo (7 - 10) Indeterminado

Descripción:	BETA-2 MICROGLOBULINA SUERO
Código:	B2MICRO
Técnica:	Inmunoturbidimetría
Unidades:	mcg/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 mL suero Alternativa: plasma de sodio/litio
Valores de referencia:	(0.8 - 2.4) < 60 años (Inf. 3) > 60 años

Descripción:	BETA-2-MICROGLOBULINA EN ORINA
Código:	B2MICRO2
Técnica:	Turbidimetría
Unidades:	mcg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	orina oxalico
Comentario adicional:	5 ML ORINA (PH IGUAL O SUPERIOR A 6) Se recomienda el siguiente procedimiento de recolección: El paciente ha de vaciar la vejiga, luego beber al menos 0,5L de agua. La muestra de orina ha de recogerse en una hora, y ajustar el pH (con NaOH 1M) a 6-8.
Valores de referencia:	(Inf. 300)

Descripción:	Beta-Caroteno en suero
Código:	BCAROTENO
Técnica:	Cromatografía líquida de alta resolución/Espectrometría
Unidades:	µg/L

Descripción:	Beta-Caroteno en suero
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 mL de suero CON gel separador Conservación: CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO Muestra protegida de la luz
Valores de referencia:	(100 - 850) Los niveles de beta-caroteno en suero están influidos por la dieta.

Descripción:	BETA-CROSSLAPS (CTX) TELOPEPTIDO C TERMINAL COLAGENO TIPO I
Código:	CTX
Técnica:	Electroquimioluminiscencia
Unidades:	ng/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 mL suero congelado, plasma de heparina litio congelado o plasma EDTA Suero y plasma de heparina litio a 2-8ºC tiene estabilidad de 8 horas. Plasma EDTA a 2-8ºC tiene estabilidad de 8 días.
Valores de referencia:	(0.238 - 1.019) Hombre < 30 años (0.225 - 0.936) Hombre 30 años - 40 años (0.182 - 0.801) Hombre 40 años - 50 años (0.161 - 0.737) Hombre 50 años - 60 años (0.132 - 0.752) Hombre 60 años - 70 años (0.118 - 0.776) Hombre > 70 años (0.136 - 0.689) Mujer Pre-menopausia (0.177 - 1.015) Mujer Post-menopausia

Descripción:	Beta-Glucocerebrosidasa (E. Gaucher), sangre seca
Código:	BGLUCOCER
Técnica:	Fluorimetría
Unidades:	µmol/L x Hora
Plazo:	17 días
Tubo:	Tubo Especial
Comentario adicional:	Recoger gotas de sangre SIN ANTICOAGULANTE en 2 a 4 circulos de papel filtro (Solicitar a almacen). Dejar secar al aire libre durante 1 hora. Guardar en nevera en bolsa de plástico cerrada hasta el envio. Enviar a temperatura ambiente. INDISPENSABLE informe clínico y antecedentes familiares.
Valores de referencia:	(1.30 - 10.06)

Descripción:	BETAHCG
Código:	BETAHCG.
Técnica:	CMIA
Unidades:	mU/mL
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 5) Mujer (No embarazo) (202 - 231000) Mujer Embarazo 1-10 semana gestación (22536 - 234990) Mujer Embarazo 11-15 semana gestación (8007 - 50064) Mujer Embarazo 16-22 semana gestación (1600 - 49413) Mujer Embarazo 23-40 semana gestación (Inf. 5) Hombre

Descripción:	BETA-HEXOSAMINIDASA TOTAL Y DISTRIB. ISOENZIMATICA (SUERO)
Código:	BHEXOSASUE
Técnica:	Electroforesis manual, Fluorimetría
Unidades:	
Plazo:	33 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	5 mL Suero. Congelar. Centrifugar la muestra de sangre a 2500rpm 10 minutos a temperatura ambiente en las primeras 2 horas de su obtención, separar el sobrenadante a otro tubo y congelarlo inmediatamente a -20°C Adjuntar historia clínica resumida
Valores de referencia:	

Descripción:	BETA-PAPILOMAVIRUS (B-HPV) DNA DETECCIÓN
Código:	BHPV
Técnica:	PCR-Secuenciación
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	Muestra envios externos
Comentario adicional:	Biopsia- contenedor con solucion salina. Refrigerar. Lesión de piel. Refrigerar.
Valores de referencia:	

Descripción:	BETA-PAPILOMAVIRUS (B-HPV) DNA DETECCIÓN
Código:	BHPV
Técnica:	PCR-Secuenciación
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	Muestra envios externos
Comentario adicional:	Biopsia- contenedor con solucion salina. Refrigerar. Lesión de piel. Refrigerar.
Valores de referencia:	

Descripción:	BICARBONATO EN ORINA
Código:	BICARORINA
Técnica:	Espectrometría
Unidades:	mmol/L
Plazo:	9 días
Tubo:	Orina basal
Comentario adicional:	Orina (micción aislada) Volumen: 10.0 mL Volumen mínimo: 5 mL
Valores de referencia:	(20 - 50)

Descripción:	BICARBONATO EN SUERO
Código:	BIC
Técnica:	Espectrometría
Unidades:	mmol/L
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero doble
Comentario adicional:	1 mL suero en tubo sin destaponar

Descripción:	BICARBONATO EN SUERO
Valores de referencia:	(17.00 - 24.00) < 2 meses (16.00 - 24.00) 2 meses - 24 meses (19.00 - 24.00) 3 años - 4 años (21.00 - 31.00) > 4 años

Descripción:	BILIRRUBINA DIRECTA
Código:	BILD
Técnica:	Espectrofotometría
Unidades:	mg/dL
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 mL suero o plasma. Proteger de la luz
Valores de referencia:	(Inf. 0.2)

Descripción:	BILIRRUBINA INDIRECTA SUERO (COLEMIA INDIRECTA)
Código:	BILI
Técnica:	Espectrofotometría
Unidades:	mg/dL
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 mL de suero o plasma
Valores de referencia:	(Inf. 1)

Descripción:	BILIRRUBINA TOTAL
Código:	BILT
Técnica:	Espectrofotometría
Unidades:	mg/dL
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 mL de suero
Valores de referencia:	(1.4 - 8.7) < 1 dia (3.4 - 11.5) 1 dia - 2 dias (1.5 - 12.0) 2 dias - 5 dias (0.3 - 1.2) > 5 dias

Descripción:	'BIOMARCADOR TUMOR ONCOHEMATOLÓGICO · BCL2(18Q21.3)
Código:	FISH_TBCL2
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	'BIOMARCADOR TUMOR ONCOHEMATOLÓGICO · BCL6(3Q27.3)
Código:	FISH_TBCL6
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	5 días

Descripción:	'BIOMARCADOR TUMOR ONCOHEMATOLÓGICO · BCL6(3Q27.3)
Tubo:	Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	'BIOMARCADOR TUMOR ONCOHEMATOLÓGICO · C-MYC (8Q24)
Código:	FISH_TCMYC
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	Biomarcador tumor sólido 11p15
Código:	FISH11P15
Técnica:	FISH
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:	Tejido parafinado Tª ambiente
Valores de referencia:	

Descripción:	Biomarcador tumor sólido 19q
Código:	FISH19Q
Técnica:	FISH
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:	Tejido parafinado Tª ambiente
Valores de referencia:	

Descripción:	Biomarcador tumor sólido 1p
Código:	FISHSRD
Técnica:	FISH
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:	Tejido parafinado Tª ambiente
Valores de referencia:	

Descripción:	Biomarcador tumor sólido 1p/19q
Código:	FISH1P_19Q
Técnica:	FISH
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:	Tejido parafinado Tª ambiente
Valores de referencia:	

Descripción: Biomarcador tumor sólido cr 3
Código: FISHCEN3
Técnica: FISH
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Tejido parafinado Tª ambiente
Valores de referencia:

Descripción: Biomarcador tumor sólido cr 7
Código: FISHCEN7
Técnica: FISH
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Tejido parafinado Tª ambiente
Valores de referencia:

Descripción: Biomarcador tumor sólido FGFR1 (8p11)
Código: FISHFGFR
Técnica: FISH
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Tejido parafinado Tª ambiente
Valores de referencia:

Descripción: Biomarcador tumor sólido FOXO1A (13q14)
Código: FISHFOXO
Técnica: FISH
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Tejido parafinado Tª ambiente
Valores de referencia:

Descripción: Biomarcador tumor sólido HER2/neu
Código: FISHHER2
Técnica: FISH
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Tejido parafinado Tª ambiente
Valores de referencia:

Descripción: Biomarcador tumor sólido HER2/neu
Código: FISHHER2
Técnica: FISH
Unidades:
Plazo: 5 días

Descripción:	Biomarcador tumor sólido HER2/neu
Tubo:	Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:	Tejido parafinado Tª ambiente
Valores de referencia:	

Descripción:	Biomarcador tumor sólido MDM2 (12q15)
Código:	FISHMDM2
Técnica:	FISH
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:	Tejido parafinado Tª ambiente
Valores de referencia:	

Descripción:	Biomarcador tumor sólido NR4A3
Código:	FISHNR4A3
Técnica:	FISH
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:	Tejido parafinado Tª ambiente
Valores de referencia:	

Descripción:	Biomarcador tumor sólido P16 (9p22)
Código:	FISHP16
Técnica:	FISH
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:	Tejido parafinado Tª ambiente
Valores de referencia:	

Descripción:	Biomarcador tumor sólido Reordenam COL1A1/PDFGB [t(17;22)]
Código:	MDFISH1722
Técnica:	FISH
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:	Tejido parafinado Tª ambiente
Valores de referencia:	

Descripción:	Biomarcador tumor sólido Reordenam COL1A1/PDFGB [t(17;22)]
Código:	MDFISH1722
Técnica:	FISH
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:	Tejido parafinado Tª ambiente
Valores de referencia:	

Descripción:	Biomarcador tumor sólido SYT (18q11)
Código:	FISHSYT
Técnica:	FISH
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:	Tejido parafinado Tª ambiente
Valores de referencia:	

Descripción:	BIOMARCADORES EN TS · IDH1(R132), IDH2(R172) · HOT SPOT
Código:	IDH1_2SOMA
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:	Muestra: Tejido tumoral parafinado. Tª ambiente
Valores de referencia:	

Descripción:	BIOMARCADORES EN TS · KIT(9,11,13,17) · HOT SPOT
Código:	KIT_MUTS
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:	Sangre EDTA. ROTULAR:ONCO
Valores de referencia:	

Descripción:	BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · 1p/19q
Código:	FISHTS1P19
Técnica:	FISH
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · ALK (2p23)
Código:	FISH_TSALK
Técnica:	FISH
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · EWSR1(22q12)
Código:	FISH_TSEWS
Técnica:	
Unidades:	

Descripción:	BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · EWSR1(22q12)
Plazo:	5 días
Tubo:	Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · FGFR2 (10q26)
Código:	FISHTFGFR2
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · FGFR3 (4p16.3)
Código:	FISHTFGFR3
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · NTRK2 (9q21.3)
Código:	FISHTNTRK2
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · RET(10q11.21)
Código:	FISH_TSRET
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · ROS1 (6q22)
Código:	FISH_TROS1
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción: BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · BRAF(V600X) HOT SPOT
Código: BRAF_V600
Técnica: RT-PCR HOT-SPOT
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Posibilidad de estudio en oncohematología en médula ósea.
Valores de referencia:

Descripción: BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · EGFR(18-21) · HOT SPOT
Código: EGFR_MUTS
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Muestras: tejido incluido en parafina.
Una vez hechos los cortes que se necestian para el estudio, devolvemos el bloque al paciente / médico.
Rotular ONCO.
Valores de referencia:

Descripción: BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · ERBB2 (20) · HOT SPOT
Código: ERBB2_MUTS
Técnica: SANGER - HOT SPOT
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: 1 Pieza/s Tejido parafinado [Tªambiente] (Estabilidad: 20°C:1 Años)
Valores de referencia:

Descripción: BIOMARCADORES EN TUMORES SOLIDOS · H3-3A (G34R/V) · HOT SPOT
Código: H3_MUTSG34
Técnica: SANGER - HOT SPOT
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: 1 Pieza/s Tejido parafinado [Tªambiente] (Estabilidad: 20°C:1 Años)
Valores de referencia:

Descripción: BIOMARCADORES EN TUMORES SOLIDOS · H3-3A (K27M) · HOT SPOT
Código: H3_MUTSK27
Técnica: SANGER - HOT SPOT
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: 1 Pieza/s Tejido parafinado [Tªambiente] (Estabilidad: 20°C:1 Años)
Valores de referencia:

Descripción: BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · KRAS(2, 3, 4) · HOT SPOT
Código: KRAS_MUTS
Técnica: PCR y secuenciación

Descripción: BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · KRAS(2, 3, 4) · HOT SPOT
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Muestras: tejido incluido en parafina o EDTA
Una vez hechos los cortes que se necestian para el estudio, devolvemos el bloque al paciente / médico.
Rotular ONCO.
Valores de referencia:

Descripción: BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · MGMT(METILACION PROMOTOR)
Código: MGMT
Técnica: qPCR
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Se requieren entre 2-10 secciones de tejido parafinado de 10 µm marcadas como muestra de oncogenética.
Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.
Valores de referencia:

Descripción: BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · NRAS(2, 3, 4) · HOT SPOT
Código: NRAS_MUTS
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Tejido parafinado.Tª ambiente
Valores de referencia:

Descripción: BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS BÁSICO · PANEL · NGS
Código: TUMOR_MUT
Técnica:
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Bloque parafina. Tª ambiente
ROTULAR ONCO
Valores de referencia:

Código: BIOPSIARAD
Descripción: BIOPSIA CON CIRUGÍA RADICAL
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	NBIOP			Registro Biopsia		
Prueba	SNOMED1			SNOMED1		
Prueba	DIAGNOST			DIAGNOST		
Prueba	DMACRO			DMACRO		
Prueba	DMICRO			DMICRO		

Componentes						
Prueba	NOTABIOP			NOTA		
Prueba	PATOLOGO			PATOLOGO		
Prueba	TDMRADICAL			TIPIO DE MUESTRA CIRUGÍA RADICAL		

Código: BIOPDISECC
Descripción: BIOPSIA CON DISECCION
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	NBIOP			Registro Biopsia		
Prueba	SNOMED1			SNOMED1		
Prueba	DIAGNOST			DIAGNOST		
Prueba	DMACRO			DMACRO		
Prueba	DMICRO			DMICRO		
Prueba	NOTABIOP			NOTA		
Prueba	PATOLOGO			PATOLOGO		
Prueba	TDMDISECCI			TIPO DE MUESTRA CON DISECCIÓN		

Código: BIOPINTRA
Descripción: BIOPSIA INTRAOPERATORIA
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	NBIOP			Registro Biopsia		
Prueba	SNOMED1			SNOMED1		
Prueba	DIAGNOST			DIAGNOST		
Prueba	DMACRO			DMACRO		
Prueba	DMICRO			DMICRO		
Prueba	NOTABIOP			NOTA		
Prueba	PATOLOGO			PATOLOGO		
Prueba	TDMINTRAO			TIPO DE MUESTRA INTRAOPERATORIA		

Descripción: Biopsia líquida genes BRCA1 y BRCA2
Código: BLBRCA1.2
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: STRECK BIOPSIA LIQUIDA

Descripción: Biopsia líquida genes BRCA1 y BRCA2
Comentario adicional: 2 TUBOS STRECK
Rotular con ONCO
Valores de referencia:

Descripción: Biopsia líquida panel de 40 genes
Código: BIOLIQPANE
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: STRECK BIOPSIA LIQUIDA
Comentario adicional: Solicitar kit específico, 2 tubos streck
se envía a BIOSECUENCE
Valores de referencia:

Descripción: Biopsia liquida Pulmon
Código: ONCOLIPUL
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional: Solicitar kit especial.Contactar con asesoría genética antes de tomar la muestra. Tubo sangre total especial
Valores de referencia:

Código: BIOPSIADP1
Descripción: BIOPSIA PIEZA PEQUEÑA
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	NBIOP			Registro Biopsia		
Prueba	SNOMED			SNOMED		
Prueba	DIAGNOST			DIAGNOST		
Prueba	DMACRO			DMACRO		
Prueba	DMICRO			DMICRO		
Prueba	NOTABIOP			NOTA		
Prueba	PATOLOGO			PATOLOGO		
Prueba	TBIOPSIA			Especimen		

Descripción: BIOPSIA PROTEOMICA EN AMILOIDOSIS
Código: PROTEOBIOS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: BIOPSIA ESPECIAL

Descripción: BIOPSIA PROTEOMICA EN AMILOIDOSIS

Comentario adicional: Bloque de parafina de la biopsia con una copia del informe del estudio AP (para poder confirmar que el bloque se corresponde con el paciente).

Breve resumen de la historia clínica del paciente (necesitamos que conste el nombre, apellidos y fecha de nacimiento.

ENVIAR A LA ATENCIÓN DE eNVIOS EXTERNOS.
ENVIAR A VAL CENTRAL DE LUNES A MIERCOLES

Valores de referencia:

Código: BIOPSENC

Descripción: BIOPSIA SENCILLA

Técnica:

Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	NBIOP			Registro Biopsia		
Prueba	SNOMED			SNOMED		
Prueba	DIAGNOST			DIAGNOST		
Prueba	DMACRO			DMACRO		
Prueba	DMICRO			DMICRO		
Prueba	NOTABIOP			NOTA		
Prueba	PATOLOGO			PATOLOGO		
Prueba	TDMSENC			TIPO DE MUESTRA BIOPSIA SENCILLA		

Descripción: Biotina (Vitamina H)

Código: BIOTINA

Técnica: EIA

Unidades: ng/L

Plazo: 10 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 2 ml de Suero . Refrigerar.

Valores de referencia: (Inf. 100) Niveles bajos
(100 - 250) Zona intermedia
(Sup. 250) Niveles normales

Descripción: BIOTINIDASA EN PLASMA

Código: BIOTINID

Técnica: Colorimetría

Unidades: nmol/min/mL

Plazo: 17 días

Tubo: Plasma EDTA Congelado

Comentario adicional: 1 mL plasma de EDTA. Congelar inmediatamente. eNVIAR EN TUBO SEPARADO PARA ESTA DETERMINACIÓN. INDISPENSABLE ENVIAR HISTORIA CLINICA.

Valores de referencia: (7.8 - 13.1)

Descripción: BIPERIDENO (AKINETON) EN SUERO

Código: BIPERI

Técnica: HPLC

Unidades: µg/L

Plazo: 19 días

Descripción: BIPERIDENO (AKINETON) EN SUERO
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 3 mL.
Valores de referencia: (10 - 100)

Descripción: Birk-Barel, Sd. Sec Gen: KCNK9
Código: GEN_000073
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Código: BISFO
Descripción: BISFENOL A EN ORINA
Técnica: LC-MS/MS
Comentario adicional: 5 mL Orina (primera micción). refrigerar.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	BISFOC			perfil BISFENOL A EN ORINA CONCENTRACION	µg/L	
Prueba	BISFOCR			perfil BISFENOL A EN ORINA	µg/g creatin.	(Inf. 2) Valores orientativos basados en Cha BS, Koh SB, Park JH, Eom A, Lee KM, Choi HS (2008). Influence of occupational exposure to bisphenol A on the sex hormones of male epoxy resin painters. Mol Cell Toxicol 4(3):230-234. No están descritos valores límites biológicos de exposición profesional (VLB) INSST 2023.

Descripción: BISMUTO EN ORINA
Código: BISMUTO2
Técnica: Espectometría de Emisión Atómica/MS
Unidades: mcg/24 h
Plazo: 9 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: .10 mL orina 24 h.Indicar volumen orina 24 horas.
Valores de referencia: (Inf. 3)

Descripción: BISMUTO SANGRE TOTAL
Código: BISMUSAN
Técnica: Espectometría de masas-plasma acoplado inductivamente (ICP-MS)
Unidades: µg/L
Plazo: 10 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 2 ml sangre total EDTA

Descripción:	BISMUTO SANGRE TOTAL
Valores de referencia:	(Inf. 5.0)

Descripción:	Björnstadt, Sd. Sec Gen: BCS1L
Código:	GEN_000074
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Bladder Epicheck (screening cáncer de vejiga)
Código:	BEPICHECK
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	ORINA ONCOGENETICA
Comentario adicional:	Muestra: primera orina de la mañana recogida en bote estéril ROTULADO con ONCO (Laboratorio Oncogenética))hay kits a disponibilidad del paciente. Volúmen mínimo 30 ml conservar en nevera hasta su recogida. La muestra dura máximo 5 días hasta su procesamiento. SIN masaje prostático
Valores de referencia:	

Descripción:	BLASTOCYSTIS SPP en HECES PCR
Código:	BLASTOPCR
Técnica:	Hibridación molecular (PCR)
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	heces especiales
Comentario adicional:	Heces congeladas
Valores de referencia:	

Descripción:	Bloom, Sd. Sec Gen: BLM
Código:	GEN_000075
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	BOR, Sd., artrocalasia tipo Ehlers-Danlos. Panel NGS
Código:	GEN_000688
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	BOR, Sd., Autoinmune proliferativo. Panel NGS
Código:	GEN_000689
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	BORDETELLA PARAPERTUSSIS AC. IGG SUERO
Código:	BORDEPAACG
Técnica:	IFI
Unidades:	Titulo
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero
Valores de referencia:	< 1:100 Ausencia de Inmunidad

Descripción:	BORDETELLA PARAPERTUSSIS AC. IGM SUERO
Código:	BORDEPAACM
Técnica:	IFI
Unidades:	Titulo
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero
Valores de referencia:	<1:100 Negativo >o =1:100 Positivo

Descripción:	BORDETELLA PERTUSSIS AC. IGA SUERO
Código:	BORDETEIGA
Técnica:	EIA
Unidades:	UI/mL
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. Refrigerado.
Valores de referencia:	(Inf. 1) Negativo

Descripción:	BORDETELLA PERTUSSIS AC. IGG SUERO
Código:	BORDETEACG
Técnica:	CLIA
Unidades:	UI/mL
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 54) Negativo (55 - 65) Indeterminado (Sup. 66) Positivo

Descripción:	BORDETELLA PERTUSSIS AC. IGM SUERO
Código:	BORDETEACM

Descripción:	BORDETELLA PERTUSSIS AC. IGM SUERO
Técnica:	EIA
Unidades:	
Plazo:	10 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero Alternativa: plasma (citrato, heparina)
Valores de referencia:	(Inf. 9) Negativo (9 - 11) Indeterminado (Sup. 11) Positivo

Descripción:	Bordetella pertussis DNA PCR Cualitativa
Código:	B.PERTUSSI
Técnica:	PCR
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:	Muestra exudado Aspirado nasofaríngeo Frotis nasofaringeo Alternativa: Exudado nasofaríngeo u orofaríngeo recogido con hiposo seco.
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta

Descripción:	Borjeson-Forssman-Lehmann, Sd. Sec Gen: PHF6
Código:	GEN_000076
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	BORO SUERO
Código:	BORO
Técnica:	ICP-MS
Unidades:	mcg/L
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 100)

Código:	WEBM
Descripción:	BORRELIA BURGDORFERI (ENF. LYME) CONFIRM.BLOT AC IgM. SU
Técnica:	
Comentario adicional:	Suero. refrigerar.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	WBM10	PROP5009512		Ac Borrelia IgM (western blot) Proteina P17		Valor de referencia indicativo: No se detecta

Componentes						
Prueba	WBM11	PROP5009900		Ac Borrelia IgM (western blot) Proteina P19		Valor de referencia indicativo: No se detecta
Prueba	WBM12	PROP5009900		Ac Borrelia IgM (western blot) Proteina P21		Valor de referencia indicativo: No se detecta
Prueba	WBM13	PROP5009902		Ac Borrelia IgM (western blot) Proteina P30		Valor de referencia indicativo: No se detecta
Prueba	WBM14	PROP5009903		Ac Borrelia IgM (western blot) Proteina P83		Valor de referencia indicativo: No se detecta
Prueba	WBM2	32666-0		Ac Borrelia IgM (western blot) Proteína P25 (OspC)		Valor de referencia indicativo: No se detecta
Prueba	WBM3	44947-0		Ac Borrelia IgM (western blot) Proteína P31 (OspA)		Valor de referencia indicativo: No se detecta
Prueba	WBM4	9599-2		Ac Borrelia IgM (western blot) Proteína P39 (BmpA)		Valor de referencia indicativo: No se detecta
Prueba	WBM7	PROP5009519		Ac Borrelia IgM (western blot) Proteína VlsE		Valor de referencia indicativo: No se detecta
Prueba	WBM9	13503-8		Ac Borrelia IgM (western blot) Comentario		

Descripción:	BORRELIA BURGDORFERI AC. IGG (ENFERMEDAD DE LYME) SUERO
Código:	BORRELIACG
Técnica:	CLIA
Unidades:	UA/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. Alternativa: Plasma (citrato, EDTA, heparina)
Valores de referencia:	(Inf. 10) Negativo (10 - 15) Indeterminado

Descripción:	BORRELIA BURGDORFERI AC. IGG (ENFERMEDAD DE LYME) LCR
Código:	BORREACGLC
Técnica:	clia
Unidades:	UA/mL
Plazo:	8 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 mL LCR.
Valores de referencia:	(Inf. 4.5) Negativo

Descripción:	BORRELIA BURGDORFERI AC. IGM (ENFERMEDAD DE LYME) LCR
Código:	BORREACMLC
Técnica:	IFI
Unidades:	Titulo
Plazo:	8 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 mL LCR.

Descripción:	BORRELIA BURGDORFERI AC. IGM (ENFERMEDAD DE LYME) LCR
Valores de referencia:	Título < 1/2 Negativo Título > o =1/2 Positivo

Descripción:	BORRELIA BURGDORFERI AC. IGM (ENFERMEDAD DE LYME) SUERO
Código:	BORRELIACM
Técnica:	EIA
Unidades:	Indice
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 0.9) Negativo (0.91 - 1.1) Indeterminado

Descripción:	Borrelia burgdorferi DNA PCR Cualitativa
Código:	BORRPCR
Técnica:	PCR a tiempo real
Unidades:	
Plazo:	6 días
Tubo:	Sangre EDTA
Comentario adicional:	1 5 mL tubo angre total EDTA.Refrigerado. LCR congelado.
Valores de referencia:	

Descripción:	BP230 (PENFIGOIDE BULLOSO) AC. SUERO
Código:	BP230
Técnica:	EIA
Unidades:	Ratio
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL.
Valores de referencia:	(Inf. 1) Negativo

Descripción:	Braquidactilia tipo a1. Sec Gen: IHH
Código:	GEN_000077
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	BRIVARACETAM SUERO
Código:	BRIVARACET
Técnica:	Cromatografía Líquida-Tándem Masas
Unidades:	mg/L
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	Suero congelado.

Descripción:	BRIVARACETAM SUERO
Valores de referencia:	(0.5 - 0.9) (Sup. 1.8) Toxicidad

Descripción:	BROMAZEPAM SUERO
Código:	BROMAZEPAM
Técnica:	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)
Unidades:	µg/L
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero SIN gel separador Volumen mínimo: 1 mL La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la toma de la dosis.
Valores de referencia:	(50 - 200) Intervalo terapéutico (Inf. 10) Límite de cuantificación (Sup. 300) Toxicidad

Descripción:	BROMUROS EN ORINA
Código:	BROMUR2
Técnica:	Cromatografía líquida de alta resolución.
Unidades:	mg/L
Plazo:	24 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	10 ML orina (micción aislada)
Valores de referencia:	(Inf. 15) Personal no expuesto (Inf. 115) Personal expuesto

Descripción:	BROMUROS EN SUERO
Código:	BROMUROS
Técnica:	HPLC
Unidades:	mg/L
Plazo:	23 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 12) Final semana laboral (exposición a Bromuro de metilo); BLW-DFG (200 - 1200) Niveles terapeúticos (tratamiento con Bromuros) (Sup. 3000) Niveles tóxicos (tratamiento con Bromuros)

Descripción:	Bronquiectasia idiopática. Sec Gen: SCNN1A
Código:	GEN_000078
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	BRUCELLA ABORTUS ANTICUERPOS, SUERO
Código:	BRAB
Técnica:	Aglutinación

Descripción:	BRUCELLA ABORTUS ANTICUERPOS, SUERO
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Siero refrigerado
Valores de referencia:	Titulo inferior a 1/80 Negativo

Descripción:	BRUCELLA AC. IGG LCR
Código:	BRUCEACGLC
Técnica:	EIA
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 1.00) Negativo (Sup. 1.00) Positivo

Descripción:	BRUCELLA AC. IGG SUERO
Código:	BRUCELAACG
Técnica:	EIA
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero Alternativa: Plasma de EDTA/Heparina/Citrato
Valores de referencia:	(Inf. 0.8) Negativo La determinación de Ac IgG es útil para confirmar el diagnóstico de la enfermedad aunque no permite discernir entre curación y evolución a cronicidad ya que los anticuerpos pueden persistir en sujetos curados.

Descripción:	BRUCELLA AC. IgM LCR
Código:	BRUCEACMLC
Técnica:	EIA
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 1.00) Negativo (Sup. 1.00) Positivo

Descripción:	BRUCELLA AC. IGM SUERO
Código:	BRUCELAACM
Técnica:	EIA
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero Alternativa: Plasma de EDTA/Heparina/citrato
Valores de referencia:	(Inf. 0.8) Negativo

Descripción:	BRUCELLA AC. SEROAGLUTINACION
Código:	AGLUBRU
Técnica:	AGLUTINACIÓN
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	Compatible con primoinfectados >1/160; Pueden aparecer resultados negativos en fases avanzadas de la enfermedad.

Descripción:	BRUCELLA AGLUTINACION EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
Código:	AGLUBRLC
Técnica:	Aglutinación
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	BRUCELLA ANTICUERPOS INCOMPLETOS SUERO
Código:	BRUCEIMCOM
Técnica:	Técnica inmunocaptura-aglutinación
Unidades:	
Plazo:	23 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml suero
Valores de referencia:	Se considera resultado positivo a partir de título 1:320

Descripción:	BRUCELLA SPP DNA, MUESTRA BIOLÓGICA
Código:	BRUCESPPCR
Técnica:	PCR Nested
Unidades:	
Plazo:	10 días
Tubo:	Muestra envios externos
Comentario adicional:	1 tubo sangre total EDTA. refrigerar. 2 ml Orina en contenedor estéril. refrigerar. 1 pieza tejido parafinadp. Temperatura ambiente LCR en tubo esteril. Congelar Heces recogidas en tubo estéril. Congelar. tejido suero fisiológico. Congelar
Valores de referencia:	

Descripción:	BRUCELLA TEST DE COOMBS SUERO
Código:	COOMBSBRU
Técnica:	Aglutinación de Ac. Incompletos
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	

Descripción: Bruck, Sd. Sec Gen: PLOD2
Código: GEN_000694
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: BUN (NITROGENO UREICO)
Código: BUN
Técnica: Enzimático colorimétrico.
Unidades: mg/dL
Plazo: 2 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 3 mL suero.
Valores de referencia: (7 - 20) 1 año - 17 años
(8 - 24) Hombre > 17 años
(6 - 21) Mujer > 17 años

Descripción: BUPRENORFINA
Código: BUPRENORF
Técnica: LC-MS/MS
Unidades: ng/mL
Plazo: 9 días
Tubo: Orina congelada
Comentario adicional: 10 mL orina (micción aislada). CONGELAR Y ENVIAR CONGELADA.
Valores de referencia:

Descripción: BUPROPION SUERO
Código: BUPROPION
Técnica: Cromatografía Líquida/Tándem Masas (LC-MS/MS)
Unidades: ng/mL
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero.
Valores de referencia: (850 - 1500) Rango terapéutico (AGNP 2017)

Descripción: Buschke-Ollendorff, Sd. Sec Gen: LEMD3
Código: GEN_000079
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: C1Q ANTICUERPOS SUERO
Código: C1QAC
Técnica: ENZIMOINMUNOANÁLISIS

Descripción:	C1Q ANTICUERPOS SUERO
Unidades:	U/mL
Plazo:	14 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero. Volumen mínimo: 0,50 mL
Valores de referencia:	(Inf. 9.99) Negativo

Descripción:	C4b-BP (PROTEINA LIGANTE PROTEINA S)
Código:	C4B.BP
Técnica:	Inmunoanálisis.
Unidades:	%
Plazo:	9 días
Tubo:	Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:	.Congelar y enviar congelado.
Valores de referencia:	(68 - 140)

Descripción:	CA 125 II SUERO
Código:	CA125
Técnica:	CMIA
Unidades:	UI/mL
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Determinación realizable en Líquidos Biológicos
Valores de referencia:	(Inf. 35)

Descripción:	CA 15-3 suero
Código:	CA153
Técnica:	CMIA
Unidades:	UI/mL
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Determinación realizable también en Liquidos Biológicos
Valores de referencia:	(Inf. 32)

Descripción:	CA 199 EN MUESTRA
Código:	CA199MUEST
Técnica:	ECLIA
Unidades:	UI/mL
Plazo:	
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	CA 19-9 SUERO
Código:	CA199
Técnica:	ECLIA
Unidades:	U/mL
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal

Descripción:	CA 19-9 SUERO
Comentario adicional:	Suero y Plasma tratado con heparina (litio, sodio, amonio) y EDTA tripotásico. No emplear plasma con citrato de sodio.
Valores de referencia:	(Inf. 34) Observaciones: Los pacientes con grupo sanguíneo Lewis a-b- (aproximadamente el 6 % de la población) no expresan el determinante antigénico CA 19-9 ni siquiera en presencia de una enfermedad maligna. Esto tiene que tenerse en cuenta ante resultados indetectables.

Descripción:	CA 242 (MARCADOR TUMORAL), SUERO
Código:	CA242
Técnica:	EIA
Unidades:	U/mL
Plazo:	12 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. 1 mL
Valores de referencia:	(Inf. 44)

Descripción:	CA 50 SUERO
Código:	CA50
Técnica:	CLIA
Unidades:	U/mL
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero congelado
Valores de referencia:	(Inf. 25)

Descripción:	CA 72-4 SUERO (TAG-72)
Código:	CA72.4
Técnica:	INMUNOQUIMIOLUMINISCENCIA
Unidades:	U/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Alternativo 1 ml de plasma (EDTA o de Heparina litio, Heparina sódica)
Valores de referencia:	(Inf. 6.9)

Descripción:	Ca. de colon HNPCC: <10 genes (NGS)
Código:	LYNCH_MUTS
Técnica:	PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:	
Plazo:	45 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	CA-27.29 en suero
Código:	CA27.29
Técnica:	Quimioluminiscencia.
Unidades:	U/mL
Plazo:	5 días

Descripción: CA-27.29 en suero
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero. Refrigerar
Volumen: 1.0 mL
Volumen mínimo: 0.50 mL
Valores de referencia: (Inf. 38.6)

Descripción: CADASIL: gen NOTCH3 (NGS)
Código: CADASILTOT
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Código: CADENASLI2
Descripción: CADENAS LIGERAS LIBRES ORINA KAPPA LAMBDA
Técnica: Nefelometría
Comentario adicional: 10 ml orina.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	KAPPALIB2	38176-4		CADENAS LIGERAS KAPPA LIBRES EN ORINA	mg/dL	(Inf. 3.29)
Prueba	LAMBDALIB2	38178-0		CADENAS LIGERAS LAMBDA LIBRES EN ORINA	mg/dL	(Inf. 0.38)

Código: FREELITE
Descripción: CADENAS LIGERAS LIBRES SUERO
Técnica: Inmunoanálisis
Comentario adicional: Suero. Refrigerado

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	FREELITEK	36916-5		CADENAS LIGERAS LIBRES KAPPA SUERO	mg/dL	(0.33 - 1.94)
Prueba	FREELITEL	33944-0		CADENAS LIGERAS LIBRES LAMBDA SUERO	mg/dL	(0.57 - 2.63)
Prueba	FREELITECO	48378-4		COCIENTE KAPPA/LAMBDA LIBRES SUERO		(0.26 - 1.65)

Descripción: CADMIO SANGRE
Código: CD
Técnica: ICP-MS
Unidades: µg/L
Plazo: 5 días

Descripción:	CADMIO SANGRE
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	Sangre total EDTA Dipotásico (libre trazas metales)
Valores de referencia:	(Inf. 1) .Población no expuesta. (Inf. 5) .Valor límite biológico recomendado por INHST (2017) para exposición a cadmio y compuestos inorgánicos.

Descripción:	CAFEÍNA SUERO
Código:	CAFEIN
Técnica:	LC-MS/MS
Unidades:	mg/L
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	(2.00 - 10.00)

Descripción:	Caffey, enfermedad de. Sec Gen: COL1A1
Código:	GEN_000080
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Calcif. cerebr. fam. primaria: SLC20A2, PDGFRB, PDGFB, XPR1
Código:	CALCI_CERE
Técnica:	PCR y secuenciación
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	Calcinosis tumoral hipofosfatémica: gen GALNT3 (NGS)
Código:	GALNT3_MUT
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	CALCIO CORREGIDO
Código:	CACORLGS
Técnica:	
Unidades:	mg/dL
Plazo:	2 días

Descripción:	CALCIO CORREGIDO
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(8.80 - 10.60) > 12 años

Descripción:	CALCIO ERITROCITARIO, SANGRE
Código:	CAERI
Técnica:	Absorción atómica.
Unidades:	mmol/L
Plazo:	7 días
Tubo:	Heparina Litio
Comentario adicional:	Sangre total Heparina litio. Refrigerar.
Valores de referencia:	(1.12 - 1.58)

Descripción:	CALCIO IONICO
Código:	CAIONICO
Técnica:	Electrodo selectivo.
Unidades:	mmol/L
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 mL suero. Separar y congelar
Valores de referencia:	(1.01 - 1.36)

Descripción:	CALCIO TOTAL
Código:	CA
Técnica:	
Unidades:	mg/dL
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(7.6 - 10.4) < 10 dias (9.0 - 11.0) 10 dias - 2 años (8.8 - 10.8) 2 años - 12 años (8.8 - 10.6) > 12 años

Descripción:	CALCIO TOTAL ORINA
Código:	CA2
Técnica:	Colorimetría.
Unidades:	mg/24h
Plazo:	2 días
Tubo:	Orina 24 Horas
Comentario adicional:	.Indicar diuresis.
Valores de referencia:	(100 - 300)

Descripción:	CALCITONINA
Código:	CALCITO
Técnica:	Téc. CLIA
Unidades:	pg/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Congelado

Descripción:	CALCITONINA
Comentario adicional:	0.5 mL suero. Congelar y enviar congelado. No existe muestra alternativa
Valores de referencia:	(Inf. 11.8) Hombre (Inf. 4.8) Mujer

Descripción:	CALCULO BILIAR
Código:	CALCULBI
Técnica:	Espectrofotometría infrarroja
Unidades:	
Plazo:	6 días
Tubo:	Cálculo
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	CALCULO SALIVAL
Código:	CALCULOSAL
Técnica:	Espectrofotometría infrarroja.
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Cálculo
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	CALCULO URINARIO
Código:	CALCULOR
Técnica:	Espectroscopía infrarroja.
Unidades:	
Plazo:	6 días
Tubo:	Cálculo
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	CALCULO URINARIO 2ºMUESTRA
Código:	CALCULOR2
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	
Tubo:	Cálculo
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	CALPROTECTINA EN HECES
Código:	CALPROTEC
Técnica:	CLIA
Unidades:	µg/g
Plazo:	5 días
Tubo:	Heces No Microbiología
Comentario adicional:	Se recomienda recoger las primeras heces del día. Preferiblemente heces formes. Evitar heces sanguinolentas. Enviar congeladas.

Descripción:	CALPROTECTINA EN HECES
Valores de referencia:	(Inf. 50) No son indicativos de inflamación del tracto intestinal.

Descripción:	CALPROTECTINA EN SUERO
Código:	CALPROSUE
Técnica:	Inmunoturbidimetría
Unidades:	ng/mL
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	Suero congelado
Valores de referencia:	(Inf. 3000)

Descripción:	CAMPYLOBACTER JEJUNI AC. IGG LCR
Código:	JEJUACGLCR
Técnica:	EIA
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 ml LCR
Valores de referencia:	(Inf. 0.80) Negativo (0.80 - 1.09) Indeterminado

Descripción:	CAMPYLOBACTER JEJUNI AC. IGA
Código:	JEJUNIACA
Técnica:	EIA
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	(Inf. 0.80) Ausencia de niveles detectables de anticuerpos (0.80 - 1.09) Zona límite

Descripción:	CAMPYLOBACTER JEJUNI AC.IGG
Código:	JEJUNACG
Técnica:	EIA
Unidades:	Indice
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml suero. Alt. plasma (EDTA, citrato, heparina)
Valores de referencia:	(Inf. 20) Negativo (20 - 30) Indeterminado

Descripción:	Camurati-Engelmann, enfermedad de. Sec Gen: TGFB1
Código:	GEN_000081
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Descripción: Camurati-Engelmann, enfermedad de. Sec Gen: TGFB1
Valores de referencia:

Código: CANACALCR
Descripción: CANALES DE CALCIO AC. LCR
Técnica: RADIOINMUNOANÁLISIS
Comentario adicional: 1 mL LCR (Refrigerado)

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	CANCAPLCR	5010766		PERFIL CANALES CALCIO AC. LCR TIPO PQ	pmol/L	(Inf. 40.0)
Prueba	CANCANLCR	5010765		PERFIL CANALES CALCIO AC. LCR TIPO N		(Inf. 15.0) Ratio

---

Descripción: CANALES DE CALCIO AC. SUERO TIPO P
Código: CANACAACPQ
Técnica: Radioisotópica
Unidades: pmol/L
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: suero
Valores de referencia: (Inf. 30) Negativo
La detección de anticuerpos contra los canales de calcio tipo P es fundamental para el diagnóstico del Síndrome de Lambert Eaton, estando presentes en aproximadamente el 85-90% de los pacientes.

Descripción: CANALES DE POTASIO AC. LCR
Código: CANAKACLCR
Técnica: Radioinmunoanálisis
Unidades: pmol/L
Plazo: 11 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 ml LCR
Valores de referencia: (Inf. 10)

Descripción: CANALES DE POTASIO AC. SUERO
Código: CANAKAC
Técnica: Radioisotópica
Unidades: pmol/L
Plazo: 32 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: (Inf. 72.0)

Descripción: Canalopatías del sistema nervioso central. Panel
Código: GEN_000082
Técnica:
Unidades:

Descripción: Canalopatías del sistema nervioso central. Panel
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Canalopatias panel genes
Código: PHARMALAP2
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Imprescindible enviar la historia clínica y formulario de petición de genética o consentimiento informado
Valores de referencia:

Descripción: Canavan, enfermedad de. Sec Gen: ASPA
Código: GEN_000083
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer colon no polipósico familiar. Sec Gen: BMPR1A
Código: GEN_000087
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer colon. Poliposis adenomatosa atenuada. Gen MUTYH
Código: MUTYH_MUTS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer de colon familiar ampliado. Panel
Código: GEN_000084
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Cáncer de colon familiar ampliado. Panel
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer de colon familiar. Panel
Código: GEN_000085
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer de colon HNPCC: gen MLH1 (NGS)
Código: MLH1_MUTS
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer de colon HNPCC: gen MSH2 (NGS)
Código: MSH2_MUTS
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer de colon HNPCC: gen MSH6 (NGS)
Código: MSH6_MUTS
Técnica: PCR, secuenciación, y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer de colon HNPCC: gen PMS2 (NGS)
Código: PMS2_MUTS
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Cáncer de colon HNPCC: gen PMS2 (NGS)
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer de colon no polipósico familia. Sec Gen: EPCAM
Código: GEN_000515
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer de colon no polipósico familiar. Sec Gen: MLH3
Código: GEN_000090
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer de colon no polipósico familiar. Sec Gen: PMS1
Código: GEN_000086
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer de colon: expresión de MYH
Código: MYH_INMUN
Técnica: Inmunohistoquímica
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Muestra: tejido incluido en parafina.
Una vez hechos los cortes que se necesitan para el análisis, se devuelve el bloque al paciente/médico.
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer de mama / ovario familiar. Sec Gen: BRCA1
Código: GEN_000091
Técnica: Secuenciación masiva (NGS)
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.

Descripción: Cáncer de mama / ovario familiar. Sec Gen: BRCA1
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer de mama / ovario familiar. Sec Gen: BRCA2
Código: GEN_000092
Técnica: Secuenciación masiva (NGS)
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente
.
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer de mama / ovario familiar. Sec Gen: RAD51D
Código: GEN_000093
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo:
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer de próstata familiar. Panel NGS > 10 genes
Código: PROSTATAH
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer de pulmón NSCLC: reordenamientos EML4-ALK
Código: EML4_ALK
Técnica:
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Muestras: tejido incluido en parafina.
Una vez hechos los cortes que se necestian para el estudio, devolvemos el bloque al paciente / médico.
Rotular ONCO.
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer endometrio familiar. Panel NGS < 10 genes
Código: ENDOMETRH
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Descripción: Cáncer endometrio familiar. Panel NGS < 10 genes

Valores de referencia:

Descripción: Cáncer familiar de mama y ovario: genes BRCA1 y BRCA2 (NGS)

Código: BRCA1.2

Técnica: Secuenciación masiva (NGS)

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Alternativas: Heparina y Citrato.

Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente

Valores de referencia:

Descripción: Cáncer familiar de mama y ovario: genes BRCA1 y BRCA2 MLPA

Código: BRCA_MLPA

Técnica: MLPA

Unidades:

Plazo: 20 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún apataro, y rotulado con BM.

Alternativas: Heparina o Citrato.

Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente

Valores de referencia:

Descripción: Cáncer familiar de mama y ovario: sec. BRCA1 y BRCA2 (NGS)

Código: BRCA1.2SEC

Técnica: Secuenciación masiva (NGS)

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún apataro, y rotulado con BM.

Alternativas: Heparina o Citrato.

Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente

Valores de referencia:

Descripción: Cáncer familiar de mama, ovario y colon: 20 genes (NGS)

Código: BRCA_PLUS

Técnica: NGS

Unidades:

Plazo: 20 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo DE EDTA para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Alternativas: Citrato

Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente

Valores de referencia:

Descripción: Cáncer gástrico difuso hereditario: gen CDH1 (NGS)

Código: CANCERGAST

Técnica: PCR, secuenciación y MLPA

Unidades:

Descripción: Cáncer gástrico difuso hereditario: gen CDH1 (NGS)
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato y muestra de tejido.
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer gástrico familiar. Panel NGS > 10 genes
Código: GASTRICOH
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer hereditario: secuenciación >150 genes
Código: PANCANCER
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún apataro, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer hereditario: secuenciación >150 genes (SIN INFORME)
Código: PANCAN_VCF
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Muestra: sangre EDTA BM.
Solo análisis (SIN INFORME)
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer páncreas familiar. Panel NGS > 10 genes
Código: PANCREASH
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Valores de referencia:

Descripción: Cáncer renal familiar. Panel NGS > 10 genes
Código: RENALH
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días

Descripción:	Cáncer renal familiar. Panel NGS > 10 genes
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Valores de referencia:	

Descripción:	CANDIDA ALBICANS AC. IGA
Código:	CANDIDAIGA
Técnica:	EIA
Unidades:	
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero (Refrigerado) Alternativa: Plasma citrato, plasma heparina
Valores de referencia:	(Inf. 9) Negativo

Descripción:	CANDIDA ALBICANS AC. IGG SUERO
Código:	CANDIDA
Técnica:	Técnica CLIA
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 0.90) Negativo

Descripción:	CANDIDA ALBICANS AC. IGM
Código:	CANDIDAIGM
Técnica:	EIA
Unidades:	
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero (Refrigerado) Alternativa: Plasma citrato, plasma heparina
Valores de referencia:	(Inf. 9) Negativo

Descripción:	CANDIDA ANTIGENO MANANO SUERO
Código:	CANDIMANA
Técnica:	EIA
Unidades:	
Plazo:	6 días
Tubo:	
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	(Inf. 1) Negativo (Sup. 1) Positivo

Descripción:	CANDIDA SPP DNA, MUESTRA BIOLÓGICA
Código:	DCSM
Técnica:	RT-PCR
Unidades:	
Plazo:	8 días
Tubo:	Muestra envios externos

Descripción:	CANDIDA SPP DNA, MUESTRA BIOLÓGICA
Comentario adicional:	LCR. refrigerar. Exudado vaginal. refrigerar. Orina (primera micción). refrigerar. Secreción vaginal en torunda de dacrón con vástago de plástico. Se acepta torunda en medio de transporte (Stuart o Amies refrigerado) y frasco SurePath. Rechazo: Torunda de algodón y/o vástago de madera.
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta

Descripción:	CANNABINOIDES SINTETICOS (AB-PINACA)EN ORINA
Código:	PINACA
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	2 días
Tubo:	Orina Drogas de Abuso
Comentario adicional:	orina micción aislada
Valores de referencia:	Valor discriminante de la técnica: 5 ng/ml

Descripción:	CANNABIS
Código:	CANNA
Técnica:	Inmunoensayo
Unidades:	
Plazo:	2 días
Tubo:	Orina Drogas de Abuso
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	CANNABIS CONFIRMACION EN SALIVA
Código:	CANNASAL
Técnica:	LC-MS/MS
Unidades:	ng/mL
Plazo:	10 días
Tubo:	Saliva
Comentario adicional:	Saliva recogida en kit ORAL-EZE. Solicitar kit en el almacén.
Valores de referencia:	

Descripción:	CANNABIS EN PELO (NEODIAGNOSTICA)
Código:	CANNAPELO
Técnica:	Cromatografia líquida/Tanden masas (LC-MS/MS)
Unidades:	
Plazo:	17 días
Tubo:	Tubo Especial
Comentario adicional:	PEDIR KIT ESPECIAL: almacen@ctes.eurofinseu.com PEDIR PROTOCOLO DE TOMA DE MUESTRA: calidad@ctes.eurofinseu.com -Análisis Informativo: incluye kit de toma de muestra y formulario de solicitud -Cadena custodia: En caso de solicitar el análisis con validez judicial, solicitar al almacen tambien documentación de cadena custodia (acta de toma de muestra y hoja de seguimiento). El protocolo de cadena custodia debe solicitarse a calidad@ctes.eur En el caso de cadena custodia debe recogerse la muestra por duplicado.
Valores de referencia:	

Descripción:	CANVAS: gen RFC1 expansión (AAGGG)n
Código:	RFC1_MUT
Técnica:	

Descripción:	CANVAS: gen RFC1 expansión (AAGGG)n
Unidades:	
Plazo:	40 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	CAPACIDAD TOTAL FIJACION DE HIERRO (TIBC)
Código:	TIBC
Técnica:	
Unidades:	µg/dL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(230 - 400)

Descripción:	CARBAMAZEPINA
Código:	CARBA
Técnica:	Enzimoinmunoensayo.
Unidades:	µg/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(4 - 10) Rango Terapeútico

Descripción:	CARBAMAZEPINA 10:11 EPOXIDO
Código:	CARBAEPOX
Técnica:	LC-MS/MS
Unidades:	µg/mL
Plazo:	16 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	3 mL
Valores de referencia:	(0.80 - 3.20)

Descripción:	CARBAMAZEPINA LIBRE SUERO (TEGRETOL LIBRE)
Código:	CARBALI
Técnica:	Ultrafiltración/EIA (Ultrafiltración/Inmunoluminiscencia desde el 4-2012)
Unidades:	mcg/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	3 mL
Valores de referencia:	(1 - 3)

Descripción:	CARBIDOPA
Código:	CARBIDOPA
Técnica:	Cromatografía líquida / Tándem masas (LC-MS/MS)
Unidades:	mcg/L
Plazo:	12 días
Tubo:	Suero Basal

Descripción: CARBIDOPA
Comentario adicional: 2 mL suero. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO
Valores de referencia: (20 - 200)

Descripción: CARBOXIHEMOGLOBINA
Código: COHB
Técnica: Espectroscopía de absorción visible.
Unidades: %
Plazo: 4 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 5 mL sangre total EDTA.
Valores de referencia: (Inf. 3.5) Exposición a monóxido de carbono
(Inf. 10) Fumadores
(Sup. 20) Tóxico

Descripción: Carcinoma medular de tiroide familiar. Sec Gen: RET
Código: GEN_000102
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Carcinoma papilar familiar cels renales. Sec Gen: MET
Código: GEN_000103
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Código: CARDINESCO
Descripción: CARDIOINCODE SCORE
Técnica: array
Comentario adicional: 2 tubos EDTA + cuestionario CardioIncode, todo en un sobre rotulado como INCODE

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	SCORPMF			CARDIOSCORE POLIMORFISMOS		
Prueba	SCORIESGO			CARDIOSCORE RIESGO		

Descripción: CARDIOLIPINA AC. IGG SUERO
Código: CARDIACG
Técnica: EIA
Unidades: GLP-U/mL
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal

Descripción:	CARDIOLIPINA AC. IGG SUERO
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 10) Negativo (10 - 40) Indeterminado

Descripción:	CARDIOLIPINA AC. IGM SUERO
Código:	CARDIACM
Técnica:	EIA
Unidades:	MLP-U/mL
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 10) Negativo (10 - 40) Indeterminado

Descripción:	CARDIOLIPINAS AC. IGA SUERO
Código:	CARDIACA
Técnica:	EIA
Unidades:	ALP-U/mL
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 mL Suero. Alternativa: Plasma
Valores de referencia:	(Inf. 14) Negativo (14 - 20) Indeterminado

Descripción:	CARIOTIPO EN SANGRE DE CORDON UMBILICAL
Código:	CARIOCUMB
Técnica:	Cultivo celular
Unidades:	
Plazo:	10 días
Tubo:	Heparina Litio
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	CARIOTIPO EN TEJIDOS
Código:	CARIOTEJ
Técnica:	Cultivo celular
Unidades:	
Plazo:	21 días
Tubo:	Muestra Citogenética
Comentario adicional:	Biopsia o restos abortivos en medio RPMI
Valores de referencia:	

Descripción:	CARIOTIPO EN VELLOSIDADES CORIONICAS
Código:	CARIOCORIO
Técnica:	Cultivo celular
Unidades:	
Plazo:	21 días
Tubo:	GENETICA

Descripción: CARIOTIPO EN VELLOSIDADES CORIONICAS
Comentario adicional: Vellosidad corial en medio RPMI.
Valores de referencia:

Descripción: CARIOTIPO LIQUIDO AMNIOTICO
Código: CARIOAMN
Técnica: Cultivo celular
Unidades:
Plazo: 21 días
Tubo: LIQUIDO CITOGENETICA
Comentario adicional: 15-20 mL Líquido amniótico a tª ambiente.
Enviar la muestra preferentemente en dos tubos truncados esteriles de 10 mL
Se requiere consentimiento informado
Se requiere información clínica, imprescindible semanas de gestación y teléfono de contacto del médico prescriptor.
Valores de referencia:

Descripción: CARIOTIPO MEDULA OSEA
Código: CARIOMED
Técnica: Cultivo celular
Unidades:
Plazo: 21 días
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional: Médula ósea en medio RPMI
Conservar en nevera
Valores de referencia:

Descripción: CARIOTIPO ONCOLOGICO EN SANGRE PERIFÉRICA
Código: CARIOSPMD
Técnica:
Unidades:
Plazo: 21 días
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional: HEPARINA
conservar y transportar a 4ºC
Valores de referencia:

Descripción: CARIOTIPO SANGRE ALTA RESOLUCION
Código: CARIOSAR
Técnica: Cultivo celular
Unidades:
Plazo: 21 días
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional: 5 ml sangre total Heparina de litio.
Envío inmediato a temperatura ambiente.
Se requiere información clínica.

Alternativa sangre total Heparina de sodio.
Valores de referencia:

Descripción: CARIOTIPO SANGRE PERIFERICA
Código: CARIOTIP
Técnica: Cultivo celular

Descripción:	CARIOTIPO SANGRE PERIFERICA
Unidades:	
Plazo:	21 días
Tubo:	Heparina Litio
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	CARNITINA LIBRE ORINA
Código:	CARNILI2
Técnica:	LC-MS/MS
Unidades:	mcmol/g crea.
Plazo:	12 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	5 mL de orina. Congelar y enviar congelado.
Valores de referencia:	(Inf. 1066)

Descripción:	CARNITINA LIBRE PLASMA
Código:	CARNITILIB
Técnica:	Cromatografía líquida/Tándem masas (LC-MS/MS)
Unidades:	µmol/L
Plazo:	12 días
Tubo:	Plasma de Heparina Congelado
Comentario adicional:	2 ml de plasma (HEPARINA).CONGELAR y enviar congelado. Alternativa: Suero congelado
Valores de referencia:	(10.6 - 56.0) < 1 mes (16.2 - 60.7) 1 mes - 1 año (17.6 - 49.1) 1 año - 8 años (18.6 - 53.9) 8 años - 18 años (19 - 60.7) > 18 años

Descripción:	CARNITINA LIBRE PLASMA SEMINAL
Código:	CARNILISE
Técnica:	LC-MS/MS
Unidades:	mcmol/L
Plazo:	12 días
Tubo:	Semen
Comentario adicional:	1 mL plasma seminal
Valores de referencia:	(250 - 620)

Descripción:	CARNITINA TOTAL PLASMA (PERFIL)
Código:	CARNITITOT
Técnica:	Cromatografía líquida/Tándem masas (LC-MS/MS)
Unidades:	µmol/L
Plazo:	12 días
Tubo:	Plasma de Heparina Congelado
Comentario adicional:	1 mL plasma (heparina). CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.

Descripción: CARNITINA TOTAL PLASMA (PERFIL)

Valores de referencia:
(12.7 - 69.0) < 1 mes
(18.3 - 74.8) 1 mes - 1 año
(26.1 - 62.2) 1 año - 8 años
(25.1 - 64.1) 8 años - 18 años
(25.2 - 77.1) > 18 años

Descripción: CASPR1 (CONTACTIN-ASSOC.PROTEIN-1) SUERO

Código: CASPR1

Técnica: Inmunofluorescencia indirecta (cell binding assay)

Unidades:

Plazo: 47 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 1 mL suero

Valores de referencia:

Descripción: Catarata congénita, miocardiopatía hipertrófica. Gen SLC25A4

Código: GEN_000105

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Catarata nuclear tipo 23. Sec Gen: CRYAB

Código: GEN_000106

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Código: CATECOL2BA

Descripción: CATECOLAMINAS EN ORINA ESPONTANEA

Técnica: Cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) acoplada a detector electroquímico

Comentario adicional: Añadir a 10 ml orina espontanea, 60 ul de HCL 5N Identificar tubo con el comentario +ácido

No ingerir 5 días antes de la recolección de la orina; té, café, plátano, chocolate, vainilla, queso, bebidas carbonatadas ni ningún tipo de medicamento especialmente de salicilatos, medicación hipotensora y contrastes con yodo (solo hacerlo bajo pres

Evitar cualquier tipo de ejercicio físico no habitual . Evitar el estrés. (3 días antes de la toma de muestra)

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	ADRE2BAS	13734-9		PERFIL CATECOLAMINAS EN ORINA ESPONTANEA ADRENALINA	ug/g creatinina	(Inf. 75) < 1 año (Inf. 39) 1 año - 5 años (Inf. 29) 5 años - 10 años (Inf. 18) 10 años - 15 años (Inf. 12) > 16 años

Componentes						
Prueba	NORAD2BAS	13782-8		PERFIL CATECOLAMINAS EN ORINA ESPONTANEA NORADRENALINA	ug/g creatinina	(36 - 272) < 3 meses (28 - 197) 3 meses - 6 meses (28 - 195) 6 meses - 12 meses (12 - 139) 1 año - 2 años (9 - 91) 2 años - 5 años (6 - 72) 5 años - 10 años (4 - 53) > 10 años
Prueba	DOPAM2BASA	13733-1		DOPAMINA/CREATININA	ug/g creatinina	(193 - 2675) < 3 meses (458 - 2453) 3 meses - 6 meses (463 - 1933) 6 meses - 12 meses (220 - 1654) 1 año - 2 años (168 - 1156) 2 años - 5 años (72 - 847) 5 años - 10 años (Inf. 450) 10 años - 18 años (Inf. 350) > 18 años

Código: CATECOF

Descripción: CATECOLAMINAS FRACCIONADAS PLA

Técnica: LC-MS/MS

Comentario adicional: plasma de (EDTA). Separar el plasma lo antes posible, CONGELAR INMEDIATAMENTE Y ENVIAR CONGELADO.
Volumen: 2.0 mL
Volumen mínimo: 1.00 mL

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	NORADRENA	2666-6		Perfil, Noradrenalina en plasma	pg/mL	(Inf. 420)
Prueba	ADRENALI	2230-1		Perfil, Adrenalina en plasma	pg/mL	(Inf. 84) Posición supina, relajada (Inf. 150) Posición ortostática
Prueba	DOPAMINA	2216-0		Perfil, Dopamina en plasma	pg/mL	(Inf. 85) El contenido en sal de la dieta y la edad son otros factores que influyen en los niveles de catecolaminas fraccionadas en plasma.

Código: CATECO2

Descripción: CATECOLAMINAS ORINA 24 HORAS

Técnica: Cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) acoplada a detector electroquímico

Comentario adicional: 20 ml orina 24 horas con 60 ul de HCL 5N. Indicar diuresis de orina.Identificar tubo con el comentario +ácido
No ingerir 5 días antes de la recolección de la orina; té, café, plátano, chocolate, vainilla, queso, bebidas carbonatadas ni ningún tipo de medicamento especialmente de salicilatos, medicación hipotensora y contrastes con yodo.
Evitar cualquier tipo de ejercicio físico no habitual . Evitar el estrés. (3 días antes de la toma de muestra)

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	NORADRENA2	2668-2		PERFIL CATECOLAMINAS ORINA 24 HORAS NORADRENALINA	µg/24h	(Inf. 105) Límite de cuantificación: 4µg/L
Prueba	ADRENALI2	2232-7		PERFIL CATECOLAMINAS ORINA 24 HORAS ADRENALINA	µg/24h	(Inf. 20) Límite de cuantificación: 4µg/L

Componentes						
Prueba	DOPAMINA2	2218-6		PERFIL CATECOLAMINAS ORINA 24 HORAS DOPAMINA	µg/24h	(Inf. 446) Límite de cuantificación: 7µg/L
Prueba	HORAS_VOL			VOLUMEN DE ORINA: HORAS		
Prueba	VOL_ORINA			Volumen de orina mL	c.c.	

Descripción:	CBFB/MYH11(inv(16)(p13q22)) · RT-PCR
Código:	CBFB_MYH11
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional:	3 tubos de EDTA exclusivos para esta determinación: tubo sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO. Muestra: sangre periférica o médula ósea NO PINCHAR VIERNES NI VÍSPERAS DE FESTIVOS: la sangre se empieza a procesar dentro de las primeras 48 horas desde la extracción
Valores de referencia:	

Descripción:	CCL5 (RANTES), SUERO
Código:	CCL5
Técnica:	ELISA
Unidades:	pg/mL
Plazo:	17 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 mL de suero congelado.
Valores de referencia:	

Descripción:	CD3 CD4 DR
Código:	CD3CD4DR
Técnica:	
Unidades:	% sobre CD4
Plazo:	4 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(3 - 12) 2 años - 5 años (3 - 13) 5 años - 10 años (4 - 11) 10 años - 16 años (4 - 11) > 16 años

Descripción:	CD3 CD8 DR
Código:	CD3CD8DR
Técnica:	
Unidades:	% sobre CD8
Plazo:	4 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	

Descripción:	CD3 CD8 DR
Valores de referencia:	(7 - 37) 2 años - 5 años (6 - 29) 5 años - 10 años (5 - 25) 10 años - 16 años (5 - 25) > 16 años

Descripción:	CD3-CD56+CD16+ TOTALES
Código:	CD3_5616T
Técnica:	
Unidades:	/µL
Plazo:	
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	1 tubo de EDTA de 5ml
Valores de referencia:	

Descripción:	CEA (ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO)
Código:	CEA
Técnica:	CMIA
Unidades:	ng/mL
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL.
Valores de referencia:	(Inf. 5)

Descripción:	Cegeura congénita: >10 genes (NGS)
Código:	CEGUERACON
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM. Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	Ceguera nocturna estacionaria congénita 2. Sec Gen PDE6B
Código:	GEN_000107
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	CELULAS EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
Código:	LIQLCCE
Técnica:	Recuento manual
Unidades:	/µL
Plazo:	3 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	

Descripción: CELULAS EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
Valores de referencia: (Inf. 5) Leucocitos (/µL)

Descripción: CELULAS ENDOTELIALES ANTICUERPOS
Código: CELENDOTEL
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: Negativo <1/100
Positivo >1/100

Descripción: CELULAS LIQUIDO SINOVIAL
Código: LIQSICE
Técnica: Microscopía óptica
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Código: TMEMORIA
Descripción: CELULAS NAIVE Y MEMORIA T CD45RO/RA
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Perfil	T4T8	65759-3		LINFOCITOS T4/T8 (COCIE		
Prueba	T4NAIVE			perfil LINFOCITOS T CD4 NAIVE CD45RA+ CCR7+	% sobre CD4	(54 - 80) < 2 años (46 - 72) 2 años - 4 años (35 - 69) 4 años - 6 años (32 - 68) 6 años - 8 años (25 - 63) 8 años - 13 años (31 - 57) > 13 años
Prueba	T4CM			perfil LINFOCITOS T CD4 DE MEMORIA CENTRAL CD45 RO+ CCR7+	% sobre CD4	(10 - 26) < 2 años (11 - 20) 2 años - 4 años (9 - 25) 4 años - 6 años (9 - 24) 6 años - 8 años (11 - 25) 8 años - 13 años (10 - 27) > 13 años
Prueba	T4EM			perfil LINFOCITOS T CD4 DE MEMORIA EFECTORA CD45 RO+ CCR7-	% sobre CD4	(3 - 16) < 2 años (9 - 20) 2 años - 4 años (10 - 30) 4 años - 6 años (9 - 32) 6 años - 8 años (12 - 30) 8 años - 13 años (12 - 44) > 13 años
Prueba	T4TEMRA			perfil LINFOCITOS T CD4 TEMRA (CD45 RA+ CCR7-)	% sobre CD4	(3 - 12) < 2 años (3 - 14) 2 años - 4 años (4 - 22) 4 años - 6 años (4 - 15) 6 años - 8 años (4 - 24) 8 años - 13 años (4 - 12) > 13 años

Componentes						
Prueba	T8NAIVE			perfil LINFOCITOS T CD8 NAIVE (CD45RA + CCR7+)	% sobre CD8	(34 - 73) < 2 años (29 - 72) 2 años - 4 años (23 - 68) 4 años - 6 años (30 - 61) 6 años - 8 años (22 - 58) 8 años - 13 años (18 - 61) > 13 años
Prueba	T8CM			perfil LINFOCITOS T CD8 DE MEMORIA CENTRAL (CD45RO+ CCR7+)	% sobre CD8	(3 - 15) < 2 años (2 - 13) 2 años - 4 años (4 - 11) 4 años - 6 años (2 - 12) 6 años - 8 años (2 - 15) 8 años - 13 años (3 - 12) > 13 años
Prueba	T8EM			perfil LINFOCITOS T CD8 DE MEMORIA EFECTORA CD45RO+ CCR7-	% sobre CD8	(9 - 47) < 2 años (14 - 49) 2 años - 4 años (14 - 59) 4 años - 6 años (20 - 45) 6 años - 8 años (24 - 58) 8 años - 13 años (25 - 58) > 13 años
Prueba	T8TEMRA			perfil LINFOCITOS T CD8 TEMRA (CD45RA+ CCR7-)	% sobre CD8	(7 - 25) < 2 años (5 - 25) 2 años - 4 años (6 - 30) 4 años - 6 años (7 - 26) 6 años - 8 años (7 - 26) 8 años - 13 años (5 - 20) > 13 años

Código: NKT

Descripción: CELULAS NKT (CELULAS LGL/T) SUBPOBLACIONES

Técnica:

Comentario adicional: 5 mL DE SANGRE EDTA TOTAL

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	CELBRIGHT			CD56 ++ CELULAS BRIGHT	% sobre NK	(1 - 9)
Prueba	NKCD56CD16			NKCD56+CD16+	% sobre NK	(91 - 99)
Prueba	CD3CD56	17135-5		CD3+CD56+	%	(Inf. 13)
Prueba	CD3_5616	8112-5		CD3-CD56+CD16+	%	(4 - 16)
Prueba	CD3_5616_	5003820		CD3-CD56+CD16-	%	(Inf. 2)
Prueba	CD3_56_16	5003821		CD3-CD56-CD16+	%	(Inf. 2)
Prueba	CD3CD56T	26858-1		CD3+CD56+ TOTALES	/µL	
Prueba	CD3_5616T	9728-7		CD3-CD56+CD16+ TOTALES	/µL	
Prueba	CD3_56_16T			CD3-CD56-CD16+ TOTALES	/µL	
Prueba	CD3_5616_T			CD3-CD56+CD16- TOTALES	/µL	
Prueba	NOTATIP			NOTA TIPAJE LEUCOCITOS SANGRE PERIFERICA		
Prueba	CELULASNK1	5011449		LINFOCITOS NATURAL KILLER SANGRE		
Prueba	CELNK1TOT	53936-1		CELULAS NK TOTALES	/µL	
Prueba	LINFOTOT	30364-4		LINFOCITOS TOTALES (POBLACIONES LINFOCITARIAS)	/µL	(1000 - 4500)

Descripción:	CERULOPLASMINA SUERO
Código:	CERULO
Técnica:	Turbidimetría
Unidades:	mg/dL
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 mL de suero. Alternativa: Heparina litio/sodio
Valores de referencia:	(20 - 60)

Descripción:	Char, Sd. Sec Gen: TFAP2B
Código:	GEN_000108
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Charcot-Marie-Tooth 1: gen EGR2 (NGS)
Código:	CMT1A_EGR2
Técnica:	PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	Charcot-Marie-Tooth 1: gen MPZ (NGS)
Código:	CMT1_MPZ
Técnica:	PCR y secuenciación
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	Charcot-Marie-Tooth 1: gen PMP22 (NGS)
Código:	CMT1_PMP22
Técnica:	PCr y secuenciación
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción: Charcot-Marie-Tooth 1A: deleciones y duplicaciones gen PMP22
Código: CHARCOT.MT
Técnica: MLPA
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Charcot-Marie-Tooth 2: gen MFN2 (NGS)
Código: CMT2A_MFN2
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Charcot-Marie-Tooth 4A: gen GDAP1 (NGS)
Código: CMT4_GDAP1
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Charcot-Marie-Tooth ligado X: gen GJB1 (NGS)
Código: CMTX_CX32
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Charcot-Marie-Tooth tipo 3. Panel
Código: GEN_000109
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Charcot-Marie-Tooth: >10 genes (NGS)
Código: CHARCOT_MT

Descripción: Charcot-Marie-Tooth: >10 genes (NGS)
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Chediak-Higashi, Sd. Sec Gen: LYST
Código: GEN_000110
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: CHIKUNGUNYA AC. IGG EN SUERO
Código: CHIKUNGIGG
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: Índice
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Volumen mínimo: 0.5 mL
Enviar la muestra en un tubo estéril en un embalaje de seguridad biológica
Valores de referencia: (Inf. 0.80) Negativo
(0.80 - 1.10) Indeterminado
(Sup. 1.10) Positivo

Descripción: CHIKUNGUNYA AC. IGM EN SUERO
Código: CHIKUNGIGM
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: Índice
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Volumen mínimo:0.5 mL

Enviar la muestra en un tubo estéril en un embalaje de seguridad biológica
Valores de referencia: (Inf. 0.80) Negativo
(0.80 - 1.10) Indeterminado
(Sup. 1.10) Positivo

Descripción: Chikungunya DNA PCR Cualitativa
Código: CHIKUNGPCR
Técnica: RT-PCR
Unidades:
Plazo: 8 días
Tubo: Muestra envios externos

Descripción:	Chikungunya DNA PCR Cualitativa
Comentario adicional:	1 mL suero, plasma y LCR Muestra a recoger hasta 7 días después de la aparición de síntomas
Valores de referencia:	

Descripción:	CHLAMYDIA ANTIGENO MUESTRA
Código:	CHLAMYDIA
Técnica:	Inmunocromatografía
Unidades:	
Plazo:	6 días
Tubo:	Muestra Microbiología
Comentario adicional:	Torunda específica de Chlamydia. En mujeres toma cervical y en hombres toma uretral u orina
Valores de referencia:	

Descripción:	CHLAMYDIA PNEUMONIAE AC. IGG
Código:	CHLAPNEACG
Técnica:	CLIA
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 0.9) Negativo (0.9 - 1.1) Zona límite (Sup. 1.1) Positivo

Descripción:	CHLAMYDIA PNEUMONIAE AC. IGM
Código:	CHLAPNEACM
Técnica:	CLIA
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 0.90) Negativo (0.90 - 1.10) Indeterminado (Sup. 1.10) Positivo

Descripción:	CHLAMYDIA PNEUMONIAE AC.IGA
Código:	CHLAPNEACA
Técnica:	INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero refrigerado V. min: 0.60 ml
Valores de referencia:	Negativo <1:12 Positivo >1:12

Descripción:	Chlamydia pneumoniae DNA PCR Cualitativa
Código:	CHLAMPNPCR
Técnica:	Q-PCR

Descripción:	Chlamydia pneumoniae DNA PCR Cualitativa
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	Tubo Especial
Comentario adicional:	Muestra respiratoria
Valores de referencia:	

Descripción:	CHLAMYDIA PSITTACI AC. IGA SUERO
Código:	CHLAPSIACA
Técnica:	IFI
Unidades:	Titulo
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml Suero
Valores de referencia:	<1/12 Negativo >1/12 Positivo

Descripción:	CHLAMYDIA PSITTACI AC. IGG SUERO
Código:	CHLAPSIACG
Técnica:	IFI
Unidades:	Titulo
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero Volumen 1 ml (mínimo 0.30 mL)
Valores de referencia:	<1:64 Negativo = o >1:64 Inmunidad adquirida o en evolución

Descripción:	CHLAMYDIA PSITTACI AC. IGM SUERO
Código:	CHLAPSIACM
Técnica:	IFI
Unidades:	Titulo
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml Volumen mínimo 0.30 mL
Valores de referencia:	Negativo <1/12 Positivo > o = 1/12

Descripción:	CHLAMYDIA PSITTACI DNA, SANGRE TOTAL
Código:	DNCPS
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	10 días
Tubo:	Sangre EDTA
Comentario adicional:	sangre total Edta refrigerado.
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta.

Descripción:	CHLAMYDIA TRACHOMATIS AC Ig A SUERO
Código:	CHLATRAACA

Descripción:	CHLAMYDIA TRACHOMATIS AC Ig A SUERO
Técnica:	EIA
Unidades:	NTU
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero Alteratuva: Plasma de citrato/heparina
Valores de referencia:	(Inf. 9) Negativo.

Descripción:	CHLAMYDIA TRACHOMATIS AC. IGG SUERO
Código:	CHLATRAACG
Técnica:	EIA
Unidades:	NTU
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero Alternativa: plasma citrato/heparina
Valores de referencia:	(Inf. 9) Negativo

Descripción:	CHLAMYDIA TRACHOMATIS AC. IGM
Código:	CHLATRAACM
Técnica:	ELISA
Unidades:	NTU
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero Alternativa: Plasma o citrato
Valores de referencia:	(Inf. 9) Negativo

Descripción:	Chlamydia trachomatis DNA PCR Cualitativa
Código:	CHLAMPCR
Técnica:	PCR
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Muestra envios externos
Comentario adicional:	orina . primera micción- REFRIGERAR exudado conjuntival-REFRIGERAR exudado endocervical-REFRIGERAR exudado uretral- REFRIGERAR raspado uretral- REFRIGERAR biopsia corneal-REFRIGERAR semen- REFRIGERAR liquido sinovial- REFRIGERAR Humor vitreo/acuoso- REFRIGERAR
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta

Descripción:	CICLOFOSFAMIDA EN SUERO
Código:	CICLF
Técnica:	GC-MS
Unidades:	mg/L
Plazo:	10 días

Descripción:	CICLOFOSFAMIDA EN SUERO
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL de suero. Refrigerar.
Valores de referencia:	(2 - 7) Tras dosis de 350 mg/día (15 - 30) Pico después de infusión de 900 mg (Inf. 0.05) Control de personal expuesto

Descripción:	CICLOFOSFAMIDA ORINA
Código:	CICLOFOSOR
Técnica:	Técnica GC-MS
Unidades:	mg/l
Plazo:	12 días
Tubo:	Orina basal
Comentario adicional:	10 mL orina
Valores de referencia:	(Inf. 0.005) Control personal expuesto.

Descripción:	CICLOHEXANOL EN ORINA
Código:	CICLOHEXAN
Técnica:	Cromatografía de gases-Ionización de llama.
Unidades:	mg/L
Plazo:	12 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	10 ml de orina final de jornada laboral. Refrigerar
Valores de referencia:	(Inf. 8) Fin de la jornada laboral (exposición a Ciclohexanona); VLB-INSHT

Descripción:	CICLOSPORINA
Código:	CICLOSPO
Técnica:	Inmunofluorescencia de polarización.
Unidades:	ng/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Sangre EDTA
Comentario adicional:	. 1 ml de sangre total EDTA.
Valores de referencia:	(150 - 225) Transplante renal. Terapia inicial (100 - 150) Transplante renal. Terapia mantenimiento. (225 - 300) Transplante hígado. Terapia inicial (100 - 150) Transplante hígado. Terapia mantenimiento. (250 - 350) Transplante corazón. Terapia inicial. (150 - 250) Transplante corazón. Terapia mantenimiento.

Descripción:	CID sindrom. o con sintomas asociada. Sec Gen STAT5B
Código:	GEN_000111
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	CININÓGENO DE ALTO PESO MOLECULAR EN PLASMA
Código:	CININOGENO

Descripción:	CININÓGENO DE ALTO PESO MOLECULAR EN PLASMA
Técnica:	Coagulación
Unidades:	%
Plazo:	17 días
Tubo:	Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:	1 mL plasma (citrato) pobre en plaquetas, congelado
Valores de referencia:	(70 - 120)

Descripción:	CISTATINA C SUERO
Código:	CISTATINAC
Técnica:	Nefelometría
Unidades:	mg/L
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml de suero . Ant. 1 mL plasma(EDTA, Heparina), separarlo lo antes posible.
Valores de referencia:	(0.62 - 1.11)

Descripción:	CISTINA EN ORINA
Código:	CISTINA
Técnica:	Cromatografía líquida/Tándem masas (LC-MS/MS)
Unidades:	mg/g creatin.
Plazo:	9 días
Tubo:	Orina basal
Comentario adicional:	ORINA MICCIÓN AISLADA
Valores de referencia:	Niños 6-170 mg/g creatinina Adultos 10-50 mg/g creatinina

Descripción:	Cistina intraleucocitaria (Cistinosis), sangre total
Código:	CISTINAINT
Técnica:	HPLC-EM/EM
Unidades:	nmol cist/mg pt
Plazo:	30 días
Tubo:	Heparina Litio
Comentario adicional:	10mL de sangre total Heparina a temperatura ambiente. Enviar de Lunes a miércoles. Condiciones de obtención: Obtener la sangre heparinizada. Si es para control de tratamiento, extraer la sangre transcurridas 6 horas de la última medicación. No congelar
Valores de referencia:	< 0.5 nmol cistina/mg proteína

Descripción:	CISTINA ORINA 24H
Código:	CISTINA24H
Técnica:	Cromatografía Líquida de Alta Resolución
Unidades:	mg/24 h
Plazo:	13 días
Tubo:	Orina 24 Horas
Comentario adicional:	10 ml orina 24h (vol. mín. 5 mL) Indicar volumen 24h

Descripción: CISTINA ORINA 24H
Valores de referencia:
(5 - 31) 1 año - 12 años
(0.00 - 38.00) > 12 años
(2.20 - 3.30) 10 dias - 49 dias

Descripción: Cistinosis. Sec Gen: CTNS
Código: GEN_000112
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Cistinuria. Sec Gen: SLC3A1
Código: GEN_000113
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Cistinuria. Sec Gen: SLC7A9
Código: GEN_000114
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: CITALOPRAM
Código: CITALOPRAM
Técnica: Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)
Unidades: µg/L
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
0.5 mL suero SIN gel separador
Volumen mínimo: 0.1 mL
Alternativa: 0.5 mL Plasma EDTA

El contenedor recomendado es el tubo seco (sin gel separador) para evitar procesos de adsorción del fármaco. En caso de no disponer de tubo seco, la extracción se puede realizar en tubo con gel separador, separando el suero dentro de las 2 horas poste

Valores de referencia:
(50 - 110) Intervalo terapéutico
(Sup. 220) Toxicidad
(Inf. 5) Límite de cuantificación

Descripción: Citocromo 450 2B6. Sec Gen: CYP2B6
Código: GEN_000115
Técnica:
Unidades:

Descripción: Citocromo 450 2B6. Sec Gen: CYP2B6
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Citocromo 450 2C9. Sec Gen: CYP2C9
Código: GEN_000116
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Citocromo 450 2D6. Sec Gen: CYP2D6
Código: GEN_000117
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Citologia anal
Código: CITOANAL
Técnica: Tinción de papanicolau|Observación microscopica
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional: ThinPrep
Valores de referencia:

Código: CITOLB
Descripción: CITOLOGÍA DE LÍQUIDOS BIOLÓGICOS (ORINA, BRONCOASPIRADOS...)
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	NREGCIT			NREGCIT		
Prueba	SNOMEDC			SNOMED Citologías		
Prueba	PATO			PATÓLOGO		
Prueba	DMACROCITO			EXAMEN MACROSCOPICO CITOLOGIA		
Prueba	DMICROCITO			EXAMEN MICROSCOPICO CITOLOGIA		
Prueba	NOTACITO			Nota Citologia		
Prueba	RESDIAG			Resumen Diagnóstico		
Prueba	TDMBIOLOGI			TIPO DE MUESTRA BIOLOGICA		

Código: CCITOPAAFS
Descripción: CITOLOGIA DE PAAF (CRISTALES)
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	NREGCIT			NREGCIT		
Prueba	SNOMEDC			SNOMED Citologías		
Prueba	PATO			PATÓLOGO		
Prueba	DMACROCITO			EXAMEN MACROSCOPICO CITOLOGIA		
Prueba	DMICROCITO			EXAMEN MICROSCOPICO CITOLOGIA		
Prueba	NOTACITO			Nota Citologia		
Prueba	RESDIAG			Resumen Diagnóstico		
Prueba	TDMPAAF			TDMPAAF		

Código: CCITOPAAFP
Descripción: CITOLOGIA DE PAAF PROFUNDA (CRISTALES DIAGNÓSTICO))
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	NREGCIT			NREGCIT		
Prueba	SNOMEDC			SNOMED Citologías		
Prueba	PATO			PATÓLOGO		
Prueba	DMACROCITO			EXAMEN MACROSCOPICO CITOLOGIA		
Prueba	DMICROCITO			EXAMEN MICROSCOPICO CITOLOGIA		
Prueba	RESDIAG			Resumen Diagnóstico		
Prueba	TDMPAAF			TDMPAAF		

Código: CITOPAAF
Descripción: CITOLOGIA DE PAAF SUPERFICIAL
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	NREGCIT			NREGCIT		
Prueba	SNOMEDC			SNOMED Citologías		
Prueba	PATO			PATÓLOGO		
Prueba	DMACROCITO			EXAMEN MACROSCOPICO CITOLOGIA		
Prueba	DMICROCITO			EXAMEN MICROSCOPICO CITOLOGIA		

Componentes						
Prueba	NOTACITO			Nota Citologia		
Prueba	RESDIAG			Resumen Diagnóstico		
Prueba	TDMPAAF			TDMPAAF		

Código: CITOEXFO
Descripción: CITOLOGÍA EXFOLIATIVA
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	NREGCIT			NREGCIT		
Prueba	SNOMEDC			SNOMED Citologías		
Prueba	PATO			PATÓLOGO		
Prueba	ESTHORM			ESTHORM		
Prueba	ASPMORG			Aspecto Morfológico		
Prueba	NOTACITO			Nota Citologia		
Prueba	RESDIAG			Resumen Diagnóstico		
Prueba	TDMEXFOLI			TOMA DE MUESTRA EXFOLIATIVA		
Prueba	CATCALIDAD			CATCALIDAD		
Prueba	ESTMICRO			ESTMICRO		

Código: CITOLIQ
Descripción: CITOLOGÍA GINECOLOGICA EN MEDIO LIQUIDO
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	NREGCIT			NREGCIT		
Prueba	TDMVAGINAL			TIPO DE MUESTRA VAGINAL		
Prueba	ESTHORM			ESTHORM		
Prueba	CATCALIDAD			CATCALIDAD		
Prueba	ESTMICRO			ESTMICRO		
Prueba	ASPMORG			Aspecto Morfológico		
Prueba	RESDIAG			Resumen Diagnóstico		
Prueba	NOTACITO			Nota Citologia		
Prueba	SNOMEDC			SNOMED Citologías		
Prueba	PATO			PATÓLOGO		

Descripción: CITOMEGALOVIRUS AC. IGG
Código: CITOACG

Descripción:	CITOMEGALOVIRUS AC. IGG
Técnica:	CMIA.
Unidades:	Índice
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 5.9) Negativo (Sup. 6.0) Inmunidad adquirida o en evolucion

Descripción:	CITOMEGALOVIRUS AC. IGG EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
Código:	CITOGLC
Técnica:	Inmunoanálisis (Téc. Enzimoinmunoanálisis hasta el 22-03-2012)
Unidades:	
Plazo:	6 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 1) Negativo (Sup. 1) Positivo

Descripción:	CITOMEGALOVIRUS AC. IGM
Código:	CITOACM
Técnica:	CMIA
Unidades:	
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 0.85) Negativo

Descripción:	CITOMEGALOVIRUS AC. IGM EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
Código:	CITOMLC
Técnica:	Inmunoanálisis (Hasta el 13/03/2012 Técnica EIA)
Unidades:	
Plazo:	6 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	.
Valores de referencia:	(Inf. 1) Negativo (Sup. 1) Positivo

Descripción:	Citomegalovirus DNA PCR cualitativa
Código:	CITOPCR
Técnica:	PCR
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular

Descripción:	Citomegalovirus DNA PCR cualitativa
Comentario adicional:	LCR-CONGELAR 3ml Plasma de EDTA-CONGELAR 3ml Sangre total EDTA-REFRIGERAR 1ml Aspirado bronquial-REFRIGERAR 1ml Lavado broncoalveolar-REFRIGERAR 1ml Líquido amniótico-CONGELAR Orina-CONGELAR. En orina solo se realiza en recien nacidos o mujer gestante. Humor vitreo/acuoso-CONGELAR Placenta-REFRIGERAR Tejido-REFRIGERAR Tejido parafinadoTA 3ml Médula ósea-REFRIGERAR
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta Límite de detección: 178 UI/mL

Descripción:	Citomegalovirus DNA PCR Cuantitativa
Código:	CITOCUAN
Técnica:	PCR cuantitativa
Unidades:	UI/mL
Plazo:	7 días
Tubo:	Muestra envios externos
Comentario adicional:	1ml LCR- CONGELAR 1 ml plasma EDTA-CONGELAR 1ml Sangre total EDTA 1 ml BAL-CONGELAR 1 ml BAS-CONGELAR 1ml humor vitreo/acuoso-CONGELAR 1ml Líquido amniótico-CONGELAR 1ml Médula ósea EDTA-CONGELAR 1ml Orina (Sólo bebes)-CONGELAR Placenta-REFRIGERAR Tejido parafinado- TA Biopsia en suero fisiológico-REFRIGERAR
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta Límite de detección: 178 UI/mL. Límite de cuantificación: 100.000.000 UI/mL

Descripción:	CITOMEGALOVIRUS IgG AVIDEZ
Código:	AVIDEZCITO
Técnica:	CLIA
Unidades:	Indice
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL de suero o plasma (citrato, heparina) positiva para CMV IgG
Valores de referencia:	(Inf. 0.4) Baja Avidez. Compatible con primoinfección reciente de menos de 4 meses. (0.4 - 0.5) Avidez intermedia. No permite distinguir infección reciente de una infección anterior. (Sup. 0.5) Alta Avidez. Compatible con infección pasada de más de 5 meses. El diagnóstico de una infección no solamente se debe basar en el resultado del ensayo. Es necesario considerar la anamnésis y la sintomatología del paciente junto al resultado serológico.

Descripción:	Citopenia ligada al X asociada a GATA1. Sec Gen: GATA1
Código:	GEN_000118
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	CITOPLASMA NEUTROFILOS AC. (ANCA)
Código:	ANCA
Técnica:	IFI
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	Negativo <1/40 Positivo >1/40

Descripción:	CITOSOL HEPATICO AC. SUERO
Código:	LC1
Técnica:	IFI
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	Negativo < 1/10 Positivo > 1/10

Descripción:	CITRULINA PLASMA
Código:	CITRU
Técnica:	Cromatografía líquida de alta resolución
Unidades:	mcmol/L
Plazo:	13 días
Tubo:	Tubo Especial
Comentario adicional:	TUBOS ESPECIALES, SOLICITAR AL LABORATORIO. NSTRUCCIONES OBTENCIÓN MUESTRA: Extraer sangre total en tubo de Heparína ó EDTA y separar el PLASMA. Mezclar a partes iguales INMEDIATAMENTE después, el plasma separado con Ácido Perclórico 1 mol/L (tubos enviados). Ej: 1mL de plasma + 1 mL de Ácido perclórico. Centrifugar a 3000 r.p.m. durante 10 minutos. Separar el SOBRENADANTE en tubo adjunto (vacio), UNA VEZ SEPARADO, CONGELAR INMEDIATAMENTE Y ENVIAR CONGELADO.
Valores de referencia:	(10 - 60) > 1 año

Descripción:	Citrulinemia tipo 1. Sec Gen: ASS1
Código:	GEN_000119
Técnica:	

Descripción:	Citrulinemia tipo 1. Sec Gen: ASS1
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Citrulinemia tipo 2. Sec Gen: SLC25A13
Código:	GEN_000182
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	CK ISOENZIMA MB
Código:	CKMB
Técnica:	Espectrofotometría
Unidades:	U/L
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	0.5 mL suero congelado
Valores de referencia:	(Inf. 24)

Descripción:	CK ISOENZIMA MB (MASA)
Código:	CKMBMASA
Técnica:	CMIA
Unidades:	ng/mL
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 mL suero Alternativo plasma de Heparina y EDTA.
Valores de referencia:	(Inf. 5.2) Hombre (Inf. 3.1) Mujer

Descripción:	CLOMETIAZOL
Código:	CLOMETIAZO
Técnica:	Cromatografía líquida-tándem masas
Unidades:	mcg/mL
Plazo:	17 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	2 mL de suero
Valores de referencia:	(1.0 - 4.0)

Código:	CLOMIPRAMI
Descripción:	Clomipramina+Desmetilclomipramina
Técnica:	Cromatografía Líquida de Alta Resolución
Comentario adicional:	2 mL suero. REFRIGERAR.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	CLPM	3491-8		CLOMIPRAMINA	µg/L	<10 µg/L: Límite de cuantificación
Prueba	DESMECLO	3536-0		DESMETILCLOMIPRAMINA	µg/L	<12 µg/L: Límite de cuantificación
Prueba	SUMACLDES	3493-4		Clomipramina+Desmetilclomipramina	µg/L	(230 - 450) Intervalo terapéutico (Sup. 450) Toxicidad

Descripción: CLONALIDAD B · REORDENAMIENTOS IGH · FRAGMENTOS
Código: IGH
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Al menos 3 ml de Médula Ósea o Sangre Periférica en tubo EDTA. Tubo exclusivo para esta determinación (tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO).
IMPORTANTE: SIEMPRE REFRIGERADO
Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.
Valores de referencia:

Descripción: CLONALIDAD T · REORDENAMIENTOS TCRBETA · FRAGMENTOS
Código: TCRBETA
Técnica: PCR y análisis de fragmentos
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO.
IMPORTANTE: REFRIGERADO SIEMPRE
Valores de referencia:

Descripción: CLONALIDAD T · REORDENAMIENTOS TCRDELTA · FRAGMENTOS
Código: TCRDELTA
Técnica:
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativa: citrato.
Valores de referencia:

Descripción: CLONALIDAD T · REORDENAMIENTOS TCRDELTA · FRAGMENTOS
Código: TCRDELTA
Técnica:
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: CLONALIDAD T · REORDENAMIENTOS TCRGAMMA · FRAGMENTOS
Código: TCRGAMMA

Descripción:	CLONALIDAD T · REORDENAMIENTOS TCRGAMMA · FRAGMENTOS
Técnica:	PCR y análisis de fragmentos
Unidades:	
Plazo:	10 días
Tubo:	TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional:	Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO. IMPORTANTE: REFRIGERADO SIEMPRE
Valores de referencia:	

Descripción:	CLONAZEPAM
Código:	CLONAZEPAM
Técnica:	LC-MS/MS
Unidades:	µg/L
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Volumen: 0.5 ml suero Volumen mínimo: 0.1 mL suero Conservación: Refrigerar CONTENEDOR: TUBO SUERO SIN GEL SEPARADOR
Valores de referencia:	(20 - 70) (Sup. 80) Tóxico

Descripción:	CLORAZEPATO (TRANXILIUM) SUERO
Código:	CLORAZEPAM
Técnica:	LC-MS/MS
Unidades:	µg/mL
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	2 mL ml de suero Tubo suero con gel separador.
Valores de referencia:	(0.10 - 1.00) Valores terapéuticos indicativos. Los resultados se exprexan como Nordiazepam (el clorazepato se convierte a Nordiazepam por efecto del HCl gástrico

Descripción:	CLORDIAZEPOXIDO (LIBRIUM)
Código:	CLORDIAZE
Técnica:	LC-MS/MS
Unidades:	µg/L
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero, refrigerar. Alternativa: plasma de edta refrigerado. La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis.
Valores de referencia:	(400 - 3000) Indice terapéutico (Sup. 3500) Toxicidad (Inf. 60) Límite de cuantificación

Descripción:	CLOROQUINA SUERO
Código:	CLOROQ

Descripción:	CLOROQUINA SUERO
Técnica:	LC-MS/MS
Unidades:	mcg/L
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(13 - 32) Profilaxis (96 - 192) Nivel terapeútico (Sup. 1000) Tóxico

Descripción:	CLORPROMACINA
Código:	CLORPROMA
Técnica:	LC-MS/MS
Unidades:	ng/mL
Plazo:	12 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	2 ml suero
Valores de referencia:	(50 - 300) Valores terapeúticos (Sup. 1500) Toxicidad

Descripción:	CLORURO DE METILENO (DICLOROMETANO) EN ORINA
Código:	CLORUMETIL
Técnica:	Cromatografía de Gases/ Captura electrónica
Unidades:	mg/L
Plazo:	12 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	3 mL orina final de jornada laboral Volumen mínimo: 1 mL
Valores de referencia:	(Inf. 0.3) Valor Límite Biológico-VLB® (INSST) en orina final de jornada (Inf. 0.3) Biological Exposure Indices-BEIs® (ACGIH®) en orina final de jornada (Inf. 0.05) Límite de cuantificación

Descripción:	CLORURO DE METILENO (DICLOROMETANO) EN SANGRE
Código:	CLORUROMET
Técnica:	Cromatografía de gases/captura electrónica
Unidades:	mg/L
Plazo:	13 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	2 ml de sangre total (EDTA) Muestreo: final de turno o jornada laboral
Valores de referencia:	(Inf. 0.5)

Descripción:	CLORUROS
Código:	CL
Técnica:	
Unidades:	mmol/L
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	

Descripción:	CLORUROS
Valores de referencia:	(90 - 110)

Descripción:	Clostridium difficile, Toxina A y B, PCR
Código:	CLOSTRIPCR
Técnica:	PCR (HIBRIDACIÓN MOLECULAR CON AMPLIFICACIÓN)
Unidades:	
Plazo:	8 días
Tubo:	heces especiales
Comentario adicional:	Heces diarreicas o acuosas. No se recomienda realizar una prueba para toxina de clostridium difficile si las heces no son diarreicas o líquidas.
Valores de referencia:	

Descripción:	Clouston, Sd. Sec Gen: GJB6
Código:	GEN_000120
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	COACH, Sd. Sec Gen: TMEM67
Código:	GEN_000121
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	COBALTO EN ORINA
Código:	COBALTO2
Técnica:	ICP-MS
Unidades:	µg/L
Plazo:	7 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	10 ml de orina aislada al final de la semana laboral. No recolectar muestras de orina en un ambiente en el que sea más probable que ocurra la exposición. Es importante evitar que el polvo de la ropa pueda interferir en el contenido de la muestra. No recoger la orina en recipientes con base de metal, como urinarios o sartenes de metal. Recoger la orina en tubos de polipropileno incoloro libre de metales sin tapones de colores. Cuando esto no sea posible, usar para la recogida de orina un envas
Valores de referencia:	(Inf. 15) (VLB-INSHT) Exposición al final de la semana laboral (Inf. 1) Límite de cuantificación

Descripción:	COBALTO EN SANGRE TOTAL
Código:	COBALTOSAN
Técnica:	IPC-MS
Unidades:	µg/L
Plazo:	6 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	Sangre total EDTA Dipotásico (libre trazas metales) al final de la semana laboral.

Descripción:	COBALTO EN SANGRE TOTAL
Valores de referencia:	(Inf. 1.0) .Valor límite biológico recomendado por INHST al fiinal de semana laboral tras exposición a COBALTO y sus derivados inorgánicos excepto óxidos.

Descripción:	COBALTO EN SUERO
Código:	COBALTO
Técnica:	Espectrometría de masas -Plasma acoplado inductivamente
Unidades:	µg/l
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	La muestra idónea es contenedor Tubo Suero metales traza. Volumen 1.0 mL Volumen mínimo 0.15 mL .
Valores de referencia:	(Inf. 2.0) Prótesis e implantes: No existe desgaste (2 - 10) Prótesis e implantes: Riesgo de desgaste

Descripción:	COBRE EN ORINA AISLADA
Código:	CU2_MCG
Técnica:	ICP-MS
Unidades:	ug/g creatinina
Plazo:	7 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	OFJ en caso de exposición laboral. Orina aislada. No recoger muestras de orina en un ambiente en el que sea más probable que ocurra la exposición. Es importante evitar que el polvo de la ropa pueda interferir en el contenido de la muestra. No recoger la orina en recipientes con base de metal, como urinarios o sartenes de metal. Recoger la orina en tubos de polipropileno incoloro libre de metales sin tapones de colores. Cuando esto no sea posible, usar para la recogida de orina un envas
Valores de referencia:	(9 - 58) 2 años - 6 años (7 - 46) 7 años - 11 años (5 - 18) 12 años - 17 años (9 - 43) Hombre .Valores de referencia orientativos para población no expuesta. (7 - 72) Mujer .Valores de referencia orientativos para población no expuesta.

Descripción:	Cobre en tejido hepatico-Muestra parafinada
Código:	COBRETEJID
Técnica:	ICP-MS
Unidades:	mcg/g peso seco
Plazo:	9 días
Tubo:	Muestra envios externos
Comentario adicional:	2-3 mg de tejido. Congelar y enviar congelado
Valores de referencia:	(10 - 43) (Sup. 250) Compatible con Enf. de Wilson

Descripción:	COBRE ERITROCITARIO, SANGRE
Código:	CUG
Técnica:	
Unidades:	µg/dL
Plazo:	7 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia

Descripción:	COBRE ERITROCITARIO, SANGRE
Comentario adicional:	Sangre total EDTA Dipotásico (libre trazas metales) Volumen 1.0 mL Volumen mínimo 0.15 mL Alternativo: Se puede hacer con muestra en tubo libre de metales y anticoagulante Heparina Sódica.
Valores de referencia:	(43 - 91)

Descripción:	COBRE LIBRE EN SUERO
Código:	CULIBRE
Técnica:	Ultrafiltración-Espectrometría de Emisión Atómica/ Espectrometría de masas(ICP-MS)
Unidades:	µg/dL
Plazo:	10 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	3 mL.
Valores de referencia:	(0.0 - 10.0)

Descripción:	COBRE ORINA DE 24 HORAS
Código:	CU2
Técnica:	ICP-MS
Unidades:	µg/24h
Plazo:	7 días
Tubo:	Orina 24 Horas
Comentario adicional:	5 ml de orina de 24 horas. Anotar diureis en el tubo/bote que se envíe. Válida orina acidificada
Valores de referencia:	(Inf. 60) (Inf. 6) Límite de cuantificación

Descripción:	COBRE SUERO
Código:	CU
Técnica:	Espectrofotometría.
Unidades:	µg/dL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 mL suero
Valores de referencia:	(70 - 140) Hombre > 18 años (80 - 155) Mujer > 18 años (20 - 70) < 6 meses (90 - 190) 6 meses - 18 años

Descripción:	COCAINA
Código:	COCA
Técnica:	Inmunoensayo
Unidades:	
Plazo:	2 días
Tubo:	Orina Drogas de Abuso
Comentario adicional:	.
Valores de referencia:	

Código:	COCS
Descripción:	COCAINA CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SANGRE
Técnica:	LC-MS/MS

Código: COCS

10 mL Sangre total Oxalato/Fluoruro [Refrigerar]

Comentario adicional:

Alternativa:
10 mL Sangre total EDTA [Refrigerar]

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	COCASAN	72405-4		Perfil Confirmación de Cocaina en sangre por LC-MS/MS	ng/mL	(Inf. 1.3) Incertidumbre de medida (Inf. 8) Límite de cuantificación
Prueba	COBZST			Perfil Confirmación Benzoilecgonina sangre LC-MS/MS	ng/mL	(Inf. 1.6) Incertidumbre de medida (Inf. 8) Límite de cuantificación

Código: COCS

Descripción: COCAINA CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SANGRE

Técnica: LC-MS/MS

10 mL Sangre total Oxalato/Fluoruro [Refrigerar]

Comentario adicional:

Alternativa:
10 mL Sangre total EDTA [Refrigerar]

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	COCASAN	72405-4		Perfil Confirmación de Cocaina en sangre por LC-MS/MS	ng/mL	(Inf. 1.3) Incertidumbre de medida (Inf. 8) Límite de cuantificación
Prueba	COBZST			Perfil Confirmación Benzoilecgonina sangre LC-MS/MS	ng/mL	(Inf. 1.6) Incertidumbre de medida (Inf. 8) Límite de cuantificación

Descripción: COCAINA CONFIRMACION EN SALIVA

Código: COCASAL

Técnica: LC-MS/MS

Unidades: ng/mL

Plazo: 10 días

Tubo: Saliva

Comentario adicional: Saliva recogida en kit ORAL-EZE. Solicitar kit en el almacén.

Valores de referencia:

Descripción: COCAINA PELO CONFIRMACION

Código: COCAPELO

Técnica: Cromatografia líquida/Tanden masas (LC-MS/MS)

Unidades:

Plazo: 17 días

Tubo: Tubo Especial

Descripción:	COCAINA PELO CONFIRMACION
Comentario adicional:	PEDIR KIT ESPECIAL: almacen@ctes.eurofinseu.com PEDIR PROTOCOLO DE TOMA DE MUESTRA: calidad@ctes.eurofinseu.com -Análisis Informativo: incluye kit de toma de muestra y formulario de solicitud -Cadena custodia: En caso de solicitar el análisis con validez judicial, solicitar al almacen tambien documentación de cadena custodia (acta de toma de muestra y hoja de seguimiento). El protocolo de cadena custodia debe solicitarse a calidad@ctes.eur En el caso de cadena custodia debe recogerse la muestra por duplicado.
Valores de referencia:	

Descripción:	COCCIDIOIDES IMMITIS AC.
Código:	COCCI
Técnica:	Inmunodifusión Ouchterlony.
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	

Descripción:	COCIENTE ALDOSTERONA/RENINA DIRECTA
Código:	RAR
Técnica:	Cálculo
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	COCIENTE COLESTEROL LDL/APOLIPOPROTEINA B
Código:	LDLC_APOB
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Sup. 1.3)

Descripción:	COCIENTE COLESTEROL LDL/COLESTEROL HDL
Código:	LDLC_HDLC
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 3.55) Hombre (Inf. 3.22) Mujer

Descripción:	Cockayne tipo B. Panel
Código:	GEN_000122
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular

Descripción:	Cockayne tipo B. Panel
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	COCLEARES P-68 KD (HSP-70) Ac. SUERO
Código:	COCLEARAC
Técnica:	Inmunoblot
Unidades:	
Plazo:	12 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero. Refrigerar
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta

Descripción:	COENZIMA Q 10 EN SUERO
Código:	COEQ10
Técnica:	Cromatografía líquida de alta eficacia - Ultravioleta.
Unidades:	mg/L
Plazo:	13 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	Suero congelado. Alternativa: plasma Hepatina de litio. Congelado Muestra protegida de la luz
Valores de referencia:	(0.35 - 1.94)

Descripción:	COFACTOR II HEPARINA EN PLASMA
Código:	COFACTHEPA
Técnica:	Substrato cromogénico.,
Unidades:	%
Plazo:	31 días
Tubo:	Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:	1 mL plasma.Congelar y enviar congelado
Valores de referencia:	(65 - 145)

Descripción:	Coffin-Lowry, Sd. Sec Gen: RPS6KA3
Código:	GEN_000123
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Cohen, Sd. Sec Gen: VPS13B
Código:	GEN_000124
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	COLAGENO TIPO II ANTICUERPOS, SUERO
Código:	ACOL
Técnica:	EIA
Unidades:	Indice
Plazo:	32 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero refrigerado.
Valores de referencia:	Valor de referencia indicativo:Negativo

Descripción:	COLAGENO TIPO VII NC1 ANTICUERPOS SUERO
Código:	COLAGTVII
Técnica:	Enzimoinmunoanalisis
Unidades:	Ratio
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	(Inf. 1) Negativo

Descripción:	Colangiocarcinoma panel 2
Código:	COLANGIO_2
Técnica:	NGS
Unidades:	
Plazo:	10 días
Tubo:	Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:	Muestras: tejido incluido en parafina. Laboratorio Oncogenética
Valores de referencia:	

Descripción:	Colestasis intrahepática familiar progresiva. Panel
Código:	GEN_000125
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Colestasis intrahepática familiar progresiva: gen MDR3 (NGS)
Código:	MDR3_MUTS
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM. Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	Colestasis intrahepática familiar. Sec Gen: ABCB11
Código:	GEN_000126
Técnica:	

Descripción:	Colestasis intrahepática familiar. Sec Gen: ABCB11
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	COLESTEROL
Código:	CHOL
Técnica:	
Unidades:	mg/dL
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 200)

Descripción:	COLINESTERASA
Código:	COLI
Técnica:	Colorimétrico multifrecuencia.
Unidades:	U/L a 37 ºC
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 mL suero
Valores de referencia:	(5100 - 13700) Hombre (4400 - 12100) Mujer

Descripción:	COLINESTERASA ERITROCITARIA
Código:	COLINESERI
Técnica:	Espectrometría
Unidades:	U/L
Plazo:	5 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	1 mL sangre total (EDTA)
Valores de referencia:	(11188 - 16698) 70% del valor pre-exposición: Valor límite biológico (exposición a insecticidas organofosforados, incluido paratión) (VLB-INSHT) 70% del valor pre-exposición: Biological Exposure Indices-BEIs® (ACGIH®)

Descripción:	Coloboma renal, Sd. Sec Gen: PAX2
Código:	GEN_000127
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	COLOR LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
Código:	LIQLCCOLOR
Técnica:	Observación

Descripción:	COLOR LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
Unidades:	
Plazo:	
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	Comentario interno FISH
Código:	NOTAFISH
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	
Tubo:	Heparina Litio
Comentario adicional:	Prueba para comentario interno
Valores de referencia:	

Descripción:	COMPARACIÓN PERFILES GENÉTICOS EN LÍQUIDO AMNIÓTICO
Código:	COMPERFLA
Técnica:	QF-PCR
Unidades:	
Plazo:	2 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:	Muestra: líquido amniótico
Valores de referencia:	

Descripción:	Complejo de Carney. Sec Gen: PRKAR1A
Código:	GEN_000128
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	COMPLEMENTO C-1 ESTERASA INHIBIDOR ACTIVIDAD PLASMA
Código:	C1ESTERA
Técnica:	Téc.Cromogénica
Unidades:	%
Plazo:	5 días
Tubo:	Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:	1mL plasma citrato separado y Congelado
Valores de referencia:	(70 - 130)

Descripción:	COMPLEMENTO C-1 ESTERASA INHIBIDOR PROTEÍNA
Código:	C1ESTERAP
Técnica:	Turbidimetría
Unidades:	mg/dL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero

Descripción:	COMPLEMENTO C-1 ESTERASA INHIBIDOR PROTEÍNA
Valores de referencia:	(21 - 38)

Descripción:	COMPLEMENTO C-1 Q SUERO
Código:	C1Q
Técnica:	Turbidimetría
Unidades:	mg/dL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	El Suero es el único tipo de muestra válido
Valores de referencia:	(15.7 - 30.6)

Descripción:	COMPLEMENTO C-2 SUERO
Código:	C2
Técnica:	Turbidimetría
Unidades:	mg/L
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 mL suero congelado
Valores de referencia:	(10.8 - 24.5)

Descripción:	COMPLEMENTO C3 ACTIVADOR SUERO (FACTOR B)
Código:	C3ACTIVA
Técnica:	Nefelometría
Unidades:	mg/dL
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Alt. plasma EDTA o plasma heparina
Valores de referencia:	(Sup. 22.5)

Descripción:	COMPLEMENTO C-3 SUERO
Código:	C3
Técnica:	Inmunoturbidimetría
Unidades:	mg/dL
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 mL suero. NOTA TECNICA ABBOTT (21-5-2019) NO SE PUEDE UTLIZAR EDTA Alternativa plasma heparina.
Valores de referencia:	(82 - 173) Mujer 1 año - 14 años (83 - 193) Mujer 14 años - 80 años (80 - 170) Mujer > 81 años (80 - 170) Hombre 1 año - 14 años (82 - 185) Hombre 14 años - 80 años (80 - 170) Hombre > 81 años

Descripción:	COMPLEMENTO C-4 SUERO
Código:	C4
Técnica:	Inmunoturbidimetría
Unidades:	mg/dL
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal

Descripción:	COMPLEMENTO C-4 SUERO
Comentario adicional:	0.5 mL suero Alt. plasma EDTA o plasma heparina NOTA TECNICA ABBOTT (21-5-2019) NO SE PUEDE UTLIZAR EDTA NI PLASMA HEPATINA
Valores de referencia:	(13 - 46) Mujer 1 año - 14 años (15 - 57) Mujer 14 años - 80 años (14 - 44) Mujer > 81 años (14 - 44) Hombre 1 año - 14 años (15 - 53) Hombre 14 años - 80 años (14 - 44) Hombre > 81 años

Descripción:	COMPLEMENTO C-5 SUERO
Código:	C5
Técnica:	
Unidades:	mg/dL
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL de suero refrigerado.
Valores de referencia:	(Sup. 9.5)

Descripción:	COMPLEMENTO C-6 SUERO
Código:	C6
Técnica:	Inmunodifusión radial
Unidades:	mg/dL
Plazo:	17 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL.
Valores de referencia:	(2.8 - 6.9)

Descripción:	COMPLEMENTO C-7 SUERO
Código:	C7
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	mg/dL
Plazo:	17 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL de suero.
Valores de referencia:	(4.0 - 11.0)

Descripción:	COMPLEMENTO C-8 SUERO
Código:	C8
Técnica:	Inmunodifusión radial
Unidades:	mg/dL
Plazo:	23 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL.
Valores de referencia:	(4.9 - 10.6)

Descripción:	COMPLEMENTO C-9 SUERO
Código:	C9
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	mg/dL

Descripción:	COMPLEMENTO C-9 SUERO
Plazo:	12 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml
Valores de referencia:	(3.30 - 9.50)

Descripción:	COMPLEMENTO HEMOLITICO 50 SUERO
Código:	CH50
Técnica:	Inmunoensayo in vitro automatizado basado en liposomas
Unidades:	U/mL
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 mL suero. Congelar inmediatamente
Valores de referencia:	(Sup. 41)

Descripción:	Comunicación interauricular cardíaca. Sec Gen: MYH6
Código:	GEN_000129
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	CONCENTRACION AC. HOMOGENTISICO ORINA
Código:	HOMOGENMG
Técnica:	HPLC
Unidades:	mg/L
Plazo:	17 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	10 mL orina (micción aislada) con 0,5 mL ác. clorhídrico conc
Valores de referencia:	(Inf. 8)

Descripción:	CONCENTRACION EN ORINA AISLADA DE PORFOBILIGENO
Código:	PORFOBIMG
Técnica:	Espectrometría
Unidades:	mg/g creatin.
Plazo:	8 días
Tubo:	Orina congelada
Comentario adicional:	1 tubo orina Conservación preferiblemente enviar congelada Volumen mínimo 0,5 mL
Valores de referencia:	(1.8 - 4.70) Límite de cuantificación: <0.80 mg/L

Descripción:	Condrodisplasia metafisaria tipo Jansen. Sec Gen: PTH
Código:	GEN_000130
Técnica:	
Unidades:	

Descripción: Condrodisplasia metafisaria tipo Jansen. Sec Gen: PTH
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Condrodisplasia metafisaria tipo Schmid: gen COL10A1 (NGS)
Código: COL10A1
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Condrodisplasia punctata ligada al X t1. Sec Gen: ARSE
Código: GEN_000131
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Condrodisplasia punctata ligada al X t2. Sec Gen: EBP
Código: GEN_000132
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Condrodisplasia punctata ligada al X. Panel
Código: GEN_000133
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Condrodisplasia tipo Blomstrand. Sec Gen: PTH1R
Código: GEN_000134
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Descripción: Condrodisplasia tipo Blomstrand. Sec Gen: PTH1R
Valores de referencia:

Descripción: Confirmación 6-monoacetil morfina (6AM) sangreLC-MS/MS
Código: CO6MMST
Técnica:
Unidades: ng/mL
Plazo: 7 días
Tubo: Tubo fluoruro
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 2) Valor de corte recomendado
(Inf. 0.5) Incertidumbre de medida

Código: DASA
Descripción: CONFIRMACION ANFETAMINAS SALIVA LC-MS/MS
Técnica:
Comentario adicional: Saliva. refrigerar.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	COANFSA	72758-6		Confirmación de Anfetamina en saliva LC-MS/MS	ng/mL	(Inf. 15) Valor de corte recomendado (Inf. 3.8) Incertidumbre de medida
Prueba	COMDASA	72736-2		Confirmación de MDA saliva por LC-MS/MS	ng/mL	(Inf. 15) Valor de corte recomendado (Inf. 3.3) Incertidumbre de medida
Prueba	COMTFSA	72735-4		Confirmación de Metanfetamina en saliva por LC-MS/MS	ng/mL	(Inf. 15) Valor de corte recomendado (Inf. 2.9) Incertidumbre de medida
Prueba	COMDMASA	74651-1		Confirmación de MDMA en saliva LC-MS/MS	ng/mL	(Inf. 15) Valor de corte recomendado (Inf. 3.7) Incertidumbre de medida
Prueba	COMDEASA	74649-5		Confirmación de MDEA saliva por LC-MS/MS	ng/mL	(Inf. 15) Valor de corte recomendado (Inf. 3.2) Incertidumbre de medida

---

Código: DAPG
Descripción: CONFIRMACION ANFETAMINAS SANGRE LC-MS/MS
Técnica:
Comentario adicional: Sangre total Oxalato/Fluoruro. refrigerar.
Sangre total Heparina litio. refrigerar.
Sangre total EDTA. refrogerar.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	COANFST	42576-9		Confirmación de Anfetamina en sangre por LC-MS/MS	ng/mL	(Inf. 15) Valor de corte recomendado (Inf. 2.9) Incertidumbre de medida

Componentes						
Prueba	COMDAST	29598-0		Confirmación de MDA en sangre por LC-MS/MS	ng/mL	(Inf. 15) Valor de corte recomendado (Inf. 3.2) Incertidumbre de medida
Prueba	COMTFST	82966-3		Confirmación de Metanfetamina en sangre por LC-MS/MS	ng/mL	(Inf. 15) Valor de corte recomendado (Inf. 3) Incertidumbre de medida
Prueba	COMDMAST	29619-4		Confirmación de MDMAen sangre por LC-MS/MS	ng/mL	(Inf. 15) Valor de corte recomendado (Inf. 2.6) Incertidumbre de medida
Prueba	COMDEAST	82965-5		Confirmación de MDEA en sangre por LC-MS/MS	ng/mL	(Inf. 15) Valor de corte recomendado (Inf. 3.3) Incertidumbre de medida

Descripción:	Confirmación de Anfetamina en saliva LC-MS/MS
Código:	COANFSA
Técnica:	
Unidades:	ng/mL
Plazo:	7 días
Tubo:	Saliva
Comentario adicional:	Saliva
Valores de referencia:	(Inf. 15) Valor de corte recomendado (Inf. 3.8) Incertidumbre de medida

Descripción:	Confirmación de Benzoilecgonina en orina por LC-MS/MS
Código:	COBZOR
Técnica:	LC-MS/MS
Unidades:	ng/mL
Plazo:	7 días
Tubo:	Orina Drogas de Abuso
Comentario adicional:	orina refrigerada
Valores de referencia:	Límite de cuantificación 25 ng/mL Incertidumbre de medida 3.9 ng/mL

Descripción:	Confirmación de Codeína en sangre por LC-MS/MS
Código:	COCODST
Técnica:	
Unidades:	ng/mL
Plazo:	7 días
Tubo:	Tubo fluoruro
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 5) Valor de corte recomendado (Inf. 1) Incertidumbre de medida

Descripción:	Confirmación de MDA saliva por LC-MS/MS
Código:	COMDASA
Técnica:	
Unidades:	ng/mL

Descripción:	Confirmación de MDA saliva por LC-MS/MS
Plazo:	7 días
Tubo:	Saliva
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 15) Valor de corte recomendado (Inf. 3.3) Incertidumbre de medida

Descripción:	Confirmación de MDA saliva por LC-MS/MS
Código:	COMDASA
Técnica:	
Unidades:	ng/mL
Plazo:	7 días
Tubo:	Saliva
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 15) Valor de corte recomendado (Inf. 3.3) Incertidumbre de medida

Descripción:	Confirmación de MDMA en saliva LC-MS/MS
Código:	COMDMASA
Técnica:	
Unidades:	ng/mL
Plazo:	7 días
Tubo:	Saliva
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 15) Valor de corte recomendado (Inf. 3.7) Incertidumbre de medida

Descripción:	Confirmación de MDMA en saliva LC-MS/MS
Código:	COMDMASA
Técnica:	
Unidades:	ng/mL
Plazo:	7 días
Tubo:	Saliva
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 15) Valor de corte recomendado (Inf. 3.7) Incertidumbre de medida

Descripción:	Confirmación de Morfina en saliva por LC-MS/MS
Código:	COMORSA
Técnica:	
Unidades:	ng/mL
Plazo:	7 días
Tubo:	Saliva
Comentario adicional:	Saliva. Refrigerar. (1 ml)
Valores de referencia:	(Inf. 5) Valor de corte recomendado (Inf. 1.2) Incertidumbre de medida

Descripción:	Confirmación de Morfina en saliva por LC-MS/MS
Código:	COMORSA
Técnica:	
Unidades:	ng/mL

Descripción: Confirmación de Morfina en saliva por LC-MS/MS
Plazo: 7 días
Tubo: Saliva
Comentario adicional: Saliva. Refrigerar. (1 ml)
Valores de referencia: (Inf. 5) Valor de corte recomendado
(Inf. 1.2) Incertidumbre de medida

Descripción: Confirmación de Morfina en saliva por LC-MS/MS
Código: COMORSA
Técnica:
Unidades: ng/mL
Plazo: 7 días
Tubo: Saliva
Comentario adicional: Saliva. Refrigerar. (1 ml)
Valores de referencia: (Inf. 5) Valor de corte recomendado
(Inf. 1.2) Incertidumbre de medida

Descripción: Confirmación de Morfina en sangre por LC-MS/MS
Código: COMORST
Técnica:
Unidades: ng/mL
Plazo: 7 días
Tubo: Tubo fluoruro
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 5) Valor de corte recomendado
(Inf. 1) Incertidumbre de medida

Código: COCSA
Descripción: CONFIRMATORIO COCAINA SALIVA LC-MS/MS
Técnica:
Comentario adicional: Saliva. refrigerar.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	COBZSA	87809-0		Confirmación de Benzoilecgonina en saliva por LC-MS/MS	ng/mL	(Inf. 8) Valor de corte recomendado (Inf. 1.9) Incertidumbre de medida
Prueba	COCOCSA	72737-0		Confirmación de Cocaína en saliva por LC-MS/MS	ng/mL	(Inf. 8) Valor de corte recomendado (Inf. 2) INcertidumbre de medida

---

Código: CPIS
Descripción: CONFIRMATORIO OPIACEOS EN SANGR LC-MS/MS
Técnica: LC-MS/MS
Comentario adicional: Sangre total Oxalato/Fluoruro. Refrigerar.
Sangre total Heparina litio. Refrigerar.
Sangre total EDTA. Refrigerar.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	CO6MMST	80115-9		Confirmación 6-monoacetil morfina (6AM) sangreLC-MS/MS	ng/mL	(Inf. 2) Valor de corte recomendado (Inf. 0.5) Incertidumbre de medida
Prueba	COCODST	86226-8		Confirmación de Codeína en sangre por LC-MS/MS	ng/mL	(Inf. 5) Valor de corte recomendado (Inf. 1) Incertidumbre de medida
Prueba	COMORST	86226-8		Confirmación de Morfina en sangre por LC-MS/MS	ng/mL	(Inf. 5) Valor de corte recomendado (Inf. 1) Incertidumbre de medida

Descripción: Convul. neonat-infantil benigna famil. Sec Gen: SCN2A
Código: GEN_000136
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: COPEPTINA (CT-proAVP) EN SUERO
Código: COPEPTINA
Técnica: Inmunoluminiscencia
Unidades: pmol/L
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 mL suero. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO. EVITAR MUESTRA DE PLASMA
Valores de referencia: Osmolalidad / Copeptina
270-280 mOsm/kg / 0.8 - 11.6 pmol/L
281-285 mOsm/kg / 1.0 - 13.7 pmol/L
286-290 mOsm/kg / 1.5 - 15.3 pmol/L
291-295 mOsm/kg / 2.3 - 24.5 pmol/L
296-300 mOsm/kg / 2.4 - 28.2 pmol/L

Código: COPROANTI
Descripción: COPROCULTIVO (CULTIVO DE HECES
Técnica: Cultivo en medios apropiados
Comentario adicional: Se requiere una muestra de una deposición del tamaño de una nuez trasferida a un recipiente estéril de boca ancha y cierre hermético.
En el caso heces líquidas se necesitan entre 5 y 10 ml.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Perfil	CULTIVO		HECES	CULTIVO GENERAL en ESTUDIO MICROBIOLOGICO DE HECES		

Descripción: COPROPORFIRINA ISOMEROS (I-III) ORINA
Código: COPROISOME

Descripción: COPROPORFIRINA ISOMEROS (I-III) ORINA
Técnica: HPLC
Unidades: mcg/24h
Plazo: 9 días
Tubo: Orina 24 Horas
Comentario adicional: 10 mL de orina 24 horas. Indicar volumen total de 24 horas.
Valores de referencia: (Inf. 35) COPROPORFIRINA I
(Inf. 65) COPROPORFIRINA III

Descripción: Corea benigna familiar. Sec Gen: NKX2-1
Código: GEN_000137
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Corea hereditaria benigna: gen NKK2-1 (NGS)
Código: NKX2_1_MUT
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.
Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Cornelia de Lange, Sd. Panel
Código: GEN_000138
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Coronavirus SARS-COV-2 RT-PCR
Código: COV2PCR
Técnica:
Unidades:
Plazo: 2 días
Tubo: ENSAYOS
Comentario adicional: Muestra respiratoria: torunda nasofaríngea con medio de transporte Vircell (solicitar al almacén Valderribas)
Valores de referencia:

Descripción: CORTICOSTERONA SUERO
Código: CORTICOSTE
Técnica: LC-MS/MS
Unidades: mcg/dL

Descripción:	CORTICOSTERONA SUERO
Plazo:	32 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	2 ml de suero congelado
Valores de referencia:	(0.1 - 2.0) Adultos (Inf. 6.5) Despues de ACTH

Descripción:	CORTISOL EN SALIVA (1 MUESTRA) 23-24 HORAS
Código:	CORTISA24H
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	ng/mL
Plazo:	18 días
Tubo:	SALIVA PROYECTOS
Comentario adicional:	1 mL saliva
Valores de referencia:	(Inf. 1.00)

Descripción:	CORTISOL EN SALIVA (1 MUESTRA) MAÑANA
Código:	CORTISA
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	ng/mL
Plazo:	18 días
Tubo:	SALIVA PROYECTOS
Comentario adicional:	1 mL saliva
Valores de referencia:	(1.19 - 7.21)

Descripción:	CORTISOL EN SALIVA (1 MUESTRA) TARDE
Código:	CORTISATAR
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	ng/mL
Plazo:	18 días
Tubo:	SALIVA PROYECTOS
Comentario adicional:	1 ml saliva
Valores de referencia:	(0.33 - 2.23)

Descripción:	CORTISOL LIBRE URINARIO
Código:	CORTI2
Técnica:	ICMA
Unidades:	mcg/24 h
Plazo:	2 días
Tubo:	Orina 24 Horas
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 53) < 20 años (Inf. 90) > 20 años

Descripción:	CORTISOL SUERO
Código:	CORTI
Técnica:	ICMA
Unidades:	mcg/dL
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal

Descripción:	CORTISOL SUERO
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(5 - 25) Mañana (3 - 16) Tarde

Descripción:	COTININA ORINA (METABOLITO DE NICOTINA)
Código:	COTININA
Técnica:	Técnica EIA
Unidades:	ng/mL
Plazo:	2 días
Tubo:	Orina Bioquímica
Comentario adicional:	10 mL orina Recoger orina sin conservantes.
Valores de referencia:	(Inf. 500) No Fumadores

Descripción:	COTININA SUERO (METABOLITOS DE NICOTINA)
Código:	COTININASU
Técnica:	Técnica ICMA
Unidades:	ng/ml
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero refrigerado
Valores de referencia:	(Inf. 25) No Fumadores (Sup. 25) Fumadores

Descripción:	Cowden, Sd. Panel
Código:	GEN_000139
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Coxiella burnetii Fase II Ac. IGM
Código:	COXIEIACM
Técnica:	EIA
Unidades:	Índice
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. Alternativa: plasma (citrato, heparina)
Valores de referencia:	(Inf. 9) Negativo (9.01 - 11) Indeterminado

Descripción:	Coxiella burnetii DNA PCR
Código:	COXIELLPCR
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	12 días
Tubo:	Muestra envios externos

Descripción: Coxiella burnetii DNA PCR
Comentario adicional: 2 ml de sangre total EDTA, suero, secreción, tejido, tejido parafinado, LCR..
Valores de referencia:

Descripción: Coxiella burnetii Fase I Ac. IGA
Código: COAFASEI
Técnica: EIA
Unidades: Índice
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml de suero refrigerado
Valores de referencia: (Inf. 0.9) Negativo
(0.9 - 1.1) Indeterminado

Código: COXIEIACG
Descripción: COXIELLA BURNETII FASE I/II AC. IGG
Técnica: EIA
Comentario adicional: 1 mL suero

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	COGFASEI	51810-0		Coxiella burnetii Fase I IgG	Índice	(Inf. 9) Negativo (9.01 - 11) Indeterminado
Prueba	COGFASEII	51812-6		Coxiella burnetii Fase II IgG	Índice	(Inf. 9) Negativo (9.01 - 11) Indeterminado

---

Descripción: Coxiella burnetii Fase II IGG LCR
Código: COXBURLCR
Técnica:
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 ml LCR
Biopsia ganglio: Se puede hacer siempre y cuando la muestra no esté conservada en FORMOL, tienen que en solución salina estéril.
Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo
(Sup. 1) Positivo

Descripción: Coxiella burnetii Fase II IGM LCR
Código: COXBIMLCR
Técnica:
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 ml LCR
Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo
(Sup. 1) Positivo

Descripción: COXSACKIE B AC. IgM EN LCR
Código: COXACKBML
Técnica: Inmunofluorescencia indirecta.

Descripción:	COXSACKIE B AC. IgM EN LCR
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 mL LCR.Se recomienda efectuar análisis simultáneo de suero y LCR
Valores de referencia:	Positivo título>1:1

Descripción:	COXSACKIE B AC. IgG EN LCR
Código:	COXACKBGL
Técnica:	Inmunofluorescencia indirecta
Unidades:	
Plazo:	6 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 mL LCR.Se recomienda efectuar análisis simultáneo de suero y LCR
Valores de referencia:	Positivo título>1:1

Descripción:	COXSACKIE B AC. IGG EN SUERO
Código:	COXACKIB1G
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	Índice
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero Alt. Plasma
Valores de referencia:	(Inf. 0.9) Negativo (0.9 - 1.1) Indeterminado

Descripción:	COXSACKIE B AC. IGM EN SUERO
Código:	COXACKIB1M
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	Titulo
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1ml Suero Alt. Plasma
Valores de referencia:	Título <1/10 Negativo

Descripción:	Craneosinostosis: <10 genes (NGS)
Código:	CRANEOSINO
Técnica:	NGS con TSO Illumina y MLPA
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	CREATIN KINASA
Código:	CK
Técnica:	Espectrofotometría

Descripción:	CREATIN KINASA
Unidades:	U/L a 37 ºC
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 mL de suero
Valores de referencia:	(Inf. 190) Hombre (Inf. 167) Mujer

Descripción:	Creatina en suero
Código:	CREATINAS
Técnica:	Espectrometría
Unidades:	mg/dL
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero Volumen mínimo: 0.5 mL
Valores de referencia:	(0.20 - 1.00) Hombre (0.20 - 1.20) Mujer

Descripción:	CREATINA ORINA
Código:	CREATINA
Técnica:	Espectrofotometría
Unidades:	mg/24 h
Plazo:	8 días
Tubo:	Orina 24 Horas
Comentario adicional:	alicuota de orina de 24 horas. Refrigerar.
Valores de referencia:	(Inf. 250)

Descripción:	CREATININA
Código:	CREA
Técnica:	Técnica enzimática colorimétrica
Unidades:	mg/dL
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 mL suero o plasma Heparina, EDTA
Valores de referencia:	(0.55 - 1.02) Mujer > 15 años (0.72 - 1.18) Hombre > 15 años (0.26 - 1.01) < 2 meses (0.15 - 0.37) 2 meses - 3 años (0.24 - 0.73) 3 años - 15 años

Descripción:	CREATININA ORINA
Código:	CREA2
Técnica:	Espectrofotometría
Unidades:	g/24h
Plazo:	2 días
Tubo:	Orina 24 Horas
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(1.2 - 2.5) Hombre (0.8 - 1.4) Mujer

Código: CKISOEN
Descripción: CREATINQUINASA ISOENZIMAS -MACROCREATINQUINASA
Técnica: Electroforesis en gel de agarosa
Comentario adicional: 1 mL suero.
Plazo: 12 días

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	FRACCKBB	14680-3		ISOENZIMAS CK (CK-MB, CK-MM, CKBB) Electroforesis		

Descripción: Creutzfeldt-Jakob, enf. Gen: PRNP.Polimorfismo 129 (M129V)
Código: GEN_000325
Técnica:
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Crigler Najjar 1, Sd.Gen: UGT1A1. Detección de inserción TA
Código: GEN_000140
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Crigler Najjar tipo 1, Sd. Sec Gen: UGT1A1
Código: GEN_000141
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: CRIOAGLUTININAS SUERO
Código: CRIOAGLU
Técnica: Aglutinación
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional: Suero extraído en tubo seco (tapón marrón, SIN gelosa. Los geles pueden interferir al quedar partículas de gel adsorbidas a la superficie del hematíe) Y tubo de EDTA. TUBOS EXCLUSIVOS PARA ESTAS DETERMINACIONES. OJO!! SOLO SE COGEN MUESTRAS DE LUNES A JUEVES (deben llegar a Valderribas antes de las 19:00h).
Valores de referencia: Valores significativos a partir de 1/32

Descripción: CRIOFIBRIONOGENO EN PLASMA
Código: CRIOFIBRI
Técnica: Precipitacion a 4ºC redisolucion a 37ºC, electroforesis
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional: 2 mL Plasma Citrato sódico. NO CONGELAR
Valores de referencia:

Descripción: CRIOGLOBULINAS
Código: CRIOGLO
Técnica: Precipitación
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional: 1 mL de suero extraido en tubo seco (tapón marrón, SIN gelosa). TUBO EXCLUSIVO PARA ESTA DETERMINACIÓN.
OJO!! SOLO SE COGEN MUESTRAS DE LUNES A JUEVES (deben llegar a Valderribas antes de las 19:00h).

Las crioglobulinas son inmunoglobulinas que precipitan a bajas temperaturas, por ello la muestra se debe obtener y mantener en todo momento hasta la obtención del suero a 37 º C.
Para ello la jeringa y el tubo en que se va a extraer la muestra se debe mantener en estufa 30 minutos antes de la extracción. Para poder tener siempre disponible material a 37º C, en la estufa de Hematologia se mantienen siempre tubos de bioquimica (
descender, se transportan en el mismo recipiente en el que se encuentran en la estufa: termo lleno de arena en el que se "hunden" los tubos y del que sólo se sacan en el momento de la extracción, volviéndolo a colocar en la arena para su transporte ha
extracción la muestra se transporta a 37 º C en la arena del termo y se deja coagular a 37 º C en baño maría o en estufa.
Cuando ya se ha producido la coagulación, se centrifuga el tubo y se obtiene el suero.
Si el proceso se ha mantenido en todo momento a 37º C las crioglobulinas presentes en el suero se podrán recuperar por precipitación en frío.
Valores de referencia: Valor de referencia orientativo: Negativo

---

Descripción: Crisponi. Panel
Código: GEN_000142
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Crohn, enfermedad de. Panel
Código: GEN_000327
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: CROMO ORINA
Código: CR2
Técnica: ICP-MS
Unidades: µg/L
Plazo: 7 días
Tubo: Orina Final de Jornada

Descripción:	CROMO ORINA
Comentario adicional:	Al menos 5 mL orina al final de la semana laboral. No recoger muestras de orina en un ambiente en el que sea más probable que ocurra la exposición. Es importante evitar que el polvo de la ropa pueda interferir en el contenido de la muestra. No recoger la orina en recipientes con base de metal, como urinarios o sartenes de metal. Recoger la orina en tubos de polipropileno incoloro libre de metales sin tapones de colores. Cuando esto no sea posible, usar para la recogida de orina un envas
Valores de referencia:	(Inf. 7.5) al final de la semana laboral (exposición a CROMO VI) VLB-INSHT 2024. (Inf. 0.8) Límite de cuantificación

Descripción:	CROMO SUERO
Código:	CR
Técnica:	ICP-MS
Unidades:	µg/L
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero. Al muestra óptima es suero en tubo libre de elementos traza. De forma alternativa se acepta suero.
Valores de referencia:	(Inf. 2) .Personas no expuestas. (Inf. 5) .No existe desgaste en prótesis de cadera (SECCA). (Inf. 0.8) Límite de cuantificación

Descripción:	CROMOGRANINA A SUERO
Código:	CROMOGRANI
Técnica:	EIA
Unidades:	mcg/L
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL de suero. Ayunas.
Valores de referencia:	(Inf. 100)

Descripción:	Crouzon, Sd. Sec Gen: FGFR2
Código:	GEN_000143
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS AG. EN LCR
Código:	CRYPTOLCR
Técnica:	Inmunocromatografía
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 mL
Valores de referencia:	

Descripción:	CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS ANTIGENO SUERO
Código:	CRYPTOAG
Técnica:	Inmunocromatografía

Descripción:	CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS ANTIGENO SUERO
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero refrigerado
Valores de referencia:	Negativo

Descripción:	CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS MUESTRA PCR
Código:	CRYPTOCPCR
Técnica:	HIBRIDACIÓN MOLECULAR CON AMPLIFICACIÓN (PCR)
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	Muestra envios externos
Comentario adicional:	2 mL Sangre Total EDTA, LCR, Humor vitro/acuoso. REFRIGERAR.
Valores de referencia:	

Descripción:	CRYPTOSPORIDIUM MUESTRA PCR
Código:	CRYPTOSPCR
Técnica:	Hibridación molecular (PCR)
Unidades:	
Plazo:	17 días
Tubo:	Muestra envios externos
Comentario adicional:	10 g heces, Biopsia mucosa intestinal. La muestra recomendada es de HECES, por tener este microorganismo su replicación en la mucosa intestinal de intestino delgado. (BAL)Para otras muestras, se necesita justificación del clinico.
Valores de referencia:	

Descripción:	Cuantificación ADN de bloque tumoral parafinado
Código:	CUANTIFADN
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	
Tubo:	Muestra envios externos
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	CUERPOS REDUCTORES EN HECES
Código:	REDUCTORES
Técnica:	Colorimetría
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	heces especiales
Comentario adicional:	1 g heces. CONGELADA
Valores de referencia:	

Descripción:	Culler-Jones, Sd. Sec Gen: GLI2
Código:	GEN_000144
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Descripción: Culler-Jones, Sd. Sec Gen: GLI2
Valores de referencia:

Código: UROCULANTI
Descripción: CULTIVO DE ORINA, IDENTIFICACION Y ANTIBIOGRAMA
Técnica: Cultivo de la muestra en medio cromogénico adecuado
Comentario adicional: Preferiblemente primera orina de la mañana. Recoger orina de la porción media de la micción en recipiente estéril adecuado.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Perfil	CULTIVO		ORINA	CULTIVO GENERAL en ORINA		

Descripción: CULTIVO EN MEDIO LOWENSTEIN IDENTIFICACION Y ANTIBIOGRAMA (C
Código: LOWES
Técnica: Cultivo en medio Lowenstein-Jensen específico para Micobacterias
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: Muestra Microbiología
Comentario adicional: Muestra en frasco esteril
Valores de referencia:

Código: CULTIVO
Descripción: CULTIVO GENERAL
Técnica: Cultivo en medios apropiados
Comentario adicional: Líquido, exudado o muestra biológica

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	AISLADO			Cultivo		
Prueba	OBS.MICRO			Observaciones microbiologia		

Descripción: CULTIVO PRENATAL
Código: CULTPREN
Técnica:
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: LIQUIDO CITOGENETICA
Comentario adicional: Muestra Líquido amniótico o Tejido Prenatal.
Muestra en tubo sin aditivos
Valores de referencia:

Descripción: Currarino, Sd. Sec Gen: MNX1
Código: GEN_000145
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Currarino, Sd. Sec Gen: MNX1
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Cutis Laxa autosómico recesiva. Panel
Código: GEN_000146
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Cutis Laxa. Panel
Código: GEN_000147
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: CYFRA 21.1 SUERO
Código: CYFRA21.1
Técnica: ICMA
Unidades: ng/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero recogido en tubos estándar de muestra o en tubos que contienen gel de separación.
Plasma tratado con heparina de litio o con EDTA di o tripotásico.
Pueden emplearse tubos para plasma que contengan gel de separación.
Valores de referencia: (Inf. 2.37)

Descripción: CYFRA 21-1 EN LIQUIDO PLEURAL
Código: CYFRA211LP
Técnica: Inmunoanálisis
Unidades: ng/mL
Plazo: 12 días
Tubo: Líquido Bioquímica
Comentario adicional: 1 mL líquido pleural
Valores de referencia: (Inf. 50) Compatible con pleuritis benignas

---

Descripción: DAO: mutaciones gen DAO
Código: DAO_GEN
Técnica: SANGER
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: DAO: mutaciones gen DAO
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente
Valores de referencia:

Descripción: Darier-White, enfermedad de. Sec Gen: ATP2A2
Código: GEN_000148
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: DARUNAVIR EN PLASMA
Código: DARUNAVIR
Técnica: LC-MS/MS
Unidades: mcg/mL
Plazo: 12 días
Tubo: Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional: 2 mL plasma (EDTA). CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO
Valores de referencia: (1.26 - 7.37) Dosis 600 mg/dos veces al día

---

Descripción: Def. glucosa-6-fosfato deshidr.: gen G6PD (NGS)
Código: G6PD_MUTS
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Defect coagulac por defici recep prot C. Sec Gen: PROCR
Código: GEN_000152
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Defectos coagula por deficien Factor XI. Sec Gen: F11
Código: GEN_000151
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Descripción: Defectos coagula por deficien Factor XI. Sec Gen: F11
Valores de referencia:

Descripción: Defectos congénitos de la glicosilación. Panel
Código: GEN_000149
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Defectos en la biogénesis de peroxisomas. Panel
Código: GEN_000150
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Defectos en la fosforilación oxidativa. Panel
Código: GEN_000153
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Defectos en la oxidación de los ácidos grasos. Panel
Código: GEN_000154
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Deficiencia del transportador de MCT8: gen SLC16A2 (NGS)
Código: SLC16A2
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM. Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Deficiencia en 21-hidroxilasa: secuenciacion gen CYP21A2
Código: CYP21

Descripción: Deficiencia en 21-hidroxilasa: secuenciacion gen CYP21A2
Técnica: PCR, y secuenciación
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente
Valores de referencia:

Descripción: Deficiencia en 5-alfa-reductasa: gen SRD5A2 (NGS)
Código: ALFA_REDUC
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Deficiencia en mioadelinato desaminasa: gen AMPD1 (NGS)
Código: AMPD1
Técnica: NGS Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Deficiencia en TPMT: gen TPMT (NGS)
Código: TPMT_MUTS
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Deficiencia transp. glucosa 1 (GLUT1): gen SLC2A1 (NGS)
Código: SLC2A1
Técnica: NGS con TSOE de Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit 3-hidroxiacil-CoA deshidrogena. Sec Gen: HADH
Código: GEN_000161
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit 3hidroxiacilCoA deshidrogenasa cad larga Gen HADHA
Código: GEN_000160
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit 3-metilcrotonil-CoA carboxi 1. Sec Gen: MCCC1
Código: GEN_000162
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit 3-metilcrotonil-CoA carboxil2. Sec Gen: MCCC2
Código: GEN_000163
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit Acil-CoA deshidr cadena media. Sec Gen: ACADM
Código: GEN_000165
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit Acil-CoA deshidrog cad larga. Sec Gen: ACADVL
Código: GEN_000167
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días

Descripción: Déficit Acil-CoA deshidrog cad larga. Sec Gen: ACADVL
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit Acil-CoA deshidroge cad corta. Sec Gen: ACADS
Código: GEN_000166
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit acil-CoA oxidasa peroxisomal. Sec Gen: ACOX1
Código: GEN_000168
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit adenina fosforribosiltransfer. Sec Gen: APRT
Código: GEN_000169
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit arginina:glicina amidinotransf. Sec Gen: GATM
Código: GEN_000173
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit carnitina palmitoiltransfer 1. Sec Gen: CPT1A
Código: GEN_000178
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit carnitina palmitoiltransfer 2. Sec Gen: CPT2
Código: GEN_000179
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit carnitina-acilcarnitina. Sec Gen SLC25A20
Código: GEN_000180
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit combinado de hormona pituitaria. Panel
Código: GEN_000158
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de 3-metilcrotonil-CoA carboxilasa. Panel
Código: GEN_000164
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de adenosina deaminasa. Sec Gen: ADA
Código: GEN_000170
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de arginasa. Sec Gen: ARG1
Código: GEN_000172
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días

Descripción: Déficit de arginasa. Sec Gen: ARG1
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de ATP sintasa, nuclear 1. Sec Gen: ATPAF2
Código: GEN_000188
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de beta-cetotiolasa. Sec Gen: ACAT1
Código: GEN_000174
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de biotinidasa. Sec Gen: BTD
Código: GEN_000175
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de butiril-colinesterasa. Sec Gen: BCHE
Código: GEN_000176
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de carnitina-palmitoiltransferasa. Panel
Código: GEN_000177
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de citocromo C oxidasa. Sec Gen: SCO2
Código: GEN_000181
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de coenzima Q10. Sec Gen: APTX
Código: GEN_000183
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de fumarasa. Sec Gen: FH
Código: GEN_000184
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de glipoproteína VI. Sec Gen: GP6
Código: GEN_000156
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de glutamina sintetasa. Sec Gen: GLUL
Código: GEN_000185
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de hormona de crecimiento. Sec Gen: GH1
Código: GEN_000189
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días

Descripción: Déficit de hormona de crecimiento. Sec Gen: GH1
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de hormona hipofisaria. Sec Gen: PROP1
Código: GEN_000187
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de malonil-CoA. Sec Gen: MLYCD
Código: GEN_000190
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de N-acetil glutamato sintasa. Sec Gen: NAGS
Código: GEN_000191
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de ornitina aminotransferasa. Sec Gen: OAT
Código: GEN_000192
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de ornitina transcarbamilasa. Sec Gen: OTC
Código: GEN_000193
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de pir.deshidrogenasa fosfatas. Sec Gen: PDP1
Código: GEN_000196
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de piruvato carboxilasa. Sec Gen: PC
Código: GEN_000194
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de piruvato descarboxilasa. Sec Gen: PDHA1
Código: GEN_000195
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de piruvato quinasa. Sec Gen: PKLR
Código: GEN_000197
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de plasminógeno tipo 1. Sec Gen: PLG
Código: GEN_000198
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de proteína D-bifuncional. Sec Gen: HSD17B4
Código: GEN_000199
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días

Descripción: Déficit de proteína D-bifuncional. Sec Gen: HSD17B4
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de purina nucleósido fosforilasa. Sec Gen: PNP
Código: GEN_000209
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de sacarasa isomaltasa: gen IS (NGS)
Código: SACAR_ISOM
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de succinato-CoQ reductasa. Sec Gen: SDHA
Código: GEN_000202
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit de tetrahidrobiopterina. Panel
Código: GEN_000204
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit del complejo II mitocondrial. Sec Gen: SDHAF1
Código: GEN_000210
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit en alfa-1-antitripsina. Sec Gen: SERPINA1.
Código: GEN_000036
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit en colesterol7alfahidroxilas. Sec Gen: CYP7A1
Código: GEN_000212
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit en tirosin hidroxilasa. Sec Gen: TH
Código: GEN_000207
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit familiar de lipoproteinlipasa. Sec Gen: LPL
Código: GEN_000213
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit guanidino-acetato metiltransfe. Sec Gen: GAMT
Código: GEN_000186
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit inhibidor activador plasminógeno. SERPINE1. 4G/5G
Código: GEN_000159
Técnica:
Unidades:
Plazo: 20 días

Descripción: Déficit inhibidor activador plasminógeno. SERPINE1. 4G/5G
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit intelectual lig X. Hipoplasia cerebelosa. Gen OPHN1
Código: GEN_000214
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit intelectual ligado al cr X Hedera. Sec Gen: ATP6AP2
Código: GEN_000215
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit intelectual. Panel
Código: GEN_000216
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit múltiple de carboxilasa. Sec Gen: HLCS
Código: GEN_000217
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit múltiple de sulfatasa. Sec Gen: SUMF1
Código: GEN_000218
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit primario de carnitina. Sec Gen: SLC22A5
Código: GEN_000219
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit primario de coenzima Q10. Panel
Código: GEN_000220
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit prot. E3binding pir. deshidrogen. Sec Gen: PDHX
Código: GEN_000201
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit succíninil-semialdehido-deshidrogen. Gen ALDH5A1
Código: GEN_000203
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficit zinc neonatal transitoria. Sec Gen: SLC30A2
Código: GEN_000157
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Déficits combinados de la fosforilación oxidativa. Panel
Código: GEN_000221
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días

Descripción: Déficits combinados de la fosforilación oxidativa. Panel
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Deg. macular asociada a la edad: 6 polim. (sec. Sanger)
Código: DMAE_SNP
Técnica: SNPs
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente
Valores de referencia:

Descripción: Degeneración de la retina. Panel
Código: GEN_000222
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Degeneración macular asociada a la edad. Panel
Código: GEN_000223
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Degeneración macular asociada a la edad: >10 genes (NGS)
Código: DMAE
Técnica: NGS Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Degeneración macular. Panel
Código: GEN_000224
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Descripción:	Degeneración macular. Panel
Valores de referencia:	

Descripción:	DEHIDROEPIANDROSTERONA -S EN SALIVA
Código:	DEHASSALI
Técnica:	Téc. EIA (Enzimoinmunoanálisis)
Unidades:	ng/mL
Plazo:	23 días
Tubo:	Tubo Especial
Comentario adicional:	1 ml de saliva. Toma de muestra a las 8 mañana.
Valores de referencia:	(0.2 - 2.5) Mujer (0.2 - 2.7) Hombre

Descripción:	DEHIDROEPIANDROSTERONA, SUERO
Código:	DEHA
Técnica:	Técnica EIA
Unidades:	ng/mL
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1mL de suero. Alternativa PLasma EDTA/. Refrigerado
Valores de referencia:	(1.87 - 15.01) Hombre > 14 años (1.65 - 13.50) Mujer > 14 años (0.13 - 1.87) Hombre 6 años - 9 años (0.31 - 2.05) Hombre 9 años - 11 años (0.83 - 2.58) Hombre 11 años - 14 años (0.18 - 1.89) Mujer 6 años - 9 años (1.12 - 2.24) Mujer 9 años - 11 años (0.98 - 3.60) Mujer 11 años - 14 años

Descripción:	DEHIDROEPIANDROSTERONA-S
Código:	DEHAS
Técnica:	Téc. ICMA
Unidades:	µg/mL
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(0.086 - 1.70) Mujer 11 años - 15 años (0.61 - 4.94) Mujer 15 años - 20 años (1.34 - 4.07) Mujer 20 años - 25 años (0.96 - 5.11) Mujer 25 años - 35 años (0.75 - 4.10) Mujer 35 años - 45 años (0.56 - 2.83) Mujer 45 años - 55 años (0.29 - 1.82) Mujer 55 años - 65 años (0.34 - 0.79) Mujer 65 años - 70 años (0.166 - 2.43) Hombre 11 años - 15 años (0.45 - 3.85) Hombre 15 años - 20 años (2.38 - 5.39) Hombre 20 años - 25 años (1.68 - 5.92) Hombre 25 años - 35 años (1.39 - 4.84) Hombre 35 años - 45 años (1.36 - 4.48) Hombre 45 años - 55 años (0.49 - 3.62) Hombre 55 años - 65 años (2.29 - 2.84) Hombre 65 años - 70 años

Descripción: Delec y Dupli MLPA gen MEFV. Fiebre mediterránea familiar
Código: FIEBRME_DE
Técnica: MLPA
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina y Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Delecio y dupli MLPA: gen CFTR, Fibrosis Quisitica y ACBVD
Código: CFTR_MLPA
Técnica: RCP-MLPA
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina y Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Deleciones subteloméricas y síndr. de microdeleción por MLPA
Código: MLPA_RMENT
Técnica: MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina y Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Deleciones y dupli 21-hidroxilasa, MLPA gen CYP21A2
Código: CYP21_MLPA
Técnica: PCR-MLPA
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina y Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Deleciones y dupli MLPA gen GJB2, Cx 26. Hipoacusia heredi
Código: GJB2_MLPA
Técnica: MLPA
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina y Citrato.
Valores de referencia:

Descripción:	Deleciones y Duplicac MLPA gen TSC1.Esclerosis Tuberosa 1
Código:	TSC1_MLPA
Técnica:	MLPA
Unidades:	
Plazo:	20 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina y Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	Deleciones y Duplicac MLPA gen TSC2.Esclerosis Tuberosa 2
Código:	TSC2_MLPA
Técnica:	MLPA
Unidades:	
Plazo:	20 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina y Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	Deleciones y Duplicaciones MLPA gen NF1. Neurofibromatosis 1
Código:	NF1_MLPA
Técnica:	MLPA
Unidades:	
Plazo:	20 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina y Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	Deleciones y Duplicaciones MLPA gen USHA2. Síndrome Usher 2
Código:	USHER2_MLP
Técnica:	MLPA
Unidades:	
Plazo:	20 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina y Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	Deleciones y Duplicaciones MLPA: Diabetes MODY tipos 1al 10
Código:	MODY_MLPA
Técnica:	MLPA
Unidades:	
Plazo:	20 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina y Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción: Demencia de Pick: genes PSEN1 y MAPT (NGS)
Código: DEMEN_PICK
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación
Valores de referencia:

Descripción: Demencia frontotemporal. Panel
Código: GEN_000225
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Demencia Lewy-Boy: secuenciación genes GBA, SNCA y SNCB
Código: LEWY_BODY
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Demencia por cuerpos de Lewy. Sec Gen: SNCA
Código: GEN_000226
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Demencias panel genes
Código: PHARMALAP9
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Imprescindible enviar la historia clínica y formulario de petición de genética o consentimiento informado
Valores de referencia:

Descripción: Demencias. Panel
Código: GEN_000227

Descripción:	Demencias. Panel
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	DENGUE AC. IGG
Código:	DENGUEAC
Técnica:	CLIA
Unidades:	Índice
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero
Valores de referencia:	(Inf. 0.9) Negativo (0.9 - 1.1) Indeterminado (Sup. 1.1) Positivo

Descripción:	DENGUE AC. IGM
Código:	DENGUEACM
Técnica:	CLIA
Unidades:	Índice
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero
Valores de referencia:	(Inf. 0.9) Negativo (0.9 - 1.1) Indeterminado (Sup. 1.1) Positivo

Descripción:	DENGUE VIRUS (SEROTIPOS 1-4 FLAVIVIRUS)PCR
Código:	DENGUEPCR
Técnica:	RT-PCR
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL Plasma EDTA, Suero, Orina, Saliva. Refrigerada
Valores de referencia:	

Descripción:	Dent, enfermedad de. Panel
Código:	GEN_000228
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Denys-Drash, Sd. Sec Gen: WT1
Código:	GEN_000229

Descripción: Denys-Drash, Sd. Sec Gen: WT1
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Código: DEPORTPLUS
Descripción: Deporte +Nutrigenetica+ Suplementos y vitaminas
Técnica:
Comentario adicional: Muestra EDTA rotulada con BM y hoja de petición especial (wellness)

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	DEPORGEN			T. genetico predisposicion rendimiento deportivo		
Prueba	NUTRIGEN			T. genetico nutricion y metabolismo		
Prueba	SUPLEMEN			Estudio genético para suplementos alimenticios y vitaminas		

Código: BIENESTAR
Descripción: Deporte+Nutrigenetica+Intolerancias +Suplementos y vitaminas
Técnica:
Comentario adicional: Muestra EDTA rotulada con BM y hoja de petición especial (wellness)

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	DEPORGEN			T. genetico predisposicion rendimiento deportivo		
Prueba	NUTRIGEN			T. genetico nutricion y metabolismo		
Prueba	INTALIGEN			Test genético intolerancia gluten, lactosa y fructosa		
Prueba	SUPLEMEN			Estudio genético para suplementos alimenticios y vitaminas		

Descripción: DESALQUILFLURAZEPAM EN SUERO
Código: DESFLURAZE
Técnica: Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectrometría de masas
Unidades: µg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL Suero. Refrigerado.
Alternativamente 1 mL plasma EDTA TRIPOTÁSICO.
Valores de referencia: (10 - 150) Rango Terapéutico

Descripción: DESMOGLEINA-1 (Dsg-1) AC. SUERO
Código: DESMOGL1
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: Ratio
Plazo: 8 días

Descripción:	DESMOGLEINA-1 (Dsg-1) AC. SUERO
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	(Inf. 1.00) Negativo

Descripción:	DESMOGLEINA-3 (Dsg-3) AC. SUERO
Código:	DESMOGL3
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	Ratio
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	(Inf. 1.00) Negativo

Descripción:	Desoxicorticosterona a los 30 minutos
Código:	DESOXI30
Técnica:	Radioinmunoanálisis
Unidades:	ng/dL
Plazo:	32 días
Tubo:	Suero 30 minutos
Comentario adicional:	2 mL suero.Alternativa plasma de heparina. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO
Valores de referencia:	

Descripción:	Desoxicorticosterona a los 60 minutos
Código:	DESOXI60
Técnica:	
Unidades:	ng/dL
Plazo:	32 días
Tubo:	Suero 60 Minutos
Comentario adicional:	2 mL suero.Alternativa plasma de Heparina CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO
Valores de referencia:	

Descripción:	DESOXICORTICOSTERONA EN SUERO
Código:	DESOXICOR
Técnica:	LC-MS/MS
Unidades:	ng/dL
Plazo:	32 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	2 ml de suero. Alternativa plasma de heparina. INDISPENSABLE INFORMAR EDAD. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO
Valores de referencia:	(Inf. 105) < 1 dia (7 - 49) 1 mes - 1 año (2 - 34) 2 años - 10 años (2 - 15) > 15 años (Inf. 90) Después de ACTH

Descripción:	DETECCION DE CANDIDA ALBICANS EN MUESTRA POR PCR
Código:	CANDIDAPCR

Descripción:	DETECCION DE CANDIDA ALBICANS EN MUESTRA POR PCR
Técnica:	RT-PCR
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Muestra envios externos
Comentario adicional:	Enviar los escobillones secos, sin medio. secreción vaginalRefrigeración citologia liquidaRefrigeración orinaRefrigeración salivaRefrigeración exudado heridaRefrigeración liquido biologico-recipiente esterilRefrigeración medula osea- tubo sangre edtaRefrigeración BALRefrigeración BASRefrigeración Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío. Enviar los escobillones secos, sin medio. Estabilidad de la muestra
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta

Descripción:	Detección de la expansión (CTG/CAG) del gen ATXN8OS
Código:	SCA8_EXPA
Técnica:	PCR, TP-PCR, y análisis de fragmentos
Unidades:	
Plazo:	20 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	Detección de la expansión (CAG) del gen ATXN7
Código:	SCA7_EXPA
Técnica:	PCR, TP-PCR, y análisis de fragmentos
Unidades:	
Plazo:	20 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	Detección de la expansión (CAG) del gen CACNA1A
Código:	SCA6_EXPA
Técnica:	PCR, TP-PCR, y análisis de fragmentos
Unidades:	
Plazo:	20 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	Detección de la expansión (CAG) del gen ATXN1
Código:	SCA1_EXPA

Descripción: Detección de la expansión (CAG) del gen ATXN1
Técnica: PCR, TP-PCR, y análisis de fragmentos
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Detección de la expansión GGCCTG del gen NOP56
Código: SCA36_EXPA
Técnica: PCR, TP-PCR, y análisis de fragmentos
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Detección de la expansión (CAG) del gen TBP
Código: SCA17_EXPA
Técnica: PCR, TP-PCR, y análisis de fragmentos
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Detección de mutaciones específicas LONG PCR (Pseudogenes)
Código: LONG_PCR
Técnica: LONG PCR
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Detección del gen de fusión KMT2A/AFF1 (MLL-AF4)
Código: KMT2A_AFF1
Técnica:
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: 3 tubos de EDTA exclusivos para esta determinación: tubo sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con onco.

IMPORTANTE: MUESTRA REFRIGERADA

Muestra: sangre periférica o médula ósea
NO PINCHAR VIERNES NI VÍSPERAS DE FESTIVOS: la sangre se empieza a procesar dentro de las primeras 48 horas desde la extracción

Descripción: Detección del gen de fusión KMT2A/AFF1 (MLL-AF4)
Valores de referencia:

Descripción: Detección del virus de la viruela del mono
Código: MONO_VIRU
Técnica:
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Exudado (Escobillón con medio de transporte de virus)
Exudado (Escobillón seco)-REFRIGERAR

Muestra recomendada:
Exudado de lesión cutánea (vesículas, pústulas). Contactar con el laboratorio antes de solicitar el estudio.REFRIGERAR

Valores de referencia:

Descripción: Detección del virus del molluscum contagiosum
Código: MOLLU_CONT
Técnica:
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Lesión de piel o exudado de herida en escobillón seco
4ºC: 48 Horas;-20ºC: 3 Meses

Valores de referencia:

Descripción: Detección expansión (GAA)n del gen FGF14 (SCA27B) + TP-PCR
Código: SCA27_EXPA
Técnica: PCR, TP-PCR, y análisis de fragmentos
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas:Citrato.
Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.

Valores de referencia:

Descripción: Detección expansión (GAA)n del gen FGF14 (SCA27B) + TP-PCR
Código: SCA27_EXPA
Técnica: PCR, TP-PCR, y análisis de fragmentos
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas:Citrato.
Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.

Valores de referencia:

Descripción: Detección expansión (GAA)n del gen FGF14 (SCA27B) + TP-PCR
Código: SCA27_EXPA
Técnica: PCR, TP-PCR, y análisis de fragmentos
Unidades:

Descripción:	Detección expansión (GAA)n del gen FGF14 (SCA27B) + TP-PCR
Plazo:	20 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas:Citrato. Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.
Valores de referencia:	

Descripción:	Determinación presencia/ausencia del gen SRY (PCR)
Código:	SEXO_GEN
Técnica:	RT-PCR
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	2 tubos de 10mL sangre EDTA
Valores de referencia:	

Descripción:	Determinación temprana del sexo fetal en sangre materna
Código:	SEXOFETAL
Técnica:	PCR digital
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	STRECK BIOPSIA LIQUIDA
Comentario adicional:	2 Tubos Streck cfDNA.Solicitar tubos al almacen.ENVIAR A TEMPERATURA AMBIENTE Y PROTEGIDO CON PAPEL DE BURBUJA junto con hoja de solicitud/CI Se realiza a partir de la semana 10 de gestación
Valores de referencia:	

Descripción:	DEXAMETASONA SUERO
Código:	DEXAMETA
Técnica:	Cromatografía Líquida de Alta Resolución
Unidades:	ng/mL
Plazo:	17 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	2 mL suero
Valores de referencia:	(Sup. 1.0) 8 a.m tras 1 mg Dexametasona noche anterior (Sup. 8.0) 8 a.m tras 8 mg Dexametasona (4x2 mg) día anterior

Descripción:	Diabetes insípida nefrogénica ligada X. Sec Gen: AVPR2
Código:	GEN_000232
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Diabetes insípida nefrogénica. Panel
Código:	GEN_000233
Técnica:	
Unidades:	

Descripción: Diabetes insípida nefrogénica. Panel
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Diabetes insípida. Sec Gen: AVP
Código: GEN_000231
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Diabetes Mellitus neonatal permanente (PNDM). Panel
Código: GEN_000234
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Diabetes Mellitus neonatal transitoria (TNDM). Panel
Código: GEN_000235
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Diabetes MODY. Panel
Código: GEN_000236
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Diabetes MODY1 a 6: >10 genes (NGS)
Código: MODY_1_6
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.

Descripción: Diabetes MODY1 a 6: >10 genes (NGS)
Valores de referencia:

Descripción: Diabetes MODY1: gen HNF4A (NGS)
Código: MODY1_GEN
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Diabetes MODY2: gen GCK (NGS)
Código: MODY2_GEN
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Diabetes MODY3: gen HNF1A (NGS)
Código: MODY3_GEN
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Diabetes MODY4: gen PDX1 (NGS)
Código: MODY4_GEN
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Diabetes MODY5: TCF2 (NGS)
Código: MODY5_GEN
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.

Descripción:	Diabetes MODY5: TCF2 (NGS)
Valores de referencia:	

Descripción:	Diabetes MODY6: gen NEUROD1 (NGS)
Código:	MODY6_GEN
Técnica:	PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:	
Plazo:	21 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	DIAMINOOXIDASA (DAO) CONCENTRACION
Código:	DIAMINOOX
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	U/mL
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml suero
Valores de referencia:	(Inf. 3) Alta incidencia de intolerancia a la histamina (3 - 10) Probable intolorencia a la histamina (Sup. 10) Baja incidenca de intolerancia a la histamina

Descripción:	Diaminooxidasa actividad
Código:	DAO2.EXT
Técnica:	Radioinmunoensayo
Unidades:	U/mL
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 ml de suero congelado, separar rápidamente y congelar a -20ºC En casos puntuales, podrá también enviarse plasma EDTA congelado.
Valores de referencia:	(3.74 - 12.54) Moderada capacidad de degradacion de histamina (40-80 HDU) (Sup. 12.54) Alta capacidad de degradación de histamina (>80 HDU)

Descripción:	Diarrea congénita por cloreto. Sec Gen: SLC26A3
Código:	GEN_000237
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Código:	DIAZE
Descripción:	DIAZEPAM (DIAZEPAM+NORDIAZEPAM) EN SUERO
Técnica:	Cromatografía líquida/Tándem masas
Comentario adicional:	

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	DIAZEPAM	3548-5		PERFIL DIAZEPAM (DIAZEPAM)	mcg/mL	
Prueba	NORDIAZEPA	3537-8		PERFIL DIAZEPAM (NORDIAZEPAM)	mcg/mL	
Prueba	DIAZESUMA	16757-7		PERFIL DIAZEPAM (DIAZEPAM TOTAL)	mcg/mL	(0.20 - 2.50) Valores terapéuticos indicativos

Descripción: DIBUCAINA NUMERO SUERO
Código: DIBUCA
Técnica: Cinética
Unidades: %
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: (75 - 100) Normal
(30 - 75) Heterozigoto
(Inf. 30) Homozigoto

Descripción: DIETA INFLAM + marcadores antioxidantes
Código: TDICOM
Técnica:
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional: 1 tubos de 3 mL de sangre total EDTA K2 (protegido de la luz, por ejemplo, envolver en papel de aluminio)

•1 tubos de 3 mL de sangre total EDTA K2 (centrifugar, separar 1 alícuota y congelar – marcar tubo como PLEC) para TIOTOT

•1 tubo de gelosa suero de 8,5 mL (centrifugar, separar 1 alícuota y congelarla) para CQ10

•1 tubo de SUET (libre de metales) de 5 mL Refrigerada 3 días / Congelada 1 mes

Valores de referencia:

Descripción: DIFTERIA AC IGG
Código: DIFTERIA
Técnica: Técnica EIA
Unidades: UI/mL
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 0.01) Sin protección
(0.01 - 0.1) Protección no efectiva. Se recomienda revacunación.
(0.1 - 1) Protección básica
(Sup. 1) Protección efectiva

Descripción: DIGESTION DE PRINCIPIOS INMEDIATOS (HECES)
Código: DIGES
Técnica: Microscopía óptica
Unidades:

Descripción:	DIGESTION DE PRINCIPIOS INMEDIATOS (HECES)
Plazo:	3 días
Tubo:	HECES MICRO MUESTRA 1
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	DIGITOXINA SUERO
Código:	DIGITOXI
Técnica:	Quimioluminiscencia
Unidades:	ng/mL
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL de suero refrigerado (2-8ºC) Volumen mínimo 0.20 mL
Valores de referencia:	(10 - 25)

Descripción:	DIGOXINA
Código:	DIGO
Técnica:	Inmunoensayo
Unidades:	ng/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(0.8 - 2.0) Rango Terapéutico

Descripción:	DIHIDROTESTOSTERONA SUERO
Código:	DIHIDROTES
Técnica:	EIA
Unidades:	pg/mL
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml suero refrigerado.
Valores de referencia:	(143 - 842) Hombre > 18 años (0 - 596) Mujer 18 años - 50 años Premenopausia (0 - 431) Mujer 50 años - 83 años Postmenopausia (Inf. 85.7) Hombre 1 año - 9 años (11.1 - 875.6) Hombre 9 años - 14 años (70.3 - 1260.9) Hombre 14 años - 18 años (Inf. 88.9) Mujer 2 años - 9 años (22.5 - 280.6) Mujer 9 años - 14 años (62.6 - 760.3) Mujer 14 años - 18 años

Descripción:	DIMERO D PLASMA
Código:	DIMEROD
Técnica:	INMUNOTURBIDIMETRIA
Unidades:	ng/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:	1 mL plasma
Valores de referencia:	(Inf. 500)

Descripción: Dis. ectodérmica anhidrótica,inmunodef. Osteopetrosis. IKBKG
Código: GEN_000258
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Discapacidad intelectual con alfa-talasemia lig X. Gen ATRX
Código: GEN_000239
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Discinesia ciliar primaria. Kartagener, Sd. Panel
Código: GEN_000238
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Discinesia paroxística cinesiogénica fam: gen PRRT2 (NGS)
Código: PRRT2
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Discinesia paroxística. Panel
Código: GEN_000241
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Disfunción del metabolismo del surfactante pulmonar. Panel
Código: GEN_000242
Técnica:
Unidades:

Descripción: Disfunción del metabolismo del surfactante pulmonar. Panel
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Disgenesia gonadal completa 46,XY. Sec Gen: SRY
Código: GEN_000243
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Disgenesia reticular. Sec Gen: AK2
Código: GEN_000245
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Disgenesia, respuesta ovárica estimulac FSH. Gen: FSHR
Código: GEN_000244
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Dishormonogénesis tiroidea familiar 2A. Sec Gen: TPO
Código: GEN_000246
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Dislipemias panel de genes
Código: PHARMALAP4
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Dislipemias panel de genes
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Imprescindible enviar la historia clínica y formulario de petición de genética o consentimiento informado
Valores de referencia:

Descripción: Disostosis acrofacial de Weyers. Panel
Código: GEN_000247
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Disostosis acrofacial, tipo Weyers. Sec Gen: EVC
Código: GEN_000248
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Disostosis espondilocostal autosómico recesiva. Panel
Código: GEN_000249
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia acromesomélica Maroteaux. Sec Gen: NPR2
Código: GEN_000250
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia arritmogénica ventrículo derecho.: >10 genes (NGS)
Código: DAVD
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 40 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.

Descripción: Displasia arritmogénica ventrículo derecho.: >10 genes (NGS)
Valores de referencia:

Descripción: Displasia campomélica. Sec Gen: SOX9
Código: GEN_000251
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia cleidocraneal. Sec Gen: RUNX2
Código: GEN_000252
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia cráneo -metafisaria AD. Sec Gen: SOST
Código: GEN_000254
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia cráneo -metafisariaAD. Sec Gen: ANKH
Código: GEN_000253
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia craneofrontonasal. Sec Gen: EFNB1
Código: GEN_000692
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia de Schneckenbecken. Sec Gen: SLC35D1
Código: GEN_000255

Descripción: Displasia de Schneckenbecken. Sec Gen: SLC35D1
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia diastrófica. Sec Gen: SLC26A2
Código: GEN_000256
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia ectoderm. anhidrótica Inmunodefi celula T. NFKBIA
Código: GEN_000257
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia ectodérmica hidrótica tipo 2. Sec Gen: GJB6.
Código: GEN_000260
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia ectodérmica hidrótica2: gen GJB6 (sec. Sanger)
Código: EDA2_MUTS
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Displasia ectodérmica hipohidrótica ligada al X. Gen: EDA
Código: GEN_000261
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días

Descripción: Displasia ectodérmica hipohidrótica ligada al X. Gen: EDA
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia ectodérmica hipohidrótica. Panel
Código: GEN_000262
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia ectodérmica. Panel
Código: GEN_000263
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia epifisaria múltiple: gen COMP (NGS)
Código: COMP
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Displasia epifiseal múltiple. Panel
Código: GEN_000264
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia epifisaria-falángica forma de ángel. Gen: GDF5
Código: GEN_000265
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia espondiloepifisaria tardía cr. X. Gen: TRAPPC2
Código: GEN_000266
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia espondiloepimetafisaria anauxética. Gen: RMRP
Código: GEN_000267
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia esquelét platiespondilítica letal,Torrance. COL2A1
Código: GEN_000269
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia esquelética de Eiken. Sec Gen: PTH1R
Código: GEN_000268
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia esquelética. Sec Gen: CHST3
Código: GEN_000270
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia inmuno ósea de Schimke. Sec Gen: SMARCAL1
Código: GEN_000271
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días

Descripción: Displasia inmuno ósea de Schimke. Sec Gen: SMARCAL1
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia mandibuloacral con lipoDistr. tip A (MADA). Panel
Código: GEN_000272
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia oculodentodigital. Sec Gen: GJA1
Código: GEN_000273
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia ósea esclerosante. Sec Gen: SOST
Código: GEN_000274
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia osteoglofónica. Sec Gen: FGFR1
Código: GEN_000275
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia septo-óptica. Sec Gen: HESX1
Código: GEN_000276
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia ventricular arritmogénica aislada derecho. JUP
Código: GEN_000277
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasia ventricular arritmogénica aislada derecho: TGFB3
Código: GEN_000278
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Displasias esqueléticas: >10 genes
Código: DISPLA_ESQ
Técnica: NGS y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Disqueratosis congénita AD tipo 1. Sec Gen: TERC
Código: GEN_000279
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Disqueratosis congénita XL - Zinsser-Cole-Engman. Gen: DKC1
Código: GEN_000280
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Disqueratosis congénita. Panel
Código: GEN_000281
Técnica:
Unidades:

Descripción:	Disqueratosis congénita. Panel
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	DISTOMATOSIS AC. SUERO (FASCIOLA HEPATICA)
Código:	FASCIOLAAC
Técnica:	Hemaglutinación
Unidades:	Titulo
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL de suero. Volumen 1.0 mL (mínimo 0.57 mL)
Valores de referencia:	> 1:320 Positivo <1:160 Negativo 1:160 Indeterminado

Descripción:	Distonía de torsión DYT1: gen TOR1A (NGS)
Código:	DYT1_MUTS
Técnica:	PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	Distonía de torsión DYT5: gen GCH1 (NGS)
Código:	DYT5_MUTS
Técnica:	PCR, secuenciación, y MLPA
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	Distonía de torsión DYT6: gen THAP1 (NGS)
Código:	DYT6_MUTS
Técnica:	PCR y secuenciación
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	Distonía hereditaria sensible a L-dopa secundaria. GCH1
Código:	GEN_000282
Técnica:	

Descripción: Distonía hereditaria sensible a L-dopa secundaria. GCH1
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distonía mioclónica DYT11: gen SGCE (NGS)
Código: DYT11_MUTS
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Distonía mioclónica. Panel
Código: GEN_000283
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distonía primaria mioclónica. Sec Gen: DRD2
Código: GEN_000284
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distonía. Panel
Código: GEN_000288
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distonía-parkinsonismo hipermanganesemia. Gen: SLC30A10
Código: GEN_000285
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Distonía-parkinsonismo hipermanganesemia. Gen: SLC30A10
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distonía-parkinsonismo inicio rápido. Sec Gen: ATP1A3
Código: GEN_000286
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distonía-parkinsonismo ligado al X. Sec Gen: TAF1
Código: GEN_000287
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distr. corneal congénita del estroma. Sec Gen: DCN
Código: GEN_000289
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distr. corneoretinal cristalina Bietti. Sec Gen: CYP4V2
Código: GEN_000292
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distr. coroidea areolar central tip 2. Sec Gen: PRPH2
Código: GEN_000293
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distr. facioescapulohumeral tipo 2. Sec Gen: SMCHD1
Código: GEN_000297
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distr. macular viteliforme de Best. Sec Gen: BEST1
Código: GEN_000299
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distr. muscular congénita Fukuyama. Sec Gen: FKTN
Código: GEN_000303
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distr. Sorsby fondo de ojo, pseudoinflamatoria. Gen: TIMP3
Código: GEN_000740
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distrof. musc. Emery-Dreiffuss: genes EMD, FHL1 y LMNA (NGS)
Código: EMERY_DREI
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Distrof. muscular Emery-Dreifuss 1 ligada al X. Gen: EMD
Código: GEN_000307
Técnica:
Unidades:

Descripción: Distrof. muscular Emery-Dreifuss 1 ligada al X. Gen: EMD
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distrof. muscular Emery-Dreifuss 6 ligada al X. Gen: FHL1
Código: GEN_000308
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distrofia corneal de Meesman: gen KRT12 (NGS)
Código: DISTRO_COR
Técnica: NGS Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distrofia corneal. Panel
Código: GEN_000290
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distrofia corneana, microquística. Sec Gen: TGFBI
Código: GEN_000291
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distrofia de conos y bastones. Sec Gen: AIPL1
Código: GEN_000294
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Descripción: Distrofia de conos y bastones. Sec Gen: AIPL1
Valores de referencia:

Descripción: Distrofia de conos y bastones: >10 genes (NGS)
Código: DIS_CONBAS
Técnica: NGS Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distrofia de retina de Bothnia. Sec Gen: RLBP1
Código: GEN_000295
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distrofia facio-escápulo-humeral
Código: DISTROFFEH
Técnica: PCR y Southern blotting
Unidades:
Plazo: 65 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: 20 mL sangre total EDTA. INDISPENSABLE enviar información clínica y antecedentes familiares.

Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: DISTROFIA FACIOESCAPULOHUMERAL 1 - HAPLOTIPO SSLP
Código: FSHD1_HAPL
Técnica: PCR-Análisis de fragmentos.
Unidades:
Plazo: 35 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Mínimo 15ml Sangre EDTA
Valores de referencia:

Descripción: Distrofia macular corneal. Sec Gen: CHST6
Código: GEN_000298
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distrofia macular juvenil de retina: gen ABCA4 (NGS)
Código: STARGARDT
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Distrofia macular pseudovitel.: genes BEST1 y PRPH 2 (NGS)
Código: DIST_VITEL
Técnica: NGS Illumina y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distrofia macular y/o de retina. Sec Gen: SIX6
Código: GEN_000300
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distrofia macular. Panel
Código: GEN_000302
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distrofia macular. Sec Gen: PRPH2
Código: GEN_000301
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distrofia miotónica 1 (Steinert): gen DMPK secuencia (CTG)n
Código: DISTROFIAM
Técnica: PCR, TP-PCR, y análisis de fragmentos

Descripción: Distrofia miotónica 1 (Steinert): gen DMPK secuencia (CTG)n
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.
Valores de referencia:

Descripción: Distrofia miotónica 2: gen CNBP secuencia (CCTG)n
Código: DISTROFI_2
Técnica: PCR, TP-PCR y análisis de fragmentos
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.
Valores de referencia:

Descripción: Distrofia musc. oculofaríngea: gen PABPN1 secuencia (GCN)
Código: PABPN1_GCN
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente
Valores de referencia:

Descripción: Distrofia muscular congénita tipo 1C. Sec Gen: FKRP
Código: GEN_000305
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distrofia muscular congénita. Sec Gen: LAMA2
Código: GEN_000304
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distrofia muscular de cintura 1B/CMT2B1: gen LMNA (NGS)
Código: LMNA

Descripción: Distrofia muscular de cintura 1B/CMT2B1: gen LMNA (NGS)
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Distrofia muscular de cinturas 2A: gen CAPN3 (NGS)
Código: CAPN3_MUTS
Técnica: PCR, secuenciación, y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Distrofia muscular de cinturas 2B: gen DYSF (NGS)
Código: DYSF
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Distrofia muscular de cinturas: >10 genes (NGS)
Código: D_CINTURAS
Técnica: NGS con TSO Illumin
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distrofia muscular de Duchenne-Becker. Sec Gen: DMD
Código: GEN_000306
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distrofia muscular Duchenne/Becker: del. y dup. gen DMD
Código: DUCHENNE
Técnica: MLPA

Descripción: Distrofia muscular Duchenne/Becker: del. y dup. gen DMD
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Distrofia muscular espinal tipo 1. Sec Gen: SEPN1
Código: GEN_000309
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distrofia muscular. Panel
Código: GEN_000310
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distrofia retiniana. Panel
Código: GEN_000311
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Distrofia torácica asfixiante tipo 2. Sec Gen: IFT80
Código: GEN_000312
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: DIURETICOS EN ORINA
Código: DIURETICOS
Técnica: Cromatografía Líquida / Tándem masas (LC-MS/MS)
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Orina pruebas referencia

Descripción: DIURETICOS EN ORINA
Comentario adicional: 10 ml orina.Micción aislada.
Esta determinación detecta la presencia HIDROCLOROTIAZIDA, ACETETAZOLAMIDA, CLORTALIDONA, FUROSEMIDA, TRIAMTERENO, XIPAMIDA, INDAPAMIDA, TORASEMIDA,Y ESPIRONOLACTO
Valores de referencia:

Descripción: DNA ASCARIS LUMBRICOIDES
Código: DNAASCARIS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional: Muestra: heces, orina...muestras focalizadas al punto de infección.
Valores de referencia:

Descripción: DNA Chlamydia tracho/Neisseria gonor. muestra oral
Código: DNCNOR
Técnica: PCR-Real time
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional: exudado bucal refrigerado
Valores de referencia:

Descripción: DNA Chlamydia tracho/Neisseria gonor. muestra oral
Código: DNCNOR
Técnica: PCR-Real time
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional: exudado bucal refrigerado
Valores de referencia:

Descripción: DNA NATIVO (n-DNA) DSDNA ANTICUERPOS
Código: NDNAAC
Técnica: EIA
Unidades: UI/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 10) Negativo
(10 - 15) Indeterminado
Límite de cuantificación: 1.5 UI/mL

Descripción: DNA NATIVO AC. (n-DNA) EN LCR
Código: NDNAACLCR
Técnica: EIA
Unidades: U/mL
Plazo: 4 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 ml LCR

Descripción:	DNA NATIVO AC. (n-DNA) EN LCR
Valores de referencia:	(Inf. 20)

Descripción:	DNASA B anticuerpos en suero
Código:	DNASABAC
Técnica:	Nefelometría-turbidimetría
Unidades:	UI/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml suero
Valores de referencia:	(Inf. 300) < 14 años (Inf. 200) > 14 años

Descripción:	DNP ANTICUERPOS (DESOXI-RIBONUCLEOPROTEÍNA)
Código:	DNPAC
Técnica:	Aglutinación de partículas
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. Refrigerar.
Valores de referencia:	Valor de referencia indicativo: Negativo

Descripción:	Donnai-Barrow, Sd. Sec Gen: LRP2
Código:	GEN_000313
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	DOPAMINA AC. ANTI RECEPTOR 2 (D2R) SUERO
Código:	DOPRACSUE
Técnica:	INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA EN CÉLULAS TRANSFECTADAS
Unidades:	
Plazo:	16 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL SUERO (alt. Plasma CONGELADO) Volumen mínimo 0.30mL
Valores de referencia:	

Descripción:	DOPAMINA AC. ANTI RECEPTOR 2 (DR2) LCR
Código:	DOPRACLCR
Técnica:	INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA (CELL BINDING ASSAY)
Unidades:	
Plazo:	46 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 mL LCR.
Valores de referencia:	

Descripción: Dos individuos adicionales legal: Paternidad y parentesco
Código: PATER2HIJ3
Técnica:
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Lleva KIT especial con cadena de custodia, solictar a asesoría genética, Enviar con las muestras a Alfonso XII
Muestra: mucosa bucal con Hisopo sin medio

Esta prueba es para 2 individuos adicionales tanto para paternidad como parentesco
Valores de referencia:

Código: DOXEPINA
Descripción: DOXEPINA (doxepina + desmetildoxepina), Suero
Técnica: LC-MS/MS
Comentario adicional: 2 mL

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	SUMADOX	3582-4		(doxepina+desmetildoxepina)	ng/mL	(30 - 150) Rango terapeutico indicativo
Prueba	DOXEPIN	3579-0		Perfil Doxepina	ng/mL	
Prueba	DESDOXE	3862-0		Perfil desmetildoxepina	ng/mL	

Descripción: DPPX AC. (Dipeptidil Aminopeptidasa like Protein-6) SUERO
Código: DPPXAC
Técnica: INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL Suero.
Valores de referencia: Negativo: Título <1/10

Descripción: DPPX ANTICUERPOS LCR(determinación aislada)
Código: DPPXACLCR
Técnica:
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: LIQUIDO LCR INMUNO
Comentario adicional: 1 ml LCR
Valores de referencia:

Descripción: DPYD*2A (toxicidad a FU)
Código: DPYD_2A
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA

Descripción: DPYD*2A (toxicidad a FU)

Comentario adicional: Al menos 1 ml de Médula Ósea en tubo EDTA o al menos 5 ml de Sangre Periférica en tubo EDTA. Tubo exclusivo para esta determinación (tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO).

IMPORTANTE: SIEMPRE REFRIGERADO

Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.

Valores de referencia:

Descripción: DROGA EN SALIVA (UNA DETERMINACION)

Código: DROGASALIV

Técnica: LC-MS/MS

Unidades: ng/mL

Plazo: 10 días

Tubo: Saliva

Comentario adicional: Saliva recogida en kit ORAL-EZE. Solicitar kit en el almacen. Especificar la droga a analizar.

Valores de referencia:

Descripción: DROGAS EN SALIVA. PANEL 10 DROGAS

Código: SALIVDAO10

Técnica: LC-MS/MS

Unidades: ng/mL

Plazo: 10 días

Tubo: Saliva

Comentario adicional: Saliva recogida en kit ORAL-EZE. Solicitar kit en el almacen.

Valores de referencia:

Descripción: Duane-Radial Ray, Sd. Sec Gen: SALL4

Código: GEN_000314

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: DULOXETINA

Código: DULOXETINA

Técnica: Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectrometría de masas.

Unidades: ng/mL

Plazo: 5 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 2 mL Suero (Congelado)

Valores de referencia: (20 - 80)

Descripción: ECHINOCOCCUS AC. IGG

Código: ECHINOCIGG

Técnica: Enzimoinmunoanálisis

Unidades: Indice

Plazo: 7 días

Tubo: Suero Basal

Descripción:	ECHINOCOCCUS AC. IGG
Comentario adicional:	1 mL suero Alternativa: Plasma de citrato o heparina
Valores de referencia:	(Inf. 9) Negativo (9 - 11) Indeterminado (Sup. 11) Positivo

Descripción:	ECHINOCOCCUS GRANULOSUS AC.TOTALES SUERO (HIDATIDOSIS)
Código:	HIDATIAC
Técnica:	CLIA
Unidades:	Indice
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 0.9) Negativo (0.91 - 1.09) Indeterminado (Sup. 1.1) Positivo

Descripción:	ECHINOCOCCUS spp IGG INMUNOBLOT
Código:	ECHINOBLOT
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	12 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	ECHOVIRUS AC. IgG EN LCR
Código:	ECHOVIIGGL
Técnica:	Tec. EIA
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 1) Negativo (Sup. 1) Positivo

Descripción:	ECHOVIRUS AC. IGG EN SUERO
Código:	ECHOVIIGG
Técnica:	EIA
Unidades:	Indice
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	suero
Valores de referencia:	(Inf. 0.9) Negativo (0.9 - 1.09) Indeterminado (Sup. 1.09) Positivo

Descripción:	ECHOVIRUS AC. IgM EN LCR
Código:	ECHOVIIGML
Técnica:	Tec. EIA

Descripción:	ECHOVIRUS AC. IgM EN LCR
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 1) Negativo (Sup. 1) Positivo

Descripción:	ECHOVIRUS AC. IGM EN SUERO
Código:	ECHOVIIGM
Técnica:	EIA
Unidades:	Indice
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	suero
Valores de referencia:	(Inf. 0.9) Negativo (0.9 - 1.1) Indeterminado (Sup. 1.1) Positivo

Descripción:	EDAD BIOLOGICA Y LONGEVIDAD
Código:	EBLONGEVID
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	20 días
Tubo:	Tubo Especial
Comentario adicional:	Kit especial. Solicitar a almacén
Valores de referencia:	

Descripción:	Ehlers-Danlos clásico: genes COL1A,1 COL5A1 y COL5A2 (NGS)
Código:	EHLERSD1_2
Técnica:	PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	Ehlers-Danlos hipermóvil: genes TNXB y COL3A1 (NGS)
Código:	EHLERHIPER
Técnica:	NGS Illumina y MLPA
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Ehlers-Danlos tipo IV: gen COL5A1 (NGS)
Código:	EHLERSD_5A
Técnica:	PCR, secuenciación y MLPA

Descripción:	Ehlers-Danlos tipo IV: gen COL5A1 (NGS)
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	Ehlers-Danlos: >10 genes (NGS)
Código:	EHLERSDTOT
Técnica:	NGS con TSOE Illumina y MLPA
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	EHRLICHIA CHAFFEENSIS AC.IGG
Código:	EHRCHAACG
Técnica:	IFI
Unidades:	Titulo
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero Volumen mínimo 0.10 mL
Valores de referencia:	Negativo < 1:64 Positivo >1:64

Descripción:	EHRLICHIA CHAFFEENSIS AC.IGM
Código:	EHRCHAACM
Técnica:	IFI
Unidades:	Titulo
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL de Suero Volumen mínimo 0.10 mL
Valores de referencia:	Negativo <1:64 Positivo > 1:64

Descripción:	EJ AC. SUERO
Código:	EJAC
Técnica:	Inmunoblot
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	Negativo

Descripción:	ELASTASA ANTICUERPOS
Código:	ELASTASAAC

Descripción: ELASTASA ANTICUERPOS
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 23 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1mL de suero
Valores de referencia: (Inf. 0.80) Negativo
(0.80 - 1.20) Indeterminado
(Sup. 1.20) Positivo

Descripción: ELASTASA PANCREATICA HECES
Código: ELASTASAHE
Técnica: CLIA
Unidades: mcg/gheces
Plazo: 5 días
Tubo: Heces No Microbiología
Comentario adicional: HECES REFRIGERADO.
No requiere que los pacientes ingieran una dieta especial o interrumpan la terapia de reemplazo de enzimas pancreáticas.
Valores de referencia: (Sup. 200) :Normal
(100 - 200) :Insuficiencia pancreática exocrina leva a moderada
(Inf. 100) :Insuficiencia pancreática exocrina severa

Descripción: ELASTASA PLASMA EDTA
Código: ELASTASAPL
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: µg/L
Plazo: 17 días
Tubo: Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional: 1 mL de plasma de EDTA.
Valores de referencia: (19.0 - 78.0)

Código: ELP
Descripción: ELECTROFORESIS DE PROTEINAS SU
Técnica: Electroforesis
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	ALB_P	13980-8		ALBUMINA, PROTEINOGRAMA	%	(54.70 - 69.66)
Prueba	ALFA1	13978-2		ALFA-1-GLOBULINAS	%	(2.63 - 5.03)
Prueba	ALFA2	13981-6		ALFA-2-GLOBULINAS	%	(4.87 - 10.48)
Prueba	BETA	13982-4		BETA GLOBULINAS	%	(7.73 - 16.30)
Prueba	GAMMA	13983-2		GAMMA GLOBULINAS	%	(9.69 - 18.90)
Prueba	A_G	44429-9		COCIENTE ALBUMINA/GLOBULINA		(1.1 - 2.1)
Prueba	SUMA2			SUMA PROTEINOGRAMA		(98 - 101)
Prueba	PT	2885-2		PROTEINAS TOTALES SUERO	g/dL	(6 - 8.3)
Prueba	NOTAPROT	12851-2		NOTA PROTEINOGRAMA		
Prueba	GRAFICO			Grafico Proteinograma		
Prueba	ALB_P#			ALBUMINA PROTEINOGRAMA GRAMOS	g/dL	(3.5 - 5.1)

Componentes						
Prueba	ALFA1#			ALFA-1-GLOBULINAS GRAMOS	g/dL	(0.1 - 0.4)
Prueba	ALFA2#			ALFA-2-GLOBULINAS GRAMOS	g/dL	(0.51 - 0.85)
Prueba	BETA#			BETA GLOBILINAS GRAMOS	g/dL	(0.60 - 0.94)
Prueba	GAMMA#			GAMMA GLOBULINAS GRAMOS	g/dL	(0.8 - 1.35)

Código: ELPLCR
Descripción: ELECTROFORESIS EN LCR
Técnica: Electroforesis
Comentario adicional: LCR. REFRIGERAR.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	LPT			PROTEINAS TOTALES EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO	mg/dL	(15 - 45)
Prueba	LPREALB	13973-3		PREALBUMINA EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO	%	(2 - 7)
Prueba	LALB	13974-1		ALBUMINA EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO	%	(56 - 76)
Prueba	LALFA1	13972-5		ALFA 1 GLOBULINA EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO	%	(2 - 7)
Prueba	LALFA2	13975-8		ALFA 2 GLOBULINA EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO	%	(4 - 12)
Prueba	LBETA	13976-6		BETA GLOBULINA EN LIQUIDO CELAFORRAQUIDEO	%	(5.3 - 12)
Prueba	LTAU	58463-1		TAU GLOBULINA LCR (perfil electroforesis)	%	(2.7 - 6)
Prueba	LGAMMA	13977-4		GAMMA GLOBULINA EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO	%	(3 - 12)
Prueba	A_G_LCR			COCINETE ALBUMINA /GLOBULINA EN LCR		(0 - 4.5)

Descripción: Eliptocitosis: genes EPB41, SPTA1, SPTB y SLC4A1 (NGS)
Código: ELIPTOCITO
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.
Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: EMA (EOSIN 5 MALEIMIDE) RELACIONADO CON ESFEROCITOSIS HEREDI
Código: EMA
Técnica: citometría de flujo
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 5 mL sangre total EDTA. 2 extensiones de sangre reciente sin teñir.IMPRESCINDIBLE: Adjuntar historia clínica y día de la extracción

Descripción:	EMA (EOSIN 5 MALEIMIDE) RELACIONADO CON ESFEROCITOSIS HEREDI
Valores de referencia:	(Sup. 0.86) Valores del test EMA inferiores a 0.86 se asocian a esferocitosis hereditaria

Descripción:	ENA (ANTIGENOS NUCLEARES EXTRAIBLES) AC. SUERO
Código:	ENA
Técnica:	EIA
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	Negativo

Descripción:	Encefalopatía atípica por glicina. Sec Gen: AMT
Código:	GEN_000315
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Encefalopatía epiléptica infantil temprana. Panel NGS
Código:	GEN_000316
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Encefalopatía epiléptica infantil. Panel Ampliado NGS
Código:	GEN_000317
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Encefalopatía epiléptica precoz infantil. Sec Gen: ARX
Código:	GEN_000318
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Encefalopatía epiléptica temprana: gen CDKL5 (NGS)
Código:	CDKL5

Descripción: Encefalopatía epiléptica temprana: gen CDKL5 (NGS)
Técnica: PCR, secuenciación, y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Encefalopatía infantil por glicina. Sec Gen: GCSH
Código: GEN_000319
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Encefalopatía neonatal grave. Sec Gen: MECP2
Código: GEN_000320
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Encefalopatía por glicina. Panel NGS
Código: GEN_000321
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: ENDOMISIO AC. IGA
Código: ENDOMIACA
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: Negativo < 1/10
Positivo >1/10

Descripción: ENDOMISIO AC. IGG
Código: ENDOMIACG
Técnica: IFI
Unidades:

Descripción:	ENDOMISIO AC. IGG
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	Negativo <1/10 Positivo >1/10

Descripción:	Enf, Alzheimer 3 y 6: gen PSEN1 (NGS)
Código:	ALZH_PSEN1
Técnica:	NGS Illumina y MLPA
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Enf. Alzheimer 1: gen APP (NGS)
Código:	ALZH_APP
Técnica:	NGS Illumina y MLPA
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Enf. Alzheimer 4: gen PSEN2 (NGS)
Código:	ALZH_PSEN2
Técnica:	NGS Illumina y MLPA
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Enf. cerebral peq. vasos hemorragia. Sec Gen: COL4A1
Código:	GEN_000322
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Enf. de Gilbert: gen UGT1A1 (TA)n promotor (sec. Sanger)
Código:	GILBERTGEN
Técnica:	PCR y secuenciación
Unidades:	
Plazo:	30 días

Descripción: Enf. de Gilbert: gen UGT1A1 (TA)n promotor (sec. Sanger)
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente
Valores de referencia:

Descripción: Enf. de Pompe: gen GAA (NGS)
Código: GAA_MUTS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.
Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Enf. Osler-Weber-Rendu: genes ENG, ACVRL1, SMAD4, GDF2 (NGS)
Código: HHT
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Enf. Parkinson de aparición temprana (PDEO): <10 genes (NGS)
Código: PARKINS_EO
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Enf. por cuerpos poliglucosanos adulto. Sec Gen: GBE1
Código: GEN_000339
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enferm. veno-oclusiva hepática inmunodeficiencia. Gen: SP110
Código: GEN_000341
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días

Descripción: Enferm. veno-oclusiva hepática inmunodeficiencia. Gen: SP110
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad celiaca: haplotipos HLADQ2 y HLADQ8
Código: HLACELIACA
Técnica: PCR e hibridación con sondas
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas:Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad de Alzheimer: <10 genes (NGS)
Código: ALZHEIMER
Técnica: NGS con TSOE y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Sec Gen: PRNP
Código: GEN_000326
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad de Devic: gen AQP4 (NGS)
Código: DEVIC
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad de Fabry, Alfa Galactosidasa A, sangre seca
Código: GALACTSECA
Técnica: Fluorimetrica
Unidades: mcmol/Lxhora
Plazo: 32 días
Tubo: Tubo Especial

Descripción: Enfermedad de Fabry, Alfa Galactosidasa A, sangre seca
Comentario adicional: Sangre seca recogida en papel de filtro especial. Pedir instrucciones. Indispensable informe clinico y antecedentes familiares
Valores de referencia: (4.7 - 18.8)

Descripción: Enfermedad de Fabry: gen GLA (NGS)
Código: FABRY
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad de Gaucher: gen GBA (NGS)
Código: GAUCHERDNA
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad de Hirschsprung. Sec Gen: RET
Código: GEN_000329
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad de Huntington: gen HTT secuencia (CAG)n
Código: HUNTINGTON
Técnica: PCR, TP-PCR, y análisis de fragmentos
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce. Panel
Código: GEN_000330
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce. Panel
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad de Menkes: gen ATP7A (NGS)
Código: MENKES_MUT
Técnica: NGS y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad de multiminicore. Panel
Código: GEN_000332
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad de músculo-ojo-cerebro. Sec Gen: POMGNT1
Código: GEN_000333
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad de Norrie: gen NDP (NGS)
Código: NORRIE
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad de Parkinson 1: gen SNCA (NGS)
Código: PARKINSON1
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.

Descripción: Enfermedad de Parkinson 1: gen SNCA (NGS)
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad de Parkinson 2: gen PARK2 (NGS)
Código: PARKINSON2
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad de Parkinson 8: gen LRRK2 (NGS)
Código: PARKINSON8
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad de Parkinson AD: genes SNCA, LRRK2 y VPS35 (NGS)
Código: PARKINS_AD
Técnica: Secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad de Parkinson AR: <10 genes (NGS)
Código: PARKINS_AR
Técnica: Secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo:
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad de Parkinson: >10 genes (NGS)
Código: PARKINSON
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Descripción: Enfermedad de Parkinson: >10 genes (NGS)
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad de Tay Sachs: gen HEXA (NGS)
Código: TAY_SACHS
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad de Von Hippel-Lindau: gen VHL (NGS)
Código: VHL_MUTS
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad de Wilson: gen ATP7B (NGS)
Código: WILSON
Técnica: PCR, Secuenciación, y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad del núcleo central. Sec Gen: RYR1
Código: GEN_000334
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad granulomatosa crónica. Panel NGS
Código: GEN_000335
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad granulomatosa crónica: gen CYBB (NGS)
Código: CYBB
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo:
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad hepática poliquística. Sec Gen: PRKCSH
Código: GEN_000336
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Panel NGS
Código: GEN_000337
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: ENFERMEDAD MEDIBLE RESIDUAL (EMR) LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA
Código: EMR_LLA
Técnica: Citometría de flujo
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 1 tubo de EDTA de 5ml
Valores de referencia:

Descripción: ENFERMEDAD MEDIBLE RESIDUAL (EMR) LINFOMA
Código: EMR_LNH
Técnica: Citometría de flujo
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 1 tubo de EDTA de 5ml
Valores de referencia:

Descripción: ENFERMEDAD MEDIBLE RESIDUAL (EMR) MIELOMA MÚLTIPLE
Código: EMR_MM
Técnica: Citometría de flujo
Unidades:

Descripción: ENFERMEDAD MEDIBLE RESIDUAL (EMR) MIELOMA MÚLTIPLE
Plazo: 4 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 1 tubo de EDTA de 5ml
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad medular quística renal: genes UMOD y MUC1 (NGS)
Código: UROMO_MUTS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad renal poliquística AD. Sec Gen: PKD1
Código: GEN_000340
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad renal quística medular 2AD. Sec Gen: UMOD
Código: GEN_000568
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedad von Willebrand: gen VWF (NGS)
Código: WILLEB_SEC
Técnica: NGS y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedades autoinflamatorias. Panel
Código: GEN_000342
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Enfermedades autoinflamatorias. Panel
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedades lisosomales. Panel NGS
Código: GEN_000343
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedades mitocondriales. Panel NGS
Código: GEN_000344
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedades musculares panel de genes
Código: PHARMALAP6
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Imprescindible enviar la historia clínica y formulario de petición de genética o consentimiento informado
Valores de referencia:

Descripción: Enfermedades priónicas: gen PRNP (NGS)
Código: PRION_ENF
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato y muestra de tejido.
Valores de referencia:

Descripción: ENOLASA NEURONAL ESPECIFICA SUERO
Código: NSE
Técnica: Electroquimioluminiscencia
Unidades: ng/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal

Descripción:	ENOLASA NEURONAL ESPECIFICA SUERO
Comentario adicional:	1 mL suero. Evitar muestra de Plasma. La hemólisis interfiere esta determinación. Se recomienda centrifugar la muestra en menos de 1 hora
Valores de referencia:	(Inf. 16.3)

Descripción:	ENOLASA NEURONAL ESPECIFICA LCR
Código:	NSELCR
Técnica:	Enzimoinmunoanalisis
Unidades:	µg/l
Plazo:	7 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 ml. Evitar la hemolisis
Valores de referencia:	(Inf. 13)

Descripción:	ENOLASA NEURONAL ESPECIFICA LIQ.PLEURAL
Código:	NSEPLEURAL
Técnica:	Inmunoanálisis
Unidades:	ng/mL
Plazo:	4 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 ml de Líquido Pleural.
Valores de referencia:	Valores inferiores a 13.0 ng/ml son compatibles con Pleuritis benignas

Descripción:	ENTAMOEBA HISTOLYTICA MUESTRA PCR
Código:	ENTAMOEPCR
Técnica:	Hibridación molecular (PCR)
Unidades:	
Plazo:	12 días
Tubo:	Muestra envios externos
Comentario adicional:	Heces frescas. suero y heces congeladas
Valores de referencia:	

Descripción:	ENTAMOEBA HISTOLYTICA AC (AMEBIASIS)
Código:	AMEBAAC
Técnica:	Hemaglutinación
Unidades:	Titulo
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	Negativo: <1/80 Indeterminado: titulos entre 1/80 y 1/160 Valores significativos : = o > 1/320

Descripción:	ENTAMOEBA HYSTOLITICA ANTIGENO, HECES
Código:	ENTA
Técnica:	Inmunocromatografía.
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	heces especiales

Descripción:	ENTAMOEBA HYSTOLITICA ANTIGENO, HECES
Comentario adicional:	Heces. refrigerar. Cantidad: 5 g (en tubo)
Valores de referencia:	Valor de referencia: Negativo

Descripción:	ENTEROBACTERIAS PORTADORAS DE CARBAPENEMASAS
Código:	EPC
Técnica:	Cultivo
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Microbiología
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	ENTEROCITOS AC. (AIE-75) SUERO
Código:	ENTEROAC
Técnica:	Radioinmunoprecipitacion (RIPA)
Unidades:	Ratio
Plazo:	17 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero refrigerado
Valores de referencia:	(Inf. 10) Negativo (10 - 15) Indeterminado (Sup. 15) Positivo

Descripción:	ENTEROVIRUS ANTICUERPOS IgG SUERO
Código:	ENTEROIGG
Técnica:	EIA
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	(Inf. 0.80) Negativo (0.80 - 1.09) Indeterminado (Sup. 1.10) Positivo

Descripción:	ENTEROVIRUS ANTICUERPOS IgM SUERO
Código:	ENTEROIGM
Técnica:	EIA
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1mL suero refrigerado
Valores de referencia:	(Inf. 0.80) Negativo (0.80 - 1.09) Indeterminado (Sup. 1.10) Positivo

Descripción:	ENTEROVIRUS EN HECES
Código:	ENTEROVHEC
Técnica:	INMUNOCROMATOGRAFÍA
Unidades:	

Descripción:	ENTEROVIRUS EN HECES
Plazo:	4 días
Tubo:	Heces No Microbiología
Comentario adicional:	Heces.
Valores de referencia:	NEGATIVO

Descripción:	Enterovirus RNA RT-PCR Cualitativa
Código:	ENTEROVIRU
Técnica:	RT-PCR
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:	1 ml LCR-CONGELAR 1 ml plasma EDTA-CONGELAR 0,5ml líquido pericárdico-CONGELAR 5g heces (sólo niños)-CONGELAR 5ml Sangre total EDTA-REFIRGERAR
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta

Descripción:	ENVOPLAQUINA ANTICUERPOS SUERO
Código:	ENVOPLAQ
Técnica:	EIA
Unidades:	Ratio
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero
Valores de referencia:	(Inf. 1) Negativo

Descripción:	ENZIMA CONVERTIDOR ANGIOTENSINA EN LCR
Código:	ECALCR
Técnica:	Espectrometria
Unidades:	U/L
Plazo:	9 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 mL LCR. Refrigerar.
Valores de referencia:	(Inf. 11.3)

Descripción:	ENZIMA CONVERTIDOR DE LA ANGIOTENSINA SUERO (ECA)
Código:	ECA
Técnica:	Cinética
Unidades:	U/L
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL de suero. Alternativa: Plasma de litio/sodio, separado inmediatamente de los eritrocitos El plasma de EDTA interfiere en esta determinación
Valores de referencia:	(13.3 - 63.9) > 14 años (5 - 83) < 3 años (8 - 76) 3 años - 8 años (6 - 89) 8 años - 14 años

Descripción: Enzima convertidora de angiotensina: polimorfirmos (Sanger)
Código: ECA_MUTS
Técnica: PCR y Secuenciación
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente
Valores de referencia:

Código: ENZLISOLEU
Descripción: ENZIMAS LISOSOMALES EN LEUCOCITOS
Técnica: Fluorimetría
Comentario adicional: 10 mL Sangre total (anticoagulante heparina). Refgigerada

Indispensable concertación previa si la preparación de leucocitos se ha de realizar en nuestro Centro. Si lo prefieren pueden enviar los leucocitos congelados en nieve carbónica preparados según se describe en el Anexo (Consultar comentario).

Se debe adjuntar un preparado de leucocitos control de un individuo no emparentado.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	BGLUCURO	24065-5		BETA-GLUCURONIDASA- Leucocitos	nmol/h/mg prot	(147 - 1148)
Prueba	PALMIPROTI	74935-8		PALMITOIL PROTEÍNA TIOESTERASA- Leucocitos	nmol/h/mg prot	(12.7 - 26.0)
Prueba	TRIPEPT	76038-9		TRIPEPTIDIL PEPTIDASA I - Leucocitos	nmol/h/mg prot	(173 - 318)
Prueba	COMENZLISO			COMENTARIO ENZIMAS LISOSOMALES LEUCOCITOS		

Descripción: Epidermolisis ampollosa simple, AR 1, Dowling-Meara. Panel
Código: GEN_000347
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Epidermolisis bullosa con atresia pilórica. Panel NGS
Código: GEN_000348
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Epidermolisis bullosa distrófica: gen COL7A1 (NGS)
Código: EPIDERMOLI

Descripción: Epidermolisis bullosa distrófica: gen COL7A1 (NGS)
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Epidermolisis bullosa juntural estenosis pilóric. Gen: ITGA6
Código: GEN_000349
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Epidermolisis bullosa simple, AR, tipo1. Gen: KRT14
Código: GEN_000350
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Epidermolisis bullosa simple. Sec Gen: KRT5
Código: GEN_000351
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Epidermolisis bullosa. Panel NGS
Código: GEN_000352
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Epilepsia AD con afectación auditiva. Sec Gen: LGI1
Código: GEN_000353
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días

Descripción: Epilepsia AD con afectación auditiva. Sec Gen: LGI1
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Epilepsia con Displasia. Panel NGS
Código: GEN_000354
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Epilepsia de ausencias juveniles 1. Sec Gen: EFHC1
Código: GEN_000355
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Epilepsia dependiente de piridoxina. Sec Gen: ALDH7A1
Código: GEN_000358
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Epilepsia femenina retraso mental: gen PCDH19 (NGS)
Código: PCDH19
Técnica: PCR, secuenciación, y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Epilepsia mioclónica progr. Lafora: secu. EPM2A y NHLRC1
Código: LAFORA_MUT
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Descripción: Epilepsia mioclónica progr. Lafora: secu. EPM2A y NHLRC1
Valores de referencia:

Descripción: Epilepsia mioclónica progresiva. Panel NGS
Código: GEN_000356
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Epilepsia nocturna dominante del lóbulo frontal. Panel NGS
Código: GEN_000357
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Epilepsia panel de genes
Código: PHARMALP11
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Imprescindible enviar la historia clínica y formulario de petición de genética o consentimiento informado
Valores de referencia:

Descripción: Epilepsia relacionada con piridoxina. Panel NGS
Código: GEN_000359
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Epilepsia Síndrome de Dravet: gen SCN1A (NGS)
Código: SCN1A
Técnica: PCR, secuenciación, y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción:	Epilepsia: >10 genes (NGS)
Código:	EPILEPSIA
Técnica:	NGS Illumina y MLPA
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	EPSTEIN BARR AC. VCA IGG
Código:	EPSBARRACG
Técnica:	CLIA
Unidades:	
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero
Valores de referencia:	(Inf. 0.74) Negativo (0.75 - 0.99) Indeterminado (Sup. 1.00) Positivo

Descripción:	EPSTEIN BARR AC. VCA IGA
Código:	EPSBARRACA
Técnica:	ELISA
Unidades:	
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1mL de suero refrigerado. Alt. Plasma heparina o citrato
Valores de referencia:	(Inf. 9) (9 - 11) (Sup. 11)

Descripción:	EPSTEIN-BARR AC. EARLY ANTIGEN IGG
Código:	EBEARLAC
Técnica:	CLIA
Unidades:	UI/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero. Alternativo 1 mL plasma de EDTA. ALTERNATIVA: plasma citrato, plasma heparina
Valores de referencia:	(Inf. 10) Negativo

Descripción:	EPSTEIN-BARR AC. VCA IGG EN LCR
Código:	EPSBARGLC
Técnica:	IFI
Unidades:	Titulo
Plazo:	5 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 mL LCR. refrigerar.

Descripción:	EPSTEIN-BARR AC. VCA IGG EN LCR
Valores de referencia:	Título <1/2 Negativo Título >o = 1/2 Positivo

Descripción:	EPSTEIN-BARR AC. VCA IGM EN LCR
Código:	EPSBARMLC
Técnica:	IFI
Unidades:	Titulo
Plazo:	5 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 mL LCR. Se recomienda efectuar análisis simultáneo en suero y LCR
Valores de referencia:	Título <1/2 Negativo Título > o = 1/2 Positivo

Descripción:	EPSTEIN-BARR AC. VCA IGM
Código:	EPSBARRACM
Técnica:	CMIA
Unidades:	
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero
Valores de referencia:	(Inf. 0.49) Negativo (0.50 - 0.99) Indeterminado (Sup. 1.0) Positivo

Descripción:	EPSTEIN-BARR AC. EARLY ANTIGEN IGM
Código:	EBEARLAIGM
Técnica:	Enzimoinmunoanalisis
Unidades:	Indice
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml de suero. Alternativa Plasma (EDTA o Heparina)
Valores de referencia:	(Inf. 1.0) Negativo (1.0 - 1.2) Indeterminado (Sup. 1.2) Positivo

Descripción:	EPSTEIN-BARR AC. NUCLEAR ANTIGEN (EBNA) IGG
Código:	EBNUCACG
Técnica:	Quimioluminiscencia
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero/PLasma EDTA
Valores de referencia:	(Inf. 0.9) Negativo (0.91 - 1.1) Indeterminado (Sup. 1.11) Positivo

Descripción:	EPSTEIN-BARR AC. NUCLEAR ANTIGEN (EBNA) IGM
Código:	EBNUCACM
Técnica:	IFI
Unidades:	Titulo

Descripción:	EPSTEIN-BARR AC. NUCLEAR ANTIGEN (EBNA) IGM
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero.
Valores de referencia:	Negativo <1:20

Descripción:	Epstein-Barr DNA PCR Cualitativa
Código:	DNAEPSBA
Técnica:	PCR
Unidades:	
Plazo:	6 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:	LCR-CONGELAR 1ml Plasma de EDTA-CONGELAR 3ml Sangre total EDTA-REFRIGERAR 1ml Aspirado bronquial-REFRIGERAR 1ml Lavado broncoalveolar-REFRIGERAR Tejido parafinado-TA 2ml Lavado broncoalveolar-REFRIGERAR
Valores de referencia:	

Descripción:	Epstein-Barr DNA PCR Cuantitativa
Código:	EBVCUAN
Técnica:	PCR cuantitativa
Unidades:	
Plazo:	12 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	2ml Plasma-CONGELAR 2ml LCR-CONGELAR 5ml Sangre total EDTA-REFRIGERAR
Valores de referencia:	

Descripción:	Eritrocitosis. Sec Gen: EPOR
Código:	GEN_000361
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Eritrodermia ictiosiforme congénita no bullosa. Panel NGS
Código:	GEN_000362
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Eritromelalgia hereditaria. Sec Gen: SCN9A
Código:	GEN_000363
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	ERITROPOYETINA
Código:	ERITROPO
Técnica:	ICMA
Unidades:	mU/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero. Evitar plasma de EDTA.
Valores de referencia:	(2.6 - 19)

Descripción:	ERITROPOYETINA ANTICUERPOS
Código:	ERITROANTI
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	Índice
Plazo:	32 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	2 mL suero. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO
Valores de referencia:	

Descripción:	Escherichia coli K1 PCR en LCR
Código:	ECOLIK1PCR
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	Muestra envios externos
Comentario adicional:	1 ml de LCR, puede usarse tambien sangre total
Valores de referencia:	

Descripción:	ESCITALOPRAM, SUERO
Código:	ESCITALO
Técnica:	LC-MS/MS
Unidades:	ng/mL
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	2 mL Suero
Valores de referencia:	(10 - 150)

Descripción:	Esclerosis lateral amiotrófica 1 (ELA1): gen SOD1 (NGS)
Código:	SOD1_MUT
Técnica:	PCR y secuenciación
Unidades:	
Plazo:	30 días

Descripción: Esclerosis lateral amiotrófica 1 (ELA1): gen SOD1 (NGS)
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Esclerosis lateral amiotrófica fam. frontotemporal. C9orf72
Código: GEN_000365
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Esclerosis lateral amiotrófica familiar. Panel NGS
Código: GEN_000366
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Esclerosis lateral amiotrófica juvenil: gen ALS2 (NGS)
Código: ALS2
Técnica: NGS con TSOE Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Esclerosis lateral amiotrófica. Panel NGS
Código: GEN_000364
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Esclerosis lateral amiotrófica: expansión C9orf72
Código: C9ORF72
Técnica: PCR, TP-PCR y análisis de fragmentos
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Esclerosis lateral amiotrófica: expansión C9orf72
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.
Valores de referencia:

Descripción: Esclerosis tuberosa. Sec Gen: TSC1
Código: GEN_000367
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Esclerosis tuberosa. Sec Gen: TSC2
Código: GEN_000368
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Esclerosis tuberosa: genes TSC1 y TSC2 (NGS)
Código: ESCLER_TUB
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 60 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: ESCOPOLAMINA EN ORINA
Código: ESCOPOLAMI
Técnica: Cromatografía líquida/Tándem masas
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Orina Drogas de Abuso
Comentario adicional: 10 mL de orina
Valores de referencia:

Descripción: Esferocitosis hereditaria. Sec Gen: EPB42
Código: GEN_000370
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Descripción: Esferocitosis hereditaria. Sec Gen: EPB42
Valores de referencia:

Descripción: Esferocitosis hereditaria. Sec Gen: SPTB
Código: GEN_000369
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Esferocitosis: <10 genes (NGS)
Código: ESFER_MUTS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: ESLICARBAZEPINA
Código: ESLICARBA
Técnica: Cromatografía Líquida - Tándem Masas (LC-MS/MS)
Unidades: µg/mL
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml suero
Valores de referencia: (10.0 - 35.0)

Descripción: ESPERMATOZOIDES ANTICUERPOS SUERO
Código: ESPERMAAC
Técnica: ELISA
Unidades: Indice
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL Suero (Refrigerado)
Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo

Código: SEMIN
Descripción: ESPERMIOGRAMA
Técnica:
Comentario adicional: Centros de fuera de Madrid, solo se realiza control postvasectomia

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	COLOR	10569-2		ESPERMIOGRAMA: COLOR		
Prueba	VISCOS	32789-0		ESPERMIOGRAMA: VISCOSIDAD		
Prueba	VOLUM	3160-9		ESPERMIOGRAMA: VOLUMEN	mL	

Componentes						
Prueba	PHESPER	2752-4		ESPERMIOGRAMA: PH		
Prueba	NESPER	9780-8		ESPERMIOGRAMA: NUMERO DE ESPERMATOZOIDES	millones/mL	
Prueba	NCELGER	10576-7		ESPERMIOGRAMA: NUMERO CELULAS GERMINALES	Células germina	
Prueba	NLEUCO	10579-1		ESPERMIOGRAMA: NUMERO DE LEUCOCITOS	Leucocitos/mL	
Prueba	NCELRED	10585-8		CELULAS REDONDAS EN SEMEN	células redonda	
Prueba	MOTITOT	6800-7		ESPERMIOGRAMA: MOTILIDAD PROGRESIVA	%	
Prueba	MOTPRO	14194-5		ESPERMIOGRAMA: MOTILIDAD PROGRESIVA	%	
Prueba	MOTNOPRO	10620-3		ESPERMIOGRAMA: MOTILIDAD NO PROGRESIVA	%	
Prueba	INMOVI	10611-2		ESPERMIOGRAMA: MOTILIDAD: INMOVILES	%	
Prueba	MORNOR	10622-9		ESPERMIOGRAMA: MORFOLOGIA NORMAL	%	
Prueba	MORANOR	15376-7		ESPERMIOGRAMA: MORFOLOGIA ANORMALES	% morfologicame	
Prueba	CABEZA	10602-1		ESPERMIOGRAMA: MALFOR. CABEZA	% malformacione	
Prueba	PINTERME	10603-9		ESPERMIOGRAMA: MALFOR. P. INTERMEDIA	% malformacione	
Prueba	COLA	10604-7		ESPERMIOGRAMA: MALFOR. COLA	% malformacione	
Prueba	POLINU	14377-6		ESPERMIOGRAMA: POLINUCLEARES	% polinucleares	
Prueba	LINFOCI	14383-4		ESPERMIOGRAMA: LINFOCITOS	%	
Prueba	ESPERTOTAL	72517-6		ESPERMIOGRAMA: CANTIDAD TOTAL DE ESPERMATOZOIDES EN EYACULAD		
Prueba	OPACIDAD	13359-5		ESPERMIOGRAMA: OPACIDAD		
Prueba	NOTASEMI	15426-0		NOTA SEMINOGRAMA		
Prueba	ITZ	5004594		INDICE DE TERATOZOOSPERMIA		

Descripción: Espondilolistesis Ehlers-Danlos. Sec Gen: SLC39A13
Código: GEN_000371
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Código: ESPUCUL
Descripción: ESPUTO CULTIVO, IDENTIFICACION
Técnica: Cultivo en placas adecuadas
Comentario adicional: La muestra se obtiene tras una expectoración profunda, preferentemente matinal. Se necesitan de 2 a 10 ml, si es posible.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Perfil	CULTIVO		ESPUTO	CULTIVO GENERAL en ESTUDIO MICROBIOLOGICO DE ESPUTO		

Descripción:	Esquizencefalia. Sec Gen: EMX2
Código:	GEN_000372
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	ESTAÑO EN ORINA
Código:	ESTAÑO2
Técnica:	ICP-MS
Unidades:	µg/g creatin.
Plazo:	7 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	10 mL orina (micción aislada). Refrigerar
Valores de referencia:	(Inf. 50)

Descripción:	ESTAÑO EN SANGRE
Código:	ESTAÑO
Técnica:	ICP-MS. Hasta 29-05-2006 AAS/cámara de grafito.
Unidades:	mcg/L
Plazo:	11 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	2 ml sangre total (EDTA)
Valores de referencia:	(Inf. 50) No exposición

Descripción:	Estenosis supravalvular aórtica. Sec Gen: ELN
Código:	GEN_000373
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	ESTIRENO EN SANGRE TOTAL
Código:	ESTIR
Técnica:	Cromatografía de gases-ionización de llama
Unidades:	mg/L
Plazo:	12 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	5 mL sangre total al final de la jornada laboral

Descripción:	ESTIRENO EN SANGRE TOTAL
Valores de referencia:	(Inf. 0.20) Final de jornada (exposición a ESTIRENO). Valor límite biológico-VLB(INSS)

Descripción:	ESTRADIOL
Código:	E2
Técnica:	Técnica CMIA
Unidades:	pg/mL
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 44) Hombre > 14 años (24 - 251) Mujer > 14 años F. Folicular (38 - 649) Mujer > 14 años Ovulación (24 - 312) Mujer > 14 años F. Luteínica (Inf. 28) Mujer > 14 años Post-menopausia sin tratamiento hormonal sustitutivo (Inf. 144) Mujer > 14 años Post-menopausia con tratamiento hormonal sustitutivo

Descripción:	ESTRIOL LIBRE (EMBARAZO) SUERO
Código:	ESTRIOLLIB
Técnica:	Inmunoquimioluminiscencia
Unidades:	ng/mL
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1ml suero (Refrigerar) Alt. 1 mL Plasma(Refrigerar)
Valores de referencia:	(Inf. 0.22) Hombre (Inf. 0.20) Mujer (2.10 - 7.40) Mujer 25 semanas gestación (2.20 - 8.00) Mujer 26 semanas gestación (2.30 - 10.00) Mujer 27-29 semanas gestacion (2.70 - 11.70) Mujer 30-31 semanas gestación (2.90 - 18.40) Mujer 32-37 semanas gestación

Descripción:	ESTRIOL SUERO
Código:	ESTRIOL
Técnica:	EIA
Unidades:	ng/mL
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. Alternativa: Plasma humano.
Valores de referencia:	(Inf. 8.5) Mujer (5.49 - 25.30) Mujer 17-20 semanas gestación (6.73 - 41.40) Mujer 21-24 semanas gestación (13.40 - 50.28) Mujer 25-28 semanas gestación (17.49 - 54.91) Mujer 29-32 semanas gestación (18.52 - 61.62) Mujer 33-36 semanas gestación (21.97 - 84.83) Mujer 37 semanas gestación-parto (Inf. 8.50) Hombre

Descripción: ESTRONA SUERO
Código: ESTRONA
Técnica: EIA
Unidades: pg/mL
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL Suero. Refrigerado.

Alt. 1 mL Plasma EDTA Tripotásico, 1mL Plasma Heparina.
Valores de referencia: (15.6 - 77) Hombre
(15.5 - 220.2) Mujer Premenopausia
(11.0 - 54.5) Mujer Postmenopausia

Descripción: ESTRONCIO EN SANGRE
Código: SR
Técnica: ICP-MS
Unidades: µg/L
Plazo: 9 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: 2 mL Sangre total EDTA (2-8 ºC - Refrigerar)
Valores de referencia: (7.8 - 35.0)

Código: BLOQUEONCO
Descripción: Estudio bloque muestra parafinada ONCO/AP
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	EXTRACCADN			Extraccion ADN de bloque tumoral parafinado		
Prueba	CUANTIFADN			Cuantificación ADN de bloque tumoral parafinado		
Prueba	MACRODISEC			AP: MACRODISECCION (MUESTRAS GENETICA)		
Prueba	PORCEN_ADN			Porcentaje ADN tumoral en bloque original		

Descripción: Estudio de cualquier gen por NGS
Código: SEC_UNGEN
Técnica: TP-PCR, y análisis de framgentos
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato
Valores de referencia:

Descripción: ESTUDIO DE E. COLI ENTEROHEMORRÁGICO
Código: ECEH
Técnica: Cultivo
Unidades:

Descripción: ESTUDIO DE E. COLI ENTEROHEMORRÁGICO
Plazo:
Tubo: HECES MICRO MUESTRA 1
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Estudio de una expansión
Código: UNA_EXPANS
Técnica: TP-PCR, y análisis de framgentos
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato
Valores de referencia:

Código: ESTEROLES
Descripción: ESTUDIO DEL METABOLISMO DE LOS ESTEROLES EN SUERO
Técnica: Cromatografía de gases - Ionización de llama.
Comentario adicional: 2 ml de suero. Congelar y enviar congelado. Proteger de la luz con papel de aluminio.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	DHCOL	32289-1		Perfil Esteroles en suero 7-Dehidrocolesterol	µmol/L	(Inf. 8)
Prueba	COLESTENOL	76022-3		Perfil Esteroles en suero 8(9)-Colestenol	µmol/L	(Inf. 2.0)
Prueba	DEHIDROCOL	56535-8		Perfil Esteroles en suero 8-Dehidrocol	µmol/L	(Inf. 2.0)
Prueba	BCOL	74432-6		Perfil Esteroles en suero Beta-Colestanol	µmol/L	(2.2 - 12.6)
Prueba	CAMPESTERO	58464-9		Perfil Esteroles en suero Campesterol	µmol/L	(Inf. 10)
Prueba	COL	14647-2		Perfil Esteroles en suero Colesterol	mmol/L	(1.7 - 6.6)
Prueba	DESMOS	74905-1		Perfil Esteroles en suero Desmosterol	µmol/L	(Inf. 2.0)
Prueba	SITOSTEROL	74907-7		Perfil Esteroles en suero Sitosterol	µmol/L	(Inf. 10.0)
Prueba	COMESTEROL	79327-3		COMENTARIO ESTUDIO METABOLISMO DE LOS ESTEROLES EN SUERO		

Descripción: Estudio genético de cardiopatías
Código: CARDIO_GEN
Técnica: NGS con TSO de Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Estudio genético de respuesta a 113 fármacos
Código: FARMAGEN75
Técnica:
Unidades:

Descripción: Estudio genético de respuesta a 113 fármacos
Plazo: 25 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: Muestra EDTA rotulada con BM y hoja de petición especial (wellness)
Valores de referencia:

Descripción: Estudio genético para suplementos alimenticios y vitaminas
Código: SUPLEMEN
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Muestra EDTA rotulada con BM y hoja de petición especial (wellness)
Valores de referencia:

Descripción: Estudio genómico del complemento: gen C3 (NGS)
Código: C3_MUTS
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Estudio hallazgos 2 mutaciones puntuales
Código: DOS_HALLMT
Técnica: SANGER
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Sangre EDTA rotulada con BM.
Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente
Valores de referencia:

Descripción: Estudio hallazgos CNV
Código: HALLAZCNV
Técnica: MLPA
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación y rotulado con BM.
Valores de referencia:

Descripción: Estudio hallazgos mutación puntual
Código: HALLAZMUTA
Técnica: SANGER
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: Muestra Biología Molecular

Descripción: Estudio hallazgos mutación puntual
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación y rotulado con BM.
Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente
Valores de referencia:

Descripción: ESTUDIO INMUNOHISTOQUIMICO BAP1
Código: IHQBAP1
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo:
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: ESTUDIO INMUNOHISTOQUIMICO CLAUDINA 18
Código: IHQCLAU18
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo:
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: ESTUDIO INMUNOHISTOQUIMICO DE PDL1 CLON 22C3
Código: IHQPDL1_22
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo:
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: ESTUDIO INMUNOHISTOQUIMICO MTAP
Código: IHQMTAP
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo:
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Código: ILMI
Descripción: ESTUDIO MICROINMUNOTERAPIA BASICO (ILMI) SANGRE
Técnica: CF
Comentario adicional: Sangre total EDTA. Refrigerada

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Perfil	MICROINMAV			Perfil Citometria Microinmunoterapia Avanzado		

Código: ILMIBASIC
Descripción: ESTUDIO MICROINMUNOTERAPIA BASICO MAS SEROLOGIA
Técnica:
Comentario adicional: SUERO + EDTA

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Perfil	MICROINMAV			Perfil Citometria Microinmunoterapia Avanzado		
Prueba	CITOACG	5124-3		CITOMEGALOVIRUS AC. IGG	Índice	(Inf. 5.9) Negativo (Sup. 6.0) Inmunidad adquirida o en evolucion
Prueba	EPSBARRACG	5157-3		EPSTEIN BARR AC. VCA IGG		(Inf. 0.74) Negativo (0.75 - 0.99) Indeterminado (Sup. 1.00) Positivo
Prueba	EPSBARRACM	5159-9		EPSTEIN-BARR AC. VCA IGM		(Inf. 0.49) Negativo (0.50 - 0.99) Indeterminado (Sup. 1.0) Positivo
Prueba	EBNUCACG	5156-5		EPSTEIN-BARR AC. NUCLEAR ANTIGEN (EBNA) IGG		(Inf. 0.9) Negativo (0.91 - 1.1) Indeterminado (Sup. 1.11) Positivo
Prueba	EBEARLAC	24007-7		EPSTEIN-BARR AC. EARLY ANTIGEN IGG	UI/mL	(Inf. 10) Negativo
Prueba	HERPES1ACG	51916-5		HERPES SIMPLE TIPO I AC. IGG SUERO (HOMINIS)		(Inf. 0.59) Negativo (0.60 - 0.99) Indeterminado (Sup. 1.0) Positivo
Prueba	HERPES2ACG	43180-9		HERPES SIMPLE TIPO II AC. IGG SUERO (HOMINIS)		(Inf. 0.50) Negativo (0.51 - 0.99) Indeterminado (Sup. 1) Positivo
Prueba	VARICEACG	5403-1		VARICELA ZOSTER AC. IGG SUERO (HERPES ZOSTER)	mUI/mL	(Inf. 150) Negativo (Sup. 150) Positivo
Prueba	PARVB19ACG	5273-8		PARVOVIRUS B19 AC. IGG SUERO	UI/mL	(Inf. 2) Negativo (2.01 - 2.49) Indeterminado (Sup. 2.50) Positivo

Descripción: ESTUDIO PRENATAL DE ESTEROLES EN LIQ. AMNIOTICO
Código: ESTERAMNIO
Técnica: Cromatografía de gases
Unidades:
Plazo: 13 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 5 mL líquido amniótico. Indicar edad gestacional. Indispensable historia clínica y antecedentes familiares
Valores de referencia:

Descripción: ETANERCEPT Y ANTICUERPOS SUERO
Código: ETANERCEPT
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal

Descripción:	ETANERCEPT Y ANTICUERPOS SUERO
Comentario adicional:	2 mL suero. Toma de muestras antes de la administración de la próxima dosis.
Valores de referencia:	

Descripción:	ETIL GLUCURÓNIDO, SUERO
Código:	ETGLS
Técnica:	LC-MS/MS
Unidades:	
Plazo:	14 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml Suero. refrigerar.
Valores de referencia:	Interpretación según criterio clínico

Descripción:	ETILENGLICOL SUERO
Código:	ETILENGLI
Técnica:	Cromatografía de gases
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	2 mL de suero
Valores de referencia:	

Descripción:	ETILGLUCURONIDO CONFIRMACION EN ORINA
Código:	ETILGLCONF
Técnica:	LC-MS/MS
Unidades:	ng/mL
Plazo:	9 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	5 mL orina micción aislada
Valores de referencia:	(Inf. 250)

Descripción:	ETOSUXIMIDA SUERO
Código:	ETOSU
Técnica:	EIA
Unidades:	mcg/mL
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL Suero.
Valores de referencia:	(40 - 100) Niveles terapeúticos indicativos

Descripción:	ETV6(TEL)/RUNX1(AML1) · RT-PCR
Código:	ETV6_RUNX1
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	TUBO ONCOGENETICA

Descripción: ETV6(TEL)/RUNX1(AML1) · RT-PCR
Comentario adicional: 3 tubos de EDTA exclusivos para esta determinación: tubo sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO.

Muestra: sangre periférica o médula ósea

NO PINCHAR VIERNES NI VÍSPERAS DE FESTIVOS: la sangre se empieza a procesar dentro de las primeras 48 horas desde la extracción

Valores de referencia:

Descripción: Evaluacion del microbioma endometrial (Endometriome)
Código: DISBIENDOM
Técnica:
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: BIOPSIA ESPECIAL
Comentario adicional: Solicitar kit especial.Contactar con asesoría genética antes de tomar la muestra.
Valores de referencia:

Descripción: EVERLI COMPLETO (ANEUPLOIDIAS, DELECCIONES Y DUPLICACIONES)
Código: EVERLICOMP
Técnica: NGS (Next Generation Sequencing)
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Prenatal
Comentario adicional: Tubo Streck cfDNA.
Valores de referencia:

Código: EVERGENES
Descripción: EVERLI PLUS + GENESAFE COMPLETO
Técnica: NGS
Comentario adicional: se necesitan 2 kits: Genesafe + Everlyplus

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	EVERLIPLUS			EVERLI TEST COMPLETO MAS 9 SINDROMES DE MICRODELECCION		
Prueba	GENESAFECO			GENESAFE INHERITED + GENESAFE DE NOVO		

Descripción: EVERLI TEST AVANZADO (T21, T18, T13 CrX, CrY)
Código: EVERLIAVAN
Técnica: NGS (Next Generation Sequencing)
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Prenatal
Comentario adicional: Tubo Streck cfDNA.
Valores de referencia:

Descripción: EVERLI TEST BASICO (CROMOSOMAS T21, T18, T13)
Código: EVERLIBASI
Técnica: NGS (Next Generation Sequencing)

Descripción: EVERLI TEST BASICO (CROMOSOMAS T21, T18, T13)
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Prenatal
Comentario adicional: Tubo Streck cfDNA.
Valores de referencia:

Descripción: EVERLI TEST COMPLETO MAS 9 SINDROMES DE MICRODELECCION
Código: EVERLIPLUS
Técnica: NGS (Next Generation Sequencing)
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Prenatal
Comentario adicional: Tubo Streck cfDNA.
Valores de referencia:

Código: EVERLIT21
Descripción: EVERLI TRISOMIA 21
Técnica: NGS
Comentario adicional: Tubo Streck cfDNA. Es el mismo kit que el Everli

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	EVERLI_T21			EVERLI TRISOMIA 21		
Prueba	EVERLISEXO			EVERLI TEST CON/SIN SEXO		
Prueba	EVERLIFETO			EVERLI TEST Nº FETOS		
Prueba	NIPT.FRACC			NIPT FRACCION		
Prueba	NIPT.CROMO			NIPT CROMOSEX		
Prueba	NIPT.DESCR			NIPT DESCRIPCIO		
Prueba	NIPT.ANOMA			NIPT ANOMALIA		

Código: EVERLIT21
Descripción: EVERLI TRISOMIA 21
Técnica: NGS
Comentario adicional: Tubo Streck cfDNA. Es el mismo kit que el Everli

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	EVERLI_T21			EVERLI TRISOMIA 21		
Prueba	EVERLISEXO			EVERLI TEST CON/SIN SEXO		
Prueba	EVERLIFETO			EVERLI TEST Nº FETOS		
Prueba	NIPT.FRACC			NIPT FRACCION		
Prueba	NIPT.CROMO			NIPT CROMOSEX		
Prueba	NIPT.DESCR			NIPT DESCRIPCIO		
Prueba	NIPT.ANOMA			NIPT ANOMALIA		

Descripción:	EVEROLIMUS SANGRE TOTAL
Código:	EVEROLIMUS
Técnica:	Cromatografía líquida / Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)
Unidades:	ng/mL
Plazo:	6 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	1 mL sangre total EDTA Conservación: Refrigerar Muestra extraída en pre dosis.
Valores de referencia:	(3.0 - 8.0) Intervalo terapéutico. Terapia triple (ciclosp. A; corticos.) en transplante renal. (Inf. 0.5) Límite de cuantificación

Descripción:	EXAMEN DE GOTA GRUESA
Código:	GOTAGRUE
Técnica:	Examen microscópico
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Sangre EDTA
Comentario adicional:	2 mL sangre total (EDTA)
Valores de referencia:	

Descripción:	Exoma clínico (NGS)
Código:	EXOMA_TSO
Técnica:	PCR y secuenciación
Unidades:	
Plazo:	40 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	Exoma clínico + ADN mitocondrial completo
Código:	MIT_TSO
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	40 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	Exoma clínico + Exoma Mitocondrial
Código:	EXOCLINMIT
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	40 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Descripción: Exoma clínico + Exoma Mitocondrial
Valores de referencia:

Descripción: Exoma clínico en duo
Código: DUO_TSO
Técnica:
Unidades:
Plazo: 40 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Exoma clínico en trío
Código: TRIO_TSO
Técnica:
Unidades:
Plazo: 40 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Exoma completo (NGS)
Código: EXOMA
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 40 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Exoma completo individual con screening de CNVs
Código: EXOMA_CNV
Técnica:
Unidades:
Plazo: 40 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Exoma completo madre, padre e hijo (NGS)
Código: EXOMA_TRIO
Técnica: NGS Illumina
Unidades:
Plazo: 40 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Descripción: Exoma completo madre, padre e hijo (NGS)
Valores de referencia:

Descripción: Exoma completo: archivos FASTQ
Código: EXOMA_RAW
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Exoma completo: archivos VCF
Código: EXOMA_VCF
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Expresión génica + porcentaje dd-cfDNA
Código: OMNIGRAFT
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional: Tubo Hemasure
Muestras para estudio transplante riñón. Contactar con laboratorio NIPT
Valores de referencia:

Descripción: Extraccion ADN de bloque tumoral parafinado
Código: EXTRACCADN
Técnica: Extraccion de ADN
Unidades:
Plazo:
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Código: CULCONJUN
Descripción: EXUDADO CONJUNTIVAL CULTIVO, IDENTIFICACION
Técnica: Cultivo de la muestra en medios apropiados
Comentario adicional: Torunda con medio tipo Stuart o Amies (medio semi-sólido, no nutriente) y suero salino estéril.
Con la torunda mojada en suero fisiológico recoger el exudado procedente del saco inferior y del canto interno del ojo

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.

Componentes						
Perfil	CULTIVO		CONJUNTIVA	CULTIVO GENERAL en ESTUDIO MICROBIOLOGICO DE EXUDADO CONJUNTIVAL		

Código: CULFAR

Descripción: EXUDADO FARINGEO CULTIVO, IDENTIFICACION

Técnica: Cultivo en medios apropiados

Comentario adicional: Torunda con medio tipo Stuart o Amies (medio semi-sólido, no nutriente)
Tocar con la torunda el fondo de garganta, amígdalas, fosas tonsilares y cualquier otra zona donde exista inflamación, exudado o ulceración

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Perfil	CULTIVO		FARINGE	CULTIVO GENERAL en ESTUDIO MICROBIOLOGICO DE EXUDADO FARINGEO		

Código: CULNA

Descripción: EXUDADO NASAL CULTIVO, IDENTIFICACION

Técnica: Cultivo en medios apropiados

Comentario adicional: Torundas con medio tipo Stuart o Amies (medio semi-sólido, no nutriente).

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Perfil	CULTIVO		NASAL	CULTIVO GENERAL en ESTUDIO MICROBIOLOGICO DE EXUDADO NASAL		

Código: CULOTI

Descripción: EXUDADO OTICO CULTIVO, IDENTIFICACION

Técnica: Cultivo en medios apropiados

Comentario adicional: torundas con medio tipo Stuart o Amies (medio semi-sólido, no nutriente).

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Perfil	CULTIVO		OTICO	CULTIVO GENERAL en ESTUDIO MICROBIOLOGICO DE EXUDADO OTICO		

Código: CULRECTAL

Descripción: EXUDADO RECTAL CULTIVO, IDENTI

Técnica: Cultivo en medios apropiados

Comentario adicional: Torundas con medio en gel tipo Stuart o Amies (medio semi-sólido, no nutriente)

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Perfil	CULTIVO		RECTAL	CULTIVO GENERAL en EXUDADO RECTAL		

Código: CULURE
Descripción: EXUDADO URETRAL CULTIVO, IDENTIFICACION
Técnica: Cultivo en medios apropiados
Comentario adicional: Torundas uretrales finas, de alginato cálcico o Dracon con medios de transporte tipo Stuart-Amies

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Perfil	CULTIVO		URETRAL	CULTIVO GENERAL en ESTUDIO MICROBIOLOGICO DE EXUDADO URETRAL		

Código: CULVAGI
Descripción: EXUDADO VAGINAL CULTIVO, IDENTIFICACION
Técnica: Cultivo en medios apropiados
Comentario adicional: Torundas con medio en gel tipo Stuart o Amies (medio semi-sólido, no nutriente)
Regoger material de la zona con mayor exudado, o en su defecto, del fondo de saco vaginal posterior.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Perfil	CULTIVO		VAGINAL	CULTIVO GENERAL en ESTUDIO MICROBIOLOGICO DE EXUDADO VAGINAL		

Descripción: F-ACTINA AC. IGG SUERO
Código: ACACTINAF
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: Títulos significativos a partir de 1:100

Descripción: FACTOR A DE CRECIMIENTO VASCULAR ENDOTELIAL (VEGF-A)
Código: VEGFA
Técnica: EIA
Unidades: pg/mL
Plazo: 12 días
Tubo: Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional: 1 mL plasma.
CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO
Evitar muestra de suero
Valores de referencia: (Inf. 311.4)

Descripción: FACTOR D DE CRECIMIENTO VASCULAR ENDOTELIAL (VEGF-D)
Código: VEGFD
Técnica: EIA
Unidades: pg/mL
Plazo: 12 días
Tubo: Plasma EDTA Congelado

Descripción:	FACTOR D DE CRECIMIENTO VASCULAR ENDOTELIAL (VEGF-D)
Comentario adicional:	1 mL plasma EDTA. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO
Valores de referencia:	(Inf. 437.0)

Descripción:	FACTOR DE CRECIMIENTO PLACENTARIO (PIGF)
Código:	PIGF
Técnica:	Técnica ECLIA
Unidades:	pg/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	suero refrigerado 48h, sino, suero congelado
Valores de referencia:	(28.8 - 122) Mujer 10-14 sem.gestación (66.2 - 289) Mujer 15-19 sem.gestación (119 - 605) Mujer 20-23 sem.gestación (169 - 1117) Mujer 24-28 sem.gestación (114 - 1297) Mujer 29-33 sem.gestación (78 - 984) Mujer 34-36 sem.gestación (54.4 - 862) Mujer 37 sem.gestación-parto

Descripción:	Factor de Necrosis Tumoral Alfa
Código:	TNF
Técnica:	ELISA
Unidades:	pg/mL
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 ml suero. Separar el suero lo antes posible y CONGELAR. ENVIAR CONGELADO.
Valores de referencia:	(4.60 - 12.40)

Descripción:	FACTOR FLETCHER (PRECALICREINA) EN PLASMA
Código:	FACTFELT
Técnica:	Método coagulométrico
Unidades:	%
Plazo:	32 días
Tubo:	Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:	1 ml Plasma citrato sódico Congelar la muestra inmediatamente
Valores de referencia:	(50 - 150)

Descripción:	FACTOR H COMPLEMENTO SUERO ANTICUERPOS
Código:	FHCOMPLAC
Técnica:	EIA
Unidades:	
Plazo:	32 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	Volumen y condiciones de la muestra: 2 mL suero. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO. Adjuntar historial clínico. INDISPENSABLE enviar alícuota separada del resto de determinaciones.
Valores de referencia:	(Inf. 1.00) Negativo

Descripción:	FACTOR H DEL COMPLEMENTO
Código:	FACTORH

Descripción:	FACTOR H DEL COMPLEMENTO
Técnica:	Inmunodifusión Radial
Unidades:	mg/dL
Plazo:	17 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	2 mL se suero. Congelar y enviar congelado. Adjuntar historial clínico con fecha de nacimiento.
Valores de referencia:	(36 - 68)

Descripción:	FACTOR II PLASMA
Código:	FACTORII
Técnica:	Método coagulométrico
Unidades:	%
Plazo:	9 días
Tubo:	Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(70 - 120)

Descripción:	FACTOR INTRINSECO AC
Código:	FACTORINAC
Técnica:	Técnica EIA
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 0.9) Negativo (0.9 - 1.1) Indeterminado

Descripción:	FACTOR IX EN PLASMA
Código:	FACTORIX
Técnica:	Método coagulométrico
Unidades:	%
Plazo:	9 días
Tubo:	Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(60 - 150)

Descripción:	FACTOR LIBERADOS DE CORTICOTROPINA (CRF)
Código:	CRF
Técnica:	EIA
Unidades:	pg/mL
Plazo:	19 días
Tubo:	Plasma trasylol/aprotinina
Comentario adicional:	1 ml Plasma EDTA Aprotinina (Trasylol) (Congelado) Separar el plasma y congelar inmediatamente después de la extracción.
Valores de referencia:	(12.4 - 64.0)

Descripción:	FACTOR NEFRITICO C3
Código:	FACNEFRITI
Técnica:	Hemólisis

Descripción:	FACTOR NEFRITICO C3
Unidades:	
Plazo:	12 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL de suero con separador. REFRIGERAR.
Valores de referencia:	Valores de referencia indicativos: Negativo

Descripción:	FACTOR Rh
Código:	RH
Técnica:	Aglutinación
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Sangre EDTA
Comentario adicional:	Sangre total EDTA. También se admite citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	FACTOR RH ESTUDIO DU
Código:	RHDU
Técnica:	Microtipaje en columnas
Unidades:	
Plazo:	
Tubo:	Sangre EDTA
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	FACTOR V EN PLASMA
Código:	FACTORV
Técnica:	Método coagulométrico
Unidades:	%
Plazo:	9 días
Tubo:	Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(70 - 120)

Descripción:	FACTOR VII EN PLASMA
Código:	FACTORVII
Técnica:	Método coagulométrico
Unidades:	%
Plazo:	9 días
Tubo:	Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(55 - 170)

Descripción:	FACTOR VIII ANTIGENICO
Código:	FVIIIANTIG
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	%
Plazo:	9 días
Tubo:	Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:	1 mL plasma (citrato) pobre en plaquetas (doble centrifugación a 2500 g/15 min.) Aspirar parte superior. CONGELAR INMEDIATAMENTE Y ENVIAR CONGELADO. Tubo aparte

Descripción:	FACTOR VIII ANTIGENICO
Valores de referencia:	(63 - 199)

Descripción:	FACTOR VIII EN PLASMA
Código:	FACTORVIII
Técnica:	Método coagulométrico
Unidades:	%
Plazo:	9 días
Tubo:	Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(50 - 150)

Descripción:	FACTOR VON WILLEBRAND ACTIVIDAD (COFACTOR DE LA RISTOCETINA)
Código:	RISTOCETIN
Técnica:	Método turbidimétrico basado en la agregación de plaquetas
Unidades:	%
Plazo:	9 días
Tubo:	Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(50 - 200) Los pacientes de grupo sanguíneo O suelen mostrar un VWF:RCo más bajo

Descripción:	FACTOR VON WILLEBRAND ANTIGENO PLASMA
Código:	WILLEBRAND
Técnica:	Técnica inmunoturbidimétrica
Unidades:	%
Plazo:	9 días
Tubo:	Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:	Plasma citrato
Valores de referencia:	(50 - 160)

Descripción:	FACTOR X EN PLASMA
Código:	FACTORX
Técnica:	Método coagulométrico
Unidades:	%
Plazo:	9 días
Tubo:	Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(70 - 120)

Descripción:	FACTOR XI
Código:	FACTORXI
Técnica:	Método coagulométrico
Unidades:	%
Plazo:	9 días
Tubo:	Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(60 - 150)

Descripción:	FACTOR XII EN PLASMA
Código:	FACTORXII

Descripción:	FACTOR XII EN PLASMA
Técnica:	Método coagulométrico
Unidades:	%
Plazo:	9 días
Tubo:	Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(60 - 150)

Descripción:	FACTOR XIII EN PLASMA
Código:	FACTORXIII
Técnica:	Método Inmunoturbidimétrico
Unidades:	%
Plazo:	7 días
Tubo:	Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:	1 mL de plasma citrato refrigerado
Valores de referencia:	(59 - 181)

Descripción:	Fallo espermático tipo 8. Sec Gen: NR5A1
Código:	GEN_000374
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Fallo ovárico precoz. Sec Gen: BMP15
Código:	GEN_000375
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Fanconi-Bickel, Sd. Sec Gen: SLC2A2
Código:	GEN_000376
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Farmacogenética del Clopidogrel: genotipos CYP2C19
Código:	CLOPIDOGRE
Técnica:	PCR
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular

Descripción:	Farmacogenética del Clopidogrel: genotipos CYP2C19
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	Farmacogenética del tamoxifeno: genotipos CYP2D6
Código:	TAMOXIFENO
Técnica:	PCR
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	Feingold, Sd. Sec Gen: MYCN
Código:	GEN_000377
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	FENCICLIDINA EN ORINA CONFIRMACION
Código:	FENCICONF
Técnica:	
Unidades:	mg/mL
Plazo:	12 días
Tubo:	Orina basal
Comentario adicional:	10 ML DE ORINA AISLADA
Valores de referencia:	(Sup. 25) Positivo

Descripción:	FENIL MERCAPTURICO EN ORINA
Código:	FENILMERCA
Técnica:	Cromatografía líquida/Espectrometría de masas tándem
Unidades:	µg/g creatin.
Plazo:	12 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	10 mL orina (micción aislada) al final de la jornada laboral con Cantidad. Refrigerar Volumen mínimo: 5 mL
Valores de referencia:	(Inf. 8) Valor límite biológico (VLB-INSST) Final jornada laboral (exposición BENCENO) Límite de cuantificación: 5 µg/L

Descripción:	Fenilalanina
Código:	FENILALA
Técnica:	Cromatografia líquida/Tándem masas (LC-MS/MS)
Unidades:	mcmol/L
Plazo:	13 días

Descripción:	Fenilalanina
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 mL Suero CONGELADO. Indicar información clínica.
Valores de referencia:	(28 - 80) < 2 años (30 - 95) 2 años - 18 años (35 - 80) > 18 años

Descripción:	FENILALANINA ORINA
Código:	FENILALA2
Técnica:	Técnica Cromatografia Liquida/Tandem masas (LC-MS/MS)
Unidades:	mcmol/g crea.
Plazo:	9 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	10 mL orina (micción aislada).
Valores de referencia:	(58 - 268) < 14 años (39 - 81) > 14 años

Descripción:	Fenilcetonuria. Sec Gen: PAH
Código:	GEN_000378
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	FENITOINA LIBRE (DIFENILHIDANTOINA LIBRE)
Código:	FENITOLI
Técnica:	Técnica Ultrafiltración-Inmunoluminiscencia (Hasta el 19-03-2012 Tec. Ultracentrifugación/EIA)
Unidades:	mcg/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	3 mL
Valores de referencia:	(1.0 - 2.0)

Descripción:	FENITOINA TOTAL (DIFENILHIDANTOÍNA TOTAL)
Código:	FENITO
Técnica:	Inmunoensayo
Unidades:	µg/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(10 - 20) Rango Terapeútico

Descripción:	FENOBARBITAL
Código:	FENOBAR
Técnica:	Inmunoensayo
Unidades:	µg/mL
Plazo:	3 días

Descripción:	FENOBARBITAL
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(15 - 40) Rango Terapeútico

Descripción:	FENOLES LIBRES EN ORINA
Código:	FENOLESLIB
Técnica:	Cromatografía de gases
Unidades:	mg/g creatin.
Plazo:	6 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	10 mL de orina, micción aislada
Valores de referencia:	(Inf. 20) Persona no expuesta (Inf. 40) Exposición (B.E.I.)

Descripción:	FENOLES TOTALES ORINA
Código:	FENOLES
Técnica:	Téc. Cromatografía líquida de alta eficacia
Unidades:	mg/g creatin.
Plazo:	11 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	Muestra de Orina Final de Jornada. 5 mL Orina (Refrigerado) Toma muestra:Final de la jornada laboral.Refrigerar
Valores de referencia:	(Inf. 120) VLB-INSHT. Final jornada laboral (Fenol)

Descripción:	FENOTIPO ERITROCITARIO
Código:	FENOERITRO
Técnica:	Microtipaje en columnas
Unidades:	
Plazo:	6 días
Tubo:	Sangre EDTA
Comentario adicional:	5 mL EDTA
Valores de referencia:	

Descripción:	FENOTIPO Rh
Código:	FENORH
Técnica:	Microtipaje en columnas
Unidades:	
Plazo:	
Tubo:	Sangre EDTA
Comentario adicional:	1 mL sangre total EDTA
Valores de referencia:	

Descripción:	FENTANILO CONFIRMACIÓN ORINA (LC-MS/MS)
Código:	FENTANILOR
Técnica:	Cromatografía líquida/Tándem masas (LC-MS/MS)
Unidades:	ng/mL
Plazo:	7 días
Tubo:	

Descripción: FENTANILO CONFIRMACIÓN ORINA (LC-MS/MS)
Comentario adicional: 5 mL
Volumen mínimo 1 mL
Valores de referencia:

Descripción: FERRITINA
Código: FERRI
Técnica: ICMA
Unidades: ng/mL
Plazo: 2 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL de suero
Valores de referencia: (21.81 - 274.66) Hombre > 15 años
(10 - 204.00) Mujer > 15 años
(200 - 600) 1 semana - 4 semanas
(50 - 200) 4 semanas - 5 meses
(7 - 140) 5 meses - 15 años

Descripción: FERRITINA GLUCOSILADA
Código: FERRIGLUCO
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 23 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 2 mL de suero. Evitar plasma (EDTA). La ferritina debe ser superior a 150 ng/mL
Valores de referencia: (20 - 200) mcg/L Ferritina
(50 - 80) % glicosilación

Descripción: Fertiscan Abortos Recurrentes, panel NGS
Código: ABORTRECUR
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Sangre EDTA Tª ambiente. Rotulado con BM
Tubo exclusivo para esta determinación
Valores de referencia:

Descripción: Fertiscan Defectos maduracion ovocitos, panel NGS
Código: MADUROVOCI
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Sangre EDTA Tª ambiente. Rotulado con BM
Tubo exclusivo para esta determinación
Valores de referencia:

Descripción: Fertiscan Disgenesia ovarica, panel NGS
Código: DISGENOVAR
Técnica: NGS

Descripción: Fertiscan Disgenesia ovarica, panel NGS
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Sangre EDTA Tª ambiente. Rotulado con BM
Tubo exclusivo para esta determinación
Valores de referencia:

Descripción: Fertiscan Hiperestimulacion ovarica, panel NGS
Código: ESTIMOVARI
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Sangre EDTA Tª ambiente. Rotulado con BM
Tubo exclusivo para esta determinación
Valores de referencia:

Descripción: Fertiscan infertilidad Femenina, panel NGS
Código: INFERTFEM
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Sangre EDTA Tª ambiente. Rotulado con BM
Tubo exclusivo para esta determinación
Valores de referencia:

Descripción: Fertiscan Infertilidad Masculina, panel NGS
Código: INFERTMASC
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Sangre EDTA Tª ambiente. Rotulado con BM
Tubo exclusivo para esta determinación
Valores de referencia:

Descripción: Fertiscan Insuficiencia ovarica primaria, panel NGS
Código: INSUFOVARI
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Sangre EDTA Tª ambiente. Rotulado con BM
Tubo exclusivo para esta determinación
Valores de referencia:

Descripción: Fertiscan Mortalida embrionaria previa implantacion, NGS
Código: IMPLANTEMB
Técnica: NGS

Descripción: Fertiscan Mortalida embrionaria previa implantacion, NGS
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Sangre EDTA Tª ambiente. Rotulado con BM
Tubo exclusivo para esta determinación
Valores de referencia:

Descripción: Fertiscan Ovario poliquistico, panel NGS
Código: OVARPOLIQ
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Sangre EDTA Tª ambiente. Rotulado con BM
Tubo exclusivo para esta determinación
Valores de referencia:

Descripción: FIBRILARINA AC. SUERO
Código: FIBRILARAC
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL
Valores de referencia: Negativo

Descripción: FIBRINOGENO
Código: FIBRI
Técnica: Método coagulométrico de Claus
Unidades: mg/dL
Plazo: 3 días
Tubo: Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional: Plasma citrato.
(solución de citrato trisódico 0,109 M: 1 vol. de
citrato por 9 vol. de sangre.)
Valores de referencia: (200 - 400)

Descripción: FIBRINOGENO (PROTEÍNA)
Código: FIBRIPRO
Técnica: Nefelometría
Unidades: g/L
Plazo: 6 días
Tubo: Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional: 1 mL plasma
Valores de referencia: (1.80 - 3.50)

Descripción: Fibrodisplasia osificante progresiva. Sec Gen: ACVR1
Código: GEN_000379
Técnica:

Descripción: Fibrodisplasia osificante progresiva. Sec Gen: ACVR1
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Fibromialgia: mutación V185M gen COMT (sec. Sanger)
Código: COMT_V185M
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente
Valores de referencia:

Descripción: Fibronectina en plasma
Código: FIBRONEC
Técnica: Nefelometría
Unidades: mg/dL
Plazo: 3 días
Tubo: Plasma CITRATO Refrigerado
Comentario adicional: 1 ml plasma de CITRATO congelado
Valores de referencia: (25 - 40)

Descripción: Fibrosis cong. músculos extraoculares: <10 genes (NGS)
Código: FIB_MUSOCU
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.
Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Fibrosis congénit músculos extraocul. Sec Gen: KIF21A
Código: GEN_000380
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Fibrosis congénit músculos extraocul. Sec Gen: TUBB2B
Código: GEN_000381
Técnica:
Unidades:

Descripción:	Fibrosis congénit músculos extraocul. Sec Gen: TUBB2B
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Fibrosis Quística: 62 mutaciones gen CFTR
Código:	FIBROPCR
Técnica:	PCR-RLB
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	Fibrosis quística: gen CFTR (NGS)
Código:	FIBRO_SEC
Técnica:	PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	FIEBRE AMARILLA AC IGG
Código:	FAMARILIGG
Técnica:	Inmunofluorescencia indirecta
Unidades:	
Plazo:	23 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	Positivo título >1:100

Descripción:	FIEBRE AMARILLA AC IGM
Código:	FAMARILIGM
Técnica:	Inmunofluorescencia indirecta
Unidades:	
Plazo:	23 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	Positivo título>1:10

Descripción:	FIEBRE AMARILLA VACUNAL PCR LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
Código:	FIAMAPCR
Técnica:	RT-PCR
Unidades:	
Plazo:	12 días
Tubo:	Líquidos Biológicos

Descripción: FIEBRE AMARILLA VACUNAL PCR LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO

Comentario adicional: -Adjuntar historia clínica resumida, incluyendo si el paciente ha visitado otros países recientemente y un resumen de la sintomatología. Indicar fecha de la vacunación contra fiebre amarilla.

Es para diagnóstico de reacciones adversas a la vacuna, no para casos de fiebre amarilla salvaje

-Volumen requerido: 1mL

-Condiciones de transporte: Enviar la muestra en un tubo estéril en un embalaje de seguridad biológica. A temperatura ambiente el mismo día de la obtención, CONGELADA si se remite al día siguiente.

Valores de referencia:

Descripción: Fiebre mediterránea familiar: gen MEFV (NGS)

Código: FIEBRE_MED

Técnica: PCR, secuenciación y MLPA

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Fiebre mediterránea familiar: gen MEFV (SANGER)

Código: MEFV_SANG

Técnica: Secuenciación Sanger

Unidades:

Plazo: 15 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: FILARIAS ANTICUERPOS

Código: FILARIAS

Técnica: ELISA

Unidades: NTU

Plazo: 12 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 1 ml de suero. Refrigerado
Puede tener reacciones cruzadas con otros parásitos.

Valores de referencia: (Inf. 9.00) Negativo

Descripción: Filarias DNA PCR

Código: FILARIAPCR

Técnica: PCR

Unidades:

Plazo: 12 días

Tubo: Sangre EDTA

Comentario adicional: 2 mL sangre total (EDTA) para filariasis linfáticas (Wuchereria bancrofti) y subcutáneas (Loa loa).

Exudado de lesiones cutáneas para Onchocerca volvulus

Valores de referencia:

Descripción: FILTRADO GLOMERULAR ESTIMADO (CKD-EPI CREATININA)

Código: FILTRACKD

Técnica: Fórmula

Unidades: mL/min/1.73m^2

Descripción:	FILTRADO GLOMERULAR ESTIMADO (CKD-EPI CREATININA)
Plazo:	2 días
Tubo:	
Comentario adicional:	Asociado a realización de creatinina sérica
Valores de referencia:	(Sup. 60)

Descripción:	Filtrado glomerular estimado por Cistatina C
Código:	FGECC
Técnica:	
Unidades:	mL/min/1.73m^2
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	_COMENTARIODT
Valores de referencia:	

Descripción:	Filtrado glomerular estimado por Cistatina C
Código:	FGECC
Técnica:	
Unidades:	mL/min/1.73m^2
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	_COMENTARIODT
Valores de referencia:	

Descripción:	Filtrado glomerular estimado por Cistatina C
Código:	FGECC
Técnica:	
Unidades:	mL/min/1.73m^2
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	_COMENTARIODT
Valores de referencia:	

Descripción:	Filtrado glomerular estimado por Cistatina C
Código:	FGECC
Técnica:	
Unidades:	mL/min/1.73m^2
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	_COMENTARIODT
Valores de referencia:	

Descripción:	Filtrado glomerular estimado por Cistatina C
Código:	FGECC
Técnica:	
Unidades:	mL/min/1.73m^2
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	_COMENTARIODT
Valores de referencia:	

Descripción:	Filtrado glomerular estimado por Cistatina C
Código:	FGECC
Técnica:	
Unidades:	mL/min/1.73m^2
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	_COMENTARIODT
Valores de referencia:	

Descripción:	Filtrado glomerular estimado por Cistatina C
Código:	FGECC
Técnica:	
Unidades:	mL/min/1.73m^2
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	_COMENTARIODT
Valores de referencia:	

Descripción:	Filtrado glomerular estimado por Cistatina C
Código:	FGECC
Técnica:	
Unidades:	mL/min/1.73m^2
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	_COMENTARIODT
Valores de referencia:	

Descripción:	Filtrado glomerular estimado por Cistatina C
Código:	FGECC
Técnica:	
Unidades:	mL/min/1.73m^2
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	_COMENTARIODT
Valores de referencia:	

Descripción:	Filtrado glomerular estimado por Cistatina C
Código:	FGECC
Técnica:	
Unidades:	mL/min/1.73m^2
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	_COMENTARIODT
Valores de referencia:	

Descripción:	Filtrado glomerular estimado por Cistatina C
Código:	FGECC
Técnica:	
Unidades:	mL/min/1.73m^2
Plazo:	6 días

Descripción:	Filtrado glomerular estimado por Cistatina C
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	_COMENTARIODT
Valores de referencia:	

Descripción:	Filtrado glomerular estimado por Cistatina C
Código:	FGECC
Técnica:	
Unidades:	mL/min/1.73m^2
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	_COMENTARIODT
Valores de referencia:	

Descripción:	FISH 13(q14) [deleción 13q14]
Código:	MDFISHDE13
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	
Tubo:	Heparina Litio
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	FISH 5 SONDAS (ESPERMATOZOIDES)
Código:	FISH5ESPER
Técnica:	Hibridación in situ fluorescente (FISH)
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	Semen
Comentario adicional:	Conservar en nevera
Valores de referencia:	

Descripción:	FISH 7 SONDAS (ESPERMATOZOIDES)
Código:	FISH7ESPER
Técnica:	Hibridación in situ fluorescente (FISH)
Unidades:	
Plazo:	17 días
Tubo:	Semen
Comentario adicional:	Muestra de semen fresco o capacitado Enviar a temperatura ambiente (mantener en nevera hasta el momento de realizar el envio) Enviar de un día para otro, entre lunes y jueves, evitando fines de semana y festivos. Las muestras deben ir acompañadas del
Valores de referencia:	

Descripción:	FISH 9 SONDAS (ESPERMATOZOIDES)
Código:	FISH9ESPER
Técnica:	Hibridación in situ fluorescente (FISH)
Unidades:	
Plazo:	17 días
Tubo:	Semen
Comentario adicional:	Muestra de semen fresco o capacitado Enviar a temperatura ambiente (mantener en nevera hasta el momento de realizar el envio) Enviar de un día para otro, entre lunes y jueves, evitando fines de semana y festivos. Las muestras deben ir acompañadas del
Valores de referencia:	

Descripción:	FISH deleción región 5q31/5q33 (región control: 5p15)
Código:	MDFISHDE5Q
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	
Tubo:	Heparina Litio
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	FISH deleción región 7q22;7q36 (región control: Cen7)
Código:	MDFISHDE7Q
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	
Tubo:	Heparina Litio
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	FISH deleción TP53 (región: 17p13, región control: Cen17)
Código:	MDFISHP53
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	
Tubo:	Heparina Litio
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	FISH ganacia gen SRD (región: 1p36, región control: Cen1)
Código:	MDFISHSRD
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	
Tubo:	Heparina Litio
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	FISH gen de fusión BCR/ABL [translocación: t(9:22)]
Código:	MDFISHT922
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	6 días
Tubo:	Heparina Litio
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	FISH reordenamiento gen IGH (región: 14q32)
Código:	MDFISHIGH
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	

Descripción: FISH reordenamiento gen IGH (región: 14q32)
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: FISH reordenamiento gen NTKR1
Código: MDFISHNTK1
Técnica:
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: FISH sonda centromérica (por centrómero analizado)
Código: MDFISHCEN
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: FISH sonda centromérica cromosoma 15
Código: MDFISHCE15
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo:
Comentario adicional: Médula ósea
Valores de referencia:

Descripción: FISH sonda centromérica cromosoma 9
Código: MDFISHCEN9
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo:
Comentario adicional: Muestra médula ósea
Valores de referencia:

Código: FLAVIVIIGG
Descripción: FLAVIVIRUS MOSAICO 1 IGG
Técnica: IFI
Comentario adicional: 1 mL suero

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	TBEIGG			VIRUS TBE (PERFIL FLAVIVIRUS) IGG	Titulo	Negativo <1/10

Componentes						
Prueba	VFAIGG	77954-6		FLAVIVIRUS FIEBRE A (PERFIL FLAVIVIRUS) IGG		Negativo <1/10
Prueba	NILOOCIIGG	60030-4		VIRUS NILO OCCIDENTAL (PERFIL FLAVIVIRUS) IGG		Negativo <1/10
Prueba	ENJAPONIGG			VIRUS ENCEFALITIS JAPONESA (PERFIL FLAVOVIRUS) IGG		Negativo <1/10

Código: FLAVIVIIGM
Descripción: FLAVIVIRUS MOSAICO 1 IGM
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	TBEIGM	5009468		VIRUS TBE (PERFIL FLAVIVIRUS) IGM		Negativo <1/10
Prueba	VFAIGM	77955-3		FLAVIVIRUS FIEBRE A (PERFIL FLAVIVIRUS) IGM		Negativo <1/10
Prueba	NILOOCIIGM	31704-0		VIRUS NILO OCCIDENTAL (PERFIL FLAVIVIRUS) IGM		Negativo <1/10
Prueba	ENJAPONIGM			VIRUS ENCEFALITIS JAPONESA (PERFIL FLAVOVIRUS) IGM		Negativo <1/10

Descripción: FLECAINIDA (APOCARD)
Código: FLECAINIDA
Técnica: Téc. HPLC
Unidades: µg/L
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero.Refrigerar
No utilizar tubos con gel separador.
Valores de referencia: (200 - 500) < 15 años Rango terapéutico en niños
(300 - 800) > 15 años Rango terapéutico en adultos

Descripción: FLUCONAZOL SUERO
Código: FLUCONA
Técnica: Cromatografía líquida/Tándem masas (LC-MS/MS)
Unidades: mg/L
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: (2 - 15)
(Sup. 20) Toxicidad

Descripción: FLUNITRAZEPAM ORINA (ROHIPNOL)
Código: FLUNITRAZE
Técnica: Cromatografía líquida/tándem masas
Unidades:

Descripción: FLUNITRAZEPAM ORINA (ROHIPNOL)
Plazo: 7 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 10 mL de orina (micción aislada)
Valores de referencia: Negativo

Descripción: FLUOR SUERO
Código: FLUORSUERO
Técnica: Electrodo selectivo
Unidades: µg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 5 mL suero
Valores de referencia: (Inf. 19) Valores de referencia indicativos
(Inf. 76) Valores máximos recomendados
(Inf. 950) Límite máximo aceptado tras medicación

Descripción: FLUORURO ORINA FINAL DE JORNADA
Código: FLUORURO
Técnica: Electrodo selectivo
Unidades: mg/L
Plazo: 7 días
Tubo: Orina Final de Jornada
Comentario adicional: Tubo 5 mL.
Volumen 2.0 mL (Volumen mínimo 0,5 mL
Valores de referencia: (Inf. 3.0) Final de jornada laboral. Valor Límite Biológico-VLB®

Código: FLUOXETINA
Descripción: FLUOXETINA (FLUOXETINA+NORFLUOXETINA) EN SUERO
Técnica: LC-MS/MS
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	FLUOXE	3644-2		PERFIL FLUOXETINA (FLUOXETINA)	ng/mL	
Prueba	NORFLUOXE	3868-7		PERFIL FLUOXETINA (NORFLUOXETINA)	ng/mL	
Prueba	FLUOXSUMA	10339-0		PERFIL FLUOXETINA (FLUOXETINA TOTAL)	ng/mL	(200 - 1100) Valores terapéuticos indicativos (Sup. 2000) Niveles tóxicos

---

Descripción: FLURAZEPAM SUERO
Código: FLURAZEPAM
Técnica: Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)
Unidades: µg/L
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal

Descripción: FLURAZEPAM SUERO
Comentario adicional: 0.5 mL suero SIN gel separador
Volumen mínimo: 0.1 mL
Valores de referencia: (75 - 165) Intervalo Terapéutico
(Inf. 3) Límite de cuantificación
(Sup. 330) Toxicidad

Descripción: FLUVOXAMINA SUERO
Código: FLUVOXAMIN
Técnica: CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA/TÁNDEM MASAS (LC-MS/MS)
Unidades: ng/mL
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 2 mL suero.
Valores de referencia: (50 - 900)

Código: FR
Descripción: FORMULA SANGUINEA, RECUENTO TR
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	HEMATIES	789-8		NUMERO TOTAL HEMATIES	10^6/µL	(4.60 - 6.20) Hombre (4.20 - 5.40) Mujer
Prueba	HGB	718-7		HEMOGLOBINA SANGRE	g/dL	(13.5 - 18) Hombre (12 - 16) Mujer
Prueba	HTO	4544-3		HEMATOCRITO SANGRE	%	(42 - 52) Hombre (37 - 47) Mujer
Prueba	VCM	787-2		VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO SANGRE	fL	(80 - 100) Hombre (80 - 100) Mujer
Prueba	HCM	785-6		HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MEDIA SANGRE	pg	(27 - 33) Hombre (27 - 33) Mujer
Prueba	CHCM	786-4		CHCM	g/dL	(31 - 35.5)
Prueba	RDW	788-0		RDW	%	(11 - 18)
Prueba	PLAQ	777-3		NUMERO TOTAL PLAQUETAS	10^3/µL	(130 - 450)
Prueba	VPM	32623-1		VPM	fL	(7 - 13)
Prueba	LEUCOCITOS	6690-2		NUMERO TOTAL LEUCOCITOS	10^3/µL	(4.00 - 11.00)
Prueba	LINFO	736-9		% LINFOCITOS	%	(16 - 45)
Prueba	MONO	5905-5		% MONOCITOS	%	(Inf. 12)
Prueba	SEG	770-8		% NEUTROFILOS	%	(35 - 70)
Prueba	EOS	713-8		% EOSINOFILOS	%	(Inf. 5)
Prueba	BASO	706-2		% BASOFILOS	%	(Inf. 1.5)
Prueba	CAYA	35332-6		% CAYADOS	%	
Prueba	SUMA			SUMA % FORMULA		

Componentes						
Prueba	STK1	18314-5		COMENTARIO 1 HEMATOLOGIA		
Prueba	STK2	18314-5		COMENTARIO 2 STKR		
Prueba	BASO#	704-7		Basofilos global	/µL	(Inf. 200)
Prueba	CAY#	30229-9		Cayados global	/µL	
Prueba	EOS#	711-2		Eosinofilos global	/µL	(Inf. 700) < 2 años (Inf. 650) 2 años - 5 años (Inf. 600) 5 años - 16 años (Inf. 800) > 16 años
Prueba	SEG#	751-8		Neutrófilos global	/µL	(1500 - 8500) < 16 años (1800 - 7500) > 16 años
Prueba	LINFO#	731-0		linfocitos global	/µL	(4000 - 10500) < 2 años (2000 - 8000) 2 años - 5 años (1500 - 6500) 5 años - 16 años (1000 - 4500) > 16 años
Prueba	MONO#	742-7		Monocitos global	/µL	(Inf. 800) < 16 años (200 - 1000) > 16 años

Descripción:	FOSFATASA ACIDA PLASMA SEMINAL
Código:	FACSEMEN
Técnica:	Cinética
Unidades:	kU/L
Plazo:	4 días
Tubo:	Semen
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(280 - 994)

Descripción:	FOSFATASA ACIDA PROSTATICA
Código:	FACP
Técnica:	ICMA
Unidades:	ng/mL
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. Fines de semana: enviar suero congelado
Valores de referencia:	(Inf. 2.3)

Descripción:	FOSFATASA ACIDA TARTRATO RESISTENTE
Código:	FACTARRESI
Técnica:	Espectrometría
Unidades:	U/L (37ºC)
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero. Refrigerar
Valores de referencia:	(Inf. 3.90)

Descripción:	FOSFATASA ACIDA TOTAL
Código:	FACT
Técnica:	Cinética

Descripción:	FOSFATASA ACIDA TOTAL
Unidades:	U/L a 37 ºC
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1ml de suero. Congelar si no se envía en el día.
Valores de referencia:	(Inf. 4.5) Mujer (Inf. 5.5) Hombre

Descripción:	FOSFATASA ALCALINA
Código:	ALP
Técnica:	
Unidades:	U/L a 37ºC
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(38 - 126) > 15 años (Inf. 373) Hombre < 15 años (Inf. 360) Mujer < 15 años

Descripción:	FOSFATASA ALCALINA ISOENZIMA OSEA
Código:	ALPISOEN
Técnica:	CLIA
Unidades:	mcg/L
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml suero, evitar plasma EDTA
Valores de referencia:	(25 - 221) Hombre < 2 años (27 - 148) Hombre 2 años - 9 años (35 - 169) Hombre 9 años - 13 años (13 - 111) Hombre 13 años - 17 años (Inf. 20) Hombre > 17 años (28 - 187) Mujer < 2 años (31 - 152) Mujer 2 años - 9 años (29 - 177) Mujer 9 años - 13 años (7 - 41) Mujer 13 años - 17 años (Inf. 14) Mujer > 17 años Premenopausia (Inf. 22) Mujer > 17 años Postmenopausia

Descripción:	FOSFATASAS ALCALINAS GRANULOCITICAS
Código:	FAGRANULO
Técnica:	Técnica Citoquímica
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	Heparina Litio
Comentario adicional:	2 mL de sangre total (heparina), ademas de 4 extensiones en porta, sin fijar, sangre nativa o con heparina. El EDTA interfiere en esta determinación.
Valores de referencia:	(20 - 120) Índice de actividad

Descripción:	FOSFATIDILETANOLAMINA AC IgG SUERO
Código:	FOSETANOLA
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	Indice
Plazo:	11 días

Descripción:	FOSFATIDILETANOLAMINA AC IgG SUERO
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml suero. REFRIGERAR.
Valores de referencia:	(Inf. 10) Negativo Los resultados positivos deben confirmarse en un plazo de 12 semanas

Descripción:	FOSFATIDILETANOLAMINA AC IgM SUERO
Código:	FOSETANOLM
Técnica:	EIA
Unidades:	Indice
Plazo:	11 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. REFRIGERAR.
Valores de referencia:	(Inf. 10) Negativo

Descripción:	FOSFATIDILINOSITOL AC Ig G SUERO
Código:	FOSFINOACG
Técnica:	EIA
Unidades:	Indice
Plazo:	12 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	(Inf. 10) Negativo

Descripción:	FOSFATIDILINOSITOL AC Ig M SUERO
Código:	FOSFINOACM
Técnica:	EIA
Unidades:	Indice
Plazo:	12 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	(Inf. 10) Negativo

Descripción:	FOSFATIDILSERINA /PROTROMBINA AC. Ig G SUERO
Código:	FOSFPROACG
Técnica:	
Unidades:	U/L
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero.
Valores de referencia:	(Inf. 30) Negativo

Descripción:	FOSFATIDILSERINA /PROTROMBINA AC. Ig M SUERO
Código:	FOSFPROACM
Técnica:	
Unidades:	U/L
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL. Suero.
Valores de referencia:	(Inf. 30) Negativo

Descripción:	FOSFATIDILSERINA AC. IGG SUERO
Código:	FOSFAACG
Técnica:	EIA
Unidades:	RLU/mL
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	(Inf. 12) Negativo

Descripción:	FOSFATIDILSERINA AC. IGM SUERO
Código:	FOSFAACM
Técnica:	EIA
Unidades:	RLU/mL
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	(Inf. 12) Negativo

Descripción:	FOSFATIDILSERINA ANTICUERPOS IgA, SUERO
Código:	AFOA
Técnica:	
Unidades:	RU/mL
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero refrigerado
Valores de referencia:	(Inf. 12) Negativo

Descripción:	FOSFOETANOLAMINA ORINA
Código:	FOSFOETANO
Técnica:	Cromatografía líquida-Tándem masas
Unidades:	mcmol/g creatin
Plazo:	12 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	10 mL orina (micción aislada)
Valores de referencia:	(Inf. 150) < 14 años (Inf. 70) > 14 años

Descripción:	Fosfohexosaisomerasa (PHI) en suero
Código:	PHI
Técnica:	Espectrometría de absorción molecular
Unidades:	U/L
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml suero
Valores de referencia:	(26 - 110)

Descripción:	FOSFOLIPASA A2 RECEPTOR (PLA2R) ANTICUERPOS
Código:	PLA2R
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	Indice

Descripción:	FOSFOLIPASA A2 RECEPTOR (PLA2R) ANTICUERPOS
Plazo:	11 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ML SUERO
Valores de referencia:	(Inf. 0.69) Negativo (0.70 - 0.99) Indeterminado (Sup. 1.00) Positivo

Descripción:	FOSFOLIPIDOS
Código:	FOSFO
Técnica:	Espectrofotometría Enzimática
Unidades:	mg/dL
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml suero
Valores de referencia:	(125 - 366)

Descripción:	FOSFORO
Código:	P
Técnica:	
Unidades:	mg/dL
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(3.5 - 6.5) < 14 años (2.5 - 5) 14 años - 70 años (1.8 - 4.6) > 70 años

Descripción:	FOSFORO ORINA
Código:	P2
Técnica:	Espectrofotometría
Unidades:	g/24h
Plazo:	2 días
Tubo:	Orina 24 Horas
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 3)

Descripción:	Fragmentación espermática cad. simple + cad. doble (COMET)
Código:	FRAGM_SIMP
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	Semen
Comentario adicional:	Dpto. citogenética Eyaculado tras 3, 4 días de abstinencia en tubo estéril sin ningún medio. Envío de la muestra CONGELADA. Contactar con logistica@megalab.es y genetica@megalab.es
Valores de referencia:	

Descripción:	Fragmentación espermática total (SCD)
Código:	FRAGM_TOT
Técnica:	

Descripción:	Fragmentación espermática total (SCD)
Unidades:	
Plazo:	17 días
Tubo:	Semen
Comentario adicional:	Dpto. citogenética Guardar en nevera (NO congelar). enviar de lunes a miércoles.
Valores de referencia:	

Descripción:	Fragmentación espermática total (SCD) + cadena doble (COMET)
Código:	FRAGM_DC
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	Semen
Comentario adicional:	Dpto. citogenética Eyaculado tras 3, 4 días de abstinencia en tubo estéril sin ningún medio. Envío de la muestra CONGELADA. Contactar con logística@megalab.es y genetica@megalab.es
Valores de referencia:	

Descripción:	FRANCISELLA TULARENSIS AC. IGG SUERO (TULAREMIA)
Código:	TULAREMACG
Técnica:	ENZIMOINMUNOANÁLISIS
Unidades:	U/mL
Plazo:	10 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero.
Valores de referencia:	(Inf. 10) Negativo (10 - 15) Indeterminado

Descripción:	FRANCISELLA TULARENSIS AC. IGM SUERO (TULAREMIA)
Código:	TULAREMACM
Técnica:	ENZIMOINMUNOANÁLISIS
Unidades:	U/mL
Plazo:	10 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero.
Valores de referencia:	(Inf. 10) Negativo (10 - 15) Indeterminado

Descripción:	FRANCISELLA TULARENSIS AC. SUERO (TULAREMIA)
Código:	TULAREMIAC
Técnica:	CLIA
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 0.9) Negativo (0.9 - 1.1) Indeterminado (Sup. 1.1) Positivo

Descripción:	Francisella Tularensis DNA PCR Cualitativa
Código:	FRANCISDNA
Técnica:	PCR
Unidades:	
Plazo:	10 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero. También válidas otros tipos de muestras.
Valores de referencia:	

Descripción:	Fraser, Sd. Sec Gen: FREM2
Código:	GEN_000382
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Freeman-Sheldon, Sd. Sec Gen: MYH3
Código:	GEN_000383
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	FROTIS DE SANGRE PERIFERICA
Código:	FROTIS
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	EXTENSION FROTIS SANGUINEO
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	FRUCTOSA PLASMA SEMINAL
Código:	FRUTOSASE
Técnica:	Enzimática-Espectrofotometría ultravioleta
Unidades:	mg/dL
Plazo:	5 días
Tubo:	SEMEN CONGELADO
Comentario adicional:	1 mL de Plasma Seminal. Congelar y enviar congelado.
Valores de referencia:	(150 - 500)

Descripción:	FRUCTOSAMINA
Código:	FRUC
Técnica:	Espectrofotometría
Unidades:	µmol/L
Plazo:	3 días

Descripción:	FRUCTOSAMINA
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 mL de suero
Valores de referencia:	(205 - 285)

Descripción:	FSH
Código:	FSH
Técnica:	Técnica ICMA
Unidades:	mU/mL
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(3.03 - 8.08) Mujer > 14 años F. Folicular (2.55 - 16.69) Mujer > 14 años Ovulacion (1.38 - 5.47) Mujer > 14 años F. Luteinica (26.72 - 133.41) Mujer > 14 años Post-menopausia (0.95 - 11.95) Hombre > 14 años

Descripción:	FTA
Código:	FTA
Técnica:	Aglutinación
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. Alternativa: plasma de EDTA
Valores de referencia:	Negativo

Descripción:	Fucosidosis. Sec Gen: FUCA1
Código:	GEN_000384
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Fundus albipunctatus. Panel NGS
Código:	GEN_000385
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Fundus flavimaculatus. Sec Gen: ABCA4
Código:	GEN_000386
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días

Descripción:	Fundus flavimaculatus. Sec Gen: ABCA4
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	FUROSEMIDA SUERO
Código:	FUROSEMIDA
Técnica:	Cromatografía Líquida/ Tándem Masas (LC-MS/MS). Hasta la fecha 1 de Febrero se hacía por HPLC.
Unidades:	mcg/mL
Plazo:	23 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 4) DESPUES DOSIS 40 mg

Descripción:	GABA A (Subunid GABA-A) AC.antireceptor, LCR
Código:	GABARALCR
Técnica:	Técn. Cell Binding Assay Inmunofluorescencia indirecta
Unidades:	
Plazo:	17 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 mL LCR.
Valores de referencia:	Negativo Título <1/2 Positivo Título >o=1/2

Descripción:	GABA A (Subunid GABA-A) AC.antireceptor, SUERO
Código:	GABARASUE
Técnica:	Cell Binding Assay Inmunofluorescencia indirecta
Unidades:	
Plazo:	17 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL de suero
Valores de referencia:	Negativo Título <1/10 Positivo Título >o=1/10

Descripción:	GABA B (Subunid GABARB1/B2) AC.antireceptor, LCR
Código:	GABARBLCR
Técnica:	Cell Binding Assay Inmunofluorescencia indirecta
Unidades:	
Plazo:	16 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 ml LCR
Valores de referencia:	Valores de referencia indicativos: se consideran niveles significativos a partir de título 1:2

Descripción:	GABA B (Subunid GABARB1/B2) AC.antireceptor, Suero
Código:	ANTIGABA
Técnica:	IFI
Unidades:	
Plazo:	17 días

Descripción:	GABA B (Subunid GABARB1/B2) AC.antireceptor, Suero
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	Negativo: Título < 1/10

Descripción:	GABAPENTINA EN SUERO
Código:	GABAPENTI
Técnica:	Cromatografía Líquida Tándem Masas (LC-MS/MS).
Unidades:	mg/L
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 mL suero. Congelar. La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis.
Valores de referencia:	(0.5 - 6.0) Indice terapeútico (Sup. 25.0) Toxicidad (Inf. 0.4) Límite de cuantificación

Descripción:	GAD/65K AC. SUERO
Código:	GAD_64KAC
Técnica:	ELISA
Unidades:	UI/mL
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero/alt. plasma EDTA
Valores de referencia:	(Inf. 10) Negativo

Descripción:	GALACTOSA 1 FOSFATO, ERITROCITOS
Código:	G1FOSFATO
Técnica:	Enzimática
Unidades:	µmol/g Hb
Plazo:	12 días
Tubo:	Sangre EDTA
Comentario adicional:	5 mL sangre total (EDTA). Envio inmediato. Evitar envio viernes y vísperas de festivo. Enviar informe clínico(debe incluir edad, si toma lactosa, si presenta clínica hepática y/o cataratas).
Valores de referencia:	(Inf. 0.20) (Inf. 0.90) Valores de referencia en pacientes galactosémicos bajo tratamiento

Descripción:	GALACTOSA EN PLASMA
Código:	GALACTOSA
Técnica:	Enzimática
Unidades:	mcmol/L
Plazo:	12 días
Tubo:	Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional:	1 mL plasma de EDTA. Enviar informe clínico (debe incluir edad, si toma lactosa,si presenta clinica hepática y/o cataratas. Envio inmediato, evitar envios viernes y visperas de festivos
Valores de referencia:	(Inf. 300)

Descripción: GALACTOSA-1-FOSFATO URIDIL TRANSFERASA EN SANGRE
Código: GALAC1FURI
Técnica: Téc. Cromatografia liquida/Tánden masas (LC-MS/MS)
Unidades: mmol/h/g Hb
Plazo: 17 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 5 ml sangre total EDTA.
Envio inmediato (no viernes ni festivos) Se requiere información clínica (edad, si toma lactosa, si daño hepatico, catarata)
Valores de referencia: (18 - 28)

Descripción: Galactosemia 3 Déficit UDP-galactosa-4epimeras. Gen: GALE
Código: GEN_000387
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Galactosemia tipo 2. Sec Gen: GALK1
Código: GEN_000389
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Galactosemia. Panel NGS
Código: GEN_000388
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Galactosemia: gen GALT (NGS)
Código: GALT_MUTS
Técnica: NGS con TSO Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: GAN AC. IGG
Código: GANGQGDGG
Técnica:

Descripción:	GAN AC. IGG
Unidades:	
Plazo:	17 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 0.90) Negativo (0.90 - 1.10) Indeterminado (Sup. 1.10) Positivo

Descripción:	GAN AC. IGM
Código:	GANGQGDGM
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	17 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 0.90) Negativo (0.90 - 1.10) Indeterminado (Sup. 1.10) Positivo

Descripción:	GANCICLOVIR PLASMA
Código:	GANCICLOVI
Técnica:	Cromatografía líquida de alta resolución
Unidades:	mcg/mL
Plazo:	17 días
Tubo:	Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional:	2 mL plasma (EDTA). CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO. Evitar muestra de suero.
Valores de referencia:	(0.3 - 1.5) Valores terapéuticos indicativos

Descripción:	GANGLIÓNICO ACETILCOLINA RECEPALFA 3 AC. SUERO
Código:	GANGALFA3
Técnica:	Radioisotópica
Unidades:	pmol/L
Plazo:	35 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL de suero Indispensable nombre completo y fecha de nacimiento
Valores de referencia:	(Inf. 10) Negativo (10 - 14.9) Indeterminado (Sup. 15) Positivo

Descripción:	GANGLIOSIDOS MAS SULFATIDOS AC. IGM
Código:	GANGIGM
Técnica:	Inmunoblot
Unidades:	
Plazo:	17 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL
Valores de referencia:	

Descripción: GANGLIOSIDOS GM1,GM2,GM3,GD1a,GD1b,GT1b,GQ1b IgG LCR
Código: GANGLCR
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: LIQUIDO LCR INMUNO
Comentario adicional:
Valores de referencia: NOTA: Mediante esta técnica se identifican los siguientes anticuerpos frente a los gangliósidos GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b.

Descripción: GANGLIOSIDOS GM1,GM2,GM3,GD1a,GD1b,GT1b,GQ1b IgM LCR
Código: GANMLCR
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: LIQUIDO LCR INMUNO
Comentario adicional:
Valores de referencia: NOTA: Mediante esta técnica se identifican los siguientes anticuerpos frente a los gangliósidos GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b.

Código: GQ1BGD1BGM
Descripción: GANGLIÓSIDOS GQ1b + GD1b + GM1 ANTICUERPOS IgG SUERO
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	GANGGD1B	58971-3		PERFIL GD1B AC. IgG LCR (GANGLIOSIDO GD1B)		
Prueba	GANGGQ1B	58975-4		PERFIL GQ1B AC. IgG LCR (GANGLIOSIDO GQ1B)		
Prueba	GM1AGLCR			GM1ACLCR-ANTICUERPOS IG G ANTIGANGLIOSIDOS M1 EN LCR		

Código: GQ1BGD1BGM
Descripción: GANGLIÓSIDOS GQ1b + GD1b + GM1 ANTICUERPOS IgG SUERO
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	GANGGD1B	58971-3		PERFIL GD1B AC. IgG LCR (GANGLIOSIDO GD1B)		
Prueba	GANGGQ1B	58975-4		PERFIL GQ1B AC. IgG LCR (GANGLIOSIDO GQ1B)		
Prueba	GM1AGLCR			GM1ACLCR-ANTICUERPOS IG G ANTIGANGLIOSIDOS M1 EN LCR		

Descripción: GANGLIOSIDOS MAS SULFATIDOS AC. IGG
Código: GANGIGG
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL
Valores de referencia:

Descripción: GANGLIÓSIDOS PERFIL ANTICUERPOS IgG SUERO
Código: GANGLIOIGG
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml de suero
Valores de referencia:

Descripción: GANGLIÓSIDOS PERFIL ANTICUERPOS IgM SUERO
Código: GANGLIOIGM
Técnica: Immunoblot
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia:

Descripción: Gangliosidosis tipo 1 (GM1): gen GLB1 (NGS)
Código: GM1_MUTS
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Gangliosidosis. Panel NGS
Código: GEN_000390
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación.
Tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Gardner, Sd. Sec Gen: APC
Código: GEN_000391

Descripción: Gardner, Sd. Sec Gen: APC
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Código: GASOMEARTE
Descripción: GASOMETRIA ARTERIAL
Técnica: Electrodo de estado sólido
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	PH_GASES	2744-1		PH, GASOMETRIA ARTERIAL		(7.35 - 7.45)
Prueba	PCO2	2019-8		PCO2, GASOMETRIA ARTERIAL	mm Hg	(35 - 45)
Prueba	PO2	2703-7		PO2, GASOMETRIA ARTERIAL	mm Hg	(73 - 105)
Prueba	HCO3	1960-4		BICARBONATO ACTUAL, GASOMETRIA ARTERIAL	mEq/L	(22 - 26)
Prueba	TCO2	2026-3		CO2 TOTAL, GASOMETRIA ARTERIAL	mEq/L	(23 - 27)
Prueba	BEB	1925-7		EXCESO DE BASES CELULARES, GASOMETRIA ARTERIAL	mEq/L	(-5 - 5)
Prueba	SO2C	2708-6		SATURACION DE O2, GASOMETRIA ARTERIAL	%	(95 - 100)

Código: GASOCORD
Descripción: GASOMETRÍA SANGRE CORDÓN
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	PHCORD			PH SANGRE DE CORDON		(7.18 - 7.45)
Prueba	PCO2CORD			PCO2 SANGRE DE CORDÓN		(32.4 - 56)
Prueba	PO2CORD			PO2 SANGRE DE CORDÓN		(5.6 - 30.4)
Prueba	HCO3CORD			HCO3 SANGRE CORDÓN		(17.3 - 27.3)
Prueba	EBCORD			EXCESO DE BASES SANGREN DE CORDÓN		(-6 - +2)

Código: GASOMEVENO
Descripción: GASOMETRIA VENOSA
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.

Componentes						
Prueba	PH_GASV	2746-6		PH, GASOMETRIA VENOSA		(7.30 - 7.42)
Prueba	PCO2V	2021-4		PCO2, GASOMETRIA VENOSA	mm Hg	(41 - 45)
Prueba	PO2V	2705-2		PO2, SANGRE VENOSA	mm Hg	(25 - 40)
Prueba	HCO3V	14627-4		BICARBONATO ACTUAL, GASOMETRIA VENOSA	mEq/L	(24 - 28)
Prueba	TCO2V	2027-1		CO2 TOTAL, GASOMETRIA VENOSA	mEq/L	(25 - 29)

Descripción:	GASTRINA SUERO
Código:	GASTRINA
Técnica:	ICMA-Inmunoensayo quimioluminiscente
Unidades:	pg/mL
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 ml de suero. Separar el suero lo antes posible, congelar y enviar congelado. El paciente no debe tomar café y o té durante el ayuno. El paciente no debe tomar antiácidos durante las 24 horas previas al análisis. El paciente no debe fumar durante las 24 horas prev
Valores de referencia:	(Inf. 16)

Descripción:	Gaucher, enfermedad de. Sec Gen: GBA
Código:	GEN_000392
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	GAXILOSA EN ORINA (ACTIVIDAD LACTASAS INTESTINALES)
Código:	GAXILOSA
Técnica:	Espectrofotometría
Unidades:	g
Plazo:	5 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	Congelar la orina si va a pasar 24 horas hasta analisis. Anotar la diuresis
Valores de referencia:	(Sup. 37.87) (Inf. 37.87) Hipolactasia

Descripción:	Gen SCN5A (NGS)
Código:	SCN5A
Técnica:	PCR y secuenciación
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	Gen SHOX (NGS)
Código:	SHOX

Descripción: Gen SHOX (NGS)
Técnica: PCR, secuenciación, y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Gen SHOX. Deleciones y Duplicaciones (MLPA) Talla Baja
Código: SHOX_MLPA
Técnica: MLPA
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina y Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Genes COL6A1, COL6A2 y COL6A3 (NGS)
Código: COLAG_MUTS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: GeneScreen Añadir pareja. Compatibilidad genetica/portadores
Código: GENEPAREJA
Técnica:
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación sangre EDTA rotulado con BM.
Valores de referencia:

Descripción: GeneScreen Avanzado:400 gen Compat. genetica/portadores
Código: COMPATAVA
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 22 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Muestra: sangre EDTA
+ Hoja solicitud GeneScreen
Valores de referencia:

Descripción: GeneScreen Avanzado:400 gen Compat. genetica/portadores
Código: COMPATAVA
Técnica: NGS

Descripción: GeneScreen Avanzado:400 gen Compat. genetica/portadores
Unidades:
Plazo: 22 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Muestra: sangre EDTA
+ Hoja solicitud GeneScreen
Valores de referencia:

Descripción: GeneScreen Básico:120 gen Compatibilidad genetica/portadores
Código: COMPATBAS
Técnica: Ngs
Unidades:
Plazo: 22 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Muestra: sangre EDTA
+ hoja soliciutd genescreen
Valores de referencia:

Descripción: GeneScreen Completo: Exoma Compat. genetica/portadores
Código: COMPATCOMP
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 22 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Muestra: sangre EDTA BM
+ Hoja solicitud GeneScreen
Valores de referencia:

Código: PORTGSPLUS
Descripción: GeneScreen Plus Parejas: Compatibilidad genetica/portadores
Técnica:
Comentario adicional: Perfil para parejas que se realicen GenescreenPlus (2 pacietnes)

Tubo exclusivo para esta determinación sangre EDTA rotulado con BM.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
	COMPATPLUS					
Prueba	GENEPAREJA			GeneScreen Añadir pareja. Compatibilidad genetica/portadores		

Descripción: Genoma completo: secuenciación
Código: GENOMA
Técnica:
Unidades:
Plazo: 60 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Descripción: Genoma completo: secuenciación
Valores de referencia:

Descripción: Genoma madre, padre e hijo (NGS)
Código: GENOMA_TRI
Técnica:
Unidades:
Plazo: 60 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: GENOSPORT CARDIO COMPLET: GENES ASOCIADOS A CARDIOPATIAS
Código: GENSPORTCA
Técnica:
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional: Kit especial. Solicitar a almacén
Valores de referencia:

Descripción: GENOSPORT ENTRENAMIENTO COMPLET: GENES ASOCIADOS A EFICIENCI
Código: GENSPORENT
Técnica:
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional: Kit especial. Solicitar a almacén
Valores de referencia:

Descripción: GENOSPORT LESIONES COMPLET: GENES ASOCIADOS A LESIONES
Código: GENSPORLES
Técnica:
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional: Kit especial. Solicitar a almacén
Valores de referencia:

Descripción: GENOTIPO ABO (GRUPO SANGUINEO) POR PCR-SSP
Código: GENOTIPABO
Técnica: PCR-SSP
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 5 mL sangre total EDTA
Valores de referencia:

Descripción: Genotipo alfa-1 antitripsina
Código: PIGENOTIPO

Descripción: Genotipo alfa-1 antitripsina
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente
Valores de referencia:

Descripción: Genotipo apolipoproteína E (sec. Sanger)
Código: APOE_PCR
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Herparina o Citrato
Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente
Valores de referencia:

Descripción: Genotipo de receptores KIR en sangre
Código: GENOKIR
Técnica: Tipaje mediante el uso de sondas especificas SSO (Sequence Specific Oligonucleotide) unidas a microesferas Luminex (Lifecodes, Inmucor).
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: GENOTIPO DE RESISTENCIAS HIV-1
Código: VIH1MUT
Técnica: RT-PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 24 días
Tubo: Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional: Plasma de EDTA -CONGELAR

Alternativa: sangre total EDTA refrigerado.
Valores de referencia:

Descripción: GENTAMICINA
Código: GENTA
Técnica: Inmunoensayo
Unidades: mcg/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:

Descripción:	GENTAMICINA
Valores de referencia:	(6.0 - 10.0) Pico (Sup. 12.0) Asociado a Toxicidad-Pico (6.0 - 8.0) Pico- Infecciones graves (8.0 - 10.0) Pico-Infecciones muy graves (0.5 - 2.0) Valle (Sup. 2.0) Asociado a Toxicidad-Valle (0.5 - 1.5) Valle-Infecciones graves (1.0 - 2.0) Valle- Infecciones muy graves

Descripción:	Gerstmann-Straussler, Sd. Sec Gen: PRNP
Código:	GEN_000395
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	GFAP ANTICUERPOS SUERO
Código:	GFAP
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	32 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml LCR
Valores de referencia:	

Descripción:	GFAP ANTICUERPOS SUERO
Código:	GFAP
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	32 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml LCR
Valores de referencia:	

Descripción:	GGT
Código:	GGT
Técnica:	
Unidades:	U/L a 37 ºC
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(12 - 64) Hombre (9 - 36) Mujer

Descripción:	GHRELINA EN SUERO
Código:	GHRELINA
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	pg/mL

Descripción:	GHRELINA EN SUERO
Plazo:	23 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 ml de suero congelado.
Valores de referencia:	(520 - 700) Individuos con peso normal (340 - 450) Individuos obesos antes de la dieta (450 - 600) Individuos obesos tras tratamiento dietético (Inf. 120) Individuos obesos tras bypass gástrico

Descripción:	GHRH (Growth Hormone Releasing Hormone) en plasma
Código:	GHRH
Técnica:	Radioinmunoensayo
Unidades:	ng/L
Plazo:	26 días
Tubo:	Plasma trasylol/aprotinina
Comentario adicional:	2mL plasma-EDTA con aprotinina (TRASYLOL). CONGELAR INMEDIATAMENTE Y ENVIAR CONGELADO. Envío tubo independiente del resto de pruebas.
Valores de referencia:	(Inf. 60)

Descripción:	GIARDIA LAMBLIA EN HECES PCR
Código:	GIARDIAPCR
Técnica:	PCR
Unidades:	
Plazo:	12 días
Tubo:	heces especiales
Comentario adicional:	10 g heces(REFRIGERADO)
Valores de referencia:	

Descripción:	GIARDIA LAMBLIA IgA (EIA) ANTICUERPOS, SUERO
Código:	GIARAE
Técnica:	EIA
Unidades:	U/mL
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero Refrigerado.
Valores de referencia:	(Inf. 5) Negativo

Descripción:	GIARDIA LAMBLIA IGG AC
Código:	LAMBLIAAC
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	U/mL
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 mL suero Volumne mínimo: 0.2 mL
Valores de referencia:	(Inf. 10) Negativo

Descripción:	GIARDIA LAMBLIA IgM (EIA) ANTICUERPOS, SUERO
Código:	GIARME
Técnica:	EIA
Unidades:	U/mL

Descripción:	GIARDIA LAMBLIA IgM (EIA) ANTICUERPOS, SUERO
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero regrigerado.
Valores de referencia:	(Inf. 25) Negativo

Descripción:	GIARDIA LAMBLIA TEST RAPIDO
Código:	GIARDIAAG
Técnica:	Inmunocromatografía
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Heces No Microbiología
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	Gilbert, Sd. Sec Gen: UGT1A1
Código:	GEN_000396
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Gilles de la Tourette, Sd. Sec Gen: SLITRK1
Código:	GEN_000699
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	GIST · KIT(9, 11, 13, 17), PDGFRA(12, 14, 18) · HOT SPOT
Código:	GIST_MUTS
Técnica:	SANGER - HOT SPOT
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:	1 Pieza/s Tejido parafinado [Tªambiente] (Estabilidad: 20°C:1 Años)
Valores de referencia:	

Descripción:	GIST · KIT(9, 11, 13, 17), PDGFRA(12, 14, 18) · HOT SPOT
Código:	GIST_MUTS
Técnica:	SANGER - HOT SPOT
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:	1 Pieza/s Tejido parafinado [Tªambiente] (Estabilidad: 20°C:1 Años)
Valores de referencia:	

Descripción: GLANDULA SALIVAR ANTICUERPOS
Código: GLANDUSAAC
Técnica: IFI
Unidades: Titulo
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL Suero (Refrigerado)
Valores de referencia: Negativo <1/5
Positivo >1/5

Descripción: Glaucoma congénito. Sec Gen: CYP1B1
Código: GEN_000397
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Glaucoma congénito. Sec Gen: MYOC
Código: GEN_000398
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Glaucoma congénito. Sec Gen: OPTN
Código: GEN_000399
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Glaucoma exfoliativo: gen LOXL1 polimorfismos (sec. Sanger)
Código: GLAUCO_EXF
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Glaucoma por pseudoexfoliación. Sec Gen: LOXL1
Código: GEN_000400
Técnica:

Descripción: Glaucoma por pseudoexfoliación. Sec Gen: LOXL1
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: GLIADINA AC. IGA SUERO
Código: GLIADIACA
Técnica: Téc. EIA
Unidades: U/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 7) Negativo
(7 - 10) Indeterminado

Descripción: GLIADINA AC. IGG SUERO
Código: GLIADIACG
Técnica: Téc. EIA
Unidades: U/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 7) Negativo
(7 - 10) Indeterminado

Descripción: GLICINA ANTICUERPOS RECEPTORES NEURONALES
Código: GLICINAACN
Técnica: Inmunohistoquímica
Unidades:
Plazo: 23 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1mL suero refrigerado
Valores de referencia:

Descripción: GLICOPROTEINAS DE MEMBRANA PLAQUETAR SANGRE TOTAL
Código: GLICOPLAQ
Técnica: CITOMETRÍA DE FLUJO
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 10 mL sangre total (EDTA). Envío inmediato a temperatura ambiente. Indispensable información clínica
Valores de referencia:

Código: GAGS
Descripción: GLICOSAMINOGLICANOS (GAGS): DERMATÁN HEPARÁN QUERATÁN
Técnica: Cromatografía líquida/Tándem masas (LC-MS/MS)
Comentario adicional: 10 mL orina. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.INDISPENSABLE enviar historia clínica

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	DERMATAN			PERFIL DERMATÁN SULFATO	mg/g creatinina	(Inf. 22) < 3 años (Inf. 18) 4 años - 13 años (Inf. 9) > 13 años
Prueba	HEPARAN			PERFIL HEPARÁN SULFATO	mg/g creatinina	(Inf. 10) < 3 años (Inf. 8) 4 años - 13 años (Inf. 5) > 13 años
Prueba	QUERATAN			PERFIL QUERATÁN SULFATO	mg/g creatinina	(Inf. 20) < 3 años (Inf. 10) 4 años - 13 años (Inf. 5) > 13 años

Descripción:	Glioma Hereditario
Código:	GLIOMAH
Técnica:	NGS
Unidades:	
Plazo:	20 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Valores de referencia:	

Descripción:	Glomeruloesclero focal y segmentaria / Sd.nefrótico. Panel
Código:	GEN_000401
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	GLUCAGON PLASMA
Código:	GLUCAGON
Técnica:	Técnica RIA
Unidades:	pg/mL
Plazo:	9 días
Tubo:	Plasma trasylol/aprotinina
Comentario adicional:	Tubo especial con aprotinina (TRASYLOL). 2 mL plasma EDTA con Aprotinina, separar y congelar inmediatamente (mímimo: 0.50mL) Ayuno mínimo de 12 horas.
Valores de referencia:	(Inf. 208)

Descripción:	Glucogenosis de corazón, letal. Sec Gen: PRKAG2
Código:	GEN_000402
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción: Glucogenosis tipo III: gen AGL (NGS)
Código: AGL_MUTS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Glucogenosis tipo V: mutaciones R49X, G204S y W797R gen PYGM
Código: MCARDLE
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Glucogenosis. Enf. almace.glucógeno lisosómico. Gen: LAMP2
Código: GEN_000338
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Glucogenosis. Enferm.del almacenamiento de glucógeno. Panel
Código: GEN_000324
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: GLUCOSA
Código: GLU
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: mg/dL
Plazo: 2 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL de suero o plasma con fluoruro o heparina
Valores de referencia: (60 - 100)

Descripción: GLUCOSA EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
Código: LIQLCGLU
Técnica: Espectrofotometría

Descripción:	GLUCOSA EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
Unidades:	mg/dL
Plazo:	3 días
Tubo:	Líquido Bioquímica
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(50 - 80)

Descripción:	GLUCOSA FOSFATO ISOMERASA (GPI) SANGRE TOTAL
Código:	GPI_ERIT
Técnica:	Espectrofotometría
Unidades:	UI/g Hb
Plazo:	17 días
Tubo:	Heparina Litio
Comentario adicional:	5 mL sangre total (heparina). También válida sangre (EDTA). Envío inmediato de Lunes a Miercoles. Avisar previamente.
Valores de referencia:	(46 - 66)

Descripción:	GLUCOSA ORINA (GLUCOSURIA) EN ORINA DE 24 HORAS
Código:	GLU2
Técnica:	Espectrofotometría
Unidades:	g/24h
Plazo:	2 días
Tubo:	Orina Bioquímica
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 0.5) Negativo

Descripción:	GLUCOSA POSTPRANDIAL 1 HORA SUERO
Código:	GLUPOST1H
Técnica:	
Unidades:	mg/dL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero 60 Minutos
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 180)

Descripción:	GLUCOSA POSTPRANDIAL 2 HORAS SUERO
Código:	GLUPOST2H
Técnica:	
Unidades:	mg/dL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero 120 minutos
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 140)

Descripción:	GLUCOSA TRAS INGESTA DE 50 G. DE GLUCOSA
Código:	GLUINGESTA
Técnica:	Espectrofotometría
Unidades:	mg/dL
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero para GLUINGESTA
Comentario adicional:	1h. tras ingesta de 50 g. de glucosa

Descripción:	GLUCOSA TRAS INGESTA DE 50 G. DE GLUCOSA
Valores de referencia:	(Inf. 140) Raza blanca (Inf. 130) Raza negra (Inf. 145) Filipinas (Inf. 150) Asiáticas

Descripción:	GLUCOSA-6-P-DESHIDROGENASA, SANGRE
Código:	G6PDB
Técnica:	Espectrofotometría
Unidades:	U/g Hb
Plazo:	3 días
Tubo:	Sangre EDTA Colinesterasa
Comentario adicional:	1 mL sangre total EDTA refrigerado. NO congelar Evitar extracciones en vísperas de festivos
Valores de referencia:	(Sup. 9.52) Hombre Normal (Inf. 2.71) Hombre Deficiente (Sup. 10.22) Mujer Normal (Inf. 2.95) Mujer Deficiente

Descripción:	GLUTAMATO DEHIDROGENASA (GDH) CLOSTRIDIUM DIFFICILE
Código:	GDHCLOST
Técnica:	Inmunocromatografía
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	HECES MICRO MUESTRA 1
Comentario adicional:	Heces
Valores de referencia:	

Descripción:	Glutamato Deshidrogenasa (GLDH) (alfa cetoglutarato)
Código:	GLDH
Técnica:	Cinética
Unidades:	U/L a 37 ºC
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml suero
Valores de referencia:	(Inf. 7) Hombre (Inf. 5) Mujer

Descripción:	Glutation oxidado
Código:	GLUOX
Técnica:	ICP-MS
Unidades:	µmol/L
Plazo:	39 días
Tubo:	KIT DE ENSAYOS CLINICOS
Comentario adicional:	Suero. KIT especial. CONGELAR Se precisa KIT ESPECIFICO. Obtener 8 ml de sangre en un tubo facilitado y mezclar por inversión como mínimo 5 veces. Centrifugar 10 min a 3000 rpm durante la hora siguiente a la obtención de la muestra. Transferir 500 µL de suero claro por análisis (g Kit Ref SAP: 600063597
Valores de referencia:	(0.16 - 0.50)

Código:	GLUO
Descripción:	GLUTATION OXIDADO-REDUCIDO en suero

Código: GLUO

Técnica: ICP-MS/MS

Comentario adicional: Se precisa KIT ESPECÍFICO. CONGELAR.
Los centros propios lo pueden pedir por email y los clientes externos via enlace web de pedidos dentro de la ventana de "materiales fuera de plantilla"
Obtener 8 ml de sangre en un tubo facilitado y mezclar por inversión como mínimo 5 veces. Centrifugar 10 min a 3000 rpm durante la hora siguiente a la obtención de la muestra. Transferir 500 µL de suero claro por análisis (glutatión total, glutatión o
Kit Ref SAP: 600063597

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	GLUOX	79600-3		Glutation oxidado	µmol/L	(0.16 - 0.50)
Prueba	GLURE	79600-3		Glutation reducido	µmol/L	(3.80 - 5.50)

Descripción: GLUTATION PEROXIDASA ERITROCITARIA

Código: GLUTATION

Técnica: Téc. espectrofotometría ultravioleta

Unidades: U/g Hb

Plazo: 18 días

Tubo: Heparina Litio

Comentario adicional: 1 mL sangre total heparina

Valores de referencia: (27.5 - 73.6)

Descripción: Glutation reducido

Código: GLURE

Técnica: ICP-MS

Unidades: µmol/L

Plazo: 39 días

Tubo: KIT DE ENSAYOS CLINICOS

Comentario adicional: Suero. KIT especial. CONGELAR
Se precisa KIT ESPECÍFICO. Obtener 8 ml de sangre en un tubo facilitado y mezclar por inversión como mínimo 5 veces. Centrifugar 10 min a 3000 rpm durante la hora siguiente a la obtención de la muestra. Transferir 500 µL de suero claro por análisis (g
Kit Ref SAP: 600063597

Valores de referencia: (3.80 - 5.50)

Descripción: Glutation Reductasa

Código: GLUTAREDUC

Técnica: Espectrometría de Absorción Molecular

Unidades: ng/mL

Plazo: 22 días

Tubo: Suero Congelado

Comentario adicional: 1 mL suero. Congelar inmediatamente

Valores de referencia: (33 - 73)

Descripción: GM1 AC. IgM LCR (GANGLIOSIDO M1)

Código: GM1ACLCR

Técnica: EIA

Unidades:

Plazo: 15 días

Tubo: LIQUIDO LCR INMUNO

Comentario adicional:

Descripción:	GM1 AC. IgM LCR (GANGLIOSIDO M1)
Valores de referencia:	

Descripción:	GM1 AC.IgM SUERO (GANGLIOSIDOS M1)
Código:	GM1AC
Técnica:	Inmunoblot
Unidades:	
Plazo:	11 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	Negativo

Descripción:	GM1ACLCR-ANTICUERPOS IG G ANTIGANGLIOSIDOS M1 EN LCR
Código:	GM1AGLCR
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	LIQUIDO LCR INMUNO
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	GOBLET CELLS ANTICUERPOS IGG EN SUERO
Código:	GOBLETACG
Técnica:	Técnica IFI
Unidades:	Titulo
Plazo:	45 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	Negativo Título < 1:10

Descripción:	GONOCOCO ANTIGENO MUESTRA GENITAL (TEST RAPIDO)
Código:	GONOCOCO
Técnica:	Inmunocromatografía
Unidades:	
Plazo:	1 días
Tubo:	Muestra Microbiología
Comentario adicional:	Exclusivamente muestras genitales: uretral, cervical y vaginal, obtenidas con la misma TORUNDA ESPECIAL que Chlamydia (de rayón o tacron). No admite torunda de algodón.
Valores de referencia:	

Descripción:	GPT (VITROS)
Código:	GPTV
Técnica:	Espectrofotometría
Unidades:	U/L a 37 ºC
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 mL suero Alternativa sangre total Heparina de litio
Valores de referencia:	(0 - 50) Hombre (0 - 35) Mujer

Descripción: GRASA TOTAL EN HECES (ESTEATORREA)
Código: GRASAHEC
Técnica: Espectrofotometría de infrarrojos
Unidades: g/100g
Plazo: 10 días
Tubo: heces especiales
Comentario adicional: 5 g de heces. REFRIGERAR.
Las heces deben recogerse en un recipiente limpio y seco. Evite la contaminación con orina o papel.
Recoger una muestra de las heces, del tamaño mínimo de una nuez, excretadas durante 3 días.
Es necesario mantener la muestra refrigerada dentro de los contenedores adecuados, hasta la entrega en el laboratorio.
Dieta con contenido normal de grasas 3 días antes y posterior a la recogida.

NO utilizar enemas, laxantes, o aceites minerales y es conveniente no estar en tratamiento con antibiótico.

Evitar que la toma de muestra coincida con la administración de algún contraste para exploración radiológica.
Valores de referencia: (Inf. 20)

Descripción: Greig, Sd. Sec Gen: GLI3
Código: GEN_000405
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: GRIPE A/H1N1 AC. SUERO
Código: GRIPEAAC
Técnica: Hemaglutinación.
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL.
Valores de referencia:

Descripción: Griscelli, Sd. Panel NGS
Código: GEN_000406
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: GRUPO SANGUINEO
Código: GS
Técnica: Aglutinación
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Sangre EDTA

Descripción:	GRUPO SANGUINEO
Comentario adicional:	Sangre total EDTA. También se admite citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	GRUPO SERICO
Código:	GSSERICO
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	GUANIDINOACETATO
Código:	ACGUANIAC
Técnica:	HPLC-Espectrometría de masas
Unidades:	mmol/mol creat.
Plazo:	10 días
Tubo:	Orina congelada
Comentario adicional:	15 ml de Orina CONGELADA Se requiere Fecha de nacimiento e información clínica
Valores de referencia:	(9 - 200) < 4 años (12 - 127) 4 años - 12 años (8 - 68) > 12 años

Descripción:	HA ANTICUERPOS(TIROSIL-TRNA SINTETASA) EN SUERO
Código:	HAAC
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	11 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero
Valores de referencia:	

Descripción:	HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO b AC.IGG SUERO
Código:	HAEMOBIGG
Técnica:	EIA
Unidades:	mcg/mL
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1.0 mL (mínimo 0.5 mL)
Valores de referencia:	(Sup. 1) Niveles protectores

Descripción:	Haemophylus ducreyi DNA PCR muestra
Código:	HAEMDUCPCR
Técnica:	HIBRIDACIÓN MOLECULAR (PCR) A TIEMPO REAL
Unidades:	
Plazo:	10 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular

Descripción: Haemophylus ducreyi DNA PCR muestra
Comentario adicional: 1 ml orina-REFRIGERAR
2 exudados genitales-REFRIGERAR
Valores de referencia: Valor de referencia: No se detecta

Descripción: HALOPERIDOL SUERO
Código: HALOPERI
Técnica: LC-MS/MS
Unidades: µg/L
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL Suero (Refrigerado)
Alt. 0.5 mL Plasma de EDTA (Refrigerado)

Refrigerar
Volumen mínimo
0,1 mL

Se aconseja toma de muestra 12 horas después de la última dosis.
El contenedor recomendado es el tubo seco (sin gel separador) para evitar procesos de adsorción del fármaco. En caso de no disponer de tubo seco, la extracción se puede realizar en tubo con gel separador, separando el suero dentro de las 2 horas poste
Valores de referencia: (5.0 - 17) Intervalo Terapéutico

Descripción: HANTAVIRUS ANTICUERPOS IgG, SUERO
Código: HANTA
Técnica: EIA
Unidades: Titulo
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero.
Refrigerar
Rogamos adjunten edad e información clínica del paciente indicando sospecha de patología renal o respiratoria.
Para valoración clínica del paciente se recomienda la determinación simultánea de IgM e IgG.
Valores de referencia: Título <1/100: Negativo

Descripción: HANTAVIRUS ANTICUERPOS IgM, SUERO
Código: HANTAM
Técnica: IFI
Unidades: Titulo
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero. refrigerar.
Rogamos adjunten edad e información clínica del paciente indicando sospecha de patología renal o respiratoria.
Para valoración clínica del paciente se recomienda la determinación simultánea de IgM e IgG.
Valores de referencia: Título <1/100: Negativo

Descripción: HAPTOGLOBINA
Código: HAPTO
Técnica: Turbidimetría
Unidades: mg/dL
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal

Descripción:	HAPTOGLOBINA
Comentario adicional:	0.5 mL suero. Alternativa plasma EDTA/heparina.
Valores de referencia:	(30 - 200)

Descripción:	HARMONY MÁS DELECCIÓN 22q11.2
Código:	HARMON22Q
Técnica:	Microarray
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	Prenatal
Comentario adicional:	Tubo Roche cfDNA.
Valores de referencia:	

Descripción:	HARMONY TEST PRENATAL (T21, T18, T13)
Código:	HARMOBASIC
Técnica:	Microarray
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	Prenatal
Comentario adicional:	Tubo Roche cfDNA.
Valores de referencia:	

Descripción:	HARMONY TEST PRENATAL CON ANEUPLIODIAS SEXUALES
Código:	HARMONANEU
Técnica:	Microarray
Unidades:	
Plazo:	
Tubo:	Prenatal
Comentario adicional:	Tubo Roche cfDNA.
Valores de referencia:	

Descripción:	HARMONY TEST PRENATAL CON MONOSOMÍA X
Código:	HARMONMONX
Técnica:	Microarray
Unidades:	
Plazo:	
Tubo:	Prenatal
Comentario adicional:	Tubo Roche cfDNA.
Valores de referencia:	

Descripción:	HARMONY TEST PRENATAL CON SEXO FETAL
Código:	HARMONSEXO
Técnica:	Microarray
Unidades:	
Plazo:	
Tubo:	Prenatal
Comentario adicional:	Tubo Roche cfDNA.
Valores de referencia:	

Descripción:	Hay-Wells; Sd.AEC, Sd. Sec Gen: TP63
Código:	GEN_000407
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	HBV DNA PCR Cualitativa (hepatitis B)
Código:	HBDNA
Técnica:	PCR
Unidades:	UI/mL
Plazo:	10 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Tubo SUERO. Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato.
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta (Inf. 3) Límite de detección

Descripción:	HBV DNA PCR Cuantitativa (hepatitis B)
Código:	DNAHBHIB
Técnica:	RT-PCR
Unidades:	UI/mL
Plazo:	10 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Tubo de SUERO. Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Valores de referencia:	(Inf. 3) Límite de detección (10 - 1000000000) Rango de medida

Descripción:	HBV DNA PCR mutaciones gen HBpol (hepatitis B)
Código:	HBVMUT
Técnica:	PCR y secuenciación
Unidades:	
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Biología Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Plasma EDTA CONGELADO Cantidad
Valores de referencia:	

Descripción:	HBV DNA Semen PCR Cualitativa (hepatitis B)
Código:	DNABSEME
Técnica:	RT-PCR
Unidades:	
Plazo:	12 días
Tubo:	Semen
Comentario adicional:	Semen fresco y lavado o solo fresco Hablar con Diagnóstico Molecular antes de hacer el envío. Condiciones especiales. Las muestras tienen que enviarse congeladas en nieve carbónica.
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta

Descripción:	HCG POR VIDAS (GONADOTROFINA CORIONICA)
Código:	HCG
Técnica:	Técnica ELFA
Unidades:	mU/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 4) Mujer (1500 - 23000) Mujer 4- 5 semanas (3400 - 135300) Mujer 5-6 semanas (10500 - 161000) Mujer 6- 7 semanas (18000 - 209000) Mujer 7- 8 semanas (37500 - 219000) Mujer 8- 9 semanas (42800 - 218000) Mujer 9- 10 semanas (33700 - 218700) Mujer 10-11 semanas (21800 - 193200) Mujer 11- 12 semanas (20300 - 166100) Mujer 12-13 semanas (15400 - 190000) Mujer 13-14 semanas (2800 - 176100) Mujer 2º trimestre (14-26) (2800 - 144400) Mujer 3º trimestre (26-39)

Descripción:	HCG-BETA LIBRE SUERO
Código:	BETAHCGL
Técnica:	ICMA
Unidades:	ng/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. No hay muestra alternativa.
Valores de referencia:	55.13 ng/ml -Embarazo - 8 semanas 72.55 ng/ml -Embarazo - 9 semanas 60.67 ng/ml-Embarazo - 10 semanas 44.54 ng/ml -Embarazo - 11 semanas 34.33 ng/ml-Embarazo - 12 semanas 28.82 ng/ml-Embarazo - 13 semanas

Descripción:	HCV RNA RT-PCR Cualitativa (hepatitis C)
Código:	HCRNA
Técnica:	RT-PCR
Unidades:	UI/mL
Plazo:	10 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Tubo de SUERO. Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, si pasar por ningún aparato.
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta (Inf. 8.46) Límite de detección

Descripción:	HCV RNA RT-PCR Cuantitativa (hepatitis C)
Código:	RNACCUAN
Técnica:	RT-PCR cuantitativa
Unidades:	UI/mL
Plazo:	10 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Tubo de Suero. Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato.

Descripción:	HCV RNA RT-PCR Cuantitativa (hepatitis C)
Valores de referencia:	(Inf. 8.46) Límite de detección (15 - 100000000) Rango de medida

Descripción:	HCV RNA RT-PCR Genotipo (hepatitis C)
Código:	VHC
Técnica:	RTPCR
Unidades:	
Plazo:	10 días
Tubo:	Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional:	Plasma de EDTA separado y congelado y rotulado con BM.
Valores de referencia:	Observaciones: Se identifican los subtipos;1,1a, 2 (2a/2b), 3, 4, 5a y 6

Descripción:	HCV RNA Semen RT-PCR Cualitativa (hepatitis C)
Código:	RNACSEME
Técnica:	RT-PCR
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	Semen
Comentario adicional:	Semen fresco y lavado o solo fresco Hablar con Diagnóstico Molecular antes de hacer el envío. Condiciones especiales. Las muestras tienen que enviarse congeladas en nieve carbónica.
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta

Descripción:	HCV: gen NS3 mutación Q80K (sec. Sanger)
Código:	Q80K_NS3
Técnica:	PCR y secuenciación
Unidades:	
Plazo:	22 días
Tubo:	Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional:	Plasma de Edta congelado
Valores de referencia:	

Descripción:	HDL COLESTEROL
Código:	HDL
Técnica:	
Unidades:	mg/dL
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Sup. 40)

Descripción:	HDV RNA RT-PCR Cuantitativa (hepatitis delta)
Código:	DELTACUAN
Técnica:	RT-PCR cuantitativa
Unidades:	copias/mL
Plazo:	9 días
Tubo:	Plasma EDTA Congelado

Descripción:	HDV RNA RT-PCR Cuantitativa (hepatitis delta)
Comentario adicional:	1 mL Plasma de EDTA SEPARADO Y CONGELADO. ENVIAR CONGELADO. Separar plasma lo antes posible. Tubo exclusivo para esta determinación, rotulado con BM. Como alternativa suero en las mismas condiciones.
Valores de referencia:	(Inf. 150) La linea de corte de esta técnica es de 150 copias/mL

Descripción:	HE4 (PROTEINA EPIDIDIMAL HUMANA)
Código:	HE4
Técnica:	ICMA
Unidades:	pmol/L
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	(Inf. 70) Mujer > 14 años Premenopausia (Inf. 140) Mujer > 14 años Postmenopausia

Descripción:	HELICOBACTER PYLORI AC. IGA SUERO
Código:	CAMPYLOACA
Técnica:	EIA
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero o plasma (citrato, heparina)
Valores de referencia:	(Inf. 9) Negativo (9 - 11) Indeterminado

Descripción:	HELICOBACTER PYLORI AC. IGG SUERO
Código:	CAMPYLOACG
Técnica:	CLIA
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero
Valores de referencia:	(Inf. 0.80) Negativo (0.80 - 0.90) Indeterminado

Descripción:	HELICOBACTER PYLORI AG EN HECES
Código:	HELIAGCLIA
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Heces No Microbiología
Comentario adicional:	las muestras de heces se recogen en un recipiente limpio, hermético y sin conservantes
Valores de referencia:	(Inf. 0.9) Negativo (0.9 - 1.1) Indeterminado

Descripción:	HELICOBACTER PYLORI AC. IGM SUERO
Código:	CAMPYLOACM
Técnica:	EIA
Unidades:	.

Descripción:	HELICOBACTER PYLORI AC. IGM SUERO
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 1.0) Negativo (1.0 - 1.2) Indeterminado

Descripción:	Helicobacter pylori DNA PCR Cualitativa
Código:	HELIPCR
Técnica:	PCR
Unidades:	
Plazo:	8 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:	1ml Jugo gástrico-REFRIGERAR biopsia gástrica (solución salina)-REFRIGERAR Biopsia gástrica (parafina)-TA 1ml saliva-TA Heces-CONGELAR
Valores de referencia:	

Descripción:	Helicobacter pylori, Test de aire espirado
Código:	CAMPYALI
Técnica:	Espectrometría de masas
Unidades:	
Plazo:	8 días
Tubo:	Test Aliento
Comentario adicional:	El comprimido contenido en este kit no debe administrarse a niños menores de 18 años debido a la falta de datos que valoren los resultados
Valores de referencia:	

Descripción:	HEMATIES EN EXUDADO
Código:	LIQEXUHEM
Técnica:	Microscopía óptica
Unidades:	/µL
Plazo:	
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	HEMATIES EN LIQUIDO ASCITICO
Código:	LIQASCHEM
Técnica:	Microscopía óptica
Unidades:	/µL
Plazo:	
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	HEMATIES EN LIQUIDO PLEURAL
Código:	LIQPLHEM
Técnica:	Microscopía óptica
Unidades:	/µL

Descripción: HEMATIES EN LIQUIDO PLEURAL
Plazo:
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Hemidisplasia congénita eritrodermia. Sec Gen: NSDHL
Código: GEN_000408
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hemiplejia alternante de la infancia. Sec Gen: ATP1A3
Código: GEN_000409
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hemocromatosis 3 (HFE3): gen TFR2 (NGS)
Código: HFE3
Técnica: NGS Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hemocromatosis hereditaria: gen HFE (NGS)
Código: HFE_MUTS
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.
Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Hemocromatosis hereditaria: mutaciones C282Y, H63D, S65C HFE
Código: PCRHEMO
Técnica: Estudio de genotipado con sondas TaqMan mediante PCR en tiempo real (Real-Time PCR)
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Hemocromatosis hereditaria: mutaciones C282Y, H63D, S65C HFE

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario de EDTA sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Alternativas: Citrato.

El tiempo estimado para cada prueba se contará desde el día de entrada de la muestra en el laboratorio central (dias laborables).

Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.

Valores de referencia:

Descripción: Hemocromatosis juvenil 2A (HFE2A): gen HFE2 (NGS)

Código: HFE2A

Técnica: PCR y secuenciación

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Alternativas: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Hemocromatosis juvenil 2B (HFE2B): gen HAMP (NGS)

Código: HFE2B

Técnica: PCR y secuenciación

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Alternativas: Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Hemocromatosis: <10 genes (NGS)

Código: HEMOCROMAT

Técnica: NGS y MLPA

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.

Alternativa: Citrato.

Valores de referencia:

Código: HEMOCUL

Descripción: HEMOCULTIVO (CULTIVO DE SANGRE

Técnica: Cultivo en medios apropiados

Comentario adicional: Introducir la sangre obtenida por venopunción en los dos medios (aerobio y anaerobio) pinchando en el tapón (nunca abrir el tapón), 10 ml en cada frasco.

En caso de neonatos y niños pequeños en que no se pueden obtener volúmenes grandes de sangre es suficiente una cantidad de 1-5 ml, que se introduce en un solo frasco pediátrico.

Mover suavemente los frascos para que la sangre y el medio de cultivo se mezclen y remitir al laboratorio

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Perfil	CULTIVO		SANGREC	CULTIVO GENERAL en HEMOCULTIVO		

Descripción: Hemofilia A: gen F8 (NGS e inversión)

Código: HEMOFILIAA

Descripción:	Hemofilia A: gen F8 (NGS e inversión)
Técnica:	NGS Illumina
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Hemofilia B: gen F9 (NGS)
Código:	HEMOFILIAB
Técnica:	NGS con TSO Illumina
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	Hemofilia. Panel NGS
Código:	GEN_000410
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	HEMOGLOBINA A2
Código:	HBA2
Técnica:	HPLC
Unidades:	%
Plazo:	7 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	5 mL sangre total EDTA/Heparina Li.
Valores de referencia:	(2.0 - 3.5)

Descripción:	HEMOGLOBINA FETAL
Código:	HBFETAL
Técnica:	HPLC
Unidades:	%
Plazo:	7 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	5 mL sangre total EDTA/Heparina Li.
Valores de referencia:	(Inf. 92) 0-2 meses (Inf. 90) 2-3 meses (Inf. 42) 3-6 meses (Inf. 17) 6-9 meses (Inf. 10) 9-12 meses (Inf. 6.3) 1-2 años (Inf. 1.0) > 2 años

Descripción: HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)
Código: HBA1C
Técnica:
Unidades: %
Plazo: 3 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 5.7)

Descripción: HEMOGLOBINA LIBRE
Código: HGBLIBRE
Técnica: Espectrometría de absorción molecular.
Unidades: g/L
Plazo: 8 días
Tubo: Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional: 2 ml de plasma citrato
Valores de referencia: (Inf. 0.04)

Descripción: HEMOGLOBINA SANGRE
Código: HGB
Técnica:
Unidades: g/dL
Plazo: 3 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional:
Valores de referencia: (13.5 - 18) Hombre
(12 - 16) Mujer

Descripción: HEMOGLOBINAS ELECTROFORESIS SANGRE
Código: HBELEC
Técnica: Electroforesis
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 5 mL sangre total EDTA
Valores de referencia:

Código: HPN
Descripción: HEMOGLOBINURIA PAROXISTICA NOCTURNA
Técnica: Citometría de flujo
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	CD59	49031-8		CD59 (HEMATIES)	%	
Prueba	CD24GRA			CD24 (GRANULOCITOS)	%	
Prueba	FLAERGRA			FLAER (GRANULOCITOS)	%	
Prueba	CD14MON			CD14 (MONOCITOS)	%	
Prueba	FLAERMON			FLAER (MONOCITOS)	%	

Descripción:	HEMOGLOBINURIA PAROXISTICA NOCTURNA SCREENING
Código:	HPNSCREEN
Técnica:	Microtipaje en columnas de gel
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	10 mL Sangre total EDTA
Valores de referencia:	

Descripción:	Hemoglobinuria paroxística nocturna. Sec Gen: PIGA
Código:	GEN_000411
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	HEMOPEXINA EN SUERO
Código:	HEMOPEXINA
Técnica:	Inmuno Nefelometría
Unidades:	mg/dL
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero
Valores de referencia:	(50 - 115)

Descripción:	HEMORRAGIAS OCULTAS
Código:	HEMOC
Técnica:	Inmunoensayo
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	FOB
Comentario adicional:	Mantener refrigerado tubo recolector de heces del kit, máximo 5 días.
Valores de referencia:	NEGATIVO

Descripción:	HEMOSIDERINA ORINA
Código:	HEMOSI2
Técnica:	Tinción de Perls
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Orina basal
Comentario adicional:	5 ml orina refrigerada
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta

Descripción:	HEPATITIS A AC. IGG SUERO
Código:	HAACG
Técnica:	Técnica CMIA

Descripción:	HEPATITIS A AC. IGG SUERO
Unidades:	
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	HEPATITIS A AC. IGM
Código:	HAACM
Técnica:	Técnica ICMA
Unidades:	Índice
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 0.8) Negativo (0.8 - 1.2) Indeterminado

Descripción:	HEPATITIS B AC. SUPERFICIE
Código:	HBACS
Técnica:	Téc. ICMA
Unidades:	mUI/mL
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Sup. 10) Niveles de Ac. protectores en personas vacunadas

Descripción:	HEPATITIS B AC.ANTI CORE IGM
Código:	HBACCM
Técnica:	ICMA
Unidades:	
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 0.99) Negativo

Descripción:	HEPATITIS B AC.ANTI-CORE
Código:	AHBACC
Técnica:	Técnica ICMA
Unidades:	
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 1.00) Negativo

Descripción:	HEPATITIS B ANTICUERPOS ANTI-E
Código:	HBACE
Técnica:	Técnica ICMA
Unidades:	
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal

Descripción:	HEPATITIS B ANTICUERPOS ANTI-E
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Sup. 1.01) Negativo (Inf. 1.01) Positivo

Descripción:	HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE
Código:	HBAGS
Técnica:	Técnica ICMA
Unidades:	Índice
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 0.99) Negativo

Descripción:	HEPATITIS B ANTIGENO E
Código:	HBAGE
Técnica:	Técnica ICMA
Unidades:	
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 0.99) Negativo (1.00 - 1.19) Indeterminado

Descripción:	HEPATITIS B CONFIRMACION DEL ANTIGENO DE SUPERFICIE
Código:	HBSCONF
Técnica:	CMIA con neutralización con anticuerpos específicos
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero o plasma (Edta, litio, heparina)
Valores de referencia:	

Descripción:	HEPATITIS B DELTA AC. SUERO
Código:	HBDELTAACG
Técnica:	Técnica CLIA
Unidades:	UA/mL
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. Alternativa: Citrato, EDTA, heparina sodica y de litio. Muestras post mortem recogidas 24h despues de la muerte.
Valores de referencia:	(Inf. 1) Negativo

Descripción:	HEPATITIS B DELTA ANTIGENO SUERO
Código:	HBDAG
Técnica:	EIA
Unidades:	Índice
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Basal

Descripción:	HEPATITIS B DELTA ANTIGENO SUERO
Comentario adicional:	Suero Volumen 1.0 mL Volumen mínimo 0.50 mL
Valores de referencia:	(Inf. 0.9) Negativo

Descripción:	HEPATITIS C ANTICUERPOS IgG
Código:	HCACG
Técnica:	Técnica ICMA
Unidades:	Índice
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 0.90) Negativo (0.90 - 1.10) Indeterminado

Descripción:	HEPATITIS C CONFIRMACION E IDENTIFICACION ANTICUERPOS
Código:	HCCONF
Técnica:	(Téc. inmunoblot 3ª generación)
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 ml Suero Muestra alternativa: Plasma de EDTA, citrato, heparina
Valores de referencia:	

Descripción:	HEPATITIS D VIRUS (VHD) (IgM ANTI-VHD) AC IgM, SUERO
Código:	HDV
Técnica:	
Unidades:	Índice
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero refrigeradao
Valores de referencia:	(Inf. 0.9) No se detecta (0.9 - 1.1) Indeterminado (Sup. 1.1) Positivo

Descripción:	HEPATITIS DELTA (HDV) RNA RT-PCR Cualitativa
Código:	RNADELTA
Técnica:	PCR
Unidades:	
Plazo:	21 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. 1 mL suero, separado lo antes posible del coágulo. Evitar hemólisis. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO
Valores de referencia:	

Descripción:	HEPATITIS E AC IGG CONFIRMACION
Código:	HEACGCONF
Técnica:	Inmunoblot
Unidades:	

Descripción:	HEPATITIS E AC IGG CONFIRMACION
Plazo:	9 días
Tubo:	
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	HEPATITIS E AC IGM CONFIRMACION
Código:	HEACMCONF
Técnica:	Inmunoblot
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	HEPATITIS E AC. IGG SUERO
Código:	HEACG
Técnica:	Técnica CLIA
Unidades:	Indice
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. Alternativa plasma.
Valores de referencia:	(Inf. 0.9) Negativo (0.9 - 1.1) Indeterminado

Descripción:	HEPATITIS E ANTICUERPOS IGM
Código:	HEACM
Técnica:	Técnica CLIA
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. Alternativa plasma.
Valores de referencia:	(0.4 - 0.5) Indeterminado (Inf. 0.4) Negativo

Descripción:	Hepatitis E virus RNA PCR Cualitativa
Código:	VHEPCR
Técnica:	PCR
Unidades:	
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 mL suero separado lo antes posible del coágulo. Evitar hemólisis. CONGELAR INMEDIATAMENTE Y ENVIAR CONGELADO OTRAS MUESTRAS: Plasma de EDTA. Congelado. Heces en recipiente esteril. Congeladas Sangre total EDTA. Refrigerado
Valores de referencia:	

Descripción:	HEPCIDINA (25-BIOACTIVA) SUERO
Código:	HEPCIDINA

Descripción:	HEPCIDINA (25-BIOACTIVA) SUERO
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis.
Unidades:	ng/mL
Plazo:	12 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero. refrigerar. Alternativa: Plasma de EDTA/CITRATO NA/HEPATINA LI/HEPARINA NA
Valores de referencia:	(1.49 - 41.46)

Descripción:	Hermansky-Pudlak, Sd. Panel NGS
Código:	GEN_000412
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Herpes 1 y 2 PCR Cualitativa + Genotipo
Código:	HSVPCR
Técnica:	PCR
Unidades:	
Plazo:	6 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:	Exudado genital (escobillón seco)-REFRIGERAR 1ml LCR-CONGELAR Frotis-REFRIGERAR 1ml humor vitreo/acuoso-CONGELAR 1ml Líquido amniótico-CONGELAR 1ml Plasma de EDTA-CONGELAR 1ml Sangre total EDTA-REFRIGERAR 5ml orina-REFRIGERAR
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta

Descripción:	Herpes 6 DNA PCR Cualitativa
Código:	DNAHERP6
Técnica:	PCR
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:	1 ml LCR-CONGELAR 2 ml esputo-REFRIGERAR 3ml Sangre total EDTA-REFIRGERAR 5ml Orina-REFIRGERAR 1ml humor vitreo/ocuoso-REFIRGERAR
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta Esta prueba tiene una sensibilidad del 99% y una especificidad del 98%.

Descripción:	Herpes 7 DNA PCR
Código:	DNAHERP7

Descripción:	Herpes 7 DNA PCR
Técnica:	Hibridación Molecular (PCR) a Tiempo Real
Unidades:	
Plazo:	12 días
Tubo:	Muestra envios externos
Comentario adicional:	Escobillón seco, LCR, sangre total (EDTA)
Valores de referencia:	

Descripción:	Herpes 8 DNA PCR Cualitativa
Código:	DNAHERP8
Técnica:	RT-PCR
Unidades:	
Plazo:	12 días
Tubo:	Muestra envios externos
Comentario adicional:	LCR- CONGELAR Esputo-REFRIGERAR Sangre total EDTA: REFRIGERAR Orina-REFRIGERAR Humor vitreo/acuoso- REFRIGERAR
Valores de referencia:	Valor de referencia indicativo: No se detecta

Descripción:	HERPES SIMPLE TIPO I AC. IGG SUERO (HOMINIS)
Código:	HERPES1ACG
Técnica:	Téc. ECLIA
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. Alternativa: Plasma (heparina, edta)
Valores de referencia:	(Inf. 0.59) Negativo (0.60 - 0.99) Indeterminado (Sup. 1.0) Positivo

Descripción:	HERPES SIMPLE TIPO I AC. IGM SUERO (HOMINIS)
Código:	HERPES1ACM
Técnica:	Téc. EIA
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. Alternativa plasma (citrato, heparina)
Valores de referencia:	(Inf. 9) Negativo (9 - 11) Indeterminado

Descripción:	HERPES SIMPLE TIPO I ANTICUERPOS IGG EN LCR
Código:	HERP1GLC
Técnica:	Téc. EIA
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 1) Negativo (Sup. 1) Positivo

Descripción:	HERPES SIMPLE TIPO I ANTICUERPOS IGM EN LCR
Código:	HERP1MLC
Técnica:	Téc. EIA
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 1) Negativo (Sup. 1) Positivo

Descripción:	HERPES SIMPLE TIPO II AC. IGG SUERO (HOMINIS)
Código:	HERPES2ACG
Técnica:	Téc. CLIA
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. Muestra alternativa: Plasma (heparina, edta).
Valores de referencia:	(Inf. 0.50) Negativo (0.51 - 0.99) Indeterminado (Sup. 1) Positivo

Descripción:	HERPES SIMPLE TIPO II AC. IGM SUERO (HOMINIS)
Código:	HERPES2ACM
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. Alternativa plasma (citrato, heparina)
Valores de referencia:	(Inf. 9) Negativo (9 - 11) Indeterminado

Descripción:	HERPES SIMPLE TIPO II ANTICUERPOS IGG EN LCR
Código:	HERP2GLC
Técnica:	Téc. EIA
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	Interpretación según criterio clínico

Descripción:	HERPES SIMPLE TIPO II ANTICUERPOS IGM EN LCR
Código:	HERP2MLC
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	Interpretación según criterio clínico

Descripción:	HERPES VIRUS 1/2 ANTICUERPOS IgM
Código:	HERPES1_2M
Técnica:	Técnica CLIA
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	El ensayo se puede efectuar en muestras de suero o plasma humano. Se pueden utilizar anticoagulantes como el citrato, el EDTA y la heparina
Valores de referencia:	(Inf. 0.9) Negativo (0.9 - 1.1) Indeterminado

Descripción:	HERPES VIRUS TIPO 6 AC. IGG
Código:	HERPES6ACG
Técnica:	Técnica CLIA
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 0.80) Negativo (0.81 - 1.00) Indeterninado (Sup. 1.01) Positivo

Descripción:	HERPES VIRUS TIPO 6 AC. IGM
Código:	HERPES6ACM
Técnica:	IFI
Unidades:	Titulo
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1mL de suero Volumen mínimo 0.2 mL
Valores de referencia:	Negativo <1/10 Positivo > o = 1/10

Descripción:	HERPES VIRUS TIPO 6 ANTICUERPOS IGG EN LCR
Código:	HERP6GLC
Técnica:	Inmunofluorescencia Indirecta (IFI)
Unidades:	
Plazo:	6 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 ml LCR,se recomienda efectuar análisis simultaneo en suero y LCR
Valores de referencia:	Positivo título >1:1

Descripción:	HERPES VIRUS TIPO 6 ANTICUERPOS IGM EN LCR
Código:	HERP6MLC
Técnica:	Inmunofluorescencia Indirecta (IFI)
Unidades:	
Plazo:	6 días
Tubo:	Líquidos Biológicos

Descripción:	HERPES VIRUS TIPO 6 ANTICUERPOS IGM EN LCR
Comentario adicional:	1 ml de LCR , se recomienda efectuar análisis simultaneo en suero y LCR
Valores de referencia:	Positivo titulo >1:1

Descripción:	HERPES VIRUS TIPO 7 AC. IGG
Código:	HERPES7ACG
Técnica:	IFI
Unidades:	
Plazo:	11 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL
Valores de referencia:	<1:20 Título<1:20 Negativo >1:20 Título>o=1:20 Positivo

Descripción:	HERPES VIRUS TIPO 7 AC. IGM
Código:	HERPES7ACM
Técnica:	IFI
Unidades:	
Plazo:	11 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL
Valores de referencia:	<1:10 Título<1:10 Negativo >1:10 Título>o=1:10 Positivo

Descripción:	HERPES VIRUS TIPO 8 AC. IGG
Código:	HERPES8ACG
Técnica:	IFI
Unidades:	
Plazo:	18 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero.
Valores de referencia:	<1:64 Negativo <1:64 >1:64 Positivo >1:64

Descripción:	HERPES VIRUS TIPO 8 AC. IGM
Código:	HERPES8ACM
Técnica:	IFI
Unidades:	
Plazo:	12 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL
Valores de referencia:	<1:20 Negativo <1:20 >1:20 Positivo >1:20

Descripción:	HERPESVIRUS 1/2 ANTICUERPOS IgG
Código:	HERPES1_2G
Técnica:	Técnica CLIA
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal

Descripción:	HERPESVIRUS 1/2 ANTICUERPOS IgG
Comentario adicional:	El ensayo se puede efectuar en muestras de suero o plasma humano. Se pueden utilizar anticoagulantes como el citrato, el EDTA y la heparina
Valores de referencia:	(Inf. 0.9) Negativo (0.9 - 1.10) Indeterminado

Descripción:	Heteroplasia progresiva ósea. Sec Gen: GNAS
Código:	GEN_000413
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Heterotopia periventricular ligada al X. Panel NGS
Código:	GEN_000414
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Heterotopía periventricular ligada al X. Sec Gen: WAS
Código:	GEN_000415
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	HEXANODIONA 2,5 ORINA
Código:	HEXANODION
Técnica:	Cromatografía de Gases / Espectrometría Masas.
Unidades:	mg/L
Plazo:	13 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	5 ml de orina (micción aislada) al final de la jornada laboral. Volumen mínimo: 2 mL
Valores de referencia:	(Inf. 0.2) Final de semana laboral (exposión a Hexano o Metil-N-butilcetona)

Descripción:	HGV RNA RT-PCR Cualitativa
Código:	HGRNA
Técnica:	RTPCR
Unidades:	
Plazo:	10 días
Tubo:	Suero Biología Molecular

Descripción:	HGV RNA RT-PCR Cualitativa
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, si pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Valores de referencia:	

Descripción:	Hialuronidasa anticuerpos
Código:	HIALUROAC
Técnica:	Hemaglutinación
Unidades:	U/mL
Plazo:	13 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero.
Valores de referencia:	(Inf. 300)

Descripción:	Hibridación en arrays 750k: deleciones y ganancias de ADN
Código:	CGHARRAY
Técnica:	aCGH
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Muestra exclusiva para esta determinación: tubo de EDTA sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Enviar informe médico
Valores de referencia:	

Descripción:	Hibridación en arrays CGH180K: deleci. y ganancias de ADN
Código:	ARRAY180K
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:	Sangre total en EDTA Adjuntar informe médico
Valores de referencia:	

Descripción:	Hibridación en arrays CGH400K: deleci. y ganancias de ADN
Código:	ARRAY400K
Técnica:	ARRAY CGH
Unidades:	
Plazo:	35 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Sangre total en EDTA Adjuntar informe médico
Valores de referencia:	

Descripción:	Hidrocefalia ligada al X. Sec Gen: L1CAM
Código:	GEN_000416
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Descripción:	Hidrocefalia ligada al X. Sec Gen: L1CAM
Valores de referencia:	

Descripción:	Hidropesía fetal no autoinmune. Sec Gen: EPHB4
Código:	GEN_000417
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	HIDROXIBUTIRATO BETA EN ORINA
Código:	BETAOHBUTO
Técnica:	Enzimática-Espectrofotometría ultravioleta
Unidades:	mg/L
Plazo:	6 días
Tubo:	Orina basal
Comentario adicional:	5 ml orina (micción aislada)
Valores de referencia:	(Inf. 10)

Descripción:	HIDROXIBUTIRATO BETA EN SUERO
Código:	BETAOHBUTI
Técnica:	Enzimática UV
Unidades:	mmol/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 mL de suero CONGELADO Volumen mínimo: 0.20 mL
Valores de referencia:	(0.02 - 0.27) < 14 años Nota: Los valores de referencia son orientativos. En condiciones de ayuno los valores aumentan significativamente. (0.02 - 0.43) > 14 años Nota: Los valores de referencia son orientativos. En condiciones de ayuno los valores aumentan significativamente.

Descripción:	Hidroxipireno (Exposicion al Alquitran), Orina
Código:	HIDROPIREN
Técnica:	H.P.L.C.
Unidades:	µg/L
Plazo:	9 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	10 mL Orina Final de Jornada
Valores de referencia:	(Inf. 2.5) Exposición a hidrocarburos aromáticos policíclicos (PHAs). Biological Exposure Indices-BEIs® (ACGIH®)

Descripción:	HIDROXIPROGESTERONA 17 ALFA
Código:	OHPRO17
Técnica:	CLIA
Unidades:	ng/ml
Plazo:	4 días

Descripción:	HIDROXIPROGESTERONA 17 ALFA
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1mL suero. En recién nacidos es indispensable efectuar técnica de extracción, (distinta de la habitual),por lo que se debe indicar la edad del paciente. Hablar con envios externos
Valores de referencia:	(0.0 - 16.8) 1 dia - 1 mes (1.9 - 9.8) 1 mes - 2 meses (0.1 - 4.0) 2 meses - 3 meses (0.07 - 1.7) 3 años - 14 años (0.5 - 2.1) Hombre > 14 años (0.1 - 0.8) Mujer > 14 años Fase folicular (0.6 - 2.3) Mujer > 14 años Fase lutea (0.3 - 1.4) Mujer > 14 años Ovulación (2.0 - 12.0) Mujer > 14 años Tercer trimestre (0.13 - 0.51) Mujer > 14 años Postmenopáusica

Descripción:	HIDROXIPROGESTERONA 17-ALFA 60 MINUTOS
Código:	OHPRO17.60
Técnica:	
Unidades:	ng/mL
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero 60 Minutos
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	HIDROXIPROLINA (NORDIN) MG/G CREATININA
Código:	OHPROMG
Técnica:	HPLC
Unidades:	mg/g Creatinina
Plazo:	8 días
Tubo:	Orina basal
Comentario adicional:	Orina. Refrigerar. La noche anterior al examen, el paciente deberá evitar beber, comer o fumar a partir de las 21h. A las 7h de la mañana orinar y desechar dicha micción. A continuación, el paciente deberá beber 250ml. de agua destilada y seguirá evitando beber otros líquidos, comer o fumar. A las 9h el paciente debe orinar en un recipiente estéril y entregarlo al laboratorio
Valores de referencia:	(9 - 25) Límite de cuantificación: 2.2 mg/L

Descripción:	HIDROXIPROLINA EN ORINA 24 HORAS
Código:	OHPRO.MG.H
Técnica:	Cromatografía líquida de alta eficiencia
Unidades:	mg/24h
Plazo:	8 días
Tubo:	Orina 24 Horas
Comentario adicional:	Orina 24h. (alícuota). refrigerar. Acidificar la orina. No ingerir 3 días antes de la toma de muestra : Cualquier tipo de carne pescado o marisco, caldos, salsas, conservas, alubias, garbanzos, lentejas, habas, frutos secos, dulces, helados, licores. Dieta exenta de gelatinas y colágeno Alimentos permitidos: Queso, huevos, leche, legumbres verdes, arroz, pan blanco, naranjas, manzanas, peras, agua sin gas. Al tercer día de dieta, el paciente recogerá la orina de 24 horas
Valores de referencia:	(13.1 - 45.9) Límite de cuantificación: 2.2 mg/L

Descripción:	HIDROXITRIPTOFANO-5 ORINA
Código:	HIDROXITRI
Técnica:	H.P.L.C.-Fluorimetría
Unidades:	mcg/24 h
Plazo:	12 días
Tubo:	Orina 24 Horas
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 150)

Descripción:	HIERRO
Código:	FE
Técnica:	
Unidades:	µg/dL
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(59 - 160) Hombre (37 - 160) Mujer

Descripción:	HIERRO EN ORINA AISLADA FINAL DE JORNADA
Código:	FEOR
Técnica:	ICP-MS
Unidades:	µg/L
Plazo:	14 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	10.0 mL Orina final jornada
Valores de referencia:	(Inf. 650)

Descripción:	HIERRO ORINA
Código:	FE2
Técnica:	Espectrofotometría
Unidades:	µg/24 h
Plazo:	4 días
Tubo:	Orina 24 Horas
Comentario adicional:	Orina 24h. (alícuota de 1 ml). Refrigerar
Valores de referencia:	(Inf. 200) Prueba de eliminación: <1000 µg/6h. Límite de detección: 10 µg/L

Descripción:	Hígado graso no alcohólico, enf. de. Gen: PNPLA3
Código:	GEN_000418
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Hiperaldosteronismo familiar 1. Sec Gen: CYP11B2
Código:	GEN_000420
Técnica:	

Descripción: Hiperaldosteronismo familiar 1. Sec Gen: CYP11B2
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hiperaldosteronismo familiar. Sec Gen: CYP11B1
Código: GEN_000421
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hiperaldosteronismo primario: gen de fusión Cyp11b1-Cyp11b2
Código: CYP11B2
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Hipercalcemia hipocalciúrica familiar: gen CASR (NGS)
Código: HIPERCALC
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: HiperCKemia asintomática: gen ANO5 (NGS)
Código: ANO5
Técnica: NGS Illumina y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipercol. familiar: gen APOB exones 26 y 29 (sec. Sanger)
Código: APOB_SEC
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:

Descripción: Hipercol. familiar: gen APOB exones 26 y 29 (sec. Sanger)
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente
Valores de referencia:

Descripción: Hipercolesterolemia familiar. Panel NGS
Código: GEN_000423
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipercolesterolemia familiar. Sec Gen: APOB
Código: GEN_000422
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipercolesterolemia familiar: >10 genes (NGS)
Código: HIPERCOLES
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Hipercolesterolemia familiar: gen LDLR (NGS)
Código: LDLR
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Hipercolesterolemia familiar: gen LDLRAP1 (NGS)
Código: LDLRAP1
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días

Descripción: Hipercolesterolemia familiar: gen LDLRAP1 (NGS)
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Hipercolesterolemia familiar: gen PCSK9 (NGS)
Código: PCSK9
Técnica: PCR y seucenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Hiperekplexia hereditaria. Sec Gen: SLC6A5
Código: GEN_000424
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hiperferritinemia con cataratas congénitas: gen FTL (NGS)
Código: FTL
Técnica: NGS con TSO Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación sin abrir, marcado con BM. Alternativa: citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hiperinsulinismo congénito (CHI). Panel NGS
Código: GEN_000425
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hiperinsulinismo-hiperamonemia, Sd. Sec Gen: GLUD1
Código: GEN_000426
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Hiperinsulinismo-hiperamonemia, Sd. Sec Gen: GLUD1
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hiperlipemias: >10 genes (NGS)
Código: HIPERLIPEM
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM. Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Hiperlipoproteinemia 1 y 5: déficit lipoproteína lipasa. LPL
Código: GEN_000427
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hiperlipoproteinemia tipo 1: genes LPL y APOC2 (NGS)
Código: LPL_APOC2
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Hipermetioninemia. Sec Gen: MAT1A
Código: GEN_000428
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hiperoxaluria primaria. Panel NGS
Código: GEN_000429
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hiperparatiroidismo 2 (HRPT2): gen CDC73 (NGS)
Código: CDC73
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Hiperparatiroidismo familiar. Panel NGS
Código: GEN_000430
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hiperplasia suprarren. congénita 2: gen HSD3B2 (NGS)
Código: HSD3B2
Técnica: NGS con TSO de Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación sin abrir, marcado con BM. Alternativa: citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hiperplasia suprarrenal def. 17-alfa-hidroxilasa. CYP17A1
Código: GEN_000431
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hiperprolinemia. Panel NGS
Código: GEN_000432
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipertensión pulmonar primaria. Sec Gen: BMPR2
Código: GEN_000433
Técnica:

Descripción: Hipertensión pulmonar primaria. Sec Gen: BMPR2
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipertermia maligna muscular. Sec Gen: RYR1
Código: GEN_000434
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipertermia maligna: <10 genes (NGS)
Código: HIPERT_MAL
Técnica: NGS y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipertrofia muscular asociada a miostatina. Sec Gen: MSTN
Código: GEN_000435
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipoacusia acueducto vestibular dilatado, AR. SLC26A4
Código: GEN_000437
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipoacusia asociada a OTOF: gen OTOF (NGS)
Código: OTOF
Técnica: NGS con TSO Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Hipoacusia asociada a OTOF: gen OTOF (NGS)
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipoacusia congénita ligada a X. Sec Gen: POU3F4
Código: GEN_000438
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipoacusia congénita no sindrómica. Screening
Código: GEN_000443
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo:
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipoacusia congénita. Panel
Código: GEN_000436
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipoacusia congénita. Sec Gen: GJB2. Mutación 35delG
Código: GEN_000439
Técnica:
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipoacusia congénita. Sec Gen: GJB3
Código: GEN_000441
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipoacusia hereditaria. Panel NGS
Código: GEN_000444
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipoacusia hereditaria: >10 genes (NGS)
Código: HIPOACUHER
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Hipoacusia hereditaria: gen GJB2 (NGS)
Código: GJB2
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.
Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Hipoacusia hereditaria: gen GJB6 (NGS)
Código: GJB6
Técnica: NGS con TSO Illumina y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipoacusia neurosensorial no sind. mtADN. MTRNR1. Mut A1555G
Código: GEN_000445
Técnica:
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipoacusia y sordera no sindr. mitocondrial: sec gen MT-RNR1
Código: MT_RNR1

Descripción: Hipoacusia y sordera no sindr. mitocondrial: sec gen MT-RNR1
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipobetalipoproteinemia: genes APOB y ANGPTL3 (NGS)
Código: HIPOBETALI
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipocondrogénesis. Panel
Código: GEN_000446
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipocondroplasia estudio ampliado: genes FGFR2, FGFR3 y SHOX
Código: HIPOCONAMP
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 40 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Hipocondroplasia: secuenciación gen FGFR3
Código: HIPOCONDRO
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Hipofosfatasia: secuenciación gen ALPL
Código: ALPL
Técnica: NGS con TSO Illumina

Descripción: Hipofosfatasia: secuenciación gen ALPL
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Hipoglucemia >10 genes (NGS)
Código: HIPOGLUCEM
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo EDTA marcado con BM, sin manipular
Valores de referencia:

Descripción: Hipogonadis. hipogonadotr.: genes LEP, LEPR y PCSK1 (NGS)
Código: HIPOGONADI
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún apataro, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Hipogonadismo congénito. Panel NGS
Código: GEN_000448
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipogonadismo hipogonadotrófico 3 con o sin anosmia.PROKR2
Código: GEN_000449
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipogonadismo hipogonadotrófico. Sec Gen: LHB
Código: GEN_000450
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días

Descripción: Hipogonadismo hipogonadotrófico. Sec Gen: LHB
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipomagnesemia renal tipo 1. Sec Gen: TRPM6
Código: GEN_000451
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipomielinización y catarata congénita. Sec Gen: FAM126A
Código: GEN_000452
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipoparatiroidismo. Panel NGS
Código: GEN_000453
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipoplasia adrenal congénita. Sec Gen: NROB1
Código: GEN_000454
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipoplasia células de Leydig por resistencia a LH. LHCGR
Código: GEN_000456
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipoplasia cerebelosa. Sec Gen: VLDLR
Código: GEN_000455
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipoplasia dérmica focal. Sec Gen: PORCN
Código: GEN_000457
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipoplasia pontocerebelar. Panel NGS
Código: GEN_000458
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipoplasia suprarrenal congénita ligada al X. Gen: NR0B1
Código: GEN_000460
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Hipotiroidismo congénito. Sec Gen: TRHR
Código: GEN_000461
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: HIPROCRETINA-1 (OREXINA-A) EN LCR
Código: HIPOCRETIN
Técnica: Radioinmunoensayo
Unidades: pg/ml
Plazo: 47 días

Descripción:	HIPROCRETINA-1 (OREXINA-A) EN LCR
Tubo:	Liquido cefalorraquideo congelado
Comentario adicional:	1 mL LCR. INDISPENSABLE VOLUMEN 1 mL.en tubo de polipropileno ESPECIAL con rosca a su disposición.Envío inmediato a 4ºC.
Valores de referencia:	(Sup. 200) (Inf. 110) En pacientes con narcolepsia y cataplejia. (110 - 200) En pacientes con otras enfermedades neurológicas asociadas con trastornos del sueño.

Descripción:	Hirschsprung, enfermedad de. Panel Ampliado NGS
Código:	GEN_000328
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Hirschsprung, enfermedad de. Panel NGS
Código:	GEN_000462
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	HISTAMINA ORINA 24 HORAS
Código:	HISTAMI2
Técnica:	EIA
Unidades:	µg/24h
Plazo:	6 días
Tubo:	Orina 24 Horas
Comentario adicional:	10 mL orina de 24h (alicuota). Indicar volumen, se requiere la diuresis.
Valores de referencia:	(Inf. 56)

Descripción:	HISTAMINA PLASMA
Código:	HISTAMINA
Técnica:	EIA
Unidades:	ng/ml
Plazo:	6 días
Tubo:	Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional:	1 mL Plasma EDTA CONGELADO,
Valores de referencia:	(Inf. 1.98)

Descripción:	HISTAMINA SANGRE TOTAL HEPARINA
Código:	HISTAMSANG
Técnica:	Radioinmunoensayo
Unidades:	mcg/dl
Plazo:	8 días
Tubo:	Heparina Litio

Descripción:	HISTAMINA SANGRE TOTAL HEPARINA
Comentario adicional:	4 ml sangre total heparina, evitar sangre EDTA (1 TUBO): Refrigerar. Evitar remitir la muestra en fines de semana y vísperas de festivos.
Valores de referencia:	(2 - 20)

Descripción:	HISTAMINA, HECES
Código:	HISTHE
Técnica:	
Unidades:	ng/g heces
Plazo:	8 días
Tubo:	HECES CONGELADAS
Comentario adicional:	Heces recogidas en recipiente estéril. Congelar
Valores de referencia:	(Inf. 959)

Descripción:	Histidinemia. Sec Gen: HAL
Código:	GEN_000463
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	HISTONAS AC. IGG SUERO
Código:	HISTONASAC
Técnica:	Técnica ELISA
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero alternativo plasma de EDTA o plasma citrato
Valores de referencia:	(Inf. 1) Negativo (Sup. 1) Positivo

Descripción:	Histoplasma capsulatum PCR cualitativa
Código:	HISTOP_PCR
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	HISTOPLASMOSIS AC. SUERO (HISTOPLASMA CAPSULATUM)
Código:	HISTOPLAAC
Técnica:	Inmunodifusión Ouchterlony
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1mL suero.

Descripción:	HISTOPLASMOSIS AC. SUERO (HISTOPLASMA CAPSULATUM)
Valores de referencia:	

Descripción:	HIV-1 RNA RT-PCR Cualitativa
Código:	VIH1RNA
Técnica:	RT-PCR
Unidades:	copias/mL
Plazo:	15 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	TUBO DE EDTA. Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta (Inf. 13.2) Límite de detección

Descripción:	HLA A ALTA RESOLUCION EN SANGRE TOTAL
Código:	HLAAALTARE
Técnica:	PCR-SSO/SBT
Unidades:	
Plazo:	17 días
Tubo:	Sangre EDTA
Comentario adicional:	2 ML EDTA sangre total. Envio a temperatura ambiente.
Valores de referencia:	

Descripción:	HLA ANTICUERPOS SUERO
Código:	HLAAC
Técnica:	Tecnica bead array, luminex
Unidades:	
Plazo:	33 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	Negativo

Descripción:	HLA DQA1/DQB1 Diabetes mellitus
Código:	HLADIABE
Técnica:	PCR e hibricación
Unidades:	
Plazo:	21 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación sin abrir y marcado con BM. Alternativa: citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	HLA DR2 SANGRE
Código:	HLADR2
Técnica:	Hibridación molecular (PCR)
Unidades:	
Plazo:	12 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	5 mL sangre total (EDTA)
Valores de referencia:	

Descripción:	HLA DR3 EN SANGRE
Código:	HLADR3
Técnica:	Hibridación molecular (PCR)
Unidades:	
Plazo:	12 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	5 mL sangre total (EDTA)
Valores de referencia:	

Descripción:	HLA DR4 EN SANGRE
Código:	HLADR4
Técnica:	HIibridacion molecular (PCR)
Unidades:	
Plazo:	12 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	5 mL sangre total (EDTA)
Valores de referencia:	

Descripción:	HLA DR5 SANGRE
Código:	HLADR5
Técnica:	Hibridación molecular (PCR)
Unidades:	
Plazo:	12 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	5 mL sangre total (EDTA)
Valores de referencia:	

Descripción:	HLA DRB1 artritis reumatoide
Código:	HLADRB1
Técnica:	PCR e hibridación
Unidades:	
Plazo:	17 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación sin abrir, marcado con BM. Alternativa: citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	HLA PGT Monogenicas
Código:	HLAPGTM
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	BIOPSIA ESPECIAL
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	HLA-A TIPAJE DNA POR HIBRIDACIÓN MOLECULAR
Código:	HLAAPCR
Técnica:	Hibidación molecular (PCR)
Unidades:	

Descripción:	HLA-A TIPAJE DNA POR HIBRIDACIÓN MOLECULAR
Plazo:	23 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	5 mL de sangre total (EDTA)
Valores de referencia:	

Descripción:	HLA-A29 EN SANGRE
Código:	HLAA29
Técnica:	PCR-SSO
Unidades:	
Plazo:	12 días
Tubo:	Sangre EDTA
Comentario adicional:	10 mL de sangre total EDTA
Valores de referencia:	La presencia del alelo HLA A29 está asociado con un marcado incremento de riesgo para la corirretinopatía en perdigonada o de Birdshot.

Descripción:	HLA-B TIPAJE DNA POR HIBRIDACION MOLECULAR
Código:	HLABLOCUS
Técnica:	Hibridación molecular (PCR)
Unidades:	
Plazo:	23 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	5 mL sangre total (EDTA)
Valores de referencia:	

Descripción:	HLAB*5701 relacionado con hipersensibilidad a Abacavir
Código:	HLAB5701
Técnica:	Hibridación molecular (PCR)
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Sangre EDTA
Comentario adicional:	2 mL sangre total (EDTA)
Valores de referencia:	

Descripción:	HLAB27 ANTIGENO DE HISTOCOMPATIBILIDAD CF
Código:	HLAB27
Técnica:	Citometría de flujo
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	Sangre total (EDTA). Envio inmediato a temperatura ambiente. Tubo exclusivo para esta determinación Alternativa: sangre total Heparina
Valores de referencia:	El antígeno de histocompatibilidad B27 representa una característica genética y está asociado a un aumento del riesgo relativo de espondilitis anquilosante. En esta determinación se efectúa una selección previa de la población celular CD3 positiva. Se emplean dos anticuerpos anti HLA B27 de diferentes especificidades.

Descripción:	HLAB27 antígeno de histocompatibilidad por PCR
Código:	HLAB27_GEN

Descripción:	HLAB27 antígeno de histocompatibilidad por PCR
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	HLA-B5 (B51/B52) SANGRE
Código:	HLAB5
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	_COMENTARIODT
Valores de referencia:	La enfermedad de Behçet (BD) es una forma de vasculitis que se manifiesta con úlceras dolorosas en la boca y genitales, lesiones cutáneas y oculares (uveítis). También puede aparecer inflamación en articulaciones, sistema nervioso y tracto digestivo. A pesar de ser de distribución global, es más frecuente en la zona de la ruta de la seda (del Este de Asia hasta la cuenca del Mediterráneo), con mayor prevalencia en Turquía y relativamente frecuente en Japón e Irán. BD está asociada al antígeno HLA-B*5, codificado por los alelos HLA-B*51 y HLA-B*52. Por lo tanto, su presencia se considera un factor de riesgo para padecer dicha enfermedad, así como un efecto modulador de su expresión. Este informe ha de ser interpretado por un especialista dentro del contexto clínico y la historia familiar del paciente, en conjunto con otros hallazgos de laboratorio. Se recomienda asesoramiento genético.

Descripción:	HLA-B5 (B51/B52) SANGRE
Código:	HLAB5
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	_COMENTARIODT
Valores de referencia:	La enfermedad de Behçet (BD) es una forma de vasculitis que se manifiesta con úlceras dolorosas en la boca y genitales, lesiones cutáneas y oculares (uveítis). También puede aparecer inflamación en articulaciones, sistema nervioso y tracto digestivo. A pesar de ser de distribución global, es más frecuente en la zona de la ruta de la seda (del Este de Asia hasta la cuenca del Mediterráneo), con mayor prevalencia en Turquía y relativamente frecuente en Japón e Irán. BD está asociada al antígeno HLA-B*5, codificado por los alelos HLA-B*51 y HLA-B*52. Por lo tanto, su presencia se considera un factor de riesgo para padecer dicha enfermedad, así como un efecto modulador de su expresión. Este informe ha de ser interpretado por un especialista dentro del contexto clínico y la historia familiar del paciente, en conjunto con otros hallazgos de laboratorio. Se recomienda asesoramiento genético.

Descripción:	HLA-B5 (B51/B52) SANGRE
Código:	HLAB5
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	_COMENTARIODT
Valores de referencia:	La enfermedad de Behçet (BD) es una forma de vasculitis que se manifiesta con úlceras dolorosas en la boca y genitales, lesiones cutáneas y oculares (uveítis). También puede aparecer inflamación en articulaciones, sistema nervioso y tracto digestivo. A pesar de ser de distribución global, es más frecuente en la zona de la ruta de la seda (del Este de Asia hasta la cuenca del Mediterráneo), con mayor prevalencia en Turquía y relativamente frecuente en Japón e Irán. BD está asociada al antígeno HLA-B*5, codificado por los alelos HLA-B*51 y HLA-B*52. Por lo tanto, su presencia se considera un factor de riesgo para padecer dicha enfermedad, así como un efecto modulador de su expresión. Este informe ha de ser interpretado por un especialista dentro del contexto clínico y la historia familiar del paciente, en conjunto con otros hallazgos de laboratorio. Se recomienda asesoramiento genético.

Descripción:	HLA-B5 (B51/B52) SANGRE
Código:	HLAB5
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	_COMENTARIODT
Valores de referencia:	La enfermedad de Behçet (BD) es una forma de vasculitis que se manifiesta con úlceras dolorosas en la boca y genitales, lesiones cutáneas y oculares (uveítis). También puede aparecer inflamación en articulaciones, sistema nervioso y tracto digestivo. A pesar de ser de distribución global, es más frecuente en la zona de la ruta de la seda (del Este de Asia hasta la cuenca del Mediterráneo), con mayor prevalencia en Turquía y relativamente frecuente en Japón e Irán. BD está asociada al antígeno HLA-B*5, codificado por los alelos HLA-B*51 y HLA-B*52. Por lo tanto, su presencia se considera un factor de riesgo para padecer dicha enfermedad, así como un efecto modulador de su expresión. Este informe ha de ser interpretado por un especialista dentro del contexto clínico y la historia familiar del paciente, en conjunto con otros hallazgos de laboratorio. Se recomienda asesoramiento genético.

Descripción:	HLA-B5 (B51/B52) SANGRE
Código:	HLAB5
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	_COMENTARIODT

Descripción:	HLA-B5 (B51/B52) SANGRE
Valores de referencia:	La enfermedad de Behçet (BD) es una forma de vasculitis que se manifiesta con úlceras dolorosas en la boca y genitales, lesiones cutáneas y oculares (uveítis). También puede aparecer inflamación en articulaciones, sistema nervioso y tracto digestivo. A pesar de ser de distribución global, es más frecuente en la zona de la ruta de la seda (del Este de Asia hasta la cuenca del Mediterráneo), con mayor prevalencia en Turquía y relativamente frecuente en Japón e Irán. BD está asociada al antígeno HLA-B*5, codificado por los alelos HLA-B*51 y HLA-B*52. Por lo tanto, su presencia se considera un factor de riesgo para padecer dicha enfermedad, así como un efecto modulador de su expresión. Este informe ha de ser interpretado por un especialista dentro del contexto clínico y la historia familiar del paciente, en conjunto con otros hallazgos de laboratorio. Se recomienda asesoramiento genético.

Descripción:	HLA-B5 (B51/B52) SANGRE
Código:	HLAB5
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	_COMENTARIODT
Valores de referencia:	La enfermedad de Behçet (BD) es una forma de vasculitis que se manifiesta con úlceras dolorosas en la boca y genitales, lesiones cutáneas y oculares (uveítis). También puede aparecer inflamación en articulaciones, sistema nervioso y tracto digestivo. A pesar de ser de distribución global, es más frecuente en la zona de la ruta de la seda (del Este de Asia hasta la cuenca del Mediterráneo), con mayor prevalencia en Turquía y relativamente frecuente en Japón e Irán. BD está asociada al antígeno HLA-B*5, codificado por los alelos HLA-B*51 y HLA-B*52. Por lo tanto, su presencia se considera un factor de riesgo para padecer dicha enfermedad, así como un efecto modulador de su expresión. Este informe ha de ser interpretado por un especialista dentro del contexto clínico y la historia familiar del paciente, en conjunto con otros hallazgos de laboratorio. Se recomienda asesoramiento genético.

Descripción:	HLA-B5 (B51/B52) SANGRE
Código:	HLAB5
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	_COMENTARIODT

Descripción:	HLA-B5 (B51/B52) SANGRE
Valores de referencia:	La enfermedad de Behçet (BD) es una forma de vasculitis que se manifiesta con úlceras dolorosas en la boca y genitales, lesiones cutáneas y oculares (uveítis). También puede aparecer inflamación en articulaciones, sistema nervioso y tracto digestivo. A pesar de ser de distribución global, es más frecuente en la zona de la ruta de la seda (del Este de Asia hasta la cuenca del Mediterráneo), con mayor prevalencia en Turquía y relativamente frecuente en Japón e Irán. BD está asociada al antígeno HLA-B*5, codificado por los alelos HLA-B*51 y HLA-B*52. Por lo tanto, su presencia se considera un factor de riesgo para padecer dicha enfermedad, así como un efecto modulador de su expresión. Este informe ha de ser interpretado por un especialista dentro del contexto clínico y la historia familiar del paciente, en conjunto con otros hallazgos de laboratorio. Se recomienda asesoramiento genético.

Descripción:	HLA-B5 (B51/B52) SANGRE
Código:	HLAB5
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	_COMENTARIODT
Valores de referencia:	La enfermedad de Behçet (BD) es una forma de vasculitis que se manifiesta con úlceras dolorosas en la boca y genitales, lesiones cutáneas y oculares (uveítis). También puede aparecer inflamación en articulaciones, sistema nervioso y tracto digestivo. A pesar de ser de distribución global, es más frecuente en la zona de la ruta de la seda (del Este de Asia hasta la cuenca del Mediterráneo), con mayor prevalencia en Turquía y relativamente frecuente en Japón e Irán. BD está asociada al antígeno HLA-B*5, codificado por los alelos HLA-B*51 y HLA-B*52. Por lo tanto, su presencia se considera un factor de riesgo para padecer dicha enfermedad, así como un efecto modulador de su expresión. Este informe ha de ser interpretado por un especialista dentro del contexto clínico y la historia familiar del paciente, en conjunto con otros hallazgos de laboratorio. Se recomienda asesoramiento genético.

Descripción:	HLA-B5 (B51/B52) SANGRE
Código:	HLAB5
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	_COMENTARIODT

Descripción:	HLA-B5 (B51/B52) SANGRE
Valores de referencia:	La enfermedad de Behçet (BD) es una forma de vasculitis que se manifiesta con úlceras dolorosas en la boca y genitales, lesiones cutáneas y oculares (uveítis). También puede aparecer inflamación en articulaciones, sistema nervioso y tracto digestivo. A pesar de ser de distribución global, es más frecuente en la zona de la ruta de la seda (del Este de Asia hasta la cuenca del Mediterráneo), con mayor prevalencia en Turquía y relativamente frecuente en Japón e Irán. BD está asociada al antígeno HLA-B*5, codificado por los alelos HLA-B*51 y HLA-B*52. Por lo tanto, su presencia se considera un factor de riesgo para padecer dicha enfermedad, así como un efecto modulador de su expresión. Este informe ha de ser interpretado por un especialista dentro del contexto clínico y la historia familiar del paciente, en conjunto con otros hallazgos de laboratorio. Se recomienda asesoramiento genético.

Descripción:	HLA-B5 (B51/B52) SANGRE
Código:	HLAB5
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	_COMENTARIODT
Valores de referencia:	La enfermedad de Behçet (BD) es una forma de vasculitis que se manifiesta con úlceras dolorosas en la boca y genitales, lesiones cutáneas y oculares (uveítis). También puede aparecer inflamación en articulaciones, sistema nervioso y tracto digestivo. A pesar de ser de distribución global, es más frecuente en la zona de la ruta de la seda (del Este de Asia hasta la cuenca del Mediterráneo), con mayor prevalencia en Turquía y relativamente frecuente en Japón e Irán. BD está asociada al antígeno HLA-B*5, codificado por los alelos HLA-B*51 y HLA-B*52. Por lo tanto, su presencia se considera un factor de riesgo para padecer dicha enfermedad, así como un efecto modulador de su expresión. Este informe ha de ser interpretado por un especialista dentro del contexto clínico y la historia familiar del paciente, en conjunto con otros hallazgos de laboratorio. Se recomienda asesoramiento genético.

Descripción:	HLA-B7 EN SANGRE
Código:	HLAB7
Técnica:	Test de citotoxicidad
Unidades:	%
Plazo:	4 días
Tubo:	Heparina Litio
Comentario adicional:	10 mL de sangre total Heparina litio.Envío a temperatura ambiente. Evitar envío los jueves y viernes.
Valores de referencia:	(Inf. 50) Negativo (Sup. 50) Positivo

Descripción:	HLA-C TIPAJE EN SANGRE
Código:	HLACPCR
Técnica:	Tipaje mediante el uso de sondas especificas SSO (Sequence Specific Oligonucleotide) unidas a microesferas Luminex (Lifecodes, Inmucor).
Unidades:	

Descripción:	HLA-C TIPAJE EN SANGRE
Plazo:	15 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	HLAC-W6 TIPAJE EN SANGRE (psoriasis)
Código:	HLACW6
Técnica:	Tipaje mediante el uso de sondas especificas SSO (Sequence Specific Oligonucleotide) unidas a microesferas Luminex (Lifecodes, Inmucor).
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	HLA-DQ2 EN SANGRE
Código:	HLADQ2
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	5 mL sangre total (EDTA)
Valores de referencia:	

Descripción:	HLA-DQ8 EN SANGRE
Código:	HLADQ8
Técnica:	DQ3
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	sangre en EDTA 5 ml
Valores de referencia:	

Descripción:	HLA-DR TIPAJE DNA POR HIBRIDACIÓN MOLECULAR
Código:	HLADRT
Técnica:	Hibridación molecular (PCR)
Unidades:	
Plazo:	14 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	5 mL de Sangre total (EDTA)
Valores de referencia:	

Descripción:	HLA-DR1 EN SANGRE
Código:	HLADR1
Técnica:	Hibridación molecular (PCR)
Unidades:	
Plazo:	23 días

Descripción:	HLA-DR1 EN SANGRE
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	5 mL Sangre total EDTA
Valores de referencia:	

Descripción:	HLA-DRB1-1501, HLA-DQA1-0102, y HLA-DQB1-0602
Código:	NARCOLEPSI
Técnica:	PCR e hibridación con sondas
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	HMGCR ANTICUERPOS SUERO (CoA reductasa)
Código:	HMGCRAC
Técnica:	EIA
Unidades:	UA/mL
Plazo:	14 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1mL suero. REFRIGERAR. Volumne mínimo: 0.5 ML
Valores de referencia:	(Inf. 20)

Descripción:	Holoprosencefalia no sindrómica. Panel NGS
Código:	GEN_000464
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	HOLOTRANSCOBALAMINA
Código:	HOLOTRANSC
Técnica:	Inmunoanálisis
Unidades:	pmol/L
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero Volumen 2.0 mL Volumen mínimo 0.57 mL
Valores de referencia:	(25.1 - 165)

Descripción:	Holt-Oram, Sd. Sec Gen: TBX5
Código:	GEN_000465
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días

Descripción:	Holt-Oram, Sd. Sec Gen: TBX5
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	HOMOCISTEINA TOTAL EN SUERO
Código:	HOMOCISTE
Técnica:	Inmunoensayo turbidimétrico
Unidades:	mcmol/L
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml suero. 1 mL plasma EDTA/HEPARINA Litio
Valores de referencia:	(4.44 - 13.56) Mujer (5.46 - 16.20) Hombre

Descripción:	HOMOCISTINA ORINA
Código:	HOMOCIST
Técnica:	Cromatografía líquida de alta resolución
Unidades:	mcmol/g crea.
Plazo:	9 días
Tubo:	Orina basal
Comentario adicional:	10mL orina (micción aislada)
Valores de referencia:	(Inf. 2)

Descripción:	Homocistinuria Ampliado Panel NGS
Código:	GEN_000468
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Homocistinuria def. cistationina beta sintasa: gen CBS (NGS)
Código:	CBS
Técnica:	NGS con TSOE Illumina
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Homocistinuria por déficit de MTHFR. Sec Gen: MTHFR
Código:	GEN_000467
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Homocistinuria por déficit de MTHFR. Sec Gen: MTHFR
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Homocistinuria. Panel NGS
Código: GEN_000469
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: HONGOS DERMATOFITOS DNA PCR Cualitativa
Código: HONGOSPCR
Técnica: Reacción en cadena de la polimerasa.
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional: Escamas, piel, uñas
Valores de referencia:

Descripción: HORMONA ANTIMULLERIANA ROCHE
Código: MULLERIANA
Técnica: ECLIA
Unidades: ng/ml
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero o plasma heparina. Preferible enviar congelado.
No emplear plasma con EDTA
Conveniente indicar edad y sexo
Valores de referencia: (1.43 - 11.60) Hombre
(1.52 - 9.95) Mujer 20 años - 24 años
(1.20 - 9.05) Mujer 24 años - 29 años
(0.71 - 7.59) Mujer 29 años - 34 años
(0.41 - 6.96) Mujer 34 años - 39 años
(0.06 - 4.44) Mujer 39 años - 44 años
(0.01 - 1.79) Mujer 44 años - 50 años
Mujer Ovario Poliquístico:
(2.41 - 17.1) Mujer
Mujer Reserva ovárica estimada:
(Inf. 0.68) Mujer Baja reserva ovárico
(0.68 - 2.27) Mujer Suficiente reserva ovárica
(Sup. 2.27) Mujer Reserva ovárica normal

Descripción: HORMONA DE CRECIMIENTO SUERO (HGH)
Código: GH
Técnica: Técnica Quimioluminiscencia
Unidades: ng/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:

Descripción:	HORMONA DE CRECIMIENTO SUERO (HGH)
Valores de referencia:	(Inf. 5) Los niveles basales de GH sufren variaciones fisiológicas por lo que se recomienda, para su valoración, efectuar pruebas dinámicas. De manera orientativa se considera valor normal inferior a 5 ng/mL

Descripción:	HORMONA DE CRECIMIENTO SUERO (HGH)
Código:	GH
Técnica:	Técnica Quimioluminiscencia
Unidades:	ng/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 5) Los niveles basales de GH sufren variaciones fisiológicas por lo que se recomienda, para su valoración, efectuar pruebas dinámicas. De manera orientativa se considera valor normal inferior a 5 ng/mL

Descripción:	HORMONA ESTIMULADORA DE MELANOCITOS (ALFA-MSH)
Código:	MSH
Técnica:	Técnica RIA
Unidades:	pmol/L
Plazo:	31 días
Tubo:	Plasma trasylol/aprotinina
Comentario adicional:	2 mL plasma EDTA con aprotinina, separar y congelar inmediatamente Tubo especial con aprotinina (TRASYLOL).
Valores de referencia:	(9.0 - 18.0)

Descripción:	HORMONA LIBERADORA DE GONADOTROFINA (GNRH), SUERO
Código:	GNRH
Técnica:	EIA
Unidades:	ng/mL
Plazo:	19 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 mL de suero congelado
Valores de referencia:	(4.09 - 11.55) Determinación realizada mediante un procedimiento EIA de tipo RUO. Los valores reportados tienen carácter orientativo.

Descripción:	HSV1, HSV2, Herpes 6, Varicela zoster, Eps.-Barr, y CMV PCR
Código:	HERPESPCR
Técnica:	PCR
Unidades:	
Plazo:	10 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular

Descripción: HSV1, HSV2, Herpes 6, Varicela zoster, Eps.-Barr, y CMV PCR
Comentario adicional:
1ml LCR-CONGELAR
Exudado genital (escobillón seco)-REFRIGERAR
Frotis (escobillón seco)-REFRIGERAR
Lesión de piel -REFRIGERAR
1 ml BAL(SOLO ACEPTAMOS PARA cmv)-REFRIGERAR
1ml DNA extraído-CONGELAR
1ml humor vitreo/acuoso-CONGELAR
2ml Sangre total EDTA- REFRIGERAR
Valores de referencia:

Descripción: HTLV I + HTLV II DNA, PROVIRAL SANGRE TOTAL
Código: DNHT
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: Sangre total EDTA. refrigerar.
Valores de referencia: Valor de referencia indicativo: No se detecta

---

Descripción: HTLV I/II AC. INMUNOBLOT
Código: HTLVBLOT
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia:

Descripción: HTLV-1 Y 2 AC. SUERO
Código: HTLV1AC
Técnica: Técnica Inmunoanálisis. Hasta fecha 21-09-2011 Enzimoinmunoanálisis.
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
1 mL de suero
Alternativa: Plasma de EDTA, CITRATO, HEPARINA LITIO Y HEPARINA SODIO.
Valores de referencia:
(Inf. 1) Negativo
(Sup. 1) Positivo

Descripción: Hu (ANNA-1) AC. LCR
Código: ACHU.LCR
Técnica: Técnica Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: LIQUIDO LCR INMUNO
Comentario adicional: 1 ml LCR
Valores de referencia:

Descripción: Huella genética (DNI genético)
Código: HUELLAGEN
Técnica:

Descripción: Huella genética (DNI genético)
Unidades:
Plazo:
Tubo:
Comentario adicional: Previo contacto con el laboratorio
Valores de referencia:

Descripción: HUESO NASAL AUSENTE
Código: HUESONASAL
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo:
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Human Peripheral Blood Mononuclear Cells
Código: PBMC
Técnica:
Unidades: 10^6 células/mL
Plazo: 3 días
Tubo: Heparina Litio
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Hurler o MPS1, Sd. Sec Gen: IDUA
Código: GEN_000470
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: IA2 AC. SUERO
Código: IA.2AC
Técnica: ICMA
Unidades: UI/mL
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL de suero sin hemolisis
Valores de referencia: (Inf. 28) Negativo
(28 - 33) Indeterminado

Descripción: IBSSMART TEST_DIAG COLON / INTESTINO IRRITIBLE
Código: IBS_SMART
Técnica:
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Sangre EDTA

Descripción: IBSSMART TEST_DIAG COLON / INTESTINO IRRITIBLE

Comentario adicional: 3 tubos de 3ml de sangre EDTA.
Las extracciones se realizarán únicamente los LUNES (enviar el mismo día que se obtiene la muestra).
CONDICIONES PREVIAS: 7 días antes de la toma de la muestra no se debe tomar: antihistamínicos, inmunosupresores o corticoides.
Aconsejable estar en ayunas.
Llamar a la mensajería Nacex (Tfno. 900 100 000) y realizar el envío al n.º de abonado 1201/75
Si surge cualquier problema llamar al 964 220216.
El envio se hace desde el punto de extracción.

Valores de referencia:

Descripción: Ictiosis arlequín. Sec Gen: ABCA12

Código: GEN_000471

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Ictiosis con hipotricosis, AR. Sec Gen: ST14

Código: GEN_000472

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Ictiosis epidermolítica. Sec Gen: KRT10

Código: GEN_000474

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Ictiosis epidermolítica: genes KRT1 y KRT10 (NGS)

Código: ICTIO_EPID

Técnica: NGS Illumina

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Ictiosis folicular-atriquia-fotofobia, Sd. Gen: MBTPS2

Código: GEN_000475

Técnica:

Unidades:

Descripción: Ictiosis folicular-atriquia-fotofobia, Sd. Gen: MBTPS2
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Ictiosis lamelar. Sec Gen: TGM1
Código: GEN_000476
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Ictiosis ligada al cromosoma X. Sec Gen: STS
Código: GEN_000477
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Ictiosis vulgar. Sec Gen: FLG
Código: GEN_000478
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Ictiosis y erirtroderma ictiosiforme. Panel NGS
Código: GEN_000479
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Ictiosis-colangitis esclerosante neonatal, Sd. Gen: CLDN1
Código: GEN_000480
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción:	IDENTIFICACION DE ANTICUERPOS IRREGULARES
Código:	IRREGUAC
Técnica:	Columna gel
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Se requiere suero y sangre total (EDTA)
Valores de referencia:	

Descripción:	IFAP, Sd. Sec Gen: MBTPS2
Código:	GEN_000481
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	IGA SECRETORA LAGRIMAS (INMUNOGLOBULINA IGA LAGRIMAS)
Código:	IGALA
Técnica:	Nefelometría
Unidades:	mg/dL
Plazo:	5 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	0.5 mL Lagrimas en frasco esteril
Valores de referencia:	(3 - 30)

Descripción:	IGA SECRETORA MOCO NASAL (INMUNOGLOBULINA IGA-S MOCO NASAL)
Código:	IGAMOCO
Técnica:	Nefelometría
Unidades:	mg/dL
Plazo:	7 días
Tubo:	
Comentario adicional:	Muestra de moco nasal.
Valores de referencia:	(Sup. 3.0)

Descripción:	IGA SECRETORA SALIVA (INMUNOGLOBULINA IGA SALIVA)
Código:	IGASA
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	mcg/mL
Plazo:	9 días
Tubo:	Saliva
Comentario adicional:	1mL Saliva en frasco esteril congelada
Valores de referencia:	(40 - 170)

Descripción:	IgE ESPECÍFICA MULTIPLEX (ALEX TEST), SUERO
Código:	ALEX
Técnica:	EIA
Unidades:	
Plazo:	10 días

Descripción:	IgE ESPECÍFICA MULTIPLEX (ALEX TEST), SUERO
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL Suero
Valores de referencia:	

Descripción:	IGE MOCO NASAL (INMUNOGLOBULINA IGE MOCO NASAL)
Código:	IGEMOCO
Técnica:	CLIA
Unidades:	UI/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Muestra envios externos
Comentario adicional:	Lavado nasal. Refrigerar
Valores de referencia:	(Inf. 10)

Descripción:	IGF-1 (SOMATOMEDINA C)
Código:	SOMATOC
Técnica:	Quimioluminiscencia
Unidades:	ng/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. Alternativa: plasma de heparina de Na o Li Fines de semana: enviar suero congelado

Descripción: IGF-1 (SOMATOMEDINA C)

Descripción: IGF-1 (SOMATOMEDINA C)

(69.1 - 200) Hombre 50 años - 55 años
(60.5 - 195) Hombre 55 años - 60 años
(55.8 - 191) Hombre 60 años - 65 años
(54.4 - 187) Hombre 65 años - 70 años
(49.6 - 188) Hombre 70 años - 75 años
(47.8 - 185) Hombre 75 años - 80 años

Descripción: IGFBP-3 SUERO (IGF BINDING PROTEIN-3)

Código: IGFBP3

Técnica: Técnica Inmunoluminiscencia

Unidades: mcg/mL

Plazo: 3 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 1 mL suero.

Valores de referencia:
(0.64 - 3.75) 1 año - 2 años
(0.88 - 4.73) 2 años - 4 años
(0.95 - 5.56) 4 años - 6 años
(1.50 - 6.42) 6 años - 8 años
(1.89 - 7.25) 8 años - 10 años
(2.55 - 8.42) 10 años - 12 años
(3.23 - 10.17) 12 años - 14 años
(3.51 - 9.23) 14 años - 16 años
(3.13 - 8.57) 16 años - 18 años
(2.81 - 7.32) 18 años - 20 años
(3.37 - 7.33) 20 años - 30 años
(3.59 - 6.68) 30 años - 40 años
(3.42 - 6.83) 40 años - 50 años
(3.36 - 6.87) 50 años - 60 años
(3.28 - 6.46) 60 años - 64 años
(2.79 - 5.54) 64 años - 80 años

Descripción: IGF-II

Código: IGFII

Técnica: EIA

Unidades: ng/mL

Plazo: 23 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 1 ml suero

Valores de referencia: (350 - 1000)

Descripción: IGG 4ESPECIFICA A DACTYLIS GLOMERATA (GRAMA,C

Código: G03IGG4

Técnica:

Unidades: mg/L

Plazo: 5 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional:

Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A ACAROS DERMATOPHAGOIDES FARINAE

Código: D02IGG

(79.3 - 207) Hombre 45 años - 50 años

Descripción:	IGG ESPECIFICA A ACAROS DERMATOPHAGOIDES FARINAE
Técnica:	CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG ESPECIFICA A ACAROS DERMATOPHAGOIDES MICROCERAS
Código:	D03IGG
Técnica:	CAP SYSTEM- Fluoroinmunoanálisis
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG ESPECIFICA A ACAROS DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS
Código:	D01IGG
Técnica:	CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG ESPECIFICA A ALIMENTOS BACALAO (PESCADO)
Código:	F03IGG
Técnica:	CAP SYSTEM- Fluoroinmunoanálisis
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG ESPECIFICA A ALIMENTOS CLARA DE HUEVO
Código:	F01IGG
Técnica:	CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG ESPECIFICA A ALIMENTOS GLUTEN (TRIGO)
Código:	F79IGG
Técnica:	CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal

Descripción: IGG ESPECIFICA A ALIMENTOS GLUTEN (TRIGO)
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A ALIMENTOS OVOALBUMINA
Código: F232IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A ALIMENTOS OVOMUCOIDE
Código: F233IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A ANIMALES CASPA DE GATO
Código: E01IGG
Técnica: CAP SYSTEM- Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A ANIMALES CASPA DE PERRO
Código: E05IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A ANIMALES EPITELIO DE CONEJO
Código: E82IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A ANIMALES EXCREMENTO DE CANARIO
Código: E200IGG

Descripción:	IGG ESPECIFICA A ANIMALES EXCREMENTO DE CANARIO
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG ESPECIFICA A ANIMALES LORO (plumas, excrems y prots
Código:	GE92IGG
Técnica:	Fluoroinmunoanálisis
Unidades:	mg/L
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL SUERO. Refrigerar si se envía hasta 24 h después de obtención. Congelar si se superan las 24 h.
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG ESPECIFICA A ANIMALES PLUMAS DE CANARIO
Código:	RE201IGG
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG ESPECIFICA A APIS MELLIFERA (VENENO DE ABEJA)
Código:	I01IGG
Técnica:	CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG ESPECIFICA A ASPERGILLUS NIGER
Código:	RM207IGG
Técnica:	CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG ESPECIFICA A BETA-LACTOGLOBULINA (F77)
Código:	BETLACIGG
Técnica:	FLUOROINMUNOANÁLISIS
Unidades:	mg/L
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal

Descripción:	IGG ESPECIFICA A BETA-LACTOGLOBULINA (F77)
Comentario adicional:	1 mL
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG ESPECIFICA A CASEINA (F78)
Código:	CASEINAIGG
Técnica:	FLUOROINMUNOANÁLISIS
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG ESPECIFICA A ENTEROTOXINA A STAPHILOC.
Código:	M80IGG
Técnica:	Fluoroinmunoanalisis (Cap System)
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG ESPECIFICA A ENTEROTOXINA C STAPHILOC
Código:	M223IGG
Técnica:	Fluoroimnunoanalisis (Cap System)
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG ESPECIFICA A ENTEROTOXINA TSST STAPHILOC.
Código:	M226IGG
Técnica:	Fluroinmunoanálisis (Cap System)
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG ESPECIFICA A EXCREMENTOS DE PERIQUITO
Código:	E77IGG
Técnica:	CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG ESPECIFICA A EXCREMENTOS DE POLLO
Código:	E218IGG

Descripción:	IGG ESPECIFICA A EXCREMENTOS DE POLLO
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG ESPECIFICA A INSECTOS BLATELLA GERMANICA (CUCARACHA
Código:	I06IGG
Técnica:	CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG ESPECIFICA A MICROPOLYSPORA FAENI
Código:	GM22IGG
Técnica:	CAO SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS ASPERGILLUS FUMIGATUS
Código:	M03IGG
Técnica:	CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS CANDIDA ALBICANS
Código:	M05IGG
Técnica:	CAP SYSTEM-Fluoroinmuinoanálisis
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS FUSARIUM MONILIFORME
Código:	M09IGG
Técnica:	CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal

Descripción: IGG ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS FUSARIUM MONILIFORME
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS MUCOR RACEMOSUS
Código: M04IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS PENICILLIUM NOTATUM
Código: M01IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A PALOMA (plumas, excrem y prots)
Código: GE91IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A PARASITOS ANISAKIS (PESCADO)
Código: P04IGG
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A PERIQUITO (PLUMAS, EXCREMENTOS Y PROTEÍ
Código: GE90IGG
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A PLUMAS DE OCA
Código: E70IGG

Descripción: IGG ESPECIFICA A PLUMAS DE OCA
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A PLUMAS DE PALOMA
Código: E215IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A PLUMAS DE PERIQUITO
Código: E78IGG
Técnica: CAP SYSTEM- Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A PLUMAS DE POLLO
Código: E85IGG
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A POLENES DA SECALE CEREALE (CENTENO)
Código: G12IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A POLENES DE ARBOLES CORYLUS AVELLANA
Código: T04IGG
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal

Descripción:	IGG ESPECIFICA A POLENES DE ARBOLES CORYLUS AVELLANA
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG ESPECIFICA A POLENES DE ARBOLES PINUS STROBUS (PINO)
Código:	T16IGG
Técnica:	CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG ESPECIFICA A POLENES DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS (CIPRES
Código:	T23IGG
Técnica:	CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG ESPECIFICA A POLENES DE CYNODON DACTYLON (GRAMA MAYO
Código:	G02IGG
Técnica:	CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG ESPECIFICA A POLENES DE DACTYLIS GLOMERATA (GRAMA, C
Código:	G03IGG
Técnica:	CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG ESPECIFICA A POLENES DE FESTUCA ELATIOR (CAÑUELA, FE
Código:	G04IGG
Técnica:	CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG ESPECIFICA A POLENES DE FRAXINUS AMERICANA (FRESNO)
Código:	T15IGG

Descripción:	IGG ESPECIFICA A POLENES DE FRAXINUS AMERICANA (FRESNO)
Técnica:	CAP SYSTEM- Fluoroinmunoanálisis
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG ESPECIFICA A POLENES DE GRAMINEAS ANTHOXANTHUM ODORATUM
Código:	G01IGG
Técnica:	CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis.
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG ESPECIFICA A POLENES DE HERBACEAS URTICA DIOICA (ORTIGA)
Código:	W20IGG
Técnica:	CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG ESPECIFICA A POLENES DE LOLIUM PERENNE (BALLICO)
Código:	G05IGG
Técnica:	CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG ESPECIFICA A POLENES DE PARIETARIA JUDAICA (PARIETAR
Código:	W21IGG
Técnica:	CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG ESPECIFICA A POLENES DE PHLEUM PRATENSE (HIERBA TIM
Código:	G06IGG
Técnica:	CAP-SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal

Descripción:	IGG ESPECIFICA A POLENES DE PHLEUM PRATENSE (HIERBA TIM
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG ESPECIFICA A POLENES DE PLANTAGO LANCEOLATA
Código:	W09IGG
Técnica:	CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG ESPECIFICA A POLENES DE PLATANUS ACERIFOLIA
Código:	T11IGG
Técnica:	CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG ESPECIFICA A POLENES DE POA PRATENSIS (ESPIGUILLA)
Código:	G08IGG
Técnica:	CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG ESPECIFICA A POLENES DE QUERCUS ALBA (ROBLE, ENCINA)
Código:	T07IGG
Técnica:	CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG ESPECIFICA A POLENES DE SALIX CAPREA (SAUCE)
Código:	T12IGG
Técnica:	CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG ESPECIFICA A POLENES DE SALSOLA KALI (PESTIFER)
Código:	W11IGG

Descripción:	IGG ESPECIFICA A POLENES DE SALSOLA KALI (PESTIFER)
Técnica:	CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG ESPECIFICA A POLENES DE ULMUS AMERICANA (OLMO)
Código:	T08IGG
Técnica:	CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG ESPECIFICA A POLENES DECHENOPODIUM ALBUM (CEÑIGO)
Código:	W10IGG
Técnica:	CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG ESPECIFICA A POLENES DEPARIETARIA OFFICINALIS
Código:	W19IGG
Técnica:	CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG ESPECIFICA A POLISTES SPP. (VENENO DE AVISPA)
Código:	I04IGG
Técnica:	CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG ESPECIFICA A PROTEÍNAS SUERO DE POLLO
Código:	RE219IGG
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal

Descripción: IGG ESPECIFICA A PROTEÍNAS SUERO DE POLLO
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA A VESPULA SPP (VENENO DE AVISPA)
Código: I03IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA ALFA-LACTOALBUMINA (F76)
Código: ALFLACTIGG
Técnica: FLUOROINMUNOANÁLISIS
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml
Valores de referencia:

Código: ASPERGIAC
Descripción: IGG ESPECIFICA ASPERGILLUS (PRECIPITINAS)
Técnica: Téc. Inmunodifusión Ouchterlony
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	M03IGG	26954-8		IGG ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS ASPERGILLUS FUMIGATUS	mg/L	
Prueba	RM207IGG	58914-3		IGG ESPECIFICA A ASPERGILLUS NIGER	mg/L	
Prueba	M36IGG	63166-3		IGG ESPECIFICA ASPERGILLUS TERREUS	mg/L	
Prueba	M228IGG	99476-4		IGG ESPECIFICA ASPERGILLUS FLAVUS	mg/L	

Descripción: IGG ESPECIFICA ASPERGILLUS FLAVUS
Código: M228IGG
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG ESPECIFICA ASPERGILLUS TERREUS
Código: M36IGG
Técnica:
Unidades: mg/L

Descripción:	IGG ESPECIFICA ASPERGILLUS TERREUS
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IgG ESPECÍFICA Cupressus arizonica) Polen árboles, SUERO
Código:	T222GG
Técnica:	CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG ESPECIFICA MOHOS Y HONGOS CLADOSPORIUM HERBARUM
Código:	M02IGG
Técnica:	CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG ESPECIFICA POLENES DE ARTEMISIA VULGARIS (ARTEMISA)
Código:	W06IGG
Técnica:	CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG EXCREMENTOS GALLINA EN SUERO
Código:	SUEGALLIAC
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	U/mL
Plazo:	12 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ML SUERO
Valores de referencia:	(Inf. 1) Negativo

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A ARBOLES SALIX CAPREA (SAUCE)
Código:	T12IGG4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A ENTEROTOXINA STAPHILOC.
Código: M80IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A HERBACEAS SALSOLA KALI (PESTIFER)
Código: W11IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A ALERGENOS OCUPACIONALES FORMALDEHIDO
Código: K80IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A ALERGENOS OCUPACIONALES ISOCIANATO HDI
Código: K77IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A ALERGENOS OCUPACIONALES LATEX
Código: K82IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A ALIMENTOS LENTEJA
Código: RF235IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A ALIMENTOS LENTEJA
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A HOLCUS LANATUS (HENO BLANCO
Código:	G13IGG4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A PLUMAS DE POLLO
Código:	E85IGG4
Técnica:	
Unidades:	mg//L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA rPhl p 1 Polen Hierba Timotea
Código:	G205IGG4
Técnica:	CAP SYSTEM-FLUOROINMUNOANÁLISIS
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A ALFA-LACTOALBUMINA (LECHE DE VACA)
Código:	F76IGG4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A ANISAKIS (PESCADO)
Código:	P04IGG4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A ARBOLES PLATANUS ACERIFOLIA
Código: T11IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A CASEINA (LECHE DE VACA)
Código: F78IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A HERBACEAS ARTEMISIA VULGARIS (ARTEMIS
Código: W06IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A ACAROS ACARUS SIRO
Código: D70IGG4
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A ACAROS DERMATOPHAGOIDES FARINAE
Código: D02IGG4
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A ACAROS DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS
Código: D01IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A ACAROS DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A ACAROS LEPIDOGLYPHUS DESTRUCTOR
Código:	D71IGG4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A ACAROS THYROPHAGUS PUTRESCENTIAE
Código:	D72IGG4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A AEDES COMMUNIS (MOSQUITO COMUN)
Código:	I71IGG4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A ALERGENOS OCUPACIONALES ANHIDRIDO FTALICO
Código:	K79IGG4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A ALERGENOS OCUPACIONALES ISOCIANATO MDI
Código:	K76IGG4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A ALIMENTOS CACAHUETE
Código: F13IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A ALIMENTOS CLARA DE HUEVO
Código: F01IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A ALIMENTOS GLUTEN
Código: F79IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A ALIMENTOS SOJA GRANO
Código: F14IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A ALIMENTOS TRIGO
Código: F04IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A ALIMENTOS YEMA DE HUEVO
Código: F75IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A ALIMENTOS YEMA DE HUEVO
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A ALIMENTOS ZANAHORIA
Código:	F31IGG4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A ALTERNARIA ALTERNATA (A. TENUIS)
Código:	M06IGG4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A ANIMALES CASPA DE GATO
Código:	E01IGG4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A ANIMALES CASPA DE PERRO
Código:	E05IGG4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A ANIMALES EPITELIO DE CONEJO
Código:	E82IGG4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A ANIMALES EPITELIO DE RATA
Código: E73IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A ANIMALES EPITELIO RATON
Código: E71IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A ANIMALES EXCREMENTOS DE PERIQUITO
Código: E77IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A ANIMALES PLUMAS DE PERIQUITO
Código: E78IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A ARBOLES CORYLUS AVELLANA (AVELLANO)
Código: T04IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A ARBOLES CUPRESSUS ARIZONICA
Código: T222IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A ARBOLES CUPRESSUS ARIZONICA
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A ARBOLES CUPRESSUS SEMPERVIRENS
Código:	T23IGG4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A ARBOLES FRAXINUS AMERICANA (FRESNO AM
Código:	T15IGG4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A ARBOLES OLEA EUROPAEA (OLIVO)
Código:	T09IGG4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A ARBOLES PINUS STROBUS (PINO)
Código:	T16IGG4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A ARBOLES QUERCUS ALBA (ROBLE,ENCINA)
Código:	T07IGG4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A ARBOLES ULMUS AMERICANA (OLMO)
Código:	T08IGG4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A BETA-LACTOGLOBULINA (LECHE DE VACA)
Código:	F77IGG4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A CANDIDA ALBICANS
Código:	M05IGG4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A CLADOSPORIUM HERBARUM (HORMODENDR
Código:	M02IGG4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A ENTEROTOXINA B STAPHILOC.
Código:	M81IGG4
Técnica:	Fluorinmunoanálisis (Cap System)
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A ENTEROTOXINA C STAPHILOC
Código:	M223IGG4
Técnica:	Fluoroanalisis (Cap System)
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A ENTEROTOXINA C STAPHILOC
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A FESTUCA ELATIOR (CAÑUELA,FE
Código:	G04IGG4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A FUSARIUM MONILIFORME
Código:	M09IGG4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A GRAMINEAS CYNODON DACTYLON (GRAMA MAY
Código:	G02IGG4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A HERBACEAS CHENOPODIUM ALBUM (CEÑIGO)
Código:	W10IGG4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A HERBACEAS PARIETARIA JUDAICA (PARIETA
Código:	W21IGG4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A HERBACEAS PARIETARIA OFFICINALIS (PAR
Código:	W19IGG4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A HERBACEAS PLANTAGO LANCEOLATA (LLANTE
Código:	W09IGG4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A LOLIUM PERENNE (BALLICO)
Código:	G05IGG4
Técnica:	CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A MEDICAMENTOS PENICILINA G
Código:	C1IGG4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A MEDICAMENTOS PENICILINA V
Código:	C2IGG4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A MOHOS MEZCLA (m1, m2, m3, m6)
Código:	MX1G
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A MOHOS MEZCLA (m1, m2, m3, m6)
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero Alternativa: Plasma de edta
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A MOHOS RHIZOPUS NIGRICANS
Código:	M11IGG4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS ASPERGILLUS FUMIGATUS
Código:	M03IGG4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS TRICHODERMA VIRIDE
Código:	M15IGG4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A MUCOR RACEMOSUS
Código:	M04IGG4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A NATIVO nOle e 7 (LTP) Olivo
Código:	T227RG4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A OVOALBUMINA
Código: RF232IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A OVOMUCOIDE
Código: RF233IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A PENICILLIUM NOTATUM
Código: M01IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A PERA
Código: F94IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A PHLEUM PRATENSE (HIERBA TIM
Código: G06IGG4
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4 ESPECIFICA A PISTACHO
Código: RF203IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A PISTACHO
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A PLATANO
Código:	F92IGG4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A POA PRATENSIS (ESPIGUILLA)
Código:	G08IGG4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A POLISTES SPP. (VENENO DE AVISPA)
Código:	I04IGG4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A RECOMBINANTE rOle e 1Polen Olivo
Código:	RT224G4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A RECOMBINANTE rOle e 9 (Glucanasa) Olivo
Código:	T240G4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A RECOMBINANTE rPhl p 1 Polen Hierba Timotea
Código:	RG205G4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	suero
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A RECOMBINANTE rPhl p 11 Hierba timotea
Código:	G211RG4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A RECOMBINANTE rPhl p 6 Polen Hierba Timotea
Código:	RG209G4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A RECOMBINANTE rPhl p2 Polen Hierba Timotea
Código:	RG206G4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	suero
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A RECOMBINANTE rPhl p5b Polen Hierba Timotea
Código:	RG215G4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A rPru p3 (LTP) MELOCOTON
Código:	F420IGG4
Técnica:	CAP SYSTEM-FLUOROINMUNOANÁLISIS
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A rPru p3 (LTP) MELOCOTON
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A SALMON
Código:	F41IGG4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A STEMPHYLIUM BOTRYOSUM
Código:	M10IGG4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A TRIGO (Triticum sativum)
Código:	G15IGG4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A UVA
Código:	RF259IGG4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A VESPULA SPP (VENENO DE AVISPA)
Código:	I03IGG4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA MEZCLA GX1(G3,G4,G5,G6,G8)
Código:	GX1G4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA NUEZ DE NOGAL
Código:	RF256IGG4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA Pólen de Hierba timotea (nPhl p4)
Código:	RG208G4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	suero
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA rCan f 5 Esterasa arginina perro
Código:	E226IGG4
Técnica:	
Unidades:	KU/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA RECOMBINANTE rPhl p 12 H.timotea
Código:	RG212G4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA RECOMBINANTE rPhl p 12 H.timotea
Código:	RG212G4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA RECOMBINANTE rPhl p 12 H.timotea
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA RECOMBINATE rcan f1 Canis familiaris Perro
Código:	E101IGG4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 ESPECIFICA A RECOMBINANTE rPhl p 7 Polen Hierba Timotea
Código:	RG210G4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 RAST A ALIMENTOS ATUN
Código:	F40IGG4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 RAST A ALIMENTOS BACALAO
Código:	F03IGG4
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	IGG4 RAST A ALIMENTOS LENGUADO
Código:	F337IGG4
Técnica:	
Unidades:	mg/l
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción: IGG4 RAST A ALIMENTOS MERLUZA
Código: RF307IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4ESPECIFICA A APIS MELLIFERA (VENENO DE ABEJA)
Código: I01IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4ESPECÍFICA A ANCHOA (BOQUERON)
Código: RF313IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGG4ESPECIFICA A SECALE CEREALE (CENTENO)
Código: G12IGG4
Técnica:
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGGESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS ALTERNARIA ALTERNATA
Código: M06IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGGESPECIFICA A POLENES DE OLEA EUROPAEA (OLIVO)
Código: T09IGG
Técnica: CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades: mg/L
Plazo: 5 días

Descripción: IGGESPECIFICA A POLENES DE OLEA EUROPAEA (OLIVO)
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: IGLON5 ANTICUERPOS LCR
Código: IGLON5LCR
Técnica: Inmunofluorescencia Indirecta (Células transfectadas)
Unidades:
Plazo: 32 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia: Título < 1:2 Negativo
Título > 1:2 Positivo

Descripción: IGLON5 ANTICUERPOS SUERO
Código: IGLON5
Técnica: Inmunofluorescencia Indirecta en células transfectadas
Unidades:
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero: refrigerar.
Valores de referencia: Valor de referencia indicativo: No se detecta

---

Descripción: IL28B rs8099917 SNP ligado a respuesta a peg-INF/RBV
Código: IL28B_SNP
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Código: IMIPRA
Descripción: IMIPRAMINA MAS DESIPRAMINA
Técnica: Cromatografía líquida /tanden masas (LC-MS/MS)
Comentario adicional: 2 mL suero

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	DESIPRA	3531-1		DESIPRAMINA (Perfil)	ng/mL	
Prueba	IMIDESI	9627-1		IMIPRAMINA (Perfil)	ng/mL	(150 - 250) Suma (Sup. 500) Tóxico - Suma

---

Descripción: INDICE ANDROGENICO LIBRE (TESTOSTERONA/SHBG)
Código: IANDROGELI
Técnica: Cálculo
Unidades:

Descripción:	INDICE ANDROGENICO LIBRE (TESTOSTERONA/SHBG)
Plazo:	2 días
Tubo:	
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(0.7 - 8.7) Mujer 21 años - 49 años Premenopausia (0.5 - 4.7) Mujer > 50 años Postmenopausia (24.5 - 113.3) Hombre 21 años - 49 años (19.3 - 118.4) Hombre > 50 años

Descripción:	INDICE DE CALCIO/CREATININA EN ORINA
Código:	ICA2_CREA2
Técnica:	Fórmula
Unidades:	mg/mg
Plazo:	3 días
Tubo:	Orina Bioquímica
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(0.032 - 0.19)

Descripción:	INDICE DE EXCRECION DE CALCIO
Código:	IEXCRECA2
Técnica:	
Unidades:	mg/dL de F.G.
Plazo:	3 días
Tubo:	Orina Bioquímica
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(0.07 - 0.17)

Descripción:	INDICE DE RETICULOCITOS INMADUROS
Código:	IRF
Técnica:	Citometría de flujo
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Sangre EDTA
Comentario adicional:	5 ml sangre total EDTA. Rogamos envio inmediato, evitar extracción viernes.
Valores de referencia:	(Inf. 0.3) (Sup. 0.3) Reti. inmaduros

Descripción:	INDICE DE RIESGO DEFECTOS ABIERTOS DEL TUBO NEURAL
Código:	INEURAL
Técnica:	Fórmula
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	INDICE RIESGO PRENATAL SEGUNDO TRIMESTRE
Valores de referencia:	

Código:	IRIESGO1
Descripción:	INDICE DE RIESGO PRIMER TRIMESTRE
Técnica:	
Comentario adicional:	

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	PAPP.A	32046-5		PROTEINA PLASMATICA A ASOCIADA A LA GESTACION	mUI/mL	0.28 mUI/mL-Embarazo-8 semanas 0.47 mUI/mL-Embarazo-9 semanas 0.90 mUI/mL-Embarazo-10 semanas 1.58 mUI/mL-Embarazo-11 semanas 2.51 mUI/mL-Embarazo-12 semanas 3.68 mUI/mL-Embarazo-13 semanas
Prueba	BETAHCGL	25373-2		HCG-BETA LIBRE SUERO	ng/mL	55.13 ng/ml -Embarazo - 8 semanas 72.55 ng/ml -Embarazo - 9 semanas 60.67 ng/ml-Embarazo - 10 semanas 44.54 ng/ml -Embarazo - 11 semanas 34.33 ng/ml-Embarazo - 12 semanas 28.82 ng/ml-Embarazo - 13 semanas
Prueba	INDIRIES1	43995-0		INDICE DE RIESGO PRIMER TRIMESTRE		
Prueba	SEMGEST			SEMANAS DE GESTACION	sem.gestación	
Prueba	PESOCORPO			PESO CORPORAL	kg	
Prueba	ALTURA			ALTURA	cm	
Prueba	EMBARAZOTI			TIPO DE EMBARAZO		
Prueba	F.U.R.			FECHA ULTIMA REGLA		
Prueba	FUMADORA			FUMADORA		
Prueba	DIABETES			DIABETES EMBARAZADA		
Prueba	CRIBADOTIP			CRIBADO TIPO		
Prueba	FECHAECO			FECHA ECOGRAFIA SEMANA 12		
Prueba	CRL			CRL LONGITUD CRANEO CAUDAL	mm	
Prueba	TN			TRANSLUCENCIA NUCAL	mm	
Prueba	HUESONASAL			HUESO NASAL AUSENTE		
Prueba	RAZA			RAZA		
Prueba	NFETOS			NUMERO DE FETOS		

Descripción: INDICE DE RIESGO PRIMER TRIMESTRE
Código: INDIRIES1
Técnica: Fórmula
Unidades:
Plazo: 7 días

Descripción: INDICE DE RIESGO PRIMER TRIMESTRE
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Edad gestacional menor de 14 semanas
Valores de referencia:

Código: PHIPROPSA
Descripción: Indice de salud prostatica- PHI (proPSA),Suero
Técnica:
Comentario adicional: 1 mL de suero
El suero debe centrifugarse y separarse antes de 3 horas despues de la toma de la muestra.
Congelar

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	PHIPSA	2857-1		Perfil Indice de Salud Prostático PSA	ng/mL	(Inf. 4)
Prueba	PHIPSALIBR	10886-0		Perfil Indice de Salud Prostático PSA-Libre	ng/mL	
Prueba	PHIPSAPRO	97149-9		Perfil indice de salud prostático [-2] proPSA	pg/mL	
Prueba	INDICEPHI	97150-7		Perfil Indice de Salud Prostático resultado	Indice	(Inf. 20.99) Riesgo Bajo (21 - 40) Riesgo Moderado (Sup. 40) Riesgo Alto

---

Descripción: INDICE DE SATURACION DE TRANSFERRINA
Código: ISATUFE
Técnica: Cálculo
Unidades: %
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (16 - 45)

Descripción: INDICE DE TIBBLING RESULTADO
Código: RESINTIBB
Técnica: Fórmula
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo:
Comentario adicional: 1 ml suero
1 ml LCR
Valores de referencia: (Inf. 0.80)

Descripción: INDICE DE TIROXINA LIBRE
Código: ITIROXLIBR
Técnica: Inmunoanálisis
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal

Descripción: INDICE DE TIROXINA LIBRE
Comentario adicional: 1 ml suero. Refrigerar.
Valores de referencia: (4.2 - 14.3)

Descripción: INDICE OMEGA 3 SANGRE TOTAL
Código: IOM32AG
Técnica: Cromatografía de Gases / Ionización de Llama.
Unidades: %
Plazo: 13 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: 1 TUBO DE EDTA SANGRE TOTAL, Tubo protegido de la luz
Volumen mínimo: 1,00 mL
Conservación:Refrigerar
Ayuno de 4 horas
Valores de referencia: (8 - 12)

Código: IRIESGO2
Descripción: INDICE RIESGO PRENATAL SEGUNDO TRIMESTRE
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	SEMGEST			SEMANAS DE GESTACION	sem.gestación	
Prueba	BETAHCGL	25373-2		HCG-BETA LIBRE SUERO	ng/mL	55.13 ng/ml -Embarazo - 8 semanas 72.55 ng/ml -Embarazo - 9 semanas 60.67 ng/ml-Embarazo - 10 semanas 44.54 ng/ml -Embarazo - 11 semanas 34.33 ng/ml-Embarazo - 12 semanas 28.82 ng/ml-Embarazo - 13 semanas
Perfil	A1FETO			ALFA-1-FETOPROTEINA SUERO		
Perfil	NEURAL			INDICE DE RIESGO PARA DEFECTOS		
Prueba	RAZA			RAZA		
Prueba	PESOCORPO			PESO CORPORAL	kg	
Prueba	ALTURA			ALTURA	cm	
Prueba	NFETOS			NUMERO DE FETOS		
Prueba	EMBARAZOTI			TIPO DE EMBARAZO		
Prueba	F.U.R.			FECHA ULTIMA REGLA		
Prueba	FUMADORA			FUMADORA		
Prueba	DIABETES			DIABETES EMBARAZADA		

Componentes						
Prueba	CRIBADOTIP			CRIBADO TIPO		
Prueba	FECHAECO			FECHA ECOGRAFIA SEMANA 12		
Prueba	CRL			CRL LONGITUD CRANEO CAUDAL	mm	

Código: ROMA
Descripción: INDICE ROMA
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	CA125	83082-8		CA 125 II SUERO	UI/mL	(Inf. 35)
Prueba	HE4	55180-4		HE4 (PROTEINA EPIDIDIMAL HUMANA)	pmol/L	(Inf. 70) Mujer > 14 años Premenopausia (Inf. 140) Mujer > 14 años Postmenopausia
Prueba	ROMAPRE	69569-2		INDICE ROMA PREMENOPAUSICA	%	(Inf. 7.4) Bajo Riesgo (Sup. 7.4) Alto Riesgo
Prueba	ROMAPOST	69570-0		INDICE ROMA POSTMENOPAUSICA	%	(Inf. 25.3) Bajo Riesgo (Sup. 25.3) Alto Riesgo

Descripción: INDICE TESTOSTERONA/EPITESTOSTERONA EN ORINA
Código: EPITESTOS
Técnica: cromatografía de gases -espectrometría de masas
Unidades: Índice
Plazo: 23 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 20 mL orina (micción aislada)
Valores de referencia: (Inf. 4) ;Observaciones: WADA Agosto 2004. Con la técnica utilizada se obtiene un resultado orientativo, sin validez legal.

Descripción: INESTABILIDAD DE MICROSATÉLITES (MSI) · A. FRAGMENTOS
Código: INEST_MICR
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Tejido tumoral y EDTA
ROTULAR:ONCO
Tejido parafinado. Tª ambiente

Descripción: INESTABILIDAD DE MICROSATÉLITES (MSI) · A. FRAGMENTOS
Valores de referencia:

Código: INFLIXIMAB
Descripción: INFLIXIMAB NIVELES SUERO Y AC. ANTI INFLIXIMAB
Técnica: FIA
Comentario adicional: 1 mL Suero. Toma de muestra antes de la administración de la próxima dosis. Alternativa: Plasma

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	INFLIANTIC	90780-8		PERFIL INFLIXIMAB AC. SUERO	AU/mL	(Inf. 10) No se detectan
Prueba	INFLINIVE	86896-8		PERFIL INFLIXIMAB NIVELES SUERO	µg/mL	Límite de cuantificación 0.20 µg/mL. Los rangos óptimos terapeúticos son específicos de la enfermedad.

Descripción: INFLUENZA A ANTICUERPOS IGG
Código: INFLUAACG
Técnica: Técnica CLIA
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 0.90) Negativo
(0.91 - 1.10) Indeterminado
(Sup. 1.11) Positivo

Descripción: INFLUENZA A ANTICUERPOS IGG EN LCR
Código: INFLUAALCR
Técnica: Enzimoimunoanálisis
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 mL LCR. Se recomienda efectuar análisis simultáneo en suero y LCR
Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo
(Sup. 1) Positivo

Descripción: INFLUENZA A ANTICUERPOS IGM
Código: INFLUAACM
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: NTU
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml suero. Alternativo 1 ml de plasma de citrato sódico, y de heparina Litio.
Valores de referencia: (Inf. 9) Negativo

Descripción: INFLUENZA A Y B VIRUS GRIPE POR PCR
Código: GRIPEAH1N1
Técnica: RT-PCR

Descripción: INFLUENZA A Y B VIRUS GRIPE POR PCR
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: 1ml Aspirado bronquial-REFRIGERAR
1ml Exudado nasal (escobillón con medio de transporte para virus)-REFRIGERAR
1ml Lavado broncoalveolar-REFRIGERAR
Frotis nasofaríngeo (escobillón con medio de transporte de virus9-REFRIGERAR
Valores de referencia:

Descripción: INFLUENZA B ANTICUERPOS IGG
Código: INFLUBACG
Técnica: Técnica CLIA
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 0.90) Negativo
(0.91 - 1.10) Indetermiado
(Sup. 1.11) Positivo

Descripción: INFLUENZA B ANTICUERPOS IGM
Código: INFLUBACM
Técnica: Técnica EIA
Unidades: NTU
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml suero. Alternativo 1 ml de plasma de citrato sódico, y de heparina Litio.
Valores de referencia: (Inf. 9) Negativo

Descripción: Informe compatibilidad genética (matching)-con coste
Código: INF_COMPAT
Técnica:
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: No requiere muestra adicional. Informe realizado a partir de los resultados de 2 test de compatibilidad genética (test de portadores)
Valores de referencia:

Descripción: Informe extra de ensayos clínicos
Código: ONCOTRIALS
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional: NO necesita muestra, solo TRF e informe
Contactar con Asesoria Genética para procedimiento
Valores de referencia:

Descripción: INHIBIDOR ACTIVIDAD TISULAR DEL PLASMINOGENO (PAI)
Código: PLASMIINHI

Descripción:	INHIBIDOR ACTIVIDAD TISULAR DEL PLASMINOGENO (PAI)
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	ng/mL
Plazo:	9 días
Tubo:	Plasma de Citrato congelado
Comentario adicional:	1 mL plasma (citrato) pobre en plaquetas (doble centrifugación a 2500 g/15min.) Aspirar parte superior. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO Volumen mínimo 0.90 mL
Valores de referencia:	(4 - 43)

Descripción:	INHIBIDORES DEL FACTOR XII EN PLASMA
Código:	INHIFXII
Técnica:	Téc. coagulométrico
Unidades:	U Bethesda
Plazo:	10 días
Tubo:	Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:	1 mL Plasma de Citrato Sódico (Congelado). Enviar congelado.
Valores de referencia:	Negativo

Descripción:	INHIBIDORES ESPECIFICOS FRENTE AL FACTOR IX EN PLASMA
Código:	INHIFIX
Técnica:	Téc. coagulométrica
Unidades:	U Bethesda
Plazo:	9 días
Tubo:	Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:	1 mL plasma citrato pobre en plaquetas (doble centrifugacion 2500g/15 min) y congelar
Valores de referencia:	(Inf. 0.5)

Descripción:	INHIBIDORES ESPECIFICOS FRENTE AL FACTOR VIII EN PLASMA
Código:	INHIFVIII
Técnica:	Coagulométrica
Unidades:	U. Bethesda
Plazo:	7 días
Tubo:	Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:	2 mL plasma (citrato) pobre en plaquetas (doble centrifugación a 2500 g/15 min.) Aspirar parte superior. CONGELAR INMEDIATAMENTE Y ENVIAR CONGELADO
Valores de referencia:	La línea de corte mediante esta técnica se establece en 0.5 Unidades Bethesda

Descripción:	INHIBIDORES FRENTE AL FACTOR XI (PLASMA)
Código:	INHIFXI
Técnica:	Téc. coagulométrica
Unidades:	U Bethesda
Plazo:	7 días
Tubo:	Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:	1 mL plasma citrato pobre en plaquetas (doble centrifugacion 2500g/15 min) y congelar
Valores de referencia:	(Inf. 0.5) Negativo

Descripción:	Inhibina A
Código:	INIBINAA

Descripción:	Inhibina A
Técnica:	Quimioluminiscencia
Unidades:	pg/mL
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL de suero Volumen mínimo 0.50 mL
Valores de referencia:	(Inf. 2) Hombre (1.80 - 90.30) Mujer Fase folicular (2.70 - 97.50) Mujer Fase luteal (16.90 - 91.80) Mujer Medio del ciclo (Inf. 2.10) Mujer Menopausia

Descripción:	INHIBINA B DIMERICA
Código:	INHIBDIM
Técnica:	EIA
Unidades:	pg/mL
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero
Valores de referencia:	(25 - 325) Hombre (Inf. 341) Mujer (Inf. 273) Mujer Tercer día del ciclo (Inf. 5.8) Mujer Postmenopausia (Inf. 352) Niño (Inf. 83) Niña

Descripción:	INMUNOBLOT ANTICUERPOS IGG EPSTEIN BARR
Código:	EPSTBLOT
Técnica:	Inmunoblot
Unidades:	
Plazo:	12 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero.
Valores de referencia:	

Descripción:	INMUNOCOMPLEJOS CIRCULANTES SUERO
Código:	INMUNOCOM
Técnica:	EIA
Unidades:	mcg Eq/L
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1ml
Valores de referencia:	Inferior a 4.4 Negativo 4.4 - 10.8 Indeterminado Superior a 10.8 Positivo

Descripción:	Inmunodeficiencia combinada severa. Panel
Código:	GEN_000484
Técnica:	

Descripción: Inmunodeficiencia combinada severa. Panel
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Inmunodeficiencia común variable. Panel NGS
Código: GEN_000485
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Inmunodeficiencia ligada X déficit magnesio neoplasia. MAGT1
Código: GEN_000486
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Inmunodeficiencia. Panel NGS
Código: GEN_000487
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Inmunodeficiencias primarias. Panel NGS
Código: GEN_000488
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: INMUNOELECTROFORESIS ORINA (INMUNOFIJACION)
Código: INMUNO2
Técnica: Inmunoelectroforesis
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: ORINA INMUNOLOGIA
Comentario adicional: 25 mL orina 24 h

Descripción: INMUNOELECTROFORESIS ORINA (INMUNOFIJACION)
Valores de referencia:

Descripción: INMUNOELECTROFORESIS SUERO (INMUNOFIJACION)
Código: INMUNO
Técnica: Inmunofijacion
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1ml
Valores de referencia:

Código: TIPA_DEFIC
Descripción: INMUNOFENOTIPO DE INMUNODEFICIENCIA
Técnica:
Comentario adicional: 1 tubo de EDTA de 5ml

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Perfil	TMEMORIA			CELULAS NAIVE Y MEMORIA T CD45RO/RA		
Perfil	SUB_B			SUBPOBLACIONES LINFOIDES B		

Código: TIPA_DEFIC
Descripción: INMUNOFENOTIPO DE INMUNODEFICIENCIA
Técnica:
Comentario adicional: 1 tubo de EDTA de 5ml

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Perfil	TMEMORIA			CELULAS NAIVE Y MEMORIA T CD45RO/RA		
Perfil	SUB_B			SUBPOBLACIONES LINFOIDES B		

Descripción: INMUNOFENOTIPO DE LEUCEMIA AGUDA
Código: TIPA_AGUDA
Técnica: Citometria de flujo
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 1 tubo de EDTA de 5ml
Valores de referencia:

Descripción: INMUNOFENOTIPO DE MASTOCITOSIS SISTÉMICA
Código: TIPA_MASTO
Técnica: Citometría de flujo
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia

Descripción:	INMUNOFENOTIPO DE MASTOCITOSIS SISTÉMICA
Comentario adicional:	1 tubo de EDTA de 5ml
Valores de referencia:	

Descripción:	INMUNOFENOTIPO DE MONOCITOS
Código:	TIPA_MONOS
Técnica:	Citometria de flujo
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	1 tubo de EDTA de 5ml
Valores de referencia:	

Descripción:	INMUNOFENOTIPO DE NEUTROPENIA
Código:	TIPA_NEUTR
Técnica:	Citometria de flujo
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	1 tubo de EDTA de 5ml
Valores de referencia:	

Descripción:	INMUNOFENOTIPO DE SINDROME MIELODISPLÁSICO
Código:	TIPAJE_SMD
Técnica:	Citometría de flujo
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	1 tubo de EDTA de 5ml
Valores de referencia:	

Descripción:	INMUNOFENOTIPO HEMOGLOBINURIA PAROXÍSTICA NOCTURNA
Código:	TIPAJE_HPN
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	1 tubo de EDTA de 5ml
Valores de referencia:	

Descripción:	INMUNOFENOTIPO LEUCOCITARIO EN MEDULA OSEA
Código:	TIPALEUMO
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Sangre EDTA
Comentario adicional:	Medula ósea recogida en tubo de EDTA
Valores de referencia:	

Descripción: INMUNOFENOTIPO LIQUIDO CEFALORRAQUÍDEO / LCR
Código: TIPAJE_LCR
Técnica:
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 tubo seco
Valores de referencia:

Descripción: INMUNOFENOTIPO MICOSIS FUNGOIDE SEZARY PAPULOSIS LINFO
Código: TIPA_SEZAR
Técnica: Citometría de flujo
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 1 tubo de EDTA de 5ml
Valores de referencia:

Descripción: INMUNOFENOTIPO MICOSIS FUNGOIDE SEZARY PAPULOSIS LINFO
Código: TIPA_SEZAR
Técnica: Citometría de flujo
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 1 tubo de EDTA de 5ml
Valores de referencia:

Descripción: INMUNOFENOTIPO MICOSIS FUNGOIDE SEZARY PAPULOSIS LINFO
Código: TIPA_SEZAR
Técnica: Citometría de flujo
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 1 tubo de EDTA de 5ml
Valores de referencia:

Descripción: INMUNOFENOTIPO MICOSIS FUNGOIDE SEZARY PAPULOSIS LINFO
Código: TIPA_SEZAR
Técnica: Citometría de flujo
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 1 tubo de EDTA de 5ml
Valores de referencia:

Descripción: INMUNOFENOTIPO MICOSIS FUNGOIDE SEZARY PAPULOSIS LINFO
Código: TIPA_SEZAR
Técnica: Citometría de flujo
Unidades:
Plazo: 4 días

Descripción:	INMUNOFENOTIPO MICOSIS FUNGOIDE SEZARY PAPULOSIS LINFO
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	1 tubo de EDTA de 5ml
Valores de referencia:	

Descripción:	INMUNOFENOTIPO MICOSIS FUNGOIDE SEZARY PAPULOSIS LINFO
Código:	TIPA_SEZAR
Técnica:	Citometría de flujo
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	1 tubo de EDTA de 5ml
Valores de referencia:	

Descripción:	INMUNOFENOTIPO MIELOMA MULTIPLE / GAMMAPATÍA MONOCLONAL
Código:	TIPAJE_MM
Técnica:	Citometria de flujo
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	1 tubo de EDTA de 5ml
Valores de referencia:	

Descripción:	INMUNOFENOTIPO SINDROME LINFOPROLIFERATIVO EN MÉDULA ÓSEA
Código:	TIPA_LNHMO
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	1 tubo de EDTA de 5ml
Valores de referencia:	

Descripción:	INMUNOFENOTIPO SINDROME LINFOPROLIFERATIVO EN SANGRE
Código:	TIPA_LNHSP
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	1 tubo de EDTA de 5ml
Valores de referencia:	

Descripción:	INMUNOFIJACION IgD SUERO
Código:	IGDINMFIJ
Técnica:	Inmunofijación
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml Suero.
Valores de referencia:	

Descripción:	Inmunoglobulina A (IgA)secretora en Heces
Código:	IGAHECES
Técnica:	
Unidades:	µg/ml
Plazo:	15 días
Tubo:	Heces No Microbiología
Comentario adicional:	2 g Heces (Congelado)
Valores de referencia:	(510 - 2040)

Descripción:	INMUNOGLOBULINA IGA
Código:	IGA
Técnica:	Turbidimetría
Unidades:	mg/dL
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 mL suero Alternativa plasma de EDTA/heparina.
Valores de referencia:	(70 - 400) > 12 años (Inf. 50) < 1 mes (Inf. 80) 1 mes - 9 meses (15 - 90) 9 meses - 12 meses (15 - 110) 1 año - 2 años (18 - 150) 2 años - 3 años (25 - 160) 3 años - 5 años (35 - 200) 5 años - 8 años (45 - 250) 8 años - 12 años

Descripción:	INMUNOGLOBULINA IGA EN LCR
Código:	IGALCR
Técnica:	Nefelometria
Unidades:	mg/dL
Plazo:	3 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1ml LCR
Valores de referencia:	(Inf. 0.6)

Descripción:	Inmunoglobulina IgA en orina
Código:	IGA2O
Técnica:	Nefelometria-Turbidimetria
Unidades:	mg/24 h
Plazo:	4 días
Tubo:	Orina 24 Horas
Comentario adicional:	5 ML ORINA DE 24 HORAS. Indicar volumen de orina 24 horas
Valores de referencia:	(Inf. 10)

Descripción:	INMUNOGLOBULINA IGD
Código:	IGD
Técnica:	Turbidimetria
Unidades:	mg/dL
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal

Descripción:	INMUNOGLOBULINA IGD
Comentario adicional:	suero Alternativa: Plasma (EDTA o Heparina)
Valores de referencia:	(Inf. 13.2)

Descripción:	INMUNOGLOBULINA IGE TOTAL
Código:	IGE
Técnica:	Técnica FEIA
Unidades:	kU/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	3 mL suero. Alternativa plasma de EDTA o heparina. Enviar muestra refrigerada hasta 7 días, sino, congelar inmediatamente.
Valores de referencia:	(Inf. 2.3) < 6 semanas (Inf. 4.1) 6 semanas - 3 meses (Inf. 7.3) 3 meses - 6 meses (Inf. 10) 6 meses - 9 meses (Inf. 13) 9 meses - 1 año (Inf. 23) 1 año - 2 años (Inf. 32) 2 años - 3 años (Inf. 40) 3 años - 4 años (Inf. 48) 4 años - 5 años (Inf. 56) 5 años - 6 años (Inf. 63) 6 años - 7 años (Inf. 71) 7 años - 8 años (Inf. 78) 8 años - 9 años (Inf. 85) 9 años - 10 años (Inf. 114) > 10 años

Descripción:	INMUNOGLOBULINA IGG
Código:	IGG
Técnica:	Turbidimetría
Unidades:	mg/dL
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 mL suero Alternativa plasma EDTA/ heparina.
Valores de referencia:	(700 - 1600) > 6 años (250 - 900) < 1 mes (200 - 700) 1 mes - 5 meses (220 - 900) 5 meses - 9 meses (290 - 1070) 9 meses - 12 meses (340 - 1200) 1 año - 2 años (420 - 1200) 2 años - 3 años (460 - 1240) 3 años - 6 años

Descripción:	INMUNOGLOBULINA IGG EN LCR
Código:	IGGENLCR
Técnica:	Nefelometria
Unidades:	mg/dL
Plazo:	4 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 ml LCR. Refrigerar
Valores de referencia:	(Inf. 3.4)

Descripción:	INMUNOGLOBULINA IGG EN LCR TIBBLING Y TOURTELLOTE
Código:	IGGLCR
Técnica:	Nefelometria, , Standard IFCC/BCR/CAP-CRM 470
Unidades:	mg/dL
Plazo:	3 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1ML DE SUERO Y 1 ML DE LCR. REFRIGERAR.
Valores de referencia:	(Inf. 3.4)

Descripción:	Inmunoglobulina IgG en orina
Código:	IGG2O
Técnica:	Nefelometria
Unidades:	mg/24 h
Plazo:	4 días
Tubo:	Orina 24 Horas
Comentario adicional:	5 ML ORINA DE 24 HORAS.Indicar volumen de 24 horas
Valores de referencia:	(Inf. 10)

Descripción:	INMUNOGLOBULINA IGG SUBCLASE 4 SUERO
Código:	IGG4
Técnica:	Turbidimetria
Unidades:	mg/dL
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. Alternativa Plasma.
Valores de referencia:	(0.5 - 78.4) < 2 años (1 - 53.7) 2 años - 4 años (1.8 - 112.5) 4 años - 6 años (0.4 - 99.2) 6 años - 8 años (1.9 - 93.2) 8 años - 10 años (1.6 - 115) 10 años - 12 años (3.7 - 136.0) 12 años - 14 años (11 - 157) 14 años - 18 años (3.92 - 86.4) > 18 años

Descripción:	INMUNOGLOBULINA IGM
Código:	IGM
Técnica:	Turbidimetría
Unidades:	mg/dL
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 mL suero Alternativa plasma EDTA/heparina.
Valores de referencia:	(40 - 230) > 12 años (20 - 200) < 12 años

Descripción:	INMUNOGLOBULINA IGM EN LCR
Código:	IGMLCR
Técnica:	nefelometria
Unidades:	mg/dL
Plazo:	3 días

Descripción: INMUNOGLOBULINA IGM EN LCR
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1ml
Valores de referencia: (Inf. 0.08)

Descripción: Inmunoglobulina IgM en orina
Código: IGM2O
Técnica: Nefelometria
Unidades: mg/24 h
Plazo: 4 días
Tubo: Orina 24 Horas
Comentario adicional: 5 ML ORINA DE 24 HORAS. Indicar volumen de orina 24 horas
Valores de referencia: (Inf. 10)

Descripción: INMUNOHISTOQUIMICA PDL1 22 C3
Código: PDL1_22C3
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo: TEJIDO PARAFINADO
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: INMUNOHISTOQUIMICA: CINTEC P16 HISTOLOGYC
Código: IHQHISTOLO
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo:
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Código: HISTOLOGYC
Descripción: INMUNOHISTOQUIMICA: CINTEC P16 HISTOLOGYC
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	IHQHISTOLO			INMUNOHISTOQUIMICA: CINTEC P16 HISTOLOGYC		
Prueba	DIAGNOST			DIAGNOST		
Prueba	PATOLOGO			PATOLOGO		
Prueba	NBIOP			Registro Biopsia		
Prueba	DMACRO			DMACRO		
Prueba	DMICRO			DMICRO		
Prueba	TBIOPSIA			Especimen		

Código: CITOLOGYC
Descripción: INMUNOHISTOQUIMICA: CINTECPLUS CITOLOGYC
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	IHQCITOLOG			INMUNOHISTOQUIMICA: CINTECPLUS CITOLOGYC		
Prueba	RESDIAG			Resumen Diagnóstico		
Prueba	CITOTECNIC			CITOTÉCNICO		
Prueba	PATO			PATÓLOGO		

Descripción: INMUNOHISTOQUIMICA: PDL-1
Código: IHQPDL1
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo:
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: INMUNOHISTOQUIMICA: PHOSPHO HISTONE 3
Código: PHHISTON3
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo:
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: INMUNOHISTOQUIMICA: PTEN
Código: PTEN
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo:
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: INMUNOHISTOQUIMICA: ROS1
Código: ROS1
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo:
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción:	INMUNOHISTOQUIMICA:HER2
Código:	HER2
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	
Tubo:	
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	INSULINA AC. SUERO
Código:	INSULIAC
Técnica:	ELISA
Unidades:	U/mL
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	SUERO.0.5 mL
Valores de referencia:	(Inf. 10.0) Negativo

Descripción:	INSULINA LIBRE, SUERO
Código:	INSLI
Técnica:	
Unidades:	mU/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(2.90 - 19.00)

Descripción:	INSULINA SUERO
Código:	INSULIN
Técnica:	Téc. ICMA
Unidades:	mcU/mL
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 mL suero
Valores de referencia:	(2 - 15)

Descripción:	INTERFERON GAMMA EN LCR
Código:	INTERFELCR
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	UI/mL
Plazo:	17 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 mL LCR
Valores de referencia:	(Inf. 0.30)

Descripción:	INTERFERON GAMMA EN LIQUIDO PLEURAL
Código:	INTERFLPE
Técnica:	Enzimoinmunoanalisis
Unidades:	UI/ml
Plazo:	10 días

Descripción:	INTERFERON GAMMA EN LIQUIDO PLEURAL
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 ml liquido pleural
Valores de referencia:	(Inf. 3.7) Valores compatibles con pleuritis no tuberculosa

Descripción:	INTERFERON GAMMA EN SUERO
Código:	INTERFGAMM
Técnica:	EIA
Unidades:	UI/mL
Plazo:	12 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	Suero congelado.
Valores de referencia:	(Inf. 0.58)

Descripción:	INTERLEUCINA 4 SUERO
Código:	IL4
Técnica:	EIA
Unidades:	pg/mL
Plazo:	17 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 ml de suero, congelado (Volumen mínimo 0.50 mL)
Valores de referencia:	(Inf. 38.7)

Descripción:	INTERLEUCINA -8(IL-8)
Código:	IL8
Técnica:	EIA
Unidades:	pg/mL
Plazo:	17 días
Tubo:	Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional:	1 mL de plasma (EDTA) CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO
Valores de referencia:	(Inf. 50)

Descripción:	INTERLEUCINA II RECEPTOR SOLUBLE (suero congelado)
Código:	INTERLII
Técnica:	Quimioluminiscencia
Unidades:	U/mL
Plazo:	17 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	Suero congelar Volumen mínimo 0.5 mL
Valores de referencia:	(158.00 - 623.00)

Descripción:	INTERLEUCINA-1(IL-1 beta)
Código:	IL1
Técnica:	CLIA
Unidades:	pg/mL
Plazo:	17 días
Tubo:	Suero Congelado

Descripción:	INTERLEUCINA-1(IL-1 beta)
Comentario adicional:	1 mL suero o plasma (EDTA) CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO
Valores de referencia:	(Inf. 24.2)

Descripción:	INTERLEUCINA-10 (IL-10)
Código:	IL10
Técnica:	CLIA
Unidades:	pg/mL
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 mL suero Volumen mínimo 0.5 mL Alternativa: Plasma Heparina sódica o Heparina Litio CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO
Valores de referencia:	(Inf. 5.90)

Descripción:	INTERLEUCINA-2 (IL-2)
Código:	IL2
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	pg/mL
Plazo:	17 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 mL suero. CONGELAR y ENVIAR CONGELADO Volume: 1.0 mL (volumen minimo: 0.50 mL
Valores de referencia:	(Inf. 9.1)

Descripción:	INTERLEUCINA-5
Código:	IL5
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis.
Unidades:	pg/mL
Plazo:	19 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 ml suero. Congelar y enviar congelado. Volumen 1.0 mL (MÍNIMO 0.50 mL)
Valores de referencia:	(Inf. 4.0)

Descripción:	INTERLEUCINA-6 (IL-6)
Código:	IL6
Técnica:	inmunoanálisis
Unidades:	pg/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 mL de suero.Congelar y enviar congelado. Alternativa: 1mL de plasma EDTA/Heparina.Congelar y enviar congelado.
Valores de referencia:	(Inf. 7)

Descripción:	INTERLEUCINA-6 (IL-6) MUESTRA
Código:	IL6MUESTRA
Técnica:	INMUNOANÁLISIS
Unidades:	pg/mL
Plazo:	5 días

Descripción: INTERLEUCINA-6 (IL-6) MUESTRA
Tubo:
Comentario adicional: Antes de enviar la muestra es necesario contactar con el laboratorio.
Valores de referencia:

Descripción: INTERLEUCIONA 17 EN SUERO
Código: IL17
Técnica:
Unidades: pg/mL
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 mL suero o plasma (EDTA). CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.
Valores de referencia: (Inf. 1.4)

Descripción: Intolerancia a la Fructosa: gen ALDOB (NGS)
Código: FRUCTOSMUT
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Intolerancia a la lactosa de adulto: gen MCM6 (NGS)
Código: MCM6_MUTS
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.
Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: ISLOTES DE LANGERHANS AC. SUERO (CELULAS BETA PANCREATICAS)
Código: ISLOTESAC
Técnica: ICMA
Unidades: UI/mL
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ML de suero
Valores de referencia: (Inf. 30)

Código: ISOCIANATO
Descripción: ISOCIANATOS EN ORINA METABOLITOS
Técnica: Cromatografía de gases-Espectrometría de masas
Comentario adicional: 10 ml orina (micción aislada) recogida inmediatamente después de la exposición. Orina final jornada. Refrigerar.
Volumen: 10.0 mL
Volumen mínimo: 2 mL

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	HDA	5010569		Perfil Isocianatos, 1,6-HEXAMETILEN DIAMINA	µg/g creat	(Inf. 15.0) Índice Biológico de Exposición orientativo (BAT) según DFG Personas expuestas (1,6-hexametilen diisocianato); Final de la jornada (VLB/ BAT-DFG)
Prueba	TDA2426	5017928		Perfil Isocianatos, 2,4-TDA+2.6-TDA	µg/g creat	(Inf. 5.0) Final jornada laboral en expuestos a TDI (orientativo) Índice Biológico de Exposición orientativo (BAT) según DFG
Prueba	MDA	27409-2		Perfil Isocianatos, 4,4-METILEN DIANILINA	µg/L	(Inf. 10) Valor Límite Biológico-VLB en personas expuestas a MDI (4,4-metilen difenilisocianato) Las aminas analizadas son metabolitos que aparecen en la orina de personas expuestas al diisocianato correspondiente (HDI, TDI, MDI) La relación entre concentración urinaria de HDA y TDA y efectos en la salud no está establecida, por lo que estos valores son útiles solamente como indicadores de nivel de exposición.

Código: LDHISO
Descripción: ISOENZIMAS DE LDH
Técnica: Electroforesis en agarosa
Comentario adicional: Suero. TA

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	LDH1	2536-1		LDH 1	%	(16.1 - 31.5)
Prueba	LDH2	2539-5		LDH 2	%	(29.2 - 41.6)
Prueba	LDH3	2542-9		LDH 3	%	(17 - 26.2)
Prueba	LDH4	2545-2		LDH 4	%	(5.9 - 12.3)
Prueba	LDH5	2548-6		LDH 5	%	(3.2 - 17.3)

Código: ISOHEMAGL
Descripción: ISOHEMAGLUTININAS perfil
Técnica: hemaglutinación

Código: ISOHEMAGL

Comentario adicional: Sangre total EDTA 5 mL Refrigerar
Alternativa: Suero 1 mL. refrigerarSangre total

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	ISOHEMAIGG			Isohemaglutininas anti A IgG		Interpretación según criterio clínico.
Prueba	ISOHEMAIGM			Isohemaglutininas anti A IgM		Interpretación según criterio clínico.
Prueba	ISOHEMBIGG			Isohemaglutininas anti B IgG		Interpretación según criterio clínico.
Prueba	ISOHEMBIGM			Isohemaglutininas anti B IgM		Interpretación según criterio clínico.

Descripción: ISONIAZIDA SUERO
Código: ISONIAZIDA
Técnica: Cromatografia líquida /Tanden masas (LC-MS/MS)
Unidades: mcg/mL
Plazo: 32 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 3 ml suero
Valores de referencia: (2 - 5) Valor terapéutico
(Sup. 20) Toxicidad
(2.6 - 3) Dosis 4mg/K Acetilador lento
(Sup. 3) Dosis 10mg/K Acetilador lento
(7.8 - 12) Dosis 15mg/K Acetilador lento
(Inf. 1.2) Dosis 4mg/K Acetilador rápido
(Inf. 2) Dosis 10mg/K Acetilador rápido
(2.5 - 4.9) Dosis 15mg/K Acetilador rápido

Descripción: Jo-1 AC. SUERO
Código: JO1AC
Técnica: Técnica Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: Negativo

Descripción: Johanson Blizzard, Sd. Sec Gen: UBR1
Código: GEN_000489
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Joubert /Nefronoptisis juvenil fam,Sd. Sec Gen: NPHP1
Código: GEN_000490

Descripción: Joubert /Nefronoptisis juvenil fam,Sd. Sec Gen: NPHP1
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Joubert, Sd. y patologías relacionadas. Panel NGS
Código: GEN_000491
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Kabuki, Sd. Panel NGS
Código: GEN_000492
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Kallmann, Sd. Panel NGS
Código: GEN_000493
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Kenny-Caffey, Sd. Sec Gen: TBCE
Código: GEN_000494
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: KETAMINA CONFIRMACION EN SALIVA
Código: KETASAL
Técnica: LC-MS/MS
Unidades: ng/mL
Plazo: 10 días
Tubo: Saliva

Descripción:	KETAMINA CONFIRMACION EN SALIVA
Comentario adicional:	Saliva recogida en kit ORAL-EZE. Solicitar kit en el almacén.
Valores de referencia:	

Descripción:	KETAMINA EN ORINA CONFIRMACION
Código:	KETAMIN
Técnica:	Cromatografia líquida - tándem masas LC-MS/MS
Unidades:	ng/mL
Plazo:	7 días
Tubo:	Orina Drogas de Abuso
Comentario adicional:	10 mL micción aislada. refrigerada
Valores de referencia:	Límite de cuantificación 25 ng/mL Incertidumbre de medida 5.1 ng/mL

Descripción:	KETAMINA Y NORKETAMINA EN ORINA
Código:	KETAMIN2
Técnica:	Inmunoensayo
Unidades:	
Plazo:	2 días
Tubo:	Orina Drogas de Abuso
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	Kindler, Sd. Sec Gen: FERMT1
Código:	GEN_000495
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Kingella kingae PCR Cualitativa
Código:	TOXKINGELL
Técnica:	Hibridación molecular con ampliación (PCR)
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	Muestra envios externos
Comentario adicional:	5 ml sangre (EDTA), suero, líquido sinovial...
Valores de referencia:	

Descripción:	KL-6 (KREBS VON DEN LUNGEN 6) SUERO
Código:	KL6
Técnica:	Inmunoanálisis
Unidades:	U/mL
Plazo:	32 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1mL de suero
Valores de referencia:	(Inf. 450) De manera orientativa hasta 450 U/mL

Descripción: Klippel-Feil tipo 1, Sd. Sec Gen: GDF6
Código: GEN_000496
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Krabbe, enfermedad de. Sec Gen: GALC
Código: GEN_000497
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: KS ANTICUERPOS(ASPARAGINIL-TRNA SINTETASA) EN SUERO
Código: KSAC
Técnica:
Unidades:
Plazo: 11 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero
Valores de referencia:

Descripción: Ku Ac. SUERO
Código: AC.KU
Técnica: tec. inmunoblot
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: Negativo

Descripción: LAB. CALDERON: Panel NGS Predisposición a Cáncer Hereditario
Código: CALDER_TOT
Técnica:
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún apataro, y rotulado con BM.
Valores de referencia:

Descripción: LACOSAMIDA SUERO
Código: LACOSAMIDA
Técnica: Cromatografía líquida / Espectrometría de masas tándem (LC-MS / MS)
Unidades: mg/L
Plazo: 7 días

Descripción:	LACOSAMIDA SUERO
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	0.5 mL suero SIN gel separador Conservación: CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO Volumen mínimo: 0.2 mL No utilizar tubos con gel separador.
Valores de referencia:	(1 - 10) Intervalo terapéutico (Inf. 0.5) Límite de cuantificación (Sup. 20) Toxicidad

Descripción:	LACTICO EN LCR
Código:	LACTLCR
Técnica:	Espectrometría
Unidades:	mg/dL
Plazo:	5 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1ml LCR
Valores de referencia:	(10.8 - 18.9)

Descripción:	LACTOFERRINA AC. SUERO
Código:	LACTOFEAC
Técnica:	Enzimoinmuanálisis
Unidades:	
Plazo:	12 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 mL de suero con gel separador Volumen mínimo: 0.3 mL
Valores de referencia:	(Inf. 1.00) Negativo (Sup. 1.00) Positivo

Descripción:	LACTOFERRINA EN HECES
Código:	LACTOFEHEC
Técnica:	INMUNOCROMATOGRÁFICA
Unidades:	
Plazo:	8 días
Tubo:	heces especiales
Comentario adicional:	2gr DE HECES, REFRIGERAR
Valores de referencia:	Valores de referencia: Negativo

Descripción:	LACTOGENO PLACENTARIO EN SUERO
Código:	HPL
Técnica:	ENZIMOINMUNOANÁLISIS
Unidades:	µg/mL
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml suero
Valores de referencia:	

Descripción:	LAMINA 332 ANTICUERPOS EN SUERO
Código:	LAMININ332

Descripción:	LAMINA 332 ANTICUERPOS EN SUERO
Técnica:	Cell Binding Assay, IFI
Unidades:	Titulo
Plazo:	24 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL de suero refrigerado
Valores de referencia:	Negativo <1/10

Descripción:	LAMOTRIGINA SUERO
Código:	LAMOTRIGIN
Técnica:	Cromatografía líquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)
Unidades:	mg/L
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	Tubo Suero Congelado SIN gel separador Volumen: 0.5ml de suero congelado. Volumen mínimo: 0.2mL de suero congelado 1 alicuota especifica para este análisis.
Valores de referencia:	(1 - 15) Intervalo terapéutico (Sup. 20) Toxicidad (Inf. 1) Límite de cuantificación

Descripción:	Laron, Sd. Sec Gen: GHR
Código:	GEN_000498
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	LATEX-FACTOR REUMATOIDE EN LIQUIDO PLEURAL
Código:	LIQPLATEX
Técnica:	Inmunoturbidimetria
Unidades:	UI/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 40)

Descripción:	LATEX-FR (FACTOR REUMATOIDE)
Código:	LATEXFR
Técnica:	Inmunoturbidimetria
Unidades:	UI/mL
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 mL suero. Alternativa: plasma de EDTA
Valores de referencia:	(Inf. 14)

Descripción:	LDH
Código:	LDH

Descripción:	LDH
Técnica:	Espectrofotometría
Unidades:	U/L a 37 ºC
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL. También se realiza en líquidos biológicos. Suero y plasma heparina
Valores de referencia:	(290 - 775) < 4 dias (545 - 2000) 4 dias - 10 dias (180 - 430) 10 dias - 2 años (110 - 295) 2 años - 12 años (Inf. 248) Hombre > 12 años (Inf. 247) Mujer > 12 años

Descripción:	LDH EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
Código:	LIQLCLDH
Técnica:	Espectrofotometría
Unidades:	U/L
Plazo:	
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	LDL OXIDADA, SUERO
Código:	LDLOXIDADA
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis.
Unidades:	ng/mL
Plazo:	12 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 mL Suero (-8 ºC - Congelar)
Valores de referencia:	(57.7 - 133.2) (77.7 - 144.6) DM tipo 2 sin HTA (92.5 - 192.2) DM tipo 2 (107.5 - 207.3) DM tipo 2 con HTA

Descripción:	LDL OXIDADAS ANTICUERPOS
Código:	LDLOXAC
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	Índice
Plazo:	17 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 mL Suero congelado
Valores de referencia:	(Inf. 1) Negativo

Descripción:	LDL-COLESTEROL
Código:	LDL
Técnica:	
Unidades:	mg/dL
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	

Descripción:	LDL-COLESTEROL
Valores de referencia:	(Inf. 116) Para pacientes con riesgo CV bajo (Inf. 100) Para pacientes con riesgo CV moderado (Inf. 70) Para pacientes con riesgo CV elevado (Inf. 55) Para pacientes con riesgo CV muy elevado

Descripción:	LEFLUNOMIDA
Código:	LEFLUNOMID
Técnica:	Cromatografia líquida - tándem masas (LC-MS/MS)
Unidades:	mg/L
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml suero
Valores de referencia:	(5.9 - 11.7) (A dosis de 5 mg) (8.4 - 27.6) (A dosis de 10 mg) (27 - 99) (A dosis de 25 mg)

Descripción:	LEGIONELLA PNEUMOPHILA AC TOTALES
Código:	LEGIOACTOT
Técnica:	CLIA
Unidades:	Indice
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 0.89) Negativo (0.90 - 1.10) Indeterminado (Sup. 1.11) Positivo

Descripción:	LEGIONELLA PNEUMOPHILA AC. IGM SUERO
Código:	LEGIONEACM
Técnica:	CLIA
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL. También se realiza en líquidos biológicos.(serogrupo 1)
Valores de referencia:	(Inf. 0.8) Negativo (0.8 - 1.1) Indeterminado (Sup. 1.1) Positivo

Descripción:	Legionella pneumophila DNA PCR Cualitativa
Código:	LEGIONEPCR
Técnica:	Deteccion DNA Hibridacion Molecular con Amplificacion (PCR) a Tiempo Real
Unidades:	
Plazo:	17 días
Tubo:	Muestra envios externos
Comentario adicional:	Muestra respiratoria. De manera alternativa 2 mL suero o 2 mL orina
Valores de referencia:	

Descripción:	Leigh, Sd. Panel NGS
Código:	GEN_000706
Técnica:	
Unidades:	

Descripción:	Leigh, Sd. Panel NGS
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	LEISHMANIA AC. IGM
Código:	LEISHMAIGM
Técnica:	Inmunofluorescencia Indirecta.
Unidades:	Titulo
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL.
Valores de referencia:	<1:100 Negativo = o >1:100 Positivo

Descripción:	Leishmania DNA PCR Cualitativa
Código:	LEISHMAPCR
Técnica:	PCR y secuenciación
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	1ml Médula ósea EDTA-CONGELAR 1ml Sangre total EDTA-CONGELAR Biopsia de piel (Suero fisiológico)-REFRIGERAR
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta

Descripción:	LEISHMANIA DONOVANI AC. IGG
Código:	LEISHDOIGG
Técnica:	Inmunofluorescencia Indirecta
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL de suero
Valores de referencia:	Se consideran niveles significativos los títulos iguales o superiores a 1:320

Descripción:	LEISHMANIOSIS AC. SUERO (LEISHMANIA INFANTUM)
Código:	LEISHMAAC
Técnica:	Técnica CLIA
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 0.89) Negativo (0.90 - 1.1) Indeterminado (Sup. 1.11) Positivo

Descripción:	Léntigo múltiple; Leopard, Sd. Panel NGS
Código:	GEN_000499
Técnica:	

Descripción:	Léntigo múltiple; Leopard, Sd. Panel NGS
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	LEPTINA SUERO
Código:	LEPTINA
Técnica:	Técnica ELISA
Unidades:	ng/mL
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ML SUERO refrigerado Alternativa: plasma heparina de litio.
Valores de referencia:	(Inf. 7.0) < 10 años (Inf. 8.3) > 10 años Para IMC (18-25) (Inf. 19.30) > 10 años Para IMC (25-30) (Inf. 32.0) > 10 años Para IMC >30 Los valores aumentan en función de la masa corporal. Se recomienda realizar determinaciones periódicas, ya que no es valorable una determinación aislada. El cálculo del IMC se realiza dividiendo el peso (kg) entre la altura (cm) al cuadrado.

Descripción:	LEPTOSPIRA SPP. ANTICUERPOS IGG
Código:	LEPTOSPACG
Técnica:	ELISA
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml suero refrigerado Alternativa: plasma heparina de litio
Valores de referencia:	(Inf. 9) Negativo (9 - 11) Indeterminado (Sup. 11) Positivo

Descripción:	LEPTOSPIROSIS ANTICUERPOS IGM
Código:	LEPTOSPACM
Técnica:	CLIA
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 0.9) Negativo (0.9 - 1.1) Indeterminado (Sup. 1.1) Positivo

Descripción:	Leri-Weill, Sd. Sec Gen: SHOX
Código:	GEN_000500
Técnica:	
Unidades:	

Descripción: Leri-Weill, Sd. Sec Gen: SHOX
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Lesch-Nyhan, Sd. Sec Gen: HPRT1
Código: GEN_000501
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: LEUCEMIA AGUDA MIELOIDE · CEBPA · SANGER
Código: CEBPA_MUTS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO.
IMPORTANTE: REFRIGERADO SIEMPRE

NO PINCHAR VIERNES NI VÍSPERAS DE FESTIVOS: la sangre se empieza a procesar dentro de las primeras 48 horas desde la extracción
Valores de referencia:

Descripción: LEUCEMIA AGUDA MIELOIDE · DNMT3A (R882) · HOT SPOT
Código: DNMT3A_MUT
Técnica: SANGER - HOT SPOT
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: 4 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refrigerar] (Estabilidad: 4°C:1 Meses)
o 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refrigerar] (Estabilidad: 4°C:1 Meses)
Valores de referencia:

Descripción: LEUCEMIA AGUDA MIELOIDE · NPM1 · A.FRAGMENTOS
Código: NPM1
Técnica:
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO.
IMPORTANTE: REFRIGERADO SIEMPRE

NO PINCHAR VIERNES NI VÍSPERAS DE FESTIVOS: la sangre se empieza a procesar dentro de las primeras 48 horas desde la extracción
Valores de referencia:

Descripción: LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA · FLT3/ITD y D835 · A.FRAGMENTOS
Código: FLT3

Descripción:	LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA · FLT3/ITD y D835 · A.FRAGMENTOS
Técnica:	PCR y secuenciación
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional:	Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO. IMPORTANTE: REFRIGERADO SIEMPRE
Valores de referencia:	

Descripción:	LEUCINAMINOPEPTIDASA (LAP)
Código:	LAP
Técnica:	Cinética
Unidades:	U/L a 37 ºC
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml de suero
Valores de referencia:	(18 - 49)

Descripción:	LEUCOCITOS EN EXUDADO
Código:	LIQEXULEU
Técnica:	Microscopía óptica
Unidades:	/µL
Plazo:	
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	Leucodistrofia de adulto: gen LMNB1 (NGS)
Código:	LMNB1_MUTS
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Leucodistrofias en adulto. Panel NGS (>10 genes)
Código:	GEN_000502
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Leucoencefalop. sust. blanca evanescente: gen EIF2B1 (NGS)
Código:	EIF2B1
Técnica:	PCR y secuenciación
Unidades:	

Descripción: Leucoencefalop. sust. blanca evanescente: gen EIF2B1 (NGS)
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Leucoencefalop. sust. blanca evanescente: gen EIF2B2 (NGS)
Código: EIF2B2
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Leucoencefalop. sust. blanca evanescente: gen EIF2B3 (NGS)
Código: EIF2B3
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Leucoencefalop. sust. blanca evanescente: gen EIF2B4 (NGS)
Código: EIF2B4
Técnica: NGS Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Leucoencefalop. sust. blanca evanescente: gen EIF2B5 (NGS)
Código: EIF2B5
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Leucoencefalopatía con sustancia blanca evanescente. Panel
Código: GEN_000503
Técnica:
Unidades:

Descripción:	Leucoencefalopatía con sustancia blanca evanescente. Panel
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Leucoencefalopatía. Panel NGS
Código:	GEN_000504
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	LEVETIRACETAM (KEPPRA)
Código:	LEVETIR
Técnica:	Enzimoinmunoensayo (EIA)
Unidades:	mg/L
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL Suero separado y alicuotado. Alicuota especifica para este análisis. Alternativa: Edta potásico, Heparina sodio, Heparina litio. Tomar la muestra en estado estable (nivel mínimo, antes de la administración) para garantizar una correcta monitorización terapeútica del levetiracetam.
Valores de referencia:	(6.00 - 46.00)

Descripción:	LEVODOPA
Código:	LEVODOPA
Técnica:	Cromatografía Líquida/Tándem masas (LC-MS/MS)
Unidades:	mcg/mL
Plazo:	17 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	2 mL. Congelar y enviar congelado. Toma de muestra 2 horas después de administración del medicamento.
Valores de referencia:	(1.5 - 2.5) A las dos horas de la administración del medicamento

Descripción:	LGI 1 ANTICUERPOS SUERO
Código:	LGI1
Técnica:	Inmunofluorescencia Indirecta
Unidades:	
Plazo:	17 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero
Valores de referencia:	

Descripción:	LH
Código:	LH
Técnica:	Técnica ICMA
Unidades:	mU/mL

Descripción:	LH
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(1.80 - 11.78) Mujer > 14 años F. Folicular (7.59 - 89.08) Mujer > 14 años Ovulación (0.56 - 14.00) Mujer > 14 años F. Luteínica (5.16 - 61.99) Mujer > 14 años Post-menopausia (0.57 - 12.07) Hombre > 14 años

Descripción:	Li Fraumeni, Sd. Panel NGS
Código:	GEN_000718
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	LICOPENO EN SUERO
Código:	LICOP
Técnica:	Cromatografía líquida de alta eficacia
Unidades:	µg/L
Plazo:	12 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1mL de suero congelado. Separar y congelar inmediatamente. Proteger de la luz.
Valores de referencia:	(10 - 280)

Descripción:	LIDOCAINA SUERO
Código:	LIDOCAINA
Técnica:	Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectrometría de masas.
Unidades:	µg/mL
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL Suero (Refrigerado)
Valores de referencia:	(1.50 - 5.00)

Descripción:	Li-Fraumeni tipo 2, Sd. Sec Gen: CHEK2
Código:	GEN_000505
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Li-Fraumeni, síndrome de. Gen: TP53. Sec completa
Código:	TP53_GERMI
Técnica:	NGS

Descripción: Li-Fraumeni, síndrome de. Gen: TP53. Sec completa
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: 2 tubos EDTA Tª ambiente exculsivos para esta dereminación rotulados con BM
Valores de referencia:

Descripción: Lig X inmuno de reg-poliendocrinopat-enteropat S IPEX. FOXP3
Código: GEN_000720
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Linaje vía materno judicial (ADN mitocon 1 indiv adicional)
Código: MATLINAJEA
Técnica:
Unidades:
Plazo: 21 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Lleva KIT especial con cadena de custodia, solictar a asesoría genética, Enviar con las muestras a Alfonso XII
Muestra: mucosa bucal con Hisopo sin medio

Esta prueba es para añadir algun familiar a la prueba MATLINAJE
Valores de referencia:

Descripción: Linaje vía materno judicial (ADN mitocon 1 indiv adicional)
Código: MATLINAJEA
Técnica:
Unidades:
Plazo: 21 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Lleva KIT especial con cadena de custodia, solictar a asesoría genética, Enviar con las muestras a Alfonso XII
Muestra: mucosa bucal con Hisopo sin medio

Esta prueba es para añadir algun familiar a la prueba MATLINAJE
Valores de referencia:

Descripción: Linaje vía materno judicial (ADN mitocon 1 indiv adicional)
Código: MATLINAJEA
Técnica:
Unidades:
Plazo: 21 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Lleva KIT especial con cadena de custodia, solictar a asesoría genética, Enviar con las muestras a Alfonso XII
Muestra: mucosa bucal con Hisopo sin medio

Esta prueba es para añadir algun familiar a la prueba MATLINAJE
Valores de referencia:

Descripción: Linaje vía materno judicial (ADN mitocon, 2 individuos)
Código: MATLINAJE
Técnica:
Unidades:
Plazo: 21 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Lleva KIT especial con cadena de custodia, solictar a asesoría genética, Enviar con las muestras a Alfonso XII
Muestra: mucosa bucal con Hisopo sin medio
Esta prueba es para 2 individuos, abuela nieta por ejemplo padres recomendables y gratuitos
Valores de referencia:

Descripción: Linaje vía materno judicial (ADN mitocon, 2 individuos)
Código: MATLINAJE
Técnica:
Unidades:
Plazo: 21 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Lleva KIT especial con cadena de custodia, solictar a asesoría genética, Enviar con las muestras a Alfonso XII
Muestra: mucosa bucal con Hisopo sin medio
Esta prueba es para 2 individuos, abuela nieta por ejemplo padres recomendables y gratuitos
Valores de referencia:

Descripción: Linaje vía materno judicial (ADN mitocon, 2 individuos)
Código: MATLINAJE
Técnica:
Unidades:
Plazo: 21 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Lleva KIT especial con cadena de custodia, solictar a asesoría genética, Enviar con las muestras a Alfonso XII
Muestra: mucosa bucal con Hisopo sin medio
Esta prueba es para 2 individuos, abuela nieta por ejemplo padres recomendables y gratuitos
Valores de referencia:

Descripción: Linaje vía paterna judicial (chr Y 1 individuo adicional)
Código: PATLINAJEA
Técnica:
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Lleva KIT especial con cadena de custodia, solictar a asesoría genética, Enviar con las muestras a Alfonso XII
Muestra: mucosa bucal con Hisopo sin medio
Esta prueba es para añadir algun familiar masculino a la prueba PATLINAJE
Valores de referencia:

Descripción: Linaje vía paterna judicial (cromosoma Y, 2 individuos)
Código: PATLINAJE
Técnica:
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Biología Molecular

Descripción: Linaje vía paterna judicial (cromosoma Y, 2 individuos)
Comentario adicional: Lleva KIT especial con cadena de custodia, solictar a asesoría genética, Enviar con las muestras a Alfonso XII
Muestra: mucosa bucal con Hisopo sin medio
Esta prueba es para 2 individuos: abuelo/nieto por ejemplo
Valores de referencia:

Descripción: Linaje vía paterna judicial (cromosoma Y, 2 individuos)
Código: PATLINAJE
Técnica:
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Lleva KIT especial con cadena de custodia, solictar a asesoría genética, Enviar con las muestras a Alfonso XII
Muestra: mucosa bucal con Hisopo sin medio
Esta prueba es para 2 individuos: abuelo/nieto por ejemplo
Valores de referencia:

Descripción: Linaje vía paterna judicial (cromosoma Y, 2 individuos)
Código: PATLINAJE
Técnica:
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Lleva KIT especial con cadena de custodia, solictar a asesoría genética, Enviar con las muestras a Alfonso XII
Muestra: mucosa bucal con Hisopo sin medio
Esta prueba es para 2 individuos: abuelo/nieto por ejemplo
Valores de referencia:

Descripción: LINDANO EN ORINA
Código: LINDANOOR
Técnica: Cromatografía de gases/Espectrofotometría de masas
Unidades: µg/L
Plazo: 23 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 10 ml de orina (micción aislada)
Valores de referencia: (Inf. 1) Personal no expuesto. (Baselt RC.Biological Monitoring Methods for Industrial Chemicals)

Descripción: LINDANO SUERO (Hexaclorociclohexano)
Código: LINDANO
Técnica: Cromatografía de Gases / Espectrometría Masas.
Unidades: µg/L
Plazo: 23 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 3 ml suero CON gel separador, al final de la jornada laboral
Conservación: REFRIGERAR
Valores de referencia: (Inf. 25) Índice Biológico de Exposición orientativo (BAT) según DFG (Final jornada laboral)
Personal expuesto a LINDANO

Descripción: LINEZOLID PLASMA
Código: LINEZOLID

Descripción:	LINEZOLID PLASMA
Técnica:	LC-MS/MS
Unidades:	mcg/mL
Plazo:	4 días
Tubo:	Plasma EDTA Refrigerado
Comentario adicional:	1 mL plasma (EDTA),también es válida muestra de suero.
Valores de referencia:	(1.3 - 8.0) Valores de referencia orientativos (Sup. 10) Toxicidad

Descripción:	Linfedema - distiquiasis, Sd. Sec Gen: FOXC2
Código:	GEN_000506
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Linfedema hereditario: gen FLT4 (NGS)
Código:	FLT4_MUTS
Técnica:	NGS con TSOE Illumina
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Muestras de tejido tumotal y sangre. Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	LINFOCITOS B NAIVE
Código:	LBNAIVE
Técnica:	
Unidades:	% sobre CD19
Plazo:	4 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(54 - 88.4) 2 años - 5 años (47.3 - 77) 5 años - 10 años (51.3 - 82.5) 10 años - 16 años (48.4 - 79.7) > 16 años

Descripción:	LINFOCITOS B TRANSICIONALES
Código:	TRANSICIO
Técnica:	
Unidades:	% sobre CD19
Plazo:	4 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	

Descripción: LINFOCITOS B TRANSICIONALES

Valores de referencia:
(3.1 - 12.3) 2 años - 5 años
(4.6 - 8.3) 5 años - 10 años
(1.4 - 13) 10 años - 16 años
(0.9 - 5.7) > 16 años

Código: CELULASNK

Descripción: LINFOCITOS NATURAL KILLER SANG

Técnica: Citometría de flujo

Comentario adicional: 5 mL sangre total EDTA

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	CELULASNK1	5011449		LINFOCITOS NATURAL KILLER SANGRE		
Prueba	CD56NKH1	8133-1		CELULAS KILLER CD56(NKH-1)	%	
Prueba	CD56NKHT	14113-5		CELULAS NATURAL KILLER TOTALES	/µL	
Prueba	NOTATIP			NOTA TIPAJE LEUCOCITOS SANGRE PERIFERICA		
Prueba	LINFOTOT	30364-4		LINFOCITOS TOTALES (POBLACIONES LINFOCITARIAS)	/µL	(1000 - 4500)
Prueba	CELNK1TOT	53936-1		CELULAS NK TOTALES	/µL	

Descripción: LINFOCITOS T ACTIVADOS

Código: CD3DR

Técnica: Citometría de flujo

Unidades: %

Plazo: 4 días

Tubo: EDTA sangre total Referencia

Comentario adicional: 5 mL sangre total EDTA a temperatura ambiente

Valores de referencia:

Código: LINFOTB1

Descripción: LINFOCITOS T Y B EN SANGRE TOTAL

Técnica: Citometría de fujo

Comentario adicional: 5 mL sangre total EDTA

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	LINFOTOT	30364-4		LINFOCITOS TOTALES (POBLACIONES LINFOCITARIAS)	/µL	(1000 - 4500)
Prueba	CD3	8124-0		MARCADORES LINFOIDES (CD3)	%	
Prueba	CD3T	8122-4		LINFOCITOS CD3 TOTALES	/µL	
Prueba	CD19	8117-4		MARCADORES LINFOIDES CD19	%	
Prueba	CD19T	8116-6		LINFOCITOS CD19 TOTALES	/µL	
Prueba	NOTATIP			NOTA TIPAJE LEUCOCITOS SANGRE PERIFERICA		

Código: T4T8
Descripción: LINFOCITOS T4/T8 (COCIE
Técnica:
Comentario adicional: 1 tubo de EDTA de 5ml
Envio inmediato a temperatura ambiente

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	LINFOTOT	30364-4		LINFOCITOS TOTALES (POBLACIONES LINFOCITARIAS)	/µL	(1000 - 4500)
Prueba	CD3	8124-0		MARCADORES LINFOIDES (CD3)	%	
Prueba	CD3T	8122-4		LINFOCITOS CD3 TOTALES	/µL	
Prueba	CD4	8123-2		CD4 (T4)	%	(25 - 66) 2 años - 5 años (26 - 61) 5 años - 10 años (20 - 65) 10 años - 16 años (28 - 64) > 16 años
Prueba	CD4T	24467-3		CD4 (T4) TOTAL	/µL	(500 - 2700) 2 años - 5 años (400 - 2500) 5 años - 10 años (400 - 2100) 10 años - 16 años (500 - 2000) > 16 años
Prueba	CD8	8101-8		CD8 (T8)	%	(9 - 49) 2 años - 5 años (13 - 47) 5 años - 10 años (14 - 40) 10 años - 16 años (12 - 40) > 16 años
Prueba	CD8T	14135-8		CD8 (T8) TOTAL	/µL	(200 - 1800) 2 años - 5 años (200 - 1700) 5 años - 10 años (300 - 1300) 10 años - 16 años (200 - 1200) > 16 años
Prueba	COCIENTE	54218-3		COCIENTE T4/T8		
Prueba	NOTATIP			NOTA TIPAJE LEUCOCITOS SANGRE PERIFERICA		

Código: CI_CELIAQU
Descripción: LINFOGRAMA DUODENAL EN ENFERMEDAD CELIACA
Técnica: Citometria de flujo
Comentario adicional: Muestra de Biopsia de Bulbo duodenal/segunda porción duodenal en tubo estéril suspendido en 5 ml de suero salino o PBS

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	LINFO_EPIT			LINFOCITOS INTRAEPITELIALES	%	(Inf. 12) El porcentaje se expresa sobre la celularidad total
Prueba	LTGD			LINFOCITOS T GAMMA/DELTA	%	(Inf. 1) El porcentaje se expresa sobre la celularidad total
Prueba	LTGD_EPI			LINFOCITOS T GAMMA/ DELTA	%	(Inf. 10) El porcentaje se expresa sobre linfocitos intraepiteliales

Componentes						
Prueba	CD3_CD103			LINFOCITOS CD3-CD103+ (I-NK)	%	(Sup. 10) El porcentaje se expresa sobre linfocitos intraepiteliales
Prueba	NOTA_DUODE			NOTA LINFOGRAMA DUODENAL		

Descripción: Linfohistiocitosis hemofagocítica fam. Sec Gen: PRF1
Código: GEN_000508
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Linfohistiocitosis hemofagocítica familiar. Panel NGS
Código: GEN_000507
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: LIPASA
Código: LIPA
Técnica: Enzimática/colorimétrica
Unidades: U/L
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL suero
Alternativa plasma heparina Li
Valores de referencia: (Inf. 67) > 18 años
(Inf. 8) < 1 año
(5 - 31) 1 año - 10 años
(7 - 39) 10 años - 18 años

Código: LIPIDOGRA
Descripción: LIPIDOGRAMA SUERO
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	PREALFA	15121-7		PREALFA, LIPIDOGRAMA	%	(22 - 46)
Prueba	PREBETA	15123-3		PREBETA, LIPIDOGRAMA	%	(1 - 27)
Prueba	BETA_LIP	15122-5		BETA, LIPIDOGRAMA	%	(47 - 71)

Componentes						
Prueba	BETA_ALFA	44717-7		COCIENTE BETA/ALFA DEL LIPIDOGRAMA		(1.1 - 3.1) beta+pre beta/alfa
Prueba	BETA_PRE	56777-6		COCIENTE BETA/PREBETA EN EL LIPIDOGRAMA		(2.2 - 6.2) beta/pre beta

Descripción:	LIPIDOS TOTALES
Código:	LIP
Técnica:	
Unidades:	mg/dL
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	.
Valores de referencia:	(Inf. 800)

Descripción:	Lipodistrofia congénita generalizada. Panel NGS
Código:	GEN_000509
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Lipofucinosis ceroide neuronal. Panel NGS
Código:	GEN_000510
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Lipofuscinosis neuronal ceroidea: gen PPT1 (NGS)
Código:	LIPOFUSMUT
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Lipogranulomatosis de Farber. Sec Gen: ASAH1
Código:	GEN_000511
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Lipogranulomatosis de Farber. Sec Gen: ASAH1
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: LIPOPROTEINA (A) SUERO
Código: LPA
Técnica: Téc. Turbidimetría
Unidades: mg/dL
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL Suero
Alternativa: plasma de EDTA, heparina.
Valores de referencia: (Inf. 30)

Descripción: LIPOPROTEINA MEMBRANA HEPATICA (LSP) AC.SUERO
Código: ANTILSP
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml SUERO
Valores de referencia: Negativo <1/40
Positivo >1/40

Descripción: LIPOPROTEINA X
Código: LPX
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: mg/dL
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL de suero
Valores de referencia: (Inf. 50) < 6 meses
(Inf. 10) > 6 meses

Descripción: LIPOSCALE: TEST AVANZADO DE LIPOPROTEINAS (RMN)
Código: LIPOSCALE
Técnica: RMN
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia:

Código: SEMENCUL
Descripción: LIQUIDO SEMINAL CULTIVO, IDENT
Técnica: Cultivo en medios apropiados
Comentario adicional: 1 mL semen

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.

Componentes						
Perfil	CULTIVO		SEMEN	CULTIVO GENERAL en ESTUDIO MICROBIOLOGICO DE LIQUIDO SEMINAL		

Descripción:	LIQUIDO SINOVIAL CRISTALES
Código:	LIQSICRIS
Técnica:	Microscopía luz polarizada
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	Líquido sinovial (heparina sódica)5 Volumen 5.0 mL Volumen mínimo 2 mL
Valores de referencia:	

Descripción:	LIQUIDOS Y EXUDADOS LDH
Código:	LIQEXULDH
Técnica:	Espectrofotometría
Unidades:	U/L a 37 ºC
Plazo:	3 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	LIQUIDOS Y EXUDADOS PH
Código:	LIQEXUPH
Técnica:	Tira reactiva
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	LIQUIDOS Y EXUDADOS RECUENTO CELULAR
Código:	LIQEXUCE
Técnica:	Microscopía óptica
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	Lisencefalia ligada al X tipo 1. Sec Gen: DCX
Código:	GEN_000513
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Descripción:	Lisencefalia ligada al X tipo 1. Sec Gen: DCX
Valores de referencia:	

Descripción:	Lisencefalia: >10 genes (NGS)
Código:	LISENCEFAL
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina y Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	LISOZIMA EN LCR
Código:	LISOZLCR
Técnica:	Turbidimetría
Unidades:	mg/L
Plazo:	9 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 ml
Valores de referencia:	(Inf. 2)

Descripción:	LISOZIMA EN LIQUIDO PLEURAL
Código:	LISOZLIQPL
Técnica:	Turbidimetría
Unidades:	mg/L
Plazo:	9 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 15)

Descripción:	LISOZIMA EN MUESTRAS BIOLÓGICAS
Código:	LISOZIMA
Técnica:	Turbidimetría
Unidades:	
Plazo:	6 días
Tubo:	Muestra envios externos
Comentario adicional:	También se realiza en líquidos biológicos.
Valores de referencia:	

Descripción:	LISOZIMA ORINA (MURAMIDASA)
Código:	LISOZI2
Técnica:	Turbidimetría
Unidades:	mg/L
Plazo:	6 días
Tubo:	Orina basal
Comentario adicional:	10 ml de orina aislada
Valores de referencia:	(Inf. 2)

Descripción:	LISOZIMA SUERO (MURAMIDASA)
Código:	LISOZI

Descripción:	LISOZIMA SUERO (MURAMIDASA)
Técnica:	Turbidimetría
Unidades:	mg/L
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1mL de suero CON gel separador Conservación: refrigerar Volumen mínimo: 0.5 mL
Valores de referencia:	(2.5 - 8.0)

Descripción:	LISTERIA MONOCYTOGENES 1/2A Y/O 4B AC IGG
Código:	LISTEAC
Técnica:	Fijación del Compelemento
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml de suero, no mandar tubo con gel separador
Valores de referencia:	Se consideran valores significativos los título superiores a 1:100

Descripción:	LISTERIA MONOCYTOGENES (TIPO4B) AC IgM, SUERO
Código:	LIS4M
Técnica:	
Unidades:	Titulo
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	SUERO refrigerado
Valores de referencia:	Título <1/100 No se detectan

Descripción:	LITIO
Código:	LI
Técnica:	ESPECTROFOTOMETRÍA
Unidades:	mmol/L
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(0.6 - 1.2) Niveles terapeúticos

Descripción:	LITIO EN ORINA
Código:	LITIO2
Técnica:	
Unidades:	mmol/24 h
Plazo:	3 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	5 mL orina 24h. Indicar diuresis 24h
Valores de referencia:	Valores terapéuticos indicativos: En terapia crónica con lítio 10-40 mmol/24h. Recomendamos análisis en suero

Descripción:	LITIO ERITROCITOS
Código:	LIERI

Descripción:	LITIO ERITROCITOS
Técnica:	ESPECTROMETRÍA DE MASAS/PLASMA ACOPLADO INDUCTIVAMENTE
Unidades:	mmol/L
Plazo:	4 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	2 mL sangre total (EDTA) y 1 mL de plasma (EDTA). Se separa el plasma y se envía los dos tubos
Valores de referencia:	(0.2 - 0.45) LITIO ERITROCITOS (0.8 - 1.4) LITIO PLASMA (0.3 - 0.6) INDICE ERITOC/PLASM

Descripción:	LKM AC. SUERO
Código:	LKMAC
Técnica:	Inmunofluorescencia indirecta
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	Negativo <1/40 Positivo >1/40

Descripción:	LMC, RESISTENCIA INHIBIDORES KINASA · T315I · HOT SPOT
Código:	BCRABLT315
Técnica:	RT-PCR - Sanger
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional:	Recomendada: 9 mL Médula ósea (2 x Tubo PAXGENE) [Tªambiente] (Estabilidad: 20°C:3 Días 4°C:5 Días -20°C:1 Meses) Vol.Min. 5 mL o 9 mL Sangre total (2 x Tubo PAXGENE) [Tªambiente] (Estabilidad: 20°C:3 Días 4°C:5 Días -20°C:1 Meses) Vol.Min. 5 mL Alternativa: 9 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refrigerar] (Estabilidad: 4°C:48 Horas) Vol.Min. 5 mL o 9 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refrigerar] (Estabilidad: 4°C:48 Horas) Vol.Min. 5 mL
Valores de referencia:	

Descripción:	LONGITUD TELOMÉRICA, SANGRE TOTAL
Código:	TELCRI
Técnica:	FISH
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	Sangre EDTA
Comentario adicional:	10 mL Sangre total EDTA. Kit especifico.REFRIGERAR. Realizar la extracciónde lunes a jueves laborables. Enviar inmediatamente después de la extracción No enviar muestras de sangre que presenten hemólisis ni coágulos. Kit Ref SAP: 550000523 Consentimeinto informrmado especifico de la medición de longitud telomérica (MPP9) Cuestionario especifico que el paicente rebe cumplimentar on line (WWW. lifelength-questionnaire.com). En el kit se proporciona usuario y contraseña especificos para acceder al cuestionario on line.
Valores de referencia:	

Descripción:	LORAZEPAM SUERO
Código:	LORAZEPAM

Descripción:	LORAZEPAM SUERO
Técnica:	LC-MS/MS
Unidades:	µg/L
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	2 ml
Valores de referencia:	(20 - 250) Intervalo terapéutico (300 - 500) Concentración tóxica (Inf. 5) Límite de cuantificación

Descripción:	LORMETAZEPAM SUERO
Código:	LORMETAZEP
Técnica:	Cromatografía Líquida de Alta Eficacia- Espectrometría de masas
Unidades:	ng/mL
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL Suero. Refrigerado.
Valores de referencia:	(5 - 25) Rango terapeútico

Descripción:	Lowe, Sd. Sec Gen: OCRL
Código:	GEN_000514
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Lp-PLA2 (Lipoprotein associated phospholipase A2)
Código:	LPPLA2
Técnica:	CLIA
Unidades:	ng/mL
Plazo:	21 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero
Valores de referencia:	

Descripción:	LRP4 (Low density lipopr receptor relat protein 4) AC. SUERO
Código:	LRP4AC
Técnica:	Técnica inmunocitoquímica con células transfectadas
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 ml suero. CONGELAR
Valores de referencia:	Valor de referencia: Negativo

Descripción:	LSD EN ORINA
Código:	LSD
Técnica:	EIA
Unidades:	

Descripción:	LSD EN ORINA
Plazo:	4 días
Tubo:	Orina basal
Comentario adicional:	5 mL orina (micción aislada). REFRIGERAR.
Valores de referencia:	Valor de referencia indicativo: Negativo El valor discriminante de la técnica es 0,50 ng/mL

Descripción:	Lujan-Fryns, Sd. Sec Gen: MED12
Código:	GEN_000708
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	LUTEINA Y ZEAXANTINA EN SUERO
Código:	LUTEI
Técnica:	Cromatografía líquida de alta eficacia
Unidades:	µg/L
Plazo:	12 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 mL suero congelado Separar y congelar inmediatamente. Proteger de la luz.
Valores de referencia:	(100 - 500)

Descripción:	M1 MUSCARÍNICO COLINÉRGICO RECEPTOR ANTICUERPOS SUERO
Código:	MUSCA1
Técnica:	EIA
Unidades:	U/mL
Plazo:	32 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero
Valores de referencia:	(Inf. 9) Negativo

Descripción:	M2 MUSCARÍNICO COLINÉRGICO RECEPTOR ANTICUERPOS SUERO
Código:	MUSCA2
Técnica:	EIA
Unidades:	U/mL
Plazo:	32 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero
Valores de referencia:	(Inf. 9) Negativo

Descripción:	M3 MITOCONDRIALES AC.
Código:	AMA3
Técnica:	IFI
Unidades:	
Plazo:	5 días

Descripción:	M3 MITOCONDRIALES AC.
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml suero
Valores de referencia:	Negativo <1/40 Positivo >1/40

Descripción:	M4 MITOCONDRIALES AC.
Código:	AMA4
Técnica:	Téc, IFI
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	Negativo <1/40 Positivo >1/40

Descripción:	M4 MUSCARÍNICO COLINÉRGICO RECEPTOR ANTICUERPOS SUERO
Código:	MUSCA4
Técnica:	EIA
Unidades:	U/mL
Plazo:	32 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero
Valores de referencia:	(Inf. 10.7) Negativo

Descripción:	M9 MITOCONDRIALES AC.
Código:	AMA9
Técnica:	IFI
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL
Valores de referencia:	Negativo <1/80 Positivo >1/80

Descripción:	MACRO AST SUERO
Código:	MACROGOT
Técnica:	PRECIPITACIÓN-ENZIMÁTICA
Unidades:	% no precipit
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	2 mL.
Valores de referencia:	(Inf. 27) Presencia de Macro AST

Descripción:	MACRO TSH SUERO
Código:	MACROTSH
Técnica:	PRECIPITACIÓN-INMUNOLUMINISCENCIA
Unidades:	%
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal

Descripción:	MACRO TSH SUERO
Comentario adicional:	2 mL Suero.
Valores de referencia:	

Descripción:	MACRO VITAMINA B12, SUERO
Código:	MVB12
Técnica:	precipitación con polietilenglicol
Unidades:	% recuperación
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero, 2 mL. Refrigerar.
Valores de referencia:	Valores de referencia orientativos: Se considera presencia de Macro Vitamina B12, cuando el porcentaje de recuperación en el sobrenadante es inferior al 40 %.

Descripción:	MACROAMILASA
Código:	MACROAMI
Técnica:	Precipitación enzimática
Unidades:	%
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero Volumen mínimo: 0.3 mL
Valores de referencia:	(Sup. 27) Ausencia de Macroamilasa

Descripción:	MACROGLOBULINEMIA DE WALDENSTROM · CXCR4(S338X) · HOT SPOT
Código:	CXCR4_MUTS
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional:	Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO. IMPORTANTE: SIEMPRE REFRIGERADO Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	MACROGLOBULINEMIA DE WALDENSTROM · MYD88(L265P) · HOT SPOT
Código:	MYD88_MUTS
Técnica:	PCR y secuenciación
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional:	Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO. IMPORTANTE: REFRIGERADO SIEMPRE
Valores de referencia:	

Descripción:	MACROPROLACTINA SUERO
Código:	MACROPROLA
Técnica:	
Unidades:	% recuperación
Plazo:	4 días

Descripción:	MACROPROLACTINA SUERO
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	Macrotrombocitopenia sordera neurosensorial progresiva. MYH9
Código:	GEN_000516
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	MAF TEST
Código:	MAFTEST
Técnica:	FISH
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:	Tejido parafinado Tª ambiente
Valores de referencia:	

Descripción:	MAG (MYELIN ASSOCIATED GLYCOPROTEIN) ANTICUERPOS IgM
Código:	MAGACM
Técnica:	Immunoblot
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero
Valores de referencia:	Negativo: Título <1/100

Descripción:	MAG AC. IGM LCR (Glucoproteína asociada a mielina)
Código:	MAGACMLCR
Técnica:	Técnica Cell Binding Assay IFI
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	LIQUIDO LCR INMUNO
Comentario adicional:	1mL.
Valores de referencia:	

Descripción:	MAGNESIO
Código:	MG
Técnica:	
Unidades:	mmol/L
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	

Descripción:	MAGNESIO
Valores de referencia:	(0.62 - 0.91) 2 dias - 4 dias (0.70 - 0.95) 5 meses - 6 años (0.70 - 0.86) 6 años - 12 años (0.70 - 0.91) 12 años - 20 años (0.66 - 1.07) > 20 años

Descripción:	MAGNESIO EN ORINA (mmol/L) POR CREATININA (g)
Código:	MG2CREA
Técnica:	
Unidades:	mmol/g creat.
Plazo:	3 días
Tubo:	Orina Bioquímica
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(0.58 - 5.72) Mujer (0.74 - 4.53) Hombre

Descripción:	MAGNESIO EN PLASMA SEMINAL
Código:	MGSEMEN
Técnica:	AAS
Unidades:	mg/dL
Plazo:	5 días
Tubo:	Semen
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(1.3 - 42.9)

Descripción:	MAGNESIO ERITROCITOS
Código:	MGERI
Técnica:	Absorción atómica/llama
Unidades:	mg/L
Plazo:	7 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	Sangre total EDTA Dipotásico (libre trazas metales). Refrigerar Cantidad: 1 tubo Tubo Sangre EDTA metales traza Volumen: 1.0 mL Volumen mínimo: 0.35 mL Se puede hacer con muestra en tubo libre de metales y anticoagulante Heparina Sódica.
Valores de referencia:	(35 - 55)

Descripción:	MAGNESIO ORINA
Código:	MG2
Técnica:	Espectrofotometría
Unidades:	mmol/24h
Plazo:	2 días
Tubo:	Orina 24 Horas
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(3 - 5)

Descripción:	Malformac cavernosa cerebral hereditaria 1. Gen: KRIT1
Código:	GEN_000518

Descripción: Malformac cavernosa cerebral hereditaria 1. Gen: KRIT1
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Malformac. venosas cutáneas y mucosas. Sec Gen: TEK
Código: GEN_000519
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Malformación cavernosa cerebral hereditaria. Panel NGS
Código: GEN_000517
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Malformaciones del Sistema Nervioso Central (SNC) panel
Código: PHARMALP12
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Imprescindible enviar la historia clínica y formulario de petición de genética o consentimiento informado
Valores de referencia:

Descripción: MALONDIALDEHÍDO PLASMA (TBARS)
Código: MALONDI
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: µmol/L
Plazo: 13 días
Tubo: Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional: 1 mL plasma (EDTA). CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO
Plasma EDTA separar y congelar rápidamente.
Valores de referencia: (2.3 - 4)

Descripción: MammaPrint + BluePrint - Expresión génica
Código: MAMMAPRINT
Técnica: Expresión génica

Descripción:	MammaPrint + BluePrint - Expresión génica
Unidades:	
Plazo:	20 días
Tubo:	Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:	Bloque de tejido tumoral. Tª ambiente Tumor INFILTRANTE Entregar a Asesoría Genética
Valores de referencia:	

Descripción:	MANGANESO EN SANGRE
Código:	MANGANESO
Técnica:	ICP-MS
Unidades:	µg/L
Plazo:	6 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	Sangre total EDTA Dipotásico (libre trazas metales)
Valores de referencia:	(5.0 - 15.0) .Valores de referencia orientativos.

Descripción:	MANGANESO ORINA
Código:	MN2
Técnica:	ICP-MS
Unidades:	µg/g creatinina
Plazo:	7 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	Al menos 5 ml orina final de la semana laboral o del periodo de exposición. La muestra se contamina fácilmente. Partículas de polvo del ambiente,piel o ropa del trabajador pueden contaminarla (por ello es conveniente que el trabajador se quite la ropa de trabajo y se lave las manos antes de recoger la muestra). No recolectar muestras de orina en un ambiente en el que sea más probable que ocurra la exposición. Es importante evitar que el polvo de la ropa pueda interferir en el contenido de la muestra. No recoger la orina en recipientes con base de metal, como urinarios o sartenes de metal. Recoger la orina en tubos de polipropileno incoloro libre de metales sin tapones de colores. Cuando esto no sea posible, usar para la recogida de orina un envas
Valores de referencia:	(Inf. 1) .en personas sin exposición. (Inf. 40) .valor límite biológioco (VLB) adaptado de ACGIH.

Descripción:	MANGANESO SUERO
Código:	MN
Técnica:	Espectrometría de Masas con Plasma acoplado inductivamente (ICP-MS)
Unidades:	µg/L
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	La muestra idónea es contenedor Suero (libre trazas metales). De forma alternativa se puede usar tubo de suero normal y Plasma Heparina litio de Tubo Sangre Heparina litio metales traza No se puede realizar de plasma de EDTA. Se rechazarán muestra hemolizadas. La lipémia e ictericia no afectan. Volumen mínimo: 0,2 mL
Valores de referencia:	(Inf. 1.5) Valores de referencia orientativos. Límite de cuantificación: <1.2 µg/L

Descripción:	MANTOUX INTRADERMOREACCION
Código:	MANTOUX
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	5 días

Descripción:	MANTOUX INTRADERMOREACCION
Tubo:	Tubo Especial
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	NEGATIVO

Descripción:	MAPFRE Test compatibilidad parejas y Matching
Código:	MAPFREPORT
Técnica:	NGS
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Sangre EDTA rotulada con BM rellenar consentimiento informado y hoja de matching
Valores de referencia:	

Descripción:	MAPROTILINA EN SUERO
Código:	MAPROTI
Técnica:	Cromatografía líquida de alta resolución
Unidades:	µg/L
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 mL Suero SIN gel separador Volumen mínimo: 0.1 mL El contenedor recomendado es el tubo seco (sin gel separador) para evitar procesos de adsorción del fármaco. En caso de no disponer de tubo seco, la extracción se puede realizar en tubo con gel separador, separando el suero dentro de las 2 horas poste
Valores de referencia:	(75 - 130) Intervalo terapéutico (Sup. 220) Toxicidad (Inf. 12) Límite de cuantificación

Descripción:	Marfan, enfermedad de, y aneurismas. Panel NGS
Código:	GEN_000345
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Marinesco-Sjögren, Sd. Sec Gen: SIL1
Código:	GEN_000520
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	MASTOCITOSIS SISTÉMICA/LAM · KIT(D816V) · HOT SPOT
Código:	KIT_D816V
Técnica:	PCR y secuenciación
Unidades:	

Descripción:	MASTOCITOSIS SISTÉMICA/LAM · KIT(D816V) · HOT SPOT
Plazo:	7 días
Tubo:	TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional:	Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO. IMPORTANTE: REFRIGERADO SIEMPRE Alternativas: Citrato. Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente
Valores de referencia:	

Descripción:	McArdle, enf.Glucogenosis tipo 5 Sec Gen: PYGM
Código:	GEN_000331
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	MDA5 AC.SU (CORTACTINA/CADM140/TIF1-GAMMA/P155)
Código:	MDA5
Técnica:	Inmunoblot
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	Negativo

Descripción:	MEDICION LDL ENZIMÁTICO DIRECTO
Código:	DIRECTOLDL
Técnica:	Enzimática directa
Unidades:	mg/dL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml de suero
Valores de referencia:	(Inf. 55) Prevención secundaria y riesgo cardiovascular (Inf. 70) Riesgo cardiovascular alto (Inf. 100) Riesgo cardiovascular medio (Inf. 116) Riesgo cardiovascular bajo

Descripción:	Melanoma familiar - susceptibilidad. Sec Gen: MC1R
Código:	GEN_000522
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	MELANOMA HEREDITARIO. Panel NGS >10 genes
Código:	MELANOMH
Técnica:	NGS

Descripción:	MELANOMA HEREDITARIO. Panel NGS >10 genes
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	MELAS (encefalopatía mitocondrial): mtDNA (NGS)
Código:	MELAS_MUTS
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	MELATONINA EN SALIVA (sin especificar hora recogida)
Código:	MELATONISA
Técnica:	
Unidades:	pg/mL
Plazo:	11 días
Tubo:	Saliva
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 9.9) Día (10.1 - 61.4) Noche

Descripción:	MELATONINA EN SUERO
Código:	MELATONINA
Técnica:	Técnica RIA
Unidades:	pg/mL
Plazo:	13 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero Para muestra nocturna la extracción debe realizarse entre las 0:00 y las 4:00 horas.
Valores de referencia:	(Inf. 30) De día (Inf. 150) De noche Los niveles de Melatonina en suero tienen un marcado ritmo nictemeral teniendo interés el control del citado ritmo más que una determinación aislada.

Descripción:	MEMBRANA BASAL GLOMERULAR AC. SUERO
Código:	MEMBRANAAC
Técnica:	EIA
Unidades:	U/mL
Plazo:	10 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL
Valores de referencia:	(Inf. 7) Negativo (7 - 10) Indeterminado

Descripción:	MEMBRANA HEPATICA (LMA) AC. SUERO
Código:	MEMBRAHEAC
Técnica:	IFI
Unidades:	TITULO
Plazo:	17 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	Negativo <1/40

Descripción:	Meningioma. Sec Gen: PDGFB
Código:	GEN_000525
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	MERCURIO EN PELO
Código:	MERCURPELO
Técnica:	ESPECTROMETRÍA EMISIÓN ATÓMICA/ESPECTROMETRÍA MASAS
Unidades:	mcg/g
Plazo:	9 días
Tubo:	
Comentario adicional:	200 mg pelo aprox. Cabello de la zona inferior a la coronilla, agrupar mechón del grosor de un lápiz y cortar con tijeras tan cerca de la raíz como sea posible.
Valores de referencia:	(Inf. 2.0)

Descripción:	MERCURIO INORGANICO SANGRE (EDTA ESPECIAL)
Código:	HGINORGANI
Técnica:	Espectrofotometria de masas-plasma acoplado inductivamente (ICP/MS)
Unidades:	µg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	Tubo especial traza metales en sangre total Al final de la semana laboral VOLUMEN: 1 mL. VOLUMEN MÍNIMO: 0.150 mL
Valores de referencia:	(Inf. 10) Valor Límite Biológico-VLB® (INSST)

Descripción:	MERCURIO INORGANICO TOTAL ORINA
Código:	HGINORGAN2
Técnica:	Espectrometria de masas-plasma acoplado inductivamente (ICP/MS)
Unidades:	mcg/g creatin.
Plazo:	5 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	1 mL orina (micción aislada inicio de jornada laboral)
Valores de referencia:	(Inf. 30) Valor Límite Biológico-VLB® (INSST). Límite de cuantificación: 5,00 µg/L

Descripción:	MERCURIO TOTAL ORINA AISLADA
Código:	HG2
Técnica:	ESPECTROMETRÍA DE MASAS CON PLASMA ACOPLADO INDUCTIVAMENTE (ICP-MS)
Unidades:	mcg/g creatin.
Plazo:	7 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	1 mL orina micción aislada (inicio/final jornada) Volumen mínimo: 0.5mL
Valores de referencia:	(Inf. 25) BAT (MAK&BAT): (Mercurio elemental y compuestos inorgánicos)

Descripción:	MERCURIO TOTAL SANGRE (EDTA ESPECIAL)
Código:	HG
Técnica:	Espectrometría de emisión atómica-Espectrometría de masas
Unidades:	µg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	Contenedor libre de metales. EDTA dipotásico. Al final de la semana laboral Volumen mínimo 0.15 mL
Valores de referencia:	(Inf. 6.4) < 14 años Para valores superiores, se recomienda consejo dietético. Para valores superiores a 20 µg/L se recomienda evaluación médica y consejo dietético (Inf. 20) > 14 años Valores sin riesgo asociado. En niños/as hasta los 18 años valores superiores a 20 µg/L se recomienda evaluación médica y consejo dietético (20 - 40) > 14 años Se recomienda consejo dietético. Para valores superiores a 40 µg/L se recomienda evaluación médica y consejo dietético (Inf. 12) > 14 años Adultos con riesgo cardiovascular o renal. Para valores superiores, se recomienda consejo dietético. (Inf. 6.4) Mujer > 14 años Mujeres embarazadas, en periodo de lactancia o con planificación de gestación. Para valores superiores, se recomienda consejo dietético.

Descripción:	MERRF (epilepsia mioclónica mitocondrial): mtDNA (NGS)
Código:	MERRF_MUTS
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	MESOTELINA SOLUBLE (MESOMARK) EN SUERO
Código:	MESOTELINA
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	nmol/L
Plazo:	23 días

Descripción: MESOTELINA SOLUBLE (MESOMARK) EN SUERO
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: (Inf. 1.5)

Descripción: Metabolismo deficiente de fármacos. Sec Gen: CYP2C19
Código: GEN_000526
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: METABOLISMO ESTROGENICO EN ORINA HOMBRE
Código: METESTROG2
Técnica: Cromatografía líquida/Tándem Masas (LC-MS/MS)
Unidades:
Plazo: 32 días
Tubo: Orina basal
Comentario adicional: 10 mL de orina de la primera micción de la mañana. Descartar primera fracción.

CONSIDERACIONES PREVIAS A LA TOMA DE LA MUESTRA:
- No ingerir líquidos a partir de las 20h del día anterior a la recolección de la muestra
- Se puede realizar la recogida de muestra en cualquier día.
- En caso de tratamiento hormonal (testosterona, DHEA...), debe anotarlo en observaciones para tenerlo en cuenta en la intepretación de los resultados.

Valores de referencia:

Descripción: METABOLISMO ESTROGENICO EN ORINA MUJER (MENOPAUSIA)
Código: METESTMUM2
Técnica: Cromatografía líquida/Tándem Masas (LC-MS/MS)
Unidades:
Plazo: 32 días
Tubo: Orina basal
Comentario adicional: 10 mL de orina de la primera micción de la mañana. Descartar primera fracción.

CONSIDERACIONES PREVIAS A LA TOMA DE LA MUESTRA:
- No ingerir líquidos a partir de las 20h del día anterior a la recolección de la muestra.
- Se puede realizar la recogida de muestra en cualquier día.
- En caso de tratamiento hormonal (anticonceptivos, progesterona, testosterona...), debe anotarlo en el observaciones para tenerlo en cuenta en la intepretación de los resultados.

Valores de referencia:

Descripción: METABOLISMO ESTROGENICO EN ORINA MUJER (PREMENOPAUSIA)
Código: METESTMUP2
Técnica: Cromatografía líquida/Tándem Masas (LC-MS/MS)
Unidades:
Plazo: 32 días
Tubo: Orina basal

Descripción: METABOLISMO ESTROGENICO EN ORINA MUJER (PREMENOPAUSIA)

Comentario adicional: 10 mL de orina de la primera micción de la mañana. Descartar primera fracción.
CONSIDERACIONES PREVIAS A LA TOMA DE LA MUESTRA:
- No ingerir líquidos a partir de las 20h del día anterior a la recolección de la muestra.
- No recoger la muestra mientras este con la menstruación.
- En pacientes con ciclos regulares, se recomienda regocer la muestra en la fase lútea del ciclo menstrual (entre el día 18 a 24 desde el inició de la menstruación).
- En pacientes con ciclos irregulares o amenorrea o histerectomía, se puede realizar la recogida de muestra en cualquier día.
- En caso de tratamiento hormonal (anticonceptivos, progesterona, testosterona...), debe anotarlo en observaciones para tenerlo en cuenta en la intepretación de los resultados.

Valores de referencia:

Descripción: METABOLITOS DE ANFETAMINA ORINA CONFIRMACION
Código: ANFETACONF
Técnica: Cromatografía de gases - Espectrometría de masas
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 10 ml orina aislada
Valores de referencia:

Descripción: METABOLITOS DE BARBITURICOS ORINA CONFIRMACION
Código: BARBI2CONF
Técnica: Cromatografía líquida/Tándem masas (LC-MS/MS)
Unidades: ng/mL
Plazo: 14 días
Tubo: Orina Drogas de Abuso
Comentario adicional: Orina. Contenedor de 70 mL. Refrigerar.
Valores de referencia: (Inf. 25) Límite de cuantificación
(Inf. 5) Incertidumbre de medida

Descripción: METABOLITOS DE CANNABIS ORINA CONFIRMACION
Código: CANNACONF
Técnica: Cromatografía líquida/Tándem masas
Unidades:
Plazo: 8 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 10 ml orina aislada
Valores de referencia:

Descripción: METABOLITOS DE COCAINA ORINA CONFIRMACION
Código: COCACONF
Técnica: Cromatografía de gases - Espectrometría de masas
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: METABOLITOS DE OPIACEOS ORINA CONFIRMACION
Código: OPICONF
Técnica: Cromatografía Líquida - Espectrometría de masas tándem
Unidades:

Descripción: METABOLITOS DE OPIACEOS ORINA CONFIRMACION
Plazo: 6 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: METABOLITOS ORGANICOS Y MICOTOXINAS EN ORINA (DISB. INTES.)
Código: DISBIOSIS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 16 días
Tubo: Orina basal
Comentario adicional: Orina bote especial (PEDIR KIT ESPECIAL AL ALMACEN)
Recoger la primera orina de la mañana (preferentemente en ayunas) en un recipiente limpio.
Llenar el frasco con tapón amarillo con una parte de la orina obtenida. (El frasco contiene un conservante. Mantenerlo fuera del alcance de los niños)
Cerrar herméticamente el frasco e introducirlo en la bolsa de plástico adjunta y guardarlo en nevera hasta el envío.
Valores de referencia:

Descripción: Metabolopatías y respuesta a fármacos. Panel NGS
Código: GEN_000527
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: METACUALONA ORINA
Código: METAQUALON
Técnica: Cromatografía de gases - Espectrometría de masas
Unidades: ng/mL
Plazo: 8 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 10 mL orina (2-8 ºC - Refrigerar)
Valores de referencia: (Inf. 10)

Descripción: METADONA CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SALIVA
Código: COMETSA
Técnica:
Unidades: ng/mL
Plazo: 7 días
Tubo: Saliva
Comentario adicional: Saliva. Refrigerar.
(1 mL)
Valores de referencia: (Inf. 10) Valor de corte recomendado
(Inf. 2.2) Incertidumbre de medida

Descripción: METADONA ORINA CONFIRMACION
Código: METADOCONF
Técnica: LC-MS/MS
Unidades:

Descripción:	METADONA ORINA CONFIRMACION
Plazo:	7 días
Tubo:	Orina Drogas de Abuso
Comentario adicional:	10 mL. Micción aislada.REFRIGERAR
Valores de referencia:	(Inf. 25) Límite de cuantificación (Inf. 4.3) Incertidumbre de medida Se utiliza como criterio de Positividad que la concentración sea superior o igual al valor del límite de cuantificación más el valor de incertidumbre del ensayo. En caso contrario, el resultado es Negativo.

Descripción:	METAHEMOGLOBINA
Código:	METAHB
Técnica:	Espectrometría de absorción molecular
Unidades:	% Hb total
Plazo:	5 días
Tubo:	Sangre EDTA
Comentario adicional:	5 mL Sangre total EDTA
Valores de referencia:	(Inf. 1.5) Exposición a Nitrobenceno o Inductores de Metahemoglobina

Código:	METANEP
Descripción:	METANEFRINAS EN PLASMA
Técnica:	EIA
Comentario adicional:	1 ml plasma (EDTA). Congelar y enviar congelado. Volumen 1.0 mL Volumen mínimo: 1.00 mL Separar el plasma y congelar inmediatamente después de la extracción. Mantener al paciente en reposo 30 minutos previos a la extracción. Medicamentos como agentes antihipertensivos, antidepresivos, antipsicóticos, simpaticomiméticos y L-DOPA pueden influir en los niveles plasmáticos de Metanefrinas. Las bebidas con cafeína, la nicotina y los fármacos que mejoran el estado de ánimo tamb

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	METAN	29141-9		Perfil, Metanefrina en plasma	pg/mL	(Inf. 100)
Prueba	NORMETAN	2669-0		Perfil, Normetanefrina en plasma	pg/mL	(Inf. 216)

Código:	METANEFR
Descripción:	METANEFRINAS ORINA 24 HORAS
Técnica:	Cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) acoplada a detector electroquímico
Comentario adicional:	ALÍCUOTA DE ORINA DE 24 HORAS ACIDIFCADA (Identificar tubo con el comentario +ácido) Preservar la orina con HCl 6N (20 ml) pH=1 - 3 Cumplimentar dieta Suspender toda la medicación que interfiera (bajo prescripción médica). Evitar cualquier tipo de ejercicio físico no habitual . Evitar el estrés. (3 días antes de la toma de muestra) No ingerir 5 días antes de la recolección de la orina; té, café, plátano, chocolate, vainilla, queso, bebidas carbonatadas ni ningún tipo de medicamento especialmente de salicilatos, medicación hipotensora y contrastes con yodo.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	METANE	19049-6		PERFIL METANEFRINAS ORINA 24 HORAS METANEFRINA	µg/24h	(Inf. 375) Hombre Límite de cuantificación: 52.0 µg/L (Inf. 276) Mujer Límite de cuantificación: 52.0 µg/L

Componentes						
Prueba	NORMETA	2671-6		PERFIL METANEFRINAS ORINA 24 HORAS NORMETANEFRINA	µg/24h	(Inf. 550) Mujer 18 años - 40 años Límite de cuantificación: 60.5 µg/L (Inf. 660) Hombre 18 años - 40 años Límite de cuantificación: 60.5 µg/L (Inf. 632) Mujer 41 años - 60 años Límite de cuantificación: 60.5 µg/L (Inf. 779) Hombre 41 años - 60 años Límite de cuantificación: 60.5 µg/L (Inf. 669) Mujer 60 años - 120 años Límite de cuantificación: 60.5 µg/L (Inf. 824) Hombre 60 años - 120 años Límite de cuantificación: 60.5 µg/L
Prueba	VOL_ORINA			Volumen de orina mL	c.c.	
Prueba	HORAS_VOL			VOLUMEN DE ORINA: HORAS		

Descripción:	METANOL (ALCOHOL METILICO) EN ORINA
Código:	METANOL2
Técnica:	Cromatografía de gases - Ionización de llama
Unidades:	mg/L
Plazo:	7 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	Orina final jornada Volumen: 10.0 mL Volumen mínimo:5 mL
Valores de referencia:	(Inf. 15) Final del turno

Descripción:	METILETILACETONA
Código:	METILACETO
Técnica:	Cromatografía de gases
Unidades:	mg/L
Plazo:	7 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	10 mL orina final de la jornada laboral.
Valores de referencia:	(Inf. 2) al final de la jornada laboral (exposición a METILETILCETONA) VLB-INSHT

Descripción:	METILFORMAMIDA ORINA
Código:	METILFORMA
Técnica:	Téc. cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC/MS)
Unidades:	mg/L
Plazo:	9 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	10 mL Orina final jornada (2-8 ºC - Refrigerar) Refrigerar Volumen mínimo: 5 mL
Valores de referencia:	(Inf. 15) Final de jornada.Valor límite biológico (VLB-INSHT). Personas expuestas a Dimetilformamida

Descripción:	METILISOBUTIL CETONA ORINA
Código:	METISOBUCE
Técnica:	Cromatografía de gases/ionización de llama
Unidades:	mg/L
Plazo:	7 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	10 mL orina (miccion aislada) al final de la jornada laboral
Valores de referencia:	(Inf. 1) al final de la jornada laboral (exposición a METILISOBUTILCETONA)

Descripción:	METOTREXATO
Código:	METOTRE
Técnica:	Inmunofluorescencia de polarización
Unidades:	mcmol/L
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Enviar suero protegido de la luz
Valores de referencia:	(Inf. 5) A LAS 24 HORAS (Inf. 0.5) A LAS 48 HORAS (Sup. 5) Tóxico - A LAS 24 HORAS (Sup. 0.5) Tóxico - A LAS 48 HORAS

Descripción:	MGLUR1 ANTICUERPOS LCR (METABOTROPIIC GLUTAMATE RECEPTOR1)
Código:	MGLUR1LCR
Técnica:	Inmunofluorescencia indirecta (Cell Bindig Assay)
Unidades:	
Plazo:	17 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 mL LCR
Valores de referencia:	

Descripción:	MGLUR1 ANTICUERPOS NEURONALES (METABOTROPIC GLUTAMATE R.)
Código:	MGLUR1AC
Técnica:	Inmunohistoquímica
Unidades:	
Plazo:	32 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	suero
Valores de referencia:	

Descripción:	MGLUR5 ANTICUERPOS LCR (METABOTROPIIC GLUTAMATE RECEPTOR5)
Código:	MGLUR5LCR
Técnica:	Inmunofluorescencia indirecta (Cell Bindig Assay)
Unidades:	
Plazo:	23 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 mL LCR
Valores de referencia:	

Descripción:	MGLUR5 ANTICUERPOS NEURONALES (METABOTROPIC GLUTAMATE R.)
Código:	MGLUR5AC
Técnica:	Inmunohistoquímica
Unidades:	
Plazo:	23 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1mL de suero refrigerado
Valores de referencia:	

Descripción:	MHPG ORINA (3-METOXI-4-HIDROXIFENILETILENGLICOL)
Código:	MHPG
Técnica:	HPLC
Unidades:	mg/24 h
Plazo:	9 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	10 ML DE ORINA 24, PH: 3
Valores de referencia:	(0.9 - 2.4)

Descripción:	Mi-1/Mi-2 AC. SUERO
Código:	MI1MI2AC
Técnica:	Técnica Inmunoblot
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	Negativo

Descripción:	MIA (Melanoma Inhibitory Activity)
Código:	MIA
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	pg/mL
Plazo:	17 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 ml.congelar y enviar congelado
Valores de referencia:	(620 - 1508)

Descripción:	MIANSERINA EN SUERO
Código:	MIANSERINA
Técnica:	Cromatografía líquida/Espectrometría de masas en tándem (LC-MS/MS)
Unidades:	µg/L
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 mL suero SIN gel separador Volumen mínimo: 0.1 mL Muestra alternativa: Plasma EDTA El contenedor recomendado es el tubo seco (sin gel separador) para evitar procesos de adsorción del fármaco. En caso de no disponer de tubo seco, la extracción se puede realizar en tubo con gel separador, separando el suero dentro de las 2 horas poste
Valores de referencia:	(15 - 70) Intervalo terapéutico (Inf. 4) Límite de cuantificación (Sup. 140) Toxicidad

Descripción:	MICELIO CANDIDA ALBICANS AC. IGG
Código:	MICECANDID
Técnica:	IFI
Unidades:	
Plazo:	12 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL de suero
Valores de referencia:	Título >1:160 Niveles significativos

Descripción:	MICROALBUMINA ORINA
Código:	MICROALB
Técnica:	
Unidades:	mg/L
Plazo:	2 días
Tubo:	Orina Bioquímica
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	Interpretación según criterio clínico

Descripción:	Microangiopatía cerebral con quistes y calcificaciones. CTC1
Código:	GEN_000528
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Microbioma Intestinal Básico Test myBIOME (sin consulta)
Código:	MYBIO
Técnica:	Secuenciación metagenómica shotgun
Unidades:	
Plazo:	27 días
Tubo:	heces especiales
Comentario adicional:	Heces tubo especial Copan FloqSwab HDNA Free, estabilidad 4 semanas T.A.
Valores de referencia:	

Descripción:	MICROBIOMA VAGINAL, ESTUDIO METAGENOMICO
Código:	EMMV
Técnica:	PCR + Secuenciación Metagenómica Shotgun
Unidades:	
Plazo:	20 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:	Exudado vaginal en contenedor Copan eNAT. Temperatura ambiente. Alternativa: exudado vaginal en contenedor Omnigene·Vaginal (OMR-130). Temperatura ambiente. Exudado vaginal recogido en kit específico (Sistema de Copan e NAT) facilitado por el laboratorio. Seguir instrucciones de toma de muestra facilitadas en el kit. No obtener la muestra durante la menstruación La paciente no debe tomar antibióticos, ni utilizar soluciones antisépticas vaginales, óvulos ni pomadas al menos un mes antes de la toma de muestra. Las pacientes que se hayan sometido a tratamientos antibióticos deben esperar al menos 1 mes antes de realizar la toma de muestra.

Descripción: MICROBIOMA VAGINAL, ESTUDIO METAGENOMICO

Valores de referencia:

Código: MICOREAV

Descripción: MICROBIOTA INTESTINAL AVANZADA

Técnica:

Comentario adicional: 2 contenedores estériles de heces sin medio

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	ZONULINA	99399-8		ZONULINA EN HECES	ng/mL	(Inf. 107)
Prueba	CONSULESP			CONSULTA CON ESPECIALISTA		
Prueba	MICORE			MICROBIOTA INTESTINAL CORE VIVOLABS		

Descripción: MICROBIOTA INTESTINAL CORE VIVOLABS

Código: MICORE

Técnica: NGS, secuenciación 16S-V3-V4

Unidades:

Plazo: 20 días

Tubo: heces especiales

Comentario adicional: Heces recogidas en contenedor estéril sin medio.

La recogida debe realizarse únicamente de domingo a martes, y entregarse en el BCP en un plazo máximo de 12 a 16 horas tras la toma.

No tomar antibióticos, antifúngicos ni inmunosupresores durante las 6 semanas anteriores a la obtención de la muestra.

• En caso de haberse sometido a tratamientos de radioterapia, quimioterapia o tratamiento hormonal, esperar al menos 6 semanas antes de realizar la obtención de la muestra.

• No tomar probióticos durante las 3 semanas anteriores a la obtención de la muestra.

• Si se ha sometido a un tratamiento de fertilidad, debe esperar 4 semanas antes de la obtención de la muestra.

• No realizar la toma de muestra si hay sangrado activo por hemorroides o menstruación o si presenta un brote de enfermedad inflamatoria intestinal.

* No se recomienda realizar TEST DE MICROBIOTA INTESTINAL en niños menores de 5 años. Si los padres o tutores legales de niños menores de 5 años desean realizar el test, se requiere su prescripción por parte de un profesional de la salud que se haga cargo de la supervisión de los resultados.

Valores de referencia:

Descripción: MICROBIOTA VAGINAL PCR, ESTUDIO

Código: AMMV

Técnica: RT-PCR

Unidades:

Plazo: 9 días

Tubo: Muestra Citogenética

Comentario adicional: Exudado vaginal recogido en kit especifico (Sistema de Copan e NAT) facilitado por el laboratorio (código SAP: 550000807). Seguir instrucciones de toma de muestra facilitadas en el kit.

La paciente no debe tomar antibióticos, ni utilizar soluciones antisépticas vaginales, óvulos ni pomadas al menos un mes antes de la toma de muestra.

Las pacientes que se hayan sometido a tratamientos antibióticos deben esperar al menos 1 mes antes de realizar la toma de muestra.

Valores de referencia:

Descripción: Microcefalia primaria autosómico recesiva. Panel NGS

Código: GEN_000530

Técnica:

Descripción: Microcefalia primaria autosómico recesiva. Panel NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Microcefalia primaria: gen ASPM (NGS)
Código: MCPH5_GEN
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Microcefalia primaria: gen MCPH1 (NGS)
Código: MICROCEFAL
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Microcefalia. Panel Ampliado NGS
Código: GEN_000529
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Microdeleciones cromosoma Y en AZF
Código: DELCROM_Y
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Valores de referencia:

Descripción: Microftalmia / Anoftalmia. Panel
Código: GEN_000531
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días

Descripción:	Microftalmia / Anoftalmia. Panel
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	MICROSOMALES AC. SUERO (ANTI-TPO)
Código:	MICROSOAC
Técnica:	Téc. Inmunoensayo Magnético Quimioluminiscente
Unidades:	UI/mL
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 5.61)

Descripción:	MIDAZOLAM EN SUERO
Código:	MIDAZOLAM
Técnica:	Cromatografía Líquida/Tándem Masas
Unidades:	ng/mL
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	2 mL suero
Valores de referencia:	(50 - 600)

Descripción:	MIELINA ANTICUERPOS EN SUERO
Código:	MIELINAC
Técnica:	Téc. Inmunofluorescencia Indirecta
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL.
Valores de referencia:	

Descripción:	MIELINA PROTEINA BASICA EN LCR
Código:	MIELINALCR
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	ng/mL
Plazo:	32 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 ml de LCR. Congelar y enviar congelado.
Valores de referencia:	(Inf. 5.5)

Descripción:	MIELOPEROXIDASA AC.
Código:	MPO
Técnica:	EIA
Unidades:	IU/mL
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml
Valores de referencia:	(Inf. 3.5) Negativo (3.5 - 5.0) Indeterminado

Descripción: MIELOPROLIFERATIVO CRONICO · MPL(W515L/K) · HOT SPOT
Código: MPL_W515LK
Técnica: PCR y Secuenciación
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación rotulado con ONCO.
También sirve médula ósea
IMPORTANTE: REFRIGERADO SIEMPRE
Valores de referencia:

Descripción: Migraña hemipléjica famiiliar: <10 genes (NGS)
Código: MIGRAÑA
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Migraña hemipléjica familiar 1: gen CACNA1A (NGS)
Código: MIGRAÑA_1
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Migraña hemipléjica familiar tipo 2. Sec Gen: ATP1A2
Código: GEN_000532
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Milroy, enfermedad de. Sec Gen: FLT4
Código: GEN_000533
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Miocardiopat con defectos en la conducción / DCM+CCD. Panel
Código: GEN_000535

Descripción: Miocardiopat con defectos en la conducción / DCM+CCD. Panel
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Miocardiopatía arritmogénica ventrículo derecho/ARVC. Panel
Código: GEN_000534
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Miocardiopatía arritmogénica y m. súbita: >10 genes (NGS)
Código: ARRITMIA
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Miocardiopatía dilatada fam. aislada. Sec Gen: BAG3
Código: GEN_000536
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Miocardiopatía dilatada tipo 1M. Sec Gen: CSRP3.
Código: GEN_000537
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Miocardiopatía dilatada tipo 1R. Sec Gen: ACTC1
Código: GEN_000538
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días

Descripción: Miocardiopatía dilatada tipo 1R. Sec Gen: ACTC1
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Miocardiopatía dilatada. Sec Gen: MYH7
Código: GEN_000539
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Miocardiopatía dilatada: >10 genes (NGS)
Código: MCD
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Miocardiopatía dilatada: gen DES (NGS)
Código: DES
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Miocardiopatía dilatada: gen TNNT2 (NGS)
Código: TNNT2
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Miocardiopatia estructural panel genes
Código: PHARMALAP1
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Miocardiopatia estructural panel genes

Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Imprescindible enviar la historia clínica y formulario de petición de genética o consentimiento informado

Valores de referencia:

Descripción: Miocardiopatía hipertrófica familiar: >10 genes (NGS)

Código: MCH

Técnica: Secuenciación masiva (NGS)

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente

Valores de referencia:

Descripción: Miocardiopatía hipertrófica familiar: gen MYBPC3 (NGS)

Código: MYBPC3

Técnica: PCR, secuenciación y MLPA

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Miocardiopatía hipertrófica familiar: gen TTN (NGS)

Código: TTN

Técnica: PCR y secuenciación

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Miocardiopatía hipertrófica. Proteínas sarcoméricas. Panel

Código: GEN_000540

Técnica:

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Miocardiopatía no compactada: >10 genes (NGS)

Código: MCNC

Técnica: NGS

Unidades:

Plazo: 30 días

Descripción: Miocardiopatía no compactada: >10 genes (NGS)
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Valores de referencia:

Descripción: Miocardiopatía restrictiva / RCM. Panel NGS
Código: GEN_000541
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: MIOGLOBINA ORINA
Código: MIOGLO2
Técnica: Nefelometría - Turbidimetría
Unidades: µg/L
Plazo: 4 días
Tubo: Orina basal
Comentario adicional: 5 mL
Volumen mínimo: 1 mL
Refrigerar la muestra.

Días de montaje: L, X, V.
Valores de referencia: (Inf. 25)

Descripción: MIOGLOBINA SUERO
Código: MIOGLO
Técnica: Inmunoturbidimetría
Unidades: ng/mL
Plazo: 4 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 0.5 mL suero, alternativo plasma de EDTA y Heparina
Valores de referencia: (19 - 51) Mujer
(19 - 72) Hombre

Descripción: Miopatía con déficit de ISCU. Sec Gen: ISCU
Código: GEN_000544
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Miopatía cuerpos inclusión, Paget demencia frontotemp. VCP
Código: GEN_000543
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días

Descripción: Miopatía cuerpos inclusión, Paget demencia frontotemp. VCP
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Miopatía de Brody. Sec Gen: ATP2A1
Código: GEN_000545
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Miopatía de Salih. Sec Gen: TTN
Código: GEN_000546
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Miopatía distal de Laing. Sec Gen: MYH7
Código: GEN_000547
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Miopatía distal de Miyoshi. Sec Gen: DYSF
Código: GEN_000548
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Miopatía hereditaria con cuerpos de inclusión 2. Gen: GNE
Código: GEN_000549
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Miopatía miofibrilar alfa-B cristalina: gen CRYAB (NGS)
Código: CRYAB
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Miopatía miofibrilar. Panel NGS
Código: GEN_000550
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Miopatía miotubular centronuclear ligada al X. Sec Gen: MTM1
Código: GEN_000551
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Miopatía mitocondrial anemia sideroblástic. Sec Gen: PUS1
Código: GEN_000552
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Miopatía nemalínica tipo 3. Sec Gen: ACTA1
Código: GEN_000553
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Miopatías hereditarias: >10 genes (NGS)
Código: MIOPAT_GEN
Técnica: NGS
Unidades:

Descripción: Miopatías hereditarias: >10 genes (NGS)
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Miotilinopatía. Sec Gen: MYOT
Código: GEN_000554
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Miotonía agravada por potasio. Sec Gen: SCN4A
Código: GEN_000555
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Miotonía congénita: gen CLCN1 (NGS)
Código: MIOTO_CONG
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Miotonías no distróficas. Panel NGS
Código: GEN_000557
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: MIRTAZAPINA EN SUERO
Código: MIRTAZAPIN
Técnica: LC-MS/MS (2/2/2012)Cromatografía Líquida de Alta Resolución.
Unidades: µg/l
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal

Descripción:	MIRTAZAPINA EN SUERO
Comentario adicional:	Muestra: Suero Cantidad: 1 tubo Contenedor: Tubo suero sin gel separador Volumen: 0.5 mL Conservación: Refrigerar Volumen mínimo: 0,1 mL Alternativa Muestra: Plasma EDTA Cantidad: 1 tubo Contenedor: Tubo sangre EDTA Observaciones: El contenedor recomendado es el tubo seco (sin gel separador) para evitar procesos de adsorción del fármaco. En caso de no disponer de tubo seco, la extracción se puede realizar en tubo con gel separador, separando el suero dentro de la
Valores de referencia:	(30.0 - 80) (Sup. 160) Toxicidad

Descripción:	MITOCONDRIALES AC. (AMA) MUESTRA HUMANA
Código:	AMAMUES
Técnica:	
Unidades:	Titulo
Plazo:	5 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	MITOCONDRIALES AC. SUERO
Código:	AMA
Técnica:	Técnica IFI
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	Negativo <1/40 Positivo >1/40

Descripción:	MITOTANO
Código:	MITOTANO
Técnica:	Cromatografía líquida de alta resolución
Unidades:	mcg/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	(14.0 - 20.0)

Descripción:	MLL/AF4 · RT-PCR
Código:	MLL_AF4
Técnica:	RT-PCR
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	TUBO ONCOGENETICA

Descripción: MLL/AF4 · RT-PCR

Comentario adicional: Recomendada:
9 mL Médula ósea (2 x Tubo PAXGENE) [Tªambiente] (Estabilidad: 20°C:3 Días 4°C:5 Días -20°C:1 Meses) Vol.Min. 5 mL
o 9 mL Sangre total (2 x Tubo PAXGENE) [Tªambiente] (Estabilidad: 20°C:3 Días 4°C:5 Días -20°C:1 Meses) Vol.Min. 5 mL
Alternativa:
9 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refrigerar] (Estabilidad: 4°C:48 Horas) Vol.Min. 5 mL
o 9 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refrigerar] (Estabilidad: 4°C:48 Horas) Vol.Min. 5 mL

Valores de referencia:

Descripción: MLPA de METILACIÓN Análisis de 1 mutación de cualquier gen

Código: MLPA_METIL

Técnica: MLPA

Unidades:

Plazo: 20 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: MLPA SALSA nueva

Código: NUEVOMLPA

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: Muestra Biología Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación y rotulado con BM.

Valores de referencia:

Descripción: MOCA (4,4´ METILENBIS CLORANILINA) ORINA

Código: MOCA

Técnica: LC-MS/MS

Unidades: µg/g creatinina

Plazo: 23 días

Tubo: Orina Final de Jornada

Comentario adicional: 10 mL de orina final de jornada (OFJ).
Identificar tubo con etiqueta pequeña sin código de barras, con el tapón marcado y con la palabra OFJ en el lateral del tubo.Añadir 100 ul HCl concentrado.

Valores de referencia: (Inf. 12) **personas expuestas a MOCA** al final de la jornada laboral. **VLB** publicado por el **INSHT**

Descripción: Modificador de albinismo oculocután 2. Sec Gen: MC1R

Código: GEN_000558

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: MOG AC. (MIELINA OLIGODENDROCITO GLICOPROTEINA) EN SUERO

Código: MOGAC

Técnica: Inmunofluorescencia indirecta

Descripción:	MOG AC. (MIELINA OLIGODENDROCITO GLICOPROTEINA) EN SUERO
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL Suero (Refrigerado) Alt. 1 mL Plasma Citrato sódico (Refrigerado) Alt. 1 mL Plasma EDTA Dipotásico (Refrigerado) Alt. 1 mL Plasma Heparina litio (Refrigerado)
Valores de referencia:	Negativo <1/10 Positivo >1/10

Descripción:	MOLIBDENO EN ORINA
Código:	MOLIBDENOO
Técnica:	ICP-MS
Unidades:	µg/L
Plazo:	7 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	OFJ en caso de exposición laboral, identificada correctamente conforme a protocolo. En otro caso, orina aislada.
Valores de referencia:	(Inf. 150) .Valores de referencia orientativos.

Descripción:	MOLIBDENO SUERO
Código:	MOLIBDENO
Técnica:	ICP-MS
Unidades:	µg/L
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero. La muestra idónea es contenedor libre de metales. Refrigerar. Volumen: 1.0 mL Volumen mínimo: 0.2 mL
Valores de referencia:	(Inf. 3) Valores de referencia orientativos. Límite de cuantificación: 1.8 µg/L

Descripción:	MONONUCLEOSIS AC. HETEROFILOS
Código:	HETEROAC
Técnica:	Aglutinación
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	Morfina en suero
Código:	MORFINA
Técnica:	Cromatografía líquida/Tándem masas
Unidades:	µg/L
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(10 - 100) Rango terapéutico

Descripción:	Mowat-Wilson, Sd. Sec Gen: ZEB2
Código:	GEN_000559
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Mucolipidosis. Panel NGS
Código:	GEN_000560
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	MUCOPOLISACARIDOS ORINA 24 HORAS
Código:	MUCOPOL2
Técnica:	Electroforesis de agarosa
Unidades:	mg/mmol crea
Plazo:	8 días
Tubo:	Orina 24 Horas
Comentario adicional:	10 mL orina 24 horas. ANOTAR EL VOLUMNE DE 24H.REFRIGERAR.
Valores de referencia:	Valor de referencia: Negativo Esta técnica es de "screening" siendo indispensable efectuar método de confirmación en los casos de anormalidad

Descripción:	Mucopolisacaridosis III: genes HGSNAT, NAGLU y SGSH (NGS)
Código:	SANFILIPPO
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Mucopolisacaridosis tipo 2 (enf. Hunter): gen IDS (NGS)
Código:	HUNTER
Técnica:	PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción: Mucopolisacaridosis. Panel NGS
Código: GEN_000561
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Muenke, Sd. Sec Gen: FGFR3
Código: GEN_000562
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: MUESTRA BIOLOGICA INMUFENOTIPO LEUCOCITARIO
Código: INMFENOMUE
Técnica: Citometría de flujo
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 1 tubo de EDTA de 5ml
Valores de referencia:

Descripción: MULTIMEROS DEL FACTOR VON WILLEBRAND
Código: WILLEMULT
Técnica: Electroforesis
Unidades:
Plazo: 44 días
Tubo: Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional: 2.7 ml plasma citrato sódico congelado
Aportar resultados de Antigeno y Actividad (ristocetina)de FvW
Resultados afectados por hemolisis
Valores de referencia:

Descripción: MUP44 (CN-1A)(CITOSOLICO 5 NUCLEOTIDASA 1A)ANTICUERPOS SUERO
Código: MUP44CN1A
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 11 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia:

Descripción: MUSCULO CARDIACO AC. SUERO
Código: MUSCARDIAC
Técnica: Técnica IFI

Descripción:	MUSCULO CARDIACO AC. SUERO
Unidades:	
Plazo:	10 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. Alternativa: plasma con EDTA, heparina o citrato
Valores de referencia:	Títulos significativos a partir de 1:100

Descripción:	MUSCULO ESTRIADO AC. SUERO
Código:	MUSESTRIAC
Técnica:	IFI
Unidades:	
Plazo:	10 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL de suero refrigerado. Alternativa: plasma con EDTA, heparina o citrato
Valores de referencia:	Títulos significativos a partir de 1:100

Descripción:	MUSCULO LISO AC. SUERO (SMA)
Código:	MUSLISOAC
Técnica:	Técnica IFI
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	Negativo <1/80 Positivo >1/80

Descripción:	Mutac. Somaticas Pulmon 23 genes
Código:	ONCOTISP23
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:	Solicitar kit especial.Contactar con asesoría genética antes de tomar la muestra. Bloque parafina o portas
Valores de referencia:	

Descripción:	Mutac. Somaticas Pulmon 50 genes
Código:	ONCOTISP50
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:	Solicitar kit especial.Contactar con asesoría genética antes de tomar la muestra. Bloque parafina o portas
Valores de referencia:	

Descripción:	Mutac. Somaticas Pulmon15 genes
Código:	ONCOTISP15
Técnica:	
Unidades:	

Descripción: Mutac. Somaticas Pulmon15 genes
Plazo: 15 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Solicitar kit especial.Contactar con asesoría genética antes de tomar la muestra. Bloque parafina o portas
Valores de referencia:

Descripción: MUTACION DEL GEN DE LA CADENA PESADA DE LAS INMUNOGLO (IGHV)
Código: IGHV
Técnica: PCR y Secuenciación
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Al menos 3 ml de Médula Ósea o Sangre Periférica en tubo EDTA. Tubo exclusivo para esta determinación (tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO).

IMPORTANTE: SIEMPRE REFRIGERADO
Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.

Valores de referencia:

Descripción: Mutaciones en DNA mitocondrial: mtDNA (NGS)
Código: DNAMT_MUTS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Mutaciones en el gen BRAF V600X
Código: BRAF_MUTS
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Muestras: sangre en tubo EDTA.
Laboratorio Oncogenética

Valores de referencia:

Descripción: Mutaciones gen HCN4 (NGS)
Código: HCN4_MUTS
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Alternativas: Heparina y Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Mutaciones somáticas gen BRAF (V600X)
Código: BRAF_SOMAT
Técnica:
Unidades:

Descripción: Mutaciones somáticas gen BRAF (V600X)
Plazo: 15 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Muestra: Tejido tumoral parafinado. Tª ambiente
Valores de referencia:

Descripción: Mutaciones somáticas gen PDGFRA
Código: PDGFRA
Técnica:
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Tejido tumoral
ROTULAR: ONCO
Valores de referencia:

Descripción: MY BIOME Panel NGS (Next Generation Sequencing)
Código: MYBCON
Técnica:
Unidades:
Plazo: 27 días
Tubo: heces especiales
Comentario adicional: Heces recogidas en kit específico (Ref. 550000530) facilitado por el laboratorio. Seguir instrucciones facilitadas en el kit.
No tomar antibióticos, antifúngicos ni inmunosupresores durante las 6 semanas anteriores a la obtención de la muestra.
En caso de haberse sometido a tratamientos de radioterapia, quimioterapia o tratamiento hormonal, esperar al menos 6 semanas antes de la obtención de la muestra.
No se recomienda realizar el test BIOME200 en niños menores de 12 años. Si los padres o tutores legales de niños menores de 12 años desean realizar el test, se requiere su prescripción por parte de un profesional de la salud que se haga cargo de la su
En caso de pacientes embarazadas, el test deberá ser solicitado bajo la supervisión de un especialista médico.
Valores de referencia:

Descripción: MYBIOME + A200 (Microbioma Intestinal Plus)
Código: MYBA200
Técnica:
Unidades:
Plazo: 27 días
Tubo: SUERO Y HECES EN DISPOSITIVO ESPECIAL
Comentario adicional: Heces en kit especifico (Temperatura ambiente) y suero (refrigerado). IMPRESCINDIBLE REMITIR AMBAS MUESTRAS.

Heces recogidas en kit específico (Ref. 550000530) facilitado por el laboratorio. Seguir instrucciones facilitadas en el kit.
No tomar antibióticos, antifúngicos ni inmunosupresores durante las 6 semanas anteriores a la obtención de la muestra.
En caso de haberse sometido a tratamientos de radioterapia, quimioterapia o tratamiento hormonal, esperar al menos 6 semanas antes de la obtención de la muestra.
En caso de pacientes embarazadas, el test deberá ser solicitado bajo la supervisión de un especialista médico.
No se recomienda realizar el test BIOME200 en niños menores de 12 años. Si los padres o tutores legales de niños menores de 12 años desean realizar el test, se requiere su prescripción por parte de un profesional de la salud que se haga cargo de la su
Valores de referencia:

Descripción: MYBIOME + PARASITOS (Microbioma Intestinal Avanzado)
Código: MYBPA
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: heces especiales

Descripción: MYBIOME + PARASITOS (Microbioma Intestinal Avanzado)

Comentario adicional: Heces recogidas en kit específico (Ref. 550000530) facilitado por el laboratorio. Seguir instrucciones facilitadas en el kit.

3 MUESTRAS DE HECES PARA ESTUDIO DE PARASITOS.Recipiente con medio Alcorfix (fijador parásitos)

Valores de referencia:

Descripción: MYBIOME + PARASITOS+SEROLOGIA CELIAQUIA (Completo)

Código: MYBCEL

Técnica:

Unidades:

Plazo: 27 días

Tubo: SUERO Y HECES EN DISPOSITIVO ESPECIAL

Comentario adicional: Tubo Copan heces (FloqSwabs HDNAFree;pedir a almacén) + 3 tubos parásitos (COPROPACK FIX S.FIJA. PARASIT) + Suero. IMPRESCINDIBLE REMITIR TODAS LAS MUESTRAS.

Heces recogidas en kit específico (Ref. 550000530) facilitado por el laboratorio. Seguir instrucciones facilitadas en el kit.

No tomar antibióticos, antifúngicos ni inmunosupresores durante las 6 semanas anteriores a la obtención de la muestra.

En caso de haberse sometido a tratamientos de radioterapia, quimioterapia o tratamiento hormonal, esperar al menos 6 semanas antes de la obtención de la muestra.

En caso de pacientes embarazadas, el test deberá ser solicitado bajo la supervisión de un especialista médico.

No se recomienda realizar el test BIOME2D0 en niños menores de 12 años. Si los padres o tutores legales de niños menores de 12 años desean realizar el test, se requiere su prescripción por parte de un profesional de la salud que se haga cargo de la su

Valores de referencia:

Descripción: Mycobacterium spp PCR y resistencias a M.Tuber. Complex

Código: MYCOB_PCR

Técnica: RT-PCR

Unidades:

Plazo: 6 días

Tubo: Muestra Biología Molecular

Comentario adicional:
1ml esputo_REFRIGERAR
1ml BAL-REFRIGERAR
1ml BAS-REFRIGERAR
1ml Humor vitreo/acuoso-REFRIGERAR
1ml Orina-REFRIGERAR
Biopsia-TA

Valores de referencia: Valor de referencia: No se detecta
*La sensibilidad de la detección de micobacterias mediante PCR puede verse comprometida en muestras extrapulmonares (biopsia, sangre, líquido, orina...). Por lo tanto, un resultado negativo deberá interpretarse con cautela antes de descartar la posibilidad de infección por micobacterias.

Descripción: MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS AC. IGG EN SUERO

Código: MYCOBACACG

Técnica: Técnica EIA

Unidades:

Plazo: 17 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional:

Valores de referencia: (Inf. 0.90) Ausencia de anticuerpos

Descripción: MYCOPLASMA HOMINIS AC. IGG

Código: MYCOHOMAC

Técnica: IFI

Unidades:

Descripción:	MYCOPLASMA HOMINIS AC. IGG
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Contenedor: Tubo suero con separador. Conservación: Refrigerar Volumen: 1.0 mL Volumen mínimo: 0.20 mL
Valores de referencia:	Se consideran niveles significativos a partir de título 1:32

Descripción:	MYCOPLASMA HOMINIS AC. IGM
Código:	MYCOHOMACM
Técnica:	IFI
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. Volumen 1.0 mL Volumen mínimo 0.20 mL
Valores de referencia:	Se consideran niveles significativos a partir de título 1:32

Descripción:	Mycoplasma Hominis en muestra por PCR
Código:	MYCOPCR
Técnica:	Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR)
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Muestra envios externos
Comentario adicional:	5ml orina (primera micción)-REFRIGERAR Exudado-REFRIGERAR 1ml LCR-CONGELAR Lavado seminal-CONGELAR Secreción prostática-REFRIGERAR
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta

Descripción:	MYCOPLASMA PNEUMONIAE AC. IgA SUERO
Código:	MYCOPLAACA
Técnica:	IFI
Unidades:	
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	<1/12 Título <1/12 Negativo >1/12 Título >1/12 Positivo

Descripción:	MYCOPLASMA PNEUMONIAE AC. IGG EN LCR
Código:	MYCOPACGLC
Técnica:	Téc. Enzimoinmunoanálisis.
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 mL LCR.Refrigerar,
Valores de referencia:	Interpretación según criterio clínico

Descripción:	MYCOPLASMA PNEUMONIAE AC. IGG SUERO
Código:	MYCOACG
Técnica:	Inmunoensayo quimioluminiscencia
Unidades:	UA/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 10) Negativo (Sup. 10) Positivo

Descripción:	MYCOPLASMA PNEUMONIAE AC. IgM EN LCR
Código:	MYCOPACMLC
Técnica:	EIA
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 mL LCR.refrigerar
Valores de referencia:	Interpretación según criterio clínico

Descripción:	MYCOPLASMA PNEUMONIAE AC. IgM SUERO
Código:	MYCOPLAACM
Técnica:	Inmunoensayo de quimioluminiscencia
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 10) Probable ausencia de infección (Sup. 10.0) Probable infección aguda

Descripción:	Mycoplasma pneumoniae DNA PCR Cualitativa
Código:	MYCOPNPCR
Técnica:	PCR
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:	0,3ml Esputo-REFRIGERAR 0,3ml Lavado broncoalveolar-REFRIGERAR 0,35ml Líquido pleural -REFRIGERAR Otros: LCR, Líquido articular, Líquido amniótico
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta

Descripción:	MYCOPLASMAS GENITALES EN EXUDADO
Código:	MYCOVAGI
Técnica:	Cultivo
Unidades:	
Plazo:	6 días
Tubo:	Microbiología
Comentario adicional:	Torunda con medio de transporte
Valores de referencia:	

Descripción:	N.METIL ACETAMIDA EN ORINA
Código:	METILCETAM
Técnica:	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)
Unidades:	mg/g creatinina
Plazo:	17 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	Orina (micción aislada) al final de la semana laboral Volumen: 10.0 mL Volumen mínimo: 5 mL
Valores de referencia:	(Inf. 30.0) Al final de la semana laboral (exposición a DIMETILACETAMIDA) VLB-INSHT

Descripción:	NAG ORINA (N-ACETIL BETA D-GLUCOSAMINIDASA)
Código:	NAG
Técnica:	Espectrofotometría
Unidades:	U/g creatinina
Plazo:	7 días
Tubo:	Orina basal
Comentario adicional:	5 mL orina. refrigerar
Valores de referencia:	(0.7 - 5.7)

Descripción:	Nefrolitiasis/osteoporosis hipofosfatémica 1. Gen: SLC34A1
Código:	GEN_000564
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Nefrolitiasis: enfermedad de Dent 1. Sec Gen: CLCN5
Código:	GEN_000563
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Nefronoptisis tipo 4. Sec Gen: NPHP4
Código:	GEN_000565
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Nefronoptisis. Sec Gen: INVS
Código:	GEN_000566

Descripción:	Nefronoptisis. Sec Gen: INVS
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Nefropatía quística medular tipo 1. Sec Gen: MUC1
Código:	GEN_000567
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Nefropatías y enfermedad renal. Panel NGS
Código:	GEN_000569
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Neisseria gonorrheae DNA PCR Cualitativa
Código:	NEISSERPCR
Técnica:	PCR
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Muestra envios externos
Comentario adicional:	FROTIS/ESCOBILLON SECO-REFRIGERAR exudado bucal.escobillon seco-REFRIGERAR exudado recta. escobillon seco-REFRIGERAR exudado vaginal-REFRIGERAR orina primera miccion-REFRIGERAR
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta

Descripción:	NEISSERIA MENINGITIDIS AC IGG (POSTVACUNACIÓN)
Código:	MENINGIGG
Técnica:	Téc. Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	
Plazo:	19 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL (mínimo 0.57mL)
Valores de referencia:	(Sup. 1.0) Positivo (Inf. 1) o igual a 1 Negativo

Descripción:	Neisseria meningitidis DNA PCR en Sangre
Código:	MENINGPCR

Descripción: Neisseria meningitidis DNA PCR en Sangre
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional: 2 mL de sangre total (EDTA)
Valores de referencia:

Descripción: Neoplasia endocrina múltiple tipo 1: gen MEN1 (NGS)
Código: MEN1
Técnica: PCR, secuenciación, y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Neoplasia endocrina múltiple tipo 2: gen RET (NGS)
Código: MEN2
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Neoplasia endocrina múltiple. Panel NGS
Código: GEN_000570
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Neoplasia endocrina múltipole tipo 4: gen CDKN1B (NGS)
Código: MEN4
Técnica: PCr, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS (LLC, SMD, LAM) · TP53 · SANGER
Código: TP53
Técnica: PCR y Secuenciación

Descripción: NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS (LLC, SMD, LAM) · TP53 · SANGER
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Al menos 1 ml de Médula Ósea en tubo EDTA o al menos 5 ml de Sangre Periférica en tubo EDTA. Tubo exclusivo para esta determinación (tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO).
IMPORTANTE: SIEMPRE REFRIGERADO
Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.
Valores de referencia:

Descripción: NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS (LMA, SMD) · RUNX1 · SANGER
Código: RUNX1_MUTS
Técnica: SANGER
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: 4 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refrigerar] (Estabilidad: 4°C:1 Meses)
o 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refrigerar] (Estabilidad: 4°C:1 Meses)
Valores de referencia:

Descripción: NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS (LMA/LMMC/SMD) · SRSF2 · SANGER
Código: SRSF2_MUTS
Técnica: SANGER
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: 4 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refrigerar] (Estabilidad: 4°C:1 Meses)
o 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refrigerar] (Estabilidad: 4°C:1 Meses)
Valores de referencia:

Descripción: NEOPLASIAS MIELOIDES · IDH1(R132H), IDH2(R172W, R140Q)
Código: IDH1_IDH2
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Muestras de tejido tumoral y sangre.
Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO.
IMPORTANTE: REFRIGERADO SIEMPRE
Valores de referencia:

Descripción: NEOPTERINA ORINA
Código: NEOPTE2
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: mcmol/molcreat
Plazo: 14 días
Tubo: Orina congelada
Comentario adicional: 10 mL Orina.congelar. Proteger de la luz
Valores de referencia: (Inf. 220.0)

Descripción: NEOPTERINA SUERO
Código: NEOPTE

Descripción:	NEOPTERINA SUERO
Técnica:	LC-MS/MS
Unidades:	ng/mL
Plazo:	23 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml suero
Valores de referencia:	(Inf. 3)

Descripción:	Netherton, Sd. Sec Gen: SPINK5
Código:	GEN_000571
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	NETILMICINA
Código:	NETILMI
Técnica:	Inmunoensayo enzimático homogéneo (EMIT)
Unidades:	mcg/mL
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(6 - 10) Pico (Sup. 16) Pico - TOXICIDAD (0.5 - 2) Valle (Sup. 4) Valle - TOXICIDAD

Descripción:	NEUMOCOCO EN ORINA
Código:	NEUMOCOCO
Técnica:	Inmunocromatografía
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Muestra Microbiología
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	Neuroacantocitosis. Sec Gen: XK
Código:	GEN_000572
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Neurodeg acumulación cerebral hierro: Aceruloplasminemia. CP
Código:	GEN_000573
Técnica:	

Descripción: Neurodeg acumulación cerebral hierro: Aceruloplasminemia. CP
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Neurodeg. con depósitos de hierro: <10 genes (NGS)
Código: PANK2_MUTS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Neurodegeneración déficit de pantotenato quinasa. Gen: PANK2
Código: GEN_000574
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Neuroferritinopatía. Sec Gen: FTL
Código: GEN_000575
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Neurofibromatosis 1. NF1 - Secuenciación y evaluación ARNm
Código: NF1_ARNM
Técnica: NGS + Sanger
Unidades:
Plazo: 45 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: 2 tubos PAXgene de 5 mL Sangre total [Temperatura ambiente]
+
2 tubos de 4 mL de sangre total EDTA [Refrigerado]
Valores de referencia:

Descripción: Neurofibromatosis 1. NF1 - Secuenciación y evaluación ARNm
Código: NF1_ARNM
Técnica: NGS + Sanger
Unidades:

Descripción: Neurofibromatosis 1. NF1 - Secuenciación y evaluación ARNm
Plazo: 45 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: 2 tubos PAXgene de 5 mL Sangre total [Temperatura ambiente]
+
2 tubos de 4 mL de sangre total EDTA [Refrigerado]
Valores de referencia:

Descripción: Neurofibromatosis tipo 1: gen NF1 (NGS)
Código: NF1_DNA
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Neurofibromatosis tipo 2: gen NF2 (NGS)
Código: NF2_DNA
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato
Valores de referencia:

Descripción: NEUROFILAMENTO LIGHT(NF-L) SUERO
Código: NEUROFIL
Técnica: EnzimoInmunoanálisis
Unidades: pg/mL
Plazo: 14 días
Tubo: Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional: Plasma de EDTA en tubo de polipropileno.
Volumne mínimo: 0.5 mL

Alternativa: Suero en tubo de polipropileno. Congelar.
Valores de referencia: (Inf. 9.40) 18 años - 29 años
(Inf. 9.60) 29 años - 39 años
(Inf. 13.30) 39 años - 49 años
(Inf. 21.20) 49 años - 59 años
(Inf. 28.10) 59 años - 69 años
(Inf. 46.80) 69 años - 90 años

Descripción: NEUROMIELITIS OPTICA (ACUAPORINA 4) ANTICUERPOS IGG
Código: ANTINMO
Técnica: INMUNOFLUORESCENCIA
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal

Descripción: NEUROMIELITIS OPTICA (ACUAPORINA 4) ANTICUERPOS IGG

Comentario adicional:
```
1 mL Suero (Refrigerado)
Alt. 1 mL Plasma Citrato sódico (Refrigerado)
Alt. 1 mL Plasma EDTA Dipotásico (Refrigerado)
Alt. 1 mL Plasma Heparina litio (Refrigerado)
```

Valores de referencia:
```
Negativo <1/10
Positivo >1/10
```

Código: NEURACLCR

Descripción: NEURONALES DE SUPERFICIE ANTICUERPOS MOSAICO LCR

Técnica: Cell Binding Assay IFI

Comentario adicional: `1 mL LCR.`

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	LGI1ACLCR	90831-9		PERFIL LGI1 AC. LCR		
Prueba	AMPA1_2LCR			PERFIL AMPA 1/ AMPA 2 RECEPTORES ANTICUERPOS EN LCR		
Prueba	DPPXLCR			PERFIL DPPX ANTICUERPOS LCR		
Prueba	CASPR2LCR	90821-0		PERFIL CASPR2 AC. ANTI RECEPTOR LCR		
Prueba	GABAACLCR	90825-1		PERFIL GABA B AC. ANTI RECEPTOR LCR		
Prueba	NMDAACLCR			PERFIL NMDA AC. ANTI RECEPTOR LCR		

Código: MOSANEURO

Descripción: NEURONALES DE SUPERFICIE ANTICUERPOS MOSAICO SUERO

Técnica:

Comentario adicional: `Suero`

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	NMDAACSUER	80221-5		NMDA AC. ANTI RECEPTOR SUERO		`Negativo: Título <1/10`
Prueba	AMPA1_2			AMPA 1/ AMPA 2 RECEPTORES ANTICUERPOS EN SUERO		
Prueba	ANTIGABA	95602-9		GABA B (Subunid GABARB1/B2) AC.antireceptor, Suero		`Negativo: Título < 1/10`
Prueba	CASPR2	95600-3		AC. ANTI CASPR2 SUERO		`Negativo: Título <1/100`
Prueba	LGI1	95601-1		LGI 1 ANTICUERPOS SUERO		
Prueba	DPPXAC	95599-7		DPPX AC. (Dipeptidil Aminopeptidasa like Protein-6) SUERO		`Negativo: Título <1/10`

Descripción: Neuronopatía óptica-sordera-distonía, Sd. Sec Gen: TIMM8A

Código: GEN_000577

Técnica:

Unidades:

Descripción: Neuronopatía óptica-sordera-distonía, Sd. Sec Gen: TIMM8A
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Neuropatía ataxia retinosis pigmentosa. MTATP6. Mut. T8993G
Código: GEN_000580
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Neuropatía atáxica sensitiva-disartria-oftalmoplejia. POLG
Código: GEN_000578
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Neuropatía axonal gigante. Sec Gen: GAN
Código: GEN_000579
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Neuropatía con ataxia y retinosis pigmentosa. Gen: MTATP6
Código: GEN_000581
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Neuropatía motora distal hereditaria 2A: gen HSPB8 (NGS)
Código: HSPB8_MUTS
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.

Descripción: Neuropatía motora distal hereditaria 2A: gen HSPB8 (NGS)
Valores de referencia:

Descripción: Neuropatía motora distal hereditaria 2C: gen HSPB3 (NGS)
Código: HSPB3_MUTS
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Neuropatía óptica hereditaria de Leber: 3 mutaciones mtDNA
Código: LHON_DNA
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente
Valores de referencia:

Descripción: Neuropatía sensitiva con demencia sordera. Sec Gen: DNMT1
Código: GEN_000582
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Neuropatias hereditarias panel de genes
Código: PHARMALAP7
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Imprescindible enviar la historia clínica y formulario de petición de genética o consentimiento informado
Valores de referencia:

Descripción: Neuropatías motoras sensoriales hereditarias. Panel NGS
Código: GEN_000583
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Descripción: Neuropatías motoras sensoriales hereditarias. Panel NGS
Valores de referencia:

Descripción: Neuropatías motoras y sens. agenesia cuerpo calloso. LC12A6
Código: GEN_000584
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Neuropatías sensitivas y autonómicas hereditarias. Panel NGS
Código: GEN_000585
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: NEUROPEPTIDO Y EN SUERO
Código: NEUROPEPTY
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: pg/mL
Plazo: 19 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 0.5 mL de suero CONGELADO
CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.
Se ruega el envío de un tubo independiente para esta determinación.
Volumen mínimo: 0.3 mL
Valores de referencia: (173.0 - 1033.0)

Código: NEUROTRLCR
Descripción: NEUROTRANSMISORES LCR
Técnica: Cromatografía Líquida - Tandem masas (LC-MS/MS)
Comentario adicional: 1 mL LCR. Recubrir tubo con papel de plata para proteger de la luz. Congelar y enviar congelado. Imprescindible enviar informe clínico.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	OMDLCR	34596-7		3-ORTOMETILDOPA EN LCR	nmol/L	(81.3 - 299.5) 0-3 meses (27.0 - 119.0) 4-12 meses (5.3 - 66.9) 1-4 años (5.3 - 66.9) 4-11 años (5.3 - 66.9) 11-18 años
Prueba	MHPGLCR	47538-4		MHPG LCR	nmol/L	(89 - 242) 0-3 meses (38 - 129) 4-12 meses (38 - 129) 1-4 años (38 - 129) 4-11 años (38 - 129) 11-18 años

Componentes						
Prueba	OHTRPLCR	47546-7		5HIDROXITRIPTOFANO LCR	nmol/L	(7.3 - 29.7) 0-3 meses (7.3 - 29.7) 4-12 meses (6.1 - 20.7) 1-4 años (6.1 - 20.7) 4-11 años (6.1 - 20.7) 11-18 años
Prueba	HIAALCR	47544-2		5-HIDROXIINDOLACETICO EN LCR	nmol/L	(419 - 955) 0-3 meses (185 - 570) 4-12 meses (122 - 257) 1-4 años (65 - 211) 4-11 años (47 - 127) 11-18 años
Prueba	HVALCR	40846-8		HOMOVANILICO EN LCR	nmol/L	(415 - 1379) 0-3 meses (325 - 843) 4-12 meses (302 - 582) 1-4 años (173 - 590) 4-11 años (82 - 291) 11-18 años
Prueba	HVAHIAALCR	5004303		RATIO HVA/5-HIAA LCR		(0.9 - 2.6) 0-3 meses (0.9 - 2.6) 4-12 meses (1.2 - 4.0) 1-4 años (1.2 - 4.0) 4-11 años (1.2 - 4.0) 11-18 años
Prueba	HVAMHPGLCR	5004304		RATIO HVA/MHPG LCR		(2.3 - 8.5) 0-3 meses (2.3 - 8.5) 4-12 meses (2.3 - 8.5) 1-4 años (2.3 - 8.5) 4-11 años (1.1 - 4.0) 11-18 años

Descripción: Neutropenia aloinmune neonatal. Sec Gen: FCGR3B
Código: GEN_000586
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Neutropenia congénita 1: gen ELANE (NGS)
Código: NEUTROPENI
Técnica: NGS con TSOE de Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Neutropenia congénita severa AR tipo 3. Sec Gen: HAX1
Código: GEN_000587
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción:	NFERMEDAD MEDIBLE RESIDUAL (EMR) LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA
Código:	EMR_LMA
Técnica:	Citometria de flujo
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	1 tubo de EDTA de 5ml
Valores de referencia:	

Descripción:	Niemann-Pick. Panel NGS
Código:	GEN_000589
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Nijmegen, Sd. Sec Gen: NBN
Código:	GEN_000590
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	NIQUEL ORINA
Código:	NIQUEL2
Técnica:	ICP-MS
Unidades:	µg/l
Plazo:	7 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	Al menos 5 ml de orina al final de la semana laboral. No recolectar muestras de orina en un ambiente en el que sea más probable que ocurra la exposición. Es importante evitar que el polvo de la ropa pueda interferir en el contenido de la muestra. No recoger la orina en recipientes con base de metal, como urinarios o sartenes de metal. Recoger la orina en tubos de polipropileno incoloro libre de metales sin tapones de colores. Cuando esto no sea posible, usar para la recogida de orina un envas
Valores de referencia:	(Inf. 5.0) personas expuestas a sales insolubles de Níquel y Níquel metálico (Orina final semana laboral) (BEI-ACGIH). (Inf. 30.0) personas expuestas a sales solubles de Níquel (Orina final semana laboral) (BEI-ACGIH). (Inf. 2) Límite de cuantificación

Descripción:	NIQUEL SUERO
Código:	NIQUEL
Técnica:	ICP-MS
Unidades:	µg/l
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero. La muestra idónea es contenedor libre de metales. De forma alternativa se puede usar tubo de suero.

Descripción:	NIQUEL SUERO
Valores de referencia:	(Inf. 2) Valores de referencia orientativos para personas no expuestas. (Inf. 10) Valores de referencia orientativos para personas expuestas (propuesto por Basel RC. Biological Monitoring Methods for Industrial Chemicals).

Descripción:	Nistagmus congénito AD y ligado a X: <10 genes (NGS)
Código:	NISTAGMUS
Técnica:	NGS TSOE Illumina
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	NITRAZEPAM SUERO (MOGADON)
Código:	NITRAZEPAM
Técnica:	LC-MS/MS
Unidades:	ng/mL
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(30 - 90)

Descripción:	NKCD56+CD16+
Código:	NKCD56CD16
Técnica:	
Unidades:	% sobre NK
Plazo:	4 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(91 - 99)

Descripción:	NMDA AC. ANTI RECEPTOR SUERO
Código:	NMDAACSUER
Técnica:	Inmunocitoquímica (Cell Based Assay).
Unidades:	
Plazo:	17 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL de suero refrigerado
Valores de referencia:	Negativo: Título <1/10

Descripción:	NOCARDIA SPP DNA, MUESTRA BIOLÓGICA
Código:	NOCARDIPCR
Técnica:	HIBRIDACIÓN MOLECULAR CON AMPLIFICACIÓN (PCR)
Unidades:	
Plazo:	8 días
Tubo:	Muestra envios externos

Descripción: NOCARDIA SPP DNA, MUESTRA BIOLÓGICA

Comentario adicional:
Muestra biológica:

Líquido pericardico. Refrigerar. 4ºC: 48 Horas;-20ºC: 1 Meses
Líquido pleural. Refrigerar. 4ºC: 48 Horas;-20ºC: 1 Meses
LCR: Refrigerar. 4ºC: 48 Horas;-20ºC: 1 Meses
Humor vitreo/acuoso: Refrigerar. 4ºC: 48 Horas;-20ºC: 1 Meses
Esputo: Refrigerar. 4ºC: 48 Horas;-20ºC: 1 Meses
Biopsia de piel en suero fisiologico: Refrigerar. 4ºC: 48 Horas;-20ºC: 1 Meses
Lavado broncoalveolar: Refrigerar. 4ºC: 48 Horas;-20ºC: 1 Meses
Raspado corneal: Refrigerar. 4ºC: 48 Horas;-20ºC: 1 Meses

Muestras respiratorias profundas, muestras de biopsias cutáneas o de exudados cutáneos, o muestras de biopsias cerebrales o de líquido cefalorraquídeo. Líquido pleural, líquido pericárdico, aspirado de colección purulenta, raspado corneal, humor vitre

Valores de referencia: Valor de referencia: No se detecta

Código: NODALPARA

Descripción: NODAL-PARANODAL ANTICUERPOS (NEUROFASCINA) SUERO

Técnica:

Comentario adicional: 1 mL SUERO

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	CONTACTIN	101448-9		Contactina-1		
Prueba	NEUROF155			Neurofascina-155		
Prueba	NEUROF186			Perfil,Neurofascina-186		
Prueba	CASPR1	95600-3		CASPR1 (CONTACTIN-ASSOC.PROTEIN-1) SUERO		

Descripción: Non invasive PGT aneuploidias pack (1-8 embriones)

Código: NIPGT

Técnica:

Unidades:

Plazo: 15 días

Tubo: Tubo Especial

Comentario adicional: Medio de cultivo embrionario en kit especial. Consultar Asesoria Genetica

Valores de referencia:

Descripción: NOR-90 AC. SUERO

Código: NOR90AC

Técnica: Inmunoblot

Unidades:

Plazo: 7 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional:

Valores de referencia: Negativo

Descripción: Norovirus RNA PCR muestra

Código: NOROVIRPCR

Técnica: HIBRIDACIÓN MOLECULAR CON AMPLIFICACIÓN a TIEMPO REAL RT-PCR

Unidades:

Descripción:	Norovirus RNA PCR muestra
Plazo:	9 días
Tubo:	heces especiales
Comentario adicional:	Heces y vómitos. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO
Valores de referencia:	

Descripción:	NOTA ACLARACIÓN INFORME TEST ESPIRADO
Código:	NOTAALI
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	NT-PRO-BNP (NT-PRO-PEPTIDO NATRIURETICO CEREBRAL)
Código:	PROBNP
Técnica:	CMIA
Unidades:	pg/mL
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. Tubo alternativo: plasma de EDTA y heparina.
Valores de referencia:	(Inf. 125) < 50 años Cuadro no agudo: IC improbable (Sup. 600) < 50 años Cuadro no agudo: IC probable (Inf. 300) Cuadro agudo: IC improbable

Descripción:	NUCLEARES AC SUERO
Código:	ANA
Técnica:	Técnica IFI
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero
Valores de referencia:	Negativo <1/160

Descripción:	NUMERO TOTAL HEMATIES
Código:	HEMATIES
Técnica:	
Unidades:	10^6/µL
Plazo:	3 días
Tubo:	Sangre EDTA
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(4.60 - 6.20) Hombre (4.20 - 5.40) Mujer

Descripción:	NUMERO TOTAL LEUCOCITOS
Código:	LEUCOCITOS
Técnica:	
Unidades:	10^3/µL

Descripción: NUMERO TOTAL LEUCOCITOS
Plazo: 3 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional:
Valores de referencia: (4.00 - 11.00)

Descripción: NUMERO TOTAL PLAQUETAS
Código: PLAQ
Técnica:
Unidades: 10^3/µL
Plazo: 3 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional:
Valores de referencia: (130 - 450)

Descripción: NXP2 AC.SUERO
Código: NXP2
Técnica:
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: Negativo

Descripción: Obesidad monogénica no sindrómica: <10 genes (NGS)
Código: OBESI_MUTS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Obesidad mórbida. Sec Gen: MC4R
Código: GEN_000592
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Obesidad. Panel NGS
Código: GEN_000591
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Descripción: Obesidad. Panel NGS
Valores de referencia:

Descripción: Obesidad. Sec Gen: PPARG
Código: GEN_000593
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Oftalmoplejia ext. crónica progresiva AD tipo 4. Gen: POLG2
Código: GEN_000594
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Oftalmoplejia externa progresiva AR. Sec Gen: POLG
Código: GEN_000595
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: OJ AC. SUERO
Código: OJAC
Técnica:
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: Negativo

Descripción: OLANZAPINA SUERO
Código: OLANZAPINA
Técnica: Cromatografía Líquida/Tándem masas.
Unidades: µg/L
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: Suero congelado. 0.5 mL

Alternativa: plasma de edta congelado.

La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis.

Descripción: OLANZAPINA SUERO
Valores de referencia: (20 - 80) Indice terapéutico
(Sup. 100) Toxicidad
(Inf. 5) Límite de cuantificación

Descripción: OLIGOSACARIDOS ORINA
Código: OLIGOSACAR
Técnica: LC-MS/MS
Unidades:
Plazo: 23 días
Tubo: Orina congelada
Comentario adicional: 10 ml de orina (micción aislada)
CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO
Valores de referencia:

Código: OMALIZUMAB
Descripción: OMALIZUMAB Y AC. ANTI OMALIZUMAB
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Comentario adicional: 2 ml de suero. Toma de muestra antes de la administración de la próxima dosis.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	OMALIZ			OMALIZUMAB (P. PERFIL)	mcg/mL	
Prueba	OMALIZAC			ANTI OMALIZUMAB (P. PERFIL)		

Descripción: Omenn. Panel NGS
Código: GEN_000596
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: ONCONEURONALES LCR(CV2,PNMA2,Recov, SOX1,Gad,Titina,Zic4,etc
Código: ACAAGNENUC
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: LIQUIDO LCR INMUNO
Comentario adicional: 1 mL LCR.
Adjuntar un breve informe clínico para la interpretación de resultados.
Valores de referencia: Mediante este técnica se indentifican anticuerpos frente a: anti Hu, Yo, Ri ,CV2, PNMA2 (Ma2/Ta), Amfifisina, Recoverina, SOX1, TITINA, ZIC4, GAD64/65 Y Tr(DNER)

Código: ANNA
Descripción: ONCONEURONALES(CV2,PNMA2,Ri,Yo,Hu,Amph,Recov,Titin,SOX,ZIC)
Técnica: Inmunoblot

Código: ANNA

Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	AMPHIPHY	57749-4		PERFIL ANNA AMPHIPHYSINA AC. SUERO		Negativo
Prueba	CV2	47402-3		PERFIL ANNA CV2 AC. SUERO		Negativo
Prueba	ACYO	12853-8		PERFIL ANNA Yo AC. SUERO		Negativo
Prueba	ACHU	41769-1		PERFIL ANNA Hu AC. SUERO		Negativo
Prueba	ACRI	33008-4		PERFIL ANNA Ri AC. SUERO		Negativo
Prueba	PNMA2	56720-6		PERFIL ANNA PNMA2 (Ma2/Ta) AC. SUERO		Negativo
Prueba	TRANTICUER	63440-2		PERFIL ANNA ANTI Tr AC. (SUERO)		Negativo
Prueba	RECOVERIN	101226-9		PERFIL ANNA RECOVERINA AC. SUERO		Negativo
Prueba	SOX1	82444-1		PERFIL ANNA SOX1 AC. SUERO		Negativo
Prueba	TITINA	82449-0		PERFIL ANNA TITINA AC. SUERO		Negativo
Prueba	ZICAC	38915-5		PERFIL ANNA ZIC 4 AC. SUERO		Negativo

Descripción: Oncoproteína HER-2/neu en suero

Código: HER2NEU

Técnica: EIA

Unidades: ng/mL

Plazo: 12 días

Tubo: Suero Congelado

Comentario adicional: Congelar inmediatamente

Valores de referencia: (Inf. 15)

Descripción: Oncotype: expresión génica Cáncer de Mama

Código: ONCOTYPE

Técnica: RT-PCR

Unidades:

Plazo: 17 días

Tubo: Muestra Anatomía Patológica

Comentario adicional: Bloque de tejido tumoral mama. Tª ambiente
Informe de anatomía patológica y del oncología
Tumor INFILTRANTE
Entregar a Asesoría Genética

Valores de referencia:

Descripción: OPIACEOS

Código: OPIA

Técnica: Inmunoensayo

Unidades:

Plazo: 2 días

Tubo: Orina Drogas de Abuso

Comentario adicional:

Valores de referencia:

Descripción:	OPIACEOS CONFIRMACION EN SALIVA
Código:	OPIASAL
Técnica:	LC-MS/MS
Unidades:	ng/mL
Plazo:	10 días
Tubo:	Saliva
Comentario adicional:	Saliva recogida en kit ORAL-EZE. Solicitar kit en el almacén.
Valores de referencia:	

Descripción:	OPIACEOS EN PELO CONFIRMACION
Código:	OPIAPELO
Técnica:	Cromatografia líquida/Tanden masas (LC-MS/MS)
Unidades:	
Plazo:	17 días
Tubo:	Tubo Especial
Comentario adicional:	PEDIR KIT ESPECIAL: almacen@ctes.eurofinseu.com PEDIR PROTOCOLO DE TOMA DE MUESTRA: calidad@ctes.eurofinseu.com -Análisis Informativo: incluye kit de toma de muestra y formulario de solicitud -Cadena custodia: En caso de solicitar el análisis con validez judicial, solicitar al almacen tambien documentación de cadena custodia (acta de toma de muestra y hoja de seguimiento). El protocolo de cadena custodia debe solicitarse a calidad@ctes.eur En el caso de cadena custodia debe recogerse la muestra por duplicado.
Valores de referencia:	

Descripción:	Organoides derivados del paciente PDO
Código:	ONCOPDO
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	Muestra envios externos
Comentario adicional:	Muestra de biopsia fresca que NO tiene que pasar por laboratorio central, va directamente a Megalab Alemania. Debe de enviarse refrigerada a 4ºC.
Valores de referencia:	

Descripción:	ORO EN SUERO
Código:	ORO
Técnica:	
Unidades:	mcg/L
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 0.1) Individuos no expuestos Valores terapéuticos indicativos: Estado estacionario tras 50 mg semanales de Aurotiomalato de sodio intramuscular: aproximadamente 3000-5000 mcg/L Estado estacionario tras 6 mg diarios de Auranofina: aproximadamente 500-700 mcg/L

Descripción:	ORTO CRESOL EN ORINA (Exposicion a Tolueno)
Código:	ORTOCRESOL
Técnica:	Técnica HPLC
Unidades:	mg/g creatin.
Plazo:	11 días

Descripción:	ORTO CRESOL EN ORINA (Exposicion a Tolueno)
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	orina (micción aislada) al final de la jornada laboral. enviar refrigerada. Volumen: 5.0 mL Volumen mínimo: 2 mL
Valores de referencia:	(Inf. 0.6) Final de jornada (exposición TOLUENO) Límite de cuantificación: 0.1 mg/L

Descripción:	OSMOLALIDAD ORINA
Código:	OSMOLAL2
Técnica:	Osmometría
Unidades:	mOsm/Kg
Plazo:	3 días
Tubo:	Orina 24 Horas
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(300 - 1000) > 1 año (50 - 600) < 1 año

Descripción:	OSMOLALIDAD SUERO
Código:	OSMOLALI
Técnica:	Osmometría
Unidades:	mOsm/Kg
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 ml suero
Valores de referencia:	(275 - 300)

Descripción:	OSTEOCALCINA SUERO
Código:	OSTEOCAL
Técnica:	Inmunoensayo por quimioluminiscencia
Unidades:	ng/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero.
Valores de referencia:	(4.6 - 65.4) Hombre (6.5 - 42.3) Mujer Premenopausia (5.4 - 59.1) Mujer Posmenopausia

Descripción:	Osteocondromatosis 1 y 2: <10 genes (NGS)
Código:	OSTEOCONDR
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Osteodisplasia poliq. leucoencefalopatía esclerosant. Panel
Código:	GEN_000597

Descripción: Osteodisplasia poliq. leucoencefalopatía esclerosant. Panel
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Osteogénesis imperfecta ampliado. Panel NGS
Código: GEN_000598
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Osteogénesis imperfecta: genes COL1A1 y COL1A2 (NGS)
Código: OSTEOG_IMP
Técnica: NGS y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Osteopetrosis infantil maligna. Sec Gen: CLCN7
Código: GEN_000599
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Osteopetrosis; Albers-Schonberg, Sd. Panel NGS
Código: GEN_000600
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: OVARIO AC. SUERO
Código: OVARIOAC
Técnica: Inmunofluorescencia Indirecta.
Unidades:
Plazo: 7 días

Descripción: OVARIO AC. SUERO
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero CON gel separador
Volumen mínimo: 0.3 mL
Valores de referencia: Negativo <1/20
Positivo >1/20

Descripción: OXAZEPAM
Código: OXAZEPAM
Técnica: LC-MS/MS
Unidades: µg/L
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero SIN gel separador
Volumen mínimo: 0.57 mL
Valores de referencia: (200 - 1500)
(Inf. 25) Límite de cuantificación
(Sup. 2000) Toxicidad
(Sup. 3000) Elevada toxicidad

Código: OXCARBA
Descripción: OXCARBAZEPINA Y SU METABOLITO
Técnica: Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)
Comentario adicional: 1 mL suero sin gel separador.CONGELAR
La extracción de la muestra se debe realizar inmediatamente antes de la toma de la siguiente dosis, es decir, es pre-dosis.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	OXCAR	72659-6		NIVEL OX. SUERO	mg/L	(0.40 - 2.00) Indice terapéutico (Inf. 0.08) Límite de cuantificación
Prueba	HIDROXICAR	31019-3		METABOLITO ACTIVO DE OXCARBAZEPINA	mg/L	(5 - 30) Indice terapéutico (Inf. 1) Límite de cuantificación

---

Descripción: Oxicodona en sangre CONFIRMACION
Código: COOXCST
Técnica: LC-MS/MS
Unidades: ng/mL
Plazo: 7 días
Tubo: Tubo fluoruro
Comentario adicional: Sangre total en tubo de fluoruro. Refrigerar.

Alternativa:
Sangre total EDTA/Heparina de litio
Valores de referencia: Límite de cuantificación 5 ng/mL
Incertidumbre de medida 1.5 ng/mL
(Inf. 6.5)

Descripción: OXIDO NITRICO, SUERO
Código: OXNIT

Descripción:	OXIDO NITRICO, SUERO
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	µmol/L
Plazo:	14 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	Suero Volumen 1.0 mL Conservación Congelar Volumen mínimo 0.50 mL
Valores de referencia:	(Inf. 154) Límite orientativo

Descripción:	OXIHEMOGLOBINA
Código:	OXIHB
Técnica:	
Unidades:	%
Plazo:	9 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(94 - 99) Adultos

Descripción:	OXITOCINA EN SANGRE
Código:	OXITOCINA
Técnica:	
Unidades:	pg/mL
Plazo:	11 días
Tubo:	Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional:	plasma de edta separado y congelado
Valores de referencia:	(Inf. 700)

Descripción:	p155-p140 (TIF1 GAMMA) ANTICUERPOS SUERO
Código:	P155P140
Técnica:	Inmunoblot
Unidades:	
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	Negativo

Descripción:	P16:gen CDKN2A. Cancer pancreas (NGS)
Código:	P16_MUTS
Técnica:	PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:	

Código: RECEPTENDO
Descripción: Pack Endometriome + Eready (receptividad endometrial)
Técnica:
Comentario adicional:
```
El perfil lleva 2 KITS.
Solicitar a Asesoría Genética previamente
```

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	DISBIENDOM			Evaluacion del microbioma endometrial (Endometriome)		
Prueba	EREADY			Test de receptividad endometrial (ventana de implantación)		

Código: PFARMASUPL
Descripción: Pack Farmacogenética + Test genético suplementos y vitaminas
Técnica:
Comentario adicional:
```
Muestra: sangre EDTA BM
Cumplimentar Hoja de solicitud Wellness
```

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	FARMAGEN75			Estudio genético de respuesta a 113 fármacos		
Prueba	SUPLEMEN			Estudio genético para suplementos alimenticios y vitaminas		

Código: NUTRIPLUS
Descripción: Pack Nutrigenética + Intolerancias + Suplementos
Técnica:
Comentario adicional:
```
Muestra EDTA rotulada con BM y hoja de petición especial (wellness)
```

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	NUTRIGEN			T. genetico nutricion y metabolismo		
Prueba	INTALIGEN			Test genético intolerancia gluten, lactosa y fructosa		
Prueba	SUPLEMEN			Estudio genético para suplementos alimenticios y vitaminas		

Descripción: Paget del hueso, enfermedad de. Sec Gen: TNFRSF11A
Código: GEN_000601
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción:	Pallister-Hall, Sd. Sec Gen: GLI3
Código:	GEN_000602
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	P-AMINO FENOL (ANILINA) EN ORINA
Código:	P.AMINOFEN
Técnica:	Espectrometría
Unidades:	mg/L
Plazo:	14 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	10 mL orina fin de jornada laboral (micción aislada)
Valores de referencia:	(Inf. 50) Personas expuestas a ANILINA. Valor Límite Biológico (VLB-INSST). Al final de la jornada laboral. Observaciones: La ingesta de paracetamol puede interferir en el resultado. (Inf. 20) Límite de cuantificación

Descripción:	Pancreatitis crónica hereditaria. Sec Gen: CTRC
Código:	GEN_000603
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Pancreatitis hereditaria. Sec Gen: CFTR
Código:	GEN_000604
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Pancreatitis hereditaria: gen PRSS1 (NGS)
Código:	PRSS1
Técnica:	PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción: Pancreatitits hereditaria: gen SPINK1 (NGS)
Código: SPINK1
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: PANEL AMPLIO DIAGNÓSTICO, TERAPIA Y PRONÓSTICO (DNA y RNA)
Código: TSOTOTAL
Técnica:
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Muestras: tejido incluido en parafina.
Laboratorio Oncogenética
Valores de referencia:

Descripción: Panel avanzado de trombofilia: 23 genes
Código: TROMBO_AVA
Técnica:
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún apataro, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Código: TROMBO_BAS
Descripción: Panel básico de trombofilias: FII, FV Leiden y MTHFR
Técnica: Estudio de genotipado con sondas TaqMan mediante PCR en tiempo real (Real-Time PCR)
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
El tiempo estimado para cada prueba se contará desde el día de entrada de la muestra en el laboratorio central (dias laborables).
Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	FACIIMUT	24475-6		Trombofilia: mutación G20210A gen F2 Factor II		
Prueba	FACV_LEI	91712-0		Trombofilia: mutación G1691A (R506Q) gen F5 Factor V Leiden		
Prueba	MTHFRMUT			Trombofilia: mutaciones C677T y A1298C gen MTHFR		

Código: TROMBO_BAS
Descripción: Panel básico de trombofilias: FII, FV Leiden y MTHFR
Técnica: Estudio de genotipado con sondas TaqMan mediante PCR en tiempo real (Real-Time PCR)

Código: TROMBO_BAS

Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Comentario adicional: Alternativas: Heparina o Citrato.

El tiempo estimado para cada prueba se contará desde el día de entrada de la muestra en el laboratorio central (dias laborables).

Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	FACIIMUT	24475-6		Trombofilia: mutación G20210A gen F2 Factor II		
Prueba	FACV_LEI	91712-0		Trombofilia: mutación G1691A (R506Q) gen F5 Factor V Leiden		
Prueba	MTHFRMUT			Trombofilia: mutaciones C677T y A1298C gen MTHFR		

Descripción: PANEL CUSTOM ONCOHEMATOLOGÍA 3 - 10 GENES

Código: CUSHEM3_10

Técnica: NGS

Unidades:

Plazo: 15 días

Tubo: TUBO ONCOGENETICA

Comentario adicional: 4 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refrigerar] (Estabilidad: 4°C:1 Meses)
o 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refrigerar] (Estabilidad: 4°C:1 Meses)

Valores de referencia:

Descripción: PANEL CUSTOM ONCOHEMATOLOGÍA +25 GENES

Código: CUSHEMAS25

Técnica: NGS

Unidades:

Plazo: 15 días

Tubo: TUBO ONCOGENETICA

Comentario adicional: 4 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refrigerar] (Estabilidad: 4°C:1 Meses)
o 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refrigerar] (Estabilidad: 4°C:1 Meses)

Valores de referencia:

Descripción: PANEL CUSTOM ONCOHEMATOLOGÍA 1 - 2 GENES

Código: CUSHEM1_2

Técnica: NGS

Unidades:

Plazo: 15 días

Tubo: TUBO ONCOGENETICA

Comentario adicional: 4 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refrigerar] (Estabilidad: 4°C:1 Meses)
o 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refrigerar] (Estabilidad: 4°C:1 Meses)

Valores de referencia:

Descripción: PANEL CUSTOM ONCOHEMATOLOGÍA 1 - 2 GENES

Código: CUSHEM1_2

Técnica: NGS

Unidades:

Plazo: 15 días

Tubo: TUBO ONCOGENETICA

Descripción: PANEL CUSTOM ONCOHEMATOLOGÍA 1 - 2 GENES
Comentario adicional: 4 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refrigerar] (Estabilidad: 4°C:1 Meses)
o 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refrigerar] (Estabilidad: 4°C:1 Meses)
Valores de referencia:

Descripción: PANEL CUSTOM ONCOHEMATOLOGÍA 11 - 25 GENES · PANEL · NGS
Código: CUSHE11_25
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: 4 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refrigerar] (Estabilidad: 4°C:1 Meses)
o 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refrigerar] (Estabilidad: 4°C:1 Meses)
Valores de referencia:

Descripción: PANEL CUSTOM TEJIDO 1 - 2 GENES · PANEL · NGS
Código: CUSSOL1_2
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: 1 Pieza/s Tejido parafinado [Tªambiente] (Estabilidad: 20°C:1 Años)
Valores de referencia:

Descripción: PANEL CUSTOM TEJIDO 3 – 10 GENES ·PANEL·NGS
Código: CUSSOL3_10
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: 1 Pieza/s Tejido parafinado [Tªambiente] (Estabilidad: 20°C:1 Años)
Valores de referencia:

Descripción: Panel customizado NGS <10 genes
Código: NGSINFCUST
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: CONSULTAR SIEMPRE ANTES A ASESORÍA GENÉTICA

Tubo exclusivo para esta determinación rotulado con BM.
Valores de referencia:

Descripción: Panel customizado NGS >10 genes
Código: NGSSUPCUST
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Panel customizado NGS >10 genes

Comentario adicional: CONSULTAR SIEMPRE ANTES A ASESORÍA GENÉTICA

Tubo exclusivo para esta determinación rotulado con BM

Valores de referencia:

Descripción: Panel de 10 expansiones

Código: EXPAN_10

Técnica: PCR, TP-PCR, y análisis de fragmentos

Unidades:

Plazo: 20 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Panel de 11 expansiones

Código: EXPAN_11

Técnica: PCR, TP-PCR, y análisis de fragmentos

Unidades:

Plazo: 20 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Panel de riesgo genético

Código: PANERIESGO

Técnica: NGS

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Alternativas: Citrato.
Se puede hacer en saliva, previo envío de kit de recolección de saliva

Valores de referencia:

Código: TROMBO_PAN

Descripción: Panel de trombofilias: FII, FV Leiden, MTHFR y FXII

Técnica: Estudio de genotipado con sondas TaqMan mediante PCR en tiempo real (Real-Time PCR)

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Alternativas: Heparina o Citrato.
El tiempo estimado para cada prueba se contará desde el día de entrada de la muestra en el laboratorio central (dias laborables).

Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	FACIIMUT	24475-6		Trombofilia: mutación G20210A gen F2 Factor II		
Prueba	FACV_LEI	91712-0		Trombofilia: mutación G1691A (R506Q) gen F5 Factor V Leiden		
Prueba	MTHFRMUT			Trombofilia: mutaciones C677T y A1298C gen MTHFR		

Componentes						
Prueba	FACXIIMUT	58937-4		Trombofilia: mutación C46T gen F12 Factor XII		

Código:	TROMBO_PAN
Descripción:	Panel de trombofilias: FII, FV Leiden, MTHFR y FXII
Técnica:	Estudio de genotipado con sondas TaqMan mediante PCR en tiempo real (Real-Time PCR)
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato. El tiempo estimado para cada prueba se contará desde el día de entrada de la muestra en el laboratorio central (dias laborables). Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	FACIIMUT	24475-6		Trombofilia: mutación G20210A gen F2 Factor II		
Prueba	FACV_LEI	91712-0		Trombofilia: mutación G1691A (R506Q) gen F5 Factor V Leiden		
Prueba	MTHFRMUT			Trombofilia: mutaciones C677T y A1298C gen MTHFR		
Prueba	FACXIIMUT	58937-4		Trombofilia: mutación C46T gen F12 Factor XII		

Descripción:	Panel diagnóstico terapia y pronóstico (DNA y RNA 53 fus)
Código:	TSO500
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:	Muestras: tejido parafinado Laboratorio Oncogenética
Valores de referencia:	

Descripción:	PANEL FILM ARRAY ARTICULAR
Código:	FILMARTIC
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	PANEL FILM ARRAY GASTROINTESTINAL PCR PARASITOS VIRUS Y BACT
Código:	FILMGASTRO
Técnica:	FILM ARRAY (PCR)
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Tubo Especial
Comentario adicional:	Muestras recogidas en Fecal Swab (media Cary Blair). Solicitar dicho medio al laboratorio CENTRAL o en el lab de Nuestra señora del Rosario. 649275087
Valores de referencia:	

Descripción:	PANEL FILM ARRAY MENINGITIS
Código:	FILMMENIN
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Tubo Especial
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	PANEL FILM ARRAY RESPIRATORIO
Código:	FILMRESP
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Tubo Especial
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	PANEL FILM ARRAY SEPSIS
Código:	FILMSEPSIS
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Tubo Especial
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	Panel fusiones completo
Código:	TSORNAPAN
Técnica:	NGS
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:	Muestras:tejido incluido en parafina. Laboratorio Oncogenética
Valores de referencia:	

Descripción:	PANEL FUSIONES genes de fusión oncología mediante NGS
Código:	NGS_FUSION
Técnica:	NGS
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:	para sólido:Bloque parafina. Tª ambiente para sangre: 2 tubos de EDTA rotulados con ONCO y refrigerados
Valores de referencia:	

Descripción:	Panel germinal NGS <10 genes
Código:	NGSINF10
Técnica:	

Descripción: Panel germinal NGS <10 genes
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: CONSULTAR SIEMPRE ANTES A ASESORÍA GENÉTICA

Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Panel germinal NGS >10 genes
Código: NGSSUP10
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: CONSULTAR SIEMPRE ANTES A ASESORÍA GENÉTICA

Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Panel global de cardiopatias
Código: PHARMALAP5
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Imprescindible enviar la historia clínica y formulario de petición de genética o consentimiento informado
Valores de referencia:

Descripción: PANEL HOMOLOGUS RECOMBINATION (HRD)
Código: PANEL_HRD
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Comentario tipo tubo: Muestras: tejido tumoral incluido en parafina temperatura ambiente.
Valores de referencia:

Descripción: PANEL LINFOIDE: mut somaticas mediante NGS
Código: NGS_LINFOI
Técnica:
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: PANEL MIELOIDE: mut somaticas mediante NGS
Código: NGS_MIELOI
Técnica:
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO,.
IMPORTANTE: MUESTRA REFRIGERADA
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: PANEL ONCOHEMATOLÓGICO (LINFOMAS Y MIELOMAS) · PANEL · NGS
Código: NGS_ONCOHE
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO.
IMPORTANTE: MUESTRA REFRIGERADA
Valores de referencia:

Descripción: Panel oncología terapia pronóstico y fusiones mediante NGS
Código: TRAPRO_FUS
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Bloque parafina. Tª ambiente
Valores de referencia:

Código: TERA_FUS
Descripción: Panel oncología terapia y fusiones mediante NGS
Técnica: NGS
Comentario adicional: Bloque parafina. Tª ambiente

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	TUMOR_MUT			BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS BÁSICO · PANEL · NGS		

Descripción: Panel oncológico terapia y pronósitco completo
Código: TSODNA
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Muestras:tejido incluido en parafina.
Laboratorio Oncogenética
Valores de referencia:

Descripción:	PANEL SOMÁTICO CÁNCER COLORRECTAL AMPLIADO
Código:	NGS_COL1S
Técnica:	NGS
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:	Muestra: tejido tumoral incluido en parafina. Temperatura ambiente
Valores de referencia:	

Descripción:	PANEL SOMÁTICO CÁNCER COLORRECTAL BÁSICO
Código:	PANELCOLON
Técnica:	NGS
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:	Muestra: tejido tumoral incluido en parafina. Temperatura ambiente
Valores de referencia:	

Descripción:	PANEL SOMÁTICO CÁNCER COLORRECTAL COMPLETO
Código:	NGS_COL2S
Técnica:	NGS
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:	Muestra: tejido tumoral incluido en parafina. Temperatura ambiente
Valores de referencia:	

Descripción:	PANEL SOMÁTICO CÁNCER DE MAMA AMPLIADO
Código:	NGS_MAMA2
Técnica:	NGS
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:	Muestra: tejido tumoral incluido en parafina. Temperatura ambiente
Valores de referencia:	

Descripción:	PANEL SOMÁTICO CÁNCER DE MAMA Y OVARIO
Código:	BRCA_SOMAT
Técnica:	NGS
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:	Muestra: tejido tumoral incluido en parafina. Temperatura ambiente
Valores de referencia:	

Descripción:	PANEL SOMÁTICO CÁNCER DE PULMÓN BÁSICO
Código:	PANELPULMO
Técnica:	NGS
Unidades:	
Plazo:	15 días

Descripción: PANEL SOMÁTICO CÁNCER DE PULMÓN BÁSICO
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: `Muestra: tejido tumoral incluido en parafina. Temperatura ambiente`
Valores de referencia:

Descripción: PANEL SOMÁTICO CÁNCER DE PULMÓN COMPLETO
Código: NGS_PULM2S
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: `Muestra: tejido tumoral incluido en parafina. Temperatura ambiente`
Valores de referencia:

Código: PGLIMUTS
Descripción: PANEL SOMÁTICO GLIOMA BÁSICO
Técnica:
Comentario adicional: `Muestra: tejido tumoral incluido en parafina. Temperatura ambiente`

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	MGMT			BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · MGMT(METILACION PROMOTOR)		
Prueba	IDH1_IDH2			NEOPLASIAS MIELOIDES · IDH1(R132H), IDH2(R172W, R140Q)		
Prueba	MDFISHSRD			FISH ganacia gen SRD (región: 1p36, región control: Cen1)		
Prueba	MDFISH19Q			Alteraciones de la región 19q13. Reord/Amplificación		

Descripción: PANEL SOMÁTICO GLIOMA BÁSICO
Código: GLI1_MUTS
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: `Muestra: tejido tumoral incluido en parafina. Temperatura ambiente`
Valores de referencia:

Descripción: PANEL SOMÁTICO GLIOMA COMPLETO
Código: NGS_SNC2
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: `Muestra: tejido tumoral incluido en parafina. Temperatura ambiente`
Valores de referencia:

Descripción: PANEL SOMÁTICO HEPATOBILIAR (COLANGIOCARCINOMAS) AMPLIADO
Código: NGS_HIGS2
Técnica: NGS

Descripción:	PANEL SOMÁTICO HEPATOBILIAR (COLANGIOCARCINOMAS) AMPLIADO
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:	Comentario tipo tubo: Muestras: tejido tumoral incluido en parafina temperatura ambiente.
Valores de referencia:	

Descripción:	PANEL SOMÁTICO HEPATOBILIAR (COLANGIOCARCINOMAS) BÁSICO
Código:	NGS_HIGS
Técnica:	NGS
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:	Comentario tipo tubo: Muestras: tejido tumoral incluido en parafina temperatura ambiente.
Valores de referencia:	

Descripción:	PANEL SOMÁTICO PRÓSTATA, VEJIGA, UROTELIAL BÁSICO
Código:	NGS_PROS
Técnica:	NGS
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:	Muestras: tejido tumoral incluido en parafina temperatura ambiente.
Valores de referencia:	

Descripción:	PANEL SOMÁTICO TIROIDES COMPLETO
Código:	NGS_TIROI2
Técnica:	NGS
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:	Comentario tipo tubo: Muestras: tejido tumoral incluido en parafina temperatura ambiente
Valores de referencia:	

Descripción:	PANEL TERAPIA Y PRONOSTICO. Mutaciones somáticas por NGS
Código:	TRAT_PRON
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:	Bloque parafina. Tª ambiente
Valores de referencia:	

Descripción:	Panel triple negativo cáncer mama
Código:	TRIPLENEG
Técnica:	NGS
Unidades:	
Plazo:	20 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:	Tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.

Descripción:	Panel triple negativo cáncer mama
Valores de referencia:	

Descripción:	PAPERAS AC. IGG SUERO
Código:	PAPERASACG
Técnica:	CLIA
Unidades:	UI/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL Suero. Las pruebas realizadas confirman que es posible utilizar EDTA potásico y heparina sódica como anticoagulantes
Valores de referencia:	(Sup. 11) Positivo

Descripción:	PAPERAS AC. IGM SUERO
Código:	PAPERASACM
Técnica:	Técnica EIA
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(0.9 - 1.1) Indeterminado (Inf. 0.9) Negativo

Descripción:	PAPERAS IGG EN LCR
Código:	PAPERASGLC
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	
Plazo:	6 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 mL LCR.
Valores de referencia:	(Inf. 1) Negativo (Sup. 1) Positivo

Descripción:	PAPERAS IGM EN LCR
Código:	PAPERASMLC
Técnica:	Téc. Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	
Plazo:	6 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 mL LCR
Valores de referencia:	(Inf. 1.0) Negativo

Descripción:	PAPILOMAVIRUS ANTICUERPOS IGG SUERO
Código:	PAPILOIGG
Técnica:	ENZIMOINMUNOANÁLISIS
Unidades:	
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL.
Valores de referencia:	(Sup. 1) ó =1 Positivo (Inf. 1) Negativo

Descripción:	Paquioniquia congénita. Panel NGS
Código:	GEN_000607
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	PARACETAMOL EN SUERO
Código:	PARACETA
Técnica:	EIA
Unidades:	µg/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(10 - 25) ..Nivel terapéutico (Sup. 200) ..Toxicidad-pico máximo-(a las 4 h.de la toma) (Sup. 50) ..Nivel tóxico a las 12 h. (Inf. 120) ..Niveles tolerables a las 4 h. post-ingestión

Descripción:	PARAINFLUENZA 1-3 IGA ANTICUERPOS
Código:	PARAINFLUA
Técnica:	EIA
Unidades:	Índice
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero Alt: plasma (citrato, heparina)
Valores de referencia:	(Inf. 9) Negativo (9 - 11) Indeterminado

Descripción:	PARAINFLUENZA 1-3 IGG ANTICUERPOS
Código:	PARAINFLUG
Técnica:	EIA
Unidades:	Índice
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero Alt (heparina, citrato)
Valores de referencia:	(Inf. 9) Negativo (9 - 11) Indeterminado

Descripción:	Parálisis periódica hipercalémica 1. Sec Gen: SCN4A
Código:	GEN_000608
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Descripción: Parálisis periódica hipercalémica 1. Sec Gen: SCN4A
Valores de referencia:

Descripción: Parálisis periódica hipocal.: genes CACNA1S y SCN4A (NGS)
Código: PARHIPOCAL
Técnica: NGS Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Parálisis periódica hipocalémica 1 y 2. Panel NGS
Código: GEN_000609
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Paramiotonía congénita. Sec Gen: SCN4A
Código: GEN_000610
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: PARA-NITROFENOL EN ORINA
Código: PNITFEN
Técnica: Cromatografía de Gases / Espectrometría Masas.
Unidades: mg/g creatin.
Plazo: 11 días
Tubo: Orina Final de Jornada
Comentario adicional: Orina final de jornada
Volumen 1.0 mL
Valores de referencia: (Inf. 0.50) Fin de la jornada laboral (Exposición a Paratión) (VLB-INSST)
(Inf. 5.00) Fin de la semana laboral (Exposición a Nitrobenceno) (VLB-INSST)

Descripción: Paraparesia espástica hereditaria panel de genes
Código: PHARMALAP8
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Paraparesia espástica hereditaria panel de genes

Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Imprescindible enviar la historia clínica y formulario de petición de genética o consentimiento informado

Valores de referencia:

Descripción: Paraplejia espástica 11 (SPG11): gen SPG11 (NGS)

Código: SPG11_MUTS

Técnica: PCR, secuenciación y MLPA

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Paraplejia espástica 2 (SPG2): gen PLP1 (NGS)

Código: SPG2_MUTS

Técnica: PCR, secuenciación y MLPA

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Paraplejia espástica 30 (SPG30): gen KIF1A (NGS)

Código: SPG30

Técnica: PCR y secuenciación

Unidades:

Plazo: 40 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Paraplejia espástica 31 (SPG31): gen REEP1 (NGS)

Código: REEP1_MUTS

Técnica: PCR, secuenciación y MLPA

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.

Valores de referencia:

Descripción: Paraplejia espástica 3A (SPG3A): gen SPG3A (NGS)

Código: SPG3A_MUTS

Técnica: PCR, secuenciación y MLPA

Unidades:

Plazo: 30 días

Descripción: Paraplejia espástica 3A (SPG3A): gen SPG3A (NGS)
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Paraplejia espástica 4 (SPG4): gen SPAST (NGS)
Código: SPG4_MUTS
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningúa aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Paraplejia espástica 6 (SPG6): gen NIPA1 (NGS)
Código: SPG6_MUTS
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Paraplejia espástica 7 (SPG7): gen SPG7 (NGS)
Código: SPG7_MUTS
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Paraplejia espástica hereditaria. Panel NGS
Código: GEN_000611
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Paraplejia espástica ligada al X 1. Sd. Masa y Crash. L1CAM
Código: GEN_000612
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Paraplejia espástica ligada al X 1. Sd. Masa y Crash. L1CAM
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Paraplejia espástica ligada al X tip 2. Sec Gen: PLP1
Código: GEN_000613
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Paraplejia espástica: >10 genes (NGS)
Código: SPG_TOTAL
Técnica: NGS con TSO de Illumina y MLPA para algunos genes
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Muestras de tejido tumotal y sangre.
Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: PARASITOS HECES
Código: PARAS
Técnica: Microscopia optica
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: HECES FJADAS
Comentario adicional: Muestra de heces (preferentemente de 3 días consecutivos) recogida en recipiente copropak
Valores de referencia:

Código: VPHP
Descripción: PARASITOS Y VIRUS EN HECES POR PCR
Técnica:
Comentario adicional: Heces recogidas en Kit especifico: FECAL DNA/RNA SHIELD R1101-E. Código: 600063505. Solicitar al Almacen.
Conservar a temperatura ambiente.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	PCNOGI	54905-5		Perfil VPHP PCR NOROVIRUS GI		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	PCNGII	54906-3		Perfil VPHP PCR NOROVIRUS GII		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	PCROTA	92693-1		Perfil VPHP PCR ROTAVIRUS A		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	PCADNV	92690-7		Perfil VPHP PCR ADENOVIRUS 40+41		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	PCASTR	92691-5		Perfil VPHP PCR ASTROVIRUS		Valor de referencia: No se detecta

Componentes						
Prueba	PCSAPO	92694-9		Perfil VPHP PCR SAPOVIRUS		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	PCGILA			perfil PCR GLIARDIA LAMBLIA HECES		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	PCENHI			perfil PCR ENTAMOEBA HISTOLYTICA HECES		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	PCCRYT			perfil PCR Cryptosporidium spp. HECES		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	PCBLAST			perfil PCR BLASTOCYSTIS HOMINIS HECES		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	PCDIFR			perfil PCR DIENTAMOEBA FRAGILIS HECES		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	PCCYCA			perfil PCR CICLOSPORA CAYETANENSIS HECES		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	PCASC			perfil PCR ASCARIS SPP HECES		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	PCTAE			perfil PCR TAENIA SPP HECES		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	PCEEN			perfil PCR ENTEROCYTOZOON SPP/ENCEPHALITOZOON SPP HECES		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	PCEV			perfil PCR ENTEROBIUS VERMICULARIS HECES		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	PCSTR			perfil STRONGILOIDES SPP HECES		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	PCTT			perfil PCR TRICHURIS TRICHIURA HECES		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	PCNAM			perfil PCR NECATOR AMERICANUSHECES		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	PCANC			perfil PCR ANCYLOSTOMA SPP HECES		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	PCHYM			perfil PCR HYMENOLEPIS SPP HECES		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	VPHP_S			PARASITOS Y VIRUS EN HECES POR PCR		

Descripción:	PARATHORMONA INTACTA
Código:	PTHINTAC
Técnica:	
Unidades:	pg/mL
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Congelar si no se envía en el día. Alternativo, plasma de EDTA.
Valores de referencia:	(18.32 - 87.71) Adultos

Descripción: Parechovirus, determinación cualitativa
Código: PARECHOVIR
Técnica:
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Biología Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Valores de referencia:

Descripción: Parkinson, enfermedad de. Panel NGS
Código: GEN_000615
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: PAROXETINA
Código: PAROXETINA
Técnica: Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)
Unidades: µg/L
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
0.5 ml tubo de suero SIN gel separador
Volumen mínimo: 0.1 mL
Alternativa: Muestra de EDTA

El contenedor recomendado es el tubo seco (sin gel separador) para evitar procesos de adsorción del fármaco. En caso de no disponer de tubo seco, la extracción se puede realizar en tubo con gel separador, separando el suero dentro de las 2 horas poste

Valores de referencia:
(20 - 65) Intervalo terapéutico
(Inf. 5) Límite de cuantificación
(Sup. 120) Toxicidad

Descripción: PARVOVIRUS AC. Ig G EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
Código: PARVOACIGG
Técnica: Enzimoinmunoanalisis
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional: 0.5 ml de LCR
Valores de referencia:
(Inf. 1) Negativo
(Sup. 1) Positivo

Descripción: PARVOVIRUS AC. Ig M EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
Código: PARVOACIGM
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:

Descripción:	PARVOVIRUS AC. Ig M EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
Valores de referencia:	(Inf. 1) Negativo (Sup. 1) Positivo

Descripción:	PARVOVIRUS B19 AC. IGG SUERO
Código:	PARVB19ACG
Técnica:	Técnica CLIA (Hasta fecha 15/11/2011 Técnica ELISA)
Unidades:	UI/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. Alternativa: plasma (EDTA, citrato y heparina)
Valores de referencia:	(Inf. 2) Negativo (2.01 - 2.49) Indeterminado (Sup. 2.50) Positivo

Descripción:	PARVOVIRUS B19 AC. IGM SUERO
Código:	PARVB19ACM
Técnica:	Técnica CLIA (Hasta 15/11/2011 Técnica EIA)
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. Alternativa: plasma (citrato, plasma, heparina)
Valores de referencia:	(Inf. 0.9) Negativo (0.9 - 1.1) Indeterminado (Sup. 1.1) Positivo

Descripción:	Parvovirus B19 DNA PCR Cualitativa
Código:	PARVOVIDNA
Técnica:	PCR
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Muestra envios externos
Comentario adicional:	2ml Lavado broncoalveolar-CONGELAR 2ml LCR-CONGELAR 2 ml Médula ósea-REFRIGERAR 2 ml Plasma de EDTA-CONGELAR 2ml Sangre total EDTA-REFRIGERAR
Valores de referencia:	

Descripción:	Paternidad Prenatal no invasiva
Código:	PATERPREN
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	20 días
Tubo:	Tubo Especial
Comentario adicional:	sangre materna e hisopo bucal presunto padre. Kit especial. Pedir a Asesoría genética.
Valores de referencia:	

Descripción:	Patología esquelética hereditaria. Panel NGS
Código:	GEN_000616
Técnica:	
Unidades:	

Descripción: Patología esquelética hereditaria. Panel NGS
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Patología muscular hereditaria. Panel NGS
Código: GEN_000617
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Patología renal quística hereditaria del adulto. Panel NGS
Código: GEN_000618
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Patologías de la Retina. Panel
Código: GEN_000619
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Patologías del espectro branquio-oto-renal. Panel NGS
Código: GEN_000620
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Patologías del tejido conectivo. Panel NGS
Código: GEN_000621
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción:	PCA-2 (CITOPLASMA DE CELULAS DE PURKINJE TIPO 2 AC.SUERO
Código:	PCA2
Técnica:	Inmunofluorescencia Indirecta
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero
Valores de referencia:	Negativo <1:60

Descripción:	P-CLOROBENCENO ORINA(EXPOSICION A)
Código:	P.CLOROFEN
Técnica:	Técnica HPLC
Unidades:	mg/g creatin.
Plazo:	23 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	10 ml orina aislada al final de la semana laboral
Valores de referencia:	(Inf. 20.0) Final Jornada laboral en personas expuestas a CLOROBENCENO. (Valor límite biológico -BEI-ACGIH)

Descripción:	PCNA (PROLIFERATING CELL NUCLEAR ANTIGEN) AC.
Código:	AC.PCNA
Técnica:	IFI
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL
Valores de referencia:	Negativo

Descripción:	PCR - Ultrasensible
Código:	PCRULTRA
Técnica:	Inmunoquimica
Unidades:	mg/L
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 mL suero o plasma heparina
Valores de referencia:	(Inf. 1) Riesgo cardiovascular bajo (1 - 3) Riesgo cardiovascular moderado (Sup. 3) Riesgo cardiovascular alto

Descripción:	PCR EN RESTOS ABORTIVOS
Código:	PCRABORT
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	Muestra Citogenética
Comentario adicional:	Muestra en medio de cultivo. Refrigerada. Contactar con genetica@megalab.es para envío de medio
Valores de referencia:	

Descripción:	PDF aliento SIBO / Intolerancia
Código:	PDF_ALIENT
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Test Aliento
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	PDGFR AC.SUERO
Código:	PDGFR
Técnica:	Inmunoblot
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	Negativo

Descripción:	Pendred, Sd. Panel NGS
Código:	GEN_000622
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Pepsinogeno I en suero
Código:	PEPSINOG
Técnica:	Técnica Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	ng/mL
Plazo:	13 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 ml suero Volumen mínimo 0.57 mL
Valores de referencia:	(25 - 200)

Descripción:	PEPTIDO C EN ORINA
Código:	PEPTIDCORI
Técnica:	Inmunoluminiscencia
Unidades:	mcg/24 h
Plazo:	3 días
Tubo:	Orina 24 Horas
Comentario adicional:	10 ml orina 24. Indicar volumen 24 h. refrigerar.
Valores de referencia:	(23.70 - 207.00)

Descripción:	PEPTIDO C SUERO
Código:	PEPTIC

Descripción:	PEPTIDO C SUERO
Técnica:	Téc. ICMA
Unidades:	ng/mL
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	suero o plasma heparina
Valores de referencia:	(0.8 - 5.2)

Descripción:	PEPTIDO CICLICO CITRULINADO AC. SUERO
Código:	PEPCICITRU
Técnica:	Téc..ICMA
Unidades:	U/mL
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero/ Plasma Heparina/ Plasma EDTA tripotásico.
Valores de referencia:	(Inf. 5) Negativo

Descripción:	PEPTIDO INTESTINAL VASOACTIVO PLASMA (VIP)
Código:	VIP
Técnica:	Radioinmunoanálisis
Unidades:	pmol/L
Plazo:	14 días
Tubo:	Plasma trasylol/aprotinina
Comentario adicional:	1 mL plasma Aprotinina (Sangre total EDTA con Aprotinina)CONGELADO Alternativa: 1 mL plasma EDTA congelado Volumen mínimo: 0.5 mL
Valores de referencia:	(7.30 - 25.4)

Descripción:	Peptido Liberador de Pro-Gastrina (Pro-GRP) en suero
Código:	GRP
Técnica:	Técnica Quimioluminiscencia
Unidades:	pg/mL
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 mL de SUERO. CONGELAR. Volumen: 400.0 uL Volumen mínimo: 200 uL Alternativa: PLASMA DE EDTA, PLASMA HEPARINA SÓDICA, PLASMA HEPARINA DE LITIO. CONGELAR.
Valores de referencia:	(Inf. 36.7)

Descripción:	PEPTIDO NATRIURETICO CEREBRAL PLASMA
Código:	BNP
Técnica:	CLIA
Unidades:	pg/mL
Plazo:	6 días
Tubo:	Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional:	1 mL plasma EDTA congelado

Descripción:	PEPTIDO NATRIURETICO CEREBRAL PLASMA
Valores de referencia:	(Inf. 100) En pacientes con sospecha de insuficiencia cardiaca (IC) aguda, valores de BNP inferiores a 100 pg/mL, proporcionan un alto valor predictivo negativo (VPN) para excluir la presencia de IC. Los valores de BNP superioes a 400 pg/mL presentan un alto valor predictivo positivo (VPP).

Descripción:	PÉPTIDO RELACIONADO CON EL GEN DE CALCITONINA (CRGP), PLASMA
Código:	CGRP
Técnica:	EIA
Unidades:	ng/mL
Plazo:	13 días
Tubo:	Plasma trasylol/aprotinina
Comentario adicional:	Plasma EDTA Aprotinina. Congelar.
Valores de referencia:	(Inf. 2.8)

Descripción:	PEPTIDOS DE GLUTEN EN HECES
Código:	GLUTHECES
Técnica:	EIA
Unidades:	µg GIP/gr
Plazo:	12 días
Tubo:	HECES CONGELADAS
Comentario adicional:	1 g heces. Congelar y enviar congelado. No es necesario estar en ayunas ni preparación especial. Evitar contacto con orina o agua durante la obtención de la muestra.
Valores de referencia:	(Inf. 0.16) Resultados positivos indican la presencia de péptidos del gluten, compatible con su ingesta

Descripción:	PERAMPANEL (FYCOMPA)
Código:	PERAMPANEL
Técnica:	Cromatografía Líquida -Tándem Masas
Unidades:	ng/mL
Plazo:	12 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	(180 - 980)

Descripción:	PERFIL 14 HIDROXI-TAMOXIFENO
Código:	OHTAMOXI
Técnica:	HPLC-Espectrometría de masas
Unidades:	µg/L
Plazo:	10 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(1.10 - 6.50)

Descripción:	PERFIL 17-CETOESTEROIDES (ETIOCOLANOLONA) ORINA24H
Código:	ETIOCOL2
Técnica:	
Unidades:	mg/24 h

Descripción: PERFIL 17-CETOESTEROIDES (ETIOCOLANOLONA) ORINA24H
Plazo: 11 días
Tubo:
Comentario adicional:
Valores de referencia: (2.50 - 5.00) Hombre
(1.50 - 3.50) Mujer

Código: EPIDERMAC
Descripción: PERFIL ACS. EPIDERMIS (MEMBRANA BASAL Y SUBST. INTER.)
Técnica: Inmunofluorescencia indirecta
Comentario adicional: 1 ml suero

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	EPIDERAC	57737-9		PERFIL EPIDERMAC (ANTI MEMBRANA BASAL)	Titulo	Negativo <1:10
Prueba	SUBSINTER	57737-9		PERFIL EPIDERMAC (SUBSTANCIA INTERCELULAR)	Titulo	Negativo <1:10

Código: EPIDERMAC
Descripción: PERFIL ACS. EPIDERMIS (MEMBRANA BASAL Y SUBST. INTER.)
Técnica: Inmunofluorescencia indirecta
Comentario adicional: 1 ml suero

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	EPIDERAC	57737-9		PERFIL EPIDERMAC (ANTI MEMBRANA BASAL)	Titulo	Negativo <1:10
Prueba	SUBSINTER	57737-9		PERFIL EPIDERMAC (SUBSTANCIA INTERCELULAR)	Titulo	Negativo <1:10

Código: EPIDERMAC
Descripción: PERFIL ACS. EPIDERMIS (MEMBRANA BASAL Y SUBST. INTER.)
Técnica: Inmunofluorescencia indirecta
Comentario adicional: 1 ml suero

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	EPIDERAC	57737-9		PERFIL EPIDERMAC (ANTI MEMBRANA BASAL)	Titulo	Negativo <1:10
Prueba	SUBSINTER	57737-9		PERFIL EPIDERMAC (SUBSTANCIA INTERCELULAR)	Titulo	Negativo <1:10

Descripción: PERFIL AMPA 1/ AMPA 2 RECEPTORES ANTICUERPOS EN LCR
Código: AMPA1_2LCR
Técnica:

Descripción:	PERFIL AMPA 1/ AMPA 2 RECEPTORES ANTICUERPOS EN LCR
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	LIQUIDO LCR INMUNO
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	PERFIL ANNA Ri AC. SUERO
Código:	ACRI
Técnica:	Inmunoblot
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	Negativo

Descripción:	PERFIL ANNA Yo AC. SUERO
Código:	ACYO
Técnica:	Inmunoblot
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	Negativo

Descripción:	PERFIL ANNA ZIC 4 AC. SUERO
Código:	ZICAC
Técnica:	Inmunoblot
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	Negativo

Descripción:	PERFIL ARABINOSA EN ORINA
Código:	ARABINOSA
Técnica:	Cromatografía de gases
Unidades:	mg/g creatinina
Plazo:	23 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	15 mL primera orina de la mañana
Valores de referencia:	(Inf. 25)

Descripción:	PERFIL ARABITOL EN ORINA
Código:	ARABITOL
Técnica:	Cromatografía de gases
Unidades:	mg/g creatin.
Plazo:	23 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	15 mL primera orina de la mañana

Descripción: PERFIL ARABITOL EN ORINA
Valores de referencia: (Inf. 50)

Descripción: PERFIL CASPR2 AC. ANTI RECEPTOR LCR
Código: CASPR2LCR
Técnica: Cell Binding Assay IFI
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: LIQUIDO LCR INMUNO
Comentario adicional: 1 mL LCR.
Valores de referencia:

Código: CF_SMA
Descripción: Perfil CF delta508 + SMN1/2 Family Health
Técnica:
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	UNA_MUTACI			Análisis de 1 mutacion de cualquier gen (sec. Sanger)		
Prueba	SMN_PCR			Atrofia muscular espinal: deleciones en SMN1 y SMN2		

Código: CITOVAG
Descripción: PERFIL CITOLOGÍA VAGINAL
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	NREGCIT			NREGCIT		
Prueba	ESTHORM			ESTHORM		
Prueba	CATCALIDAD			CATCALIDAD		
Prueba	ESTMICRO			ESTMICRO		
Prueba	ASPMORG			Aspecto Morfológico		
Prueba	RESDIAG			Resumen Diagnóstico		
Prueba	NOTACITO			Nota Citologia		
Prueba	SNOMEDC			SNOMED Citologías		
Prueba	PATO			PATÓLOGO		
Prueba	TDMVAGINAL			TIPO DE MUESTRA VAGINAL		
Prueba	CITOTECNIC			CITOTÉCNICO		

Código: MICROINMAV
Descripción: Perfil Citometria Microinmunoterapia Avanzado
Técnica:
Comentario adicional: 1 tubo de EDTA de 5ml

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	LINFOTOT	30364-4		LINFOCITOS TOTALES (POBLACIONES LINFOCITARIAS)	/µL	(1000 - 4500)
Prueba	CD3	8124-0		MARCADORES LINFOIDES (CD3)	%	
Prueba	CD3T	8122-4		LINFOCITOS CD3 TOTALES	/µL	
Prueba	CD4	8123-2		CD4 (T4)	%	(25 - 66) 2 años - 5 años (26 - 61) 5 años - 10 años (20 - 65) 10 años - 16 años (28 - 64) > 16 años
Prueba	CD4T	24467-3		CD4 (T4) TOTAL	/µL	(500 - 2700) 2 años - 5 años (400 - 2500) 5 años - 10 años (400 - 2100) 10 años - 16 años (500 - 2000) > 16 años
Prueba	CD8	8101-8		CD8 (T8)	%	(9 - 49) 2 años - 5 años (13 - 47) 5 años - 10 años (14 - 40) 10 años - 16 años (12 - 40) > 16 años
Prueba	CD8T	14135-8		CD8 (T8) TOTAL	/µL	(200 - 1800) 2 años - 5 años (200 - 1700) 5 años - 10 años (300 - 1300) 10 años - 16 años (200 - 1200) > 16 años
Prueba	CD8_CD57			Linfocitos Citotoxicos (CD8+CD57-)	%	(12 - 24) sobre población linfoide
Prueba	CD8_CD57T			Linfocitos Citotoxicos (CD8+CD57-) Totales	/µL	(256 - 777)
Prueba	CD8CD57			Linfocitos Supresores (CD8+CD57+)	%	(1.7 - 12) sobre población linfoide
Prueba	CD8CD57T			Linfocitos Supresores (CD8+CD57+) Totales	/µL	(60 - 447)
Prueba	COCCD857			Cociente Linfocitos Citotoxicos/Supresores		(1.00 - 4.00)
Prueba	COCIENTE	54218-3		COCIENTE T4/T8		
Prueba	CD3DR	18408-5		LINFOCITOS T ACTIVADOS	%	
Prueba	CD3DRT	26568-6		CD3DR TOTALES	/µL	
Prueba	CD19	8117-4		MARCADORES LINFOIDES CD19	%	
Prueba	CD19T	8116-6		LINFOCITOS CD19 TOTALES	/µL	
Prueba	CD19CD5			Linfocitos B1 (CD19+CD5+)	%	(0 - 2.5) sobre población linfoide

Componentes						
Prueba	CD19CD5T			Linfocitos B1 (CD19+CD5+) Totales	/µL	(0 - 60)
Prueba	CD3_5616	8112-5		CD3-CD56+CD16+	%	(4 - 16)
Prueba	CD3_5616T	9728-7		CD3-CD56+CD16+ TOTALES	/µL	
Prueba	CD4CD45RA	13336-3		LINFOCITOS T4 NAÏVE (CD4+/CD45RA+)	% sobre CD4	(33 - 66)
Prueba	CD4CD45RAT			LINFOCITOS T4 (CD4+/CD45RA+) TOTALES	/µL	(83 - 675)
Prueba	T4REGULADO			Perfil T4 Reguladores (CD4+CD25+CD127 low) %	%	(1 - 3) sobre población linfoide
Prueba	T4REGULATO			Perfil T4 Reguladores(CD4+CD25+CD12 low) TOTALES	cel/mm3	(25 - 74)
Prueba	CD4CD29			LINFOCITOS T HELPER (CD4 + CD29+)	%	
Prueba	CD4CD29T			LINFOCITOS T HELPER (CD4 + CD29+) TOTALES	/µL	
Prueba	CR4CDR			Coexpresión CD4+CDR+	%	(3 - 5) Mujer
Prueba	CD4CDRA			Linfocitos T4 activados (CD4+DR+)	/µL	(55 - 142) Mujer (55 - 142) Hombre
Prueba	CD8DR			CD8+DR+	% sobre CD8	
Prueba	CD8DRT			CD8+DR+ TOTALES	/µL	
Prueba	CD3CD56	17135-5		CD3+CD56+	%	(Inf. 13)

Código: CLOBAZAMN

Descripción: perfil CLOBAZAM + NORCLOBAZAM EN SUERO

Técnica:

Comentario adicional: 2 ML DE SUERO

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	CLOBAZAM	59632-0		PERFIL CLOBAZAM SUERO	ng/mL	(30 - 300) Rango terapéutico (AGNP 2017)
Prueba	NORCLOBAZA	35107-2		PERFIL NORCLOBAZAM SUERO	ng/mL	(300 - 3000) Rango terapéutico (AGNP 2017)

Código: CLOZAPINAS

Descripción: PERFIL CLOZAPINA Y DESMETILCLOZAPINA

Técnica:

Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.

Componentes						
Prueba	CLOZAPINA	6896-5		PERFIL CLOZAPINA EN SUERO	µg/L	(350 - 600) I. Terapéutico
Prueba	DESCLOZAPI	10992-6		PERFIL DESMETILCLOZAPINA (o norclozapina)	µg/L	(100 - 300) (Inf. 24) Límite de cuantificación

Descripción: Perfil Confirmación de Cocaina en sangre por LC-MS/MS
Código: COCASAN
Técnica: LC-MS/MS
Unidades: ng/mL
Plazo: 7 días
Tubo: Tubo fluoruro
Comentario adicional: 10 mL Sangre total Oxalato/Fluoruro (1 x Tubo sangre EDTA) [Refrigerar]
Valores de referencia: (Inf. 1.3) Incertidumbre de medida
(Inf. 8) Límite de cuantificación

Código: COXACKAGL
Descripción: PERFIL COXSACKIE A AC. IgG EN LCR
Técnica: IFI
Comentario adicional: 1 mL LCR.Se recomienda efectuar análisis simultáneo de suero y LCR

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	COXACKA9GL	56621-6		PERFIL COXSACKIE A9 AC. IgG EN LCR		Positivo título>1:1
Prueba	COXACKA7GL	22219-0		PERFIL COXSACKIE A7 AC. IgG EN LCR		Positivo título>1:1
Prueba	COXACA16GL	22214-1		PERFIL COXSACKIE A16 AC. IgG EN LCR		Positivo título>1:1
Prueba	COXACA24GL			PERFIL COXSACKIE A24 AC. IgG EN LCR		Positivo título>1:1

Código: COXACKAG
Descripción: PERFIL COXSACKIE A AC. IgG EN SUERO
Técnica: Inmunofluorescencia indirecta
Comentario adicional: 1 mL suero. Refrigerado.
Volumen mínimo: 0.15 mL

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	COXACKIA9G	58792-3		PERFIL COXSACKIE A9 AC. IGG EN SUERO		Negativo título<1:100
Prueba	COXACKIA7G	59584-3		PERFIL COXSACKIE A7 AC. IGG EN SUERO		Negativo título<1:100
Prueba	COXACKA16G	59583-5		PERFIL COXSACKIE A16 AC. IGG EN SUERO		Negativo título<1:100

Componentes						
Prueba	COXACKA24G	59582-7		PERFIL COXSACKIE A24 AC. IGG EN SUERO		Negativo título<1:100

Código: COXACKAML
Descripción: PERFIL COXSACKIE A AC. IgM EN LCR
Técnica: IFI
Comentario adicional: 1 mL LCR.Se recomienda efectuar análisis simultáneo de suero y LCR

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	COXACKA9ML	5006649		PERFIL COXSACKIE A9 AC. IgM EN LCR		Positivo título>1:1
Prueba	COXACKA7ML	22219-0		PERFIL COXSACKIE A7 AC. IgM EN LCR		Positivo título>1:1
Prueba	COXACA16ML	22214-1		PERFIL COXSACKIE A16 AC. IgM EN LCR		Positivo título>1:1
Prueba	COXACA24ML			PERFIL COXSACKIE A24 AC. IgM EN LCR		Positivo título>1:1

Código: COXACKAM
Descripción: PERFIL COXSACKIE A AC. IgM EN SUERO
Técnica: Inmunofluorescencia indirecta.
Comentario adicional: 1 mL suero. refrigerar.
Volumen mínimo: 0.15 mL

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	COXACKIA9M	58791-5		PERFIL COXSACKIE A9 AC. IGM EN SUERO		Negativo título < 1:10
Prueba	COXACKIA7M	59581-9		PERFIL COXSACKIE A7 AC. IGM EN SUERO		Negativo título < 1:10
Prueba	COXACKA16M	59580-1		PERFIL COXSACKIE A16 AC. IGM EN SUERO		Negativo título < 1:10
Prueba	COXACKA24M	59579-3		PERFIL COXSACKIE A24 AC. IGM EN SUERO		Negativo título < 1:10

Código: DERMAELISA
Descripción: Perfil DERMA AC:BP180,BP230,DESMOGL,COLAG,ENVOPLAQ)
Técnica:
Comentario adicional: Suero
Alternativa: Plasma de EDTA, citrato, heparina

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	BP180	57738-7		ANTICUERPOS BP180 (BPAG2)	Ratio	(Inf. 1) Negativo

Componentes						
Prueba	BP230	5004450		BP230 (PENFIGOIDE BULLOSO) AC. SUERO	Ratio	(Inf. 1) Negativo
Prueba	DESMOGL1	57411-1		DESMOGLEINA-1 (Dsg-1) AC. SUERO	Ratio	(Inf. 1.00) Negativo
Prueba	DESMOGL3	57412-9		DESMOGLEINA-3 (Dsg-3) AC. SUERO	Ratio	(Inf. 1.00) Negativo
Prueba	ENVOPLAQ			ENVOPLAQUINA ANTICUERPOS SUERO	Ratio	(Inf. 1) Negativo
Prueba	COLAGTVII	94096-5		COLAGENO TIPO VII NC1 ANTICUERPOS SUERO	Ratio	(Inf. 1) Negativo

Código: DERMAELISA
Descripción: Perfil DERMA AC:BP180,BP230,DESMOGL,COLAG,ENVOPLAQ)
Técnica:
Comentario adicional: Suero
Alternativa: Plasma de EDTA, citrato, heparina

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	BP180	57738-7		ANTICUERPOS BP180 (BPAG2)	Ratio	(Inf. 1) Negativo
Prueba	BP230	5004450		BP230 (PENFIGOIDE BULLOSO) AC. SUERO	Ratio	(Inf. 1) Negativo
Prueba	DESMOGL1	57411-1		DESMOGLEINA-1 (Dsg-1) AC. SUERO	Ratio	(Inf. 1.00) Negativo
Prueba	DESMOGL3	57412-9		DESMOGLEINA-3 (Dsg-3) AC. SUERO	Ratio	(Inf. 1.00) Negativo
Prueba	ENVOPLAQ			ENVOPLAQUINA ANTICUERPOS SUERO	Ratio	(Inf. 1) Negativo
Prueba	COLAGTVII	94096-5		COLAGENO TIPO VII NC1 ANTICUERPOS SUERO	Ratio	(Inf. 1) Negativo

Descripción: PERFIL DERMATÁN SULFATO
Código: DERMATAN
Técnica: Cromatografía líquida/Tándem masas (LC-MS/MS)
Unidades: mg/g creatinina
Plazo: 17 días
Tubo: Orina congelada
Comentario adicional: 10 mL orina. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.INDISPENSABLE enviar historia clínica
Valores de referencia: (Inf. 22) < 3 años
(Inf. 18) 4 años - 13 años
(Inf. 9) > 13 años

Descripción: PERFIL DIAZEPAM (DIAZEPAM)
Código: DIAZEPAM
Técnica: LC-MS/MS
Unidades: mcg/mL
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 3 mL de suero
Valores de referencia:

Descripción: PERFIL DPPX ANTICUERPOS LCR
Código: DPPXLCR
Técnica:
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: Líquidos Biológicos
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Código: DIPCANONCO
Descripción: Perfil ensayo DIPCAN oncogenética
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
	NGSDIPCANS					
	NGSDIPCANF					

Código: PEADRENAL
Descripción: PERFIL ESTRES ADRENAL EN SALIVA CORTISOL /DEHA-S
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Comentario adicional:

1 mL de Saliva por toma. Toma de muestras de 8h, 12h, 16h, y 24h en tubos especiales (salivette).

En la hora previa a la toma de la muestra: No tomar ningún alimento, bebida, medicamento, masticar chicle ni aplicar ningún producto en los labios.

Tampoco se lave los dientes ni utilice ningún colutorio para enjuagarse la boca.

INSTRUCCIONES:

-Destapar el tubo correspondiente (1, 2, 3 o 4) según la hora, y, con las manos limpias y la punta de los dedos, extraer la torunda el tubo.

-Introducir la torunda en la boca, mantenerla 2 minutos por debajo de la lengua, para que quede totalmente empapada de saliva. Deberá realizar ligeros movimientos de mandíbula espaciados en el tiempo, durante esos 2 minutos, para estimular la salivaci

-Volver a introducir la torunda (impregnada en saliva) en el tubo pequeño y taparlo correctamente.

Conservar refrigeradas todas las muestras hasta la entrega en el laboratorio.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	PEACORT8	58674-3		PERFIL ESTRES ADRENAL SALIVA CORTISOL 8H	ng/mL	(3.00 - 9.00)
Prueba	PEACORT12	58642-0		PERFIL ESTRES ADRENAL SALIVA CORTISOL 12H	ng/mL	(1.50 - 3.00)
Prueba	PEACORT16	58668-5		PERFIL ESTRES ADRENAL SALIVA CORTISOL 16H	ng/mL	(1.00 - 3.00)
Prueba	PEACORT24	58644-6		PERFIL ESTRES ADRENAL SALIVA CORTISOL 24H	ng/mL	(0.80 - 1.20)
Prueba	PEADEHAS12			PERFIL ESTRES ADRENAL SALIVA DEHA-S 12	ng/mL	(3.00 - 10.00)
Prueba	PEADEHAS16			PERFIL ESTRES ADRENAL SALIVA DEHA-S 16	ng/mL	(3.00 - 10.00)
Prueba	PEACP			PERFIL ESTRES ADRENAL SALI VALOR PROMEDIO CORTISOL (12H-16H)	ng/mL	

Componentes						
Prueba	PEADP			PERFIL ESTRES ADRENAL SALIVA VALOR PROMEDIO DHEA-S (12H-16H)	ng/mL	
Prueba	PEAGRAFI			PERFIL ESTRES ADRENAL SALIVA GRAFICO		

Descripción:	PERFIL GABA B AC. ANTI RECEPTOR LCR
Código:	GABAACLCR
Técnica:	Cell Binding Assay IFI
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	LIQUIDO LCR INMUNO
Comentario adicional:	1 mL LCR.
Valores de referencia:	

Descripción:	PERFIL GD1B AC. IgG LCR (GANGLIOSIDO GD1B)
Código:	GANGGD1B
Técnica:	EIA
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	LIQUIDO LCR INMUNO
Comentario adicional:	1 ml LCR Se recomienda realizar analisis simultaneo en suero y LCR
Valores de referencia:	

Descripción:	PERFIL GENÉTICO RIESGO OSTEOPOROSIS
Código:	OSTEOPGENE
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	5 Ml de sangre EDTA SE DERIVA A VIVOLABS
Valores de referencia:	

Descripción:	Perfil genómico tumoral ampliado (ADN + ARN)
Código:	CGP_PANEL
Técnica:	NGS
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:	Muestra: tejido tumoral incluido en parafina. Temperatura ambiente
Valores de referencia:	

Descripción:	PERFIL GQ1B AC. IgG LCR (GANGLIOSIDO GQ1B)
Código:	GANGGQ1B
Técnica:	EIA
Unidades:	
Plazo:	15 días

Descripción: PERFIL GQ1B AC. IgG LCR (GANGLIOSIDO GQ1B)
Tubo: LIQUIDO LCR INMUNO
Comentario adicional: Se recomienda realizar análisis simultaneo en suero y LCR
Valores de referencia:

Descripción: PERFIL HEPARÁN SULFATO
Código: HEPARAN
Técnica: Cromatografía líquida/Tándem masas (LC-MS/MS)
Unidades: mg/g creatinina
Plazo: 17 días
Tubo: Orina congelada
Comentario adicional: 10 mL orina. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.INDISPENSABLE enviar historia clínica
Valores de referencia: (Inf. 10) < 3 años
(Inf. 8) 4 años - 13 años
(Inf. 5) > 13 años

Descripción: PERFIL LGI1 AC. LCR
Código: LGI1ACLCR
Técnica: Cell Binding Assay Inmunofluorescencia indirecta
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: LIQUIDO LCR INMUNO
Comentario adicional: 1 mL LCR.
Valores de referencia:

Código: TH1Y2_TH17
Descripción: PERFIL LINFOCITARIO Th1/Th2/Th17/Tfh, SANGRE TOTAL
Técnica: Citofluorimetría de flujo
Comentario adicional: 1 mL Sangre total (anticoagulante: EDTA)

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	LINF_TFH			Perfil Linf Tfh CXCR5+, % LT CD4+	% LT CD4+	(0.12 - 1.16) < 1 año (1.49 - 5.03) 1 año - 6 años (1.65 - 8.11) 6 años - 19 años (3.59 - 10.45) > 19 años
Prueba	LINF_TH1			Perfil Linf Th1 (CXCR3+CCR6-), % LT CD4+	% LT CD4+	(3 - 17) < 2 años (6 - 17) 2 años - 4 años (8 - 18) 4 años - 6 años (6 - 22) 6 años - 8 años (9 - 21) 8 años - 13 años (11 - 28) > 14 años
Prueba	LINF_TH2			Perfil Linf Th2 (CXCR3-CCR6-), %LT CD4+	% LT CD4+	(5 - 14) < 2 años (6 - 15) 2 años - 4 años (7 - 19) 4 años - 6 años (5 - 14) 6 años - 8 años (8 - 14) 8 años - 13 años (7 - 16) > 14 años
Prueba	LINF_TH17			Perfil Linf Th17 (CXCR3-CCR6+), % LT CD4+	% LT CD4+	(1 - 8) < 2 años (3 - 7) 2 años - 4 años (4 - 11) 4 años - 6 años (3 - 10) 6 años - 8 años (5 - 11) 8 años - 13 años (6 - 14) > 13 años

Componentes						
Prueba	LINF_TH1_7			Perfil Linf Th 1/17 (CXCR3+CCR6+), % LT CD4+	% LT CD4+	(1 - 6) < 2 años (2 - 7) 2 años - 4 años (3 - 10) 4 años - 8 años (4 - 14) 8 años - 13 años (7 - 19) > 13 años

Descripción: perfil LINFOCITOS T CD8 DE MEMORIA CENTRAL (CD45RO+ CCR7+)
Código: T8CM
Técnica:
Unidades: % sobre CD8
Plazo: 4 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:
Valores de referencia:
(3 - 15) < 2 años
(2 - 13) 2 años - 4 años
(4 - 11) 4 años - 6 años
(2 - 12) 6 años - 8 años
(2 - 15) 8 años - 13 años
(3 - 12) > 13 años

Código: LYMECD57NK
Descripción: PERFIL LYME CITOMETRÍA (CD57+NK CÉLULAS)
Técnica: Citometría de flujo
Comentario adicional: 5 ml de EDTA. Envío inmediato

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	LINFOTOT	30364-4		LINFOCITOS TOTALES (POBLACIONES LINFOCITARIAS)	/µL	(1000 - 4500)
Prueba	LYMECD57	8134-9		PERFIL LYME CD57	%	(2 - 23)
Prueba	LYMECD57T	21017-9		PERFIL LYME CD57 TOTALES	/µL	(40 - 500)
Prueba	LYMECD3NO	73904-5		PERFIL LYME CD57 CD3- (NK CÉLULAS)	%	(2 - 60)
Prueba	LYMECD3NT	73902-9		PERFIL LYME CD57 CD3- (NK CÉLULAS)	/µL	(100 - 360)

Código: MFENIDRITA
Descripción: PERFIL METILFENIDATO Y ACIDO RITALINICO SUERO
Técnica: Cromatografía líquida de alta eficacia-Espectrometría de masas
Comentario adicional: 1 mL suero/ alternativa 1 mL plasma Heparina litio. Refrigerar

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	MFENIDATO	3807-5		PERFIL METILFENIDATO EN SUERO	µg/L	(13.00 - 22.00)
Prueba	RITALINICO			PERFIL A• CIDO RITALI• NICO EN SUER	µg/L	(10 - 260)

Código: MFENITRIT2
Descripción: PERFIL METILFENIDATO Y ACIDO RITANILICO EN ORINA

Código: MFENITRIT2
Técnica: Cromatografia de gases -Espectrometria de masas
Comentario adicional: 5 ML DE ORINA REFRIGERADA

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	MFENIDATO2	3809-1		PERFIL METILFENIDATO EN ORINA	ng/mL	(Inf. 1.00)
Prueba	RITANILIC2			PERFIL ACIDO RITALINICO EN ORINA	ng/mL	(Inf. 100)

Descripción: PERFIL N-DESMETIL-TAMOXIFENO
Código: NDESMETILT
Técnica: HPLC-Espectrometría de masas
Unidades: µg/L
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional:
Valores de referencia: (120 - 240)

Código: NKVERDADE
Descripción: PERFIL NK VERDADEROS CITOMETRIA
Técnica: Citometria de flujo
Comentario adicional: 5 ML DE EDTA ENVIO INMEDIATO

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Perfil	NKT			CELULAS NKT (CELULAS LGL/T) SUBPOBLACIONES		
Prueba	CD56DIM94			CD56 POSITIVAS DIM CD94 POSITIVAS	%	(40 - 75) Porcentaje respecto a NK CD56+
Prueba	CD56BRCD94			CD56 POSITIVO BRIGHT CD94 POSITIVO		(90 - 100) Porcentaje respecto a NK CD56+

Descripción: PERFIL NMDA AC. ANTI RECEPTOR LCR
Código: NMDAACLCR
Técnica: Inmunocitoquímica (Cell Based Assay).
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: LIQUIDO LCR INMUNO
Comentario adicional: 1 mL LCR.
Valores de referencia:

Descripción: Perfil ORGANICO2: ACIDO METILMALONICO
Código: METILMALON
Técnica:
Unidades: mmol/mol crea
Plazo: 8 días

Descripción: Perfil ORGANICO2: ACIDO METILMALONICO
Tubo: Orina basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (Inf. 2)

Código: PANELANCA
Descripción: PERFIL PANEL ANCA
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	ANCAPR3	69957-9		Perfil PANEL ANCA, Ac IgG anti-PR3	Ratio	(Inf. 1.0)
Prueba	ANCAMPO	81787-4		Perfil PANEL ANCA, Ac IgG MPO	Ratio	(Inf. 1.0)
Prueba	ANTIBPI	33573-7		Perfil PANEL ANCA, Ac. IgG anti-BPI	Ratio	(Inf. 1.0)
Prueba	ANCACATEP			Perfil PANEL ANCA, Ac IgG anticatepsina-G	Ratio	(Inf. 1.0)
Prueba	ANCAELASTA	85086-7		Perfil PANEL ANCA, Ac IgG antielastasa	Ratio	(Inf. 1.0)
Prueba	ANCALACTOF			Perfil PANEL ANCA,Ac IgG antilactoferrina	Ratio	(Inf. 1.0)
Prueba	ANCALISOZI			Perfil PANEL ANCA, Ac IgG antilisozima	Ratio	(Inf. 1.0)

Código: POOLNACOVI
Descripción: Perfil Pool Nasal Coronavirus SARS COV 2 RT PCR
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	POOLNASCOV			Pool Nasal Coronavirus SARS 2 RT-PCR		
Prueba	COVNASRES			RESULTADO SARS-COV2 RT-PCR NASAL		
Prueba	COV_CT			Resultado interno COVID Ct		
Prueba	COVENVIO			ENVIO COVID LAB EXTERNO		

Código: POOLSACOVI
Descripción: Perfil Pool Saliva Coronavirus SARS COV 2 RT PCR
Técnica:
Comentario adicional: Muestra saliva (solicitar al almacén Valderribas)

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	POOLSALCOV			Pool Saliva Coronavirus SARS 2 RT-PCR		
Prueba	COVSALRES			RESULTADO SARS-COV2 RT-PCR SALIVA		
Prueba	COV_CT			Resultado interno COVID Ct		
Prueba	COVENVIO			ENVIO COVID LAB EXTERNO		

Código: PORCENTUMO
Descripción: Perfil porcentaje tumoral
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
	ADN_TUMOR					
Prueba	ENRIQ_MUES			Enriqueciemiento de la muestra		

Descripción: PERFIL QUERATÁN SULFATO
Código: QUERATAN
Técnica: Cromatografía líquida/Tándem masas (LC-MS/MS)
Unidades: mg/g creatinina
Plazo: 17 días
Tubo:
Comentario adicional: 10 mL orina. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.INDISPENSABLE enviar historia clínica
Valores de referencia:
(Inf. 20) < 3 años
(Inf. 10) 4 años - 13 años
(Inf. 5) > 13 años

Código: BAMILOPLA
Descripción: PERFIL RATIO BETA AMILOIDE 1-42/1-40 EN PLASMA
Técnica:
Comentario adicional: 1 mL plasma (EDTA)en tubo de polipropileno (pedir a Almacen). CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	BETAAMIL42	70073-2		perfil BETA AMILOIDE 1-42 EN PLASMA	pg/mL	
Prueba	BETAAMIL40	33200-7		perfil BETA AMILOIDE 1-40 EN PLASMA	pg/mL	
Prueba	RATIOAMILP			perfil RATIO BETA AMILOIDE 1-42/1-40 EN PLASMA		

Código: T3UP
Descripción: PERFIL T3 CAPTACION+INDICE TBC
Técnica: Quimioluminiscencia
Comentario adicional: 1mL suero CON gel separador.
Volumen mínimo: 0.2mL

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	ITBC	74795-6		PERFIL T3UP: INDICE TBC (THYROID BINDING CAPACITY)	Índice	(0.87 - 1.13) TBC (Thyroid Binding Capacity)
Prueba	T3U	3055-1		PERFIL T3UP: T3 CAPTACION SUERO	%	(24 - 35) %T3 Captación

---

Código: LINFT4R
Descripción: Perfil T4 REGULADORES CD4+CD25+CD127 low
Técnica:
Comentario adicional: 1 tubo de EDTA de 5ml

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	T4REGULADO			Perfil T4 Reguladores (CD4+CD25+CD127 low) %	%	(1 - 3) sobre población linfoide
Prueba	T4REGULATO			Perfil T4 Reguladores(CD4+CD25+CD1 low) TOTALES	cel/mm3	(25 - 74)

Descripción: Perfil T4 Reguladores(CD4+CD25+CD127 low) TOTALES
Código: T4REGULATO
Técnica:
Unidades: cel/mm3
Plazo: 7 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:
Valores de referencia: (25 - 74)

Código: METABTAMOX
Descripción: PERFIL TAMOXIFENO Y METABOLITOS
Técnica: HPLC-Espectrometría de masas
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	TAMOXI			PERFIL TAMOXIFENO	µg/L	(100 - 200)
Prueba	OHTAMOXI			PERFIL 14 HIDROXI-TAMOXIFENO	µg/L	(1.10 - 6.50)
Prueba	NDESMETILT			PERFIL N-DESMETIL-TAMOXIFENO	µg/L	(120 - 240)
Prueba	ENDOXIFENO			PERFIL ENDOXIFENO	µg/L	(5.10 - 12.4)
Prueba	RATIOTAMOX			PERFIL RATIO N-DESMETIL-TAMOXIFENO/ENDOXIFENO		(Inf. 50)

Código: H2FRUCTOS
Descripción: PERFIL Test de Aire Espirado: Intolerancia a la FRUCTOSA
Técnica: uGC TCD (Thermal Conductivity Detector)
referencia C0002101 o C0002079 (tubo de tapón verde para la muestra basal preferiblemente) y referencia C0002092 ó C0002012(para el resto de los puntos de la curva preferiblemente)
Comentario adicional: Esta prueba está contraindicada si existe intolerancia hereditaria a la fructosa o fructosemia (en estos casos puede ser potencialmente mortal).
Consentimiento informado debe guardarlo centro donde se hace test aire espirado o donde cliente coge kit para autotoma (en caso de que lo deje en otro centro diferente, este centro deberá guardarlo).

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	H2FRUCTOSA			Test de Aire Espirado: Intolerancia a la FRUCTOSA		

Componentes						
Perfil	H2CH4CO2			Gases test aliento espirado		
Prueba	RESULINTOL			RESULTADO INTOLERANCIA		

Código: H2LACTOS

Descripción: PERFIL Test de aire espirado: Intolerancia a la LACTOSA

Técnica: uGC TCD (Thermal Conductivity Detector)

Comentario adicional: referencia C0002101 o C0002079 (tubo de tapón verde para la muestra basal preferiblemente) y referencia C0002092 ó C0002012(para el resto de los puntos de la curva preferiblemente).

Consentimiento informado debe guardarlo centro donde se hace test aire espirado o donde cliente coge kit para autotoma (en caso de que lo deje en otro centro diferente, este centro deberá guardarlo).

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	H2LACTOSA			Test de Aire Espirado: Intolerancia a la LACTOSA		
Perfil	H2CH4CO2			Gases test aliento espirado		
Prueba	RESULINTOL			RESULTADO INTOLERANCIA		

Código: H2SACAROS

Descripción: PERFIL Test de aire espirado: Intolerancia a SACAROSA

Técnica: uGC TCD (Thermal Conductivity Detector)

Comentario adicional: referencia C0002101 o C0002079 (tubo de tapón verde para la muestra basal preferiblemente) y referencia C0002092 ó C0002012(para el resto de los puntos de la curva preferiblemente)

Esta prueba está contraindicada si existe intolerancia hereditaria a la fructosa o fructosemia (en estos casos puede ser potencialmente mortal).

Consentimiento informado debe guardarlo centro donde se hace test aire espirado o donde cliente coge kit para autotoma (en caso de que lo deje en otro centro diferente, este centro deberá guardarlo).

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	H2SACAROSA			Test de Aire Espirado: Intolerancia a la SACAROSA		
Perfil	H2CH4CO2			Gases test aliento espirado		
Prueba	RESULINTOL			RESULTADO INTOLERANCIA		

Código: H2XILOS

Descripción: PERFIL Test de Aire Espirado: Intolerancia a XILOSA

Técnica: uGC TCD (Thermal Conductivity Detector)

Comentario adicional: referencia C0002101 o C0002079 (tubo de tapón verde para la muestra basal preferiblemente) y referencia C0002092 ó C0002012(para el resto de los puntos de la curva preferiblemente).

Consentimiento informado debe guardarlo centro donde se hace test aire espirado o donde cliente coge kit para autotoma (en caso de que lo deje en otro centro diferente, este centro deberá guardarlo).

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	H2XILOSA			Test de Aire Espirado: Intolerancia a la XILOSA		
Perfil	H2CH4CO2			Gases test aliento espirado		
Prueba	RESULINTOL			RESULTADO INTOLERANCIA		

Código: H2SORBITO

Descripción: PERFIL Test de Aire Espirado: Intolerancia al SORBITOL

Técnica: uGC TCD (Thermal Conductivity Detector)

Código: H2SORBITO

referencia C0002101 o C0002079 (tubo de tapón verde para la muestra basal preferiblemente) y referencia C0002092 ó C0002012(para el resto de los puntos de la curva preferiblemente)

Comentario adicional:

Consentimiento informado debe guardarlo centro donde se hace test aire espirado o donde cliente coge kit para autotoma (en caso de que lo deje en otro centro diferente, este centro deberá guardarlo).

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	H2SORBITOL			Test de Aire Espirado: Intolerancia a la SORBITOL		
Perfil	H2CH4CO2			Gases test aliento espirado		
Prueba	RESULINTOL			RESULTADO INTOLERANCIA		

Código: H2SORBIFR

Descripción: PERFIL Test de Aire Espirado: Intolerancia SORBITOL+FRUCTOSA

Técnica: uGC TCD (Thermal Conductivity Detector)

referencia C0002101 o C0002079 (tubo de tapón verde para la muestra basal preferiblemente) y referencia C0002092 ó C0002012(para el resto de los puntos de la curva preferiblemente)

Comentario adicional: Esta prueba está contraindicada si existe intolerancia hereditaria a la fructosa o fructosemia (en estos casos puede ser potencialmente mortal).

Consentimiento informado debe guardarlo centro donde se hace test aire espirado o donde cliente coge kit para autotoma (en caso de que lo deje en otro centro diferente, este centro deberá guardarlo).

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	H2SORBIFRU			Test de Aire Espirado: Intolerancia al SORBITOL + FRUCTOSA		
Perfil	H2CH4CO2			Gases test aliento espirado		
Prueba	RESULINTOL			RESULTADO INTOLERANCIA		

Código: H2GALACT

Descripción: PERFIL Test de Aire Espirado:Intolerancia a GALACTOSA

Técnica: uGC TCD (Thermal Conductivity Detector)

referencia C0002101 o C0002079 (tubo de tapón verde para la muestra basal preferiblemente) y referencia C0002092 ó C0002012(para el resto de los puntos de la curva preferiblemente)

Comentario adicional:

Consentimiento informado debe guardarlo centro donde se hace test aire espirado o donde cliente coge kit para autotoma (en caso de que lo deje en otro centro diferente, este centro deberá guardarlo).

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	H2GALACTO			Test de Aire Espirado: Intolerancia a la GALACTOSA		
Perfil	H2CH4CO2			Gases test aliento espirado		
Prueba	RESULINTOL			RESULTADO INTOLERANCIA		

Código: TORRESDENT

Descripción: PERFIL TORRES DENTAL - BACTERIAS PERIODONTALES

Técnica:

Comentario adicional: Muestra exclusiva para esta determinación: sangre o puntas de papel (recogidas por el periodoncista en consulta).

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	PERIOCUAN			Bacterias periodontales DNA PCR Cuantitativa		

Componentes						
Prueba	IL1ABMUTS			Polimorfismos C889T y C3953T de genes IL-1A y IL-1B respect.		

Descripción:	PF4-HEPARINA AC.SUERO (FACTOR PLAQUETARIO 4-HEP)
Código:	PF4AC
Técnica:	EIA
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Plasma de Citrato congelado
Comentario adicional:	2 mL plasma(citrato) pobre en plaquetas(doble centrifugación a 2500g/15min.Aspirar parte superior).CONGELAR INMEDIATAMENTE Y ENVIAR CONGELADO.
Valores de referencia:	(Inf. 1) Negativo

Descripción:	PGT aneuploidías pack (1-8 embriones)
Código:	PGTA
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	BIOPSIA ESPECIAL
Comentario adicional:	Biopsia embrionaria en kit especial. Consultar Asesoria Genetica
Valores de referencia:	

Descripción:	PGT monogénicas pack (1-8 embriones)
Código:	PGTM
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	BIOPSIA ESPECIAL
Comentario adicional:	Biopsia embrionaria en kit especial. Consultar Asesoria Genetica
Valores de referencia:	

Descripción:	PGT reordenamientos pack (1-8 embriones)
Código:	PGTSR
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	BIOPSIA ESPECIAL
Comentario adicional:	Biopsia embrionaria en kit especial. Consultar Asesoria Genetica
Valores de referencia:	

Descripción:	PGT-Informatividad enfermedades frecuentes
Código:	PGTINFREC
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Consultar Asesoría Genética
Valores de referencia:	

Descripción: PGT-Informatividad enfermedades no frecuentes
Código: PGTINFNOF
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Consultar Asesoría Genética
Valores de referencia:

Descripción: Picnodisostosis. Sec Gen: CTSK
Código: GEN_000623
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Piebaldismo. Sec Gen: KIT
Código: GEN_000624
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Pierson, Sd. Sec Gen: LAMB2
Código: GEN_000625
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: PIK3CA (E542K, E545K/Q, H1047L/R) · HOT SPOT
Código: PIK3CA
Técnica:
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional: Tejido tumoral parafinado. Tª ambiente
ROTULAR: ONCO.
Valores de referencia:

Código: PIRIDINOLI
Descripción: PIRIDINOLINA Y DESOXIPIRIDINOLINA EN ORINA
Técnica: Cromatografía Líquida Alta Resolución

Código: PIRIDINOLI

2mL de orina (segunda micción). Volumen mínimo: 1mL

Comentario adicional:

Se aconseja realizar el análisis con la orina de la segunda orina matinal (entre las 10:00 y las 12:00h, atendiendo al ritmo circadiano de la eliminación de la piridinolina y desoxipiridinolina).

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	PIR	25129-8		Piridinolina	nmol/mmol crea.	(23 - 65) Hombre (25 - 83) Mujer
Prueba	DPIR	25095-1		Desoxipiridinolina	nmol/mmol crea.	(6 - 26) Hombre (6 - 23) Mujer

---

Descripción: PIRUVATO QUINASA ERITROCITOS

Código: PQERI

Técnica: Cinética - Espectrofotometría

Unidades: U/g Hb (37ºC)

Plazo: 9 días

Tubo: EDTA sangre total Referencia

Comentario adicional: 1 mL sangre total Heparina . Envío inmediato
Alt. sangre total EDTA

Valores de referencia: (7.4 - 16.4)

Descripción: PIRUVICO A LOS 30 MINUTOS

Código: PIRUVICO30

Técnica: Cinetica- Espectrofotometria ultravioleta

Unidades: mg/dl

Plazo: 4 días

Tubo: Tubo Especial

Comentario adicional: Preparación especifica de la muestra tubo especial con instrucciones adjuntas

Valores de referencia:

Descripción: PL-7/PL-12 AC. SUERO

Código: PL7PL12AC

Técnica: Técnica Inmunoblot

Unidades:

Plazo: 7 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional:

Valores de referencia: Negativo

Descripción: PLAQUETAS AC. SANGRE TOTAL

Código: PLAQUEAC

Técnica: Citometría de flujo

Unidades: %

Plazo: 7 días

Tubo: Tubo Especial

Descripción: PLAQUETAS AC. SANGRE TOTAL
Comentario adicional: Volumen: 5.0 mL MUESTRA EXCLUSIVA PARA ESTA DETERMINACION

Es necesario contactar previamente con al laboratorio para programar el estudio.
No realizar toma de muestras ni viernes ni vísperas de festivo. Mantener las muestras refrigeradas.
Indicar día y hora de extracción de la muestra.

Valores de referencia:

Descripción: PLAQUETAS ANTICUERPOS SUERO
Código: ACPLAQUE
Técnica: Técnica IFI.
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero (mínimo 0.30 mL)
Valores de referencia: Negativo <1/10
Positivo >1/10

Descripción: PLASMINOGENO EN PLASMA
Código: PLASMINOGE
Técnica: Técnica cromogénica
Unidades: %
Plazo: 8 días
Tubo: Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional: 3 mL Plasma Citrato Sódico congelado
Valores de referencia: (80 - 120)

Descripción: PLASMINOGENO ACTIVADOR TISULAR (tPA) PLASMA
Código: PLASMIACTI
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: ng/mL
Plazo: 19 días
Tubo: Plasma de Citrato congelado
Comentario adicional: 1 mL plasma (citrato).
Conservación: Centrifugar inmediatamente después de la extracción. CONGELAR PLASMA Y ENVIAR CONGELADO.

Rogamos tubo independiente para este análisis.

Extracción con estasis venosa.

Valores de referencia: (2 - 12)

Descripción: Plasmodium DNA PCR Cualitativa
Código: MALARIAPCR
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinacion: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Valores de referencia:

Descripción: PLASMODIUM SPP ANTICUERPOS (MALARIA) SUERO
Código: PLASMOAC

Descripción:	PLASMODIUM SPP ANTICUERPOS (MALARIA) SUERO
Técnica:	EIA
Unidades:	
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero,alt (plasma de citrato, heparina)
Valores de referencia:	(Inf. 9) Negativo (9 - 11) Indeterminado (Sup. 11) Positivo

Descripción:	PLATA EN ORINA
Código:	AG2
Técnica:	ICP-MS
Unidades:	µg/L
Plazo:	7 días
Tubo:	Orina basal
Comentario adicional:	10 ml de orina aislada
Valores de referencia:	(Inf. 1)

Descripción:	PLATA EN SUERO
Código:	PLATASUERO
Técnica:	Espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS)
Unidades:	µg/L
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml Suero (libre trazas metales) Tubo Suero metales traza Volumen mínimo: 0.35 mL Proteger la muestra de la luz.
Valores de referencia:	(Inf. 1) No expuestos (Inf. 1) Límite de cuantificación

Descripción:	PLATINO EN ORINA
Código:	CISPLAORIN
Técnica:	Téc. espectrometría de emisión atómica/espectrometría de masas
Unidades:	mcg/L
Plazo:	9 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 0.05) Valor orientativo

Descripción:	PLATINO SUERO (libre de metales)
Código:	PLATINO
Técnica:	Escpectometría de Emisión Atómica/Espectrometria de Masas (ICP-MS)
Unidades:	µg/L
Plazo:	11 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero (libre trazas metales). Refrigerar. Tubo Suero metales traza

Descripción:	PLATINO SUERO (libre de metales)
Valores de referencia:	(Inf. 0.20)

Descripción:	PLATINO SUERO (libre de metales)
Código:	PLATINO
Técnica:	
Unidades:	µg/L
Plazo:	11 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	_COMENTARIODT
Valores de referencia:	(Inf. 0.20)

Descripción:	PLOMO EN SANGRE
Código:	PB
Técnica:	ICP-MS
Unidades:	µg/dL
Plazo:	5 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	Tubo de sangre total EDTA o tubo de EDTA libre de elementos traza.Enviar de forma independiente 1 tubo específico para elementos traza con el tapón marcado. Momento de toma de muestra no es crítico
Valores de referencia:	(Inf. 70) **Valor límite biológico recomendado por INSST.** (30 - 70) Deberá procederse a **vigilancia médica periódica**, según INSST. (Inf. 30) Valor límite biológico recomendado por DIRECTIVA (UE) 2024/869. (Inf. 4.5) Se recomienda que los valores en **mujeres trabajadoras en edad fértil expuestas a plomo no superen el valor de la población general (4,5 µg/dL).** (Inf. 4.5) **Personas no expuestas.** (Inf. 1) Límite de cuantificación

Descripción:	PLOMO ORINA
Código:	PB2
Técnica:	ICP-MS
Unidades:	µg/L
Plazo:	6 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	Al menos 5 mL orina OFJ (Orina Final de Jornada)corectamente identificada (tapón marcado, etiquetas pequeñas sin código de barras y la palabra OFJ en el lateral del tubo). No recolectar muestras de orina en un ambiente en el que sea más probable que ocurra la exposición. Es importante evitar que el polvo de la ropa pueda interferir en el contenido de la muestra. No recoger la orina en recipientes con base de metal, como urinarios o sartenes de metal. Recoger la orina en tubos de polipropileno incoloro libre de metales sin tapones de colores. Cuando esto no sea posible, usar para la recogida de orina un envas
Valores de referencia:	(Inf. 50) al final de la jornada laboral en **personas expuestas a TETRAETIL PLOMO y/o TETRAMETIL PLOMO**. Valor límite biológico adaptado de **DFG**

Descripción:	PM-1 Ac. SUERO
Código:	PM.1
Técnica:	Técnica Fluoroenzimoensayo
Unidades:	U/mL
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal

Descripción:	PM-1 Ac. SUERO
Comentario adicional:	Suero. Alternativa Plasma
Valores de referencia:	(Inf. 7) Negativo (7 - 10) Indeterminado

Descripción:	PM75 (PM/SCL75) ANTICUERPOS
Código:	PM.75
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. Alternativa Plasma
Valores de referencia:	Negativo

Descripción:	Pneumocystis jirovecii DNA PCR cualitativa
Código:	PNEUMODNA
Técnica:	PCR
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:	Tejido pulmonar-REFRIGERAR 2ml BAL-REFRIGERAR 2 ml esputo-REFRIGERAR
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta

Descripción:	POLE (P286R, V411L, S297F, A456P, S459F) · HOT SPOT
Código:	POLE_SOMAT
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:	Tejido parafinado. Tª ambiente
Valores de referencia:	

Descripción:	Poliarteritis nodosa. Deficienc adenosin deaminasa-2. ADA2
Código:	GEN_000626
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	POLICITEMIA VERA · JAK2 (EXÓN 12) · HOT SPOT
Código:	JAK2_EX.12
Técnica:	PCR y secuenciación
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	TUBO ONCOGENETICA

Descripción: POLICITEMIA VERA · JAK2 (EXÓN 12) · HOT SPOT
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO.
IMPORTANTE: REFRIGERADO SIEMPRE
Valores de referencia:

Descripción: Poliendocrinopatía autoinmune tipo 1. Sec Gen: AIRE
Código: GEN_000627
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Polimorfismo FSHR: respuesta estimulación ovárica
Código: FSHRPOLIM
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Sangre EDTA Tª ambiente. Rotulado con BM
Tubo exclusivo para esta determinación
Valores de referencia:

Descripción: Polimorfismo rs4149056 asoc a miopatías induc por estatinas
Código: SLCO1B1
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente
Valores de referencia:

Descripción: Polimorfismo rs738409 asociado a hígado graso no alcohólico
Código: PNPLA3_SNP
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente
Valores de referencia:

Descripción: Polimorfismos C889T y C3953T de genes IL-1A y IL-1B respect.
Código: IL1ABMUTS
Técnica: PCR y digestión
Unidades:
Plazo: 7 días

Descripción: Polimorfismos C889T y C3953T de genes IL-1A y IL-1B respect.
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Muestra exclusiva para esta determinación:
puntas de papel (recogidas por el periodoncista en consulta).-REFRIGERAR
Valores de referencia:

Descripción: Polineuropatía amiloide familiar: secuenciación gen TTR
Código: ANDRADE
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente
Valores de referencia:

Descripción: Polineuropatía, sordera, ataxia, ret. pig. catarata. ABHD12
Código: GEN_000629
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Polioma virus (JC-BK) deteccion DNA en MUESTRA por PCR
Código: POLIOLCR
Técnica: Q-PCR
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional: 1 mL LCR- comgelado
sangre total (EDTA) refrigerado
orina (micción aislada) refrigerada
Valores de referencia:

Descripción: POLIOVIRUS ANTICUERPOS EN SUERO
Código: POLIOVAC
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 19 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL Suero (Refrigerado)
Valores de referencia: Valor de referencia indicativo: Negativo

---

Descripción: POLIPEPTIDO PANCREATICO
Código: PPANCREATI
Técnica: RIA
Unidades: pmol/L
Plazo: 32 días

Descripción: POLIPEPTIDO PANCREATICO
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 ml suero congelar inmediatamente
Valores de referencia: (Inf. 100)

Descripción: Poliposis adenomatosa familiar (cáncer colon): gen APC (NGS)
Código: APC_MUT
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Poliquistosis renal Ampliado. Panel NGS
Código: GEN_000635
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Poliquistosis renal auto. dom: genes PKD1 y PKD2 (NGS)
Código: ADPKD
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Poliquistosis renal autos recesiva: gen PKHD1 (NGS)
Código: ARPKD
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Poliquistosis renal. Panel NGS
Código: GEN_000634
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Descripción: Poliquistosis renal. Panel NGS
Valores de referencia:

Descripción: Pool Nasal Coronavirus SARS 2 RT-PCR
Código: POOLNASCOV
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Muestra nasal
Valores de referencia:

Descripción: Pool Saliva Coronavirus SARS 2 RT-PCR
Código: POOLSALCOV
Técnica:
Unidades:
Plazo:
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Muestra saliva (solicitar al almacén Valderribas)
Valores de referencia:

Descripción: Porfiria cutánea tarda. Sec Gen: UROD
Código: GEN_000637
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Porfiria eritropoyética congénita. Sec Gen: UROS
Código: GEN_000638
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Porfiria hepática aguda. Sec Gen: ALAD
Código: GEN_000639
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Porfiria intermitente aguda: gen HMBS (NGS)
Código: PORFIRIA

Descripción: Porfiria intermitente aguda: gen HMBS (NGS)
Técnica: NGS con TSOE Illumina y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Porfiria variegata. Sec Gen: PPOX
Código: GEN_000640
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Porfiria. Panel NGS
Código: GEN_000641
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Código: PORFIHECES
Descripción: PORFIRINAS EN HECES
Técnica: HPLC
Comentario adicional:
5 gr de heces congeladas.
SE recomienda evitar la luz directa.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	COPROH	40627-2		COPROPORFIRINAS EN HECES	mcg/g heces	(Inf. 5)
Prueba	UROH	56484-9		UROPORFIRINAS EN HECES	mcg/g heces	(Inf. 1.2)
Prueba	PROTOH	58932-5		PROTOPORFIRINAS EN HECES	mcg/g heces	(Inf. 8)
Prueba	HEPTAH	34313-7		HEPTACARBOXILPORFIRINAS EN HECES	mcg/g heces	(Inf. 0.5)

Código: PORFIFRA2
Descripción: PORFIRINAS FRACCIONADAS EN ORI
Técnica: Cromatografía líquida de alta resolución
Comentario adicional:
10 ml de orina de 24 h.
Indicar volumen de 24h.
Evitar luz directa.
Para incrementar la fiabilidad del diagnóstico, hay que evitar los factores que conducen a niveles elevados de porfirina, como, por ejemplo, el consumo de alcohol, ingesta de fármacos inductores de enzimas y situaciones de estrés.

Preservar la orina con Carbonato sódico pH = 6.0 - 9.0

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	COPROP	6877-5		Perfil COPROPORFIRINAS I EN ORINA	µg/24 h	(Inf. 24)
Prueba	COPROP3	6878-3		Perfil COPROPORFIRINAS III EN ORINA	µg/24h	(10 - 65)
Prueba	HEXAC	9527-3		Perfil HEXACARBOXILPORFIRIN EN ORINA	µg/24h	(Inf. 2) Límite de cuantificación: 1.7 µg/L
Prueba	HEPTAC	24462-4		Perfil HEPTACARBOXILPORFIRI EN ORINA	µg/24h	(Inf. 3) Límite de cuantificación: 1.1 µg/L
Prueba	PENTA	9730-3		Perfil PENTACARBOXILPORFIRI EN ORINA	µg/24h	(Inf. 4) Límite de cuantificación: 1.2 µg/L
Prueba	UROP	3113-8		Perfil UROPORFIRINAS EN ORINA	µg/24h	(Inf. 24)

Código: PORFIRFRAC

Descripción: PORFIRINAS FRACCIONADAS EN PLASMA

Técnica: HPLC

Comentario adicional:
Plasma Heparina litio
Volumen
2.0 mL
Conservación
Congelar

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	COPROPFRAC	14157-2		PERFIL PORFIRFRAC, COPROPORFIRINA I en plasma	µg/L	(Inf. 6.40)
Prueba	CP3P			PERFIL PORFIRFRAC, COPROPORFIRINA III en plasma	µg/L	(Inf. 8)
Prueba	HPCPP			PERFIL PORFIRFRAC, HEPTACARBOXIPORFIRINA en plasma	µg/L	(Inf. 3.80)
Prueba	HXCPP			PERFIL PORFIRFRAC, HEXACARBOXIPORFIRINA en plasma	µg/L	(Inf. 1.30)
Prueba	PECPP			PERFIL PORFIRFRAC, PETACARBOXIPORFIRINAS en plasma	µg/L	(Inf. 1.20)
Prueba	UROPP			PERFIL PORFIRFRAC, UROPORFIRINAS en plasma	µg/L	(Inf. 11.80)
Prueba	PORFTP			PERFIL PORFIRFRAC, PORFIRIAS TOTALES en plasma	µg/L	(Inf. 32.50)

Descripción: PORFOBILINOGENO DESAMINASA ERITROCITOS

Código: PORFOBGDES

Técnica: Análisis por inyección de flujo (FIA)

Descripción:	PORFOBILINOGENO DESAMINASA ERITROCITOS
Unidades:	nmol/s/L
Plazo:	12 días
Tubo:	Heparina Litio
Comentario adicional:	2 ml de sangre total HeparinaLi.refrigerar,
Valores de referencia:	(7.30 - 15.80) Actividad normal

Descripción:	PORFOBILINOGENO EN ORINA DE 24 HORAS
Código:	PORFOBILI
Técnica:	Espectrometría
Unidades:	mg/24 h
Plazo:	8 días
Tubo:	Orina congelada
Comentario adicional:	Proteger de la luz Orina 24h. (alícuota) Preferible enviar congelado
Valores de referencia:	(Inf. 1.7) .Límite de cuantificación: <0.80 mg/L

Descripción:	POTASIO
Código:	K
Técnica:	
Unidades:	mmol/L
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(3.5 - 5.1)

Descripción:	POTASIO ORINA
Código:	K2
Técnica:	Potenciometría directa
Unidades:	mmol/24h
Plazo:	2 días
Tubo:	Orina 24 Horas
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(25 - 100)

Descripción:	PREALBUMINA SUERO
Código:	PREALB
Técnica:	Turbidimetría
Unidades:	mg/dL
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 mL suero
Valores de referencia:	(20 - 40)

Descripción:	PRECIPITINAS THERMOACTINOMYCES VULGARIS
Código:	TERMOVUL
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	U/mL
Plazo:	8 días

Descripción:	PRECIPITINAS THERMOACTINOMYCES VULGARIS
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml suero refrigerado(2-8ºC)
Valores de referencia:	(Inf. 1.00) Negativo

Descripción:	PREGABALINA (LYRICA) SUERO
Código:	PREGABALIN
Técnica:	Cromatografía Líquida Tándem Masas.
Unidades:	mg/L
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 mL Suero. Congelar No utilizar tubos con gel separador.
Valores de referencia:	(2 - 8.0) Intervalo terapéutico (Sup. 10) Toxicidad (Inf. 0.5) Límite de cuantificación

Descripción:	PREGNANDIOL ORINA
Código:	PREGNANDI
Técnica:	Cromatografía gases - Ionización de llama
Unidades:	mg/24 h
Plazo:	12 días
Tubo:	Orina 24 Horas
Comentario adicional:	25 mL de orina de 24 h.
Valores de referencia:	(Inf. 0.1) < 2 años (Inf. 0.3) 2 años - 5 años (Inf. 0.5) 5 años - 9 años (0.1 - 0.70) Hombre 9 años - 15 años (0.1 - 1.90) Hombre > 15 años (0.1 - 1.2) Mujer 9 años - 15 años (0.1 - 2.6) Mujer Folicular (2.6 - 10.60) Mujer Luteínica (10 - 100) Mujer Embarazo

Descripción:	PREGNANTRIOL ORINA
Código:	PREGNANTRI
Técnica:	Cromatografía gases - Ionización de llama
Unidades:	mg/24 h
Plazo:	12 días
Tubo:	Orina 24 Horas
Comentario adicional:	25 mL orina de 24 h.
Valores de referencia:	(Inf. 0.10) < 5 años (Inf. 0.30) 5 años - 9 años (0.20 - 0.60) Hombre 9 años - 15 años (0.40 - 2.5) Hombre > 15 años (0.10 - 0.60) Mujer 9 años - 15 años (0.10 - 1.80) Mujer Fase folicular (0.90 - 2.20) Mujer Fase luteínica

Descripción:	PREGNENOLONA SUERO
Código:	PREGNE
Técnica:	EIA
Unidades:	ng/mL

Descripción: PREGNENOLONA SUERO
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL Suero.

Fines de semana: enviar suero congelado
Valores de referencia: (0.1 - 3.4) Hombre
(0.1 - 3.8) Mujer

Código: PREVECOL
Descripción: PREVECOL (AMADIX)
Técnica:
Comentario adicional: Contactar con Ensayos (Chus/Raquel).
tubo de EDTA de 10 mL. La muestra debe llegar al laboratorio en 24h.
LAS MUESTARS SE PUEDEN PINCHAR DE LUNES A JUEVES.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	FLT3LLOTE			FLT3L Identificación del lote (AMADIX)		
Prueba	FLT3LCAD			FLT3L Fecha de caducidad (AMADIX)		
Prueba	CD147LOTE			CD147 Identificación del lote (AMADIX)		
Prueba	CD147CAD			CD147 Fecha de caducidad (AMADIX)		
Prueba	PKM2LOTE			PKM2 Identificación del lote (AMADIX)		
Prueba	PKM2CAD			PKM2 Fecha de caducidad (AMADIX)		
Prueba	ERBB4LOTE			ERBB4 Identificación del lote (AMADIX)		
Prueba	ERBB4CAD			ERBB4 Fecha de caducidad (AMADIX)		
Prueba	TFF3LOTE			TFF3 Identificación del lote (AMADIX)		
Prueba	TFF3CAD			TFF3 Fecha de caducidad del lote (AMADIX)		
Prueba	IGFBP2LOTE			IGFBP2 Identificación del lote (AMADIX)		
Prueba	IGFBP2CAD			IGFBP2 Fecha de caducidad del lote (AMADIX)		
Prueba	CYFRALOTE			CYFRA 21.1 Identificación del lote (AMADIX)		
Prueba	CYFRACAD			CYFRA 21.1 Fecha de caducidad del lote (AMADIX)		
Prueba	AREGLOTE			AREG Identificación del lote (AMADIX)		
Prueba	AREGCAD			AREG Fecha de caducidad del lote (AMADIX)		
Prueba	HEMOLINFOA			INDICE DE HEMÓLISIS INFORMAR ABBOTT		(Inf. 30) No Hemólisis
Prueba	PREVCOLINF			INFORME RESULTADO TEST PREVECOL		

Código: PREVECOL
Descripción: PREVECOL (AMADIX)
Técnica:

Código: PREVECOL

Comentario adicional: Contactar con Ensayos (Chus/Raquel).
tubo de EDTA de 10 mL. La muestra debe llegar al laboratorio en 24h.
LAS MUESTARS SE PUEDEN PINCHAR DE LUNES A JUEVES.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	FLT3LLOTE			FLT3L Identificación del lote (AMADIX)		
Prueba	FLT3LCAD			FLT3L Fecha de caducidad (AMADIX)		
Prueba	CD147LOTE			CD147 Identificación del lote (AMADIX)		
Prueba	CD147CAD			CD147 Fecha de caducidad (AMADIX)		
Prueba	PKM2LOTE			PKM2 Identificación del lote (AMADIX)		
Prueba	PKM2CAD			PKM2 Fecha de caducidad (AMADIX)		
Prueba	ERBB4LOTE			ERBB4 Identificación del lote (AMADIX)		
Prueba	ERBB4CAD			ERBB4 Fecha de caducidad (AMADIX)		
Prueba	TFF3LOTE			TFF3 Identificación del lote (AMADIX)		
Prueba	TFF3CAD			TFF3 Fecha de caducidad del lote (AMADIX)		
Prueba	IGFBP2LOTE			IGFBP2 Identificación del lote (AMADIX)		
Prueba	IGFBP2CAD			IGFBP2 Fecha de caducidad del lote (AMADIX)		
Prueba	CYFRALOTE			CYFRA 21.1 Identificación del lote (AMADIX)		
Prueba	CYFRACAD			CYFRA 21.1 Fecha de caducidad del lote (AMADIX)		
Prueba	AREGLOTE			AREG Identificación del lote (AMADIX)		
Prueba	AREGCAD			AREG Fecha de caducidad del lote (AMADIX)		
Prueba	HEMOLINFOA			INDICE DE HEMÓLISIS INFORMAR ABBOTT		(Inf. 30) No Hemólisis
Prueba	PREVCOLINF			INFORME RESULTADO TEST PREVECOL		

Descripción: PRIMIDONA SUERO

Código: PRIMI

Técnica: Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectroscopía de masas (LC-MS/MS)

Unidades: mg/L

Plazo: 7 días

Tubo: Suero Congelado

Comentario adicional: 0.5 mL Suero SIN gel separador
Conservación: Congelar
Volumen mínimo: 0.2 mL

Valores de referencia: (5 - 10) Intervalo terapéutico
(Inf. 1) Límite de cuantificación
(Sup. 25) Toxicidad

Descripción:	PROCALCITONINA
Código:	PROCALCITO
Técnica:	Técnica ICMA
Unidades:	ng/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	Suero congelado (tubo con o sin gel) Alt. plasma EDTA, o plasma heparina de litio.
Valores de referencia:	(Inf. 0.5) > 4 dias Riesgo bajo de sepsis y/o shock séptico. Debe tenerse en cuenta que concentraciones < 0,5 ng/mL no permiten descartar una infección, ya que en algunas infecciones localizadas pueden aparecer concentraciones bajas. También pueden reflejar una infección generalizada en sus etapas muy iniciales (< 6 horas desde el debut). < 4 dias < 2.0 ng/mL a 0-6h de nacer < 4 dias <8.0 ng/mL a 6-12h de nacer < 4 dias <15.0 ng/mL a 12-18h de nacer < 4 dias <21.0 ng/mL a 18-30h de nacer < 4 dias <15.0 ng/mL a 30-36h de nacer < 4 dias <8.0 ng/mL a 36-42 h de nacer

Descripción:	PROCOLAGENO I PROPEPTIDO AMINOTERMINAL (P1NP) SUERO
Código:	PROCOLAIAM
Técnica:	CLIA
Unidades:	ng/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. Alternativa: Plasma (heparina, edta)
Valores de referencia:	(21 - 78) Hombre (15.1 - 58.6) Mujer Adultas (14.3 - 58.9) Postmenopausia con tratamiento hormonal (20.3 - 76.3) Postmenopausia sin tratamiento hormonal

Descripción:	PROCOLAGENO III PROPEPTIDO AMINOTERMINAL SUERO
Código:	PROCOLAIII
Técnica:	Téc. RIA
Unidades:	U/mL
Plazo:	14 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL de suero. Volumen: 1.0 mL (0.15 mL mínimo)
Valores de referencia:	(0.33 - 0.79) (0.34 - 6.10) < 10 años (0.64 - 1.70) 10 años - 15 años (0.37 - 1.80) 15 años - 20 años

Descripción:	PRODUCTOS DEGRADACION FIBRINOGENO
Código:	PDF
Técnica:	Inmunoensayo automatizado de aglutinación de látex
Unidades:	mg/L
Plazo:	3 días

Descripción:	PRODUCTOS DEGRADACION FIBRINOGENO
Tubo:	Plasma de Citrato congelado
Comentario adicional:	Plasma de citrato congelado
Valores de referencia:	(Inf. 5)

Descripción:	PROGESTERONA
Código:	PROGES
Técnica:	ICMA
Unidades:	ng/mL
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 mL suero Alternativo plasma con EDTA
Valores de referencia:	(Inf. 0.5) Hombre > 14 años (Inf. 0.5) Mujer > 14 años Folicular (1.2 - 15.9) Mujer > 14 años Luteínica (Inf. 0.5) Mujer > 14 años Post menopausia

Descripción:	PROINSULINA SUERO
Código:	PROINSU
Técnica:	CLIA
Unidades:	pg/mL
Plazo:	10 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	Suero congelado
Valores de referencia:	(Inf. 180)

Descripción:	PROLACTINA
Código:	PRL
Técnica:	Técnica ICMA
Unidades:	ng/mL
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(3.46 - 19.40) Hombre (5.18 - 26.53) Mujer (1.8 - 20.3) Mujer Post-menopausia

Descripción:	Pronóstico cáncer de próstata
Código:	PROSTATYPE
Técnica:	RT-qPCR
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:	kit especial hacerselo llegar a anatomía patológica
Valores de referencia:	

Descripción:	PROPOXIFENO CRIBADO, ORINA
Código:	PROPOXIOR
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis

Descripción:	PROPOXIFENO CRIBADO, ORINA
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	10 mL Orina
Valores de referencia:	

Descripción:	PROSIGNA: expresión génica
Código:	PROSIGNA
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	20 días
Tubo:	Muestra Anatomía Patológica
Comentario adicional:	Bloque de tejido tumoral mama. Tª ambiente Tumor INFILTRANTE Entregar a Asesoría genética
Valores de referencia:	

Descripción:	PROSTAGLANDINA E2 PLASMA
Código:	PGE2
Técnica:	EIA
Unidades:	pg/mL
Plazo:	25 días
Tubo:	Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional:	3 ml plasma EDTA. Separar y congelar inmediatamente. Como alternativa suero o plasma heparina
Valores de referencia:	(Inf. 2297)

Descripción:	Prostaglandina E2, orina
Código:	PGE22
Técnica:	RIA
Unidades:	pg/mL
Plazo:	10 días
Tubo:	Orina congelada
Comentario adicional:	10mL orina aislada.CONGELAR INMEDIATAMENTE.
Valores de referencia:	(Inf. 1850)

Descripción:	PROTEINA 14.3.3 (ENCEFALOPATIAS) LCR
Código:	PROT14.3.3
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	UA/mL
Plazo:	18 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	LCR. REFRIGERAR.

Descripción: PROTEINA 14.3.3 (ENCEFALOPATIAS) LCR

Valores de referencia: (Inf. 20000) La positividad de la prueba en un contexto clínico compatible es altamente sugestiva de enfermedad de Creutzfeldt-Jacob. Sin embargo, en otras situaciones de destrucción neuronal severa como ictus, encefalitis o crisis generalizadas repetidas o bien por la presencia de hematíes la prueba puede ser también positiva (falso positivo) por lo que esta positividad se ha de valorar en el contexto del enfermo y resultados de la analítica básica de LCR. Si persisten las dudas diagnósticas recomendamos repetir la determinación en 2 - 3 semanas La negatividad de la prueba no descarta el diagnóstico de la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob, pero lo hace más improbable. Si persisten las dudas diagnósticas recomendamos repetir la determinación en 2 - 3 semanas.

Código: BTLB

Descripción: PROTEINA BETA AMILOIDE/TAU, LCR

Técnica:

Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	TAUPROLCR	30160-6		PROTEINA TAU (LCR)	pg/mL	(Inf. 404)
Prueba	TAUFOSFO	72260-3		TAU FOSFORILADA LCR	pg/mL	(Inf. 56.5)
Perfil	BAMILOIDE			PERFIL BETA AMILOIDE 1-42/1-40, LCR		

Descripción: PROTEINA C ACTIVIDAD PLASMA

Código: PROTEINA.C

Técnica: Espectrofotometría

Unidades: %

Plazo: 3 días

Tubo: Coagulación - Plasma Citrato

Comentario adicional: 1 mL plasma

Valores de referencia: (70 - 130)

Descripción: PROTEINA C ANTIGENICA PCAG

Código: PROTCAG

Técnica: EIA

Unidades: %

Plazo: 8 días

Tubo: Coagulación - Plasma Citrato

Comentario adicional: 1 mL de plasma. Separar y congelar.

Valores de referencia: (70 - 140) . En recién nacidos el valor de la proteína C es bajo por inmadurez hepática.

Descripción: PROTEINA C REACTIVA SUERO

Código: PCR

Técnica: Inmunoturbidimetría

Unidades: mg/dL

Plazo: 2 días

Descripción:	PROTEINA C REACTIVA SUERO
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1ml NO HACER EN EDTA
Valores de referencia:	(Inf. 0.5)

Descripción:	PROTEINA CATIONICA EOSINOFILA MUESTRA
Código:	PROCATEOMU
Técnica:	CAP SYSTEM-Fluoroinmunoanálisis
Unidades:	µg/L
Plazo:	9 días
Tubo:	
Comentario adicional:	Muestra moco nasal/Lavado nasal
Valores de referencia:	(5.0 - 46.0) Moco nasal (3.0 - 31.0) Lavado nasal

Descripción:	PROTEINA CATIONICA EOSINOFILA SUERO
Código:	PROCATIOEO
Técnica:	FEIA. Fluoroinmunoensayo.
Unidades:	mcg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Alt. plasma EDTA
Valores de referencia:	(Inf. 13)

Descripción:	PROTEINA EOSINOFILICA X EN HECES (EPX)
Código:	PREOXH
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	ng/g heces
Plazo:	14 días
Tubo:	HECES CONGELADAS
Comentario adicional:	Heces 5g. Preferible enviar heces congeladas
Valores de referencia:	(Inf. 1358)

Descripción:	PROTEINA PLASMATICA A ASOCIADA A LA GESTACION
Código:	PAPP.A
Técnica:	Electroquimioluminiscencia
Unidades:	mUI/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. No emplear plasma
Valores de referencia:	0.28 mUI/mL-Embarazo-8 semanas 0.47 mUI/mL-Embarazo-9 semanas 0.90 mUI/mL-Embarazo-10 semanas 1.58 mUI/mL-Embarazo-11 semanas 2.51 mUI/mL-Embarazo-12 semanas 3.68 mUI/mL-Embarazo-13 semanas

Descripción:	PROTEINA RELACIONADA CON LA PTH
Código:	PTHRP
Técnica:	RIA

Descripción:	PROTEINA RELACIONADA CON LA PTH
Unidades:	pmol/L
Plazo:	32 días
Tubo:	Plasma trasylol/aprotinina
Comentario adicional:	2 mL plasma-EDTA con aprotinina (TRASYLOL). CONGELAR INMEDIATAMENTE Y ENVIAR CONGELADO. Envío en tubo independiente del resto de pruebas. Tubos especiales a su disposición
Valores de referencia:	(Inf. 4.2)

Descripción:	PROTEINA S ACTIVIDAD PLASMA
Código:	PROTSACTI
Técnica:	Coagulométrico
Unidades:	%
Plazo:	6 días
Tubo:	Plasma de Citrato congelado
Comentario adicional:	1 mL plasma citrato congelado. Se requiere contactar con el laboratorio central previamente a la extracción. centrifugar la sangre a 2500g durante 15 minutos. Separar 3/4 partes superiores del plasma con pipeta (no decantar) y traspasarlo a otro tubo. Centrifugar una segunda vez el plasma traspasado al tubo, a 2500g durante 15 minutos. Separar el sobrenadan
Valores de referencia:	(77 - 143) Hombre (55 - 123) Mujer

Descripción:	PROTEÍNA S ANTICUERPOS IgG SUERO
Código:	PROTSIGG
Técnica:	ELISA
Unidades:	Índice
Plazo:	17 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL Suero
Valores de referencia:	(1.00 - 1.75) Zona límite (1.76 - 3.70) Positivo débil (Sup. 3.70) Positivo

Descripción:	PROTEINA S LIBRE ANTIGÉNICA PLASMA
Código:	PROTSLIBRE
Técnica:	Inmuno-turbidimétrico
Unidades:	%
Plazo:	3 días
Tubo:	Plasma de Citrato congelado
Comentario adicional:	5 mL de Plasma Citrato
Valores de referencia:	(70 - 148) Hombre (50 - 134) Mujer

Descripción:	PROTEINA S TOTAL ANTIGENICA PSAG
Código:	PROTEINA.S
Técnica:	EIA
Unidades:	%
Plazo:	8 días
Tubo:	Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:	1 mL Plasma Citrato Sódico. Separar plasma y congelar inmediatamente.
Valores de referencia:	(75 - 140) Hombre (60 - 140) Mujer

Descripción:	PROTEINA S-100B SUERO
Código:	PROTS100

Descripción:	PROTEINA S-100B SUERO
Técnica:	CLIA
Unidades:	µg/L
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 mL suero no hemolizado congelado
Valores de referencia:	(Inf. 0.15)

Descripción:	PROTEINA TAU FOSFORILADA 181 EN PLASMA
Código:	TAUFOSFOPL
Técnica:	Inmunoensayo quimioluminiscente (CLEIA)
Unidades:	pg/mL
Plazo:	24 días
Tubo:	Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional:	1 mL plasma (EDTA) separado y congelado en tubo de polipropileno (especial a su disposición). CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.
Valores de referencia:	(Inf. 2) Concentraciones superiores a 2,00 pg/mL deben ser consideradas en el algoritmo diagnóstico de enfermedad de Alzheimer(EA). Concentraciones inferiores a 2,00 pg/mL con un cociente beta amiloide 1-42/1-40 en plasma inferior a 0,083, deben ser consideradas en el diagnóstico de EA.

Descripción:	PROTEINA TAU FOSFORILADA 181 EN PLASMA
Código:	TAUFOSFOPL
Técnica:	Inmunoensayo quimioluminiscente (CLEIA)
Unidades:	pg/mL
Plazo:	24 días
Tubo:	Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional:	1 mL plasma (EDTA) separado y congelado en tubo de polipropileno (especial a su disposición). CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.
Valores de referencia:	(Inf. 2) Concentraciones superiores a 2,00 pg/mL deben ser consideradas en el algoritmo diagnóstico de enfermedad de Alzheimer(EA). Concentraciones inferiores a 2,00 pg/mL con un cociente beta amiloide 1-42/1-40 en plasma inferior a 0,083, deben ser consideradas en el diagnóstico de EA.

Descripción:	PROTEINA TAU FOSFORILADA 217 EN PLASMA
Código:	TAUFOSF217
Técnica:	Enzimoinmunoensayo quimioluminiscente (CLEIA)
Unidades:	pg/mL
Plazo:	17 días
Tubo:	Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional:	1 mL plasma (EDTA)en tubo de polipropileno (pedir a Almacen). CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.
Valores de referencia:	(Inf. 0.18) Concentración de biomarcador no sugestivo de enfermedad de Alzheimer con sensibilidad y especificidad del 95%. (0.18 - 0.35) Concentración de biomarcador no concluyente que recomienda continuar con el estudio del/la paciente. (Sup. 0.35) Concentración de biomarcador compatible con enfermedad de Alzheimer con sensibilidad y especificidad del 95%. Accuracy and clinical applicability of plasma tau 181 and 217 for Alzheimer’s disease diagnosis in a memory clinic cohort. (Sarto et al, 2025)

Descripción:	PROTEINA TAU FOSFORILADA 217 EN PLASMA
Código:	TAUFOSF217
Técnica:	Enzimoinmunoensayo quimioluminiscente (CLEIA)
Unidades:	pg/mL
Plazo:	17 días
Tubo:	Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional:	1 mL plasma (EDTA)en tubo de polipropileno (pedir a Almacen). CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.
Valores de referencia:	(Inf. 0.18) Concentración de biomarcador no sugestivo de enfermedad de Alzheimer con sensibilidad y especificidad del 95%. (0.18 - 0.35) Concentración de biomarcador no concluyente que recomienda continuar con el estudio del/la paciente. (Sup. 0.35) Concentración de biomarcador compatible con enfermedad de Alzheimer con sensibilidad y especificidad del 95%. Accuracy and clinical applicability of plasma tau 181 and 217 for Alzheimer’s disease diagnosis in a memory clinic cohort. (Sarto et al, 2025)

Descripción:	PROTEINAS ORINA 24HORAS
Código:	PT2
Técnica:	Espectrometría
Unidades:	mg/24 h
Plazo:	2 días
Tubo:	Orina 24 Horas
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 100)

Descripción:	PROTEINAS TOTALES LCR
Código:	LIQLCPT
Técnica:	Espectrofotometría
Unidades:	mg/dL
Plazo:	3 días
Tubo:	Líquido Bioquímica
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(15 - 45)

Descripción:	PROTEINAS TOTALES SUERO
Código:	PT
Técnica:	
Unidades:	g/dL
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(6 - 8.3)

Descripción:	PROTEINASA-3 AC.
Código:	PR3
Técnica:	EIA
Unidades:	IU/mL
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL

Descripción:	PROTEINASA-3 AC.
Valores de referencia:	(Inf. 2.0) Negativo (2.0 - 3.0) Indeterminado

Descripción:	Proteus, Sd. Sec Gen: AKT1
Código:	GEN_000642
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Protoporfiria ligada al X. Panel NGS
Código:	GEN_000644
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Protoporfiria ligada al X. Sec Gen: ALAS2
Código:	GEN_000643
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	PROTOPORFIRINA LIBRE SANGRE
Código:	PROTOLIBRE
Técnica:	Fluorimetria
Unidades:	µg/dL
Plazo:	5 días
Tubo:	Heparina Litio
Comentario adicional:	5 mL sangre total Heparina Na.Refrigerado. Altyernativa: 5 mL sangre total EDTA. Refrigerado.
Valores de referencia:	(Inf. 55)

Descripción:	PROTROMBINA AC. IGG SUERO
Código:	PROTROMIGG
Técnica:	EIA
Unidades:	
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1mL de suero refrigerado

Descripción: PROTROMBINA AC. IGG SUERO
Valores de referencia: (Inf. 10) Negativo
(Sup. 10) Positivo

Descripción: PROTROMBINA AC. IGM SUERO
Código: PROTROMIGM
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1mL de suero refrigerado
Valores de referencia: (Inf. 10) Negativo
(Sup. 10) Positivo

Descripción: PROTROMBINA CAPILAR
Código: INRC
Técnica:
Unidades:
Plazo: 1 días
Tubo:
Comentario adicional:
Valores de referencia: 2-3

Descripción: Prueba de paternidad/ maternidad probatoria-judicial
Código: PATERNIDA2
Técnica:
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Lleva KIT especial con cadena de custodia (solictar kit) a Asesoría genética.

Este código incluye 2 individuos: padre o madre + hijo/a, pero también puede ir el 2do progenitor gratis (y serían 3 muestras por el mismo precio)

Enviar kit completo a la Att. C/Alfonso XII, Carmen del Palacio
Valores de referencia:

Código: PFLACT
Descripción: PRUEBA FUNCIONAL AC.LACTICO TRAS EJERCICIO
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	LACTICO	14118-4		ACIDO LACTICO (LACTATO) PLASMA	mg/dL	(5.7 - 22)
Prueba	TPOEJERC			TIEMPO DE EJERCICIO	minutos	
Prueba	LACTICO1	57356-8		ACIDO LACTICO TRAS 1 MINUTO DE EJERCICIO	mg/dL	
Prueba	LACTICO3	57361-8		ACIDO LACTICO TRAS 3 MINUTOS DE EJERCICIO	mg/dL	
Prueba	LACTICO5	57363-4		ACIDO LACTICO TRAS 5 MINUTOS DE EJERCICIO	mg/dL	

Descripción:	Prueba interna - Informe PDF
Código:	INFORMEPDF
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	
Tubo:	
Comentario adicional:	Prueba interna laboratorio
Valores de referencia:	

Descripción:	Prueba No Treponémica (RPR)
Código:	VDRLMICRO
Técnica:	Aglutinación
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	

Descripción:	Prueba parentesco judicial entre 2 individuos
Código:	PARENTESCO
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	10 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:	Lleva KIT especial con cadena de custodia, solictar a asesoría genética, Enviar con las muestras a Alfonso XII Muestra: mucosa bucal con Hisopo sin medio Esta prueba es para 2 individuos pero también puede ir la madre gratis (y serían 3 muestras por el mismo precio)
Valores de referencia:	

Descripción:	PSA LIBRE SUERO
Código:	PSALIBRE
Técnica:	ICMA
Unidades:	ng/mL
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	PSA SUERO (ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO)
Código:	PSA
Técnica:	ICMA
Unidades:	ng/mL
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 4) Hombre (Inf. 0.03) Mujer

Descripción: PSA-LIBRE/PSA-TOTAL RATIO
Código: PSARATIO
Técnica: ICMA + Cálculo
Unidades:
Plazo: 2 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: P-SELECTINA SOLUBLE, SUERO
Código: PSELES
Técnica:
Unidades: ng/mL
Plazo: 22 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero refirgerado
Valores de referencia: (36 - 140)

Descripción: Pseudoacondroplasia. Sec Gen: COMP
Código: GEN_000645
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Pseudohipoaldosteronismo. Panel NGS
Código: GEN_000646
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Pseudohipoparatiroidismo primario: gen GNAS (NGS)
Código: GNAS_MUTS
Técnica: NGS y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM. Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Pseudoxantoma elástico. Panel NGS
Código: GEN_000647
Técnica:
Unidades:

Descripción: Pseudoxantoma elástico. Panel NGS
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Pseudoxantoma elástico: gen ABCC6 (NGS)
Código: ABCC6_MUTS
Técnica: NGS y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM. Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Pterigion múltiple, Sd. Sec Gen: CHRNG
Código: GEN_000649
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Pterigion múltiple. Panel NGS
Código: GEN_000650
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: PURINAS Y PIRIMIDINAS EN ORINA
Código: PURPIRORIN
Técnica: CROMATOGTAFÍA LÍQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN
Unidades: mmol/mol crea
Plazo: 24 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: 10 mL orina (micción aislada). CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.
Valores de referencia:

Descripción: Púrpura trombocitopénica trombótica. Sec Gen: ADAMTS13
Código: GEN_000651
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Descripción: Púrpura trombocitopénica trombótica. Sec Gen: ADAMTS13

Valores de referencia:

Descripción: PV/MF IDIOPÁTICA/TE · JAK2(V617F) · HOT SPOT

Código: JAK2_V617F

Técnica: PCR

Unidades:

Plazo: 7 días

Tubo: TUBO ONCOGENETICA

Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación rotulado con ONCO.
También sirve médula ósea
IMPORTANTE: REFRIGERADO SIEMPRE

Valores de referencia:

Descripción: QT corto, Sd. Panel NGS

Código: GEN_000652

Técnica:

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Código: QUANTIFERO

Descripción: QUANTIFERON TB GOLD PLUS

Técnica: Quimioluminiscencia

Comentario adicional: QUANTIFERON TB-GOLD PLUS kit nuevo
4 Tubos para la recogida de sangre
(Nil, TB1 Antigen, TB2 Antigen, Mitogen).
Se llena cada tubo con sangre hasta la zona central de la MARCA NEGRA (1 mL).
Sacudir los tubos con energía durante 5 seg (10 veces).
Incubar 37°C durante 16-24 horas en posición vertical.
Centrifugar los tubos (2000-3000 g durante 15 min), asegurando la separación del plasma.
Enviar los tubos para su análisis en su envase original.

- SI ES ENVIADO DESDE MADRID: PUEDEN ENVIAR LOS TUBOS SIGUIENDO LA PREPARACIÓN REALIZANDO LOS PASOS HASTA JUSTO ANTES DE LA INCUBACIÓN. NECESARIO ENVIAR ANTES DE 6 H TRAS LA EXTRACCIÓN.ENVIAR DE LUNES A JUEVES.

- SI ES ENVIADO DESDE PROVINCIAS: ES NECESARIO QUE TENGAN ESTUFA Y HAGAN LA PREPARACIÓN HASTA EL FINAL.

la marca negra en la etiqueta de los tubos indica el rango válido de llenado de los mismos (0.8-1.2 ml).

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	NULOQFT	71776-9		Control Negativo del paciente	UI/mL	
Prueba	TB1QFT	46217-6		TB1	UI/mL	
Prueba	TB2QFT	88518-6		TB2	UI/mL	
Prueba	INTERPQFT	71773-6		INTERPRETACION QFT		
Prueba	MITQFT	71772-8		Control positivo MITOGEN QUANTIFERON-TB	UI/mL	
Prueba	NULO25#			Control negativo QUANTIFERON-TB (25%)		
Prueba	TB1QFT#	64084-7		TB1-NULO	UI/mL	
Prueba	TB2QFT#	88517-8		TB2-NULO	UI/mL	
Prueba	MITQFT#	71774-4		MITQFT-NULOQFT	UI/mL	

Descripción:	QUERATINA AC. IgG SUERO
Código:	QUERAACG
Técnica:	IFI
Unidades:	
Plazo:	23 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	<1:10 Negativo >1:10 Positivo

Descripción:	Queratocono tipo 1. Sec Gen: VSX1
Código:	GEN_000653
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Queratodermia palmoplantar epidermolítica. Sec Gen: KRT9
Código:	GEN_000654
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Queratosis palmoplantar estriada. Panel NGS
Código:	GEN_000655
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Querubinismo. Sec Gen: SH3BP2
Código:	GEN_000656
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	QUETIAPINA
Código:	QUETIAPINA

Descripción:	QUETIAPINA
Técnica:	Cromatografía líquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)
Unidades:	µg/L
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Volumen 0.5 mL (Volumen mínimo 0,1 mL) Tubo suero sin gel separador Muestra alternativa: Plasma EDTA.
Valores de referencia:	(100 - 500) (Sup. 1000) Toxicidad

Descripción:	QUIMOTRIPSINA HECES
Código:	QUIMIOTRIP
Técnica:	Espectrofotometría
Unidades:	U/g
Plazo:	8 días
Tubo:	heces especiales
Comentario adicional:	5 g heces en un tubo. REFRIGERAR Se recomienda suspender toda medicación como mínimo 5 días antes.
Valores de referencia:	(Sup. 6.0) Se consideran valores normales (3.0 - 6.0) Indeterminado

Descripción:	QUINASA ESPECIFICA MUSCULAR (MuSK) AC. SUERO
Código:	AC.MUSK
Técnica:	EIA
Unidades:	U/mL
Plazo:	15 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 0.40)

Descripción:	Quitotriosidasa (E. Gaucher), sangre seca
Código:	QUITOTRIO
Técnica:	Fluorimetría
Unidades:	µmol/L x Hora
Plazo:	17 días
Tubo:	Tubo Especial
Comentario adicional:	Recoger gotas de sangre SIN ANTICOAGULANTE en 2 a 4 círculos de papel filtro (Solicitar a almacen). Dejar secar al aire libre durante 1 hora. Guardar en nevera en bolsa de plástico cerrada hasta el envío. Enviar a temperatura ambiente. INDISPENSABLE informe clínico y antecedentes familiares.
Valores de referencia:	(14.0 - 186.0)

Descripción:	QUITOTRIOSIDASA SUERO
Código:	QUITOTRI
Técnica:	Cinética
Unidades:	nmol/h/mL
Plazo:	47 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	3 mL suero. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO. Indicar fecha nacimiento e historia clínica.

Descripción:	QUITOTRIOSIDASA SUERO
Valores de referencia:	(19 - 208)

Descripción:	RABIA VIRUS AC. CONTROL VACUNACION SUERO
Código:	RABIAC
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	UI/mL
Plazo:	10 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero refriferado Volumen mínimo 0.50 mL
Valores de referencia:	(Sup. 0.50) Protección efectiva

Descripción:	Raquitismo hereditario. Panel NGS
Código:	GEN_000657
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Raquitismo hipofosfatémico ligado cr. X. Sec Gen: PHEX
Código:	GEN_000447
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Raquitismo hipofosfatémico. Panel NGS
Código:	GEN_000658
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Raquitismo y alopecia, Sd. Sec Gen: VDR
Código:	GEN_000659
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Rasopatías. Panel NGS
Código:	GEN_000660

Descripción: Rasopatías. Panel NGS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Código: RAST_1
Descripción: RAST (IGE ESPECÍFICA) A MEDICAMENTOS
Técnica:
Comentario adicional: Suero.
Alternativa: plasma EDTA

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	C234	5000204		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS PRILOCAINA	U/mL	(Inf. 0.35)
Prueba	Q01	7108-4		IGE ESPECIFICOA ACIDO ACETILSALICILICO (ASPIRINA) SUERO	KU/L	
Prueba	Q02	50033-0		IGE ESPECIFICA A CEFALOSPORINA	kU/L	
Prueba	Q04	56778-4		IGE ESPECIFICA A ARTICAINA (ULTRACAIN)	KU/L	
Prueba	C308	16568-8		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS CEFUROXIMA	kU/L	
Prueba	Q06	48783-5		IGE ESPECIFICA A DIPIRONA(METAMIZOL) SUERO	kU/L	
Prueba	Q07	11171-6		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS ERITROMICINA SUERO	kU/L	
Prueba	Q08	54913-9		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS GENTAMICINA	kU/L	
Prueba	Q09	5000165		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS INDOMETACINA(C282)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	Q10			IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS LIDOCAINA (XILOCAINA)	kU/L	
Prueba	Q11	56877-4		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS MEPIVACAINA (SCANDICAIN)	kU/L	
Prueba	Q12	6711-6		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS PARACETAMOL SUERO	kU/L	
Prueba	Q13	49864-2		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS PROCAINA (NOVOCAINA)	kU/L	
Prueba	Q14	50031-4		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS SULFAMETOXAZOL	kU/L	
Prueba	Q15	49855-0		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS TETRACICLINA	kU/L	
Prueba	Q16	18258-4		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS TRIMETOPRIM (C242)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	Q17	56696-8		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS CLOXACILINA SUERO	kU/L	
Prueba	Q84	56711-5		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS ACIDO BENZOICO	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	Q20	56699-2		IGE ESPECIFICA A BUPIVACAINA (SVEDOCAIN)	kU/L	
Prueba	Q21			IGE ESPECIFICA A ACIDO CLAVULANICO	kU/L	
Prueba	X43	57313-9		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS PIRAZOLONAS	kU/L	(Inf. 0.35)

Componentes						
Prueba	Q23	56700-8		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS NAPROXENO	kU/L	
Prueba	Q24	56701-6		IGE ESPECIFICA A DICLOFENAC (VOLTAREN)	kU/L	
Prueba	Q25	56702-4		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS CIPROFLOXACINA	kU/L	
Prueba	Q26	11171-6		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS ESTREPTOMICINA (C295)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	Q27	56878-2		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS FENILBUTAZONA (BUTAZOLIDINA)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	Q28	58903-6		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS NEOMICINA SUERO	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	Q29	5003801		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS FLUORESCEINA SODICA	kU/L	
Prueba	Q30	54912-1		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS FOSFOMICINA	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	Q31	5000178		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS LINCOMICINA SUERO	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	Q33	56703-2		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS PIROXICAM	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	Q34	5000180		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS RIFAMPICINA	kU/L	
Prueba	Q35	5000181		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS TETRACAINA	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	Q37	56705-7		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS TOBRAMICINA	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	Q38	5000184		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS VITAMINA B1 SUERO	kU/L	
Prueba	Q39	5000185		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS VITAMINA B6	kU/L	
Prueba	Q40	5000186		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS VITAMINA B12 SUERO	kU/L	
Prueba	Q41	54923-8		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS PROPIFENAZONA (CIBALGINA)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	Q42	5006669		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS BROMHEXINA SUERO	kU/L	
Prueba	Q43	56706-5		IGE ESPECIFICA MEDICAMENTOS DOXICICLINA (C216)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	Q47	56708-1		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS METRONIDAZOL	kU/L	
Prueba	Q49	56879-0		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS LACTOSA SUERO	kU/L	
Prueba	Q50	56709-9		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS TARTRAZINA	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	Q56	56711-5		RAST A MEDICAMENTOS BENZOATO SODICO SUERO	kU/L	
Prueba	Q57	49868-3		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS IBUPROFENO	kU/L	
Prueba	Q58	5000196		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS NORFLOXACINA	kU/L	
Prueba	Q59	42894-6		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS CLINDAMICINA	kU/L	
Prueba	Q60	5000197		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS CLORANFENICOL SUERO	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	Q61	5000198		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS KETOPROFENO SUERO	kU/L	
Prueba	Q62	5006676		IGE ESPECIFICAA ACIDO MEFENÁMICO (COSLAN) SUERO	kU/L	
Prueba	Q63	98052-4		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS MINOCICLINA	kU/L	

Componentes						
Prueba	Q64	56710-7		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS CLARITROMICINA	kU/L	
Prueba	Q66	5000201		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS EPINEFRINA	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	Q67	5006667		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS ACETILCISTEINA	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	Q71	5000202		IGE ESPECIFICO A MEDICAMENTOS AC ASCORBICO	U/mL	(Inf. 0.35)
Prueba	Q72			IGE ESPECIFICO A AMARILLO NARANJA	kU/L	
Prueba	Q74	56712-3		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS DEXAMETASONA	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	Q78	5006673		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS TEOFILINA	kU/L	
Prueba	Q80	5009875		IGE ESPECIFICA A CLORURO DE COBRE	kU/L	
Prueba	Q83	5001301		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS BENZOCAINA	kU/L	
Prueba	Q85	5009865		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS AMIDOTRIZOATO DE MEGLUMINA	kU/L	
Prueba	Q86	5006677		IGE ESPECIFICA A AMIDOTRIZOATO DE SODIO	kU/L	
Prueba	Q90	5009870		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS PREDNISOLONA	kU/L	
Prueba	Q92	5001845		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS VANCOMICINA	kU/L	
Prueba	Q94	56747-9		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS AZITROMICINA (X04)	kU/L	
Prueba	X09	5010565		IGE ESPECIFICA A CLORURO DE ALUMINIO	kU/L	
Prueba	X51	5009871		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS TETRAZEPAM	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	X41			IGE ESPECIFICA A ASPARTAMO	kU/L	
Prueba	C260	5002634		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS MORFINA	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	X56	5009869		IGE ESPECIFICO A MEDICAMENTOS NITROFURANTOÍNA	kU/L	
Prueba	X22	5003798		IGE ESPECIFCO A MEDICAMENTOS ALOPURINOL	kU/L	
Prueba	X24			IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS CAPTOPRIL	kU/L	
Prueba	X47			IGE ESPECIFICO A ACIDO MOLIBDICO	kU/L	
Prueba	C70	6149-9		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS INSULINA PORCINA	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	C71			IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS INSULINA BOVINA	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	X52	5005738		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS OMEPRAZOL	kU/L	
Prueba	X55	5009868		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS LEVOTIROXINA	kU/L	
Prueba	Q91	5003907		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS TIOMERSAL	kU/L	
Prueba	Q73	5003799		IGE ESPECIFICO A MEDICAMENTOS AMBROXOL	kU/L	
Prueba	X12	5003804		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS FUROSEMIDA	kU/L	
Prueba	X14			IGE ESPECIFICO A MEDICAMENTOS HIDROCLOROTIAZIDA	kU/L	
Prueba	X38	5011561		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS OFLOXACINO SUERO	kU/L	

Código: RAST

Descripción: RAST (IGE ESPECÍFICA)

Técnica: CAP-SYSTEM

Comentario adicional: Suero
Alternativa: Plasma de edta

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	D205	63463-4		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rDer p 10 Tropomiosina D. pt	kU/L	(Inf. 0.10) No se detectan
Prueba	C05	6712-4		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS AMPICILINA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	C06	6829-6		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS AMOXICILINA	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	C08	66717-0		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS CLORHEXIDINA	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	C308	16568-8		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS CEFUROXIMA	kU/L	
Prueba	E214	13833-9		IGE ESPECIFICA A ANIMALES PLUMAS PINZON	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	C71			IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS INSULINA BOVINA	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	C73	6148-1		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS INSULINA HUMANA	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	C74	7332-0		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS GELATINA	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E102	58772-5		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rCAn f 2 Perro	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E226	64973-1		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rCan f 5 perro	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	D01	6096-2		IGE ESPECIFICA A ACAROS DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	D02	6095-4		IGE ESPECIFICA A ACAROS DERMATOPHAGOIDES FARINAE SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	D03	14036-8		IGE ESPECIFICA A ACAROS DERMATOPHAGOIDES MICROCERAS SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	D202	88708-3		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rDer p 1 D. Pteronyssimus	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	D203	63457-6		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rDer p 2 D. Pteronyssimus	kU/L	(Inf. 0.10)

Componentes						
Prueba	D70	6254-7		IGE ESPECIFICA A ACAROS ACARUS SIRO SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	D71	6160-6		IGE ESPECIFICA A ACAROS LEPIDOGLYPHUS DESTRUCTOR SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	D72	6256-2		IGE ESPECIFICA A ACAROS TYROPHAGUS PUTRESCENTIAE SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	D73	6126-7		IGE ESPECIFICA A ACAROS GLYCYPHAGUS DOMESTICUS SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	D74	6114-3		IGE ESPECIFICA A ACAROS EUROGLYPHUS MAYNEI SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E01	6833-8		IGE ESPECIFICA A ANIMALES CASPA DE GATO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E203	10943-9		IGE ESPECIFICA A ANIMALES VISON	KU/L	(Inf. 0.10) No se detectan
Prueba	E03	6143-2		IGE ESPECIFICA A ANIMALES CASPA DE CABALLO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E04	6091-3		IGE ESPECIFICA A ANIMALES CASPA DE VACA	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E05	6098-8		IGE ESPECIFICA A ANIMALES CASPA DE PERRO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E06	6134-1		IGE ESPECIFICA A ANIMALES EPITELIO DE COBAYA	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E07	6217-4		RAST A ANIMALES EXCREMENTO DE PALOMA	kU/L	(Inf. 0.1)
Prueba	E101	58773-3		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rCan f 1Canis familiaris Perro	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E228	64976-4		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rFel d 4 gato	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E229			IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rCan f 4 Perro	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E200	16535-7		IGE ESPECIFICA A ANIMALES EXCREMENTO DE CANARIO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RE230			IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rCan f 6 Perro	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E70	6129-1		IGE ESPECIFICA A ANIMALES PLUMAS DE OCA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E71	6179-6		IGE ESPECIFICA A ANIMALES EPITELIO DE RATON SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E72	6181-2		IGE ESPECIFICA A ANIMALES PROTEINAS DE ORINA DE RATON	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E73	6224-0		IGE ESPECIFICA A ANIMALES EPITELIO DE RATA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E74	6226-5		IGE ESPECIFICA A ANIMALES PROTEINAS DE ORINA DE RATA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)

Componentes						
Prueba	E75	6225-7		IGE ESPECIFICA A ANIMALES PROTEINAS SERICAS DE RATA	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E76	6180-4		IGE ESPECIFICA A ANIMALES PROTEINAS SERICAS DE RATON SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E77	6304-0		IGE ESPECIFICA A ANIMALES EXCREMENTOS DE PERIQUITO SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E78	6030-1		IGE ESPECIFICA A ANIMALES PLUMAS DE PERIQUITO (E78)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E80	6127-5		IGE ESPECIFICA A ANIMALES EPITELIO DE CABRA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E81	6243-0		IGE ESPECIFICA A ANIMALES EPITELIO DE OVEJA (LANA)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E82	6223-2		IGE ESPECIFICA A ANIMALES EPITELIO DE CONEJO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E83	6262-0		IGE ESPECIFICA A ANIMALES EPITELIO DE CERDO SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E84	6135-8		IGE ESPECIFICA A ANIMALES EPITELIO DE HAMSTER	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E85	6070-7		IGE ESPECIFICA A ANIMALES PLUMAS DE POLLO SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E86	6100-2		IGE ESPECIFICA A ANIMALES PLUMAS DE PATO SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E87	19753-3		IGE ESPECIFICA A ANIMALES RATA	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E88	19751-7		IGE ESPECIFICA A ANIMALES RATON SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E89	7753-7		IGE ESPECIFICA A ANIMALES PLUMAS DE PAVO SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E94	64975-6		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rFel d1 Gato	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E227	64974-9		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE Equ c 1 Caballo	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	EX1	30185-3		IGE ESPECIFICA A CASPA ANIMALES MEZCLA (e1, e2, e4, e5)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	EX2	82047-2		IGE ESPECIFICA A ANIMALES MEZCLA (e1, e5, e6, e87, e88)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	F01	6106-9		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CLARA DE HUEVO SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F02	7258-7		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS LECHE DE VACA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F03	6082-2		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS BACALAO (PESCADO) SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)

Componentes						
Prueba	F04	6276-0		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS TRIGO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F05	7674-5		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CENTENO SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F06	6037-6		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CEBADA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F07	6190-3		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS AVENA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F08	6087-1		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MAIZ SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F09	6230-7		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS ARROZ SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F10	6242-2		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS SEMILLA DE SESAMO SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F11	6054-1		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS TRIGO SARRACENO (ALFORFON)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F12	6204-2		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS GUISANTES SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F13	6206-7		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CACAHUETE SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F14	6248-9		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS SOJA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F15	6279-4		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS JUDIA BLANCA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F17	6136-6		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS AVELLANA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F18	6050-9		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS NUEZ DE BRASIL SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F20	6019-4		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS ALMENDRA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F23	6092-1		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CANGREJO DE MAR SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F54	7627-3		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS BONIATO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F24	6246-3		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CAMARON (LANGOSTINO) SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F25	6266-1		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS TOMATE SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F26	6219-0		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CARNE DE CERDO SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)

Componentes						
Prueba	G211	31000-3		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rPhl p 11 Hierba timotea	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F27	6039-2		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CARNE DE VACA (TERNERA)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F272	11202-9		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS ESTRAGON	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F277	7280-1		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS ENELDO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F288	7152-2		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS ARANDANO AZUL SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F301	10947-0		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CAQUI SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F31	6061-6		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS ZANAHORIA	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F316	11195-5		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS SEMILLA DE COLZA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	G216	65775-9		IGE ESPECIFICA A NATIVO nCyn d 1 GRAMA (Cynodon dactylon)	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RG208	30997-1		IGE ESPECIFICA A NATIVO nPhl p 4 polen HIERBA TIMOTEA	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F33	6194-5		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS NARANJA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F333	7312-2		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS LINAZA SEMILLA DE LINO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F35	6220-8		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS PATATA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F352	63477-4		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rAra h 8 PR-10 Cacahuete	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F36	6081-4		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS COCO SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F353	63476-6		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rGly m 4 PR-10, Soja	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F37	6048-3		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEJILLON SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F40	6270-3		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS ATUN SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F41	6237-2		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS SALMON SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F416	58752-7		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rTri a 19 Omega-5 Gliadina	kU/L	(Inf. 0.10)

Componentes						
Prueba	F420	59391-3		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rPru p3 (LTP) Melocoton	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F421	58775-8		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rPru p 4 profilina Melocoton	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F422	58779-0		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rAra h 1 Cacahuete	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F423	58778-2		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rAra h 2 Cacahuete	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F424	58777-4		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rAra h 3 Cacahuete	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F427	64965-7		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rAra h 9 (LTP) Cacahuete	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F430	64959-0		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rAct d8 PR-10 Kiwi	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F44	6257-0		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS FRESA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F45	6287-7		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS SACCHAROMYCES CEREVISIAE	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F47	6122-6		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS AJO SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F48	6193-7		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CEBOLLA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F49	6021-0		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MANZANA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RG209	30998-9		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rPhl p 6 Polen Hierba Timotea	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F55	6175-4		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MIJO COMUN SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F58	14038-4		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CALAMAR DEL PACIFICO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F59	10944-7		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS PULPO SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F60	11184-9		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS JUREL SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F75	6107-7		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS YEMA DE HUEVO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F76	7445-0		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS ALFA-LACTOALBUMINA (LECHE)	kU/L	(Inf. 0.10)

Componentes						
Prueba	F77	41397-1		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS BETA-LACTOGLOBULINA (LECHE)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F78	6062-4		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CASEINA (LECHE DE VACA) SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F79	6125-9		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS GLUTEN (TRIGO) SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F80	6165-5		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS BOGAVANTE SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F81	6067-3		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS QUESO (TIPO CHEDAR)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F82	6068-1		IGE ESPECIFICA A QUESO (CAMB.BRIE.GORG.ROQF)	kU/L	
Prueba	F83	6071-5		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CARNE DE POLLO SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F84	6154-9		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS KIWI SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F85	6065-7		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS APIO SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F86	6203-4		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS PEREJIL SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F87	57884-9		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MELON SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F88	6155-6		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CARNE DE CORDERO SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F89	6185-3		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MOSTAZA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F90	6166-3		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MALTA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F91	6167-1		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MANGO SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F92	6035-0		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS PLATANO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F93	6080-6		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CACAO SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F94	6207-5		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS PERA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F95	6205-9		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MELOCOTON SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F98	82583-6		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS GLIADINA	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F426	63473-3		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rGad c 1; Parvalbumina Bacalao	kU/L	(Inf. 0.10)

Componentes						
Prueba	F433	64966-5		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rTri a 14 LTP Trigo	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F96	6033-5		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS AGUACATE SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	FX1	46708-4		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEZCLA (f13, f17, f18, f20, f36)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX14	75005-9		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEZCLA (f25, f214, f216, f218)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX15	69958-7		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEZCLA (f33, f49, f92, f95)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX16	82059-7		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEZCLA (f44, f94, f208, f210)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX2	46712-6		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEZCLA (f40, f3, f24, f37, f41)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX21	82098-5		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEZCLA (f210, f92, f84, f87, f95)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX3	52972-7		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEZCLA (f4, f7, f8, f10, f11)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX5E	30187-9		IGE ESPECIFICA A ALIMENTO MEZCLA (f1, f2, f3, f4, f13, f14)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX70	73712-2		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEZCLA (f272, f273, f274, f275)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX71	73714-8		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEZCLA (f265, f266, f267, f268)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX73	69922-3		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEZCLA (F83, F26, F27)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	I211	66714-7		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rVes v 1 Fosfolipasa A1 Avispa	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	G01	6261-2		IGE ESPECIFICA A POLENES DE GRAMINEAS ANTHOXANTHUM ODORATUM	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	G02	6041-8		IGE ESPECIFICA A POLENES DE GRAMINEAS CYNODON DACTYLON	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	G03	6195-2		IGE ESPECIFICA A POLENES DE GRAMINEAS DACTYLIS GLOMERATA	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	G04	6169-7		IGE ESPECIFICA A POLENES DE GRAMINEAS FESTUCA ELATIOR	kU/L	(Inf. 0.10)

Componentes						
Prueba	G05	7369-2		IGE ESPECIFICA A POLENES DE GRAMINEAS LOLIUM PERENNE	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	G06	6265-3		IGE ESPECIFICA A POLENES DE GRAMINEAS PHLEUM PRATENSE	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	G07	6855-1		IGE ESPECIFICA A POLENES DE GRAMINEAS PHRAGMITES COMMUNIS	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	G08	6153-1		IGE ESPECIFICA A POLENES DE GRAMINEAS POA PRATENSIS	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	G09	6228-1		IGE ESPECIFICA A POLENES DE GRAMINEAS AGROSTIS STOLONIFERA	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	G10	6152-3		IGE ESPECIFICA A POLENES DE GRAMINEAS SORGHUM HALEPENSE	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	G11	6053-3		IGE ESPECIFICA A POLENES DE GRAMINEAS BROMUS INERMIS	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	G12	6236-4		IGE ESPECIFICA A P. DE GRAMINEAS SECALE CEREALE (CENTENO)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	G13	6272-9		IGE ESPECIFICA A P. DE GRAMINEAS HOLCUS LANATUS (HENO B.)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	G14	6093-9		IGE ESPECIFICA A P. DE GRAMINEAS AVENA SATIVA (AVENA)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	G15	6277-8		IGE ESPECIFICA A P. DE GRAMINEAS TRITICUM SATIVUM (TRIGO)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	G16	6170-5		IGE ESPECIFICA A P. DE GRAMINEAS ALOPECURUS PRATENSIS	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	G17	6034-3		IGE ESPECIFICA A P. DE GRAMINEAS PASPALUM NOTATUM (H. BAHIA)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	G70	16922-7		IGE ESPECIFICA A P. DE GRAMINEAS ELYMUS TRITICOIDES	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	G71	6058-2		IGE ESPECIFICA A PHALARIS ARUNDINACEA (ALPISTE)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	GX1	30189-5		IGE ESPECIFICA A POLENES GRAMINEA MEZCLA(g3, g4, g5, g6, g8)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	GX2	30188-7		IGE ESPECIFICA A POLEN GRAMINEA MEZCLA(g2 g5,g6,g8,g10,g17)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	GX4	69960-3		IGE ESPECIFICA A POLEN GRAMINEAS MEZCLA(g1,g5,g7,g12,g13)	kU/L	(Inf. 0.35)

Componentes						
Prueba	H01	9828-5		IGE ESPECIFICA A POLVOS DE CASA (GREER)	kU/L	
Prueba	H02	7425-2		IGE ESPECIFICA A POLVOS DE CASA (HOLLISTER-STIER)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	HX2	37987-5		IGE ESPECIFICA A POLVO CASA MEZCLA (h2,d1,d2,i6)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	I01	6844-5		IGE ESPECIFICA A INSECTOS APIS MELLIFERA (VENENO DE ABEJA)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	I02	6280-2		IGE ESPECIFICA A INSECTOS DOLICHOVESPULA MACULATA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	I03	6740-5		IGE ESPECIFICA A INSECTOS VESPULA SPP. (VENENO DE AVISPA)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	I04	6198-6		IGE ESPECIFICA A INSECTOS POLISTES SPP. (VENENO DE AVISPA)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	I05	6288-5		IGE ESPECIFICA A INSECTOS DOLICHOVESPULA ARENARIA (AVISPON)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	I06	6078-0		IGE ESPECIFICA A INSECTOS BLATELLA GERMANICA (CUCARACHA)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	I08	7502-8		IGE ESPECIFICA A INSECTOS GUSANO/MARIPOSA DE SEDA	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	I216	94276-3		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rApi m 5 Apis mellifera	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	I208	60421-5		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rApi m 1 Fosfolipasa A2 Abeja	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	I209	60240-9		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rVes v 5 Avispa	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	I214	79167-3		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rApi m 2 Abeja	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	I217	82613-1		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rApi m 10 Abeja	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	I210	63436-0		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rPol d 5 Avispa papel	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	I70	6117-6		IGE ESPECIFICA A INSECTOS SOLENOPSIS INVICTA (HORMIGA ROJA)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	I71	6177-0		IGE ESPECIFICA A INSECTOS AEDES COMMUNIS (MOSQUITO) SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	K202	10923-1		IGE ESPECIFICA A ENZIMAS BROMELINA Ananas comosus	KU/L	(Inf. 0.10)

Componentes						
Prueba	I73	6047-5		IGE ESPECIFICA A INSECTOS CHIRONOMUS THUMMI SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	I75	15342-9		IGE ESPECIFICA A INSECTOS AVISPÓN (VESPA CABRO)SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	I76	15339-5		IGE ESPECIFICA A INSECTOS TROGODERMA ANGUSTUM (ESCARABAJO)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	I77	58804-6		IGE ESPECIFICA A INSECTOS POLISTES DOMINULUS/ VENENO AVISPA	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	IGEPENIG	6851-0		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS PENICILINA G (PENICILOIL G)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	IGEPENIV	6210-9		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS PENICILINA V (PENICILOIL V)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	K215	50646-9		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rHev b1 Latex	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	K217	56595-2		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rHev b3 Latex	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RK204	11185-6		IGE ESPECIFICA A ENZIMAS MAXATASA Bacillus licheniformis	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	K224	50647-7		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rHev b 11 Latex	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	W13	6077-2		IGE ESPECIFICA A P. DE HERBACEAS XANTHIUM COMMUNE	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	W230	65782-5		IGE ESPECIFICA A NATIVO nAmb a 1 Ambrosía elatior	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	K72	6150-7		IGE ESPECIFICA A ALERGENOS OCUPACIONALES ISPAGHULA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T25	60238-3		IGE ESPECIFICA A P. DE ARBOLES FRAXINIUS EXCELSIOR	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T73	6032-7		IGE ESPECIFICA A P. DE ARBOLES CASUARINA/PINO AUSTRALIANO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	K75	7431-0		IGE ESPECIFICA A ALERGENOS OCUPACIONALES ISOCIANATO TDI	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	K76	7430-2		IGE ESPECIFICA A ALERGENOS OCUPACIONALES ISOCIANATO MDI	kU/L	(Inf. 0.10)

Componentes						
Prueba	K77	7429-4		IGE ESPECIFICA A ALERGENOS OCUPACIONALES ISOCIANATO HDI	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	K78	6112-7		IGE ESPECIFICA A ALERGENOS OCUPACIONALES OXIDO DE ETILENO	kUA/L	(Inf. 0.10)
Prueba	K79	7601-8		IGE ESPECIFICA A ALERGENOS OCUPACIONALES ANHIDRIDO FTALICO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	K80	6119-2		IGE ESPECIFICA A ALERGENOS OCUPACIONALES FORMALDEHIDO SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	K81	6116-8		IGE ESPECIFICA A ALERGENOS OCUPACIONALES FICUS SPP SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	K82	6158-0		IGE ESPECIFICA A ALERGENOS OCUPACIONALES LATEX SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	K83	6089-7		IGE ESPECIFICA A ALERGENOS OCUPACIONALES SEMILLA DE ALGODON	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	K84	6258-8		IGE ESPECIFICA A ALERGENOS OCUPACIONALES SEMILLA DE GIRASOL	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T214	7275-1		IGE ESPECIFICA A P. DE ARBOLES P. CANARIENSIS (DATILERA)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T217	6213-3		IGE ESPECIFICA A ARBOLES PIMENTERO (Schinus molle)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	K87	7073-0		IGE ESPECIFICA A ALERGENOS OCUPACIONALES ALFA-AMILASA	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	M01	6212-5		IGE ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS PENICILLIUM NOTATUM SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	M02	6075-6		IGE ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS CLADOSPORIUM HERBARUM	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	M03	6025-1		IGE ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS ASPERGILLUS FUMIGATUS	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	M04	6182-0		IGE ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS MUCOR RACEMOSUS SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)

Componentes						
Prueba	M05	6059-0		IGE ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS CANDIDA ALBICANS SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	M06	6020-2		IGE ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS ALTERNARIA ALTERNATA	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	M07	6049-1		IGE ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS BOTRYTIS CINEREA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	M08	6138-2		IGE ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS HELMINTHOSPORIUM HALODES	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	M09	6121-8		IGE ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS FUSARIUM MONILIFORME SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	M10	6252-1		IGE ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS STEMPHYLIUM BOTRYOSUM	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	M11	6229-9		IGE ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS RHIZOPUS NIGRICANS SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	M12	6029-3		IGE ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS AUREOBASIDIUM PULLULANS	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	M13	6216-6		IGE ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS PHOMA BETAE SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	M14	6111-9		IGE ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS EPICOCCUM PURPURASCENS	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	M15	6267-9		IGE ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS TRICHODERMA VIRIDE SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	M16	6094-7		IGE ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS CURVULARIA LUNATA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	M205	6860-1		IGE ESPECIFICA A TRICHOPHYTON RUBRUM	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	M229	58774-1		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rAlt a 1 Alternaria alternata	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	W231	63458-4		IGE ESPECIFICA A NATIVO nArt v 1 Artemisia	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	M80	25821-0		IGE ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS STAPHYLOCOCCAL ENTEROTOXIN A	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	M81	25822-8		IGE ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS STAPHYLOCOCCAL ENTEROTOXIN B	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	MX1	41742-8		IGE ESPECIFICA A MOHOS MEZCLA (m1, m2, m3, m6)	kU/L	(Inf. 0.35)

Componentes						
Prueba	MX2	30183-8		IGE ESPECIFICA A MOHOS MEZCLA (m1, m2, m3, m5, m6,m8)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	MX4	51529-6		IGE ESPECIFICA MOHOS MEZCLA (m3, m207, m36, m228)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	O70	6240-6		IGE ESPECIFICA A FLUIDO SEMINAL SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	P01	6022-8		IGE ESPECIFICA A PARASITOS ASCARIS SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	P04	10919-9		IGE ESPECIFICA A PARASITOS ANISAKIS (EN PESCADO)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T218	6164-8		IGE ESPECIFICA A P. ÁRBOLES QUERCUS VIRGINIANA	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	PHADIAT	57036-6		SCREENING DE NEUMOALERGENOS	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	T222	11168-2		IGE ESPECIFICA A P. DE ARBOLES CUPRESSUS ARIZONICA	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T225	82572-9		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rBbet v 6 POLEN ABEDUL	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T227	65779-1		IGE ESPECIFICA A NATIVO nOle e 7 (LTP) Olivo	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T240	65780-9		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rOle e 9 (Glucanasa) Olivo	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	M204	11204-5		IGE ESPECIFICA A MOHOS ULOCLADIUM CHARTARUM	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	M211	25801-2		IGE ESPECIFICA A TRICHOPHYTON MENT. VAR INTERDIGITALE	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RBETV1	30984-9		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rbet v1 Polen Abedul	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RBETV2	30985-6		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rbet v2 profilina Polen Abedul	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RC202	11201-1		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS SUXAMETHOMIUM (SUCCINILCOLINA)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	M227	51857-1		IGE ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS MALASSEZIA SPP	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RC7	19733-5		IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS CEFACLOR	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RD201	10921-5		IGE ESPECIFICA A ACAROS BLOMIA TROPICALIS	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RE201	7171-2		IGE ESPECIFICA A ANIMALES PLUMAS DE CANARIO	kU/L	(Inf. 0.10)

Componentes						
Prueba	RE204	10922-3		IGE ESPECIFICA A ANIMALES BSA (SUERO DE ALBUMINA BOVINA)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RE206	10960-3		IGE ESPECIFICA A ANIMALES SUERO DE CONEJO SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RE208	30987-2		IGE ESPECIFICA A ANIMALES EPITELIO DE CHINCHILLA	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RE209	7334-6		IGE ESPECIFICA A ANIMALES GERBO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RE211	10961-1		IGE ESPECIFICA A PROTEINA ORINA DE CONEJO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RE213	6202-6		IGE ESPECIFICA A ANIMALES PLUMAS DE LORO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RE215	10948-8		IGE ESPECIFICA A ANIMALES PLUMAS DE PALOMA	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RE217	11172-4		IGE ESPECIFICA A ANIMALES EPITELIO DE HURON	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RE218	19734-3		IGE ESPECIFICA A ANIMALES EXCREMENTO DE POLLO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RE219	6836-1		IGE ESPECIFICA A PROTEINAS DE SUERO DE POLLO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RE220	19732-7		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rFel d 2 Albúmina sérica gato	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RE221	19738-4		IGE ESPECIFICA A NATIVO nCan F3 SEROALBÚMINA PERRO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RE222	19759-0		IGE ESPECIFICA A ANIMALES ALBUMINA SERICA PORCINA	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF201	6208-3		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS NUEZ LISA (PACANA) SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF202	6718-1		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS NUEZ DE ACAJU (ANACARDO) SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF203	7613-3		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS PISTACHO SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF204	6268-7		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS TRUCHA	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF205	6139-0		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS ARENQUE SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF206	7474-0		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CABALLA	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF207	6076-4		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS ALMEJA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF208	6159-8		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS LIMON SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)

Componentes						
Prueba	RF209	6131-7		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS POMELO SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF210	6218-2		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS PIÑA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF211	7151-4		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MORA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF212	6848-6		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CHAMPIÑON SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF213	7642-2		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CARNE DE CONEJO SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF214	6856-9		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS ESPINACA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF215	6161-4		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS LECHUGA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF216	7169-6		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS COL (REPOLLO) SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF217	7160-5		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS COLES DE BRUSELAS SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF218	7563-0		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS PIMIENTA ROJA/PIMENTON/PIMIENTO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF220	6837-9		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CANELA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF221	6083-0		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CAFE SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RM36	6026-9		IGE ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS ASPERGILLUS TERREUS	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF225	6854-4		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CALABAZA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF226	11193-0		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS SEMILLA DE CALABAZA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF227	24165-3		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS SEMILLA DE REMOLACHA (F319) SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF231	10940-5		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS LECHE HERVIDA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF232	7556-4		IGE ESPECIFICA A NATIVO nGal d 2, Ovoalbumina huevo	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF233	7557-2		IGE ESPECIFICA A NATIVO nGal d1, Ovomucoide huevo	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF234	7756-0		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS VAINILLA	kU/L	(Inf. 0.10)

Componentes						
Prueba	RF235			IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS LENTEJAS SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF236	7774-3		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS SUERO DE LA LECHE SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF237	7091-2		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS ALBARICOQUE SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF242	6719-9		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CEREZA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF244	6724-9		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS PEPINO SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF245	7291-8		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS HUEVO ENTERO SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF246	10933-0		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS GUAR (CYAMOPSIS TETRAGONOLOBUS)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF247	7412-0		RAST A ALIMENTOS MIEL SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF253	10954-6		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS PIÑONES (PONUS EDULES) SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF255	6853-6		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CIRUELA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF256	6273-7		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS NUEZ DE NOGAL SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF258	6858-5		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CALAMAR SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF259	6841-1		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS UVA	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF260	6052-5		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS BRECOL SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF261	7099-5		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS ESPARRAGO SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF262	7296-7		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS BERENJENA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF263	6852-8		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS PIMIENTA VERDE	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RM228	6024-4		IGE ESPECIFICA A ASPERGUILLUS FLAVUS	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF268	7234-8		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CLAVO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF269	7118-3		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS ALBAHACA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)

Componentes						
Prueba	RF270	7335-3		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS JENGIBRE SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF271	7081-3		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS ANIS (PIPINELLA ANISUM)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF273	7737-0		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS TOMILLO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF276	10928-0		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS HINOJO FRESCO SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF278	7125-8		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS HOJA DE LAUREL SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	O215	73837-7		IGE ESPECIFICA A NATIVO nGal-Alpha 1,3 Gal TG bovine	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF280	6045-9		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS PIMIENTA NEGRA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF281	7270-2		IGE ESPECIFICA A CURRY SUERO	kU/L	(Inf. 0.1)
Prueba	RF282	6188-7		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS NUEZ MOSCADA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF283	7552-3		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS OREGANO SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF284	6271-1		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CARNE DE PAVO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF286	10936-3		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS LECHE DE YEGUA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF287	7129-0		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS JUDIA PINTA	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF289	31002-9		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS DATIL SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF290	7558-0		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS OSTRA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF291	6835-3		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS COLIFLOR SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RO214	58984-6		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE CCD; MUXF3 DE BROMELIA	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF293	6850-2		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS PAPAYA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF294	10946-2		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MARACUYA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF296	7179-5		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS ALGARROBA SUERO (E 410)	kU/L	(Inf. 0.10)

Componentes						
Prueba	RF297	7382-5		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS GOMA ARABIGA (E 414)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	U254			IGE ESPECIFICA A MEDICAMENTOS ROCURONIO SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF299	6259-6		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CASTAÑA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF300	7340-3		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS LECHE DE CABRA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	I215	94275-5		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rApi m 3 Fosfatasa ác. Abeja	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF302	7731-3		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MANDARINA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF303	6842-9		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS HALIBUT/ FLETAN SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF304	6249-7		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS LANGOSTA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF306	7464-1		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS LIMA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF307	19741-8		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MERLUZA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF308	11197-1		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS SARDINA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF309	7573-9		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS GARBANZO SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	W203	6084-8		RAST A POLENES HERBACEAS BRASSICA NAPUS (COLZA)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF311	10939-7		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS GALLO (PESCADO) SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF312	7728-9		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS EMPERADOR (PEZ ESPADA) SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF313	7079-7		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS ANCHOA (BOQUERON) SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF314	11200-3		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CARACOL SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF315	6831-2		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS JUDIA VERDE SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF317	16650-4		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CILANTRO SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)

Componentes						
Prueba	RF319	19728-5		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS REMOLACHA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF320	7265-2		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CANGREJO DE RIO SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF323	25615-6		IGE ESPECIFICA A NATIVO nGal d3; Conalbumina huevo	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RLEPD2	64981-4		IGE ESPECIFICA Lepidoglyphus destructor (rLep d 2)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF325	19756-6		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS LECHE DE OVEJA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF326	19757-4		IGE ESPECIFICA A SUERO DE LECHE DE OVEJA	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF328	11173-2		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS HIGO SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF329	7770-1		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS SANDIA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF331	19755-8		IGE ESPECIFICA A AZAFRAN SUERO	kU/L	(Inf. 0.1)
Prueba	RF332	11190-6		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MENTA	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	E231R	94278-9		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rFel d 7gato	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF335	50650-1		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS ALTRAMUZ SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF338	7691-9		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS VIEIRA	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF340	25609-9		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS EXTRACTO DE COCHINILLA (E 120)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF342	21428-8		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS OLIVA (ACEITUNA)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF343	7656-2		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS FRAMBUESA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F51	10920-7		IGE ESPECIFICA A BAMBU MOSO	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF345	11183-1		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS NUEZ DE MACADAMIA	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF351	58986-1		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rPen a 1 Tropomiosina Camarón	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RG201	7116-7		IGE ESPECIFICA A P. DE GRAMINEAS HORDEUM VULGARE (CEBADA)	kU/L	(Inf. 0.10)

Componentes						
Prueba	RG202	7248-8		IGE ESPECIFICA A POLENES DE GRAMINEAS ZEA MAYS (MAIZ)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RG205	30994-8		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rPhl p 1 Polen Hierba Timotea	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RG206	30995-5		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rPhl p2 Polen Hierba Timotea	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RG210	30999-7		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rPhl p 7 Polen Hierba Timotea	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RG212	34428-3		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rPhl p 12 profilina H. Timotea	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RG213	34429-1		IGE ESPECIFICA RECOMBINANTE rPhl p1+rPhl p5b Hierba Timotea	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	RG214	34430-9		IGE ESPECIFICA RECOMBINANTE rPhl p7+rPhl p12 Hierba Timotea	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	RG215	58981-2		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rPhl p5b Polen Hierba Timotea	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RI203	10938-9		IGE ESPECIFICA A INSECTOS MARIPOSA DE LA HARINA	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RI204	6144-0		IGE ESPECIFICA A INSECTOS TABANO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RI205	6056-6		IGE ESPECIFICA A INSECTOS ABEJORRO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RI206	30170-5		IGE ESPECIFICA A INSECTOS PERIPLANETA AMERICANA	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F124	33002-7		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS ESCANDA (TRITICUM SPELTA)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F222	6264-6		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS TE	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F224	7623-2		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS SEMILLA DE AMAPOLA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RK208	11182-3		IGE ESPECIFICA A NATIVO nGal d 4; Lisozima huevo de gallina	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F254	10959-5		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS PLATIJA	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F274	10937-1		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEJORANA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F337	7709-9		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS LENGUADO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F347	25743-6		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS QUINOA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)

Componentes						
Prueba	F355	66445-8		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rCyp c1; Parvalbumina Carpa	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RK218	56596-0		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rHev b 5 Latex	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F413	11191-4		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS CARBONERO SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RK220	50649-3		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rHev b 6,02 Latex	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RK221	56597-8		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rHev b 8 Profilina Latex	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F414			IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS TILAPIA	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F417	64960-8		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rApi g 1.01 PR-10 Apio	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RM201	14104-4		IGE ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS USTILAGO NUDA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F419	58776-6		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rPru p1 (PR-10) Melocotón	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RM207	6830-4		IGE ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS ASPERGILLUS NIGER SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RM208	7200-9		IGE ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS CHAETOMIUM GLOBOSUM	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RM209	11187-2		IGE ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS PENICILLIUM FREQUENTANS	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RM218	30986-4		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rAsp f 1 Aspergillus fumigatus	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RM219	30990-6		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rAsp f 2 Aspergillus fumigatus	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RM220	30991-4		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rAsp f 3 Aspergillus fumigatus	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RM221	30992-2		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rAsp f 4 Aspergillus fumigatus	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RM222	30993-0		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rAsp f 6 Aspergillus fumigatus	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RM223	25824-4		IGE ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS STAPHYLOCOCCAL ENTEROTOXIN C	kU/L	(Inf. 0.10)

Componentes						
Prueba	RM226	51856-3		IGE ESPECIFICA A ENTEROTOXINA TSST STAPHYLOC. SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F425	58753-5		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rCor a 8 LTP Avellana	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F428	69421-6		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rCor a 1 PR-10 Avellana	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F432	65772-6		IGE ESPECIFICA A NATIVO nGly m 6 Glicinina Soja	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RO209			IGE ESPECIFICA A PITYROSPORUM ORBICULARE (M70)	kU/L	
Prueba	RO213	91122-2		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE MALTOSA-BINDING PROTEIN	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RS201	5010112		IGE ESPECIFICA A NYLON	kU/L	
Prueba	RS204	7251-2		IGE ESPECIFICA A ALGODON (TRATADO FIBRA) O1 SUERO	kU/L	(Inf. 0.1)
Prueba	RS205	6245-5		IGE ESPECIFICA LANA TRATADA (K20)	U/mL	
Prueba	RS210	6187-9		IGE ESPECIFICA A MOHOS Y HONGOS NEUROSPORA SITOPHILA SUERO	kU/L	
Prueba	RS211	5010189		RAST A ANIMALES SUERO DE PALOMA	kU/L	
Prueba	F434	64961-6		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rMal d 1 PR-10 MANZANA	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RS221	54916-2		RAST A ALIMENTOS RAPE (PESCADO) SUERO	kU/L	
Prueba	F435	81791-6		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rMal d 3 LTP MANZANA	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F439	81788-2		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rCor A 14 AVELLANA	KU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RS225	6162-2		IGE ESPECIFICO ARBOLES SYRINGA VULGARIS (POLEN LILA) (T250)	kU/L	
Prueba	RS226			IGE ESPECIFICA A TERYLENE	kU/L	
Prueba	RS227	7719-8		IGE ESPECIFICA A STAPHYLOCOCCUS AUREUS ENTERO TSST	kU/L	
Prueba	F440	65765-0		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rCor A 9 AVELLANA	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RS231	54909-7		RAST A INSECTOS CULEX PIPIENS (MOSQUITO)	kU/L	
Prueba	RS233	49715-6		IGE ESPECIFICA A ANIMALES MOSCA DOMESTICA	kU/L	

Componentes						
Prueba	RS236	21471-8		RAST A ALIMENTOS GRANADA SUERO	kU/L	
Prueba	RS237	7094-6		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS ALCACHOFA SUERO (F358)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	RS238	16101-8		RAST A ALIMENTOS COMINO	kU/L	
Prueba	RS239	6073-1		RAST A ALIMENTOS CHOCOLATE SUERO	kU/L	
Prueba	RS240	7523-4		RAST A NECTARINA	kU/L	
Prueba	RS241	56746-1		RAST A ALIMENTOS PUERRO SUERO	kU/L	
Prueba	RS242	5007007		RAST A ALIMENTOS ACELGA SUERO	kU/L	
Prueba	RS243	54930-3		RAST A ALIMENTOS HABA SUERO	kU/L	
Prueba	RS244	5003909		RAST A ALIMENTOS LUBINA SUERO	kU/L	
Prueba	F441	81790-8		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rJug r 1 Nuez	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RS246	7718-0		RAST A ALIMENTOS CALABACIN	kU/L	
Prueba	F442	81789-0		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rJug r 3 LTP Nuez	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RS249	7596-0		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS PIMIENTA BLANCA	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RT201	6857-7		IGE ESPECIFICA A POLENES DE ARBOLES PICEA EXCELSA (ABETO)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RT203	7220-7		IGE ESPECIFICA A P. DE ARBOLES AESCULUS HIPPOCASTANUM	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RT205	6108-5		IGE ESPECIFICA A POLENES DE ARBOLES SAMBUCUS NIGRA (SAUCO)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RT206	6069-9		IGE ESPECIFICA A P. DE ARBOLES CASTANEA SATIVA (CASTAÑO)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RT208	11179-9		IGE ESPECIFICA A POLENES DE ARBOLES TILIA CORDATA (TILO)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RT209	7416-1		IGE ESPECIFICA A P. DE ARBOLES CARPINUS BETULUS (CARPE)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RT210	7632-3		IGE ESPECIFICA A P. DE ARBOLES LIGUSTRUM VULGARE	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RT212	26049-7		IGE ESPECIFICA A P. DE ARBOLES LIBOCEDRUS DECURRENS	kU/L	(Inf. 0.10)

Componentes						
Prueba	RT213	7609-1		IGE ESPECIFICA A PINUS RADIATA	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RW204	7726-3		IGE ESPECIFICA A P. DE HERBACEAS HELIANTHUS ANNUUS (GIRASOL)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F454			IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rPru p 7 Melocoton	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T01	7155-5		IGE ESPECIFICA A P. DE ARBOLES ACER NEGUNDO (ARCE, SICOMORO)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T02	15284-3		IGE ESPECIFICA A P. DE ARBOLES ALNUS INCANA (ALISO GRIS)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T03	15283-5		IGE ESPECIFICA A P. DE ARBOLES BETULA VERRUCOSA (ABEDUL)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T04	6137-4		IGE ESPECIFICA A P. DE ARBOLES CORYLUS AVELLANA (AVELLANO)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T05	6038-4		IGE ESPECIFICA A POLENES DE ARBOLES FAGUS GRANDIFOLIA (HAYA)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T06	6178-8		IGE ESPECIFICA A P. DE ARBOLES JUNIPERUS SABINOIDES (SABINA)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T07	6189-5		IGE ESPECIFICA A P. DE ARBOLES QUERCUS ALBA (ROBLE, ENCINA)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T08	6109-3		IGE ESPECIFICA A POLENES DE ARBOLES ULMUS AMERICANA (OLMO)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T09	6192-9		IGE ESPECIFICA A POLENES DE ARBOLES OLEA EUROPAEA (OLIVO)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T10	33982-0		IGE ESPECIFICA A P. DE ARBOLES JUGLANS CALIFORNIA (NOGAL)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T11	15285-0		IGE ESPECIFICA A P. DE ARBOLES PLATANUS ACERIFOLIA (PLATANO)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T12	6285-1		IGE ESPECIFICA A POLENES DE ARBOLES SALIX CAPREA (SAUCE)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T14	6090-5		IGE ESPECIFICA A P. DE ARBOLES POPULUS DELTOIDES	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T15	6278-6		IGE ESPECIFICA A P. DE ARBOLES FRAXINUS AMERICANA	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T16	6282-8		IGE ESPECIFICA A POLENES DE ARBOLES PINUS STROBUS (PINO)	kU/L	(Inf. 0.10)

Componentes						
Prueba	T17	14035-0		IGE ESPECIFICA A P. DE ARBOLES CRYPTOMERIA JAPONICA	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T18	6113-5		IGE ESPECIFICA A P. DE ARBOLES EUCALYPTUS SPP (EUCALIPTUS)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T19	6015-2		IGE ESPECIFICA A P. DE ARBOLES ACACIA LONGIFOLIA (ACACIA)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T20	6173-9		IGE ESPECIFICA A P. DE ARBOLES PROSOPIS JULIFLORA (MEZQUITE)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T21	6171-3		IGE ESPECIFICA A P. DE ARBOLES MELALEUCA LEUCADENDRON	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T211	6260-4		IGE ESPECIFICA A P. DE ARBOLES AMBAR	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T22	6209-1		IGE ESPECIFICA A P. DE ARBOLES CARYA PECAN (NOGAL AMERICANO)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T220	34250-1		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rBet v4 Polcalcina Abedul	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T223	40790-8		IGE ESPECIFICA A POLENES DE ARBOLES ELAIS GUINEENSIS PALMERA	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T241	64969-9		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE nPla a 1 Platanus	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T224	58754-3		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rOle e 1Polen Olivo	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T226	65778-3		IGE ESPECIFICA A NATIVO nCup a 1 Cipres	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T23	6151-5		IGE ESPECIFICA A P. DE ARBOLES CUPRESSUS SEMPERVIRENS	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T70	6281-0		IGE ESPECIFICA A POLENES DE ARBOLES MORUS ALBA (MORERA)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	T72	6222-4		IGE ESPECIFICA A P. DE ARBOLES ARECASTRUM ROMANZOFFIANUM	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	RF341	7262-9		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS ARANDANO ROJO SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	TX5	69959-5		IGE ESPECIFICA A POLEN ARBOLES MEZCLA(t2,t4,t8,t12,t14)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	TX7	30182-0		IGE ESPECIFICA A POLEN ARBOL MEZCLA(t9,t12,t16,t18,t19,t21)	kU/L	(Inf. 0.35)

Componentes						
Prueba	W01	6085-5		IGE ESPECIFICA A P. DE HERBACEAS AMBROSIA ELATIOR	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	W02	6275-2		IGE ESPECIFICA A P. DE HERBACEAS AMBROSIA PSILOSTACHYA	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	W03	6124-2		IGE ESPECIFICA A P. DE HERBACEAS AMBROSIA TRIFIDA	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	W04	6115-0		IGE ESPECIFICA A P. DE HERBACEAS FRANSERIA ACANTHICARPA	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	W05	6286-9		IGE ESPECIFICA A P. DE HERBACEAS A. ABSINTHIUM (AJENJO)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	W06	6183-8		IGE ESPECIFICA A P. DE HERBACEAS A. VULGARIS (ARTEMISA)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	W07	6196-0		IGE ESPECIFICA A P. DE HERBACEAS CHRYSANTHEMUM LEUCANTHEMUM	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	W08	6097-0		IGE ESPECIFICA A P. DE HERBACEAS TARAXACUM VULGARE	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	W09	6110-1		IGE ESPECIFICA A P. DE HERBACEAS PLANTAGO LANCEOLATA	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	W10	6156-4		IGE ESPECIFICA A P. DE HERBACEAS CHENOPODIUM ALBUM (CEÑIGO)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	W11	6234-9		IGE ESPECIFICA A P. DE HERBACEAS SALSOLA KALI	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	W12	6128-3		IGE ESPECIFICA A P. DE HERBACEAS SOLIDAGO VIRGAUREA	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	W14	7604-2		IGE ESPECIFICA A P. DE HERBACEAS AMARANTHUS RETROFLEXUS	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	W15	6239-8		IGE ESPECIFICA A P. DE HERBACEAS ATRIPLEX LENTIFORMIS	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	W207	11180-7		IGE ESPECIFICA A POLENES HERBACEAS LUPINO(LUPINUS SPP)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	W16	6232-3		IGE ESPECIFICA A POLENES DE HERBACEAS IVA CILIATA (GILDE)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	W17	6118-4		IGE ESPECIFICA A POLENES DE HERBACEAS KOCHIA SCOPARIA	kU/L	(Inf. 0.10)

Componentes						
Prueba	W18	6244-8		IGE ESPECIFICA A P. DE HERBACEAS RUMEX ACETOSELLA	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	W19	6200-0		IGE ESPECIFICA A P. DE HERBACEAS PARIETARIA OFFICINALIS	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	W20	6186-1		IGE ESPECIFICA A POLENES DE HERBACEAS URTICA DIOICA (ORTIGA)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	W206	6057-4		IGE ESPECIFICA A MATRICARIA CHAMOMILLA (MANZANILLA)	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	W21	6199-4		IGE ESPECIFICA A POLENES DE HERBACEAS PARIETARIA JUDAICA	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	W211	56882-4		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rPar j 2 LTP P. judaica	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	W232	65784-1		IGE ESPECIFICA A NATIVO nSal k 1 Salsola	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	W233	65783-3		IGE ESPECIFICA A NATIVO nArt v 3 (LTP) Artemisia	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	WX1	24480-6		IGE ESPECIFICA A POLEN HERBACEAS MEZCLA(w1,w6,w9,w10,w11)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	WX2	24493-9		IGE ESPECIFICA A POLEN HERBACEA MEZCLA(w2,w6,w9,w10,w15)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	WX5	63197-8		IGE ESPECIFICA A POLEN HERBACEA MEZCLA(w1,w6,w7,w8,w12)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	F61	30989-8		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS SARDINA JAPONESA SUERO	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F431	73719-7		IGE ESPECIFICA A NATIVO nGly m 5 (Betaconglicinina) Soja	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F354	64963-2		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rBer e 1 Nuez de Brasil	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	W234	64972-3		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rPla l 1 Plantago lanceolata	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	D209	96278-7		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rDer p 23 D. Pteronyssinus	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F447	90880-6		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rAra h 6 CACAHUETE	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	F443	82539-8		IGE ESPECIFICA A RECOMBINANTE rAna o 3 Anacardo	kU/L	(Inf. 0.10)
Prueba	O211			IGE ESPECIFICA A INSECTOS GUSANO DE LA HARINA	kU/L	(Inf. 0.10)

Componentes						
Prueba	RS258			IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS PANGA (PESCADO) SUERO	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	RS250	5003088		RAST A ALIMENTOS SEPIA (PESCADO) SUERO	kU/L	
Prueba	RS254	5003910		RAST A ALIMENTOS DORADA (PESCADO) SUERO	kU/L	
	RS256					
Prueba	ALMOREIGE			RAST A ALMOREJO	kU/L	
Prueba	F248	30043-4		IgE ESPECÍFICA Romero (Rosmarinus officinalis) suero	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	I207	25611-5		IgE ESPECÍFICA Cucaracha oriental (blatta orientalis)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	RS257	5004918		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS PARAGUAYO SUERO	kU/L	
Prueba	X45	5009873		IGE ESPECIFICA A CROMO	kU/L	
Prueba	RS252	7304-9		IGE ESPECIFICO A ALIMENTOS ENDIVIA SUERO	kU/L	
Prueba	X09	5010565		IGE ESPECIFICA A CLORURO DE ALUMINIO	kU/L	
Prueba	X41			IGE ESPECIFICA A ASPARTAMO	kU/L	
Prueba	X28	5003802		IGE ESPECIFICA A ACIDO SORBICO	kU/L	
Prueba	X32			IGE ESPECIFICA A XILENO	kU/L	
Prueba	X34			IGE ESPECIFICA A ISOPROPANOL	kU/L	
Prueba	X47			IGE ESPECIFICO A ACIDO MOLIBDICO	kU/L	
Prueba	F219	10929-8		IgE ESPECÍFICA Hinojo semilla SUERO	KU/L	(Inf. 0.1)

Código: RAST_2

Descripción: RAST A MEZCLAS DE ALERGENOS

Técnica: CAP-SYSTEM

Comentario adicional: Suero.
Alternativa: plasma EDTA

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	EX72	73713-0		IGE ESPECIFICA A PLUMAS AVES MEZCLA (e201, e213, e214, e78)	KUI/L	(Inf. 0.35)
Prueba	EX1	30185-3		IGE ESPECIFICA A CASPA ANIMALES MEZCLA (e1, e2, e4, e5)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX13	69931-4		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEZCLA (f12,f15,f31,f35)	kU/L	(Inf. 0.35)

Componentes						
Prueba	FX17	46714-2		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEZCLA (f49, f92, f94, f95)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX20	46713-4		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEZCLA (f4, f5, f6, f9)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX74	51828-2		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEZCLA (f3, rf205, rf206, rf254)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	TX1	30184-6		IGE ESPECIFICA A POLEN ARBOLES MEZCLA(t1,t3,t7,t8,t10)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	WX3	82041-5		IGE ESPECIFICA A POLEN HERBACEA MEZCLA(w6,w9,w10,w12,w20)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	WX7	82045-6		IGE ESPECIFICA A POLEN HERBACEA MEZCLA(w7,w8,w9,w10,w12)	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX25	82582-8		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEZCLA (f10, f45, f47, f85)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	EX2	82047-2		IGE ESPECIFICA A ANIMALES MEZCLA (e1, e5, e6, e87, e88)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	EX70	71370-1		IGE ESPECIFICA A ANIMALES MEZCLA(e6, e82, e84, e87, e88)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX27			IGE ESPECIFICA ALIMENTOS MEZCLA (f3, f4, f14, f17)	kU/L	
Prueba	EX71	72279-3		IGE ESPECIFICA A PLUMAS AVES MEZCLA (e70, e85, e86,e89)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX1	46708-4		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEZCLA (f13, f17, f18, f20, f36)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX2	46712-6		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEZCLA (f40, f3, f24, f37, f41)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX3	52972-7		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEZCLA (f4, f7, f8, f10, f11)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX5E	30187-9		IGE ESPECIFICA A ALIMENTO MEZCLA (f1, f2, f3, f4, f13, f14)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX7	47302-5		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEZCLA (f25,f45,f47,f48,f85)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX14	75005-9		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEZCLA (f25, f214, f216, f218)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX15	69958-7		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEZCLA (f33, f49, f92, f95)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX16	82059-7		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEZCLA (f44, f94, f208, f210)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX18	73711-4		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEZCLA (f12,f13,f14)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX21	82098-5		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEZCLA (f210, f92, f84, f87, f95)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX22	46707-6		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEZCLA (f256, f202, 203, 201)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX24	50655-0		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEZCLA (f17,f24,f84,f92)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX70	73712-2		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEZCLA (f272, f273, f274, f275)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX71	73714-8		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEZCLA (f265, f266, f267, f268)	kU/L	(Inf. 0.35)

Componentes						
Prueba	GX1	30189-5		IGE ESPECIFICA A POLENES GRAMINEA MEZCLA(g3, g4, g5, g6, g8)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	GX2	30188-7		IGE ESPECIFICA A POLEN GRAMINEA MEZCLA(g2 g5,g6,g8,g10,g17)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	GX3	50654-3		IGE ESPECIFICA A POLEN GRAMINEAS MEZCLA (g1,g5,g6,g12,g13)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	GX4	69960-3		IGE ESPECIFICA A POLEN GRAMINEAS MEZCLA(g1,g5,g7,g12,g13)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	HX2	37987-5		IGE ESPECIFICA A POLVO CASA MEZCLA (h2,d1,d2,i6)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	RX1	82103-3		IGE ESPECIFICA A OTRAS MEZCLAS REGIONALES(g6,t3,w6,w9,w21)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	RX2	82105-8		IGE ESPECIFICA A OTRAS MEZCLAS REGIONALES(d2,e1,e3,e5,m6)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	RX3	82107-4		IGE ESPECIFICA A MEZCLAS REGIONALES(g2,g5,g17,w1,w9,w10)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	RX5	37988-3		IGE ESPECIFICA A OTRAS MEZCLAS REGIONALES(d1,e1,i6,m3)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	TX4	24491-3		IGE ESPECIFICA A POLEN ARBOLES MEZCLA(t7,t8,t11,t12,t14)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	TX5	69959-5		IGE ESPECIFICA A POLEN ARBOLES MEZCLA(t2,t4,t8,t12,t14)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	TX6	82035-7		IGE ESPECIFICA A POLEN ARBOLES MEZCLA(t1,t3,t5,t7,t10)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	TX7	30182-0		IGE ESPECIFICA A POLEN ARBOL MEZCLA(t9,t12,t16,t18,t19,t21)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	TX8	50653-5		IGE ESPECIFICA A POLEN ARBOLES MEZCLA(t1,t3,t4,t7,t11)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	TX9	71371-9		IGE ESPECIFICA A POLEN ARBOLES MEZCLA(t2,t3,t4,t7,t12)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	WX1	24480-6		IGE ESPECIFICA A POLEN HERBACEAS MEZCLA(w1,w6,w9,w10,w11)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	WX2	24493-9		IGE ESPECIFICA A POLEN HERBACEA MEZCLA(w2,w6,w9,w10,w15)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	WX5	63197-8		IGE ESPECIFICA A POLEN HERBACEA MEZCLA(w1,w6,w7,w8,w12)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	WX6	63198-6		IGE ESPECIFICA A POLENES HERBACEAS MEZCLA (w9-w10-w11-w18)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	MX1	41742-8		IGE ESPECIFICA A MOHOS MEZCLA (m1, m2, m3, m6)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	MX2	30183-8		IGE ESPECIFICA A MOHOS MEZCLA (m1, m2, m3, m5, m6,m8)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	FX73	69922-3		IGE ESPECIFICA A ALIMENTOS MEZCLA (F83, F26, F27)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	PHADIAT	57036-6		SCREENING DE NEUMOALERGENOS	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	PHADIAINFA	57742-9		SCREENING NEUMOALERGENOS INFANTIL	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	RG213	34429-1		IGE ESPECIFICA RECOMBINANTE rPhl p1+rPhl p5b Hierba Timotea	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	RG214	34430-9		IGE ESPECIFICA RECOMBINANTE rPhl p7+rPhl p12 Hierba Timotea	kU/L	(Inf. 0.35)

Componentes						
Prueba	T221	51524-7		IGE ESPECIFICA RECOMBINANTE Rbet v 2+rbet v ABEDUL	KU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	GX6	82100-9		RAST A POLENES DE GRAMINEAS MEZCLA (g2,g5,g10,g11 g13,g17)	kU/L	
Prueba	MX4	51529-6		IGE ESPECIFICA MOHOS MEZCLA (m3, m207, m36, m228)	kU/L	(Inf. 0.35)
Prueba	ALEX			IgE ESPECÍFICA MULTIPLEX (ALEX TEST), SUERO		

Descripción:	REABSORCION TUBULAR DE FOSFATOS
Código:	REABFOS
Técnica:	Fórmula
Unidades:	%
Plazo:	3 días
Tubo:	Orina 24 Horas
Comentario adicional:	Se requiere orina de 24 horas y suero
Valores de referencia:	(82 - 95)

Descripción:	REACCION EOSINOFILICA EN ESPECIMEN
Código:	EOSINESP
Técnica:	Microscopía óptica
Unidades:	
Plazo:	
Tubo:	Muestra envios externos
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	RECEPTOR ACETILCOLINA AC. SUERO
Código:	RECEPACEAC
Técnica:	ELISA
Unidades:	nmol/L
Plazo:	12 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 0.45) Negativo

Descripción:	RECEPTOR ACETILCOLINA ANTICUERPOS BLOQUEANTES, SUERO
Código:	ACBRACH
Técnica:	
Unidades:	% inhib
Plazo:	17 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 25) Negativo (25 - 30) Indeterminado (Sup. 30) Positivo

Descripción:	Receptor hormona de crecimiento: gen GH (NGS)
Código:	GHRECEPTOR
Técnica:	PCR y secuenciación
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	RECEPTOR SOLUBLE TRANSFERRINA SUERO
Código:	RECSOLTRAN
Técnica:	Inmunoturbidimetría
Unidades:	mg/L
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero refrigerado. Volumen: 1.0 mL Volumen mínimo: 0.50 mL
Valores de referencia:	(0.76 - 1.76)

Descripción:	RECEPTORES DE TSH ANTICUERPOS (TSI)
Código:	LATS
Técnica:	Electroquimioluminiscencia
Unidades:	UI/L
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL Suero
Valores de referencia:	

Descripción:	RECEPTORES INSULINA AC. SUERO
Código:	RECINSUAC
Técnica:	RIA
Unidades:	ng/mL
Plazo:	17 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 ml suero (CONGELADO)
Valores de referencia:	(Inf. 58.4) Negativo

Descripción:	Recogida de muestras en turno de tarde
Código:	RECOGTARDE
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	
Tubo:	
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	RECUENTO CELULAR ASPIRADO BRONQUIAL
Código:	RCASPBRONQ

Descripción:	RECUENTO CELULAR ASPIRADO BRONQUIAL
Técnica:	Microscopía óptica
Unidades:	
Plazo:	
Tubo:	Muestra envios externos
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	RECUENTO DE AEROBIOS MESÓFILOS EN SUPERFICIE
Código:	AEROBIOSSU
Técnica:	MÉTODO BASADO EN LA ISO 18593
Unidades:	ufc/cm ^2
Plazo:	6 días
Tubo:	
Comentario adicional:	1 PLACA ESPECIAL PARA AEROBIOS
Valores de referencia:	(Inf. 0) Ausencia de crecimiento(calificación:excelente) (Inf. 1) Contaminación leve(Calificación : Buena) (1 - 10) Contaminación moderada(Calificación:moderada) (Sup. 10) Contaminación fuerte(Calificación deficiente)

Descripción:	RECUENTO DE EOSINOFILOS
Código:	EOSINOFIRE
Técnica:	tinción frotis
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Citología
Comentario adicional:	Torunda
Valores de referencia:	

Descripción:	RECUENTO DE EOSINOFILOS
Código:	EOSINOREC
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	RECUENTO DE EOSINOFILOS EN EXUDADO CONJUNTIVAL
Código:	EOSCONJ
Técnica:	Microscopía óptica
Unidades:	
Plazo:	
Tubo:	Muestra envios externos
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	RECUENTO DE RETICULOCITOS
Código:	RETI
Técnica:	Citometría de flujo

Descripción:	RECUENTO DE RETICULOCITOS
Unidades:	%
Plazo:	3 días
Tubo:	Sangre EDTA
Comentario adicional:	EDTA
Valores de referencia:	(0.5 - 2)

Descripción:	REDUCTORES EN ORINA
Código:	REDUCTO2
Técnica:	Espectrometría
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	10 mL Orina. Refirgerar.
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta

Descripción:	Reevaluación Exoma completo en trío
Código:	REEVALTRIO
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	40 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	Reevaluación panel NGS
Código:	REEVALNGS
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	
Tubo:	
Comentario adicional:	Reevaluación panel NGS ya realizado. Avisar a biomol@megalab.es
Valores de referencia:	

Descripción:	Reevaluación VUS
Código:	REEVALVUS
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	
Tubo:	
Comentario adicional:	Reevaluación VUS en estudio ya realizado. Prueba sin coste. Avisar a biomol@megalab.es
Valores de referencia:	

Descripción:	Refsum, enfermedad de. Panel NGS
Código:	GEN_000661
Técnica:	
Unidades:	

Descripción:	Refsum, enfermedad de. Panel NGS
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	REM (RECUPERACIÓN DE ESPERMATOZOIDES MÓVILES)
Código:	REM
Técnica:	
Unidades:	millones
Plazo:	6 días
Tubo:	Semen
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	RENINA ACTIVIDAD PLASMA
Código:	RENINA
Técnica:	RIA
Unidades:	ng/mL/h
Plazo:	6 días
Tubo:	Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional:	Plasma de EDTA. Congelar y enviar congelado., NO refrigerar. No muestras con plasma heparina ni plasma citrato Volumen: 1.0 mL Volumen mínimo: 0.20 mL
Valores de referencia:	(0.32 - 1.84) > 17 años P.supina (0.60 - 4.18) > 17 años P.ortostática (1.40 - 7.80) < 2 años (1.50 - 3.50) 2 años - 5 años (0.80 - 2) 5 años - 8 años (0.90 - 2.90) 8 años - 11 años (1.20 - 2.40) 11 años - 17 años

Descripción:	RENINA DIRECTA PLASMA
Código:	DIRERENINA
Técnica:	CLIA
Unidades:	mcUI/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Plasma EDTA Pruebas Especiales
Comentario adicional:	1 mL Plasma EDTA. NO refrigerar ni la jeringa ni al centrifugar. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO. CONDICIONES RECOLECCION DE LA MUESTRA: Recolectar la sangre a media mañana, después de que el paciente se haya levantado (sentado, de pie o caminando) durante al menos 2 horas y después haya estado sentado durante 5-15 min. Recoja la sangre con cuidado, evitando la estasis y la hemólisis
Valores de referencia:	(2.8 - 39.9) P. supina (4.4 - 46.1) P. ortostática

Descripción:	REORDENAMIENTO CUANTITATIVO · BCR/ABL1(p190,p210) · RT-PCR
Código:	BCR_ABL1
Técnica:	RT-PCR
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	TUBO ONCOGENETICA

Descripción: REORDENAMIENTO CUANTITATIVO · BCR/ABL1(p190,p210) · RT-PCR

Comentario adicional: Al menos 1 ml de Médula Ósea en tubo EDTA o al menos 5 ml de Sangre Periférica en tubo EDTA. Tubo exclusivo para esta determinación (tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO).

IMPORTANTE: SIEMPRE REFRIGERADO Y NO PINCHAR VIERNES NI VÍSPERAS DE FESTIVOS: la sangre se empieza a procesar dentro de las primeras 48 horas desde la extracción.

Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.

Valores de referencia:

Descripción: Reordenamiento de gen FUS (16p11).

Código: MDFISHFUS

Técnica:

Unidades:

Plazo: 5 días

Tubo: Heparina Litio

Comentario adicional: 5-20 ml sangre periférica.
min 2 ml médula ósea.
Muestra alternativa: tejido fresco o fijado/parafinado

Valores de referencia:

Descripción: Reordenamientos genes NTRK1, NTRK2 y NTRK3

Código: REORD_NTRK

Técnica:

Unidades:

Plazo: 15 días

Tubo: Muestra Anatomía Patológica

Comentario adicional: Muestras: tejido incluido en parafina o EDTA
Rotular ONCO.

Valores de referencia:

Descripción: Resistencia a estrógenos. Sec Gen: ESR1

Código: GEN_000662

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Resistencia a la hormona tiroidea. Sec Gen: THRB

Código: GEN_000663

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Resistencia a la insulina. Sec Gen: INSR

Código: GEN_000664

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Resistencia a la insulina. Sec Gen: INSR
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: RESISTENCIA A LA PROTEINA C ACTIVADA
Código: RESACTPC
Técnica: Coagulación
Unidades: segundos
Plazo: 6 días
Tubo: Plasma de Citrato congelado
Comentario adicional: 5 mL de Plasma Citrato
Valores de referencia: (120 - 300)

Descripción: RESISTENCIA DE CMV A ANTIVIRICOS (GENES UL97 Y UL54)
Código: RESISTCMV
Técnica: RT-PCR y Secuenciación
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 5 mL sangre (EDTA). También aceptable plasma (EDTA) congelado.
Carga viral positiva (mínimo 1000 copias/mL).
Valores de referencia:

Descripción: RESISTENCIA GLOBULAR OSMOTICA
Código: RESIOSMO
Técnica: Lisis osmótica
Unidades:
Plazo: 4 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 5 ml sangre total EDTA. Rogamos envio inmediato(max. 24h), Extracción de Lunes a Jueves.
Se requiere una muestra del paciente y muestra de control de envio de sangre. Esta muestra de control de envio debe de ser de una persona normal (sana), no emparentada (Marcar el tubo"control normal")
Valores de referencia:

Descripción: Respuesta a tratamiento con Metformina. Gen IRS1
Código: IRS1_METFO
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Sangre EDTA Tª ambiente. Rotulado con BM
Tubo exclusivo para esta determinación
Valores de referencia:

Descripción: RETICULINA AC. IGA SUERO
Código: RETICUACA
Técnica: Inmunofluorescencia indirecta
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero.

Descripción:	RETICULINA AC. IGA SUERO
Valores de referencia:	Negativo <1/10 Positivo >1/10

Descripción:	RETICULINA AC. IGG SUERO
Código:	RETICUACG
Técnica:	Inmunofluorescencia Indirecta
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero.
Valores de referencia:	Negativo <1/10 Positivo >1/10

Descripción:	Retinitis punctata albescens. Panel NGS
Código:	GEN_000665
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Retinoblastoma. Sec Gen: RB1
Código:	GEN_000666
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	RETINOL PROTEINA FIJADORA SUERO
Código:	RETINOLPF
Técnica:	Turbidimetría
Unidades:	mg/dL
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero. Las muestras con presencia de fibrina deben centrifugarse.
Valores de referencia:	(3 - 6)

Descripción:	Retinosis pigmentaria 2, ligado al X. Sec Gen: RP2
Código:	GEN_000667
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción: Retinosis pigmentaria 3: gen RPGR (NGS)
Código: RPGR_MUTS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Retinosis pigmentaria tipo 4, AD/AR. Sec Gen: RHO
Código: GEN_000668
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Retinosis pigmentaria: >10 genes (NGS)
Código: RETIN_MUTS
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM. Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Retinosis pigmentaria: gen RP1 (NGS)
Código: RP1_RETPIG
Técnica: NGS con TSO Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación sin abrir, marcado con BM. Alternativa: citrato
Valores de referencia:

Descripción: Retinosis punctata albescens. Sec Gen: RDH5
Código: GEN_000669
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Retinosquisis, ligada al cromosoma X. Sec Gen: RS1
Código: GEN_000670

Descripción: Retinosquisis, ligada al cromosoma X. Sec Gen: RS1
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Retraso en el desarrollo. Panel NGS
Código: GEN_000672
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Retraso mental ligado al X. Sec Gen: SOX3
Código: GEN_000671
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Rett atípico, Sd. Sec Gen: CDKL5
Código: GEN_000674
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Rett, Sd. Sec Gen: FOXG1
Código: GEN_000673
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: RHINOVIRUS PCR
Código: RHINOVIPCR
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 14 días
Tubo: Tubo Especial

Descripción:	RHINOVIRUS PCR
Comentario adicional:	Aspirado nasofaríngeo Envio inmediato a 4ºC
Valores de referencia:	

Descripción:	Ri (ANNA-2) AC. LCR
Código:	ACRILCR
Técnica:	Técnica Inmunoblot
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	LIQUIDO LCR INMUNO
Comentario adicional:	1 mL LCR
Valores de referencia:	

Descripción:	RIBAVIRINA SUERO
Código:	RIBAVIRINA
Técnica:	LC-MS/MS
Unidades:	mcg/mL
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.
Valores de referencia:	(2.5 - 3.0)

Descripción:	RIBONUCLEOPROTEINA AC. SUERO
Código:	RNPAC
Técnica:	Inmunoblot
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml suero.
Valores de referencia:	Negativo

Descripción:	RIBOSOMAL P AC. SUERO
Código:	AC.RIBOSOM
Técnica:	EIA
Unidades:	U/mL
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	(Inf. 7) Negativo (7 - 10) Indeterminado

Descripción:	RICKETTSIA AC. SUERO (WEIL-FELIX SEROAGLUTINACION)
Código:	WEILFELIAC
Técnica:	Aglutinación
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	NEGATIVO

Descripción:	RICKETTSIA CONORII AC. IGG SUERO (FIEBRE BOTONOSA)
Código:	RICCONOACG
Técnica:	CLIA
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero/Plasma
Valores de referencia:	(Inf. 0.9) Negativo (0.9 - 1.1) Indeterminado (Sup. 1.1) Positivo

Descripción:	RICKETTSIA CONORII AC. IGM SUERO (FIEBRE BOTONOSA)
Código:	RICCONOACM
Técnica:	CLIA
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL
Valores de referencia:	(Inf. 0.9) Negativo (0.9 - 1.1) Indeterminado (Sup. 1.1) Positivo

Descripción:	RICKETTSIA SPP DNA (PCR)
Código:	RICKSPPPCR
Técnica:	Hibridación molecular (PCR)
Unidades:	
Plazo:	8 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	5 ml sangre total EDTA-REFRIGERAR 5 ml suero- REFRIGERAR 1 ml LCR- REFRIGERAR Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta

Descripción:	RIFAMPICINA SUERO
Código:	RIFAMPICIN
Técnica:	LC-MS/MS
Unidades:	mcg/mL
Plazo:	17 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	2 mL suero. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO. Toma de muestra 2h después de la administración del medicamento.
Valores de referencia:	(8.0 - 24.0) (A las dos horas de la administración del medicamento)

Código:	RISPER
Descripción:	RISPERIDONA MAS 9-HIDROXIRISPERIDONA
Técnica:	LC-MS/MS
Comentario adicional:	2 mL

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.

Componentes						
Prueba	RISP	9393-0		Perfil RISPERIDONA	ng/mL	
Prueba	HIDROXIRIS	9383-1		9- HIDROXIRIS	ng/mL	
Prueba	RISHIDROX	9394-8		Perfil RISPERIDONA+HIDROXRISPERIDONA	ng/mL	(20 - 60)

Descripción: RNA POLIMERASA AC. SUERO
Código: RNAPOLI
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades:
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL
Valores de referencia:
(Inf. 20) Negativo
(20 - 40) Positivo débil
(40 - 80) Positivo moderado
(Sup. 80) Positivo fuerte

Descripción: RNA VIRUS HEPATITIS A (PCR)
Código: VHAPCR
Técnica:
Unidades:
Plazo: 14 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 mL suero separado lo antes posible del coágulo. Evitar hemólisis. CONGELAR INMEDIATAMENTE Y ENVIAR CONGELADO.
Alternativas: Plasma y Heces (congeladas)
Valores de referencia:

Descripción: Roberts, Sd. Sec Gen: ESCO2
Código: GEN_000675
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Robinow, Sd. Gen: ROR2. MLPA
Código: GEN_000676
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: ROSA DE BENGALA
Código: ROSABEN
Técnica: Aglutinación de Ac anti Brucella (Ag Rosa de Bengala)
Unidades:

Descripción:	ROSA DE BENGALA
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	Test de despistaje inicial. Ante resultados positivos, debería completarse el estudio mediante realización de aglutinaciones de Brucella y test de COOMBS de Brucella.

Descripción:	ROTAVIRUS HECES
Código:	ROTAVI
Técnica:	Inmunocromatografía
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Heces No Microbiología
Comentario adicional:	2 dias a 8ªC
Valores de referencia:	

Descripción:	ROTAVIRUS RNA PCR
Código:	ROTAVIRPCR
Técnica:	Hibridación Molecular (PCR)
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	Muestra envios externos
Comentario adicional:	Muestra: LCR, HECES, otras muestras biológicas. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.
Valores de referencia:	

Descripción:	Rothmund-Thomson, Sd. Sec Gen: RECQL4
Código:	GEN_000677
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	RUBEOLA AC. IGG
Código:	RUBEACG
Técnica:	CMIA
Unidades:	UI/mL
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml suero
Valores de referencia:	(Sup. 10) Inmunidad adquirida

Descripción:	RUBEOLA AC. IGM
Código:	RUBEACM
Técnica:	CMIA
Unidades:	
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal

Descripción:	RUBEOLA AC. IGM
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 1.20) Negativo (1.21 - 1.59) Indeterminado

Descripción:	RUBEOLA AVIDEZ IGG
Código:	AVIDEZRUBE
Técnica:	EIA
Unidades:	%
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL de suero Volumen mínimo: 0.15 mL
Valores de referencia:	(Inf. 40) Baja Avidez. Compatible con primoinfeccion adquirida en los últimos 2 meses. (40 - 60) Moderada Avidez. No permite distinguir infección reciente de antigua. (Sup. 60) Alta Avidez. Compatible con infección o reinfección pasada.

Descripción:	RUBEOLA RNA (PCR) LÍQUIDO AMNIÓTICO
Código:	RUBEAMNPCR
Técnica:	Hibridación molecular (PCR)
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	10 mL Líquido Amniótico
Valores de referencia:	

Descripción:	Rubeola RNA PCR Cualitativa
Código:	RUBEOLAPCR
Técnica:	HIBRIDACIÓN MOLECULAR (PCR)
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	Muestra envios externos
Comentario adicional:	Sangre total (EDTA), LCR, orina. También válidas otros tipos de muestras (excepto líquido amniótico). Evitar muestra de suero. PARA LÍQUIDO AMNIÓTICO HAY QUE SOLICITAR LA PRUEBA RUBEAMNPCR
Valores de referencia:	

Descripción:	Rubinstein-Taybi, Sd. Sec Gen: CREBBP
Código:	GEN_000678
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	RUFINAMIDA SUERO
Código:	RUFINAMIDA
Técnica:	CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA/TÁNDEM MASAS (LC-MS/MS)

Descripción: RUFINAMIDA SUERO
Unidades: mcg/mL
Plazo: 12 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero.
Valores de referencia: (5 - 45)

Descripción: RUNX1(AML1)/RUNX1T1(ETO)(t(8;21)(q21;q22.1)) · RT-PCR
Código: AML1_ETO
Técnica: RT-PCR
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: 3 tubos de EDTA exclusivos para esta determinación: tubo sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO.

Muestra: sangre periférica o médula ósea

NO PINCHAR VIERNES NI VÍSPERAS DE FESTIVOS: la sangre se empieza a procesar dentro de las primeras 48 horas desde la extracción

Valores de referencia:

Descripción: S de Noonan: >10 genes (NGS)
Código: NOONAN
Técnica: NGS Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: S. de hiperinmunoglob. y fiebre periódica: gen MVK (NGS)
Código: HIDS
Técnica: NGS Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: S. Hemolítico urémico atípico: >10 genes (NGS)
Código: SHUA_COMPL
Técnica:
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.
Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción:	S. Hiper IgE autosómico dominante: gen STAT3 (NGS)
Código:	STAT3
Técnica:	NGS con TSO Illumina
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación sin abrir, marcado con BM. Alternativa: citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	S. QT corto: genes KCNH2, KCNQ1 y KCNJ2 (NGS)
Código:	QT_CORTO
Técnica:	NGS y MLPA
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM. Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	S. QT Largo: >10 genes (NGS)
Código:	QT_LARGO
Técnica:	PCR y secuenciación
Unidades:	
Plazo:	40 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	SACCHAROMYCES CEREVISIAE AC. IGA
Código:	ASCA
Técnica:	Técnica ELISA
Unidades:	U/mL
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. Alternativo plasma de EDTA o plasma de Citrato
Valores de referencia:	(Inf. 7) Negativo (7 - 10) Indeterminado

Descripción:	SACCHAROMYCES CEREVISIAE AC. IGG
Código:	ASCAG
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	U/mL
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	(Inf. 7) Negativo (7 - 10) Indeterminado

Descripción:	SAE1 AC SUERO
Código:	SAE1
Técnica:	Inmunoblot
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	Negativo

Descripción:	Saethre-Chotzen, Sd. Sec Gen: TWIST1
Código:	GEN_000679
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	SALMONELLA PARATIFICA B AGLUTINACIONES
Código:	PARATIFI_B
Técnica:	Aglutinación
Unidades:	Titulo
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	

Descripción:	SALMONELLA PARATIFICA A AGLUTINACIONES
Código:	PARATIFI_A
Técnica:	Aglutinación
Unidades:	Titulo
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero.
Valores de referencia:	

Descripción:	SALMONELLA TIPHY H AGLUTINACIONES
Código:	TIFICA_H
Técnica:	Aglutinación
Unidades:	Titulo
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	

Descripción:	SALMONELLA TIPHY O AGLUTINACIONES
Código:	TIFICA_O
Técnica:	Aglutinación
Unidades:	Titulo
Plazo:	3 días

Descripción: SALMONELLA TIPHY O AGLUTINACIONES
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia:

Descripción: Sandhoff, enfermedad de. Sec Gen: HEXB
Código: GEN_000680
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: SANGRE EN ORINA
Código: SANGRE
Técnica:
Unidades: /µL
Plazo: 3 días
Tubo: Orina basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: Negativo

Descripción: SANGRE EN ORINA
Código: SANGRE
Técnica:
Unidades: /µL
Plazo: 3 días
Tubo: Orina basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: Negativo

Código: SANIPULMON
Descripción: SANITAS. Panel cáncer de pulmón
Técnica:
Comentario adicional: Perfil solo para proyecto Sanitas.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	EGFR_MUTS			BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · EGFR(18-21) · HOT SPOT		
Prueba	KRAS_MUTS			BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · KRAS(2, 3, 4) · HOT SPOT		
Prueba	BRAF_SOMAT			Mutaciones somáticas gen BRAF (V600X)		
Prueba	MDFISH	78040-3		FISH sonda no especificada		
Prueba	IHQPDL1			INMUNOHISTOQUIMICA: PDL-1		
Prueba	REORD_NTRK			Reordenamientos genes NTRK1, NTRK2 y NTRK3		
Prueba	INEST_MICR			INESTABILIDAD DE MICROSATÉLITES (MSI) · A. FRAGMENTOS		

Componentes						
Prueba	FISH_TSALK			BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · ALK (2p23)		
Prueba	FISH_TSMET			BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · MET (7q31)		
Prueba	FISH_TROS1			BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · ROS1 (6q22)		
Prueba	ERBB2_MUTS			BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · ERBB2 (20) · HOT SPOT		

Descripción:	Sapovirus RNA PCR muestra
Código:	SAPOVIRPCR
Técnica:	HIBRIDACIÓN MOLECULAR CON AMPLIFICACIÓN a TIEMPO REAL RT-PCR
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	
Comentario adicional:	Heces y vómitos. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO
Valores de referencia:	

Descripción:	SARAMPION AC. IgG EN L.C.R
Código:	SARAMGLC
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	
Plazo:	6 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 ml LCR
Valores de referencia:	(Inf. 1) Negativo (Sup. 1) Positivo

Descripción:	SARAMPION AC. IGG SUERO
Código:	SARAMACG
Técnica:	CLIA
Unidades:	UI/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml suero En el ensayo puede emplearse suero o plasma humanos. Las pruebas realizadas confirman que es posible utilizar EDTA potásico y heparina sódica como anticoagulantes.
Valores de referencia:	(Inf. 13.5) Negativo (13.6 - 16.4) Indeterminado (Sup. 16.5) Positivo

Descripción:	SARAMPION AC. IgM EN L.C.R
Código:	SARAMMLC
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	
Plazo:	6 días
Tubo:	Líquido Bioquímica
Comentario adicional:	1 ml LCR

Descripción:	SARAMPION AC. IgM EN L.C.R
Valores de referencia:	(Inf. 1) Negativo (Sup. 1) Positivo

Descripción:	SARAMPION AC. IGM SUERO
Código:	SARAMACM
Técnica:	CLIA
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL Suero Las pruebas realizadas confirman que es posible utilizar EDTA potásico,heparina, citrato sódico como anticoagulantes.
Valores de referencia:	(Inf. 0.9) Negativo (0.9 - 1.1) Indeterminado (Sup. 1.1) Positivo

Descripción:	Sarcoidosis de aparición temprana. Sec Gen: NOD2
Código:	GEN_000681
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	SCC EN LIQUIDO PLEURAL (AG. CARCINOMA DE CEL. ESCAMOSAS)
Código:	SCCLIQPL
Técnica:	Inmunoluminiscencia
Unidades:	ng/mL
Plazo:	4 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 mL de Líquido Pleural
Valores de referencia:	(Inf. 2.5)

Descripción:	SCC (ANTÍGENO ASOCIADO AL CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS)
Código:	SCC
Técnica:	Inmunoluminiscencia (hasta 2011 Enzimoinmunoanálisis)
Unidades:	ng/mL
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL
Valores de referencia:	(Inf. 2.5)

Descripción:	SCHISTOSOMA (BILHARZIOSIS) EN ORINA
Código:	SCHISTORIN
Técnica:	Microscopía óptica
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Muestra Microbiología
Comentario adicional:	

Descripción:	SCHISTOSOMA (BILHARZIOSIS) EN ORINA
Valores de referencia:	

Descripción:	SCHISTOSOMA SP. AC IGG (BILHARZIOSIS)
Código:	SCHISTOSOM
Técnica:	EIA
Unidades:	Indice
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	(Inf. 0.8) Negativo (0.8 - 1.1) Indeterminado (Sup. 1.1) Positivo

Descripción:	SCHISTOSOMA SPP, DNA PCR
Código:	SCHISTOPCR
Técnica:	PCR
Unidades:	
Plazo:	12 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	2 mL sangre total (EDTA), (haematobium orina), (mansoni heces refrigeradas).También puede hacerse con muestra parafinada (bloc o al menos de 10 a 15 cortes). En LCR sospecha clínica esquistosomiasis espinal.
Valores de referencia:	

Descripción:	Scl-70 AC. SUERO (TOPOISOMERASA I)
Código:	SCL70AC
Técnica:	Inmunoblot
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL
Valores de referencia:	Negativo

Descripción:	Screening adicional a PGT embrion 1
Código:	PGTSRAD1EM
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	BIOPSIA ESPECIAL
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	Screening cáncer de próstata. Biomarcadores en orina
Código:	SELECTMDX
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	ORINA ONCOGENETICA
Comentario adicional:	Kit especial (UrNCollect)con Tubo UrNCollect, etiquetas, formulario solicitud (enviar cumplimentado), instrucciones para preparación y obtención orina. SE PUEDE TOMAR LA MUESTRA DE LUNES A MIERCOLES PARA QUE LLEGUE A CENTRAL EL JUEVES MÁXIMO
Valores de referencia:	

Código: MPX
Descripción: SCREENING HIV, VHC Y VHB POR RT-PCR (MPX)
Técnica: RT-PCR
Comentario adicional: 1 Tubo DE EDTA IDENTIFICADOS COMO "MPX"
NO ENVIAR VIERNES NI VÍSPERAS DE FESTIVO

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	HIVMPX			HIV EN MPX TEST		Valor de referencia: No se detecta Límites de detección: VIH-1 grupo M : 25.7 UI/ml VIH-1 grupo O : 8.2 copias/ml VIH-2 : 4 UI/ml
Prueba	HVBMPX			HVB EN MPX TEST		Valor de referencia: No se detecta Límite de detección: 1.4 UI/mL Genotipos A-H
Prueba	HVCMPX			HVC EN MPX TEST		Valor de referencia: No se detecta Límite de detección: 7 UI/mL Genotipos: 1a, 1b, 2, 2a, 2a/c, 2b, 3a, 3a/b, 4, 4a, 4b/4c, 5, 5a, 6, 6a

Descripción: Sd hiperornitinemia-hiperamonemia-homocitrulinuria. SLC25A15
Código: GEN_000701
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd. ectrodactilia-Aplasia Tibial. Sec Gen: BHLHA9
Código: GEN_000695
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd. espasmo infantil ligado al cr. X. Sec Gen: ARX
Código: GEN_000697
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd. espasmo infantil ligado al cr. X. Sec Gen: CDKL5
Código: GEN_000696
Técnica:

Descripción: Sd. espasmo infantil ligado al cr. X. Sec Gen: CDKL5
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd. espasmo infantil ligado al X. Panel NGS
Código: GEN_000698
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd. Hiper-IgM ligado al X. Sec Gen: CD40LG
Código: GEN_000700
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd. hipoplasia y aplasia pelvis focomegalia Schinzel. WNT7A
Código: GEN_000702
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd. insensibilidad a andrógenos. Sec Gen: AR.
Código: GEN_000704
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd. Malformac. capilar-arteriovenosa. Sec Gen: RASA1
Código: GEN_000709
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Descripción: Sd. Malformac. capilar-arteriovenosa. Sec Gen: RASA1
Valores de referencia:

Descripción: Sd. nodo enfermo. Panel NGS
Código: GEN_000716
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd. prematuridad e ictiosis. Sec Gen: SLC27A4
Código: GEN_000710
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd. radio ausente y trombocitopenia. Sec Gen: RBM8A
Código: GEN_000711
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd.cardiofaciocutáneo. Panel NGS
Código: GEN_000690
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd.cardiofaciocutáneo. Sec Gen: BRAF
Código: GEN_000691
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd.cuerno occipital. Sec Gen: ATP7A
Código: GEN_000715

Descripción: Sd.cuerno occipital. Sec Gen: ATP7A
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd.hemolítico urémico atípico. Panel NGS
Código: GEN_000717
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd.l carcinoma basocelular nevoide. Sec Gen: PTCH1
Código: GEN_000714
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd.LIG4. Sec Gen: LIG4
Código: GEN_000719
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd.mano-pie-genital. Sec Gen: HOXA13
Código: GEN_000722
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd.miasténico congénito. Panel NGS
Código: GEN_000723
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Sd.miasténico congénito. Panel NGS
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd.nefrótico congénito tipo finlandés. Sec Gen: NPHS1
Código: GEN_000724
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd.oral-facio-digital tipo 1. Sec Gen: OFD1
Código: GEN_000726
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd.oto-facio-cervical. Sec Gen: PAX1
Código: GEN_000728
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd.oto-palato-digital. Gen: FLNA. MLPA
Código: GEN_000727
Técnica:
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd.papilo-renal. Sec Gen: PAX2
Código: GEN_000729
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd.periódicos asocia. a la criopirina. Sec Gen: NLRP3
Código: GEN_000732
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd.por déficit de creatina. Panel NGS
Código: GEN_000733
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd.tricorrinofalángico. Sec Gen: TRPS1
Código: GEN_000730
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sd.Uña-rótula. Sec Gen: LMX1B
Código: GEN_000705
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sec. gen SF3B1 (NGS)
Código: GEN_SF3B1
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO,.
IMPORTANTE: MUESTRA REFRIGERADA
Valores de referencia:

Descripción: Secuenciación del producto de amplificación de 1 amplicón
Código: AMPLICON1
Técnica:
Unidades:

Descripción: Secuenciación del producto de amplificación de 1 amplicón
Plazo:
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Secuenciación del producto de amplificación de 11 amplicón
Código: AMPLICON11
Técnica:
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Secuenciación del producto de amplificación de 12 amplicón
Código: AMPLICON12
Técnica:
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Secuenciación del producto de amplificación de 14 amplicón
Código: AMPLICON14
Técnica:
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Secuenciación del producto de amplificación de 15 amplicón
Código: AMPLICON15
Técnica:
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Secuenciación del producto de amplificación de 16 amplicón
Código: AMPLICON16
Técnica:
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción:	Secuenciación del producto de amplificación de 18 amplicón
Código:	AMPLICON18
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	Secuenciación del producto de amplificación de 2 amplicones
Código:	AMPLICON2
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	Secuenciación del producto de amplificación de 35 amplicón
Código:	AMPLICON35
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	Secuenciación del producto de amplificación de 5 amplicón
Código:	AMPLICON5
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	Secuenciación del producto de amplificación de 6 amplicón
Código:	AMPLICON6
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	Secuenciación del producto de amplificación de 7 amplicón
Código:	AMPLICON7
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	15 días

Descripción:	Secuenciación del producto de amplificación de 7 amplicón
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	Secuenciación del producto de amplificación de 8 amplicón
Código:	AMPLICON8
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	Secuenciación del producto de amplificación de 9 amplicón
Código:	AMPLICON9
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	Secuenciación gen CRC1 (NGS)
Código:	CRC1_MUTS
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	Secuenciación gen GLMN (NGS)
Código:	GLMN_MUTS
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación
Valores de referencia:	

Descripción:	Secuenciación Sanger a partir de oligos
Código:	OLI_SANGER
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	10 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:	Nos mandan producto de PCR con los primers para confirmar mutaciones de NGS
Valores de referencia:	

Descripción:	SELENIO EN ORINA
Código:	SE2
Técnica:	ICP-MS
Unidades:	µg/L
Plazo:	7 días
Tubo:	Orina basal
Comentario adicional:	5 ml de orina (micción aislada)
Valores de referencia:	(Inf. 40) Individuos no expuestos

Descripción:	Selenio en suero
Código:	SE
Técnica:	ICP-MS
Unidades:	µg/L
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero. Suero (libre trazas metales)
Valores de referencia:	(65 - 160)

Descripción:	SELENIO ERITROCITARIO EN SANGRE TOTAL
Código:	SESG
Técnica:	ICP-MS
Unidades:	µg/L
Plazo:	6 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	Sangre total EDTA Dipotásico (libre trazas metales)
Valores de referencia:	(100 - 340) (Inf. 2.60) Límite de cuantificación

Descripción:	Senior-Loken, Sd. Panel NGS
Código:	GEN_000682
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Sensibildad a los ultravioleta. Sec Gen: ERCC4
Código:	GEN_000683
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	SENSIBILIDAD A 155 ALIMENTOS OVO-LACTO-VEGETARIANA
Código:	SENSI150

Descripción: SENSIBILIDAD A 155 ALIMENTOS OVO-LACTO-VEGETARIANA
Técnica: Microarray
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: SENSIBILIDAD A 204 ALIMENTOS
Código: SENSI200
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 tubo de suero
Valores de referencia:

Descripción: SENSIBILIDAD ALIMENTARIA A ADITIVOS
Código: SENADITIVO
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: SEROTONINA (5-HIDROXITRIPTAMINA) SUERO
Código: SEROTO
Técnica: EIA
Unidades: ng/mL
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 2 mL suero, separar y enviar congelado.
Valores de referencia: (20 - 206)

Descripción: SEROTONINA EN PLASMA RICO EN PLAQUETAS
Código: SEROTOPLAQ
Técnica: EIA
Unidades: ng/10^9 plaq
Plazo: 5 días
Tubo: Tubo Especial
Comentario adicional: 2 mL plasma rico en plaquetas. (Centrifugar la sangre anticoagulada con EDTA durante 10 minutos a 200 g). Enviar contaje de plaquetas(debe ser superior a 350.000/mcl)
EVITAR CONGELACIÓN MUESTRA. Enviar asimismo 5 mL de sangre (EDTA).
Valores de referencia: (500 - 950)

Descripción: SEROTONINA ORINA (5-HIDROXITRIPTAMINA)
Código: SEROTO2
Técnica: Enzimoinmunoanálisis
Unidades: mcg/24 h
Plazo: 5 días

Descripción:	SEROTONINA ORINA (5-HIDROXITRIPTAMINA)
Tubo:	Orina 24 Horas
Comentario adicional:	10 mL de orina de 24h con 0.1 ml de ác. clorhídrico conc. Indicar volumen total.
Valores de referencia:	(9 - 193)

Descripción:	SERTRALINA SUERO
Código:	SERTRALI
Técnica:	LC-MS/MS
Unidades:	µg/L
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	2 mL suero.
Valores de referencia:	(10 - 150) Niveles terapeúticos (Sup. 290) Niveles de toxicidad (Inf. 3) Límite de cuantificación

Descripción:	SHBG (Sex hormone binding globulin)
Código:	SHBG
Técnica:	CMIA
Unidades:	nmol/L
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero/alternativo Heparina NO UTILIZAR PLASMA EDTA
Valores de referencia:	(13.5 - 71.14) Hombre > 14 años (19.8 - 155.2) Mujer > 14 años (26.4 - 118) Mujer > 50 años Postmenopausia

Descripción:	Sialidosis. Sec Gen: NEU1
Código:	GEN_000684
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	SIALOTRANSFERRINA ISOFORMAS EN SUERO
Código:	SIALOTRF
Técnica:	Electroforesis capilar
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero. Evitar muestra de plasma
Valores de referencia:	

Descripción:	Sialuria. Sec Gen: GNE
Código:	GEN_000685
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días

Descripción: Sialuria. Sec Gen: GNE
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: SILICIO
Código: SILICIO
Técnica: ICP-MS/MS
Unidades: µg/L
Plazo: 9 días
Tubo: Plasma EDTA Refrigerado
Comentario adicional: 1 mL PLASMA/EDTA. Realizar la extracción en un tubo de EDTA VACUTAINER (5 mL). Centrifugar y transferir el plasma a un tubo de polipropileno o poliestireno (inmediatamente).
ENVIAR PLASMA SEPARADO E IDENTIFICADO COMO SILICIO
Valores de referencia: (200 - 500)

Descripción: Simpson-Golabi-Behmel, Sd. Sec Gen: GPC3
Código: GEN_000686
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: SINAPTOFISINA AC.
Código: SINAPTOFIS
Técnica: IFI
Unidades:
Plazo: 33 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero
Valores de referencia: Positivo >1/10

Descripción: Sindactilia tipo 2. Sec Gen: FBLN1
Código: GEN_000687
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Síndr. Blefarofimosis, Ptosis, y Epicantus: gen FOXL2 (NGS)
Código: FOXL2_MUT
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.

Descripción: Síndr. Blefarofimosis, Ptosis, y Epicantus: gen FOXL2 (NGS)
Valores de referencia:

Descripción: Síndr. feocromocitoma paragang. heredit.: >10 genes (NGS)
Código: SDH_MUTS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Síndr. feocromocitoma paraganglioma heredit.: gen SDHB (NGS)
Código: SDHB_MUTS
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Síndr. feocromocitoma paraganglioma heredit.: gen SDHD (NGS)
Código: SDHD_MUTS
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Sindr. Rubinstein-Taybi: genes CREBBP y EP300 (NGS)
Código: RUBI_TAYBI
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.
Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Alport: gen COL4A5 (NGS)
Código: ALPORT
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.

Descripción: Síndrome de Alport: gen COL4A5 (NGS)
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Alström: gen ALMS1 (NGS)
Código: ALMS1_MUTS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.
Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Angelman: test de metilación y MLPA gen SNRPN
Código: ANGELMAN
Técnica: PCR y MLPA
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Apert: gen FGFR2 (NGS)
Código: APERT
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 40 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Bartter 3: gen CLCNKB (NGS)
Código: BARTTER_3
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Bartter 4A: gen BSND (NGS)
Código: BARTTER_4A
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.

Descripción: Síndrome de Bartter 4A: gen BSND (NGS)
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Beals: gen FBN2 (NGS)
Código: BEALS_FBN2
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Beckwith-Wiedemann: región 11p15 por MLPA
Código: BECKWITH_W
Técnica: MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Birt-Hogg-Dube: gen FLCN (NGS)
Código: BIRTHOGGDU
Técnica: NGS y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.
Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Brugada: >10 genes (NGS)
Código: S_BRUGADA
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.
Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Candle: gen PSMB8 (NGS)
Código: PSMB8_MUTS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.
Alternativa: Citrato.

Descripción: Síndrome de Candle: gen PSMB8 (NGS)
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Charge: gen CHD7 (NGS)
Código: CHARGE_MUT
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.
Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Cowden: gen PTEN (NGS)
Código: PTEN_MUTS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM.
Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Gitelman: gen SLC12A3 (NGS)
Código: S_GITELMAN
Técnica: NGS y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Gorlin: genes PTCH1, PTCH2 y SUFU (NGS)
Código: GORLIN_MUT
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Hajdu-Cheney (acro-osteloisis): gen NOTCH2 (NGS)
Código: HAJDU_CHEN
Técnica: NGS Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Descripción: Síndrome de Hajdu-Cheney (acro-osteloisis): gen NOTCH2 (NGS)
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Kallmann: > 10 genes (NGS)
Código: KALLMANN
Técnica:
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Legius: gen SPRED1 (NGS)
Código: SPRED1_MUT
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Leigh: <10 genes (NGS)
Código: SIND_LEIGH
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Loeys-Dietz: sec. <10 genes (NGS)
Código: LOEYSDIETZ
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Marfan: gen FBN1 (NGS)
Código: MARFAN
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Morquio: gen GALNS (NGS)
Código: MORQUIO
Técnica: NGS con TSO Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación sin abrir, marcado con BM. Alternativa: citrato
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Noonan: gen PTPN11 (NGS)
Código: PTPN11_MUT
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Peutz-Jeghers: gen STK11 (NGS)
Código: PEUTZ_JEGH
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Prader-Willi: test metilación y MLPA gen SNRPN
Código: PRADER.W
Técnica: PCR y MLPA
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome de Rett: gen MECP2 (NGS)
Código: RETT_PCR
Técnica: PCR, secuenciación, y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina y Citrato.
Valores de referencia:

Descripción:	Síndrome de Shwachman-Diamond: gen SBDS (NGS)
Código:	SBDS_MUTS
Técnica:	NGS
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM. Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	Síndrome de Silver-Russell: análisis MS-MLPA
Código:	SILVER_RUS
Técnica:	PCR y MLPA
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	Síndrome de Sotos: gen NSD1 (NGS)
Código:	SOTOS_NSD1
Técnica:	NGS Illumina y MLPA
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Síndrome de Stickler: <10 genes (NGS)
Código:	STICKLER
Técnica:	NGS Illumina y MLPA
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Síndrome de Usher: >10 genes (NGS)
Código:	SIND_USHER
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción: Síndrome de Waardenburg: <10 genes (NGS)
Código: WAARDENBUR
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sindrome de Williams: micodeleción región WBSCR por MLPA
Código: WILLIAMS
Técnica: MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Sindrome Hipoventilacion Central: gen PHOX2B (NGS)
Código: PHOX2B
Técnica: PCR, secuenciación y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: SÍNDROME MIELODISPLÁSICO · ASXL1 (EXON 12, 13) · HOT SPOT
Código: ASXL1_MUTS
Técnica: SANGER - HOT SPOT
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: 4 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refrigerar] (Estabilidad: 4°C:1 Meses)
o 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refrigerar] (Estabilidad: 4°C:1 Meses)
Valores de referencia:

Descripción: SÍNDROME MIELODISPLÁSICO· SF3B1 (EXONES 12-15) · HOT SPOT
Código: SF3B1_MUTS
Técnica: SANGER - HOT SPOT
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: 4 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refrigerar] (Estabilidad: 4°C:1 Meses)
o 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refrigerar] (Estabilidad: 4°C:1 Meses)
Valores de referencia:

Descripción: SÍNDROME MIELOPROLIFERATIVO · MPL (EXON 10) · HOT SPOT
Código: MPL_E10
Técnica: SANGER - HOT SPOT
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: 4 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refrigerar] (Estabilidad: 4°C:1 Meses)
o 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refrigerar] (Estabilidad: 4°C:1 Meses)
Valores de referencia:

Descripción: SÍNDROME MIELOPROLIFERATIVO · MPL(S505N) · HOT SPOT
Código: MPL_S505N
Técnica: SANGER - HOT SPOT
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional: 4 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refrigerar] (Estabilidad: 4°C:1 Meses)
o 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refrigerar] (Estabilidad: 4°C:1 Meses)
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome nefrótico 2: gen NPHS2 (NGS)
Código: NPFS2_MUTS
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 40 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome Opitz Gbb: <10 genes (NGS)
Código: OPITZ_GBB
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Síndrome X Fragil
Código: XFRAGPCR
Técnica: PCR, TP-PCR y análisis de fragmentos
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas:Citrato.
Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.
Valores de referencia:

Descripción: Síndromes autoinflamatorios. Panel NGS
Código: GEN_000731
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Síndromes de deleción 22q11.2 (MLPA)
Código: DEL_22Q11
Técnica: MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Síndromes de miastenia congénita: >10 genes (NGS)
Código: MIASTENIA
Técnica: NGS TSO Illumina
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación sin abrir, marcado con BM.
Alternativa: citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sindromes febriles recurrentes hereditarios: >10 genes (NGS)
Código: F_RECURREN
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: 2 tubos de EDTA exclusivos para esta determinación: tubos primarios sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulados con BM.
Valores de referencia:

Descripción: Sinfalangismo proximal. Sec Gen: NOG
Código: GEN_000734
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: SIROLIMUS EN SANGRE
Código: SIROLIMUS
Técnica: Cromatografía líquida/ Tándem masas

Descripción: SIROLIMUS EN SANGRE
Unidades: ng/mL
Plazo: 6 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: 3 mL sangre total (EDTA). Refrigerar
Volumen min: 1 mL
Valores de referencia: (5 - 10) Transplante renal-combinación con esteroides y micofenolato de mofetilo
(8 - 12) Transplante renal-combinación con esteroides sin micofenolato de mofetilo
(4 - 12) Transplante renal- terapia triple con Ciclosporina A, corticosteroides y sirolimus
(12 - 20) Transplante renal-terapia dual con corticosteroides y sirolimus
(3 - 6) Transplante hígado-terapia con Cicosporina A o tacrolimus, sirolimus y, en caso necesario, costicosteroides
(5 - 8) Transplante hígado-terapia con sirolimus y, en caso necesario, corticosteroides
Límite de cuantificación: 2 ng/mL

Código: DRAS
Descripción: SISTEMATICO DE ORINA (ESTUDIO
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	DENSIDAD	53326-5		DENSIDAD DE ORINA		(1.000 - 1.040)
Prueba	PH	50560-2		PH ORINA		(4.5 - 7.5)
Prueba	PROTEINAS	50561-0		PROTEINAS EN ORINA	mg/dL	Negativo
Prueba	SED1			SEDIMENTO EN ORINA		Normal
Prueba	GLUCOSA	53328-1		GLUCOSA EN ORINA	g/L	Negativo
Prueba	CETONICOS	50557-8		ACETONA EN ORINA	mg/dL	Negativo
Prueba	BILIRRUBIN	53327-3		BILIRRUBINA EN ORINA	mg/dl	Negativo
Prueba	SANGRE	50559-4		SANGRE EN ORINA	/µL	Negativo
Prueba	NITRITOS	50558-6		NITRITOS EN ORINA		Negativo
Prueba	UROBILIGEN	50563-6		UROBILIGENO EN ORINA	mg/dL	Negativo
Prueba	LEUCOCITOO	58805-3		LEUCOCITOS EN ORINA	/µL	Negativo

Descripción: Sitosterolemia. Panel NGS
Código: GEN_000735
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sjogren-Larsson, Sd. Sec Gen: ALDH3A2
Código: GEN_000736
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: SMIT AC. SUERO (ANTI-SM)
Código: SMITAC
Técnica: Inmunoblot
Unidades:
Plazo: 5 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL
Valores de referencia: Negativo

Descripción: Smith-Lemli-Opitz. Def. 7-deshidrocolesterol reductas. DHCR7
Código: GEN_000737
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Sobrecrecimiento. Panel NGS
Código: GEN_000738
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: SODIO
Código: NA
Técnica:
Unidades: mmol/L
Plazo: 2 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (136 - 146)

Descripción: SODIO ORINA
Código: NA2
Técnica: Potenciometría directa
Unidades: mmol/24h
Plazo: 2 días

Descripción:	SODIO ORINA
Tubo:	Orina 24 Horas
Comentario adicional:	10 mL de orina de 24 horas
Valores de referencia:	(80 - 260)

Descripción:	SOMATOSTATINA EN PLASMA
Código:	SOMATOST
Técnica:	RIA
Unidades:	pmol/L
Plazo:	18 días
Tubo:	Plasma trasylol/aprotinina
Comentario adicional:	Plasma EDTA Aprotinina. CONGELAR. Separar y congelar inmediatamente.
Valores de referencia:	(Inf. 16)

Descripción:	Sordera con aplasia de laberinto, microtia microdoncia. FGF3
Código:	GEN_000739
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	SRP (SIGNAL RECOGNITION PARTICLE) AC. SUERO
Código:	SRPAC
Técnica:	Técnica Inmunoblot
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	Negativo

Descripción:	SS-A AC. SUERO (RO)
Código:	SSAAC
Técnica:	Inmunoblot
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml suero
Valores de referencia:	Negativo

Descripción:	SSA-52 AC. SUERO (RO52)
Código:	RO52
Técnica:	Fluoroenzimoinmunoensayo
Unidades:	U/mL
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal

Descripción:	SSA-52 AC. SUERO (RO52)
Comentario adicional:	Suero. refirgerar. Alternativa: plasma
Valores de referencia:	(Inf. 7) Negativo (7 - 10) Indeterminado (Sup. 10) Positivo

Descripción:	SS-B AC. SUERO (LA)
Código:	SSBAC
Técnica:	Inmunoblot
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL
Valores de referencia:	Negativo

Descripción:	SS-DNA AC. SUERO CADENA SENCILLA
Código:	SSDNAAC
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	U/mL
Plazo:	12 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	(Inf. 7) Negativo (7 - 10) Indeterminado (Sup. 10) Positivo

Descripción:	Stargardt tipo 4, enfermedad de. Sec Gen: PROM1
Código:	GEN_000741
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Stargardt, enfermedad de. Panel NGS
Código:	GEN_000742
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	STHAPYLOCOCUS AUREUS METICILIN-RESISTENTE
Código:	METICIRES
Técnica:	Cultivo
Unidades:	
Plazo:	

Descripción:	STHAPYLOCOCUS AUREUS METICILIN-RESISTENTE
Tubo:	Microbiología
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	STREPTOCOCCUS AGALACTIAE GRUPO B PCR
Código:	SAGALACPCR
Técnica:	RT-PCR
Unidades:	
Plazo:	6 días
Tubo:	Muestra envios externos
Comentario adicional:	Frotis nasofaringeo: escobillon seco.Refrigerar. estabilidad: 4ºC: 5 Días; Exudado uretral. escobillón seco. Refrigerar. Estabilidad: 4ºC: 3 Semanas Exudado vaginal: escobi´´on seco.Refriferar. Estabilidad: 4ºC: 3 Semanas; LCR: Tubo estéril. Congelar. Estabilidad: -20ºC: 7 Días Esputo: contenedor estéril. Refrigerar. Estabilidad: 4ºC: 5 Días;-20ºC: 7 Días
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta

Descripción:	Streptococcus pneumoniae DNA PCR en LCR
Código:	STNELCRPCR
Técnica:	PCR
Unidades:	
Plazo:	12 días
Tubo:	Muestra envios externos
Comentario adicional:	2 ml LCR
Valores de referencia:	

Descripción:	Streptococcus pneumoniae DNA PCR en Sangre
Código:	STREPNEPCR
Técnica:	PCR
Unidades:	
Plazo:	12 días
Tubo:	Sangre EDTA
Comentario adicional:	2 mL sangre total EDTA
Valores de referencia:	

Descripción:	STREPTOCOCO A ANTÍGENO (TEST DIRECTO)
Código:	STREP.A.AG
Técnica:	Inmunocromatográfica
Unidades:	
Plazo:	1 días
Tubo:	Microbiología
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	STREPTOCOCO PNEUMONIAE AC.IGG EN SUERO
Código:	PNEUMOAC
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	mcg/mL
Plazo:	12 días

Descripción: STREPTOCOCO PNEUMONIAE AC.IGG EN SUERO
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: Suero:1.0 mL. Refrigerar
Volumen mínimo 0.57mL
Valores de referencia: (Inf. 9.7) Ausencia de inmunización
(9.7 - 270) Inmunización intermedia
(Sup. 270) Inmunización óptima

Descripción: STRONGYLOIDES STERCORALIS IGG ANTICUERPOS
Código: STRONGYLOI
Técnica: CLIA
Unidades: Indice
Plazo: 6 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL suero.
Alternativa: palsma citrato o heparina
Valores de referencia: (Inf. 0.64) Negativo
(0.64 - 0.80) Indeterminado

Código: IGA1Y2
Descripción: SUBCLASE 1 Y 2 DE LA INMUNOGLOBULINA A
Técnica: Turbidimetría
Comentario adicional: 1 mL suero

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	IGA1	6886-6		IGA SUBCLASE 1 SUERO	mg/dL	(76.08 - 328.20)
Prueba	IGA2	6939-3		IGA SUBCLASE 2 SUERO	mg/dL	(6.89 - 114.25)

Código: IGGSUB
Descripción: SUBCLASES DE IGG (téc. Turbidimetría)
Técnica: Turbidimetría
Comentario adicional: 1 mL suero

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	IGG1	2466-1		INMUNOGLOBULINA IGG SUBCLASE 1 SUERO	mg/dL	(194 - 842) < 2 años (315 - 945) 2 años - 4 años (306 - 945) 4 años - 6 años (288 - 918) 6 años - 8 años (432 - 1020) 8 años - 10 años (423 - 1060) 10 años - 12 años (342 - 1150) 12 años - 14 años (315 - 855) 14 años - 18 años (382.4 - 928.6) > 18 años
Prueba	IGG2	2467-9		INMUNOGLOBULINA IGG SUBCLASE 2 SUERO	mg/dL	(22.5 - 300) < 2 años (36 - 225) 2 años - 4 años (60.5 - 345) 4 años - 6 años (44 - 375) 6 años - 8 años (72 - 430) 8 años - 10 años (76 - 355) 10 años - 12 años (100 - 455) 12 años - 14 años (64 - 495) 14 años - 18 años (241.8 - 700.3) > 18 años

Componentes						
Prueba	IGG3	2468-7		INMUNOGLOBULINA IGG SUBCLASE 3 SUERO	mg/dL	(18.6 - 85.3) < 2 años (17.3 - 67.6) 2 años - 4 años (9.9 - 122.1) 4 años - 6 años (15.5 - 85.3) 6 años - 8 años (12.7 - 85.3) 8 años - 10 años (17.3 - 173) 10 años - 12 años (28.3 - 125) 12 años - 14 años (23 - 196) 14 años - 18 años (21.8 - 176.6) > 18 años
Prueba	IGG4	2469-5		INMUNOGLOBULINA IGG SUBCLASE 4 SUERO	mg/dL	(0.5 - 78.4) < 2 años (1 - 53.7) 2 años - 4 años (1.8 - 112.5) 4 años - 6 años (0.4 - 99.2) 6 años - 8 años (1.9 - 93.2) 8 años - 10 años (1.6 - 115) 10 años - 12 años (3.7 - 136.0) 12 años - 14 años (11 - 157) 14 años - 18 años (3.92 - 86.4) > 18 años

Descripción:	Substancia P en plasma (Sustancia)
Código:	SUBSTANP
Técnica:	EIA
Unidades:	pg/mL
Plazo:	20 días
Tubo:	Plasma trasylol/aprotinina
Comentario adicional:	Tubos especiales 2 ml plasma-EDTA con aprotinina (TRASYLOL). congelar Recoger 5 mL de sangre total en un tubo vacutainer frío de EDTA K3 con 250 KIU de Trasylol (Aprotinina). Enfriar el tubo con la sangre recien extraída en un baño de hielo durante 10 minutos. Separar el plasma por centrifugación a 4ºC. El plasma debe congelarse en un plazo máximo de 1 hora y conservarse congelado hasta que sea analizado.
Valores de referencia:	(799 - 4764)

Descripción:	SUBUNIDAD ÁCIDA LÁBIL (ALS)
Código:	ALS
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	mcg/mL
Plazo:	32 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero. Alternativa plasma (EDTA/HEPARINA)
Valores de referencia:	(0.3 - 9.3) < 2 años (1.9 - 10.5) 2 años - 6 años (2.3 - 13.0) 6 años - 10 años (4.2 - 14.0) 10 años - 14 años (5.6 - 14.5) 14 años - 16 años (7.7 - 20.4) > 16 años

Descripción:	SUBUNIDAD ALFA LIBRE SUERO
Código:	SUBALFALI
Técnica:	RIA
Unidades:	UI/L
Plazo:	17 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 mL suero CONGELADO

Descripción:	SUBUNIDAD ALFA LIBRE SUERO
Valores de referencia:	(Inf. 0.70) Hombre (Inf. 0.60) Mujer Premenopausia (Inf. 1.30) Mujer Menopausia

Descripción:	SUCCINILACETONA
Código:	SUCCINACE
Técnica:	GC-MS
Unidades:	mg/L
Plazo:	23 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	3 ml suero, congelar y enviar congelado
Valores de referencia:	(Inf. 0.05)

Descripción:	SUCCINIL-ACETONA EN ORINA
Código:	SUCCINACE2
Técnica:	Cromatografía de Gases-Espectrometría de Masas
Unidades:	mg/g creatin.
Plazo:	23 días
Tubo:	Orina basal
Comentario adicional:	10 mL de orina (micción aislada). Congelar y enviar congelada.
Valores de referencia:	(Inf. 1.40)

Descripción:	SULFATOS CONJUGADOS ORINA
Código:	SULFCONJOR
Técnica:	Cromatografía de gases
Unidades:	mg/g creatinina
Plazo:	9 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	10 mL de orina final de jornada (OFJ). Identificar tubo con etiqueta pequeña sin código de barras, con el tapón marcado y con la palabra OFJ en el lateral del tubo.
Valores de referencia:	(Inf. 210)

Descripción:	SULFITOS EN ORINA
Código:	SULFITEST
Técnica:	Colorimetría
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Orina congelada
Comentario adicional:	10 ML DE ORINA CONGELADA Puede ser orina 24 h. o micción aislada.
Valores de referencia:	

Descripción:	SULPIRIDE SUERO
Código:	SULPIRIDE
Técnica:	Cromatografía líquda/Tándem masas (LC-MS/MS)
Unidades:	ng/mL
Plazo:	10 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL.

Descripción:	SULPIRIDE SUERO
Valores de referencia:	(50 - 750)

Descripción:	SULTIAM SUERO
Código:	SULTIAM
Técnica:	Cromatografía Líquida/Tándem Masas (LC-MS/MS)
Unidades:	mg/l
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	2 mL de suero. Alt. 1 mL Plasma EDTA Tripotásico (Refrigerado)
Valores de referencia:	(0.5 - 12.5) Rango Terapéutico.

Descripción:	Superactividad fosforribosilpirofosfato sintetasa. PRPS1
Código:	GEN_000743
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Superoxido Dismutasa
Código:	SOD
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	ng/mL
Plazo:	18 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 ml de suero. Congelar
Valores de referencia:	(0.10 - 104)

Descripción:	SUSCEPTIBILIDAD/RESISTENCIA A HIV CCR5(59029A/G y 59353C/T)
Código:	G18008
Técnica:	Hot Spot
Unidades:	
Plazo:	22 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo de sangre total EDTA. refrigerar
Valores de referencia:	

Descripción:	SUSCEPTIBILIDAD/RESISTENCIA A HIV CCR5(59029A/G y 59353C/T)
Código:	G18008
Técnica:	Hot Spot
Unidades:	
Plazo:	22 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo de sangre total EDTA. refrigerar
Valores de referencia:	

Descripción:	SUSCEPTIBILIDAD/RESISTENCIA A HIV CCR5(59029A/G y 59353C/T)
Código:	G18008

Descripción: SUSCEPTIBILIDAD/RESISTENCIA A HIV CCR5(59029A/G y 59353C/T)
Técnica: Hot Spot
Unidades:
Plazo: 22 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo de sangre total EDTA. refrigerar
Valores de referencia:

Descripción: SUSCEPTIBILIDAD/RESISTENCIA A HIV CCR5(59029A/G y 59353C/T)
Código: G18008
Técnica: Hot Spot
Unidades:
Plazo: 22 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo de sangre total EDTA. refrigerar
Valores de referencia:

Descripción: SUSCEPTIBILIDAD/RESISTENCIA A HIV CCR5(59029A/G y 59353C/T)
Código: G18008
Técnica: Hot Spot
Unidades:
Plazo: 22 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo de sangre total EDTA. refrigerar
Valores de referencia:

Descripción: T. genetico nutricion y metabolismo
Código: NUTRIGEN
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: Muestra EDTA rotulada con BM y hoja de petición especial (wellness)
Valores de referencia:

Descripción: T. genetico origen ancestros
Código: ANCESTROS
Técnica:
Unidades:
Plazo: 45 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Muestra EDTA rotulada con BM y hoja de petición especial (wellness)
Valores de referencia:

Descripción: T. genetico predisposicion rendimiento deportivo
Código: DEPORGEN
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: Sangre EDTA

Descripción:	T. genetico predisposicion rendimiento deportivo
Comentario adicional:	Muestra EDTA rotulada con BM y hoja de petición especial (wellness)
Valores de referencia:	

Descripción:	T. genetico tratamiento facial y cosmetico
Código:	DERMAGEN
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Muestra EDTA rotulada con BM y hoja de petición especial (wellness)
Valores de referencia:	

Descripción:	T3
Código:	T3
Técnica:	ICMA
Unidades:	ng/mL
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. alternativa plasma de EDTA y plasma de hepatina sodio, y litio
Valores de referencia:	(0.35 - 1.93)

Descripción:	T3 (TRIYODOTIRONINA) AC. SUERO
Código:	AC.TRIYODO
Técnica:	Radioinmunoprecipitación
Unidades:	
Plazo:	11 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL Suero refrigerado
Valores de referencia:	Valor de referencia orientativo: Negativo

Descripción:	T3 LIBRE SUERO (TRIYODOTIRONINA LIBRE)
Código:	FT3
Técnica:	Técnica ICMA
Unidades:	pg/mL
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. Alternativa: heparina de sodio, heparina de litio y Edta potásico.
Valores de referencia:	(1.58 - 3.91)

Descripción:	T3 REVERSE (RT3) EN SUERO
Código:	RT3
Técnica:	CLIA
Unidades:	ng/mL
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL de suero refrigerado.
Valores de referencia:	(0.31 - 0.95)

Descripción:	T4
Código:	T4
Técnica:	Técnica ICMA
Unidades:	µg/dL
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(4.87 - 11.72)

Descripción:	T4 (TIROXINA) AC. SUERO
Código:	AC.TIROXIN
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	
Plazo:	12 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	2 mL de suero
Valores de referencia:	(Inf. 1) Negativo (Sup. 1) Positivo

Descripción:	T4 LIBRE (TIROXINA LIBRE)
Código:	FT4.
Técnica:	
Unidades:	ng/dL
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(0.70 - 1.48)

Descripción:	T4/TBG indice en suero
Código:	T4_TBG
Técnica:	Inmunoanálisis
Unidades:	Indice
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL Suero (Refrigerado)
Valores de referencia:	(2.3 - 6.2)

Descripción:	TACROLIMUS
Código:	TACROLIMUS
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis de micropartículas
Unidades:	ng/mL
Plazo:	7 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	SANGRE TOTAL EDTA
Valores de referencia:	(9.0 - 13.0) Transplante renal. Terapia inicial. (4.0 - 9.0) Transplante renal. Terapia mantenimiento. (9.0 - 13.0) Transplante hígado. Terapia inicial. (4.0 - 9.0) Transplante hígado. Terapia mantenimiento. (9.0 - 15.0) Transplante corazón. Terapia inicial. (7.0 - 13.0) Transplante corazón. Terapia mantenimiento.

Descripción:	TAENIA SOLIUM AC .IGG SUERO (CISTICERCOSIS)(TENIA)
Código:	CISTICERAC
Técnica:	EIA
Unidades:	
Plazo:	12 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml de suero refrigerado. Alternativa: plasma heparina sódica o de litio
Valores de referencia:	(Inf. 9) Negativo (9 - 11) Indeterminado

Descripción:	TAENIA SOLIUM AC.IGG EN LCR (CISTICERCOSIS)
Código:	CISTICELCR
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	
Plazo:	12 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1mL LCR
Valores de referencia:	(Sup. 1) Positivo

Descripción:	TAENIA SOLIUM CONFIRMACION E IDENTIFICACION AC.CISTICERCOSIS
Código:	CISTICCONF
Técnica:	Immunoblot
Unidades:	
Plazo:	12 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero.
Valores de referencia:	Negativo

Descripción:	TAENIA SOLIUM POR PCR
Código:	TAENIAPCR
Técnica:	PCR
Unidades:	
Plazo:	18 días
Tubo:	Muestra envios externos
Comentario adicional:	2 mL sangre total EDTA, LCR, heces.
Valores de referencia:	

Descripción:	Talasemia beta: gen HBB (sec. Sanger)
Código:	BTALA_SEC
Técnica:	PCR y secuenciación
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún apataro, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	Talasemia beta-delta: sec y MLPA HBB, HBG1 y HBG2
Código:	BDTALA_SEC

Descripción:	Talasemia beta-delta: sec y MLPA HBB, HBG1 y HBG2
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	20 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún apataro, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato. Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente
Valores de referencia:	

Descripción:	Talasemina alfa: deleciones en HBA1 y HBA2 gen alfa-globina
Código:	ATALA_PCR
Técnica:	PCR
Unidades:	
Plazo:	20 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	Talasemina alfa: gen alfa-globina HBA1 y HBA2 (sec. Sanger)
Código:	ATALA_SEC
Técnica:	PCR y secuenciación
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	TALIO EN ORINA
Código:	TALIO2
Técnica:	Espectrometía de Masas-Plasma acoplado Inductivamente
Unidades:	µg/L
Plazo:	7 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	Orina final de semana laboral identificada conforme a protocolo (preferiblemente)
Valores de referencia:	(Inf. 1) en personas no expuestas. (Inf. 5.0) VLB exposición a TALIO (Baselt RC.Biological Monitoring Methods for Industrial Chemicals)

Descripción:	TALIO SANGRE TOTAL
Código:	TALIOSAN
Técnica:	ICP-MS
Unidades:	µg/l
Plazo:	6 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	Sangre total EDTA Dipotásico (libre trazas metales)
Valores de referencia:	(Inf. 2)

Descripción:	Talla baja. Panel NGS
Código:	GEN_000744
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	TAPENTADOL SUERO
Código:	TAPENTAD
Técnica:	Cromatografía líquida/Tándem masas
Unidades:	µg/l
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero (2-8ºC- refrigerar) Alternativa 1 mL Plasma EDTA Dipotásico ((2-8ºC- refrigerar)
Valores de referencia:	(50.0 - 130) Rango terapéutico

Descripción:	Taquicardia ventricular catecol.: <10 genes (NGS)
Código:	TAQ_VENTRI
Técnica:	NGS
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y reotulado con BM. Alternativa: Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	Taquicardia ventricular polimórfica catecolinérgica. CASQ2
Código:	GEN_000745
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	TAU FOSFORILADA LCR
Código:	TAUFOSFO
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	pg/mL
Plazo:	18 días
Tubo:	Liquido cefalorraquideo congelado
Comentario adicional:	Descartar las primeras 20 gotas y recoger aproximadamente 2-5 mL de LCR en un tubo de polipropileno. Congelar inmediatamente. No se aceptan muestras refrigeradas.
Valores de referencia:	(Inf. 56.5)

Descripción:	TBG SUERO (THYROXINE BINDING GLOBULIN)
Código:	TBG
Técnica:	Quimioluminiscencia

Descripción:	TBG SUERO (THYROXINE BINDING GLOBULIN)
Unidades:	mcg/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero Volumen mínimo: 0.20 mL
Valores de referencia:	(14.0 - 31.0) (27.0 - 66.0) Gestación

Descripción:	TCF3(E2A)/PBX1 · RT-PCR
Código:	TCF3_PBX1
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional:	Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	TDICOM + microbiota avanzada (KYBERLPSZO)
Código:	TDIPLUS
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	23 días
Tubo:	Muestra envios externos
Comentario adicional:	•1 tubos de 3 mL de sangre total EDTA K2 (protegido de la luz, por ejemplo, envolver en papel de aluminio) •1 tubos de 3 mL de sangre total EDTA K2 (centrifugar, separar 1 alícuota y congelar – marcar tubo como PLEC) para TIOTOT •1 tubo de gelosa suero de 8,5 mL (centrifugar, separar 1 alícuota y congelarla) para CQ10 •1 tubo de SUET (libre de metales) de 5 mL Refrigerada 3 días / Congelada 1 mes •1 muestra heces (refrigerar, estabilidad 4C: 3 días) para KYBERLPSZO
Valores de referencia:	

Descripción:	TEICOPLANINA
Código:	TEICOPLANI
Técnica:	Cromatografía Líquida/Tándem Masas (LC-MS/MS)
Unidades:	mcg/mL
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	2 mL
Valores de referencia:	5.0-60.0 mcg/mL

Descripción:	TELOPEPTIDO AMINOTERMINALES (N-TERMINAL, NTX) DE COLAGENO I
Código:	TELOPEPI
Técnica:	ICMA
Unidades:	nmol/mmol Creat
Plazo:	9 días
Tubo:	Orina basal

Descripción:	TELOPEPTIDO AMINOTERMINALES (N-TERMINAL, NTX) DE COLAGENO I
Comentario adicional:	10 mL orina. 2º micción matutina.
Valores de referencia:	(21 - 83) Hombre (17 - 94) Mujer Premenopáusicas (26 - 124) Mujer Postmenopáusicas

Descripción:	Temblor esencial hereditario tipo 4. Sec Gen: FUS
Código:	GEN_000746
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	TEOFILINA
Código:	TEOFI
Técnica:	Inmunoensayo
Unidades:	µg/mL
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(10 - 20) Adulto (5 - 10) Apnea neonatal

Descripción:	TEOFILINA SALIVA (AMINOFILINA)
Código:	TEOFISALIV
Técnica:	Inmunoanálisis
Unidades:	mcg/mL
Plazo:	5 días
Tubo:	Saliva
Comentario adicional:	1 mL saliva
Valores de referencia:	(6 - 12)

Descripción:	TEST DE AC. CONTRA RECEPTOR ACIDO FOLICO (FRAT TEST)
Código:	ARAF
Técnica:	EIA
Unidades:	
Plazo:	77 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	2 alícuotas de suero CONGELADO de 1’5 ml cada una como mínimo Y CORREO ELECTRÓNICO A Ugmp.Barcelona@ctes.eurofinseu.com indicando el número de petición. Las muestras deben llegar a Valderribas antes del Jueves. Los pacientes no deben tomar ácido fólico ni 5 MTHF, ni alimentos suplementados con ácido fólico durante las 48 horas previas a la extracción de sangre.Se recomienda realizar ayuno durante al menos 4 horas. Hay que entregar formulario específico debidamente cumplimnetado Mantener y enviar el suero congelado (petacas) al laboratorio. Es imprescindible mantener la correcta temperatura de la muestra en todo momento (no se debe congelar y descongelar). En caso de utilizar petaca, ésta deberá haber sido mantenida en el con
Valores de referencia:	

Descripción:	Test de Aire Espirado SIBO LACTULOSA/LACTITOL
Código:	H2SOBREBAC

Descripción:	Test de Aire Espirado SIBO LACTULOSA/LACTITOL
Técnica:	Cromatografía de gases
Unidades:	
Plazo:	10 días
Tubo:	Test Aliento
Comentario adicional:	TEST HIDROGENO Y METANO ESPIRADO SOBRECRECIMIENTO BACTERIANO LACTULOSA/LACTITOL Muestras de aire espirado a los tiempos establecidos
Valores de referencia:	

Descripción:	Test de Aire Espirado, Valoracion del TRÁNSITO INTESTINAL
Código:	H2TRANSITO
Técnica:	Cromatografía de gases
Unidades:	
Plazo:	10 días
Tubo:	Test Aliento
Comentario adicional:	Muestras de aire espirado en los tiempos establecidos
Valores de referencia:	

Descripción:	Test de Aire Espirado: Sobrecrecimiento Bacteriano GLUCOSA
Código:	H2SOBREGLU
Técnica:	Cromatografía de gases
Unidades:	
Plazo:	10 días
Tubo:	Test Aliento
Comentario adicional:	Muestras de aire espirado a los tiempos establecidos
Valores de referencia:	

Descripción:	Test de Aire Espirado: Intolerancia a la FRUCTOSA
Código:	H2FRUCTOSA
Técnica:	Cromatografía de gases
Unidades:	
Plazo:	10 días
Tubo:	Test Aliento
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	Test de Aire Espirado: Intolerancia a la LACTOSA
Código:	H2LACTOSA
Técnica:	Cromatografía de gases
Unidades:	
Plazo:	10 días
Tubo:	Test Aliento
Comentario adicional:	Muestras de aire espirado en los tiempos establecidos
Valores de referencia:	

Descripción:	Test de Aire Espirado: Intolerancia a la SACAROSA
Código:	H2SACAROSA
Técnica:	Cromatografía de gases
Unidades:	
Plazo:	10 días

Descripción:	Test de Aire Espirado: Intolerancia a la SACAROSA
Tubo:	Test Aliento
Comentario adicional:	Kit especial. TEST DE AIRE ESPIRADO PARA INTOLERANCIA A SACAROSA. Muestras de aire espirado en los tiempos establecidos.
Valores de referencia:	

Descripción:	Test de Aire Espirado: Intolerancia a la SORBITOL
Código:	H2SORBITOL
Técnica:	Cromatografía de gases
Unidades:	
Plazo:	10 días
Tubo:	Test Aliento
Comentario adicional:	Kit especial. TEST DE AIRE ESPIRADO PARA INTOLERANCIA A SORBITOL. Muestras de aire espirado en los tiempos establecidos.
Valores de referencia:	

Descripción:	Test de Aire Espirado: Intolerancia a la XILOSA
Código:	H2XILOSA
Técnica:	Cromatografía de gases
Unidades:	
Plazo:	10 días
Tubo:	Test Aliento
Comentario adicional:	Kit especial. TEST DE AIRE ESPIRADO PARA INTOLERANCIA A XILOSA. Muestras de aire espirado en los tiempos establecidos.
Valores de referencia:	

Descripción:	TEST DE COOMBS DIRECTO
Código:	COOMBSD
Técnica:	Columna gel
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Sangre EDTA
Comentario adicional:	1 mL sangre total EDTA
Valores de referencia:	NEGATIVO

Descripción:	TEST DE COOMBS INDIRECTO
Código:	COOMBSI
Técnica:	Columna gel
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	

Descripción:	TEST DE DESGRANULACION DE BASOFILOS
Código:	TDBH
Técnica:	Observación Microscópica
Unidades:	% cel. desgr.
Plazo:	4 días
Tubo:	ALICUOTAS EDTA SECCION PRUEBAS ESPECIALES

Descripción:	TEST DE DESGRANULACION DE BASOFILOS
Comentario adicional:	10 mL sangre total EDTA. Extracción tres semanas después de reacción alérgica. Aportar comprimido del fármaco a estudio.Tambien se puede enviar viales de medicación liquida, siempre y cuando estas sean medicaciones inyectables.
Valores de referencia:	(Sup. 30) Positivo (Inf. 30) Negativo

Descripción:	TEST DE EMBARAZO ORINA
Código:	GRAVINDEX
Técnica:	Inmunocromatografía
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Orina Test embarazo
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	Test de farmacogenética - Dolor crónico
Código:	FARMADOLOR
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	Sangre EDTA
Comentario adicional:	Muestra sangre EDTA rotulada con BM y hoja de petición especial (wellness)
Valores de referencia:	

Descripción:	Test de farmacogenética - Neuropsiquiatría
Código:	FARMANEURO
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	Sangre EDTA
Comentario adicional:	Muestra sangre EDTA rotulada con BM y hoja de petición especial (wellness)
Valores de referencia:	

Descripción:	TEST DE GRAHAM
Código:	GRAHAM
Técnica:	Microscopía óptica
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Tubo Especial
Comentario adicional:	Cinta adhesiva transparente segun hoja de instrucciones
Valores de referencia:	

Descripción:	Test de Hidrogeno y Metano Espirado: INTOLERANCIA AZUCARES
Código:	H2AZUCARES
Técnica:	Cromatografía de gases
Unidades:	
Plazo:	10 días
Tubo:	Test Aliento
Comentario adicional:	Muestras de aire espirado en los tiempos establecidos
Valores de referencia:	

Descripción:	TEST DE PERMEABILIDAD INTESTINAL
Código:	PERMEABIL
Técnica:	LC-MS/MS
Unidades:	
Plazo:	17 días
Tubo:	Orina basal
Comentario adicional:	PEDIR INSTRUCCIONES Y KIT A ALMACEN Recoger orina durante las 6 horas posteriores a la administración de lactulosa y manitol. Volumen 20.0 mL Volumen mínimo 10 mL En mujeres, no obtener la muestra durante la menstruación. Conservar y enviar refrigerada. Es necesario estar en ayunas (8h) y no tomar medicación (consultar con su médico antes de suspender cualquier medicación) ni hacer ejercicio que requiera esfuerzo.
Valores de referencia:	

Descripción:	Test de receptividad endometrial (ventana de implantación)
Código:	EREADY
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	17 días
Tubo:	BIOPSIA ESPECIAL
Comentario adicional:	Solicitar kit especial. Contactar con asesoría genética antes de tomar la muestra.
Valores de referencia:	

Descripción:	TEST DE SAICAR (ADENILSUCCINATO LIASA)
Código:	SAICAR.CAN
Técnica:	Espectrometría de absorción molecular
Unidades:	
Plazo:	12 días
Tubo:	Orina congelada
Comentario adicional:	10 mL de orina CONGELADA. puede usarse aislada o de 24 horas IMPRESCINDIBLE INFORME CLINICO
Valores de referencia:	

Descripción:	TEST DE SUDOR (CLORO)
Código:	SUDOR
Técnica:	Potenciometría
Unidades:	mmol/L
Plazo:	3 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	Sudor
Valores de referencia:	(Inf. 40) Negativo

Descripción:	TEST DIETA INFLAMATORIA CON CONSULTA
Código:	TDIC
Técnica:	VARIOS
Unidades:	
Plazo:	13 días
Tubo:	Muestra envios externos
Comentario adicional:	1 tubo de SUET (libre de metales) de 5 Ml + 1 tubo de gelosa suero de 5 mL (centrifugar) + 2 tubos de 3 mL de sangre total EDTA K2 (uno de ellos protegido de la luz, por ejemplo, envolver en papel de aluminio)

Descripción: TEST DIETA INFLAMATORIA CON CONSULTA
Valores de referencia:

Descripción: TEST DIETA INFLAMATORIA SIN CONSULTA
Código: TDII
Técnica: VARIAS
Unidades:
Plazo: 13 días
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional: 1 tubo de SUET (libre de metales) de 5 Ml + 1 tubo de gelosa suero de 5 mL (centrifugar) + 2 tubos de 3 mL de sangre total EDTA K2 (uno de ellos protegido de la luz, por ejemplo, envolver en papel de aluminio)
Valores de referencia:

Código: ETSPLUS
Descripción: TEST ETS PLUS
Técnica:
Comentario adicional:
MPX: 1 tubo EDTA
ETS14_PCR: torunda genital u orina
HPV_ROCHE: Mujer - muestra endocervical; Hombre - torunda genital u orina.
VDRL: 1 tubo SUERO

(OJO: muestras separadas opara ETS y HPV)

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	VDRL	63464-2		ANTICUERPOS ANTI TREPONEMA PALLIDUM (SYPHILIS TP)	Indice	(Inf. 0.99) Negativo
Prueba	QPAP			PAPILOMAVIRUS (HPV) DNA DETECCIÓN/TIPIFICACIÓN		Valor de referencia: No se detecta Este método permite la detección de los siguientes serotipos: VPH de bajo riesgo: 6,11 VPH de alto riesgo: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,6
Perfil	MPX			SCREENING HIV, VHC Y VHB POR RT-PCR (MPX)		
Perfil	ETS14PCR			ETS 14 PCR		

Descripción: Test genético de farmacogenética en oncología, 25 fármacos
Código: FARMAGEN25
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: Muestra EDTA rotulada con BM y hoja de petición especial (wellness)
Valores de referencia:

Descripción: Test genético intolerancia gluten, lactosa y fructosa
Código: INTALIGEN
Técnica:

Descripción: Test genético intolerancia gluten, lactosa y fructosa
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: Sangre EDTA
Comentario adicional: Muestra EDTA rotulada con BM y hoja de petición especial (wellness)
Valores de referencia:

Descripción: TEST GESTIÓN DEL PESO CON CONSULTA
Código: GEDI
Técnica: Array - SNPs
Unidades:
Plazo: 32 días
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional: 2 tubos de K2 EDTA de 3 Ml + 1 tubo de gelosa suero de 8,5 mL (centrifugarlo) +1 tubo de gelosa suero de 4 mL [centrifugar y separar en 1 alicuota (congelar SOLO si el transporte de la muestra es >48h)]

El paciente debe rellenar y escanearse el peticionario específico
Valores de referencia:

Descripción: TEST GESTIÓN DEL PESO SIN CONSULTA
Código: GEPE
Técnica: ARRAY-SNPs
Unidades:
Plazo: 32 días
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional: 2 tubos de K2 EDTA de 3 Ml + 1 tubo de gelosa suero de 8,5 mL (centrifugarlo) +1 tubo de gelosa suero de 4 mL [centrifugar y separar en 1 alicuota (congelar SOLO si el transporte de la muestra es >48h)]

Nota: importante, el paciente debe rellenar y escanearse el peticionario específico adjunto
Valores de referencia:

Descripción: TEST OWLIVER: DETECCION ESTEATOHEPATITIS NO ALCOHOLICA
Código: OWLIVER
Técnica: UHPLC/MS
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: Suero congelado
Valores de referencia:

Descripción: Test portadores GeneScreen: Ampliación panel 1 nivel
Código: AMP1LEVGS
Técnica: NGS
Unidades:
Plazo: 22 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Test portadores GeneScreen: Añadir 1 gen
Código: GENEXTRAGS
Técnica: NGS
Unidades:

Descripción: Test portadores GeneScreen: Añadir 1 gen
Plazo:
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Prueba creada para añadir el análisis de un gen a un estudio de GeneScreen hecho anteriormente.
Valores de referencia:

Código: HARMONY
Descripción: TEST PRENATAL HARMONY
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	HARMONSEXO	75693-2		HARMONY TEST PRENATAL CON SEXO FETAL		
Prueba	HARMONMONX	88571-5		HARMONY TEST PRENATAL CON MONOSOMÍA X		
Prueba	HARMONANEU	73821-1		HARMONY TEST PRENATAL CON ANEUPLIODIAS SEXUALES		
Prueba	HARMOBASIC	73967-2		HARMONY TEST PRENATAL (T21, T18, T13)		
Prueba	EDADGSEMAN	49051-6		EDAD GESTACIONAL: SEMANAS (HARMONY)		
Prueba	EDADGDIAS	49052-4		EDAD GESTACIONAL: DIAS (HARMONY)		
Prueba	FECUNHMY	47224-1		TIPO DE FECUNDACIÓN (HARMONY)		
Prueba	EDADOVULOS	68327-6		EDAD ÓVULOS: PROPIOS O DONANTE (HARMONY)		
Prueba	NFETOSHMY	55281-0		NUMERO DE FETOS (HARMONY)		

Código: HARMOBAS
Descripción: TEST PRENATAL HARMONY (TRISOMÍAS Y SEXO)
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	HARMONSEXO	75693-2		HARMONY TEST PRENATAL CON SEXO FETAL		
Prueba	HARMOBASIC	73967-2		HARMONY TEST PRENATAL (T21, T18, T13)		
Prueba	EDADGSEMAN	49051-6		EDAD GESTACIONAL: SEMANAS (HARMONY)		
Prueba	EDADGDIAS	49052-4		EDAD GESTACIONAL: DIAS (HARMONY)		
Prueba	FECUNHMY	47224-1		TIPO DE FECUNDACIÓN (HARMONY)		
Prueba	EDADOVULOS	68327-6		EDAD ÓVULOS: PROPIOS O DONANTE (HARMONY)		
Prueba	NFETOSHMY	55281-0		NUMERO DE FETOS (HARMONY)		

Código: TRCOVIDAC
Descripción: TEST RÁPIDO COVID-19 ANTICUERPOS
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	TRCOVIGG	94507-1		COVID19 IGG (TEST RÁPIDO)		
Prueba	TRCOVIGM	94508-9		COVID19 IGM (TEST RÁPIDO)		

Descripción:	TEST RAPIDO DE MALARIA
Código:	MALARIATES
Técnica:	Inmunocromatografía
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	Sangre EDTA
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	TEST RÁPIDO PARA CRYPTOSPORIDIUM
Código:	CRYPTOSAG
Técnica:	Inmunocromatografía
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Heces No Microbiología
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	TESTOSTERONA EN ORINA
Código:	TESTOS2
Técnica:	INMUNOLUMINISCENCIA
Unidades:	mcg/24 h
Plazo:	3 días
Tubo:	Orina 24 Horas
Comentario adicional:	10 mL. Indicar volumen 24h.
Valores de referencia:	(25 - 125) Hombre (5 - 35) Mujer

Descripción:	TESTOSTERONA LIBRE
Código:	TESTOSLI
Técnica:	CLIA
Unidades:	pg/mL
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero.
Valores de referencia:	(4.5 - 42) Hombre (Inf. 9) Mujer

Descripción:	TESTOSTERONA LIBRE EN SALIVA
Código:	TESTLSAL
Técnica:	EIA
Unidades:	pg/mL
Plazo:	8 días

Descripción: TESTOSTERONA LIBRE EN SALIVA
Tubo: Saliva
Comentario adicional: 1.0 mL de saliva en tubo sin aditivos.
Se puede usar Salivetes
Durante los 30 minutos antes de obtener la muestra de saliva no ingiera alimentos, no beba, no fume ni mastique chicle.

Valores de referencia:
(36.30 - 117.91) Hombre 20 años - 29 años
(28.57 - 83.93) Hombre 29 años - 39 años
(27.20 - 81.83) Hombre 39 años - 49 años
(27.12 - 77.15) Hombre 49 años - 59 años
(21.63 - 73.04) Hombre 59 años - 69 años
(7.35 - 42.50) Mujer 20 años - 29 años
(7.10 - 42.50) Mujer 29 años - 39 años
(6.50 - 42.50) Mujer 39 años - 49 años
(5.80 - 42.50) Mujer 49 años - 59 años
(5.25 - 34.20) Mujer 59 años - 69 años

Descripción: TESTOSTERONA TOTAL
Código: TESTOS
Técnica: Inmunoquimioluminiscencia
Unidades: ng/mL
Plazo: 2 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:

Valores de referencia:
(0.47 - 9.80) Hombre 18 años - 50 años
(1.27 - 10.20) Hombre > 50 años
(Inf. 0.30) Hombre 7 años - 18 años Tanner I
(Inf. 2.82) Hombre 7 años - 18 años Tanner II
(0.086 - 6.81) Hombre 7 años - 18 años Tanner III
(0.18 - 7.85) Hombre 7 años - 18 años Tanner IV
(0.13 - 9.06) Hombre 7 años - 18 años Tanner V
(0.07 - 0.79) Mujer 18 años - 50 años
(0.08 - 0.37) Mujer > 50 años
(0.058 - 0.33) Mujer 7 años - 18 años Tanner I
(0.043 - 0.23) Mujer 7 años - 18 años Tanner II
(0.069 - 0.43) Mujer 7 años - 18 años Tanner III
(0.15 - 0.53) Mujer 7 años - 18 años Tanner IV
(0.15 - 1.02) Mujer 7 años - 18 años Tanner V

Descripción: Tetra-Amelia, Sd. Sec Gen: WNT3
Código: GEN_000747
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Tetracloroetileno (Percloroetileno) en sangre
Código: PERCLOETIL
Técnica: Cromatografía de Gases/captura de electrones
Unidades: mg/L
Plazo: 13 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia

Descripción:	Tetracloroetileno (Percloroetileno) en sangre
Comentario adicional:	3 ml de sangre total al principio de la última jornada de la semana laboral. Refrigerar Volumen mínimo: 1 mL
Valores de referencia:	(Inf. 0.4) Principio de última jornada de semana laboral. Valor límite biológico- VLB (INSST) (Inf. 0.5) Principio de última jornada de semana laboral. Biológicas exposure indices-BEIs (ACGIH)

Descripción:	TETRAHIDROFURANO EN ORINA
Código:	TETRAHFUR
Técnica:	Cromatografía de gases/Ionización de Llama
Unidades:	mg/L
Plazo:	7 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	10 ml de orina (micción aislada) al final de la jornada laboral.
Valores de referencia:	(Inf. 2.0) Personas expuestas (Tetrahidrofurano); Final de la jornada (VLB-INSHT)

Descripción:	TGF-BETA 1 PLASMA
Código:	TGFBETA1
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	ng/mL
Plazo:	50 días
Tubo:	Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional:	1 mL Plasma EDTA Tripotásico congelado
Valores de referencia:	(1.40 - 8.20)

Descripción:	TH/TO AC. SUERO
Código:	TH.TOAC
Técnica:	Inmunoblot
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	Negativo

Descripción:	TIAPRIDA SUERO
Código:	TIAPRIDA
Técnica:	Cromatografía Líquida/Tándem Masas
Unidades:	µg/mL
Plazo:	17 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	(1.0 - 2.0)

Código:	PFA100
Descripción:	TIEMPO DE OBTURACION
Técnica:	Adhesión plaquetaria en flujo
Comentario adicional:	¡CITAR PRUEBA EN EL LABORATORIO!

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	PFA100EPI	24471-5		TIEMPO DE OBTURACION-EPINEFRINA	segundos	(84 - 160)
Prueba	PFA100ADP	24472-3		TIEMPO DE OBTURACION-ADP	segundos	(68 - 121)

Descripción: TIEMPO DE PROTOMBINA CAPILAR
Código: TP.C
Técnica: Coagulación
Unidades: segundos
Plazo: 1 días
Tubo:
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Código: TP
Descripción: TIEMPO DE PROTROMBINA PLASMA
Técnica: Coagulométrica
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	TP.	5902-2		TIEMPO DE PROTROMBINA	segundos	
Prueba	QUICK	5894-1		INDICE DE QUICK	%	(78 - 121)
Prueba	INR	6301-6		INR TIEMPO PROTROMBINA		(0.9 - 1.1)
Prueba	RATIO	5003181		RATIO T. PROTOMBINA		

Descripción: TIEMPO DE REPTILASE
Código: TREPTIS
Técnica:
Unidades: sg
Plazo: 5 días
Tubo: Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional: 1 ml plasma (citrato) pobre en plaquetas (doble centrifugación a 2500 g/15 min.)Aspirar parte superior. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.

Volumen mínimo
0.45 mL

Valores de referencia: (12 - 22)

Código: TROMBINA
Descripción: TIEMPO DE TROMBINA
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	TROMBHALLA	3243-3		TIEMPO DE TROMBINA	segundos	(Inf. 21)

Componentes						
Prueba	TROMCONTRO	5955-0		TIEMPO DE TROMBINA: TIEMPO CONTROL	segundos	

Descripción: TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA
Código: TTP
Técnica: Coagulometría
Unidades: segundos
Plazo: 3 días
Tubo: Coagulación - Plasma Citrato
Comentario adicional:
Valores de referencia: (20 - 39)

Código: TTP.
Descripción: TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA Y RATIO
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	TTP	14979-9		TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA	segundos	(20 - 39)
Prueba	RATIO.TTP	63561-5		RATIO TTP		(0.8 - 1.2)

Descripción: Timidin Quinasa en suero
Código: TIMIDINQUI
Técnica: Quimioluminiscencia
Unidades: U/L
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 1 mL suero. Congelar y enviar congelado.
Volumen: 1.0 mL
Volumen mínimo: 0.20 mL
Valores de referencia: (2.0 - 7.5)

Descripción: Timothy, Sd. Sec Gen: CACNA1C
Código: GEN_000748
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: TINCION DE GRAM
Código: GRAM
Técnica: Observación microscópica
Unidades:

Descripción:	TINCION DE GRAM
Plazo:	3 días
Tubo:	Microbiología
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	TINCION DE ZIEHL-NEELSEN
Código:	ZIEHL
Técnica:	Tinción Ziehl-Neelsen para bacilos ácido-alcohol resistentes
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Muestra Microbiología
Comentario adicional:	Muestras de orina, esputo y otros especímenes en recipiente estéril adecuado
Valores de referencia:	

Descripción:	TIOCIANATOS, ORINA
Código:	TIOCIANATO
Técnica:	Espectrofotometría
Unidades:	mg/L
Plazo:	12 días
Tubo:	Orina basal
Comentario adicional:	1.0 mL orina micción aislada. 100 µl
Valores de referencia:	(1.0 - 4.0) No fumadores (7.0 - 17) Fumadores

Descripción:	TIOLES TOTALES, PLASMA
Código:	TIOLES
Técnica:	Espectrofotometría
Unidades:	µmol/L
Plazo:	17 días
Tubo:	Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional:	PLASMA DE EDTA SEPARADO Y CONGELADO
Valores de referencia:	(204 - 309)

Descripción:	TIOPENTAL SUERO
Código:	TIOPENTAL
Técnica:	Cromatografía líquida/Tándem masas
Unidades:	mcg/mL
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	2 mL suero
Valores de referencia:	(1 - 5) Hipnosia (30 - 100) Coma terapéutico (7 - 130) Anestesia

Descripción:	TIOPURINA METIL-TRANSFERASA (Azatioprina)
Código:	TPMT
Técnica:	HPLC
Unidades:	U/mL

Descripción:	TIOPURINA METIL-TRANSFERASA (Azatioprina)
Plazo:	18 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	Sangre Total EDTA Volumen: 5.0 mL (mínimo 2mL) Evitar recogida vísperas de festivo.
Valores de referencia:	(Inf. 5.0) No administrar (5.1 - 13.7) 0.5 mg/kg/d de Azatioprina (13.8 - 18) 1.5 mg/kg/d de Azatioprina (18.1 - 26) 2.5 mg/kg/d de Azatioprina (26.1 - 40) 3 mg/kg/d de Azatioprina

Descripción:	TIPAJE LEUCOCITOS SANGRE PERIFERICA
Código:	TIPAJEC
Técnica:	Citometría de flujo
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	10 mL de sangre total EDTA
Valores de referencia:	

Descripción:	TIROGLOBULINA
Código:	TG
Técnica:	Téc. ICMA
Unidades:	ng/mL
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. Alternativa plasma de EDTA K2 y EDTA Na2, Heparina de litio.
Valores de referencia:	(Inf. 2) Personas tiroidectomizadas (Inf. 64.15) Personas aparentemente sanas (percentil 97.5)

Descripción:	TIROGLOBULINA AC. SUERO
Código:	TIROGLOAC
Técnica:	Técnica CMIA
Unidades:	UI/mL
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 4.11)

Descripción:	TIROSINCINASA-1 SOLUBLE TIPO FMS (sFlt-1)
Código:	SFLT1
Técnica:	Técnica ECLIA
Unidades:	pg/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	suero refrigerado 48h, sino suero congelado

Descripción: TIROSINCINASA-1 SOLUBLE TIPO FMS (sFlt-1)

Valores de referencia:
(652 - 2501) Mujer 10-14 sem.gestación
(708 - 2807) Mujer 15-19 sem.gestación
(572 - 2997) Mujer 20-23 sem.gestación
(618 - 3205) Mujer 24-28 sem.gestación
(773 - 5165) Mujer 29-33 sem.gestación
(992 - 7363) Mujer 34-36 sem.gestación
(1533 - 9184) Mujer 37 sem.gestación-parto

Descripción: Tirosinemia. Panel NGS

Código: GEN_000749

Técnica:

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: TITANIO SUERO

Código: TITANIO

Técnica: Espectrometría de masas-Plasma acoplado inductivamente

Unidades: mcg/L

Plazo: 9 días

Tubo: Tubo Especial

Comentario adicional:
INSTRUCCIONES OBTENCIÓN DE LA MUESTRA:
Se extraen 6 ml de sangre en el tubo de tapón blanco.

Invertir de 5 a 10 veces y poner el tubo en posición vertical hasta que la sangre se haya coagulado totalmente.

(60 min. como mínimo)

Se centrifuga a 1800 g (aproximadamente 3000 rpm, en función de la centrifuga) durante 10 min. y se transfiere el sobrenadante (suero) al tubo de tapón amarillo. No apurar al pipetear el suero para evitar hemólisis.

SE ENVIA SOLO EL TUBO DE TAPON AMARILLO

Valores de referencia: (Inf. 7.5)

Descripción: TOBRAMICINA

Código: TOBRA

Técnica: Inmunoanálisis

Unidades: mcg/mL

Plazo: 3 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional:

Valores de referencia:
(5 - 10) Pico
(Sup. 10) Pico - TOXICIDAD
(1 - 2) Valle
(Sup. 2) Valle - TOXICIDAD

Descripción: TOLUENO EN ORINA (EXPOSICIÓN A TOLUENO)

Código: TOLUENO2

Técnica: Cromatografía de gases/ionización de llama

Unidades: mg/L

Plazo: 12 días

Tubo: Orina Final de Jornada

Descripción:	TOLUENO EN ORINA (EXPOSICIÓN A TOLUENO)
Comentario adicional:	2 ml de orina (micción aislada) al final de la jornada laboral. Enviar refrigerada.
Valores de referencia:	(Inf. 0.08) Final de jornada laboral (exposición TOLUENO).VLB-INSST

Descripción:	TOLUENO EN SANGRE
Código:	TOLUENO
Técnica:	Téc. Cromatografía de Gases / Ionización de Llama.
Unidades:	mg/L
Plazo:	12 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	2 tubos de sangre total EDTA, al principio de la última jornada laboral. Refrigerar Volumen mínimo: 3.00 mL
Valores de referencia:	(Inf. 0.05) VLB Principio de la última jornada de la semana (INSHT)

Descripción:	TOPIRAMATO EN SUERO
Código:	TOPIRAMATO
Técnica:	LC-MS/MS
Unidades:	µg/mL
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 mL de suero. Alternativa plasma de heparina.
Valores de referencia:	(2 - 10) (AGNP 2017)

Descripción:	Tortuosidad arterial, Sd. Sec Gen: SLC2A10
Código:	GEN_000750
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Townes-Brocks, Sd. Sec Gen: SALL1
Código:	GEN_000751
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	TOXINA CLOSTRIDIUM A +B DIFFICILE EN HECES
Código:	TOXICLOS
Técnica:	Inmunoanálisis
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Heces No Microbiología
Comentario adicional:	Heces

Descripción:	TOXINA CLOSTRIDIUM A +B DIFFICILE EN HECES
Valores de referencia:	

Descripción:	TOXINA TETANICA AC. IGG SUERO
Código:	TETANOSACG
Técnica:	Técnica EIA
Unidades:	UI/mL
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	(0.01 - 0.1) Protección no efectiva (0.1 - 0.5) Protección efectiva. Corto plazo (0.5 - 5.0) Protección efectiva. Largo plazo

Descripción:	TOXOCARA CANIS AC. IGG SUERO
Código:	TOXOCIGG
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml suero. Alternativo 1 ml de plasma de citrato sódico
Valores de referencia:	(Inf. 0.8) Negativo

Descripción:	TOXOPLASMA GONDII AC. IgA
Código:	TOXOACA
Técnica:	EIA
Unidades:	Índice
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero. REFRIGERAR
Valores de referencia:	(Inf. 0.8) Negativo (0.8 - 1.1) Indeterminado

Descripción:	TOXOPLASMA GONDII AC. IGG
Código:	TOXOACG
Técnica:	CLIA
Unidades:	UI/mL
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 1.59) Negativo (1.6 - 2.99) Indeterminado

Descripción:	TOXOPLASMA GONDII AC. IGG CONFIRMACION SUERO
Código:	TOXOACGCON
Técnica:	IMMUNOBLOT
Unidades:	
Plazo:	12 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero.

Descripción:	TOXOPLASMA GONDII AC. IGG CONFIRMACION SUERO
Valores de referencia:	

Descripción:	TOXOPLASMA GONDII AC. IGG EN LCR
Código:	TOXOGLC
Técnica:	Quimioluminiscencia
Unidades:	Indice
Plazo:	4 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 mL LCR. Se recomienda realizar análisis simultáneo en suero y LCR.
Valores de referencia:	No se dispone de valores de referencia. Valorar a criterio clínico.

Descripción:	TOXOPLASMA GONDII AC. IGM
Código:	TOXOACM
Técnica:	CLIA
Unidades:	
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 0.50) Negativo (0.51 - 0.59) Indeterminado

Descripción:	TOXOPLASMA GONDII AC. IGM CONFIRMACION SUERO
Código:	TOXOACMCON
Técnica:	Inmunoblot
Unidades:	
Plazo:	12 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	

Descripción:	TOXOPLASMA GONDII AC. IGM EN LCR
Código:	TOXOMLC
Técnica:	Quimioluminiscencia
Unidades:	UImL
Plazo:	4 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	0.5 mL LCR.
Valores de referencia:	No se dispone de valores de referencia. Valorar a criterio clínico.

Descripción:	TOXOPLASMA GONDII AVIDEZ AC. IGG
Código:	AVIDEZTOXO
Técnica:	Técnica CLIA (Enzimoinmunoanalisis quimioluminiscente)
Unidades:	%
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	

Descripción:	TOXOPLASMA GONDII AVIDEZ AC. IGG
Valores de referencia:	(Inf. 50) Baja Avidez. Valorar en el contexto clinico y con resto de marcadores serológicos (50 - 59.9) Avidez zona límite (Sup. 60) Alta Avidez. Compatible con infección pasada por Toxoplasma gondii, adquirida hace más de 4 meses

Descripción:	TOXOPLASMA GONDII DNA MUESTRA BIOLÓGICA
Código:	TOXOPCR
Técnica:	Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR)
Unidades:	
Plazo:	6 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:	1 ml LCR-CONGELAR 1 ml liquido amniotico-CONGELAR 200 ml humor vitro/acuoso-CONGELAR 2 ML SANGRE TOTAL EDTA- REFRIGERADO Biopsia parafina-TA NO SE ACEPTA PLASMA
Valores de referencia:	

Descripción:	TPA SUERO (ANTIGENO POLIPEPTIDICO TISULAR)
Código:	TPA
Técnica:	Quimioluminiscencia
Unidades:	U/L
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL de suero Volumen mínimo 0.6 mL
Valores de referencia:	(Inf. 75)

Descripción:	TPHA LCR (TREPONEMA PALLIDUM AC HEMAGLUTINACION)
Código:	TPHALCR
Técnica:	Hemaglutinación Indirecta
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 ml LCR
Valores de referencia:	<1/80Negativo >1/80Positivo

Descripción:	TPHA SUERO (TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS HEMAGLUTINACION)
Código:	TPHA
Técnica:	Hemaglutinación
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero

Descripción:	TPHA SUERO (TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS HEMAGLUTINACION)
Valores de referencia:	<1/80 Negativo >1/80 Positivo

Descripción:	TPS (Antigeno Tisular Polipeptido Especifico)
Código:	TPS
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	U/L
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 ml
Valores de referencia:	(Inf. 80)

Descripción:	Tr ANTICUERPOS LCR
Código:	TRACLCR
Técnica:	Técnica Inmunoblot
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	LIQUIDO LCR INMUNO
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	Tr. almacen ac siálico. Enf. Salla. Sec Gen: SLC17A5
Código:	GEN_000754
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Tr.otopalatodigitales con FLNA. Sec Gen: FLNA
Código:	GEN_000756
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	TRAMADOL EN SUERO
Código:	TRAMADOL
Técnica:	Cromatografía líquida/Tándem masas
Unidades:	µg/L
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. refirgerar. 0.5 ml Alternativa: Plasma de EDta refrigerado. La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis.

Descripción:	TRAMADOL EN SUERO
Valores de referencia:	(100 - 1000) Indice terapéutico (Sup. 1000) Toxicidad (Inf. 25) Límite de cuantificación

Descripción:	TRANSAMINASA GOT (AST)
Código:	GOT
Técnica:	Espectrofotometría
Unidades:	U/L a 37 ºC
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 mL suero
Valores de referencia:	(25 - 75) < 10 dias (15 - 60) 10 dias - 24 meses (Inf. 35) Mujer > 24 meses (Inf. 50) Hombre > 24 meses

Descripción:	TRANSAMINASA GPT (ALT)
Código:	GPT
Técnica:	Espectrofotometría
Unidades:	U/L a 37 ºC
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 mL suero
Valores de referencia:	(Inf. 50) Hombre > 1 año (Inf. 35) Mujer > 1 año (13 - 45) < 1 año

Descripción:	TRANSCORTINA EN SUERO
Código:	TRANSCORT
Técnica:	RIA
Unidades:	µg/mL
Plazo:	22 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1mL SUERO. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.
Valores de referencia:	(22.00 - 55.00) Hombre (40.00 - 154.00) Mujer

Descripción:	TRANSFERRINA
Código:	TRANSF
Técnica:	Turbidimetría
Unidades:	mg/dL
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero Alternativa: Plasma de EDTA o heparina
Valores de referencia:	(200 - 360)

Descripción:	TRANSFERRINA DEFICIENTE EN CARBOHIDRATOS
Código:	TRANSFDEF
Técnica:	Nefelometría
Unidades:	%

Descripción:	TRANSFERRINA DEFICIENTE EN CARBOHIDRATOS
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero Volumen 1.0 mL Volumen mínimo 0.30 mL
Valores de referencia:	(Inf. 2.47) Normal

Descripción:	TRANSGLUTAMINASA AC. IGA
Código:	TRANACIGA
Técnica:	CAP SYSTEM
Unidades:	U/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 6.9) Negativo (7 - 9.9) Indeterminado

Descripción:	TRANSGLUTAMINASA AC. IGG
Código:	TRANSGLIGG
Técnica:	CAP SYSTEM
Unidades:	U/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL
Valores de referencia:	(Inf. 6.9) Negativo (7 - 9.9) Indeterminado

Descripción:	Translocación t(14;16)(q32;q23). Gen de fusión IGH/MAF
Código:	MDFISH1416
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Heparina Litio
Comentario adicional:	5-20 ml sangre periférica. min 2 ml médula ósea. Muestra alternativa: tejido fresco o fijado/parafinado
Valores de referencia:	

Descripción:	TRANSPORTADOR DE ZINC 8 ANTICUERPOS (ZNT8)
Código:	TRANSZN8
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	U/mL
Plazo:	12 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 ml suero (Volumen mínimo 0.5 mL)
Valores de referencia:	(Inf. 10) Negativo

Código:	TRANSKETOL
Descripción:	TRANSQUETOLASA ERITROCITARIA
Técnica:	Espectrofotometría de absorción molecular

Código: TRANSKETOL

Comentario adicional: 5 mL sangre total (heparina). Alternativa: EDTA.
ENVIAR DE LUNES A MARTES (No enviar visperas de festivo)
Rogamos avisar previamente .

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	TRANSQACT	34609-8		Perfil TRANSKETOL: TRANSQUETOLASA ACTIVIDAD	UI/gHb	(0.30 - 0.80)
Prueba	TRANSQTPP	34609-8		Perfil TRANSKETOL: TRANSQUETOLASA ACTIVIDAD + VIT B1 (TPP)	UI/gHb	(0.30 - 0.90)
Prueba	COEFACTK			Perfil TRANSKETOL: COEFICIENTE DE ACTIVIDAD TRANSQUETOLASA		(Inf. 1.16) Indican actividad de TK adecuada con valores de tiamina en rango. (1.16 - 1.24) Indican riesgo moderado de clínica derivada de la deficiencia de actividad de TK por descenso de tiamina. (Sup. 1.24) Indican alto riesgo de clínica derivada de la deficiencia de actividad de TK por descenso de tiamina.

Descripción: Transtornos del ciclo de la urea. Panel NGS
Código: GEN_000752
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Trastornos asociados a POLG: genes POLG1 y POLG2 (NGS)
Código: POLG
Técnica: NGS y MLPA
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Trastornos de la coagulación. Panel NGS
Código: GEN_000753
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Descripción: Trastornos de la coagulación. Panel NGS

Valores de referencia:

Descripción: Trastornos del desarrollo panel de genes

Código: PHARMALP13

Técnica: NGS

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Imprescindible enviar la historia clínica y formulario de petición de genética o consentimiento informado

Valores de referencia:

Descripción: Trastornos del desarrollo sexual. Panel NGS

Código: GEN_000755

Técnica:

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Trastornos del movimiento panel de genes

Código: PHARMALP10

Técnica: NGS

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo EDTA exclusivo para esta determinación y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Imprescindible enviar la historia clínica y formulario de petición de genética o consentimiento informado

Valores de referencia:

Descripción: TRAZODONA EN SUERO

Código: TRAZODONA

Técnica: Cromatografía Líquida/Tándem Masas

Unidades: µg/l

Plazo: 8 días

Tubo: Suero Basal

Descripción:	TRAZODONA EN SUERO
Comentario adicional:	Muestra: Suero Cantidad:1 tubo Contenedor: Tubo suero sin gel separador Volumen: 0.5 mL Conservación: Refrigerar Volumen mínimo: 0,1 mL * Alternativa Muestra: Plasma EDTA Cantidad: 1 tubo Contenedor: Tubo sangre EDTA Volumen: 0.5 mL Conservación: Refrigerar Volumen mínimo: 0,1 mL **
Valores de referencia:	(700 - 1000) (Sup. 1200) Toxicidad

Descripción:	Treacher Collins, Sd. Panel NGS
Código:	GEN_000757
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	TREPONEMA PALLIDUM AC. IGA SUERO
Código:	TREPOACA
Técnica:	Inmunofluorescencia indirecta
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	<1:10 Negativo > o = 1:10 Positivo

Descripción:	TREPONEMA PALLIDUM AC. IGG LCR
Código:	TREPOACGLC
Técnica:	ENZIMOINMUNOANÁLISIS.
Unidades:	Indice
Plazo:	5 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 mL LCR
Valores de referencia:	(Inf. 1) Negativo

Descripción:	TREPONEMA PALLIDUM AC. IGG SUERO
Código:	TREPOACG
Técnica:	EIA
Unidades:	Indice
Plazo:	6 días

Descripción:	TREPONEMA PALLIDUM AC. IGG SUERO
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 0.8) Negativo (0.8 - 1.1) Indeterminado

Descripción:	TREPONEMA PALLIDUM AC. IGM LCR
Código:	TREPOACMLC
Técnica:	ENZIMOINMUNOANÁLISIS
Unidades:	Indice
Plazo:	5 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 mL LCR
Valores de referencia:	(Inf. 1) Negativo

Descripción:	TREPONEMA PALLIDUM AC. IGM SUERO
Código:	TREPOACM
Técnica:	EIA
Unidades:	Indice
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 0.8) Negativo (0.8 - 1.1) Indeterminado

Descripción:	Treponema pallidum DNA PCR Cualitativa
Código:	TREPOPCR
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:	Exudado genital (escobillón seco) -Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO 2ml Sangre total EDTA- REFRIGERAR Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO 5ml orina-CONGELAR 1ml humor vitreo / acuoso-CONGELAR 1ml LCR-CONGELAR Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta

Descripción:	Treponema pallidum DNA PCR Cualitativa
Código:	TREPOPCR
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular

Descripción: Treponema pallidum DNA PCR Cualitativa

Comentario adicional:
```
Exudado genital (escobillón seco)
-Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO
2ml Sangre total EDTA- REFRIGERAR
Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO
5ml orina-CONGELAR
1ml humor vitreo / acuoso-CONGELAR
1ml LCR-CONGELAR

Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
```
Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío

Valores de referencia: Valor de referencia: No se detecta

Descripción: Treponema pallidum DNA PCR Cualitativa

Código: TREPOPCR

Técnica:

Unidades:

Plazo: 7 días

Tubo: Muestra Biología Molecular

Comentario adicional:
```
Exudado genital (escobillón seco)
-Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO
2ml Sangre total EDTA- REFRIGERAR
Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO
5ml orina-CONGELAR
1ml humor vitreo / acuoso-CONGELAR
1ml LCR-CONGELAR

Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
```
Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío

Valores de referencia: Valor de referencia: No se detecta

Descripción: Treponema pallidum DNA PCR Cualitativa

Código: TREPOPCR

Técnica:

Unidades:

Plazo: 7 días

Tubo: Muestra Biología Molecular

Comentario adicional:
```
Exudado genital (escobillón seco)
-Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO
2ml Sangre total EDTA- REFRIGERAR
Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO
5ml orina-CONGELAR
1ml humor vitreo / acuoso-CONGELAR
1ml LCR-CONGELAR

Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
```
Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío

Valores de referencia: Valor de referencia: No se detecta

Descripción: Treponema pallidum DNA PCR Cualitativa

Código: TREPOPCR

Técnica:

Unidades:

Plazo: 7 días

Descripción: Treponema pallidum DNA PCR Cualitativa
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Exudado genital (escobillón seco)
-Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO
2ml Sangre total EDTA- REFRIGERAR
Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO
5ml orina-CONGELAR
1ml humor vitreo / acuoso-CONGELAR
1ml LCR-CONGELAR

Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
Valores de referencia: Valor de referencia: No se detecta

Descripción: Treponema pallidum DNA PCR Cualitativa
Código: TREPOPCR
Técnica:
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Exudado genital (escobillón seco)
-Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO
2ml Sangre total EDTA- REFRIGERAR
Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO
5ml orina-CONGELAR
1ml humor vitreo / acuoso-CONGELAR
1ml LCR-CONGELAR

Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
Valores de referencia: Valor de referencia: No se detecta

Descripción: Treponema pallidum DNA PCR Cualitativa
Código: TREPOPCR
Técnica:
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Exudado genital (escobillón seco)
-Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO
2ml Sangre total EDTA- REFRIGERAR
Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO
5ml orina-CONGELAR
1ml humor vitreo / acuoso-CONGELAR
1ml LCR-CONGELAR

Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
Valores de referencia: Valor de referencia: No se detecta

Descripción: Treponema pallidum DNA PCR Cualitativa
Código: TREPOPCR
Técnica:
Unidades:

Descripción:	Treponema pallidum DNA PCR Cualitativa
Plazo:	7 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:	Exudado genital (escobillón seco) -Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO 2ml Sangre total EDTA- REFRIGERAR Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO 5ml orina-CONGELAR 1ml humor vitreo / acuoso-CONGELAR 1ml LCR-CONGELAR Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta

Descripción:	Treponema pallidum DNA PCR Cualitativa
Código:	TREPOPCR
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:	Exudado genital (escobillón seco) -Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO 2ml Sangre total EDTA- REFRIGERAR Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO 5ml orina-CONGELAR 1ml humor vitreo / acuoso-CONGELAR 1ml LCR-CONGELAR Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta

Descripción:	Treponema pallidum DNA PCR Cualitativa
Código:	TREPOPCR
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:	Exudado genital (escobillón seco) -Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO 2ml Sangre total EDTA- REFRIGERAR Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO 5ml orina-CONGELAR 1ml humor vitreo / acuoso-CONGELAR 1ml LCR-CONGELAR Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta

Descripción:	Treponema pallidum DNA PCR Cualitativa
Código:	TREPOPCR
Técnica:	

Descripción: Treponema pallidum DNA PCR Cualitativa
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Exudado genital (escobillón seco)
-Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO
2ml Sangre total EDTA- REFRIGERAR
Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO
5ml orina-CONGELAR
1ml humor vitreo / acuoso-CONGELAR
1ml LCR-CONGELAR

Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
Valores de referencia: Valor de referencia: No se detecta

Descripción: Treponema pallidum DNA PCR Cualitativa
Código: TREPOPCR
Técnica:
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Exudado genital (escobillón seco)
-Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO
2ml Sangre total EDTA- REFRIGERAR
Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO
5ml orina-CONGELAR
1ml humor vitreo / acuoso-CONGELAR
1ml LCR-CONGELAR

Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
Valores de referencia: Valor de referencia: No se detecta

Descripción: Treponema pallidum DNA PCR Cualitativa
Código: TREPOPCR
Técnica:
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: Exudado genital (escobillón seco)
-Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO
2ml Sangre total EDTA- REFRIGERAR
Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO
5ml orina-CONGELAR
1ml humor vitreo / acuoso-CONGELAR
1ml LCR-CONGELAR

Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
Valores de referencia: Valor de referencia: No se detecta

Descripción: Treponema pallidum DNA PCR Cualitativa
Código: TREPOPCR

Descripción: Treponema pallidum DNA PCR Cualitativa
Técnica:
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:
```
Exudado genital (escobillón seco)
-Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO
2ml Sangre total EDTA- REFRIGERAR
Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO
5ml orina-CONGELAR
1ml humor vitreo / acuoso-CONGELAR
1ml LCR-CONGELAR

Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
```
Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
Valores de referencia: Valor de referencia: No se detecta

Descripción: Treponema pallidum DNA PCR Cualitativa
Código: TREPOPCR
Técnica:
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:
```
Exudado genital (escobillón seco)
-Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO
2ml Sangre total EDTA- REFRIGERAR
Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO
5ml orina-CONGELAR
1ml humor vitreo / acuoso-CONGELAR
1ml LCR-CONGELAR

Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
```
Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
Valores de referencia: Valor de referencia: No se detecta

Descripción: Treponema pallidum DNA PCR Cualitativa
Código: TREPOPCR
Técnica:
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:
```
Exudado genital (escobillón seco)
-Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO
2ml Sangre total EDTA- REFRIGERAR
Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO
5ml orina-CONGELAR
1ml humor vitreo / acuoso-CONGELAR
1ml LCR-CONGELAR

Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
```
Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
Valores de referencia: Valor de referencia: No se detecta

Descripción:	Treponema pallidum DNA PCR Cualitativa
Código:	TREPOPCR
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:	Exudado genital (escobillón seco) -Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO 2ml Sangre total EDTA- REFRIGERAR Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO 5ml orina-CONGELAR 1ml humor vitreo / acuoso-CONGELAR 1ml LCR-CONGELAR Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
	Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta

Descripción:	Treponema pallidum DNA PCR Cualitativa
Código:	TREPOPCR
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:	Exudado genital (escobillón seco) -Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO 2ml Sangre total EDTA- REFRIGERAR Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO 5ml orina-CONGELAR 1ml humor vitreo / acuoso-CONGELAR 1ml LCR-CONGELAR Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
	Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta

Descripción:	Treponema pallidum DNA PCR Cualitativa
Código:	TREPOPCR
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:	Exudado genital (escobillón seco) -Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO 2ml Sangre total EDTA- REFRIGERAR Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO 5ml orina-CONGELAR 1ml humor vitreo / acuoso-CONGELAR 1ml LCR-CONGELAR Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
	Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta

Descripción:	Treponema pallidum DNA PCR Cualitativa
Código:	TREPOPCR
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:	Exudado genital (escobillón seco) -Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO 2ml Sangre total EDTA- REFRIGERAR Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO 5ml orina-CONGELAR 1ml humor vitreo / acuoso-CONGELAR 1ml LCR-CONGELAR Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
	Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta

Descripción:	Treponema pallidum DNA PCR Cualitativa
Código:	TREPOPCR
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:	Exudado genital (escobillón seco) -Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO 2ml Sangre total EDTA- REFRIGERAR Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO 5ml orina-CONGELAR 1ml humor vitreo / acuoso-CONGELAR 1ml LCR-CONGELAR Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
	Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta

Descripción:	Treponema pallidum DNA PCR Cualitativa
Código:	TREPOPCR
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:	Exudado genital (escobillón seco) -Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO 2ml Sangre total EDTA- REFRIGERAR Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO 5ml orina-CONGELAR 1ml humor vitreo / acuoso-CONGELAR 1ml LCR-CONGELAR Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
	Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta

Descripción:	Treponema pallidum DNA PCR Cualitativa
Código:	TREPOPCR
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:	Exudado genital (escobillón seco) -Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO 2ml Sangre total EDTA- REFRIGERAR Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO 5ml orina-CONGELAR 1ml humor vitreo / acuoso-CONGELAR 1ml LCR-CONGELAR Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta

Descripción:	Treponema pallidum DNA PCR Cualitativa
Código:	TREPOPCR
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:	Exudado genital (escobillón seco) -Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO 2ml Sangre total EDTA- REFRIGERAR Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO 5ml orina-CONGELAR 1ml humor vitreo / acuoso-CONGELAR 1ml LCR-CONGELAR Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta

Descripción:	TREPONEMA PALLIDUM IGG IMMUNOBLOT SUERO
Código:	TREPBLOTIG
Técnica:	Inmunoblot
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	TREPONEMA PALLIDUM IGM INMUNOBLOT
Código:	TREPBLOTIM
Técnica:	Inmunoblott.
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero

Descripción: TREPONEMA PALLIDUM IGM INMUNOBLOT
Valores de referencia:

Código: THROMBOINC
Descripción: TRHOMBOINCODE
Técnica: Array
Comentario adicional: 2 tubos de sangre EDTA junto con el consentimiento, todo en un sobre que ponga INCODE

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	THROMBPMF			THROMBOINCODE POLIMORFISMOS		
Prueba	THROMBRIES			THROMBOINCODE RIESGO		

Descripción: TRICHINELLA SPIRALIS AC. IGG SUERO (TRIQUINOSIS)
Código: TRIQUINAAC
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 12 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 ml suero. Alternativo 1 ml de plasma de citrato sódico, y de heparina Litio.
Valores de referencia: (Inf. 0.9) Negativo

Descripción: TRICHOMONA
Código: TRICHOMONA
Técnica: Microscopía óptica
Unidades:
Plazo:
Tubo: Microbiología
Comentario adicional:
Valores de referencia:

Descripción: Trichomonas DNA PCR
Código: TRICOMOPCR
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 7 días
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional: 1ml Orina-REFRIGERAR
Exudado uretral(ESCOBILLON SECO)-REFRIGERAR
Exudado genital(ESCOBILLON SECO)-REFRIGERAR
1ml Lavado seminal-CONGELAR
1ml LCR-CONGELAR
1ml secreción prostática-CONGELAR
1ml semen-CONGELAR
Tejido parafinado-TA
Valores de referencia: Valor de referencia: No se detecta

Descripción: TRICLOROETANOL SANGRE
Código: TRIETANOLL
Técnica: Cromatografía de gases/Captura electrónica

Descripción:	TRICLOROETANOL SANGRE
Unidades:	mg/L
Plazo:	12 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	3 mL sangre total (EDTA) final de la semana laboral. Refrigerar Volumen mínimo 1,00 mL
Valores de referencia:	(Inf. 0.5) VLB (INSST) Exposición a Tricloroetileno, al final de la semana laboral.

Descripción:	TricotioDistr. 4 no fotosensible. Sec Gen: C7ORF11
Código:	GEN_000758
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Tricotiodistrofia. Sec Gen: GTF2H5
Código:	GEN_000759
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	TRIGLICERIDOS
Código:	TRI
Técnica:	
Unidades:	mg/dL
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 150) Tras ayuno de 8 - 10 horas (Inf. 175) Sin ayuno de 8 - 10 horas

Descripción:	Trigonocefalia. Sec Gen: FGFR1
Código:	GEN_000760
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Código:	TRIMETILAM
Descripción:	TRIMETILAMINA Y TRIMETILAMINA N-OXIDO EN ORINA
Técnica:	LC-MS/MS

Código: TRIMETILAM

Comentario adicional: 10 mL orina (1ª micción). CONGELAR INMEDIATAMENTE Y ENVIAR CONGELADA.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	TMA			TRIMETILAMINA (TMA) EN ORINA	mmol/mol crea	(0.33 - 1.94) < 6 meses (0.10 - 0.62) 6 meses - 12 meses (0.08 - 1.51) 1 año - 14 años (0.10 - 0.84) > 14 años
Prueba	TMAO			TRIMETILAMINA N-ÓXIDO	mmol/mol crea	(4.50 - 99.12) < 6 meses (9.50 - 60.50) 6 meses - 12 meses (15.40 - 186.90) 1 año - 14 años (25.27 - 188.90) > 14 años
Prueba	TMA_TMAO			TMA/TMAO EN ORINA		(0.014 - 0.110) < 6 meses (0.006 - 0.050) 6 meses - 12 meses (0.002 - 0.043) 1 año - 14 años (0.002 - 0.020) > 14 años
Prueba	TMAO%			TMAO PORCENTAJE		(89.9 - 99) < 6 meses (97.3 - 99.4) 6 meses - 12 meses (98.4 - 99.8) 1 año - 14 años (97.6 - 99.8) > 14 años

Descripción: Trimetilaminuria: gen FMO3 (NGS)

Código: FMO3

Técnica: NGS Illumina

Unidades:

Plazo: 20 días

Tubo:

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: Triple A, síndrome. Sec Gen: AAAS

Código: GEN_000761

Técnica:

Unidades:

Plazo: 25 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: TRIPSINA SUERO

Código: TRIPSINA

Técnica: Radioinmunoanálisis

Unidades: ng/mL

Plazo: 8 días

Tubo: Suero Congelado

Comentario adicional: 1 mL Suero
Volumen mínimo 0.10 mL

Valores de referencia: (153 - 738)

Descripción:	TRIPTASA EN SUERO
Código:	TRIPTASA
Técnica:	Técnica FEIA
Unidades:	µg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Alt. plasma EDTA Las muestras de sangre deben recogerse lo más cerca posible de la reacción, preferiblemente en el plazo de 4 h del periodo sintomático. Debe extraerse una muestra de sangre adicional al menos 24 horas después de la resolución completa de todos los síntomas clínicos, para confirmar la vuelta a los niveles iniciales. Debe anotarse el tiempo entre la reacción y la recogida de la muestra. Ante la sospecha de niveles basales elevados o
Valores de referencia:	(Inf. 11.40)

Descripción:	TRIPTASA MUESTRA
Código:	TRIPTASAMU
Técnica:	FLUOROINMUNOANÁLISIS (CAP-SYSTEM)
Unidades:	µg/L
Plazo:	6 días
Tubo:	
Comentario adicional:	Antes de realizar la prueba, solicitar información sobre el tipo de muestras que se aceptan.
Valores de referencia:	

Descripción:	TROMB. ESENCIA/MIELOFIBROSIS PRIMARIA · CALR(9) · FRAGMENTOS
Código:	CALR
Técnica:	HRM
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional:	IMPORTANTE: REFRIGERADO SIEMPRE Muestras: Sangre EDTA exclusivo para esta determinación y rotulado con ONCO o Médula ósea
Valores de referencia:	

Descripción:	Trombifilia: gen APOB mutación R3500Q (sec. Sanger)
Código:	R3500Q
Técnica:	PCR y secuenciación
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:	

Descripción:	Trombocitopenia ligada al X. Sec Gen: WAS
Código:	GEN_000762
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción: Trombofilia. Déficit Antitrombina 3. Sec Gen: SERPINC1
Código: GEN_000171
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Trombofilia. Sec Gen: ACE. Polimorfismo I/D
Código: GEN_000393
Técnica:
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Trombofilia. Sec Gen: SERPINA1
Código: GEN_000764
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Trombofilia. Sec Gen: SERPINA1. mutaciones E264V, E342K
Código: GEN_000763
Técnica:
Unidades:
Plazo: 20 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Trombofilia: gen F13B Factor XIII mutación V34L
Código: FXIII_V34L
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente
Valores de referencia:

Descripción: Trombofilia: gen F7 Factor VII (NGS)
Código: FAC7_MUT
Técnica:

Descripción: Trombofilia: gen F7 Factor VII (NGS)
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Trombofilia: gen FGB mutación 455G>A (sec. Sanger)
Código: FGB_455GA
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente
Valores de referencia:

Descripción: Trombofilia: gen PAI1 secuencia 4G/5G en el promotor
Código: PAI1_PROM
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente
Valores de referencia:

Descripción: Trombofilia: gen SERPINC1 mutación p.A384S (sec. Sanger)
Código: AT3_A384S
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente
Valores de referencia:

Descripción: Trombofilia: gen ZPI mutación G1277A
Código: PZI_G1277A
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo de esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia:

Descripción: Trombofilia: mutación C46T gen F12 Factor XII
Código: FACXIIMUT
Técnica: Estudio de genotipado con sondas TaqMan mediante PCR en tiempo real (Real-Time PCR)
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
El tiempo estimado para cada prueba se contará desde el día de entrada de la muestra en el laboratorio central (dias laborables).
Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.
Valores de referencia:

Descripción: Trombofilia: mutación G1691A (R506Q) gen F5 Factor V Leiden
Código: FACV_LEI
Técnica: Estudio de genotipado con sondas TaqMan mediante PCR en tiempo real (Real-Time PCR)
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
El tiempo estimado para cada prueba se contará desde el día de entrada de la muestra en el laboratorio central (dias laborables).
Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.
Valores de referencia:

Descripción: Trombofilia: mutación G20210A gen F2 Factor II
Código: FACIIMUT
Técnica: Estudio de genotipado con sondas TaqMan mediante PCR en tiempo real (Real-Time PCR)
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
El tiempo estimado para cada prueba se contará desde el día de entrada de la muestra en el laboratorio central (dias laborables).
Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.
Valores de referencia:

Descripción: Trombofilia: mutación p.Agr306Thr gen F5 Factor V Cambridge
Código: FACV_CAM
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente
Valores de referencia:

Descripción: Trombofilia: mutación p.Arg306Gly gen F5 Factor V Hong Kong
Código: FACV_HONG
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:

Descripción: Trombofilia: mutación p.Arg306Gly gen F5 Factor V Hong Kong
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente
Valores de referencia:

Descripción: Trombofilia: mutación p.His1299Arg gen F5 Factor V R2
Código: FACV_R2
Técnica: PCR y secuenciación
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente
Valores de referencia:

Descripción: Trombofilia: mutaciones C677T y A1298C gen MTHFR
Código: MTHFRMUT
Técnica: Estudio de genotipado con sondas TaqMan mediante PCR en tiempo real (Real-Time PCR)
Unidades:
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Citrato.
El tiempo estimado para cada prueba se contará desde el día de entrada de la muestra en el laboratorio central (dias laborables).
Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente.
Valores de referencia:

Descripción: Tropheryma whippelii DNA PCR Cualitativa
Código: T.WHIPPLEI
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 8 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional: 1g heces-Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO
10ml orina-Humor vitreo/acuoso-REFRIGERADO

Otros tipo de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envio
Valores de referencia:

Descripción: TROPISMO CXCR4 CCR5 HIV PLASMA
Código: TROPVIH
Técnica: Hibridación molecular (PCR)
Unidades:
Plazo: 32 días
Tubo:
Comentario adicional: 2 mL plasma (EDTA). CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO
Valores de referencia:

Descripción:	TROPONINA I ALTA SENSIBILIDAD ABBOTT
Código:	TROPOIHSA
Técnica:	CMIA
Unidades:	pg/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	300 mcl SUERO
Valores de referencia:	(Inf. 1.9) Baja probabilidad IAM (Inf. 34) Hombre Límite de decisión diagnóstico (p99 población sana) (Inf. 16) Mujer Límite de decisión diagnóstico (p99 población sana)

Descripción:	TROPONINA I EN SUERO
Código:	TROPONINA
Técnica:	Técnica ELFA
Unidades:	mcg/L
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	alternativo plasma Heparina Litio y plasma de EDTA
Valores de referencia:	(Inf. 0.034)

Descripción:	TROPONINA T ALTA SENSIBILIDAD (HS-CTNT), SUERO
Código:	HSTNT
Técnica:	Electroquimioluminiscencia
Unidades:	ng/L
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	Suero congelado
Valores de referencia:	(Inf. 9) Mujer (Inf. 16) Hombre Punto de corte utilizado: percentil 99 de población de referencia separado por sexos

Descripción:	Troyer, Sd. Sec Gen: SPG20
Código:	GEN_000765
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	TRYPANOSOMA BRUCEI AC. IGG
Código:	TRYPABRACG
Técnica:	Inmunofluorescencia indirecta
Unidades:	
Plazo:	13 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	Negativo

Descripción:	TRYPANOSOMA BRUCEI AC. IGM
Código:	TRYPABRACM
Técnica:	INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA
Unidades:	
Plazo:	13 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	Negativo

Descripción:	TRYPANOSOMA BRUCEI GAMBIENSE/ RHODESIENSE PCR
Código:	TRYPBRPCR
Técnica:	PCR
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	Sangre EDTA
Comentario adicional:	5 mL sangre total EDTA
Valores de referencia:	

Descripción:	TRYPANOSOMA BRUCEI GAMBIENSE/ RHODESIENSE PCR
Código:	TRYPBRPCR
Técnica:	PCR
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	Sangre EDTA
Comentario adicional:	5 mL
Valores de referencia:	

Descripción:	TRYPANOSOMA CRUZI (ENFERMEDAD CHAGAS) DNA, SANGRE TOTAL
Código:	TRYPANOPCR
Técnica:	Reacción en Cadena de la Polimerasa
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Sangre EDTA
Comentario adicional:	1 tubo EDTA total. Refrigerar. No remitir muestras heparinizadas, inhiben la polimerasa de la PCR
Valores de referencia:	Valor de referencia indicativo: No se detecta

Descripción:	TRYPANOSOMA CRUZI AC. IGM
Código:	TRYPACIGM
Técnica:	Inmunofluorescencia Indirecta.
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero CON gel separador
Valores de referencia:	Negativo <1/12 Positivo >1/12

Descripción:	TRYPANOSOMA CRUZI ANTICUERPOS
Código:	TRYPANOSOM

Descripción:	TRYPANOSOMA CRUZI ANTICUERPOS
Técnica:	Quimioluminiscencia
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	IgG+ IgM
Valores de referencia:	(Sup. 1.1) Positivo (0.9 - 1.1) Indeterminado (Inf. 0.9) Negativo

Descripción:	TSH
Código:	TSH
Técnica:	
Unidades:	µUI/mL
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(0.35 - 4.94) > 14 años (0.1 - 2.5) Mujer 14 años - 50 años En embarazadas 1º trimestre (0.2 - 3.0) Mujer 14 años - 50 años En embarazadas 2º trimestre (0.3 - 3.0) Mujer 14 años - 50 años En embarazadas 3º trimestre

Descripción:	TSHDS IgM ANTICUERPOS SUERO
Código:	TSHDS
Técnica:	EIA
Unidades:	U/mL
Plazo:	32 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero
Valores de referencia:	(Inf. 9) Negativo

Descripción:	UGT1A1*28 (irinotecan)
Código:	UGT1A1_28
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	10 días
Tubo:	TUBO ONCOGENETICA
Comentario adicional:	Tubo EDTA exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con ONCO.
Valores de referencia:	

Descripción:	Un individuo adicional legal:Pruebas paternidad y parentesco
Código:	PATER2HIJ2
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	10 días
Tubo:	Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:	Lleva KIT especial con cadena de custodia, solictar a asesoría genética, Enviar con las muestras a Alfonso XII Muestra: mucosa bucal con Hisopo sin medio Esta prueba es para 1 individuo adicional tanto para paternidad como parentesco
Valores de referencia:	

Descripción:	Unverricht-Lundborg, enfermedad de. Sec Gen: CSTB
Código:	GEN_000766
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	URANIO EN ORINA
Código:	URANI2
Técnica:	ICP-MS
Unidades:	µg/l
Plazo:	12 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	10 mL orina final de jornada
Valores de referencia:	(Inf. 200) Valor límite biológico (BEI-ACGIH) en orina final de jornada (Inf. 40) Indicativo de exposición anterior (Sup. 100) Indicativo de exposición reciente

Descripción:	UREA ORINA
Código:	UREA2
Técnica:	Espectrofotometría
Unidades:	g/24h
Plazo:	2 días
Tubo:	Orina 24 Horas
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(20 - 40)

Descripción:	UREA.
Código:	UREA
Técnica:	
Unidades:	mg/dL
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(15 - 43) 1 año - 17 años (17 - 51) Hombre > 17 años (13 - 45) Mujer > 17 años

Descripción:	UREAPLASMA sp
Código:	UREAPLAS
Técnica:	Cultivo
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Microbiología
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	UREAPLASMA UREALYTICUM AC. IGG
Código:	UREAPAC
Técnica:	IFI
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. Volumen 1.0 mL Volumen mínimo 0.20 mL
Valores de referencia:	Se consideran niveles significativos a partir de título 1:32

Descripción:	UREAPLASMA UREALYTICUM AC. IGM
Código:	UREAPACM
Técnica:	Inmunofluorescencia indirecta
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. Volumen 1.0 mL Volumen mínimo 0.20 mL
Valores de referencia:	Se consideran niveles significativos a partir de título 1:32

Descripción:	Ureaplasma urealyticum/parvum DNA PCR cualitativa
Código:	UREAPLPCR
Técnica:	Hibridación molecular
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Muestra envios externos
Comentario adicional:	Citología líquida-REFRIGERAR Exudado cervical (escobillón seco)-REFRIGERAR Exudado uretral (escobillón seco)-REFRIGERAR Exudado vaginal (escobillón seco)-REFRIGERAR 4ml Orina (primera micción)-CONGELAR 1ml Lavado seminal-CONGELAR 1ml LCR-CONGELAR 1ml Liquido amniótico-CONGELAR 1ml secreción prostática-CONGELAR
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta

Descripción:	UROBILIGENO EN ORINA
Código:	UROBILIGEN
Técnica:	
Unidades:	mg/dL
Plazo:	3 días
Tubo:	Orina basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	Negativo

Descripción:	UROPORFIRINA ISOMEROS (I-III) ORINA
Código:	UROISOME
Técnica:	Cromatografía líquida de alta resolución

Descripción: UROPORFIRINA ISOMEROS (I-III) ORINA
Unidades: mcg/24h
Plazo: 9 días
Tubo: Orina 24 Horas
Comentario adicional: 10 mL orina 24 h. Indicar volumen 24 h.
Valores de referencia: (Inf. 46) UROPORFIRINA I
(Inf. 46) UROPORFIRINA III

Descripción: Usher tipo 1D / F, digénico. Panel NGS
Código: GEN_000767
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Usher tipo 2C, digénico. Panel NGS
Código: GEN_000768
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Código: USTEKINUM
Descripción: USTEKINUMAB Y ANTICUERPOS EN SUERO PERFIL
Técnica:
Comentario adicional: 1 mL suero. Toma de muestras antes de la administración de la próxima dosis.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	USTEKINUMA	87408-1		USTEKINUMAB EN SUERO	mcg/mL	
Prueba	USTEKINUAC	87409-9		USTEKINUMAB ANTICUERPOS	Indice	(Sup. 1)

Descripción: Van der Woude, Sd. Sec Gen: IRF6
Código: GEN_000769
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: VANADIO EN ORINA
Código: VANADOR
Técnica: ICP-MS

Descripción:	VANADIO EN ORINA
Unidades:	µg/g creatinina
Plazo:	7 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	10 mL orina al final de la semana laboral
Valores de referencia:	(Inf. 50) .Valor límite biológico recomendado por el INSHT al final de la semana laboral tras exposición al pentóxido de vanadio. (Inf. 7) Límite de cuantificación

Descripción:	VANADIO EN SUERO
Código:	VANADIO
Técnica:	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado
Unidades:	µg/l
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	La muestra idónea es contenedor Tubo Suero metales traza. De forma alternativa se puede usar tubo de suero normal. Volumen 1.0 mL Volumen mínimo 0.2 mL
Valores de referencia:	(Inf. 5) .En prótesis e implantes, no existe desgaste. (Inf. 1.2) .Valores de referencia orientativos.

Descripción:	VANCOMICINA
Código:	VANCOMI
Técnica:	Inmunoanálisis
Unidades:	mcg/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(30 - 40) Pico (Sup. 80) Tóxico - Pico (10 - 20) Valle (Sup. 20) Tóxico - Valle (20 - 25) Perfusión continua Las concentraciones terapéuticas se deben individualizar según la situación clínica del paciente.

Descripción:	Variantes c.-13910 C/T y c.-22018 G/A en el gen MCM6
Código:	LACTASAMUT
Técnica:	PCR y secuenciación
Unidades:	
Plazo:	15 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM. Alternativas: Heparina o Citrato. Comentario adicional: Es responsabilidad del médico peticionario recabar el consentimiento informado del paciente
Valores de referencia:	

Descripción:	VARICELA ZOSTER AC. IgG EN L.C.R
Código:	VARICGLC
Técnica:	EIA
Unidades:	Titulo
Plazo:	5 días

Descripción:	VARICELA ZOSTER AC. IgG EN L.C.R
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	LCR. REFRIGERAR.
Valores de referencia:	Título <1/2 Negativo Título > o = 1/2 Positivo

Descripción:	VARICELA ZOSTER AC. IGG SUERO (HERPES ZOSTER)
Código:	VARICEACG
Técnica:	CLIA
Unidades:	mUI/mL
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. Alternativa: plasma (EDTA, citrato y heparina)
Valores de referencia:	(Inf. 150) Negativo (Sup. 150) Positivo

Descripción:	VARICELA ZOSTER AC. IgM EN LCR
Código:	VARICMLC
Técnica:	EIA
Unidades:	Titulo
Plazo:	5 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	Título <1/2 Negativo Título > o =1/2 Positivo

Descripción:	VARICELA ZOSTER AC. IGM SUERO (HERPES ZOSTER)
Código:	VARICEACM
Técnica:	CLIA
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. Alternativa: plasma (EDTA, citrato y heparina)
Valores de referencia:	(Inf. 0.9) Negativo (0.9 - 1.1) Indeterminado (Sup. 1.1) Positivo

Descripción:	VARICELA ZOSTER ANTICUERPOS IGA, SUERO
Código:	VZA
Técnica:	
Unidades:	Titulo
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero refrigerado
Valores de referencia:	Título <1/10 Negativo

Descripción:	Varicela-zoster DNA PCR Cualitativa
Código:	DNAVARIC
Técnica:	PCR
Unidades:	
Plazo:	7 días

Descripción:	Varicela-zoster DNA PCR Cualitativa
Tubo:	Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:	1ml LCR-CONGELAR Exudado genital (escobillón seco)-REFRIGERAR Frotis (escobillón seco)-REFIRGERAR Lesión de piel -REFRIGERAR 1 ml BAL-REFRIGERAR 1ml DNA extraído-CONGELAR 1ml humor vitreo/acuoso-CONGELAR 2ml Sangre total EDTA-REFRIGERAR
Valores de referencia:	

Descripción:	VASOPRESINA (ADH)
Código:	ADH
Técnica:	RIA
Unidades:	pmol/L
Plazo:	10 días
Tubo:	Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional:	Plasma EDTA; Separar plasma y congelar Volumen 2.5 mL plasma EDTA (2 TUBOS EDTA) Volumen mínimo 1.7 mL Paciente:Evitar el estrés el día de la recogida. Se recomienda que el paciente esté en reposo al menos una hora antes de la extracción.
Valores de referencia:	(Inf. 13)

Descripción:	VCAM-1 SOLUBLE (sCD106), SUERO
Código:	VCAM1S
Técnica:	
Unidades:	ng/mL
Plazo:	34 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	Suero congelado
Valores de referencia:	(162 - 492)

Descripción:	VDRL LCR
Código:	VDRLLCR
Técnica:	Aglutinación
Unidades:	
Plazo:	5 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	Volumen 2.0 mL (mínimo 0.1 mL)
Valores de referencia:	Negativo

Descripción:	VELOCIDAD DE SEDIMENTACION A 1 HORA
Código:	V1HORA
Técnica:	Fotometría capilar
Unidades:	mm
Plazo:	3 días
Tubo:	Sangre EDTA
Comentario adicional:	1 mL sangre total EDTA

Descripción: VELOCIDAD DE SEDIMENTACION A 1 HORA

Valores de referencia:
(Inf. 21) Mujer < 50 años
(Inf. 32) Mujer > 50 años
(Inf. 15) Hombre < 50 años
(Inf. 18) Hombre > 50 años

Descripción: VENEREAL RESEARCH LABORATORY (VDRL) SUERO

Código: VDRLTRUE

Técnica: Aglutinación de partículas

Unidades:

Plazo: 5 días

Tubo: Suero Basal

Comentario adicional: 1 mL suero

Valores de referencia: Negativo

Código: VENLAFAXIN

Descripción: VENLAFAXINA SUERO

Técnica: Cromatografía líquida/Tándem masas

Comentario adicional:
0.5 ml Suero refrigerado.

La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis.

Realizar extracción a las 2 horas tras la toma del fármaco.

Alternativa: Plasma de EDTA. Refrigerado.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	VENLAFTOT	62849-5		Perfil Venlafaxina Total	µg/L	(100 - 400)
Prueba	VENLAF1	9630-5		Perfil Venlafaxina	µg/L	<10 µg/L Límite de cuantificación
Prueba	VENLAF2	9628-9		Perfil Desmetilvenlafaxina	µg/L	<10 µg/L Límite de cuantificación
Prueba	VENLAFCOC			Perfil Cociente Orto-Desvenlafaxina/Venlafaxina		(2.7 - 7.7)

Descripción: Ventrículo izquierdo no compactado / LVNC. Panel NGS

Código: GEN_000770

Técnica:

Unidades:

Plazo: 30 días

Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato

Valores de referencia:

Descripción: VIBRIO CHOLERAE EN HECES, PCR

Código: COLERAPCR

Técnica: PCR

Unidades:

Plazo: 9 días

Tubo: heces especiales

Descripción:	VIBRIO CHOLERAE EN HECES, PCR
Comentario adicional:	5 g heces. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO
Valores de referencia:	

Descripción:	VIGABATRINA SUERO
Código:	VIGABATRIN
Técnica:	Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectroscopía de masas
Unidades:	mg/L
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 mL Suero. Congelar. La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis. No utilizar tubos con gel separador.
Valores de referencia:	(2 - 10) Rango Terapéutico (Sup. 20) Toxicidad Límite de cuantificación: 1 mg/L

Descripción:	VIH 1/2 AC. INMUNOBLOT SUERO
Código:	WESTERNAC
Técnica:	INMUNOBLOT
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1mL de suero. Alternativa: plasma de EDTA, citrato o heparina.
Valores de referencia:	

Descripción:	VIH 1+2 AC. Y ANTIGENO P24 LCR
Código:	VIHLCR
Técnica:	CLIA
Unidades:	Indice
Plazo:	7 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 ml LCR (Refrigerado)
Valores de referencia:	(Inf. 1) Negativo

Descripción:	VIH AC. Y ANTÍGENO P24
Código:	VIHAC
Técnica:	Técnica ICMA
Unidades:	
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	(Inf. 0.99) Negativo

Descripción:	VIH1 DNA Proviral PCR Cualitativa
Código:	VIH1DNA
Técnica:	PCR
Unidades:	
Plazo:	6 días

Descripción: VIH1 DNA Proviral PCR Cualitativa
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Alternativas: Heparina o Citrato.
Valores de referencia: NEGATIVO Negativo

Descripción: VIH1 DNA Proviral Semen PCR Cualitativa
Código: VIH1SDNA
Técnica: PCR
Unidades:
Plazo: 10 días
Tubo: Semen
Comentario adicional: Semen fresco y lavado o solo fresco
Hablar con Diagnóstico Molecular antes de hacer el envío. Condiciones especiales.
Las muestras tienen que enviarse congeladas en nieve carbónica.
Valores de referencia: Valor de referencia: No se detecta

Código: VIH1S
Descripción: VIH1 perfil semen RT-PCR Cualitativa
Técnica: RT-PCR
Comentario adicional: Las muestras tienen que enviarse congeladas en nieve carbónica o hielo seco.
Semen y semen lavado o solo semen.
Hablar con Diagnóstico Molecular antes de hacer el envío. Para clínicas de la comunidad de Madrid se puede enviar refrigeradas en petaca.
Muestra de semen congelada. Enviadas de lunes a jueves.

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	VIH1SDNA	77368-9		VIH1 DNA Proviral Semen PCR Cualitativa		Valor de referencia: No se detecta
Prueba	VIH1SRNA	77369-7		VIH1 RNA Semen RT-PCR Cualitativa		Valor de referencia: No se detecta

---

Descripción: VIH-1 RNA RT-PCR Cuantitativa
Código: VIH1CUAN
Técnica: RT--PCR cuantitativa
Unidades: copias/mL
Plazo: 15 días
Tubo: EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional: TUBO DE EDTA. Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con BM.
Valores de referencia: (Inf. 13.2) Límite de detección
(20 - 10000000) Rango de medida

Descripción: VIH1 RNA Semen RT-PCR Cualitativa
Código: VIH1SRNA
Técnica: RT-PCR
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Semen

Descripción:	VIH1 RNA Semen RT-PCR Cualitativa
Comentario adicional:	Semen fresco y lavado o solo fresco Hablar con Diagnóstico Molecular antes de hacer el envío. Condiciones especiales. Las muestras tienen que enviarse congeladas en nieve carbónica.
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta

Descripción:	VIH2 RNA PLASMA
Código:	VIH2RNA
Técnica:	RT-PCR
Unidades:	
Plazo:	17 días
Tubo:	Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional:	2 mL Plasma de EDTA. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO
Valores de referencia:	

Descripción:	VIMENTINA CTRULINADA ANTICUERPOS
Código:	VIMENTINAC
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	
Plazo:	12 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 1.00) Negativo (Sup. 1.00) Positivo

Descripción:	VINCULINA AC SUERO
Código:	VINCULINA
Técnica:	Inmunofluorescencia indirecta
Unidades:	Titulo
Plazo:	17 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero
Valores de referencia:	Se consideran niveles significativos los títulos superiores a 1:80

Descripción:	VIRUS INFLUENZA A+B EN MUESTRA
Código:	INFLUENZAG
Técnica:	Inmunocromatografía
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Muestra envios externos
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	

Descripción:	VIRUS LINFOTROPICO T AC en LCR
Código:	HTLVLCR
Técnica:	Inmunoanalisis
Unidades:	Índice
Plazo:	4 días
Tubo:	Líquidos Biológicos
Comentario adicional:	1 ml LCR

Descripción: VIRUS LINFOTROPICO T AC en LCR
Valores de referencia:
(Inf. 1) Negativo
(Sup. 1) Positivo

Descripción: VIRUS OESTE DEL NILO (WEST NILE VIRUS), PCR
Código: NILOOEPCR
Técnica: Hibridación molecular (PCR)
Unidades:
Plazo: 9 días
Tubo: Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional:
1 mL plasma(EDTA), suero,CONGELADO
LCR (volumen mínimo 0.2 mL)
Valores de referencia:

Descripción: Virus Parotiditis (Paperas) muestra PCR Cualitativa
Código: PAROPCR
Técnica: RT- PCR
Unidades:
Plazo: 6 días
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional: Saliva, Suero, Orina, LCR, Hisopo faríngeo seco con gotas de suero fisiológico...etc.
Valores de referencia:

Descripción: VIRUS PAROTIDITIS (PAPERAS) POR PCR MUESTRA
Código: PAROPCRORI
Técnica: Hibridación molecular con Amplificación (PCR)
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Orina pruebas referencia
Comentario adicional: Saliva, Suero, Orina, LCR, Hisopo faríngeo seco con gotas de suero fisiológico...etc.
Valores de referencia:

Descripción: VIRUS RESP.(Influenza,VRS)+CORONAVIRUS SARSCOV2 RNA
Código: PGCO
Técnica: PCR-Real Time
Unidades:
Plazo: 3 días
Tubo: Muestra envios externos
Comentario adicional:
Exudado faringeo:
Contenedor
Escobillón con medio de transporte para virus
Conservación
Refrigerar
Exudado nasal:
Contenedor
Escobillón con medio de transporte para virus
Valores de referencia:

Descripción: VIRUS RESP.(Influenza,VRS)+CORONAVIRUS SARSCOV2 RNA
Código: PGCO
Técnica: PCR-Real Time
Unidades:

Descripción:	VIRUS RESP.(Influenza,VRS)+CORONAVIRUS SARSCOV2 RNA
Plazo:	3 días
Tubo:	Muestra envios externos
Comentario adicional:	Exudado faringeo: Contenedor Escobillón con medio de transporte para virus Conservación Refrigerar Exudado nasal: Contenedor Escobillón con medio de transporte para virus
Valores de referencia:	

Descripción:	VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL AC. IGG SUERO
Código:	VRSACG
Técnica:	CLIA
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 0.9) Negativo (0.9 - 1.1) Dudoso (Sup. 1.1) Positivo

Descripción:	VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL AC. IGM SUERO
Código:	VRSACM
Técnica:	EIA
Unidades:	
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. Alternativa: Plasma (Citrato, Heparina)
Valores de referencia:	(Inf. 0.8) Negativo (0.8 - 1.1) Indeterminado (Sup. 1.1) Positivo

Descripción:	VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL ANTIGENO EN MUESTRA
Código:	VRSAG
Técnica:	INMUNOCROMATOGRAFÍA
Unidades:	
Plazo:	3 días
Tubo:	Muestra envios externos
Comentario adicional:	Muestra de aspirado NASOFARINGEO.
Valores de referencia:	Negativo

Descripción:	Virus Respiratorio Sincitial(VRS) PCR
Código:	VRSINCPCR
Técnica:	PCR
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	Muestra envios externos

Descripción:	Virus Respiratorio Sincitial(VRS) PCR
Comentario adicional:	Aspirado nasofaríngeo, lavado broncoalveolar, otras muestras.
Valores de referencia:	

Descripción:	Virus Zika, RT-PCR en muestra
Código:	ZIKAVIRUS
Técnica:	Q-PCR
Unidades:	
Plazo:	9 días
Tubo:	Muestra envios externos
Comentario adicional:	5 mL sangre total (EDTA), suero, saliva. También orina, LCR, semen, líquido amniótico.
Valores de referencia:	

Descripción:	VISCOSIDAD EN SUERO
Código:	VISCOSUERO
Técnica:	
Unidades:	relativo al H2O
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	3 mL suero. INDISPENSABLE MUESTRA 3 mL de SUERO.
Valores de referencia:	(1.40 - 1.80)

Descripción:	VISCOSIDAD EN SUERO
Código:	VISCOSUERO
Técnica:	
Unidades:	relativo al H2O
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	3 mL suero. INDISPENSABLE MUESTRA 3 mL de SUERO.
Valores de referencia:	(1.40 - 1.80)

Descripción:	VITAMINA A SUERO (RETINOL)
Código:	VITAA
Técnica:	Cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) acoplada a detector UV
Unidades:	mg/L
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. Alternativamente se puede usar tanto plasma de EDTA como plasma de Heparina.
Valores de referencia:	(0.19 - 0.49) < 12 años (0.26 - 0.75) 12 años - 19 años (0.29 - 0.80) > 19 años

Descripción:	VITAMINA B1 (TIAMINA) SANGRE TOTAL EDTA
Código:	VITAB1
Técnica:	HPLC/Fluorimetría
Unidades:	µg/dL
Plazo:	8 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia

Descripción:	VITAMINA B1 (TIAMINA) SANGRE TOTAL EDTA
Comentario adicional:	Sangre total EDTA. Refrigerar. Muestra protegida de la luz Volumen:1.0 mL Volumen mínimo: 0.5 mL
Valores de referencia:	(3.60 - 9.70)

Descripción:	VITAMINA B12
Código:	VITAB12
Técnica:	
Unidades:	pg/mL
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(187 - 883)

Descripción:	VITAMINA B2 EN SANGRE TOTAL (EDTA)
Código:	VITAB2
Técnica:	HPLC
Unidades:	µg/L
Plazo:	8 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	2 ml de sangre total EDTA.(Volumen mínimo 1 mL) Proteger de la luz
Valores de referencia:	(137 - 370)

Descripción:	Vitamina B3 (Nicotinamida) en suero
Código:	VITAMINAB3
Técnica:	LC-MS/MS
Unidades:	µg/L
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	3 mL Suero. Congelar y enviar congelado. Muestra protegida de la luz
Valores de referencia:	(10 - 65)

Descripción:	Vitamina B5 (Acido Pantoténico) en suero
Código:	PANTOTENIC
Técnica:	Cromatografía Líquida/Tándem Masas
Unidades:	µg/L
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	2mL Suero refrigerado Proteger de la luz. Volumen mínimo: 0.5mL
Valores de referencia:	(23 - 125)

Descripción:	VITAMINA B6 (PIRIDOXAL FOSFATO)
Código:	VITAB6
Técnica:	Cromatografía líquida de alta eficacia/Fluorimetria

Descripción:	VITAMINA B6 (PIRIDOXAL FOSFATO)
Unidades:	µg/L
Plazo:	7 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	EDTA TOTAL. Proteger de la luz Volumen mínimo: 0.50 mL
Valores de referencia:	(16 - 64)

Descripción:	VITAMINA C PLASMA HEPARINA (ACIDO ASCORBICO)
Código:	VITAC
Técnica:	Cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) acoplada a detector UV
Unidades:	mg/L
Plazo:	5 días
Tubo:	Sang T. Heparina Congelada
Comentario adicional:	Plasma de heparina Litio. Debe ser centrifugado antes de 2 horas después de la extracción (antes de 30 minutos preferiblemente). Proteger muestra de la luz.Una vez centrifugado, separar plasma y congelar inmediatamente. Enviar muestra congelada. NO VALEN MUESTRAS DE PLASMA EDTA
Valores de referencia:	(4 - 15)

Descripción:	VITAMINA D 1,25 DIHIDROXI SUERO
Código:	VITD1.25
Técnica:	RIA
Unidades:	pg/mL
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 mL suero CONGELADO Alternativa: Plasma de EDTA, plasma de heparina Volumen mínimo:0.50 mL
Valores de referencia:	(18 - 108)

Descripción:	VITAMINA D 25 HIDROXI SUERO
Código:	VITAD25
Técnica:	Técnica CMIA
Unidades:	ng/mL
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(30 - 100) Suficiencia Los niveles varían según la dieta y son sensibles a las estaciones anuales debido a la distinta exposición a la luz solar.

Descripción:	VITAMINA E SUERO (ALFA-TOCOFEROL)
Código:	VITAE
Técnica:	Cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) acoplada a detector UV
Unidades:	µg/mL
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. Alternativamente se puede usar tanto plasma de EDTA como plasma de Heparina.

Descripción:	VITAMINA E SUERO (ALFA-TOCOFEROL)
Valores de referencia:	(5.5 - 18.0) > 19 años (3.0 - 9.0) < 12 años (6.0 - 14.2) 12 años - 19 años

Descripción:	Vitamina K1 en suero
Código:	VITAK1
Técnica:	Cromatografía Líquida Alta Resolución / Fluorimetría.
Unidades:	µg/L
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	3 mL suero. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO Volumen: 1.5 mL Volumen mínimo:1,00 mL Proteger de la luz
Valores de referencia:	(0.1 - 1.6)

Descripción:	VITAMINA K2 EN SUERO
Código:	VITAK2
Técnica:	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)
Unidades:	µg/L
Plazo:	12 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1.5 ml de Suero CONGELAADO Conservación: Congelar
Valores de referencia:	(0.10 - 0.82)

Descripción:	Vitreorretinopatía de Wagner. Sec Gen: VCAN
Código:	GEN_000771
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	25 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	Vitroretinopatía exudativa familiar. Panel NGS
Código:	GEN_000772
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	30 días
Tubo:	EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional:	Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:	

Descripción:	VLDL-COLESTEROL
Código:	VLDL
Técnica:	Fórmula
Unidades:	mg/dL
Plazo:	2 días
Tubo:	Suero Basal

Descripción: VLDL-COLESTEROL
Comentario adicional: .
Valores de referencia: (Inf. 40)

Descripción: VORICONAZOL
Código: VORICONAZO
Técnica: Cromatografia liquida/Tandem masas (LC-MS/MS)
Unidades: mcg/mL
Plazo: 8 días
Tubo: Suero Congelado
Comentario adicional: 2 ml de suero congelado
Valores de referencia: (Sup. 0.5) Profilaxis antimicótica
(Sup. 2.0) Terapia antimicótica
(Sup. 6.0) Toxicidad

Descripción: VORTIOXETINA
Código: VORTIOXETI
Técnica: LC-MS/MS
Unidades: ng/mL
Plazo: 9 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional:
Valores de referencia: (5.4 - 7.4) Dosis 5 mg/dia
(13.0 - 25.0) Dosis 20 mg/dia

Código: VSG
Descripción: VSG SANGRE (VELOCIDAD DE SEDIM
Técnica:
Comentario adicional:

Componentes						
Tipo	Código	Loinc	Muestra	Descripción	Unidades	V. ref.
Prueba	V1HORA	30341-2		VELOCIDAD DE SEDIMENTACION A 1 HORA	mm	(Inf. 21) Mujer < 50 años (Inf. 32) Mujer > 50 años (Inf. 15) Hombre < 50 años (Inf. 18) Hombre > 50 años
Prueba	V2HORA	18184-2		VELOCIDAD DE SEDIMENTACION A 2 HORAS	mm	(Inf. 50) Mujer < 50 años (Inf. 76) Mujer > 50 años (Inf. 36) Hombre < 50 años (Inf. 43) Hombre > 50 años
Prueba	KATZ	30341-2		INDICE DE KATZ	Índice	

Descripción: Waardenburg y albinismo digénico. Panel NGS
Código: GEN_000773
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Wagner, Sd. Sec Gen: VCAN
Código: GEN_000774
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Walker-Warburg, Sd. Sec Gen: POMT1
Código: GEN_000775
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Warburg Micro, Sd. Panel NGS
Código: GEN_000712
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Weill-Marchesani, Sd. Panel NGS
Código: GEN_000776
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: WELLNESS CHECK- test envejecimiento saludable
Código: NHBA
Técnica: RT-PCR
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Muestra Biología Molecular
Comentario adicional:
```
Raspado Bucal.
SE NECESITA kIT ESPECIFICO.
Enviar a temperatura ambiente.

Sangre total EDTA.
```
Valores de referencia:

Descripción: Werner, Sd. Sec Gen: WRN
Código: GEN_000777

Descripción: Werner, Sd. Sec Gen: WRN
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: West, Sd. Panel NGS
Código: GEN_000713
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Wolcott-Rallison (WRS), Sd. Sec Gen: EIF2AK3
Código: GEN_000778
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Wolff-Parkinson-White (WPW), Sd. Sec Gen: PRKAG2
Código: GEN_000779
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Wolfram tipo 2, Sd. Sec Gen: CISD2
Código: GEN_000780
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Wolfram, Sd. Panel NGS
Código: GEN_000781
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular

Descripción: Wolfram, Sd. Panel NGS
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Wolfram, Sd. Sec Gen: WFS1
Código: GEN_000782
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: WUCHERERIA BANCROFTI ANTIGENO SUERO
Código: WUCHEAG
Técnica: EIA
Unidades:
Plazo: 17 días
Tubo: Suero Basal
Comentario adicional: 1 mL.
Valores de referencia: (Inf. 1) Negativo
(Sup. 1) Positivo

Descripción: Xantomatosis cerebrotendinosa. Sec Gen: CYP27A1
Código: GEN_000783
Técnica:
Unidades:
Plazo: 25 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: Xeroderma pigmentoso. Panel NGS
Código: GEN_000784
Técnica:
Unidades:
Plazo: 30 días
Tubo: EDTA Bilogía Molecular
Comentario adicional: Tubo exclusivo para esta determinación: tubo primario sin abrir, sin pasar por ningún aparato, y rotulado con las siglas BM. Alternativas: Citrato
Valores de referencia:

Descripción: XILOSA ORINA
Código: XILO2
Técnica: Espectrofotometría
Unidades: g
Plazo: 5 días
Tubo: Orina pruebas referencia

Descripción:	XILOSA ORINA
Comentario adicional:	Estímulo: 0.5 g de XILOSA/kg de peso (máximo 25 g) en solución acuosa al 10% Muestras a obtener: Vaciar la vejiga antes de la ingesta de la D-Xilosa Adultos: Recoger todas las orinas emitidas durante las cinco horas siguientes a la ingestión de la D-Xilosa. Extraer muestra de sangre a las 2 horas tras la ingesta. Niños: Extraer muestra de sangre después de 1 hora tras ingesta. Si el médico lo solicita, se recogerán las orinas emitidas durante las cinco horas siguientes tras la ingesta.
Valores de referencia:	(5 - 8) (20 -32% de dosis ingerida)

Descripción:	XILOSA SUERO
Código:	XILO
Técnica:	Espectrofotometría
Unidades:	mg/dL
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Sup. 25) 1-2 h tras toma

Descripción:	YERSINIA DNA PCR MUESTRA BIOLOGICA
Código:	YERSENPCR
Técnica:	Hibridación Molecular con Ampliación (PCR)
Unidades:	
Plazo:	6 días
Tubo:	Muestra envios externos
Comentario adicional:	Heces, Refrigerar. Sangre total edta, refrigerar
Valores de referencia:	Valor de referencia: No se detecta Se incluye la detección de Yersinia enterocolítica, Yersinia pestis y Yersinia pseudotuberculosis.

Descripción:	YERSINIA ENTEROCOLITICA ANTICUERPOS IgM, SUERO
Código:	YERENM
Técnica:	EIA
Unidades:	U/mL
Plazo:	11 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Suero. refrigerado.
Valores de referencia:	(Inf. 24) Negativo

Descripción:	YERSINIA SP. AC.IGG SUERO
Código:	YERSIAC
Técnica:	ELISA
Unidades:	U/mL
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero o plasma (EDTA, citrato, heparina.
Valores de referencia:	(Inf. 10) Negativo (10 - 15) Indeterminado

Descripción:	YODO CONCENTRACION EN ORINA
Código:	IODO_MG
Técnica:	ICP-MS
Unidades:	µg/L

Descripción:	YODO CONCENTRACION EN ORINA
Plazo:	7 días
Tubo:	Orina pruebas referencia
Comentario adicional:	2mL de Orina reciente.Refrigerar.
Valores de referencia:	(Inf. 20) Déficit grave de yodo (20 - 50) Déficit moderado de yodo (50 - 100) Déficit leve de yodo (100 - 200) Ingesta suficiente de yodo (200 - 300) Posible riesgo de ingesta de yodo superior a la necesaria (Sup. 300) Riesgo de problemas de salud por exceso

Descripción:	YODO EN ORINA 24H
Código:	IODO
Técnica:	Espectrometría de masas-Plasma acoplado inductivamentee (ICP-MS)
Unidades:	µg/24h
Plazo:	7 días
Tubo:	Orina 24 Horas
Comentario adicional:	Orina 24h. (alícuota) Volumen: 2mL Volumen mínimo 0.8 mL Indicar diuresis
Valores de referencia:	(100 - 199) Ingesta suficiente de yodo

Descripción:	YODUROS SUERO
Código:	YODURO
Técnica:	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)
Unidades:	µg/L
Plazo:	7 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	Contenedor: Tubo suero con separador. Conservación: Refrigerar Volumen: 2.0 mL Volumen mínimo: 0.50 mL
Valores de referencia:	(40 - 80)

Descripción:	ZIKA AC. IGG
Código:	ZIKAIGG
Técnica:	CLIA
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 0.9) Negativo (0.9 - 1.1) Indeterminado

Descripción:	ZIKA AC. IGM
Código:	ZIKAIGM
Técnica:	CLIA
Unidades:	
Plazo:	4 días
Tubo:	Suero Basal

Descripción:	ZIKA AC. IGM
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 0.9) Negativo (0.9 - 1.1) Indeterminado (Sup. 1.1) Positivo

Descripción:	ZINC EN ORINA AISLADA
Código:	ZN2MG
Técnica:	ICP-MS
Unidades:	ug/g creatinina
Plazo:	7 días
Tubo:	Orina Final de Jornada
Comentario adicional:	OFJ en caso de exposición laboral. Orina aislada. No recoger muestras de orina en un ambiente en el que sea más probable que ocurra la exposición. Es importante evitar que el polvo de la ropa pueda interferir en el contenido de la muestra. No recoger la orina en recipientes con base de metal, como urinarios o sartenes de metal. Recoger la orina en tubos de polipropileno incoloro libre de metales sin tapones de colores. Cuando esto no sea posible, usar para la recogida de orina un envas
Valores de referencia:	(89 - 910) .Valores de referencia orientativos.

Descripción:	ZINC ERITROCITARIO SANGRE
Código:	ZNW
Técnica:	Técnica Espectrometría Absorción Atómica / Llama
Unidades:	mg/l
Plazo:	7 días
Tubo:	EDTA sangre total Referencia
Comentario adicional:	Sangre total EDTA Dipotásico (libre trazas metales) Muestra alternativa: Heparina sódica Momento de toma de muestra no es crítico
Valores de referencia:	(7.80 - 16.30) .Valores de referencia orientativos.

Descripción:	ZINC ORINA DE 24 HORAS
Código:	ZN2
Técnica:	ICP-MS
Unidades:	µg/24h
Plazo:	6 días
Tubo:	Orina 24 Horas
Comentario adicional:	5 mL orina 24 horas. Indicar diuresis en el tubo/bote que se envíe 24 h. Evitar el contacto de la muestra con tapones de goma.REFRIGERAR. Son válidas las orinas acidificadas.
Valores de referencia:	(150 - 1000) Normal (Inf. 30) Límite de cuantificación

Descripción:	ZINC SEMEN
Código:	ZNSEMEN
Técnica:	ESPECTROFOTOMETRÍA
Unidades:	mg/L
Plazo:	7 días
Tubo:	Semen
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(50 - 500)

Descripción:	ZINC SUERO
Código:	ZN

Descripción:	ZINC SUERO
Técnica:	Espectrofotometría
Unidades:	µg/dL
Plazo:	5 días
Tubo:	Suero tubo especial Zinc
Comentario adicional:	1 mL suero en tubo libre de metales (tapón azul) Realizar extracción en tubo libre de metales (tapón azul), pudiéndose utilizar el sistema vacutainer. Es necesario esperar a retracción del coágulo, centrifugar y trasvasar el suero con pipeta de plástico desechable a un tubo de alícuota. Marcar el tu Antes de realizar una extracción solicitar los tubos especiales y el protocolo a seguir.
Valores de referencia:	(60 - 125)

Descripción:	ZIRCONIO EN PLASMA (CIRCONIO)
Código:	ZIRCONIO
Técnica:	Espectrometría de Masas-Plasma acoplado inductivamente
Unidades:	ng/L
Plazo:	9 días
Tubo:	Plasma EDTA Congelado
Comentario adicional:	
Valores de referencia:	(Inf. 275) Valores de referencia orientativos: Población normal sin prótesis de Zr

Descripción:	ZO ANTICUERPOS (FENILALANIL-TRNA SINTETASA) EN SUERO
Código:	ZOAC
Técnica:	
Unidades:	
Plazo:	11 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	SUERO
Valores de referencia:	

Descripción:	ZOLPIDEM SUERO
Código:	ZOLPIDEM
Técnica:	
Unidades:	µg/L
Plazo:	8 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	0.5 ml suero SIN gel separador Volumen mínimo: 0.10 mL No utilizar tubos con gel separador.
Valores de referencia:	(80 - 160) Intervalo terapéutico (Inf. 12) Límite de cuantificación (Sup. 320) Toxicidad

Descripción:	ZONISAMIDA
Código:	ZONISA
Técnica:	CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA/TÁNDEM MASAS (LC-MS/MS)
Unidades:	mg/L
Plazo:	9 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	2 ml de suero.

Descripción:	ZONISAMIDA
Valores de referencia:	(10.0 - 40)

Descripción:	ZONULINA EN HECES
Código:	ZONULINA
Técnica:	EIA
Unidades:	ng/mL
Plazo:	12 días
Tubo:	Heces No Microbiología
Comentario adicional:	Heces recogidas en bote estéril. La cantidad necesaria es quivalente a "tres nueces". La estabilidad de la muestra refrigerada o a temperatura ambiente es de 4 días. Para periodos más largos, congelar la muestra.
Valores de referencia:	(Inf. 107)

Descripción:	ZONULINA EN SUERO
Código:	ZONUSUERO
Técnica:	Enzimoinmunoanálisis
Unidades:	ng/mL
Plazo:	32 días
Tubo:	Suero Congelado
Comentario adicional:	1 ml suero. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.
Valores de referencia:	(20 - 48)

Descripción:	ZOPICLONA SUERO
Código:	ZOPICLONA
Técnica:	Cromatografía líquida/Tándem masas (LC-MS/MS)
Unidades:	ng/mL
Plazo:	6 días
Tubo:	Suero Basal
Comentario adicional:	1 mL suero. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO. Toma de muestra 1,5 - 2 horas después de la administración del medicamento.
Valores de referencia:	(10 - 70) Valores terapéuticos recomendados

CATÁLOGO DE PRUEBAS
EUROFINS SNB

Edición: 29/10/2026

Catálogo actualizado mensualmente.

Consulte siempre la versión más reciente



www.eurofins.es



Pruebas

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
C604 **IgE ESPECÍFICA Persulfato de Amonio (C604) Medicamentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	10	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 kU/L
LTHN **LINFOCITOS T HELPER/ NAÏVE, SANGRE TOTAL**	Citometría de flujo.	7	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA)	Linfocitos T4 helper (CD4+CD29+): 20,00 - 34,00 % Linfocitos T4 vírgenes Coexpresión CD4 CD45RA MADRID: 10,00 - 30,00 % Linfocitos T4 naïve (CD4+CD45RA+): 31,00 - 533,00 /µL Linfocitos T memoria: Coexpresión CD4 CD45RO MADRID: 12,00 - 40,00 %
PTHRP **PARATHORMONA RP (PTH RP -RELATED PEPTIDE), PLASMA**	Enzimoinmunoanálisis Múltiple.	11	Rec. 0.5 mL Plasma EDTA Aprotinina (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Rec. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.]	Inf 2,50 pmol/L
G03188 **DEFICIENCIA CREATININA CEREBRAL 2 · GAMT · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GAMT *1*
G11286 **LIPOFUSCINOSIS NEURONAL CEROIDEA · PANEL · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	
CHDO **1,2 CICLOHEXANODIOL, ORINA**	Cromatografía de Gases / Ionización de Llama.	9	Rec. 10 mL Orina final jornada [Cong.]	1,2 Ciclohexanodiol en orina: Personal expuesto (Ciclohexano) Inf 150,00 mg/g crea 1,2 ciclohexanodiol en orina (concentración): Personal expuesto (Ciclohexanona) Inf 80,00 mg/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
DOCA **11 DESOXI CORTICOSTERONA, SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	9	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.]	Hombres 0 - 1 Años 0,06 - 0,47 ng/mL Mujeres 0 - 1 Años 0,05 - 0,47 ng/mL Mujeres 1 - 7 Años 0,06 - 0,56 ng/mL Hombres 1 - 7 Años 0,06 - 0,35 ng/mL Hombres 7 - 13 Años 0,06 - 0,60 ng/mL Mujeres 7 - 13 Años 0,06 - 0,51 ng/mL Hombres 13 - 16 Años 0,06 - 0,60 ng/mL Mujeres 13 - 16 Años 0,06 - 0,32 ng/mL Mujeres 16 - 18 Años 0,06 - 0,54 ng/mL Hombres 16 - 18 Años 0,06 - 0,75 ng/mL Hombres Sup - 18 Años Inf 0,18 ng/mL Mujeres Sup - 18 Años Inf 0,16 ng/mL
11D15 **11-DESOXICORTISOL (15'), SUERO**	Radioinmunoanálisis.	5	Rec. 1 mL Suero 15 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
11D30 **11-DESOXICORTISOL (30'), SUERO**	Radioinmunoanálisis.	6	Rec. 1 mL Suero 30 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
11D45 **11-DESOXICORTISOL (45'), SUERO**	Radioinmunoanálisis.	5	Rec. 1 mL Suero 45 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
11D60 **11-DESOXICORTISOL (60'), SUERO**	Radioinmunoanálisis.	6	Rec. 1 mL Suero 60 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
11D90 **11-DESOXICORTISOL (90'), SUERO**	Radioinmunoanálisis.	5	Rec. 1 mL Suero 90 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
11D120 **11-DESOXICORTISOL (120'), SUERO**	Radioinmunoanálisis.	5	Rec. 1 mL Suero 120 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
DESOX **11-DESOXICORTISOL, SUERO**	Radioinmunoanálisis.	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	(Metopirona) Sup 69,30 ng/mL Sin estímulo 0,43 - 7,56 ng/mL
OHPG15 **17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA (15'), SUERO**	Radioinmunoanálisis.	3	Rec. 1 mL Suero 15 m. [Refr.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
OHPG-15 **17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA (-15'), SUERO**	Radioinmunoanálisis.	5	Rec. 1 mL Suero 15 m. [Refr.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
OHPGB30 **17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA (30'), SUERO**	Radioinmunoanálisis.	2	Rec. 1 mL Suero 30 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
OHPG45 **17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA (45'), SUERO**	Radioinmunoanálisis.	3	Rec. 1 mL Suero 45 m. [Refr.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
OHPGB60 **17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA (60'), SUERO**	Radioinmunoanálisis.	2	Rec. 1 mL Suero 60 m. [Refr.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
OHPG90 **17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA (90'), SUERO**	Radioinmunoanálisis.	3	Rec. 1 mL Suero 90 m. [Refr.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
OHPG120 **17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA (120'), SUERO**	Radioinmunoanálisis.	3	Rec. 1 mL Suero 120 m. [Refr.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
OHPG180 **17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA (180'), SUERO**	Radioinmunoanálisis.	3	Rec. 1 mL Suero 180 m. [Refr.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
OHPG24H **17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA (24h), SUERO**	Radioinmunoanálisis.	3	Rec. 1 mL Suero 24 h [Refr.]	ng/mL Interpretación según criterio clínico
OHPGL **17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA LACTANTES, SUERO**	Radioinmunoanálisis.	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Ambos 0 - 2 Meses 0,12 - 3,80 ng/mL Ambos 2 - 6 Meses 0,10 - 2,80 ng/mL Ambos 6 - 12 Meses 0,10 - 0,73 ng/mL
OHPGB **17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA, SUERO**	Radioinmunoanálisis.	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Hombres 0,59 - 3,44 ng/mL Fase Folicular Mujeres 0,11 - 1,08 ng/mL Fase Luteal Mujeres 0,95 - 5,00 ng/mL Gestación 1º trimestre Mujeres 2,50 - 9,78 ng/mL Gestación 2º trimestre Mujeres 3,40 - 8,50 ng/mL Gestación 3º trimestre Mujeres 4,53 - 18,86 ng/mL Tanner II-III 0,64 - 1,70 ng/mL Tanner IV-V Hombres 1,20 - 3,40 ng/mL Tanner IV-V Mujeres 0,67 - 2,00 ng/mL Tanner I Ambos 1 - 5 Años 0,25 - 0,60 ng/mL Tanner I Ambos 5 - 8 Años 0,33 - 1,20 ng/mL Tanner I Ambos Sup - 8 Años 0,55 - 1,60 ng/mL
BE180 **17 BETA ESTRADIOL (180'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 180 m. [Refr.]	pg/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
BE20 **17 BETA ESTRADIOL (20'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 20 m. [Refr.]	pg/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
BE30 **17 BETA ESTRADIOL (30'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 30 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	pg/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
BE60 **17 BETA ESTRADIOL (60'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 60 m. [Refr.]	pg/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
BE90 **17 BETA ESTRADIOL (90'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 90 m. [Refr.]	pg/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
BE2US **17 BETA ESTRADIOL ULTRASENSIBLE, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	7	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 1 mL Plasma Heparina litio (1 x Tubo sangre heparina litio) [Refr.] Alt. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 1 mL Plasma Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) [Refr.] Rechazo: Muestra Hemolizada Rechazo: Muestra ictérica Rechazo: Muestra lipémica.	Hombres Inf 119,50 pg/mL Embarazadas (Segundo trimestre) Mujeres 1112,00 - 22997,00 pg/mL Embarazadas (Tercer trimestre) Mujeres 3551,00 - 25039,00 pg/mL Fase Folicular Mujeres Inf 235,60 pg/mL Fase Luteal Mujeres 44,60 - 282,30 pg/mL Fase Ovulatoria Mujeres 27,90 - 239,30 pg/mL Postmenopausia Mujeres 14,40 - 126,30 pg/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
E2SA **17 BETA ESTRADIOL, SALIVA**	Enzimoinmunoanálisis	10	Rec. 1 mL Saliva (1 x Tubo sin aditivos) [Cong.] No usar Salivetes Rechazo: Muestras contaminadas con sangre. Durante los 30 minutos antes de obtener la muestra de saliva no ingiera alimentos, no beba, no fume ni mastique chicle.	Hombres 2,10 - 4,10 pg/mL Fase Folicular Mujeres 3,10 - 6,40 pg/mL Fase Luteal Mujeres 3,60 - 7,50 pg/mL Mitad del ciclo Mujeres 4,90 - 11,90 pg/mL Postmenopausia 3,00 - 7,50 pg/mL
BE2 **17 BETA ESTRADIOL, SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 1 mL Plasma Heparina litio (1 x Tubo sangre heparina litio) [Refr.]	Fase Folicular Mujeres Inf 251,00 pg/mL Fase Luteal Mujeres Inf 312,00 pg/mL Fase Ovulatoria Mujeres 38,00 - 649,00 pg/mL Postmenop. con THS Mujeres Inf 144,00 pg/mL Postmenop. sin THS Mujeres Inf 28,00 pg/mL Ambos 1 - 12 Años Inf 30,00 pg/mL Hombres 12 - 17 Años 5,00 - 45,00 pg/mL Mujeres 12 - 17 Años 24,00 - 410,00 pg/mL Hombres Sup - 18 Años Inf 44,00 pg/mL
17KT **17 CETOSTEROIDES TOTALES, ORINA**	Cromatografía de Intercambio Iónico / Espectrometría.	5	Rec. 1 mL Orina 24h. (alícuota) [Refr.] Para su conservación se debe acidificar con HCl concentrado hasta pH =3 - 6. Volumen indispensable.	Excreción (24h): Hombres 10,00 - 25,00 mg/24h Excreción (24h): Mujeres 6,00 - 14,00 mg/24h Volumen de orina remitido (diuresis): 600,00 - 1600,00 mL
17OT **17 HIDROXICORTICOSTEROIDES TOTALES, ORINA**	Cromatografía de Intercambio Iónico / Espectrometría.	4	Rec. 5 mL Orina 24h. (alícuota) [Refr.] Para su conservación se debe acidificar con HCl concentrado hasta pH =3 - 6.	Excreción (24h): Hombres 3,00 - 10,00 mg/24h Excreción (24h): Mujeres 2,00 - 8,00 mg/24h Volumen de orina remitido (diuresis): 600,00 - 1600,00 mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
PREN60 **17 HIDROXIPREGNENOLONA (60'), SUERO**	Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectrometría de masas.	12	Rec. 1 mL Suero 60 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Muestra de suero congelada en tubo individual (500 µL)	En pruebas de estimulación con ACTH sintética, concentraciones elevadas de 17-OH Pregnenolona a los 60 min post administración pueden ser indicativas de déficit de la enzima 3 Beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa.	
PREN30 **17 HIDROXIPREGNENOLONA (30`), SUERO**	Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectrometría de masas.	12	Rec. 1 mL Suero 30 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Muestra de suero congelada en tubo individual (500 µL)	En pruebas de estimulación con ACTH sintética, concentraciones elevadas de 17-OH Pregnenolona a los 60 min post administración pueden ser indicativas de déficit de la enzima 3 Beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa.	
PREN **17 HIDROXIPREGNENOLONA, SUERO**	Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectrometría de masas.	12	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	Hombres 1 - 5 Meses 2,29 - 31,04 ng/mL Mujeres 1 - 5 Meses 2,29 - 31,04 ng/mL Hombres 6 - 12 Meses 2,21 - 19,81 ng/mL Mujeres 6 - 12 Meses 2,21 - 19,81 ng/mL Hombres 0,55 - 4,55 ng/mL Mujeres 0,31 - 4,55 ng/mL Mujeres 1 - 2 Años 0,35 - 7,12 ng/mL Hombres 1 - 2 Años 0,35 - 7,12 ng/mL Hombres 3 - 6 Años Inf 2,77 ng/mL Mujeres 3 - 6 Años Inf 2,77 ng/mL Hombres 7 - 9 Años Inf 1,88 ng/mL Mujeres 7 - 9 Años Inf 2,13 ng/mL Hombres 10 - 12 Años Inf 3,93 ng/mL Mujeres 10 - 12 Años Inf 3,99 ng/mL Mujeres 13 - 15 Años Inf 4,08 ng/mL Hombres 13 - 15 Años 0,35 - 4,65 ng/mL Hombres 16 - 17 Años 0,32 - 4,78 ng/mL Mujeres 16 - 17 Años Inf 4,24 ng/mL	
G03001 **17,20-LIASA AISLADA, DEFICIENCIA DE · CYP17A1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CYP17A1	*1*
G03002 **17-ALFA-HIDROXILASA / 17,20-LIASA, DEFICIENCIA DE · CYP17A1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CYP17A1	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
18OHC30 **18 HIDROXICORTICOSTERONA (30'), SUERO**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	32	Rec. 3 mL Suero 30 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	ng/dL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
18OHC60 **18 HIDROXICORTICOSTERONA (60'), SUERO**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	32	Rec. 3 mL Suero 60 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	ng/dL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
18OHC **18 HIDROXICORTICOSTERONA, SUERO**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	32	Rec. 3 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	Niños Ambos 1 - 12 Meses 5,00 - 220,00 ng/dL Adulto en reposo 12,00 - 55,00 ng/dL Adulto tras ACTH Inf 250,00 ng/dL Adulto tras ejercicio 23,00 - 145,00 ng/dL Prematuros Inf 670,00 ng/dL Recién Nacidos Inf 550,00 ng/dL Niños Ambos 1 - 2 Años 18,00 - 155,00 ng/dL Niños Ambos 2 - 15 Años 6,00 - 85,00 ng/dL
PIREC **1-HIDROXIPIRENO, ORINA**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	7	Rec. 3 mL Orina final jornada [Refr.]	BEIs® (ACGIH®): Final de la jornada laboral (Hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAHs)) Inf 2,5 µg/L
HEXA **2,5 HEXANODIONA TOTAL, ORINA**	Cromatografía de Gases / Espectrometría Masas.	11	Rec. 5 mL Orina final jornada (1 x Tubo 10 mL.) [Refr.] - Recogida de muestra de orina al final de la jornada laboral y mejor a finales de la semana laboral. CONDICIONES PRE-ANALÍTICAS: Sin hidrólisis ácida.	VLB®-INSST: Final de la semana laboral (Metil-n-butilcetona) Inf 0,2 mg/L VLB®-INSST: Final de la semana laboral (n-Hexano) Inf 0,2 mg/L Límite de cuantificación: 0,05 mg/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
21DEOX **21 DESOXICORTISOL, SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	9	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.] Ritmo circadiano: Este parámetro biológico tiene un ritmo circadiano (concentración máxima en la mañana), con una amplitud suficientemente significativas como para tener una influencia significativa en la interpretación clínica	Niños Ambos 0 - 18 Años 0,03 - 0,10 ug/L Hombres Sup - 18 Años Inf 0,16 ug/L Mujeres Sup - 18 Años Inf 0,08 ug/L
A21OH **21-HIDROXILASA ANTICUERPOS, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	15	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Separar y congelar inmediatamente. No congelar y descongelar la muestra en repetidas ocasiones. Rechazo: Muestra Hemolizada Rechazo: Muestra lipémica.	Negativo: Inf 0,40 U/mL
2HMS **2-HIDROXI-N-METILSUCCINIMIDA**	Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectrometría de masas.	15	Rec. 10 mL Orina [Refr.]	Inf 20,00 mg/g creat
2MTA **2-METOXIACETATO EN ORINA**	Cromatografía de Gases / Ionización de Llama.	10	Rec. 4 mL Orina final jornada (1 x Envase aséptico) [Refr.]	2-Metoxiacetato en orina: Inf 8,00 mg/g creat

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
3MTO **3-METOXITIRAMINA, ORINA**	Cromatografía Líquida Alta Resolución / Electroquímica.	6	Rec. 1 mL Orina 24h. (alícuota) [Refr.] No ingerir 5 días antes de la recolección de la orina; té, café, plátano, chocolate, vainilla, queso, bebidas carbonatadas ni ningún tipo de medicamento especialmente de salicilatos, medicación hipotensora y contrastes con yodo. Preservar la orina con HCl 6N (30 ml) pH=1 Suspender toda la medicación. Evitar cualquier tipo de ejercicio físico no habitual . Evitar el estrés. (3 días antes de la toma de muestra)	Excreción (24h): Ambos 18 - 40 Años Inf 460,00 µg/24h Excreción (24h): Ambos 41 - 60 Años Inf 426,00 µg/24h Excreción (24h): Ambos Sup - 60 Años Inf 385,00 µg/24h Volumen de orina remitido (diuresis): 600,00 - 1600,00 mL
3NTL **3-NITROTIROSINA (3NT), SANGRE TOTAL**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	8	Rec. 1 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Consultar plazo de entrega con el laboratorio.	Inf 1,0 ug/L
CLTO **4 CLOROCATECOL, ORINA**	Cromatografía Líquida Alta Resolución / Espectrometria UV.	12	Rec. 1 mL Orina final jornada [Refr.] Final de la jornada laboral.	Clorocatecol total: BEIs® (ACGIH®): Fin del turno al final de la semana laboral (Clorobenceno) Inf 100,00 mg/g creat
MOCA **4,4'-METILENBIS (2-CLOROANILINA) (MOCA), ORINA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	25	Rec. 10 mL Orina final jornada (1 x Contenedor 25 mL.) [Refr.]	VLB®-INSST: (4,4'-metilenbis (2-Cloroanilina)) Inf 12,00 ug/g crea

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
NUCL **5 NUCLEOTIDASA, SUERO**	Espectrometría.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Inf 10,00 U/L
G9539 **5-ALFA-REDUCTASA 2, DEFICIENCIA DE · SRD5A2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SRD5A2 *1*
5FUSU **5-FLUOROURACILO, SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	9	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	I.Terapéutico: 0,05 - 0,30 µg/mL Toxicidad: Sup 0,40 µg/mL
HNMPO **5-HIDROXI-N-METIL-2-PIRROLIDONA, ORINA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	16	Rec. 10 mL Orina [Refr.] La muestra debe ser recogida entre 2 y 4 horas después del final de la jornada laboral o del final de la exposición.	VLB®-INSST: Inf 70,00 mg/g crea
5OTR **5-HIDROXITRIPTOFANO, ORINA**	Inmunoanálisis enzimático	13	Rec. 10 mL Orina 24h. (alícuota) [Refr.] Preservar la orina con HCl 6N (20 ml) pH=1 - 3	Inf 100,00 µg/24h
MTHFLR **5-METILENTETRAHIDROFOLATO (5-MTHF), LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO**	Ultra Cromatografía Líquida de Alta Presión con Espectrometría de Masas en Tándem (UHPLC MS/MS)	20	Rec. 1 mL LCR (1 x Tubo estéril) [Cong.]	Ambos 0 - 3 Meses 59,00 - 205,00 nmol/L Ambos 4 - 23 Meses 44,00 - 171,00 nmol/L Ambos 2 - 18 Años 27,00 - 107,00 nmol/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
6PGDH **6-FOSFOGLUCONATO DESHIDROGENASA, SANGRE**	Espectrometría de absorción molecular	12	Rec. 5 mL Sangre total Heparina sódica (1 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Las muestras deben llegar a nuestro laboratorio de lunes a miércoles,nunca los Viernes ni vísperas de festivos. Sin efectos de transfusión reciente (mínimo 1 mes).	6,20 - 10,20 UI/g Hb
6T6M **6-TIOGUANINA + 6-METILMERCAPTOPURINA, SANGRE**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	10	Rec. 1 mL Sangre total Heparina litio (1 x Tubo sangre heparina litio) [Cong.] Rec. 1 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.]	6-Tioguanina nucleótido (6-TGN) (Metabolito azatioprina) en sangre Límites terapéuticos: Trasplante de órgano (triple terapia con azatioprina): 120 - 550 pmol/0,2 mL Enfermedad intestinal inflamatoria (azatioprina): 300 - 550 pmol/0,2 mL Quimioterapia (6-mercaptopurina): 600 - 1200 pmol/0,2 mL 6-Metilmercaptopurina (6-MMP) (Metabolito azatioprina) en sangre Límites terapéuticos: Toxicidad hepática en población pediátrica: Superior a 5700 pmol/0,2 mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
7DEOHC **7- DEHIDROCOLESTEROL, SUERO**	Cromatografía de gases.	23	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Alt. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo 5 mL.) [Cong.] Alt. 1 mL Líquido amniótico (1 x Tubo 5 mL.) [Cong.] Adjuntar siempre la prescripción médica, hoja de datos clínicos y certificados médicos de conformidad con el artículo R.1131-5 del decreto 2008-321 con fecha 4 de abril de 2008. Muestra protegida de la luz	Inf 3,00 µmol/L Síndrome Smith- Lemi- Opitz: Valores bibliográficos (n=65) 7 -1217 umol/L (media 400 umol/L)
7ACLCSU **7-AMINO-CLONAZEPAM, SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.] Rechazo: Muestra hemolizada, lipémica y/o ictérica	
7AFLCSU **7-AMINO-FLUNITRAZEPAM, SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.] La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis. Rechazo: Muestra hemolizada, lipémica y/o ictérica	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
GUAN				
8 OH GUANOSINA, ORINA	Enzimoinmunoanálisis	11	Rec. 1 mL Orina (1 x Contenedor estéril) [Refr.] Para su conservación, la orina se debe acidificar hasta pH =6 - 8.	6,00 - 14,00 µg/g Crea
DIET				
A200 (DIETA)	No se aplica.	13	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Obligatorio: rellenar Ficha Técina para poder emitir informe. Se recomienda realizar ayuno durante al menos 4 horas. La no realización del ayuno podría comprometer los resultados finales. Indicar edad y sexo.	Dieta A200: Se informa para cada paciente

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
PEA3 **A200, SUERO**	Inmunoblot.	7	Rec. 2 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 2 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 2 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 2 mL Plasma Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) [Refr.] - Los tratamientos con inmunosupresores y/o corticosteroides interfieren en este estudio. En el caso de tratamiento con antihistamínicos es recomendable no estar bajo este tipo de tratamientos en el momento de la extracción. (se aconseja 15 días sin tomar antihistaminico a criterio médico) - Indicar edad, sexo y motivo de solicitud. - No se recomienda realizar la prueba a pacientes embarazadas, a no se que el médico lo estime oportuno. - No se recomienda realizar el test en niños menores de 8 años.	Perfil A200 : Indicado en informe adjunto

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G09033 **AARSKOG, SÍNDROME DE · FGD1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FGD1 *1*
CCGA **AC CÉLULAS CALICIFORMES (IGA+IGG), SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	12	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Ac IgG células caliciformes: Negativo: Inf 1/10 Ac. IgA células caliciformes: Negativo: Inf 1/10
TSI **AC. FRENTE AL RECEPTOR DE TSH (TRAB), SUERO**	Quimioluminiscencia.	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Individuos sanos: Inf 2,58 UI/L Enfermedad diferente a Graves: Inf 3,10 UI/L
AAPCA2 **AC. NEURONAL PCA2 EN LCR**	Inmunoblot.	22	Rec. 2 mL LCR (1 x Tubo estéril) [Refr.]	No se detecta
ACR3FGF **AC. RECEPTOR 3 FGF (FGFR3), SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	9	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Inf 12,00 U/mL
ACTM **ACANTHAMOEBA CULTIVO, MUESTRA BIOLÓGICA**	Cultivo en medios selectivos y diferenciales	5	Rec. 1 Pieza/s Biopsia (1 x Contenedor con solución salina) [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Raspado corneal (1 x Contenedor con solución salina) [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Lentes de contacto (estuche y liquido conservante) (1 x Contenedor estéril) [Refr.]	Se informa para cada paciente

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
DACN **ACANTHAMOEBA SPP RNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	Reacción en cadena de la polimerasa.	6	Rec. 1 mL Líquido biológico [Cong.] Alt. 1 mL LCR [Cong.] Tubo estéril + recipiente de seguridad biólogica. En el caso de muestras oftalmológicas torunda de nylon o dacrón, o raspado corneal. Sospecha de queratitis ocular: · Torunda de dacrón impregnada en lesión corneal · Lágrimas impregnadas en torunda de dacrón · Líquido obtenido por punción ocular · Líquido de mantenimiento de lentes de contacto	DNA Acanthamoeba spp: No se detecta
PARAC **ACETAMINOFENO (PARACETAMOL), SUERO**	Espectrometría.	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Se puede utilizar plasma EDTA, citrato y Oxalato/fluoruro. -Dosis administrada, frecuencia y vía de administración	10,00 - 30,00 µg/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
COER **ACETIL COLINESTERASA ERITROCITARIA, SANGRE TOTAL**	Espectrometría.	3	Rec. 1 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Colinesterasa eritrocitaria: BEIs® (ACGIH®): (Organofosf. inhib. acetilcolines. y paratión) U/L 70% del valor pre-exposición Colinesterasa eritrocitaria: 11188,00 - 16698,00 U/L Hematocrito: Ambos 0 - 14 Días 41,00 - 66,00 % Hematocrito: Ambos 14 - 30 Días 39,00 - 60,00 % Hematocrito: Ambos 30 - 365 Días 31,00 - 54,00 % Hematocrito: Ambos 1 - 12 Años 28,00 - 43,50 % Hematocrito: Mujeres 12 - 65 Años 35,50 - 45,50 % Hematocrito: Hombres 12 - 65 Años 36,50 - 50,50 % Hematocrito: Mujeres Sup - 65 Años 35,00 - 45,50 % Hematocrito: Hombres Sup - 65 Años 37,00 - 49,00 %
ACEL **ACETIL COLINESTERASA LÍQUIDO AMNIÓTICO**	Electroforesis en Agarosa.	7	Rec. 1 mL Líquido amniótico [Refr.]	No se detecta
G7308 **ACETIL-CoA DESHIDROGENASA CADENA MEDIA, DEFICIENCIA DE · ACADM · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ACADM *1*
ACACE **ACETOACETATO, SUERO**	Espectrometría.	23	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	Los valores de referencia son orientativos y dependen en gran medida del estado nutricional del paciente. 0,05 - 0,29 mmol/L
AOHL **ACETONA, ORINA**	Cromatografía de Gases / Ionización de Llama.	5	Rec. 10 mL Orina final jornada [Refr.]	VLB®-INSST: Final de la jornada laboral (Acetona) Inf 50,00 mg/L VLB®-INSST: Final de la semana laboral (Alcohol isopropílico) Inf 40,00 mg/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
ACES **ACETONA, SANGRE TOTAL**	Cromatografía de Gases / Ionización de Llama.	5	Rec. 1 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Envio en tubo especial con vacio. Utilizar tubos suministrados por nuestro laboratorio. Final de la jornada laboral.	Valor biológico de tolerancia - BAT (MAK&BAT): (Isopropanol) Inf 25,00 mg/L	
G03150 **ACIDEMIA METILMALÓNICA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABCD4, ACSF3, CD320, LMBRD1, MCEE, MLYCD, MMAA, MMAB, MMACHC, MMADHC, MTR, MTRR, MUT, SUCLA2, SUCLG1	*15*
G03161 **ACIDEMIA PROPIÓNICA · PCCA, PCCB · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PCCA, PCCB	*2*
ATORC **ACIDEZ TITULABLE, ORINA**	Potenciometría	2	Rec. 1 mL Orina 24h. (alícuota) [Refr.] Volumen indispensable.	2,00 - 50,00 mmol/24 h	
BMER **ÁCIDO 1,2 DIHIDROXI BUTILMERCAPTÚRICO, ORINA**	Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectrometría de masas.	15	Rec. 1 mL Orina final jornada (1 x Vaso de orina y tubo) [Cong.] Cuando el final de la exposición no coincida con el final de la jornada laboral, la muestra se tomará lo antes posible después de que cese la exposición real.	Límite de cuantificación: 0,60 mg/L : VLB®-INSST: Final de la jornada laboral (1,3-Butadieno) Inf 1,60 mg/g crea	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ETXO **ÁCIDO 2-ETOXIACETICO, ORINA**	Cromatografía de Gases / Ionización de Llama.	10	Rec. 1 mL Orina final jornada [Refr.]	: BEIs® (ACGIH®): Final de la semana laboral (2-Etoxietanol) Inf 100,00 mg/g crea : BEIs® (ACGIH®): Final de la semana laboral (Acetato de 2-Etoxietilo) Inf 100,00 mg/g crea : VLB®-INSST: Final de la semana laboral (2-Etoxietanol) Inf 50,00 mg/L : VLB®-INSST: Final de la semana laboral (Acetato de 2-Etoxietilo) Inf 50,00 mg/L
2TCA **ACIDO 2-TIOTIAZOLIN 4-CARBOXILICO (TTCA), ORINA**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	11	Rec. 1 mL Orina final jornada [Refr.]	Excreción (creatinina): BEIs® (ACGIH®): Inf 0,50 mg/g creat Excreción (creatinina): VLB®-INSST: Inf 1,50 mg/g creat
ALAO **ACIDO 5 AMINOLEVULINICO, ORINA 24H**	Espectrometría.	6	Rec. 1 mL Orina 24h. (alícuota) (1 x Contenedor 1500 mL.) [Refr.] Muestra protegida de la luz	: Límite de cuantificación: Inf 0,80 mg/L Excreción (24h): Inf 6,40 mg/24h
A5HO **ÁCIDO 5 HIDROXINDOLACETICO, ORINA**	Cromatografía Líquida Alta Resolución / Electroquímica.	6	Rec. 10 mL Orina 24h. (alícuota) (1 x Contenedor 2500 mL.) (Ác. clorhídrico 6N)[Refr.] No ingerir alimentos que contengan serotonina (ciruelas, piñas, bananas, berenjenas, tomates, aguacates, nueces) durante tres días antes de la prueba. Preservar la orina con HCl 6N (20 ml) pH=2 - 3	Excreción (24h): 2,00 - 8,00 mg/24h : Límite de cuantificación: 2,00 mg/L Volumen de orina remitido (diuresis): 600,00 - 1600,00 mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ALA2 **ACIDO 5AMINOLEVULINICO, ORINA**	Espectrometría.	6	Rec. 1 mL Orina final jornada (1 x Tubo 5 mL.) [Refr.] Muestra protegida de la luz	Ácido delta amino Levulínico (cociente): 3,00 - 8,00 mg/gr creat : Límite de cuantificación: Inf 0,80 mg/L
VITC **ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C), PLASMA**	Cromatografía Líquida Alta Resolución / Espectrometria UV.	3	Rec. 0.5 mL Plasma Heparina litio (1 x Tubo sangre heparina litio) [Cong.] La obtención del plasma y congelación del mismo debe realizarse con la mayor rapidez posible, las muestras deben enviarse congeladas manteniendo en todo momento la cadena de frío. Muestra protegida de la luz Rechazo: Muestra Hemolizada Rechazo: Plasma-EDTA	4,00 - 15,00 mg/L Límite de cuantificación: 0,60 mg/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
VICO **ÁCIDO ASCÓRBICO, ORINA**	Cromatografía Líquida Alta Resolución / Espectrometria UV.	17	Rec. 5 mL Orina 24h. (alícuota) (1 x Kit específico) [Cong.] Recoger muestra de orina 24 h. Alicuotar 0,50 mL y añadir en tubo específico (Referencia material 600072555) que contiene 0,50 mL de solución al 10 % de ácido perclórico con un 1% de metafosfórico (siempre en estos volúmenes, para asegurar la integridad de la muestra).Vortear la mezcla. Centrifugar en frío a 2500g durante 10 minutos. Separar el sobrenadante, proteger de la luz y congelar. Remitir en estas condiciones al laboratorio.	Excreción (24h): 20,00 - 30,00 mg/24h Volumen de orina remitido (diuresis): 600,00 - 1600,00 mL
BHTO **ACIDO BUTILHIDROXITOLUENO (BHT-COOH), ORINA**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	15	Rec. 3 mL Orina final jornada (1 x Tubo 10 mL.) [Refr.]	0,10 - 1,50 µg/mL
BTXO **ÁCIDO BUTOXIACÉTICO, ORINA**	Cromatografía de Gases / Ionización de Llama.	10	Rec. 3 mL Orina final jornada (1 x Tubo 10 mL.) [Refr.]	Excreción (creatinina): VLB®-INSST: Final de la semana laboral (2-Butoxietanol) Inf 200,00 mg/g creatinina
CICM **ÁCIDO CITRICO (CREATININA), ORINA**	Espectrometría.	2	Rec. 2 mL Orina [Refr.] Recoger orina de 24horas usando HCl como conservante. EL pH de la muestra debe ser ácido (<1,7)	: mg/L Interpretación según criterio clínico Excreción (creatinina): Adultos Sup 250,00 mg/g cre Excreción (creatinina): Niños Ambos Sup - 1 Años Sup 400,00 mg/g cre Creatinina en orina : mg/dL Interpretación según criterio clínico

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
CIO2 **ÁCIDO CÍTRICO, ORINA 24H**	Enzimático UV.	3	Rec. 2 mL Orina 24h. (alícuota) (1 x Contenedor 2500 mL.) (Ác. clorhídrico 6N)[Refr.] Recoger orina de 24horas usando HCl como conservante. EL pH de la muestra debe ser ácido (<1,7)	Excreción (24h): Hombres 116,00 - 924,00 mg/24 h Excreción (24h): Mujeres 250,00 - 1160,00 mg/24 h Volumen de orina remitido (diuresis): 600,00 - 1600,00 mL
CITRS **ÁCIDO CÍTRICO, PLASMA SEMINAL**	Espectrometría.	3	Rec. 1 mL Plasma seminal (1 x Contenedor estéril) [Refr.]	Sup 300,00 mg/dL
ACITR **ACIDO CITRICO, SUERO**	Espectrometría.	5	Rec. 1.2 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	10,60 - 35,40 mg/L
APRF **ÁCIDO FITANICO Y ÁCIDO PRISTÁNICO (ENFERMEDAD PEROXISOMAL), SUERO**	Cromatografía de Gases / Ionización de Llama.	20	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Alt. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo 5 mL.) [Cong.]	Ácido Pristánico: Inf 1,00 µg/mL Comentario Interpretativo: Se informa para cada paciente Ácido Fitánico: Inf 2,00 µg/mL
ARAF **ÁCIDO FÓLICO RECEPTOR ANTICUERPOS (FRAT), SUERO**	Inmunoanálisis	75	Rec. 1.5 mL Suero (2 x Alicuota) [Cong.] Enviar dos alicuotas de 1,5 mL de suero congelado. Necesario rellenar cuestionario especifico. No tomar suplementos de ácido fólico ni comida fortificada con ácido fólico 72 h antes de la extracción.	Indicado en informe adjunto

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
FOE **ACIDO FOLICO, SANGRE TOTAL**	Quimioluminiscencia.	3	Rec. 1.5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Ácido fólico eritrocitario: 126,00 - 651,10 ng/mL Hematocrito: Ambos 0 - 14 Días 41,00 - 66,00 % Hematocrito: Ambos 14 - 30 Días 39,00 - 60,00 % Hematocrito: Ambos 30 - 365 Días 31,00 - 54,00 % Hematocrito: Ambos 1 - 12 Años 28,00 - 43,50 % Hematocrito: Hombres 12 - 65 Años 36,50 - 50,50 % Hematocrito: Mujeres 12 - 65 Años 35,50 - 45,50 % Hematocrito: Mujeres Sup - 65 Años 35,00 - 45,50 % Hematocrito: Hombres Sup - 65 Años 37,00 - 49,00 %
FOL **ÁCIDO FÓLICO, SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Extraer la muestra antes de iniciar la terapia con folato.	Sup 3,10 ng/mL
AFOO **ACIDO FORMICO, ORINA**	Cromatografía de Gases / Ionización de Llama.	7	Rec. 5 mL Orina final jornada [Refr.]	Excreción (creatinina): BEIs® (ACGIH®): Inf 80,00 mg/g crea Excreción (creatinina): No expuestos Inf 50,00 mg/g crea
FIGLU **ÁCIDO FORMIMINOGLUTÁMICO, ORINA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	31	Rec. 10 mL Orina 24h. (alícuota) [Refr.]	0,08 - 5,00 µmol/L
AFTOC **ÁCIDO FUROICO, ORINA**	Cromatografía de Gases / Ionización de Llama.	10	Rec. 10 mL Orina final jornada [Refr.] Final de la jornada laboral.	VLB®-INSST: Final de la jornada laboral (2-Furaldehido) Inf 200,00 mg/L
GABO **ACIDO GAMMA AMINOBUTIRICO (GABA), ORINA**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	14	Rec. 10 mL Orina 24h. (alícuota) [Cong.]	Inf 1,00 mg/24h
GLIC **ÁCIDO GLICÓLICO, ORINA**	Cromatografía de gases.	25	Rec. 10 mL Orina [Refr.] Orina 2ª micción de la mañana.	Inf 60,00 mg/g crea

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
GT3O **ACIDO GLUTARICO Y 3-OH-GLUTARICO**	Cromatografía de Gases / Espectrometría Masas.	40	Rec. 25 mL Orina [Cong.]	Acido 3-OH glutárico: 2,00 - 14,00 mmol/mol cr Acido glutárico: 2,00 - 10,00 mmol/mol cr
AHIA **ACIDO HIALURONICO, LÍQUIDO PLEURAL**	Enzimoinmunoanálisis	23	Rec. 1 mL Líquido pleural [Refr.]	Valores superiores a 50 mg/L son compatibles con mesotelioma pleural.
AHISU **ACIDO HIALURONICO, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	11	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Ayuno mínimo de 8 horas.	Inf 56,00 ng/mL
AHIO **ÁCIDO HIPÚRICO, ORINA**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	6	Rec. 5 mL Orina final jornada [Refr.]	Excreción (creatinina): Población no expuesta Inf 0,97 g/g crea Excreción (creatinina): VLB®-INSST: (Tolueno) Inf 1,60 g/g crea : Límite de cuantificación: 0,10 g/L
AHOHN **ACIDO HOMOGENTISICO, ORINA**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	24	Rec. 10 mL Orina 24h. (alícuota) (Ác. clorhídrico 6N)[Refr.]	0,00 - 10,00 mg/24 h

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
AHVO **ÁCIDO HOMOVANÍLICO, ORINA 24H**	Cromatografía Líquida Alta Resolución / Electroquímica.	6	Rec. 10 mL Orina 24h. (alícuota) (1 x Contenedor 2500 mL.) [Refr.] Evitar cualquier tipo de ejercicio físico no habitual . Evitar el estrés. (3 días antes de la toma de muestra) No cumplimiento dieta No ingerir 5 días antes de la recolección de la orina; té, café, plátano, chocolate, vainilla, queso, bebidas carbonatadas ni ningún tipo de medicamento especialmente de salicilatos, medicación hipotensora y contrastes con yodo. Preservar la orina con HCl 6N (20 ml) pH=1 - 3	Excreción (24h): 1,80 - 6,90 mg/24 h : Límite de cuantificación: 2,00 mg/L Volumen de orina remitido (diuresis): 600,00 - 1600,00 mL
AHVOM **ACIDO HOMOVANÍLICO, ORINA DE MICCIÓN (USO PEDIÁTRICO)**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	6	Rec. 5 mL Orina [Refr.] Preservar la orina con HCl 6N (20 ml) pH=2 - 3	Límite de cuantificación: 2,00 mg/L Acido Homovanílico en orina de micción (cociente creatinina): Ambos 0 - 1 Años 6,40 - 35,00 mg/ g cre Acido Homovanílico en orina de micción (cociente creatinina): Ambos 1 - 2 Años 5,70 - 27,30 mg/ g cre Acido Homovanílico en orina de micción (cociente creatinina): Ambos 2 - 5 Años 2,70 - 23,50 mg/ g cre Acido Homovanílico en orina de micción (cociente creatinina): Ambos 5 - 10 Años Inf 16,50 mg/ g cre Acido Homovanílico en orina de micción (cociente creatinina): Ambos 10 - 15 Años Inf 9,70 mg/ g cre Acido Homovanílico en orina de micción (cociente creatinina): Ambos Sup - 15 Años Inf 5,80 mg/ g cre

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
LAC1 **ÁCIDO LÁCTICO (1'), PLASMA**	Espectrometría.	3	Rec. 2 mL Plasma 1 m. Fluoruro sódico Oxalato (1 x Tubo bioq. Ác.láctico) [Refr.] Tubo especial: Tubo Especial Fluoruro sódico - Oxalato (Artículo: 600068706). Centrifugar y enviar el plasma separado. Indicar en el tubo LÁCTICO. Bolsa transporte muestras Especiales. No se aceptan muestras alternativas.	En prueba de ejercicio isquémico para ácido láctico, los valores esperados se encuentran entre 4 y 6 veces al valor basal.
LAC5 **ÁCIDO LÁCTICO (5'), PLASMA**	Espectrometría.	3	Rec. 2 mL Plasma 5 m. Fluoruro sódico Oxalato (1 x Tubo bioq. Ác.láctico) [Refr.] Tubo especial: Tubo Especial Fluoruro sódico - Oxalato (Artículo: 600068706). Centrifugar y enviar el plasma separado. Indicar en el tubo LÁCTICO. Bolsa transporte muestras Especiales. No se aceptan muestras alternativas.	En prueba de ejercicio isquémico para ácido láctico, los valores esperados se encuentran entre 4 y 6 veces al valor basal.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
LAC10 **ÁCIDO LÁCTICO (10'), PLASMA**	Espectrometría.	3	Rec. 2 mL Plasma 10 m. Fluoruro sódico Oxalato (1 x Tubo bioq. Ác.láctico) [Refr.] Tubo especial: Tubo Especial Fluoruro sódico - Oxalato (Artículo: 600068706). Centrifugar y enviar el plasma separado. Indicar en el tubo LÁCTICO. Bolsa transporte muestras Especiales. No se aceptan muestras alternativas.	En prueba de ejercicio isquémico para ácido láctico, los valores esperados se encuentran entre 4 y 6 veces al valor basal.
LAC2 **ACIDO LÁCTICO (2'), PLASMA**	Espectrometría.	3	Rec. 1 mL Plasma 2 m. Fluoruro sódico Oxalato (1 x Tubo bioq. Ác.láctico) [Refr.] Tubo especial: Tubo Especial Fluoruro sódico - Oxalato (Artículo: 600068706). Centrifugar y enviar el plasma separado. Indicar en el tubo LÁCTICO. Bolsa transporte muestras Especiales. No se aceptan muestras alternativas.	En prueba de ejercicio isquémico para ácido láctico, los valores esperados se encuentran entre 4 y 6 veces al valor basal.
ALCR **ÁCIDO LÁCTICO, LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO**	Espectrometría.	3	Rec. 1 mL LCR [Refr.]	10,80 - 18,90 mg/dL
ALACLP **ÁCIDO LÁCTICO, LÍQUIDO PLEURAL**	Espectrometría.	3	Rec. 2 mL Líquido pleural [Cong.]	mg/dL Interpretación según criterio clínico

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ALACLS **ÁCIDO LÁCTICO, LÍQUIDO SINOVIAL**	Espectrometría.	3	Rec. 2 mL Líquido sinovial [Cong.]	mg/dL Interpretación según criterio clínico
ALAC **ÁCIDO LÁCTICO, PLASMA**	Espectrometría.	3	Rec. 2 mL Plasma Fluoruro sódico Oxalato (1 x Tubo bioq. Ác.láctico) [Refr.] Tubo especial: Tubo Especial Fluoruro sódico - Oxalato (Artículo: 600068706). Bolsa transporte muestras Especiales. Después de la extracción, homogeneizar inmediatamente la muestra por inversión del tubo de 8 a 10 veces, centrifugar a 3000 rpm durante 10 min, separar el plasma en alicuota y enviar segregado en bolsa. Indicar en el tubo LÁCTICO.	4,50 - 19,80 mg/dL
ACLIPS **ACIDO LIPOÍCO, SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	12	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Es recomendable que la toma de muestra se realice 30 minutos antes de la administración oral.	VLB: Inf 1,00 µg/L Post-dosis: Inf 1000,00 µg/L
AMFO **ÁCIDO MANDÉLICO + ÁCIDO FENILGLIOXÍLICO, ORINA**	Cromatografía Líquida Alta Resolución / Espectrometria.	8	Rec. 1 mL Orina final jornada [Refr.]	Excreción (creatinina): VLB®-INSST: Final de la jornada laboral (Estireno) Inf 400,00 mg/g creat Excreción (creatinina): VLB®-INSST: Final de la semana laboral (Etilbenceno) Inf 700,00 mg/g creat

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
AMEH **ÁCIDO METILHIPÚRICO, ORINA**	Cromatografía Líquida Alta Resolución / Espectrometria.	6	Rec. 5 mL Orina final jornada [Refr.]	Excreción (creatinina): VLB®-INSST: Final de la jornada laboral (Xileno) Inf 1,00 g/g crea
MAOR **ÁCIDO METILMALÓNICO, ORINA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	7	Rec. 10 mL Orina (1 x Tubo 10 mL.) [Cong.]	Ácido metil Malónico: 1,80 - 26,50 µmol/g creat
AMET **ÁCIDO METILMALÓNICO, SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	7	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	Ambos 1 - 12 Años 0,10 - 0,30 µmol/L Ambos 12 - 18 Años 0,10 - 0,35 µmol/L Ambos 18 - 65 Años 0,10 - 0,40 µmol/L Ambos Sup - 65 Años 0,12 - 0,46 µmol/L
AMEVL **ACIDO MEVALONICO, ORINA**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	16	Rec. 10 mL Orina (1 x Contenedor 25 mL.) [Cong.] Alt. 10 mL Orina 24h. (alícuota) (1 x Contenedor 25 mL.) [Cong.] Muestra descongelada y mantenida a temperatura ambiente más de un día o a 4ºC más de una semana. IMPRESCINDIBLE: Adjuntar resúmen de la historia clínica.	Inf 0,10 mmol/mol crea
ANAAO **ACIDO N ACETIL ASPARTICO (ENFERMEDAD DE CANAVAN), ORINA**	Cromatografía de Gases / Espectrometría Masas.	16	Rec. 10 mL Orina [Cong.]	4,00 - 25,00 mmol/molcrea

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
IMI **ACIDO NMETILIMIDAZOLACETICO, ORINA**	Cromatografía de Gases / Espectrometría Masas.	17	Rec. 10 mL Orina 24h. (alícuota) [Refr.] Recoger la orina sobre 0,5 mL de ácido clorhídrico concentrado.Remitir diuresis.	Inf 4,50 mg/24h
OROT **ACIDO OROTICO, ORINA**	Espectrometría de masas de triple cuadrupolo (HPLC-EM/EM)	15	Rec. 2 mL Orina (1 x Tubo 5 mL.) [Cong.]	Creatinina en orina : mg/dL Interpretación según criterio clínico Excreción (creatinina): Ambos 0 - 3 Años 0,30 - 3,90 mmol/mol crea Excreción (creatinina): Ambos 4 - 12 Años 0,30 - 2,40 mmol/mol crea Excreción (creatinina): Ambos 13 - 18 Años 0,20 - 1,80 mmol/mol crea Excreción (creatinina): Ambos Sup - 18 Años 0,30 - 4,20 mmol/mol crea
OXMI **ÁCIDO OXÁLICO EN ORINA DE MICCIÓN (CONCENTRACIÓN)**	Espectrometría.	5	Rec. 10 mL Orina [Refr.] Preservar orina con HCl. El pH de la muestra debe estar entre 5 y 7.	mg/L Interpretación según criterio clínico
OXCM **ÁCIDO OXÁLICO, ORINA / CREATININA**	Espectrometría.	5	Rec. 10 mL Orina [Refr.] Preservar orina con HCl. El pH de la muestra debe estar entre 5 y 7. Se recomienda disminuir el consumo de alimentos ricos en vitamina C 48 horas antes de la recolección de la muestra.	Creatinina en orina : mg/dL Interpretación según criterio clínico Excreción (creatinina): Niños Ambos 0 - 6 Meses 86,00 - 362,00 mg/g cre Excreción (creatinina): Niños Ambos 7 - 24 Meses 42,00 - 147,00 mg/g cre Excreción (creatinina): Adultos 3,00 - 43,00 mg/g cre Excreción (creatinina): Niños Ambos 2 - 5 Años 20,00 - 109,00 mg/g cre Excreción (creatinina): Niños Ambos 5 Años 24,00 - 78,00 mg/g cre Excreción (creatinina): Niños Ambos 9 Años 13,00 - 78.00 mg/g cre Excreción (creatinina): Niños Ambos 12 Años 18,00 - 59,00 mg/g cre Excreción (creatinina): Niños Ambos 14 Años 11,00 - 71,00 mg/g cre

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
OXOR **ÁCIDO OXÁLICO, ORINA 24H**	Espectrometría.	3	Rec. 10 mL Orina 24h. (alícuota) (1 x Contenedor 2500 mL.) (pH 5-7 Ác. clorhídrico 6N)[Refr.] Alt. 10 mL Orina 24h. (alícuota) (1 x Contenedor 2500 mL.) [Refr.] Se recomienda disminuir el consumo de alimentos ricos en vitamina C 48 horas antes de la recolección de la muestra. Recoger la Orina de 24 horas usando HCl como conservante. El pH de la muestra debe estar entre 5 y 7.	Excreción (24h): Inf 35,10 mg/24 h Volumen de orina remitido (diuresis): 600,00 - 1600,00 mL
OXAL **ÁCIDO OXÁLICO, SUERO**	Espectrometría.	6	Rec. 4 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	0,00 - 26,00 µmol/L
PIPE **ÁCIDO PIPECÓLICO, PLASMA**	Cromatografía de Gases / Espectrometría Masas.	9	Rec. 2 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 2,50 µmol/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
APIRU **ACIDO PIRUVICO, SANGRE TOTAL**	Enzimático.	4	Rec. 3 mL Sobrenadante Ác.perclórico 8% (1 x Tubo bioq. Ác.pirúvico) [Refr.] PREPARACIÓN DE LOS TUBOS DE PERCLORICO: -Preparar Acido Perclórico al 8% : 7ml acido perclórico al 70% y 93 ml de agua destilada. -Dispensar 4 ml de ácido perclórico en tubo de plástico. Conservar en frio. EXTRACCION DE LAS MUESTRAS: -Al tubo que contiene 4 ml de ácido perclórico al 8%, añadir 2 ml de sangre directamente de la jeringa de extracción. -Vortex 30 segundos -Incubar en frio durante 10 min -Centrifugar 15 min a 3000 g -Separar sobrenadante (líquido transparente) -Conservar refrigerado por 8 días, si por tiempo superior congelar. Preferible en ayunas y en reposo Rechazo: Muestras de	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
			sangre/Heparina, suero o plasma/EDTA.	
FEME **ÁCIDO S FENILMERCAPTÚRICO, ORINA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	10	Rec. 2 mL Orina final jornada (1 x Contenedor 25 mL.) [Refr.]	Ácido s fenil Mercapturico : VLB®-INSST: (Benceno) Inf 8,00 µg/g crea Ácido s fenil Mercapturico : Límite de cuantificación: 5,00 µg/L
AASA **ÁCIDO SALICÍLICO, SUERO**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] -Dosis administrada, frecuencia y vía de administración La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis.	I.Terapéutico: 20,00 - 300,00 mg/L Toxicidad: Sup 300,00 mg/L Límite de cuantificación: Sup 10,00 mg/L
ASIOR **ACIDO SIALICO LIBRE, ORINA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	30	Rec. 10 mL Orina [Cong.]	Ambos 0 - 6 Meses Inf= 120,50 mmol/mol cr Ambos 6 - 12 Meses Inf= 86,70 mmol/mol cr Ambos 1 - 2 Años Inf= 86,70 mmol/mol cr Ambos 2 - 10 Años Inf= 48,50 mmol/mol cr Ambos Sup - 10 Años Inf= 17,60 mmol/mol cr
TMUC **ÁCIDO TRANSMUCONICO, ORINA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	10	Rec. 1 mL Orina final jornada (1 x Tubo 10 mL.) [Refr.]	VLB®-INSST: Final de la jornada laboral (Benceno) Inf 2,00 mg/L Límite de cuantificación: 0,10 mg/L
AT **ÁCIDO TRICLOROACÉTICO (METABOLITOS DEL PERCLOROETILENO Y/O TRICLOROETILENO), ORINA**	Cromatografía de Gases / Captura Electrónica.	7	Rec. 5 mL Orina final jornada [Refr.]	BEIs® (ACGIH®): (Tricloroetileno) Inf 15 mg/L VLB®-INSST: Final de la semana laboral (Tricloroetileno) Inf 15,00 mg/L Límite de cuantificación: Inf 1 mg/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
AU **ÁCIDO ÚRICO SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Hombres 3,60 - 7,70 mg/dL Mujeres 2,60 - 6,80 mg/dL
AUL **ÁCIDO ÚRICO, LÍQUIDO BIOLÓGICO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Líquido biológico [Refr.]	mg/dL Interpretación según criterio clínico
AULS **ÁCIDO ÚRICO, LÍQUIDO SINOVIAL**	Espectrometría.	1	Rec. 5 mL Líquido sinovial [Refr.]	3,00 - 5,00 mg/dL
UO **ÁCIDO ÚRICO, ORINA 24H**	Enzimático - colorimétrico.	1	Rec. 1 mL Orina 24h. (alícuota) (1 x Contenedor 2500 mL.) [Refr.]	Concentración:: mg/dL Excreción (24h): 250,00 - 750,00 mg/24h Volumen de orina remitido (diuresis): 600,00 - 1600,00 mL
DPKL **ACIDO VALPROICO LIBRE, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	5	Rec. 2 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Extracción antes de la toma de la mañana.	I.Terapéutico: 5,00 - 20,00 mg/L
VALP **ÁCIDO VALPROICO, SUERO**	Inmunoanálisis enzimático	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] -Dosis administrada, frecuencia y vía de administración Obtener la muestra de sangre previamente a la administración del fármaco. Usualmente se determina la concentración en predosis matinal y en ayunas.	50,00 - 100,00 µg/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
VMAO **ACIDO VANIL MANDELICO, ORINA**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	6	Rec. 10 mL Orina 24h. (alícuota) Ác. clorhídrico 6N (1 x Contenedor 2500 mL.) [Refr.] Preservar la orina con HCl 6N (20 ml) pH=1 - 3 Suspender toda la medicación. Evitar cualquier tipo de ejercicio físico no habitual . Evitar el estrés. (3 días antes de la toma de muestra) No ingerir 5 días antes de la recolección de la orina; té, café, plátano, chocolate, vainilla, queso, bebidas carbonatadas ni ningún tipo de medicamento especialmente de salicilatos, medicación hipotensora y contrastes con yodo. No cumplimiento dieta	Excreción (24h): 1,60 - 7,30 mg/24h : Límite de cuantificación: 2,00 mg/L Volumen de orina remitido (diuresis): 600,00 - 1600,00 mL
AOSSC **ÁCIDOS ORGÁNICOS · SCREENING, SUERO**	Cromatografía de Gases / Espectrometría Masas.	14	Rec. 5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	Indicado en informe adjunto
ACBIHE **ACIDOS BILIARES, HECES**	Espectrometría.	7	Rec. 5 g Heces [Refr.]	84,00 - 655,00 umol/100g
ABIL **ÁCIDOS BILIARES, SUERO**	Enzimático.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Inf 10,00 µmol/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
AG36 **ACIDOS GRASOS (OMEGA 3 OMEGA 6), SUERO**	Cromatografía de Gases / Ionización de Llama.	11	Rec. 2 mL Suero (1 x Tubo protegido de la luz) [Refr.] Ayuno de 4 horas Rechazo: Muestra Hemolizada Rechazo: Muestra lipémica.	Alfa-linolénico (c18:3n3): 3,00 - 21,00 µg/mL Araquidónico (c20:4n6): 108,00 - 422,00 µg/mL Dihomo-gamma-linolénico (c20:3n6): 38,00 - 105,00 µg/mL Docosahexaenoico (c22:6n3): 35,00 - 160,00 µg/mL Eicosapentanoico (c20:5n3): 5,00 - 73,00 µg/mL Elaidico (t-c18:1n9): Inf 10,00 µg/mL Esteárico (c18:0): 127,00 - 305,00 µg/mL Gamma-linolénico (c18:3n6): 4,00 - 42,00 µg/mL Linoleico (c18:2n6): 576,00 - 1300,00 µg/mL Mirístico (c14:0): 15,00 - 60,00 µg/mL Oleico (c18:1n9): 260,00 - 1250,00 µg/mL Palmítico (c16:0): 320,00 - 1075,00 µg/mL Palmitoleico (c16:1n7): 33,00 - 125,00 µg/mL Cociente n6/n3: 5,00 - 10,00
AGER **ACIDOS GRASOS (OMEGA 3 OMEGA 6) PERFIL COMPLETO, SANGRE TOTAL**	Cromatografía de Gases / Ionización de Llama.	11	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo protegido de la luz) [Refr.] Alt. 5 mL Sangre total Heparina sódica (1 x Tubo protegido de la luz) [Refr.] Alt. 5 mL Sangre total Heparina litio (1 x Tubo protegido de la luz) [Refr.] Peticionario general. Adjuntar documentación junto con la muestra Ayuno de 4 horas Rechazo: Muestra Hemolizada Rechazo: Muestra lipémica.	Alfa-linolénico (c18:3n3): 0,04 - 0,16 % Araquidónico (c20:4n6): 10,00 - 16,00 % Dihomo-gam-linolénico (c20:3n6): 0,95 - 2,00 % Docosahexanoico (c22:6n3): 3,10 - 8,50 % Eicosapentaenoico (c20:5n3): 0,60 - 2,30 % Elaidico (t-c18:1n9): Inf 0,95 % Esteárico (c18:0): 17,00 - 21,45 % Gamma-linolénico (c18:3n6): 0,04 - 0,50 % Linoleico (c18:2n6): 8,60 - 13,20 % Mirístico (c14:0): 0,13 - 0,67 % Oleico (c18:1n9): 14,70 - 19,80 % Palmitico (c16:0): 25,00 - 32,80 % Palmitoleico (c16:1n7): 0,10 - 0,30 % Cociente n6/n3: 2,70 - 6,00 %

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
AGML **ACIDOS GRASOS DE CADENA MUY LARGA, SUERO**	Cromatografía de gases.	12	Rec. 4 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 4 mL Plasma Heparina litio (1 x Tubo sangre heparina litio) [Refr.] Alt. 4 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Adjuntar historia clínica (importante indicar si se trata de tratamiento o diagnóstico)	C24:0/C22:0: 0,50 - 1,10 Índice C26:0/C22:0: Inf 0,04 Índice C22:0: 20,00 - 45,00 mg/L C24:0: 10,00 - 50,00 mg/L C26:0: Inf 2,00 mg/L
NEFA **ACIDOS GRASOS LIBRES (NEFA), SUERO**	Espectrometría.	4	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	0,28 - 0,89 mmol/L
AGRS **ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3/OMEGA-6**	Cromatografía de Gases / Ionización de Llama.	15	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Muestra protegida de la luz Rechazo: Muestra Hemolizada Rechazo: Muestra lipémica.	Alfa-linolénico (c18:3n3): 0,04 - 0,16 % Araquidónico (c20:4n6): 10,00 - 16,00 % Dihomo-gam-linolénico (c20:3n6): 0,95 - 2,00 % Docosahexanoico (c22:6n3): 3,10 - 8,50 % Eicosapentaenoico (c20:5n3): 0,60 - 2,30 % Gamma-linolénico (c18:3n6): 0,04 - 0,50 % Linoleico (c18:2n6): 8,60 - 13,20 % Cociente n6/n3: 2,70 - 6,00 %
AOOEC **ACIDOS ORGÁNICOS ESTUDIO, ORINA**	Cromatografía de Gases / Espectrometría Masas.	16	Rec. 10 mL Orina [Cong.] - Se precisa resumen de la historia clínica del paciente.	Perfil cromatográfico normal
3ACCR **ÁCIDOS ORGÁNICOS, LCR**	Cromatografía de Gases / Espectrometría Masas.	16	Rec. 1 mL LCR (1 x Tubo estéril) [Cong.]	2 Hidroxibutírico Inf 7,00 3 Hidroxibutírico Inf 36,00 Láctico Inf 270

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G03120 **ACIDOSIS LÁCTICA CONGÉNITA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ACAD9, AGK, AIFM1, APTX, ATP5E, ATPAF2, BCS1L, BOLA3, C10orf2, C12ORF65, CARS2 , COQ2, COQ4 , COQ7, COQ8A, COQ9, COX10, COX14, COX15, COX6B1, CYC1, DARS2, DGUOK, DLAT, DLD, DNM1L, EARS2, ECHS1, ELAC2, ETFA, ETFB, ETFDH, ETHE1, FARS2, FBP1, FBXL4, FDX1L, FH, FOXRED1, G6PC, GFER, GFM1, GYG2, GYS2, HMGCL, HTRA2, IBA57, ISCU, LARS, LARS2, LIAS , LIPT1, LRPPRC, LYRM4, MFF, MPC1, MPV17, MRPL12, MRPL44, MRPS16, MRPS22, MRPS7, MTFMT, MTO1, NARS2, NDUFA1, NDUFA10, NDUFA11, NDUFA9, NDUFAF1, NDUFAF3, NDUFAF4, NDUFAF5, NDUFAF6, NDUFB3, NDUFB9, NDUFS1, NDUFS2, NDUFS3, NDUFS4, NDUFS6, NDUFS7, NDUFS8, NDUFV1, NFU1, PARS2, PC, PCCA, PCCB, PDHA1, PDHB, PDHX, PDP1, PDSS1, PDSS2, PNPT1, POLG, POLG2, PUS1, RARS2, RMND1, RRM2B, SARS2, SCO2, SDHAF1, SERAC1, SFXN4, SLC25A26, SLC25A3, SLC25A4, SUCLA2, SUCLG1, SURF1, TARS2, TAZ, TK2, TMEM70, TPK1 , TRMT10C, TRMU, TRNT1, TSFM, TTC19, TUFM, TYMP, UQCRB, UQCRC2, UQCRQ, YARS2 *129*
G09001 **ACIDOSIS TUBULAR RENAL · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ATP6V0A4, ATP6V1B1, CA2, CLCN5, CLCN7, SLC4A1, SLC4A4 *7*
G09041 **ACIDOSIS TUBULAR RENAL CON SORDERA · ATP6V1B1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ATP6V1B1 *1*
G03186 **ACIDURIA 3-METILGLUTACÓNICA TIPO 1 · AUH · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	
G7305 **ACIDURIA ARGININOSUCCÍNICA · ASL · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ASL *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ACSCLA **ACIL CARNITINAS (ACIDURIAS ORGÁNICAS, DEFICIENCIAS DE LA BETA-OXIDACION MITOCONDRIAL), SANGRE SECA**	Espectrometría de masas.	18	Rec. 4 Circulos 10 mm Sangre seca en papel de filtro (1 x Papel de filtro Whatman 903) - Resumen de la historia clínica del paciente. Documentación: Peticionario general. Rechazo: 1-muestra escasa 2-muestra en exceso 3-muestra contaminada con cremas, pomadas, orinas, heces o alcohol 4-muestra que no se ha secado antes de ser introducida en el sobre 5-muestra obtenida con anticoagulantes 6-muestra obtenida directamente de catéteres para alimentación parenteral o para tratamientos farmacológicos 7-Papel absorbente picado y/o dañado, 8-muestra separada del marco de cartón que le da soporte y que por tanto, no está identificada.	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
QACC **ACILCARNITINAS ESTUDIO, PLASMA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	11	Rec. 4 mL Plasma Heparina litio (1 x Tubo sangre heparina litio) [Cong.]	C2 - Acetil Carnitina: Inf 28,00 µmol/L C10 - Decanoil Carnitina: Inf 0,91 µmol/L C12- Lauroil Carnitina: Inf 0,35 µmol/L C14 - Mistiroil Carnitina: Inf 0,15 µmol/L C16 - Palmitoil Carnitina: Inf 0,52 µmol/L C18 - Octadecanoil Carnitina: Inf 0,14 µmol/L C3 - Propionil Carnitina: Inf 1,80 µmol/L C4 - Butiril Carnitina: Inf 1,10 µmol/L C5 - Valeril Carnitina: Inf 0,60 µmol/L C5DC - Glutaril Carnitina: Inf 0,12 µmol/L C6 - Hexanoil Carnitina: Inf 0,23 µmol/L C8 - Octanoil Carnitina: Inf 0,78 µmol/L C0 - Carnitina libre: 10,00 - 74,00 µmol/L
G01160 **ACIL-CoA DESHIDROGENASA DE CADENA CORTA, DEFICIENCIA DE · ACADS · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ACADS *1*
QAUR **ACLARAMIENTO DE ÁCIDO ÚRICO, ORINA 24H**	Espectrometría.	1	Rec. 10 mL Orina 24h. (alícuota) (1 x Contenedor 2500 mL.) [Refr.] Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Aclaramiento de Uratos: 6,80 - 11,30 ml/mn Urato: Hombres 3,60 - 7,70 mg/dL Urato: Mujeres 2,60 - 6,80 mg/dL
ACL **ACLARAMIENTO DE CREATININA, ORINA 24 H**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 1 mL Orina 24h. (alícuota) (1 x Contenedor 2500 mL.) [Refr.] Realizar extracción de suero justo antes o justo después de la recogida de orina (no exceder 24 h)	Creatinina: Ambos 0 - 30 Días 0,31 - 0,98 mg/dL Creatinina: Ambos 30 - 365 Días 0,16 - 0,39 mg/dL Creatinina: Ambos 1 - 12 Años 0,26 - 0,77 mg/dL Creatinina: Hombres Sup - 12 Años 0,67 - 1,17 mg/dL Creatinina: Mujeres Sup - 12 Años 0,51 - 0,95 mg/dL Aclaramiento de creatinina en orina de 24 horas: 80,00 - 125,00 mL/min

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
QACU **ACLARAMIENTO DE UREA , ORINA 24H**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 1 mL Orina 24h. (alícuota) (1 x Contenedor 2500 mL.) [Refr.]	Aclaramiento de urea: 52,00 - 170,00 mL/min Urea: 17,00 - 49,00 mg/dL	
G08001 **ACONDROGÉNESIS TIPO IB · SLC26A2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SLC26A2	*1*
G08002 **ACONDROGÉNESIS TIPO II O HIPOACONDROPLASIA · COL2A1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	COL2A1	*1*
G08003 **ACONDROPLASIA · FGFR3 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FGFR3	*1*
G08004 **ACONDROPLASIA · FGFR3(c.1138G>A, c.1138G>C, c.1123G>T, p.Gly380Arg, p.Gly375Cys) · HOT SPOT**	Hot Spot	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FGFR3 [c.1138G>A, c.1138G>C, c.1123G>T, p.Gly380Arg, p.Gly375Cys]	*1*
G08005 **ACONDROPLASIA/HIPOACONDROPLASIA/PSEUDOA CONDROPLASIA · COMP, FGFR3 · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	COMP, FGFR3	*2*
G11265 **ACROCALLOSO, SÍNDROME · KIF7 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	KIF7	*1*
G02054 **ACRODERMATITIS ENTEROPÁTICA · SLC39A4 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]		

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G12073 **ACROMATOPSIA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ATF6, CNGA3, CNGB3, GNAT2, PDE6C, PDE6H
ACTI **ACTINA ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	La inmunofluorescencia no es la técnica de elección para analizar antigenicidades. Se debería solicitar una técnica específica (inmunoblot) para completar el estudio clínico. Interpretación: Negativo: Inf 1/160 Interpretación: Positivo: Sup= 1/160
DNAC **ACTINOMYCES SP DNA, MUESTRA BIOLOGICA**	RT-PCR	8	Rec. 1 Muestra/s Biopsia (1 x Contenedor con solución salina) [Refr.] Rec. 0.5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 0.5 mL Humor vitreo/acuoso (1 x Tubo estéril) [Refr.]	DNA Actinomyces sp: No se detecta
FACX **ACTIVIDAD ANTI FACTOR X, PLASMA**	Técnica Cromogénica.	2	Rec. 1 mL Plasma Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) [Cong.] Extracción entre 4 y 6 horas tras la administración por inyección subcutánea de heparina. Realizar doble centrifugación a 2300g durante 10 minutos. Separar plasma y congelar.	HBPM (Heparinas de bajo peso molecular) cada 12h: 0,60 - 1,00 UI/mL HBPM (Heparinas de bajo peso molecular) cada 24h: 1,00 - 2,00 UI/mL
AP50 **ACTIVIDAD HEMOLÍTICA VÍA ALTERNATIVA DEL COMPLEMENTO (AP50), SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	32	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	47,00 - 112,00 %

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
PP5N **ACTIVIDAD PIRIMIDINA 5NUCLEOTIDASA (P5N), SANGRE TOTAL**	Espectrometría.	47	Rec. 8 mL Sangre total Heparina sódica [Refr.] Rec. 8 mL Sangre total EDTA [Refr.] Remitir todas las muestras. Las muestras deben de llegar a nuestro laboratorio de lunes a jueves. El último día de extracción de sangre al paciente debería ser el miércoles. - Indicar edad, sexo y motivo de solicitud.	Citidina monofosfato (CMP) en sangre: 8,90 - 20,90 UI/g Hgb Uridina monofosfato (UMP) en sangre: 9,80 - 22,20 UI / g Hgb
ADALPR **ADA ADENOSINA DESAMINASA , LÍQUIDO PERICÁRDICO**	Enzimático.	3	Rec. 2 mL Líquido pericárdico [Refr.]	Sospecha de pericarditis tuberculosa: Sup 40,00 U/L
ADALA **ADA ADENOSINA DESAMINASA, LÍQUIDO ASCÍTICO**	Enzimático.	3	Rec. 2 mL Líquido ascítico [Refr.]	Sospecha de peritonitis tuberculosa : Sup 39,00 U/L
ADACR **ADA ADENOSINA DESAMINASA, LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO**	Enzimático.	3	Rec. 1 mL LCR [Refr.]	Inf 6,00 U/L
ADALPL **ADA ADENOSINA DESAMINASA, LÍQUIDO PLEURAL**	Enzimático.	3	Rec. 1 mL Líquido pleural [Refr.]	Inf 40,00 U/L
ADALS **ADA ADENOSINA DESAMINASA, LÍQUIDO SINOVIAL**	Enzimático.	3	Rec. 2 mL Líquido sinovial [Refr.]	Sospecha de artritis tuberculosa: Sup 60,00 U/L
ADAL **ADA ADENOSINA DESAMINASA, MUESTRA BIOLOGICA**	Enzimático.	3	Rec. 2 mL Líquido biológico [Refr.] Rechazo: Muestra Hemolizada	U/L Interpretación según criterio clínico

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ADASU **ADA ADENOSINA DESAMINASA, SUERO**	Enzimático.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	10,00 - 20,00 U/L
RTAD **ADALIMUMAB (HUMIRA) RESISTENCIA AL TRATAMIENTO, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] - Los motivos de la prescripción (eficacia y / o una prueba de toxicidad) -Día y hora de la extracción y última dosis -Dosis administrada, frecuencia y vía de administración -Edad, peso y altura (si es posible) -Fecha de inicio del tratamiento Información adicional:	Ac. Adalimumab : Negativo: Inf 10,00 AU/mL Adalimumab: Valle 5,00 - 10,00 µg/mL
G11129 **ADAMS OLIVER, SÍNDROME DE · NOTCH1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	NOTCH1 *1*
G11130 **ADAMS OLIVER, SÍNDROME DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ARHGAP31, DOCK6, NOTCH1, RBPJ *4*
AAD13 **ADAMTS-13 (ACTIVIDAD DE LA PROTEASA DE RUPTURA DEL FACTOR VON WILLEBRAND), PLASMA**	Electroforesis en Agarosa.	17	Rec. 2 mL Plasma Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) [Cong.]	11,00 - 100,00 %
IAD13 **ADAMTS-13 (ANTICUERPOS INHIBIDORES ANTI-PROTEASA DE RUPTURA DEL FACTOR VON WILLEBRAND), PLASMA**	Enzimoinmunoanálisis	10	Rec. 2 mL Plasma Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) [Cong.]	Negativo

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ADAMS13 **ADAMTS-13 (ANTIGENO DE LA PROTEASA DE RUPTURA DEL FACTOR VON WILLEBRAND), PLASMA**	Enzimoinmunoanálisis	22	Rec. 2 mL Plasma Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) [Cong.]	0,41 - 1,41 IU/mL
G03156 **ADENILSUCCINATO LIASA, DEFICIENCIA DE · ADSL · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ADSL
G14114 **ADENOMA HIPOFISARIO AISLADO FAMILIAR · AIP · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AIP *1*
G14118 **ADENOMA HIPOFISARIO AISLADO FAMILIAR · AIP · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AIP *1*
DAVC **ADENOVIRUS (ADV) DNA CUANTITATIVO, MUESTRA BIOLÓGICA**	PCR-Real Time.	4	Rec. 1 Muestra/s Frotis nasofaringeo (1 x Escobillón seco.) [Refr.] Rec. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Rec. 1 mL LCR (1 x Tubo estéril) [Cong.] Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío.	Límite de detección: 45 copias/mL. Límite superior de cuantificación: 25.000.000 copias/mL.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
QADV **ADENOVIRUS (ADV) DNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	PCR-Real Time.	4	Rec. 2 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 2 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Rec. 2 mL Orina (1 x Contenedor estéril) [Refr.] Rec. 2 mL LCR (1 x Tubo estéril) [Cong.] Rec. 1 Muestra/s Placenta (1 x Contenedor estéril) [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Frotis nasofaringeo (1 x Escobillón seco.) [Refr.] Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Rec. 1 mL Lavado broncoalveolar (1 x Tubo estéril) [Refr.] Alt. 0.5 mL Humor vitreo/acuoso (1 x Tubo estéril) [Cong.] Se aceptan muestras de orina para detectar adenovirus entéricos en niños con diarreas y en pacientes inmunocomprometidos y trasplantados. Este sustrato a veces inhibe la PCR (inhibidores de la orina). Muestras de placenta: enviar muestra fresca con todos los líquidos que envuelven a la placenta (en tubo estéril sin medio ni suero fisiológico) - enviar refrigerado.	DNA de Adenovirus (pedido en solitario): No se detecta La sensibilidad y la especificidad de la técnica es de un 100%. El límite de detección es 45 copias/mL.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ADEGE **ADENOVIRUS ANTICUERPOS IgG (EIA), SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Para descartar infección activa hay que valorar IgM o bien seroconversión en IgG a las 3-4 semanas con incremento del índice dos veces superior como minimo. Negativo: Inf 0,80 Indice Indeterminado: 0,80 - 1,09 Indice Positivo: Sup= 1,10 Indice
ADEME **ADENOVIRUS ANTICUERPOS IgM (EIA), SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	La POSITIVIDAD en IgM puede ser compatible con INFECCION RECIENTE. Negativo: Inf 0,80 Indice Indeterminado: 0,80 - 1,09 Indice Positivo: Sup= 1,10 Indice
ADENOR **ADENOVIRUS ANTIGENO, ASPIRADO NASOFARÍNGEO**	Inmunocromatografía.	2	Rec. 1 Muestra/s Aspirado nasofaringeo [Refr.]	
ADENO **ADENOVIRUS ANTIGENO, HECES**	Inmunocromatografía.	2	Rec. 1 g Heces (1 x Recipiente estéril) [Refr.]	Negativo
G04026 **ADHESIÓN LEUCOCITARIA, DEFICIENCIA DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FERMT3, ITGB2, SLC35C1 *3*
ADIPO **ADIPONECTINA, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	IMC (25 - 30) 2,60 - 13,70 µg/mL IMC (Inf. a 25) 3,40 - 19,50 µg/mL IMC (Sup. a 30) 1,80 - 9,40 µg/mL
ACSUP **ADRENAL CORTEX ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 1/10 Positivo: Sup= 1/10

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G03088 **ADRENOLEUCODISTROFIA · ABCD1 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABCD1 *1*
G11001 **ADRENOLEUCODISTROFIA · ABCD1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABCD1 *1*
G02050 **ADULT, SÍNDROME · TP63 ·NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TP63 *1*
G09047 **AGENESIA RENAL UNILATERAL · FREM2 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FREM2 *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
AGPL **AGREGACION PLAQUETARIA, SANGRE TOTAL**	Turbidimetría.	16	Rec. 15 mL Sangre total Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) Contactar previamente con el laboratorio para coordinar toma y envío de muestra. No realizar toma de muestras ni viernes ni vísperas de festivo. Mantener a temperatura ambiente. Remitir dentro de las primeras 4 horas tras la toma de sangre (la muestra debe de llegar al Laboratorio Central antes de las 13h). Segregar los tubos en un sobre e indicar explícitamente en él el tipo de prueba solicitada. La determinación no es realizable con recuentos plaquetarios <80.000 plaquetas/microlitro	Ácido araquidónico: 75,00 - 100,00 % ADP 1 µM: 35,00 - 100,00 % ADP 2 µM: 50,00 - 100,00 % ADP 4 µM: 78,00 - 100,00 % Colágeno 2,5 µg/mL: 75,00 - 100,00 % Epinefrina 10mM: 50,00 - 100,00 % Ristocetina 0,8 mg/mL: 33,00 - 100,00 % Ristocetina 1 mg/mL: 44,00 - 100,00 % U-46619 1,2 µM: 75,00 - 100,00 %	
G05014 **ALAGILLE 1, SÍNDROME DE · JAG1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	JAG1	*1*
G05016 **ALAGILLE 2, SÍNDROME DE · NOTCH2 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	NOTCH2	*1*
G05003 **ALAGILLE, SÍNDROME DE · JAG1 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	JAG1 [MLPA]	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G05002 **ALAGILLE, SÍNDROME DE · JAG1, NOTCH2 · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	JAG1, NOTCH2 *2*
ALBSUL **ALBENDAZOL SULFÓXIDO, SUERO**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Cong.]	500,00 - 1500,00 µg/L
G02001 **ALBINISMO · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AP3B1, BLOC1S3, BLOC1S6, C10ORF11 , DTNBP1, GPR143, HPS1, HPS3, HPS4, HPS5, HPS6, LYST, MC1R, MITF, MLPH, MYO5A, OCA2, RAB27A, SLC24A5, SLC45A2, TYR, TYRP1 *22*
G12001 **ALBINISMO OCULAR TIPO I (TIPO NETTLESHIP-FALLS) · GPR143 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GPR143 *1*
G12064 **ALBINISMO OCULAR/OCULO-CUTÁNEO · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FRMD7, GPR143, LRMDA, MC1R, OCA2, SLC24A2, SLC24A5, TYR, TYRP1 *9*
G02003 **ALBINISMO OCULOCUTANEO (TIPO IA Y IB) · TYR · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TYR *1*
G02057 **ALBINISMO OCULOCUTANEO (TIPO II) Y OCULOCUTANEO CAFÉ · OCA2 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA (2 tubos)) [Refr.]	OCA2 *1*
G02002 **ALBINISMO OCULOCUTANEO (TIPO II) Y OCULOCUTANEO CAFÉ · OCA2 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	OCA2 *1*
G02004 **ALBINISMO OCULOCUTANEO TIPO IV · SLC45A2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SLC45A2 *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ALBLCR **ALBUMINA L.C.R.**	Nefelometría - Turbidimetría.	2	Rec. 1 mL LCR [Refr.]	Inf 35,00 mg/dL
A **ALBÚMINA SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	35,00 - 52,00 g/L
ALBL **ALBUMINA, LÍQUIDO BIOLÓGICO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Líquido biológico [Refr.]	g/L Interpretación según criterio clínico
ALLS **ALBÚMINA, LÍQUIDO SINOVIAL**	Espectrometría.	2	Rec. 1 mL Líquido sinovial (1 x Tubo 5 mL.) [Refr.]	g/L Interpretación según criterio clínico
ALCAL **ALCALINIDAD, AGUA**	Potenciometría directa.	5	Rec. 100 mL Agua (1 x Envase aséptico) [Refr.]	Inf 0,20 mg/L
ALDO **ALDOLASA, SUERO**	Espectrometría.	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Inf= 7,60 U/L
ALD15 **ALDOSTERONA (15'), SUERO**	Radioinmunoanálisis.	5	Rec. 0.5 mL Suero 15 m. [Refr.]	ng/dL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
ALD240 **ALDOSTERONA (240'), SUERO**	Radioinmunoanálisis.	5	Rec. 0.5 mL Suero 240 m. [Refr.]	ng/dL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ALD30 **ALDOSTERONA (30'), SUERO**	Radioinmunoanálisis.	4	Rec. 0.5 mL Suero 30 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] El ejercicio agotador y el estrés pueden estimular las secreciones adrenocorticales y elevar el nivel de aldosterona. La ingestión excesiva de regaliz puede disminuir los niveles, ya que esa sustancia produce un efecto similar al de la aldosterona. La postura, la dieta y el embarazo influyen en el resultado. Supender los fármacos que alteran el equilibrio de sodio, potasio y líquidos (p. ej., diuréticos, hipotensores, esteroides)	ng/dL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ALD60 **ALDOSTERONA (60'), SUERO**	Radioinmunoanálisis.	4	Rec. 0.5 mL Suero 60 m. [Refr.] El ejercicio agotador y el estrés pueden estimular las secreciones adrenocorticales y elevar el nivel de aldosterona. La ingestión excesiva de regaliz puede disminuir los niveles, ya que esa sustancia produce un efecto similar al de la aldosterona. La postura, la dieta y el embarazo influyen en el resultado. Supender los fármacos que alteran el equilibrio de sodio, potasio y líquidos (p. ej., diuréticos, hipotensores, esteroides)	ng/dL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ALD120 **ALDOSTERONA (120'), SUERO**	Radioinmunoanálisis.	4	Rec. 0.5 mL Suero 120 m. [Refr.] El ejercicio agotador y el estrés pueden estimular las secreciones adrenocorticales y elevar el nivel de aldosterona. La ingestión excesiva de regaliz puede disminuir los niveles, ya que esa sustancia produce un efecto similar al de la aldosterona. La postura, la dieta y el embarazo influyen en el resultado. Supender los fármacos que alteran el equilibrio de sodio, potasio y líquidos (p. ej., diuréticos, hipotensores, esteroides)	ng/dL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ALD90 **ALDOSTERONA (90'), SUERO**	Radioinmunoanálisis.	4	Rec. 0.5 mL Suero 90 m. [Refr.] El ejercicio agotador y el estrés pueden estimular las secreciones adrenocorticales y elevar el nivel de aldosterona. La ingestión excesiva de regaliz puede disminuir los niveles, ya que esa sustancia produce un efecto similar al de la aldosterona. La postura, la dieta y el embarazo influyen en el resultado. Supender los fármacos que alteran el equilibrio de sodio, potasio y líquidos (p. ej., diuréticos, hipotensores, esteroides)	ng/dL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
ALDOR **ALDOSTERONA (POSICIÓN ORTOSTÁTICA), SUERO**	Radioinmunoanálisis.	4	Rec. 0.5 mL Suero posición ortostática (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Supender los fármacos que alteran el equilibrio de sodio, potasio y líquidos (p. ej., diuréticos, hipotensores, esteroides) La postura, la dieta y el embarazo influyen en el resultado.	El ejercicio agotador y el estrés pueden estimular las secreciones adrenocorticales y elevar el nivel de aldosterona. Posición ortostática Ambos 2 - 10 Años 5,00 - 80,00 ng/dL Posición ortostática Ambos 10 - 15 Años 4,00 - 48,00 ng/dL Posición ortostática Ambos Sup - 16 Años 3,50 - 30,00 ng/dL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ALDDS				
ALDOSTERONA (SUPINA), SUERO	Radioinmunoanálisis.	4	Rec. 0.5 mL Suero posición supina (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Supender los fármacos que alteran el equilibrio de sodio, potasio y líquidos (p. ej., diuréticos, hipotensores, esteroides) La postura, la dieta y el embarazo influyen en el resultado.	El ejercicio agotador y el estrés pueden estimular las secreciones adrenocorticales y elevar el nivel de aldosterona. Posición supina 1,00 - 16,00 ng/dL Posición supina Ambos 2 - 10 Años 3,00 - 35,00 ng/dL Posición supina Ambos 10 - 15 Años 2,00 - 22,00 ng/dL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ADTO **ALDOSTERONA, ORINA 24H**	Radioinmunoanálisis.	4	Rec. 10 mL Orina 24h. (alícuota) (1 x Contenedor 2500 mL.) [Refr.] Recoger orina de 24 horas con ácido bórico (10g/L) como preservante La ingestión excesiva de regaliz puede disminuir los niveles, ya que esa sustancia produce un efecto similar al de la aldosterona. El ejercicio agotador y el estrés pueden estimular las secreciones adrenocorticales y elevar el nivel de aldosterona. La postura, la dieta y el embarazo influyen en el resultado. Supender los fármacos que alteran el equilibrio de sodio, potasio y líquidos (p. ej., diuréticos, hipotensores, esteroides)	Excreción (24h): Inf 18,00 µg/24 h Volumen de orina remitido (diuresis): 600,00 - 1600,00 mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ALDT **ALDOSTERONA, SUERO**	Radioinmunoanálisis.	4	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rechazo: Muestras refrigeradas más de 48h. Suspender los fármacos que alteran el equilibrio de sodio, potasio y líquidos (p. ej., diuréticos, hipotensores, esteroides) La postura, la dieta y el embarazo influyen en el resultado.	El ejercicio agotador y el estrés pueden estimular las secreciones adrenocorticales y elevar el nivel de aldosterona. Ambos 1 - 12 Meses 5,00 - 90,00 ng/dL Recién Nacidos 5,00 - 175,00 ng/dL Ambos 1 - 2 Años 7,00 - 54,00 ng/dL Posición ortostática Ambos 2 - 10 Años 5,00 - 80,00 ng/dL Posición supina Ambos 2 - 10 Años 3,00 - 35,00 ng/dL Posición ortostática Ambos 10 - 15 Años 4,00 - 48,00 ng/dL Posición supina Ambos 10 - 15 Años 2,00 - 22,00 ng/dL Posición supina Ambos Sup - 16 Años 1,00 - 16,00 ng/dL Posición ortostática Ambos Sup - 16 Años 3,50 - 30,00 ng/dL
RARP **ALDOSTERONA/RENINA RELACIÓN, PLASMA**	Radioinmunoanálisis.	4	Rec. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Relación aldosterona/renina, plasma: 1,50 - 11,00
G4235 **ALEXANDER, ENFERMEDAD DE · GFAP · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GFAP *1*
A1AH **ALFA 1 ANTITRIPSINA, HECES**	Nefelometría - Turbidimetría.	3	Rec. 0.5 g Heces [Refr.]	Alfa 1 antitripsina en heces: Inf 0,76 mg/g heces hum
AAT **ALFA 1 ANTITRIPSINA, SUERO**	Turbidimetría.	1	Rec. 0.4 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.4 mL Plasma Heparina litio (1 x Tubo sangre heparina litio) [Refr.]	90,00 - 200,00 mg/dL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
AFPAM **ALFA 1 FETOPROTEINA, LÍQUIDO AMNIÓTICO**	Quimioluminiscencia.	7	Rec. 10 mL Líquido amniótico [Refr.] Se requiere la semana de gestación.	Mediana: 15 semanas de gestación 16000,00 ng/mL Mediana: 16 semanas de gestación 13500,00 ng/mL Mediana: 17 semanas de gestación 11500,00 ng/mL Mediana: 18 semanas de gestación 9700,00 ng/mL Mediana: 19 semanas de gestación 8200,00 ng/mL Mediana: 20 semanas de gestación 7000,00 ng/mL Mediana: 21 semanas de gestación 5900,00 ng/mL
AFPL **ALFA 1 FETOPROTEINA, MUESTRA BIOLOLÓGICA**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Líquido biológico [Refr.]	ng/mL Interpretación según criterio clínico
AFP **ALFA 1 FETOPROTEINA, SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Se requiere la semana de gestación.	Inf 10,00 ng/mL
AGA **ALFA 1 GLUCOPROTEINA ACIDA, SUERO**	Nefelometría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	50,00 - 120,00 mg/dL
A2MAO **ALFA 2 MACROGLOBULINA, ORINA**	Nefelometría - Turbidimetría.	5	Rec. 10 mL Orina [Refr.]	Inf 2,50 mg/L
A2MA **ALFA 2 MACROGLOBULINA, SUERO**	Nefelometría.	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	130,00 - 300,00 mg/dL
ACA **ALFA CAROTENO, SUERO**	Cromatografía Líquida Alta Resolución / Espectrometria.	12	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Separar y congelar inmediatamente. Muestra protegida de la luz	Inf 350,00 µg/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ACFOD **ALFA FODRINA ANTICUERPOS, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	14	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Alfa fodrina anticuerpos IgA: Negativo: Inf 10,00 U/mL Alfa fodrina anticuerpos IgG: Negativo: Inf 10,00 U/mL
AGLASG **ALFA GALACTOSIDASA A (ENF FABRY),SANGRE SECA**	Fluorimetría.	17	Rec. 1 mL Sangre seca en papel de filtro (1 x Papel de filtro Whatman 903) Recoger gotas de sangre sin anticoagulante en papel de filtro. Dejar secar al aire libre durante 1 hora. Guardar en nevera en bolsa de plástico cerrada hasta el envío. Volumen mínimo: 2 círculos de 10 mm - Volumen óptimo: 4 círculos de 10 mm Evitar envíos los viernes y vísperas de festivos.	4,71 - 18,79 µmol/L x h
AGLASU **ALFA GALACTOSIDASA A, SUERO**	Fluorimetría.	17	Rec. 8.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Alt. 8.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo 10 mL.) [Cong.] - Antes de centrifugar esperar a la retracción del coágulo - Ayuno. Evitar hemólisis. - Se precisa resumen de la historia clínica del paciente.	2,40 - 10,20 nmol/h/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
AGPSE **ALFA GLUCOSIDASA, PLASMA SEMINAL**	Espectrometría.	6	Rec. 1 mL Plasma seminal [Cong.] Muestra que debe recogerse después de 2 a 5 días de abstinencia. Recoger muestra en frasco estéril y dejar 30 minutos a 37ºC para su licuefacción total. Separar una alícuota y centrifugar 10 minutos a 1000g. Separar sobrenadante (1 mL de plasma seminal) en tubo de fluoruro y congelar a -20ºC. Indicar siempre el volumen del eyaculado, el pH y el conteo de espermatozoides. Centrifugar y congelar el sobrenadante inmediatamente.	Sup 6,35 mU/mL
HBDH **ALFA HIDROXIBUTIRICO DESHIDROGENASA, SUERO**	Espectrometría.	10	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.] Alt. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	72,00 - 182,00 U/L
ACINT **ALFA INTERFERON ANTICUERPOS, SUERO**	Test de neutralización	25	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 1/2 Positivo: Sup= 1/2

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
AITFLC **ALFA INTERFERON, LCR**	Enzimoinmunoanálisis	17	Rec. 1 mL LCR [Refr.]	El nivel de interferón LCR se debe interpretar con respecto a nivel sérico. LCR Interferon Sup Interferon suero sugiere producción intracecal. LCR Interferon Inf Interferon suero sugiere producción intracecal o trasudado. Dentro de la producción de interferón intracecal puede estar relacionada con meningitis viral o encefalitis. Tambien puede ser observada en el Lupus o en algunos tipos de encefalitis familiar. Inf 2,00 UI/mL	
AITFS **ALFA INTERFERON, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	23	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	Inf 2,00 UI/mL	
G04033 **ALFA TALASEMIA · HBA1, HBA2 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	HBA1, HBA2	*2*
G04070 **ALFA TALASEMIA · HBA1, HBA2 · SANGER+MLPA**	Secuenciación Sanger + MLPA	25	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA (2 tubos)) [Refr.]	Se informa para cada paciente HBA1, HBA2	*2*
G10016 **ALFA-1 ANTITRIPSINA, DEFICIENCIA DE · SERPINA1 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SERPINA1	*1*
G10017 **ALFA-1 ANTITRIPSINA, DEFICIENCIA DE · SERPINA1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SERPINA1	*1*
A1MO **ALFA1 MICROGLOBULINA, ORINA / CREATININA**	Nefelometría.	7	Rec. 1 mL Orina [Refr.]	Excreción (creatinina): Inf 14,00 mg/gr crea Alfa 1 microglobulina en orina (concentración): Inf 12,00 mg/L Creatinina en orina : mg/dL Interpretación según criterio clínico	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
A14GS **ALFA-1,4-GLUCOSIDASA EN SANGRE SECA (ENF. DE POMPE)**	Fluorimetría.	17	Rec. 1 Muestra/s Sangre seca en papel de filtro (1 x Papel de filtro Whatman 903) Coordinar previamente toma y envío de muestras con el laboratorio.	0,47 - 8,27 nmol/21h
GA1AT **ALFA-1-ANTITRIPSINA (GENOTIPO Pi*S y Pi*Z), DEFICIENCIA DE · SERPINA1 ·PCR**	Hot Spot	12	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Se informa para cada paciente *1* SERPINA1 [Alelos Pi*S, Pi*Z]
A2AP **ALFA-2 ANTIPLASMINA, PLASMA**	Técnica Cromogénica.	12	Rec. 0.5 mL Plasma Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) [Cong.] Separar y congelar inmediatamente.	80,00 - 120,00 %
ALFEN **ALFA-ENOLASA ANTICUERPOS, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	32	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 1,00 Índice
AGLA **ALFA-GALACTOSIDASA A EN LEUCOCITOS (ENF. DE FABRY) (NECESARIO AVISO PREVIO)**	Fluorimetría.	30	Rec. 10 mL Leucocitos Heparina sódica (1 x Tubo sangre heparina litio) Indispensable aviso previo.	15,00 - 50 nmol/h/mg pr
POMP **ALFA-GLUCOSIDASA (ENFERMEDAD DE POMPE), SANGRE TOTAL**	Fluorimetría.	32	Rec. 3 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) Coordinar previamente toma y envío de muestras con el laboratorio. Consultar con el laboratorio otro tipo de muestra.	6,00 - 32,00 nmol/h/mg

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
MSH **ALFA-MSH, PLASMA**	Radioinmunoanálisis.	17	Rec. 2 mL Plasma EDTA Aprotinina (1 x Tubo Sangre EDTA Aprotinina) [Cong.] Separar y congelar inmediatamente.	9,00 - 18,00 pmol/L
COAPVPOR **ALFA-PVP (ALFA -PIRROLIDINOPENTIOFENONA) CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), ORINA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 5 mL Orina [Refr.]	Se utiliza como criterio de Positividad que la concentración sea superior o igual al valor del límite de cuantificación más el valor de incertidumbre del ensayo. En caso contrario, el resultado es Negativo. Incertidumbre de medida: 5,00 ng/mL Límite de cuantificación: 20,00 ng/mL
COAPVPSA **ALFA-PVP (ALFA -PIRROLIDINOPENTIOFENONA) CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SALIVA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 1 mL Saliva	Incertidumbre de medida: 0,40 ng/mL Límite de cuantificación: 2,00 ng/mL
COAPVPST **ALFA-PVP (ALFA -PIRROLIDINOPENTIOFENONA) CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SANGRE TOTAL**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 5 mL Sangre total Oxalato/Fluoruro (1 x Tubo Sangre Total-Oxalato/Fluoruro) [Refr.] Alt. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Tubo oxalato potásico/Fluoruro sódico Ref. SAP 600088318	Incertidumbre de medida: 2,00 ng/mL Límite de cuantificación: 10,00 ng/mL
G03199 **ALFA-TRIPTASEMIA HEREDITARIA · TPSAB1, TPSB2· ddPCR**	Digital droplet PCR (ddPCR)	15	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TPSAB1, TPSB2 *2*
G01159 **ALMACENAMIENTO DE ESTERES DE COLESTEROL, ENFERMEDAD POR · LIPA · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	LIPA *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G03144 **ALMACENAMIENTO DE GLUCÓGENO TIPO 2, ENFERMEDAD DE · GAA · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GAA	*1*
G03146 **ALMACENAMIENTO DE GLUCÓGENO TIPO 2,ENFERMEDAD DE · GAA · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GAA	*1*
G03125 **ALMACENAMIENTO DE GLUCÓGENO TIPO 3, ENFERMEDAD DE · AGL · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AGL	*1*
G9555 **ALPORT AR, SÍNDROME DE · COL4A3, COL4A4 · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	COL4A3, COL4A4	*2*
G09056 **ALPORT, SÍNDROME DE · COL4A3 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Indicado en informe adjunto COL4A3	*1*
G09013 **ALPORT, SÍNDROME DE · COL4A3 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	COL4A3	*1*
G09055 **ALPORT, SÍNDROME DE · COL4A4 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Indicado en informe adjunto COL4A4	*1*
G09014 **ALPORT, SÍNDROME DE · COL4A4 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	COL4A4	*1*
G09051 **ALPORT, SÍNDROME DE · COL4A5 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	COL4A5	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G09015 **ALPORT, SÍNDROME DE · COL4A5 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	COL4A5 *1*
ALPR **ALPRAZOLAM (TRANKIMAZIN), SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.] -Dosis administrada, frecuencia y vía de administración La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis. Rechazo: Muestra hemolizada, lipémica y/o ictérica	I.Terapéutico: 5,00 - 50,00 µg/L Toxicidad: 100,00 - 400,00 µg/L Límite de cuantificación: 2,00 µg/L
G09036 **ALSTRÖM, SÍNDROME DE · ALMS1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ALMS1 *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
BIOM **ALTERACIONES DEL SUEÑO-BIORRITMO DE MELATONINA, SALIVA**	Radioinmunoanálisis.	11	Rec. 1 mL Saliva (1 x Kit específico) [Cong.] Durante los 60 minutos antes de obtener su muestra de saliva no ingiera alimentos, no beba, no fume ni mastique chicle. Kit especifico Salivette. La extracción debe realizarse a las 22:00h, 2:00h, 4:00h y 8:00h La muestra debe recepcionarse dentro de las 24 horas posteriores a su obtención. En caso de que el tiempo de envío sea mayor, enviar congelado a -20ºC. No es necesario estar en ayunas.	Melatonina 2 h: 25,00 - 70,00 pg/mL Melatonina 22 h: 5,00 - 20,00 pg/mL Melatonina 4 h: 15,00 - 40,00 pg/mL Melatonina 8 h: 10,00 - 25,00 pg/mL
AGAL **ALUMINIO, AGUA**	Absorción atómica.	10	Rec. 100 mL Agua (1 x Envase aséptico) [Refr.] Alt. 100 mL Agua (1 x Envase aséptico) (<2 Ác.nítrico)	Agua de diálisis Inf 10,00 µg/L Agua de red Inf 200,00 µg/L
ALUO **ALUMINIO, ORINA FINAL DE JORNADA**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	4	Rec. 2 mL Orina final jornada (1 x Contenedor 25 mL.) [Refr.] Final de la jornada laboral.	: Límite de cuantificación: 5,00 µg/L Aluminio en orina : Valor biológico de tolerancia - BAT (MAK&BAT): Final de la jornada laboral 50,00 µg/g crea Aluminio en orina : Valor biológico de tolerancia - BAT (MAK&BAT): No expuestos Inf 15 µg/g crea

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ALU **ALUMINIO, SUERO**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	4	Rec. 0.9 mL Suero (libre trazas metales) (1 x Tubo Suero metales traza) [Refr.] Alt. 0.9 mL Plasma Heparina litio (1 x Tubo Sangre Heparina litio metales traza) [Refr.] Tubo especial.	Inf 10,00 µg/L Pacientes hemodializados Inf 60,00 µg/L
G3073 **ALZHEIMER (ADGEN), ENFERMEDAD DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Saliva (1 x Oragene OG-510)	APOE [(c.388T>C, p.Cys130Arg), (c.526C>T, p.Arg176Cys)] , APP, PSEN1, PSEN2 *4*
APOEG **ALZHEIMER (GENOTIPO APOE), SUSCEPTIBILIDAD A · APOE · RT-PCR**	PCR-Real Time.	7	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	APOE *1*
G3149 **ALZHEIMER, ENFERMEDAD DE · PSEN1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PSEN1 *1*
G11257 **ALZHEIMER, ENFERMEDAD DE · PSEN2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PSEN2 *1*
G11187 **ALZHEIMER, PARKINSON Y OTRAS DEMENCIAS · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	APOE, APP, ATP13A2, ATP6AP2, C9orf72, CHMP2B, CSF1R, DCTN1 , DNAJC6, FBXO7, FUS, GIGYF2, GRN, HNRNPA2B1, HTRA2, ITM2B, LRRK2 , MAPT, PARK7, PINK1, PLA2G6, PRNP, PSEN1, PSEN2, SLC6A3 , SNCA, SQSTM1, SYNJ1, TAF1, TARDBP , TBK1 , TREM2, TYROBP, UBQLN2, VCP, VPS35 *36*
AMANI **AMANITINAS, ORINA**	Enzimoinmunoanálisis	2	Rec. 5 mL Orina [Refr.]	Inf 5,00

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G12066 **AMAUROSIS CONGÉNITA DE LEBER 9 · NMNAT1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	NMNAT1	*1*
G12082 **AMAUROSIS CONGÉNITA DE LEBER · PANEL · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Se informa para cada paciente CEP290 [c.2991+1655A>G; p.Cys998X] , GUCY2D, RDH12, RPGRIP1	*4*
G12002 **AMAUROSIS CONGÉNITA DE LEBER · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AIPL1, ALMS1, CABP4, CEP290, CNGA3, CRB1, CRX, GDF6, GUCY2D, IMPDH1, IQCB1, KCNJ13, LCA5, LRAT, MYO7A, NMNAT1, PRPH2, RD3, RDH12, ROM1, RPE65, RPGRIP1, SPATA7, TULP1	*24*
G12070 **AMAUROSIS CONGÉNITA DE LEBER · RDH12 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	RDH12	*1*
G12003 **AMAUROSIS CONGÉNITA DE LEBER TIPO 2 · RPE65 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	RPE65	*1*
AMIK **AMIKACINA [BICLIN, KANBINE] , SUERO**	Inmunoanálisis enzimático	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.] Especificar la toma en pico o valle.	I.Terapéutico: Pico 20,00 - 25,00 µg/mL I.Terapéutico: Valle 5,00 - 10,00 µg/mL Toxicidad: Pico Sup 35,00 µg/mL Toxicidad: Valle Sup 10,00 µg/mL	
AMISAL2 **AMILASA (2ª MUESTRA), SALIVA**	Espectrometría.	3	Rec. 1 mL Saliva (1 x Salivette) [Refr.]	80000,00 - 625000,00 U/L	
AMISAL3 **AMILASA (3ª MUESTRA), SALIVA**	Espectrometría.	3	Rec. 1 mL Saliva (1 x Salivette) [Refr.]	80000,00 - 625000,00 U/L	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
AMILP **AMILASA PANCREÁTICA (ALFA AMILASA), SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	8,00 - 53,00 U/L
AMILO **AMILASA TOTAL (ALFA AMILASA), ORINA**	Espectrometría.	1	Rec. 10 mL Orina [Refr.]	Inf 550,00 U/L
AM24 **AMILASA TOTAL (ALFA AMILASA), ORINA 24H**	Espectrometría.	1	Rec. 10 mL Orina 24h. (alícuota) (1 x Contenedor 2500 mL.) [Refr.]	Amilasa en orina de 24 horas: Inf 450,00 U/24h Volumen de orina remitido (diuresis): 600,00 - 1600,00 mL
AMIL **AMILASA TOTAL (ALFA AMILASA), SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Las soluciones de dextrosa pueden causar un resultado negativo falso.	28,00 - 100,00 U/L
AMILL **AMILASA, LÍQUIDO BIOLÓGICO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Líquido biológico [Refr.]	U/L Interpretación según criterio clínico
AMISAL **AMILASA, SALIVA**	Espectrometría.	3	Rec. 1 mL Saliva (1 x Salivette) [Refr.]	80000,00 - 625000,00 U/L
G9639 **AMILOIDOSIS · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	APOA1, B2M, CST3, FGA, GSN, IL31RA, LYZ, MEFV , NLRP3, OSMR, PRNP, RET, TGFBI, TNFRSF1A , TTR *15*
G4069 **AMILOIDOSIS HEREDIATRIA · TTR · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TTR *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
AAGR **AMINOACIDOGRAMA - ESTUDIO DE AMINOÁCIDOS LIBRES (SIN INTERPRETACIÓN), PLASMA**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	12	Rec. 1 mL Plasma Heparina litio (1 x Tubo sangre heparina litio) [Cong.] Ayuno mínimo de 8 horas.	Se informa para cada paciente
AALCQ **AMINOACIDOS (ESTUDIO COMPLETO), LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO**	Ultra Cromatografía Líquida de Alta Presión con Espectrometría de Masas en Tándem (UHPLC MS/MS)	30	Rec. 1 mL LCR (1 x Tubo estéril) [Cong.]	Se informa para cada paciente
AAORQ **AMINOÁCIDOS PEDIÁTRICOS, ORINA**	Ultra Cromatografía Líquida de Alta Presión con Espectrometría de Masas en Tándem (UHPLC MS/MS)	28	Rec. 25 mL Orina (1 x Contenedor estéril) [Cong.] Alt. 25 mL Orina 24h. (alícuota) [Cong.] Solicitar en pacientes neonatos con sospecha de errores congénitos del metabolismo de los aminoácidos (aminoacidopatías)	Indicado en informe adjunto

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
AAPLQ **AMINOÁCIDOS PEDIÁTRICOS, PLASMA**	Ultra Cromatografía Líquida de Alta Presión con Espectrometría de Masas en Tándem (UHPLC MS/MS)	30	Rec. 2 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] - Resumen de la historia clínica del paciente. Adolescentes: 12- 18 años y adultos: >18 años Ayuno mínimo de 8 horas. Centrifugar la muestra de sangre a 2500rpm 10 minutos a temperatura ambiente en las primeras 2 horas de su obtención, separar el sobrenadante a otro tubo y congelarlo inmediatamente a -20ºC.	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
AAOM **AMINOÁCIDOS, ORINA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	7	Rec. 10 mL Orina (1 x Contenedor estéril) [Cong.] Para el estudio de aminoacidopatías en pacientes pediátricos, se recomienda el análisis del perfil de aminoácidos orientado a esta población (Código AAORQ)	Alanina: Ambos 0 - 30 Días 41,00 - 276,00 mmol/mol crea Alanina: Ambos 30 - 365 Días 51,00 - 223,00 mmol/mol crea Alanina: Ambos 1 - 3 Años 38,00 - 188,00 mmol/mol crea Alanina: Ambos 3 - 13 Años 14,00 - 106,00 mmol/mol crea Alanina: Ambos Sup - 13 Años 9,00 - 47,00 mmol/mol crea Arginina: Ambos 0 - 30 Días Inf= 95,00 mmol/mol crea Arginina: Ambos 30 - 365 Días Inf= 41,00 mmol/mol crea Arginina: Ambos 1 - 3 Años Inf= 15,00 mmol/mol crea Arginina: Ambos 3 - 13 Años Inf= 13,00 mmol/mol crea Arginina: Ambos Sup - 13 Años Inf= 10,00 mmol/mol crea Asparragina: Ambos 0 - 30 Días 2,00 - 140,00 mmol/mol crea Asparragina: Ambos 30 - 365 Días 8,00 - 68,00 mmol/mol crea Asparragina: Ambos 1 - 3 Años 1,00 - 60,00 mmol/mol crea Asparragina: Ambos 3 - 13 Años 2,00 - 32,00 mmol/mol crea Asparragina: Ambos Sup - 13 Años 0,70 - 22,00 mmol/mol crea Ácido aspártico: Ambos 0 - 30 Días Inf= 23,00 mmol/mol crea Ácido aspártico: Ambos 30 - 365 Días Inf= 15,00 mmol/mol crea Ácido aspártico: Ambos 1 - 3 Años Inf= 7,00 mmol/mol crea Ácido aspártico: Ambos 3 - 13 Años Inf= 4,00 mmol/mol crea Ácido aspártico: Ambos Sup - 13 Años Inf= 2,00 mmol/mol crea Glutamina: Ambos 0 - 30 Días 18,00 - 383,00 mmol/mol crea Glutamina: Ambos 30 - 365 Días 23,00 - 497,00 mmol/mol crea Glutamina: Ambos 1 - 3 Años 34,00 - 242,00 mmol/mol crea Glutamina: Ambos 3 - 13 Años 13,00 - 187,00 mmol/mol crea Glutamina: Ambos Sup - 13 Años 4,00 - 93,00 mmol/mol crea Ácido glutámico: Ambos 0 - 30 Días Inf= 78,00 mmol/mol crea Ácido glutámico: Ambos 30 - 365 Días Inf= 40,00 mmol/mol crea Ácido glutámico: Ambos 1 - 3 Años Inf= 22,00 mmol/mol crea Ácido glutámico: Ambos 3 - 13 Años Inf= 16,00 mmol/mol crea Ácido glutámico: Ambos Sup - 13 Años Inf= 12,00 mmol/mol crea Glicina: Ambos 0 - 30 Días 104,00 - 1845,00 mmol/mol crea Glicina: Ambos 30 - 365 Días 124,00 - 826,00 mmol/mol crea Glicina: Ambos 1 - 3 Años 120,00 - 784,00 mmol/mol crea Glicina: Ambos 3 - 13 Años 58,00 - 588,00 mmol/mol crea Glicina: Ambos Sup - 13 Años 28,00 - 360,00 mmol/mol crea Histidina: Ambos 0 - 30 Días 67,00 - 433,00 mmol/mol crea Histidina: Ambos 30 - 365 Días 34,00 - 433,00 mmol/mol crea Histidina: Ambos 1 - 3 Años 64,00 - 457,00 mmol/mol crea Histidina: Ambos 3 - 13 Años 42,00 - 285,00 mmol/mol crea Histidina: Ambos Sup - 13 Años 11,00 - 180,00 mmol/mol crea 4-hidroxiprolina: Ambos 0 - 30 Días Inf= 178,00 mmol/mol crea 4-hidroxiprolina: Ambos 30 - 365 Días Inf= 91,00 mmol/mol crea 4-hidroxiprolina: Ambos 1 - 3 Años Inf= 5,00 mmol/mol crea 4-hidroxiprolina: Ambos 3 - 13 Años Inf= 3,40 mmol/mol crea 4-hidroxiprolina: Ambos Sup - 13 Años Inf= 3,40 mmol/mol crea

MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
			Isoleucina: Ambos 0 - 30 Días 1,90 - 17,00 mmol/mol crea Isoleucina: Ambos 30 - 365 Días 1,70 - 13,00 mmol/mol crea Isoleucina: Ambos 1 - 3 Años 0,90 - 7,00 mmol/mol crea Isoleucina: Ambos 3 - 13 Años 0,70 - 4,00 mmol/mol crea Isoleucina: Ambos Sup - 13 Años 0,20 - 3,40 mmol/mol crea Leucina: Ambos 0 - 30 Días 3,60 - 42,00 mmol/mol crea Leucina: Ambos 30 - 365 Días 2,00 - 34,00 mmol/mol crea Leucina: Ambos 1 - 3 Años 2,00 - 17,00 mmol/mol crea Leucina: Ambos 3 - 13 Años 1,00 - 11,00 mmol/mol crea Leucina: Ambos Sup - 13 Años 0,50 - 7,00 mmol/mol crea Lisina: Ambos 0 - 30 Días 12,00 - 256,00 mmol/mol crea Lisina: Ambos 30 - 365 Días 5,00 - 146,00 mmol/mol crea Lisina: Ambos 1 - 3 Años 7,00 - 89,00 mmol/mol crea Lisina: Ambos 3 - 13 Años 4,00 - 58,00 mmol/mol crea Lisina: Ambos Sup - 13 Años 2,00 - 39,00 mmol/mol crea Metionina: Ambos 0 - 30 Días Inf= 12,00 mmol/mol crea Metionina: Ambos 30 - 365 Días Inf= 12,00 mmol/mol crea Metionina: Ambos 1 - 3 Años Inf= 5,00 mmol/mol crea Metionina: Ambos 3 - 13 Años Inf= 3,50 mmol/mol crea Metionina: Ambos Sup - 13 Años Inf= 2,50 mmol/mol crea Ornitina: Ambos 0 - 30 Días Inf= 31,00 mmol/mol crea Ornitina: Ambos 30 - 365 Días Inf= 20,00 mmol/mol crea Ornitina: Ambos 1 - 3 Años Inf= 10,00 mmol/mol crea Ornitina: Ambos 3 - 13 Años Inf= 7,00 mmol/mol crea Ornitina: Ambos Sup - 13 Años Inf= 5,00 mmol/mol crea Fenilalanina: Ambos 0 - 30 Días 4,60 - 32,00 mmol/mol crea Fenilalanina: Ambos 30 - 365 Días 5,00 - 26,00 mmol/mol crea Fenilalanina: Ambos 1 - 3 Años 6,00 - 28,00 mmol/mol crea Fenilalanina: Ambos 3 - 13 Años 3,40 - 23,00 mmol/mol crea Fenilalanina: Ambos Sup - 13 Años 1,60 - 11,00 mmol/mol crea Prolina: Ambos 0 - 30 Días 2,00 - 200,00 mmol/mol crea Prolina: Ambos 30 - 365 Días 2,00 - 200,00 mmol/mol crea Prolina: Ambos 1 - 3 Años Inf= 17,00 mmol/mol crea Prolina: Ambos 3 - 13 Años Inf= 9,00 mmol/mol crea Prolina: Ambos Sup - 13 Años Inf= 4,00 mmol/mol crea Serina: Ambos 0 - 30 Días 17,00 - 425,00 mmol/mol crea Serina: Ambos 30 - 365 Días 24,00 - 259,00 mmol/mol crea Serina: Ambos 1 - 3 Años 15,00 - 171,00 mmol/mol crea Serina: Ambos 3 - 13 Años 2,30 - 116,00 mmol/mol crea Serina: Ambos Sup - 13 Años 0,50 - 83,00 mmol/mol crea Taurina: Ambos 0 - 30 Días 8,00 - 900,00 mmol/mol crea Taurina: Ambos 30 - 365 Días 8,00 - 515,00 mmol/mol crea Taurina: Ambos 1 - 3 Años Inf 383,00 mmol/mol crea Taurina: Ambos 3 - 13 Años 8,00 - 397,00 mmol/mol crea Taurina: Ambos Sup - 13 Años 7,00 - 288,00 mmol/mol crea Treonina: Ambos 0 - 30 Días 6,00 - 282,00 mmol/mol crea

MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
			Treonina: Ambos 30 - 365 Días 5,00 - 96,00 mmol/mol crea Treonina: Ambos 1 - 3 Años 5,00 - 74,00 mmol/mol crea Treonina: Ambos 3 - 13 Años 5,00 - 53,00 mmol/mol crea Treonina: Ambos Sup - 13 Años 0,70 - 42,00 mmol/mol crea Triptófano: Ambos 0 - 30 Días 0,10 - 42,00 mmol/mol crea Triptófano: Ambos 30 - 365 Días 3,00 - 42,00 mmol/mol crea Triptófano: Ambos 1 - 3 Años 1,00 - 42,00 mmol/mol crea Triptófano: Ambos 3 - 13 Años 2,00 - 22,00 mmol/mol crea Triptófano: Ambos Sup - 13 Años 0,80 - 17,00 mmol/mol crea Tirosina: Ambos 0 - 30 Días Inf= 84,00 mmol/mol crea Tirosina: Ambos 30 - 365 Días Inf= 94,00 mmol/mol crea Tirosina: Ambos 1 - 3 Años Inf= 56,00 mmol/mol crea Tirosina: Ambos 3 - 13 Años Inf= 34,00 mmol/mol crea Tirosina: Ambos Sup - 13 Años Inf= 20,00 mmol/mol crea Valina: Ambos 0 - 30 Días 1,00 - 60,00 mmol/mol crea Valina: Ambos 30 - 365 Días 1,00 - 52,00 mmol/mol crea Valina: Ambos 1 - 3 Años 1,00 - 23,00 mmol/mol crea Valina: Ambos 3 - 13 Años 1,00 - 17,00 mmol/mol crea Valina: Ambos Sup - 13 Años Inf= 9,00 mmol/mol crea

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
AASM **AMINOACIDOS, PLASMA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	6	Rec. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Alt. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Para el estudio de aminoacidopatías en pacientes pediátricos, se recomienda el análisis del perfil de aminoácidos orientado a esta población (Código AAPLQ) Rechazo: Muestra Hemolizada	Alanina: Ambos 0 - 2 Años 152,00 - 720,00 µmol/L Alanina: Ambos 2 - 18 Años 169,00 - 601.00 µmol/L Alanina: Ambos Sup - 18 Años 198,00 - 650,00 µmol/L Arginina: Ambos 0 - 2 Años 19,00 - 166,00 µmol/L Arginina: Ambos 2 - 18 Años 15,00 - 138,00 µmol/L Arginina: Ambos Sup - 18 Años 13,00 - 135,00 µmol/L Taurina: Ambos 0 - 2 Años 20,00 - 210,00 µmol/L Taurina: Ambos 2 - 18 Años 30,00 - 110,00 µmol/L Taurina: Ambos Sup - 18 Años 32,00 - 117,00 µmol/L Asparagina: Ambos 0 - 2 Años 22,00 - 74,00 µmol/L Asparagina: Ambos 2 - 18 Años 26,00 - 67,00 µmol/L Asparagina: Ambos Sup - 18 Años 32,00 - 71,00 µmol/L Ácido aspártico: Ambos 0 - 2 Años 2,00 - 50,00 µmol/L Ácido aspártico: Ambos 2 - 18 Años 2,00 - 21,00 µmol/L Ácido aspártico: Ambos Sup - 18 Años 2,00 - 19,00 µmol/L Cistina: Ambos 0 - 2 Años 0,50 - 17,90 µmol/L Cistina: Ambos 2 - 18 Años 0,90 - 24,70 µmol/L Cistina: Ambos Sup - 18 Años 3,60 - 47,40 µmol/L Citrulina: Ambos 0 - 2 Años 7,00 - 39,00 µmol/L Citrulina: Ambos 2 - 18 Años 14,00 - 43,00 µmol/L Citrulina: Ambos Sup - 18 Años 16,00 - 53,00 µmol/L Glutamina: Ambos 0 - 2 Años 265,00 - 944,00 µmol/L Glutamina: Ambos 2 - 18 Años 361,00 - 856,00 µmol/L Glutamina: Ambos Sup - 18 Años 423,00 - 831,00 µmol/L Ácido glutámico: Ambos 0 - 2 Años 30,00 - 259,00 µmol/L Ácido glutámico: Ambos 2 - 18 Años 20,00 - 237,00 µmol/L Ácido glutámico: Ambos Sup - 18 Años 15,00 - 112,00 µmol/L Glicina: Ambos 0 - 2 Años 128,00 - 476,00 µmol/L Glicina: Ambos 2 - 18 Años 118,00 - 449,00 µmol/L Glicina: Ambos Sup - 18 Años 125,00 - 412,00 µmol/L Histidina: Ambos 0 - 2 Años 37,00 - 115,00 µmol/L Histidina: Ambos 2 - 18 Años 55,00 - 112,00 µmol/L Histidina: Ambos Sup - 18 Años 55,00 - 111,00 µmol/L 4-hidroxiprolina: Ambos 0 - 2 Años 8,00 - 69,00 µmol/L 4-hidroxiprolina: Ambos 2 - 18 Años 9,00 - 42,00 µmol/L 4-hidroxiprolina: Ambos Sup - 18 Años 5,00 - 28,00 µmol/L Isoleucina: Ambos 0 - 2 Años 22,00 - 92,00 µmol/L Isoleucina: Ambos 2 - 18 Años 30,00 - 92,00 µmol/L Isoleucina: Ambos Sup - 18 Años 37,00 - 107,00 µmol/L Leucina: Ambos 0 - 2 Años 51,00 - 181,00 µmol/L Leucina: Ambos 2 - 18 Años 58,00 - 187,00 µmol/L Leucina: Ambos Sup - 18 Años 72,00 - 201,00 µmol/L Lisina: Ambos 0 - 2 Años 75,00 - 292,00 µmol/L Lisina: Ambos 2 - 18 Años 88,00 - 251,00 µmol/L Lisina: Ambos Sup - 18 Años 123,00 - 311,00 µmol/L

MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
			Metionina: Ambos 0 - 2 Años 10,00 - 54,00 µmol/L Metionina: Ambos 2 - 18 Años 14,00 - 36,00 µmol/L Metionina: Ambos Sup - 18 Años 17,00 - 40,00 µmol/L Ornitina: Ambos 0 - 2 Años 29,00 - 148,00 µmol/L Ornitina: Ambos 2 - 18 Años 31,00 - 121,00 µmol/L Ornitina: Ambos Sup - 18 Años 36,00 - 185,00 µmol/L Fenilalanina: Ambos 0 - 2 Años 27,00 - 121,00 µmol/L Fenilalanina: Ambos 2 - 18 Años 37,00 - 91,00 µmol/L Fenilalanina: Ambos Sup - 18 Años 41,00 - 88,00 µmol/L Prolina: Ambos 0 - 2 Años 104,00 - 409,00 µmol/L Prolina: Ambos 2 - 18 Años 99,00 - 358,00 µmol/L Prolina: Ambos Sup - 18 Años 100,00 - 330,00 µmol/L Serina: Ambos 0 - 2 Años 74,00 - 311,00 µmol/L Serina: Ambos 2 - 18 Años 84,00 - 222,00 µmol/L Serina: Ambos Sup - 18 Años 69,00 - 193,00 µmol/L Treonina: Ambos 0 - 2 Años 60,00 - 274,00 µmol/L Treonina: Ambos 2 - 18 Años 65,00 - 207,00 µmol/L Treonina: Ambos Sup - 18 Años 76,00 - 216,00 µmol/L Triptofano: Ambos 0 - 2 Años 13,00 - 117,00 µmol/L Triptofano: Ambos 2 - 18 Años 23,00 - 89,00 µmol/L Triptofano: Ambos Sup - 18 Años 35,00 - 88,00 µmol/L Tirosina: Ambos 0 - 2 Años 23,00 - 128,00 µmol/L Tirosina: Ambos 2 - 18 Años 35,00 - 101,00 µmol/L Tirosina: Ambos Sup - 18 Años 37,00 - 95,00 µmol/L Valina: Ambos 0 - 2 Años 99,00 - 354,00 µmol/L Valina: Ambos 2 - 18 Años 127,00 - 334,00 µmol/L Valina: Ambos Sup - 18 Años 150,00 - 370,00 µmol/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
AMI **AMIODARONA, SUERO**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	6	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis. No utilizar tubos con gel separador.	0,50 - 2,00 mg/L Toxicidad: Sup 2,50 mg/L Límite de cuantificación: 0,20 mg/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
QAMN **AMITRIPTILINA / NORTRIPTILINA, SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	6	Rec. 100 uL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.] La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis. El contenedor recomendado es el tubo seco (sin gel separador) para evitar procesos de adsorción del fármaco. En caso de no disponer de tubo seco, la extracción se puede realizar en tubo con gel separador, separando el suero dentro de las 2 horas posteriores a la recolección y transfiriéndolo a un tubo de alícuota para su transporte al laboratorio. Rechazo: Muestra hemolizada, lipémica y/o ictérica	Amitriptilina: Límite de cuantificación: 11,00 µg/L Nortriptilina: Límite de cuantificación: 12,00 µg/L Intervalo terapéutico (Imipramina + Desipramina): 175 -300 µg/L Toxicidad: (Imipramina + Desipramina): Sup 300 µg/L
COAMIPE **AMITRIPTILINA CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), CABELLO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	10	Rec. 200 mg Cabello (1 x Kit específico) Recoger cabello de la zona entre la nuca y la coronilla, lo más próximo a la raiz.	Valor de corte recomendado: 98,00 pg/mg

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
COAMIOR **AMITRIPTILINA CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), ORINA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 10 mL Orina (1 x Contenedor 70 mL) [Refr.]	Se utiliza como criterio de Positividad que la concentración sea superior o igual al valor del límite de cuantificación más el valor de incertidumbre del ensayo. En caso contrario, el resultado es Negativo. Incertidumbre de medida 5,5 ng/mL Límite de cuantificación 25 ng/mL
COAMISAI **AMITRIPTILINA CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SALIVA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 1 mL Saliva [Refr.]	Incertidumbre de medida 5,7 ng/mL Límite de cuantificación 25 ng/mL
COAMISTI **AMITRIPTILINA CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SANGRE**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 10 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total Oxalato Fluoruro sódico (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total Heparina litio (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Incertidumbre de medida 5,5 ng/mL Límite de cuantificación 25 ng/mL
COAMOSAI **AMOBARBITAL CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SALIVA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	3	Rec. 1 mL Saliva [Refr.]	Incertidumbre de medida 2 ng/mL Límite de cuantificación 25 ng/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
COAMOSTI **AMOBARBITAL CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SANGRE**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	3	Rec. 10 mL Sangre total Oxalato/Fluoruro (1 x Tubo Sangre Total-Oxalato/Fluoruro) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total Heparina litio (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Tubo oxalato potásico/Fluoruro sódico Ref. SAP 600088318	Incertidumbre de medida 2 ng/mL Límite de cuantificación 25 ng/mL
NH31 **AMONIACO / AMONIO (1'), PLASMA**	Espectrometría.	2	Rec. 4 mL Plasma 1 m. EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Alt. 4 mL Plasma 1 m. Heparina litio (1 x Tubo sangre heparina litio) [Cong.] Centrifugar en frío. Para plasma EDTA, congelar antes de 3 h desde la extracción. Para plasma heparina litio, congelar inmediatamente (<1 h desde la extracción). Si la muestra se analiza dentro de estos plazos, puede mantenerse refrigerada.	En prueba de ejercicio isquémico para amonio, los valores esperados se encuentran entre 5 y 10 veces al valor basal.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
NH32 **AMONIACO / AMONIO (2'), PLASMA**	Espectrometría.	2	Rec. 4 mL Plasma 2 m. EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Alt. 4 mL Plasma 2 m. Heparina litio (1 x Tubo sangre heparina litio) [Cong.] Centrifugar en frío. Para plasma EDTA, congelar antes de 3 h desde la extracción. Para plasma heparina litio, congelar inmediatamente (<1 h desde la extracción). Si la muestra se analiza dentro de estos plazos, puede mantenerse refrigerada. Muestra alternativa: plasma heparina (heparina no amónica)	En prueba de ejercicio isquémico para amonio, los valores esperados se encuentran entre 5 y 10 veces al valor basal.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
NH35 **AMONIACO / AMONIO (5'), PLASMA**	Espectrometría.	2	Rec. 4 mL Plasma 5 m. EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Alt. 4 mL Plasma 5 m. Heparina litio (1 x Tubo sangre heparina litio) [Cong.] Centrifugar en frío. Para plasma EDTA, congelar antes de 3 h desde la extracción. Para plasma heparina litio, congelar inmediatamente (<1 h desde la extracción). Si la muestra se analiza dentro de estos plazos, puede mantenerse refrigerada. Muestra alternativa: plasma heparina (heparina no amónica)	En prueba de ejercicio isquémico para amonio, los valores esperados se encuentran entre 5 y 10 veces al valor basal.
NH310 **AMONIACO / AMONIO (10'), PLASMA**	Espectrometría.	2	Rec. 4 mL Plasma 10 m. EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Alt. 4 mL Plasma 10 m. Heparina litio (1 x Tubo sangre heparina litio) [Cong.] Centrifugar en frío. Para plasma EDTA, congelar antes de 3 h desde la extracción. Para plasma heparina litio, congelar inmediatamente (<1 h desde la extracción). Si la muestra se analiza dentro de estos plazos, puede mantenerse refrigerada.	En prueba de ejercicio isquémico para amonio, los valores esperados se encuentran entre 5 y 10 veces al valor basal.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
AMOO **AMONIACO, ORINA 24H**	Espectrometría.	6	Rec. 1 mL Orina 24h. (alícuota) (1 x Contenedor 2500 mL.) [Refr.]	Excreción (24h): Ambos 0 - 14 Años 0,56 - 2,9 gr/24h Excreción (24h): Ambos Sup - 14 Años 0,14 - 1,5 gr/24h Volumen de orina remitido (diuresis): 600,00 - 1600,00 mL
NH3S **AMONIACO, PLASMA**	Espectrometría.	2	Rec. 4 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Alt. 4 mL Plasma Heparina litio (1 x Tubo sangre heparina litio) [Cong.] Centrifugar en frío. Para plasma EDTA, congelar antes de 3 h desde la extracción. Para plasma heparina litio, congelar inmediatamente (<1 h desde la extracción). Si la muestra se analiza dentro de estos plazos, puede mantenerse refrigerada.	18,00 - 72,00 µmol/L
AGNH4 **AMONIO, AGUA**	Espectrometría.	15	Rec. 100 mL Agua (1 x Envase aséptico) [Refr.]	Agua de diálisis Inf 0,2 mg/L Agua de red Inf 0,50 mg/L
AMOXSU **AMOXICILINA EN SUERO**	Cromatografía de Gases / Espectrometría Masas.	9	Rec. 2 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Enviar alícuota única. Separar y congelar inmediatamente. No utilizar tubos con gel separador.	Interpretación: Antibiótico con actividad bactericida tiempo-dependiente. - Infección con patógeno identificado: Cmín o Ceq Superior o igual a 5 veces la CMI de los microorganismos tratados e inferior a 80 mg/L. - Infección con patógeno no identificado: Cmín o Ceq: 40 - 80 mg/L (Cmín: concentración residual plasmática total en el caso de administración discontinua; Ceq: concentración plasmática total en equilibrio en el caso de administración continua; CMI: concetración mínima inhibitoria)

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
AMCC **AMP CICLICO, ORINA / CREATININA**	Radioinmunoanálisis.	11	Rec. 10 mL Orina [Cong.]	Excreción (creatinina): 0,89 - 6,30 µmol/g creat Creatinina en orina : mg/dL Interpretación según criterio clínico
AC24 **AMP CÍCLICO, ORINA 24H**	Radioinmunoanálisis.	11	Rec. 10 mL Orina 24h. (alícuota) (1 x Contenedor 2500 mL.) [Cong.] Volumen indispensable.	Excreción (24h): 2,26 - 10,00 µmol/24h Volumen de orina remitido (diuresis): 600,00 - 1600,00 mL
AMPCP **AMP CÍCLICO, PLASMA**	Radioinmunoanálisis.	10	Rec. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.]	17,00 - 36,00 nmol/L
PATERCRY **AMPLIACIÓN CON STRS PARA CROMOSOMA Y PROBATORIA-JUDICIAL (2 INDIVIDUOS)**	PCR-Análisis de fragmentos.	12	Rec. 2 Muestra/s Frotis bucal (1 x Kit específico) Contactar con el laboratorio antes de solicitar el estudio. Kit especial con cadena de custodia + hoja de solicitud de paternidad judicial 2 hisopos bucales (sin medio) por paciente	
2656 **ANALISIS DE IMAGEN (MORFOMETRIA) - ANATOMIA PATOLÓGICA**	Citometría de flujo.	5	Rec. 1 Pieza/s Tejido	Se informa para cada paciente
MICORE **ANÁLISIS MOLECULAR DE LA MICROBIOTA INTESTINAL (TEST 16S)**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	20	Rec. 5 g Heces (1 x Contenedor estéril) [Refr.]	Se informa para cada paciente

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ECQO **ANÁLISIS SISTEMÁTICO, ORINA**	Tira reactiva	1	Rec. 8 mL Orina (1 x Tubo 10 mL.) [Refr.]	Cuerpos cetónicos: Negativo Bilirrubina: Negativo Densidad: 1010,00 - 1030,00 Glucosa: mg/dL Negativo Hematíes: /uL Negativo Leucocitos: /uL Negativo Nitritos: Negativo pH: 5,00 - 8,00 Proteínas: Negativo Sedimento: Se informa para cada paciente Urobilinógeno: 0,20 - 1,00 mg/dL
G00165 **ANALISIS, INTERPRETACION E INFORME GENOMA COMPLETO DUO**	Pipeline bioinformático	22	Rec. 1 Muestra/s Datos Remitir datos (RAW DATA) en fichero compatible (FASTQ). Consultar previamente otro tipo de soporte	Indicado en informe adjunto
G00164 **ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN E INFORME GENOMA COMPLETO SINGLE**	Pipeline bioinformático	22	Rec. 1 Muestra/s Datos Remitir datos (RAW DATA) en fichero compatible (FASTQ). Consultar previamente otro tipo de soporte	Indicado en informe adjunto
G00166 **ANALISIS, INTERPRETACION E INFORME GENOMA COMPLETO TRIO**	Secuenciación Sanger + MLPA	22	Rec. 1 Muestra/s Datos Remitir datos (RAW DATA) en fichero compatible (FASTQ). Consultar previamente otro tipo de soporte	Indicado en informe adjunto
G00008 **ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN E INFORME NGS EXOMA**	Pipeline bioinformático	15	Rec. 1 Muestra/s Consultar al laboratorio	
G00100 **ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN E INFORME PANEL NGS 1 - 2 GENES**	Pipeline bioinformático	15	Rec. 1 Muestra/s Consultar al laboratorio	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G00101 **ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN E INFORME PANEL NGS 3 - 25 GENES**	Pipeline bioinformático	15	Rec. 1 Muestra/s Consultar al laboratorio		
G01002 **ANDERSON, SÍNDROME DE · KCNJ2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	KCNJ2	*1*
G7389 **ANDRÓGENOS, INSENSIBILIDAD A · AR · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AR	*1*
ADG **ANDROSTANDIOL GLUCURONIDO (3 ALFA DIOL), SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Hombres 1,53 - 14,82 ng/mL Pubertad Mujeres 0 - 20 Años 0,51 - 4,03 ng/mL Premenopausia Mujeres 20 - 55 Años 0,22 - 4,64 ng/mL Postmenopausia Mujeres Sup - 55 Años 0,61 - 3,71 ng/mL	
G04056 **ANEMIA BLACKFAN-DIAMOND ·PANEL · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Plazo de entrega orientativo dependiendo de la complejidad en la secuenciación del Gen estudiado y de las caracteristicas genotípicas inherentes al paciente. - Resumen de la historia clínica del paciente. Se requiere consentimiento informado. - En caso que proceda y si está disponible, copia del informe del caso índice familiar.	RPL11, RPL35A, RPL5, RPS17, RPS19, RPS26	*6*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G04060 **ANEMIA CONGÉNITA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABCB7, ADAMTS13, AK1, ALAS2, AMN, ANK1, ATM, ATR, ATRX, BLM, BRCA2, BRIP1, C15orf41, CLCN7, CUBN, CYB5R3, DHFR, DNAJC21, EPB42, ERCC4, FANCA, FANCB, FANCC, FANCD2, FANCE, FANCF, FANCG, FANCI, FANCL, FANCM, FOXO1A, G6PD, GATA1, GCLC, GPI, GSS, HBA1, HBA2, HBB, HFE, KIF23, KLF1, LPIN2 , MTR, NBN, NT5C3A, PALB2, PC, PDHA1, PDHX, PIEZO1, PKLR, PUS1, RAD51C, REN, RHAG, RPL11, RPL15, RPL27, RPL35A, RPL5, RPS10, RPS19, RPS24, RPS26, RPS28, RPS29, RPS7, SBDS, SEC23B, SLC11A2, SLC19A2, SLC25A38, SLC4A1, SLX4, SPTA1, SPTB, TCN2, TF, THBD, TMPRSS6, TPI1, XRCC2, YARS2	
G04067 **ANEMIA DE FANCONI · BRCA2 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BRCA2	*1*
G13128 **ANEMIA DE FANCONI · FANCA · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FANCA	*1*
G04068 **ANEMIA DE FANCONI · FANCB · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FANCB	*1*
G04069 **ANEMIA DE FANCONI · FANCD2, PALB2 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FANCD2, PALB2	*2*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G1053 **ANEMIA DE FANCONI · FRAGILIDAD CROMOSÓMICA**	Análisis cromosómico del cultivo in vitro de linfocitos con inductor de fragilidad.	30	Rec. 10 mL Sangre total Heparina sódica o Heparina Litio Junto a la muestra de sangre es necesario enviar el formulario cumplimentado por el médico prescriptor y el consentimiento informado (dos copias, a ser posible) debidamente firmado por el paciente o sus padres/tutores, si es menor de edad. MUY IMPORTANTE: No es posible aceptar muestras sin previo aviso, dado que la estabilidad de la sangre es muy limitada para este estudio. Es necesario concretar previamente con el laboratorio el día en que se realizará la extracción y programar el transporte de la muestra (idealmente, lunes o miércoles).		
G13001 **ANEMIA DE FANCONI · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BRCA1, BRCA2, BRIP1, CXCR4, ERCC4, FANCA, FANCB, FANCC, FANCD2, FANCE, FANCF, FANCG, FANCI, FANCL, FANCM, PALB2, RAD51C, SLX4, UBE2T, XRCC2	*20*
G04044 **ANEMIA FALCIFORME - BETA-TALASEMIA · HBB · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	HBB	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G04041 **ANEMIA FALCIFORME · HBB (Glu6Val) · HOT SPOT**	Hot Spot	7	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	HBB [Glu6Val] *1*
G04032 **ANEMIA MEGALOBLÁSTICA Y DESÓRDENES RELACIONADOS · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AMN, CUBN, DHFR, GIF, SLC19A2 *5*
G7291 **ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO, PANEL AMPLIADO · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABCB7, ACVR1, ALAS2, ATP7B, CP, FECH, GATA1, GLRX5, SLC11A2, SLC25A38, STEAP3, TF, TMPRSS6 *13*
QFPC **ANEUPLOIDIAS CROMOSOMAS (BASICO) · X, Y, 13, 18, 21 · QF-PCR**	QF-PCR.	2	Rec. 10 mL Líquido amniótico [Refr.] Rec. 10 mg Vellosidad corial [Refr.] Rec. 10 mg Tejido fetal fresco - restos abortivos [Refr.] Alt. 4 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Se requiere consentimiento informado.	
QFRA **ANEUPLOIDIAS CROMOSOMAS (EXTENDIDO) · X, Y, 13, 15, 16, 18, 21, 22 · QF-PCR**	QF-PCR.	2	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 10 mL Líquido amniótico [Refr.] Rec. 10 mg Vellosidad corial [Refr.] Rec. 10 mg Tejido fetal fresco - restos abortivos [Refr.] Se requiere consentimiento informado.	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G06019 **ANEUPLOIDÍAS CROMOSOMAS SEMEN (X, Y, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	10	Rec. 2 mL Semen (1 x Contenedor 25 mL.) [Cong.] Congelar la muestra inmediatamente. La muestra debe ir acompañada de hoja de petición en la que se indiquen los datos del paciente y la prueba solicitada, así como del informe del seminograma realizado previamente.	
G06020 **ANEUPLOIDÍAS CROMOSOMAS SEMEN (X, Y, 13, 16, 18, 21, 22) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	10	Rec. 2 mL Semen (1 x Contenedor 25 mL.) [Cong.] Congelar la muestra inmediatamente. La muestra debe ir acompañada de hoja de petición en la que se indiquen los datos del paciente y la prueba solicitada, así como del informe del seminograma realizado previamente.	
G06021 **ANEUPLOIDÍAS CROMOSOMAS SEMEN (X, Y, 13, 18, 21) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	10	Rec. 2 mL Semen (1 x Contenedor 25 mL.) [Cong.] Congelar la muestra inmediatamente. La muestra debe ir acompañada de hoja de petición en la que se indiquen los datos del paciente y la prueba solicitada, así como del informe del seminograma realizado previamente.	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G06022 **ANEUPLOIDÍAS CROMOSOMAS SEMEN (X, Y, 18) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	10	Rec. 2 mL Semen (1 x Contenedor 25 mL.) [Cong.] Congelar la muestra inmediatamente. La muestra debe ir acompañada de hoja de petición en la que se indiquen los datos del paciente y la prueba solicitada, así como del informe del seminograma realizado previamente.	
G01003 **ANEURISMA AÓRTICO FAMILIAR · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ACTA2, COL3A1, EFEMP2, FBN1, FOXE3, MFAP5, MYH11, MYLK, PRKG1, SMAD3, TGFB2, TGFBR1, TGFBR2 *13*
G01173 **ANEURISMA AÓRTICO TORÁCICO FAMILIAR · ACTA2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ACTA2 *1*
ANEXG **ANEXINA V ANTICUERPOS IGG, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	13	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 8,00 U/mL Positivo: Sup 8,00 U/mL
ANEXM **ANEXINA V ANTICUERPOS IgM, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	13	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 8,00 U/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
CANP **ANFETAMINAS CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), CABELLO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	10	Rec. 1 g Cabello (1 x Kit específico)	Confirmación de anfetamina en cabello : Valor de corte recomendado: 254,00 pg/mg Confirmación de MDA en cabello : Valor de corte recomendado: 244,00 pg/mg Confirmación de MDEA en cabello : Valor de corte recomendado: 240,00 pg/mg Confirmación de MDMA en cabello : Valor de corte recomendado: 246,00 pg/mg Confirmación de metanfetamina en cabello: Valor de corte recomendado: 255,00 pg/mg
DAOR **ANFETAMINAS CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), ORINA**	Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectrometría de masas.	5	Rec. 10 mL Orina (1 x Contenedor 70 mL) [Refr.] Cadena de custodia	Anfetamina : Incertidumbre de medida 6,1 ng/mL Anfetamina : Límite de cuantificación 25 ng/mL MDA (3,4-metilendioxianfetamina): Incertidumbre de medida 3,8 ng/mL MDA (3,4-metilendioxianfetamina): Límite de cuantificación 25 ng/mL MDEA (3,4-metilendioxietilanfetamina): Incertidumbre de medida 4,3 ng/mL MDEA (3,4-metilendioxietilanfetamina): Límite de cuantificación 25 ng/mL MDMA (3,4-metilendioximetanfetamina): Incertidumbre de medida 4,5 ng/mL MDMA (3,4-metilendioximetanfetamina): Límite de cuantificación 25 ng/mL Metanfetamina : Incertidumbre de medida 5,4 ng/mL Metanfetamina : Límite de cuantificación 25 ng/mL Se utiliza como criterio de Positividad que la concentración sea superior o igual al valor del límite de cuantificación más el valor de incertidumbre del ensayo. En caso contrario, el resultado es Negativo.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
DASA				
ANFETAMINAS CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SALIVA	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 1 mL Saliva [Refr.]	Anfetamina : Incertidumbre de medida 3,8 ng/mL Anfetamina : Límite de cuantificación 15 ng/mL MDA (3,4-metilendioxianfetamina) : Incertidumbre de medida 3,3 ng/mL MDA (3,4-metilendioxianfetamina) : Límite de cuantificación 15 ng/mL MDEA (3,4-metilendioxietilanfetamina) : Incertidumbre de medida 3,2 ng/mL MDEA (3,4-metilendioxietilanfetamina) : Límite de cuantificación 15 ng/mL MDMA (3,4-metilendioximetanfetamina) : Incertidumbre de medida 3,7 ng/mL MDMA (3,4-metilendioximetanfetamina) : Límite de cuantificación 15 ng/mL Metanfetamina : Incertidumbre de medida 2,9 ng/mL Metanfetamina : Límite de cuantificación 15 ng/mL
DAPG				
ANFETAMINAS CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SANGRE	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 10 mL Sangre total Oxalato/Fluoruro (1 x Tubo Sangre Total-Oxalato/Fluoruro) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total Heparina litio (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Tubo oxalato potásico/Fluoruro sódico Ref. SAP 600088318	Anfetamina : Incertidumbre de medida 2,9 ng/mL Anfetamina : Límite de cuantificación 15 ng/mL MDA (3,4-metilendioxianfetamina) : Incertidumbre de medida 3,2 ng/mL MDA (3,4-metilendioxianfetamina) : Límite de cuantificación 15 ng/mL MDEA (3,4-metilendioxietilanfetamina) : Incertidumbre de medida 3,3 ng/mL MDEA (3,4-metilendioxietilanfetamina) : Límite de cuantificación 15 ng/mL MDMA (3,4-metilendioximetanfetamina) : Incertidumbre de medida 2,6 ng/mL MDMA (3,4-metilendioximetanfetamina) : Límite de cuantificación 15 ng/mL Metanfetamina : Incertidumbre de medida 3 ng/mL Metanfetamina : Límite de cuantificación 15 ng/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
AMP **ANFETAMINAS Y METANFETAMINAS, ORINA**	Enzimoinmunoanálisis	1	Rec. 10 mL Orina (1 x Tubo 10 mL.) [Refr.]	Negativo El valor discriminante de la técnica es 500 ng/mL Permite la detección de d-anfetamina, d-metanfetamina, Metilendioxianfetamina (MDA) y Metilendioximetanfetamina (MDMA) en la muestra.
G7267 **ANGELMAN, SÍNDROME DE · 15q11-q13 · MS-MLPA**	Metilación específica MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	[15q11-q13] *1*
G11225 **ANGELMAN, SÍNDROME DE · UBE3A · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Plazo de entrega orientativo dependiendo de la complejidad en la secuenciación del Gen estudiado y de las caracteristicas genotípicas inherentes al paciente. - Resumen de la historia clínica del paciente. Se requiere consentimiento informado. - En caso que proceda y si está disponible, copia del informe del caso índice familiar.	UBE3A *1*
G1523 **ANGELMAN, SÍNDROME DE · UBE3A · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	UBE3A *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G17020 **ANGIOEDEMA HEREDITARIO TIPO III · F12 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	F12	*1*
G17011 **ANGIOEDEMA HEREDITARIO · SERPING1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SERPING1	*1*
ATII **ANGIOTENSINA II , PLASMA**	Radioinmunoanálisis.	11	Rec. 3 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] CONDICIONES DE OBTENCIÓN Permanecer 30 minutos en decúbito supino antes de la extracción de sangre. Extraer sangre del paciente recostado en tubo de EDTA frio. Centrifugar inmediatamente a 4ºC para separar el plasma y congelar las muestras inmediatamente a -20ºC. Enviar congelado.	19,00 - 38,00 pmol/L	
ATI **ANGIOTENSINA, PLASMA**	Radioinmunoanálisis.	4	Rec. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.]	0,60 - 12,00 ng/mL	
G12004 **ANIRIDIA · PAX6 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PAX6	*1*
G12005 **ANOMALÍAS DEL SEGMENTO ANTERIOR CON/SIN CATARATA · EYA1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	EYA1	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
DFS70 **ANTI DFS-70 ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunoanálisis con detección fluorescente	7	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 7,00 U/mL Indeterminado: 7,00 - 10,00 U/mL Positivo: Sup 10,00 U/mL
AFII **ANTI FACTOR II (DABIGATRAN), PLASMA**	Técnica coagulométrica.	5	Rec. 2 mL Plasma Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) [Cong.]	ng/mL Interpretación según criterio clínico
SAMPA **ANTI RECEPTOR AMPA (ANTI NEURONALES), ANTICUERPOS (IFI), SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta en células transfectadas	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo
AMPALC **ANTI RECEPTOR AMPA (ANTI NEURONALES), ANTICUERPOS (IFI). LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO**	Inmunofluorescencia Indirecta en células transfectadas	6	Rec. 1 mL LCR [Refr.]	Negativo
NMDA **ANTI RECEPTOR NMDA (ANTI NEURONALES), ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta en células transfectadas	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo Tejido: Células Transfectadas
NMDALCR **ANTI RECEPTOR NMDA (ANTI NEURONALES), ANTICUERPOS , LÍQUIDO CEFALORRAQUIDEO**	Inmunofluorescencia Indirecta en células transfectadas	6	Rec. 1 mL LCR [Refr.]	Negativo
G18032 **ANTIBIÓTICOS AMINOGLUCÓSIDOS, HIPERSENSIBILIDAD A · MT-RNR1 · HOT SPOT**	Secuenciación Sanger	20	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Se informa para cada paciente *1* MT-RNR1 [c.1555A>G]

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
LUPI **ANTICOAGULANTE LÚPICO (RUSSELL), PLASMA**	Técnica coagulométrica.	6	Rec. 1 mL Plasma Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) [Cong.] Plasma pobre en plaquetas: centrifugue el tubo azul claro durante 15 minutos a aproximadamente 1500 g dentro de los 60 minutos de la obtención de muestra. Con una pipeta de plástico, retire el plasma, evitando la capa leucocitaria/plaquetas y colóquelo en un vial de plástico. Centrifugue por segunda vez y transfiera el plasma pobre en plaquetas a un nuevo vial de plástico. El plasma debe estar libre de plaquetas (<10,000/mcL). INDICAR LUPICO en el tubo. Congelar inmediatamente y enviar congelado.	Negativo
AANHC **ANTICUERPOS ANHIDRASA CARBÓNICA II, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	32	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 1,00 UA/mL
ACHIAL **ANTICUERPOS ANTI HIALURONIDASA, SUERO**	Hemaglutinación.	12	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Inf 300,00 U/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
LRP4S **ANTICUERPOS ANTI LRP4, SUERO**	Inmunocitoquímica con células transfectadas	23	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	Negativo
P140MJ **ANTICUERPOS ANTI- NXP-2/MJ, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	17	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	No se detecta
ACRNAP **ANTICUERPOS ANTI RNA POLIMERASA I, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] No es necesario estar en ayunas.	La inmunofluorescencia no es la técnica de elección para analizar antigenicidades. Se debería solicitar una técnica específica (inmunoblot) para completar el estudio clínico. Interpretación: Negativo: Inf 1/160 Interpretación: Positivo: Sup= 1/160
AFIB **ANTICUERPOS ANTI-FIBRILARINA (IFI), SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	4	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/160 Interpretación: Positivo: Sup= 1/160 La inmunofluorescencia no es la técnica de elección para analizar antigenicidades. Se debería solicitar una técnica específica (inmunoblot) para completar el estudio clínico.
ACLAC **ANTICUERPOS ANTI-LACTOFERRINA, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	10	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Esta técnica identifica anticuerpos IgG Interpretación: Negativo: Inf= 1,00 Índice
MDA5S **ANTICUERPOS ANTI-MDA5 (CADM140), SUERO**	Inmunoblot.	17	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	No se detecta

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
SINT **ANTICUERPOS ANTI-SINTETASA (MI-2, KU, PM100, PM75, JO 1, SRP, PL7, PL12, EJ, OJ, RO52), SUERO**	Inmunoblot.	7	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 1 mL Plasma Heparina litio (1 x Tubo sangre heparina litio) [Refr.] Alt. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Plasma EDTA, heparina o citrato.	Ac EJ (glicil tRNA sintetasa): No se detecta Ac OJ (isoluecil tRNA sintetasa): No se detecta Anticuerpos Jo-1: No se detecta Anticuerpos KU: No se detecta Ac MI-2 (INMUNOBLOT): No se detecta Anticuerpos PL-12: No se detecta Anticuerpos PL-7: No se detecta Anticuerpos PM100: No se detecta Anticuerpos PM75: No se detecta Anticuerpos Ro-52: No se detecta Anticuerpos SRP: No se detecta
TIF1S **ANTICUERPOS ANTI-TIF1-GAMMA (P155), SUERO**	Inmunoblot.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	No se detecta
TPHA **ANTICUERPOS ANTI-TREPONEMA PALLIDUM (TPHA), SUERO**	Hemaglutinación indirecta.	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 1/80 Positivo: Sup= 1/80
RB **ANTICUERPOS BRUCELLA, SUERO**	Hemaglutinación.	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo
AYE **ANTICUERPOS ENTEROCITO (YEYUNO) IGA, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	7	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] No es necesario estar en ayunas.	Interpretación: Negativo: Inf 1/10 Interpretación: Positivo: Sup= 1/10

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ESIB **ANTICUERPOS ESCLERODERMIA (KU, PMSCL 100, PMSCL 75, POLIMERASA III RP11, POLIMERASA III RP155, NOR-90, U3-RNP/FIBRILARINA, TH/TO, CENTROMERO A, CENTROMERO B, PDGFR, SCL-70, RO**	Inmunoblot.	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] La muestra debe recepcionarse dentro de las 24 horas posteriores a su obtención. En caso de que el tiempo de envío sea mayor, enviar congelado a -20ºC.	Ac Centrómero A : No se detecta Ac Centrómero B: No se detecta Ac Scl-70: No se detecta Ac KU: No se detecta Ac Nor-90: No se detecta Ac PDGFR: No se detecta Ac PM100: No se detecta Ac PM75: No se detecta Ac RNA POLIMERASA III RP11: No se detecta Ac RNA POLIMERASA III RP155: No se detecta Ac Ro52: No se detecta Ac Th/To: No se detecta Ac U3: No se detecta
AVNGLC **ANTICUERPOS IGG VIRUS FIEBRE NILO OCCIDENTAL, LCR**	Inmunofluorescencia Indirecta.	8	Rec. 1 mL LCR	Negativo
AVNG **ANTICUERPOS IGG VIRUS FIEBRE NILO OCCIDENTAL, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	8	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Adjuntar historia clínica resumida, incluyendo si el paciente ha visitado otros países recientemente y un resumen de la sintomatología. Enviar la muestra en un tubo estéril en un embalaje de seguridad biológica	Interpretación: Negativo: Inf 1/10
AVNMLC **ANTICUERPOS IGM VIRUS FIEBRE NILO OCCIDENTAL, LCR**	Inmunofluorescencia Indirecta.	8	Rec. 1 mL LCR	Negativo

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
AVNM **ANTICUERPOS IGM VIRUS FIEBRE NILO OCCIDENTAL, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	8	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Adjuntar historia clínica resumida, incluyendo si el paciente ha visitado otros países recientemente y un resumen de la sintomatología. Enviar la muestra en un tubo estéril en un embalaje de seguridad biológica	Interpretación: Negativo: Inf 1/10
AIRR **ANTICUERPOS IRREGULARES, SANGRE TOTAL**	Aglutinación	4	Rec. 1 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo
ADTC **ANTIDEPRESIVOS TRICÍCLICOS (CUALITATIVA), SUERO**	Inmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.] La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis. No se acepta muestra de sangre total.	Esta técnica permite detectar los siguientes compuestos: -ANTIDEPRESIVOS CÍCLICOS Y POLICÍCLICOS -TRICÍCLICOS: Imipramina/desipramina, Amitriptilina/nortriptilina, Clomipramina/desmetilclomipramina, Doxepina/nordoxepina, Trimipramina, Sertralina (distinta composición de anillos) -TETRACÍCLICOS: Maprotilina, Paroxetina, Mianserina, Trazodona, Mirtazapina. -BICÍCLICOS: Fluoxetina/norfluoxetina, Citalopram, Escitalopram, Venlafaxina. -MONOCÍCLICOS: Fluvoxamina No se detecta
TCA **ANTIDEPRESIVOS, ORINA - SCREENING CUALITATIVO**	Cromatografía Líquida Alta Resolución / Espectrometria UV.	7	Rec. 1 mL Orina [Refr.] Orina reciente después del consumo de la droga.	Este estudio comprende la búsqueda de: Nortriptilina, mirtazapina, amitriptilina, venlafaxina, trazodona, reboxetina, citalopram, fluvoxamina, duloxentina, maprotiptilina, fluoxetina, sertralina, trimipramina, clomipramina, doxepina, desipramina, imipramina.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ADO **ANTIDIABÉTICOS ORALES, SUERO**	Espectrometría.	8	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	NOTA: Esta determinación detecta la presencia de METFORMINA, CLORPROPAMIDA, GLIBENCLAMIDA, GLICLAZIDA, GLIMEPIRIDA, GLIPIZIDA, GLIQUIDONA, GLISENTIDA, PIOGLITAZONA, SITAGLIPTINA, VILDAGLIPTINA, REPAGLINIDA y NATEGLINIDA. No se detecta
ASLO **ANTIESTREPTOLISINAS, SUERO**	Turbidimetría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Inf 200,00 UI/mL
CA15L **ANTÍGENO CA 15.3 (LÍQUIDO BIOLÓGICO)**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Líquido pleural [Refr.] Rec. 1 mL Líquido ascítico [Refr.]	U/mL Interpretación según criterio clínico
AGWUBA **ANTÍGENO DE WUCHERERIA BANCROFTI EN SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	23	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf= 1,00 Indice Positivo: Sup 1,00 Indice
DNASA **ANTIGENO ESTREPTOCOCCUS (DNASA B) ANTICUERPOS, SUERO**	Nefelometría - Turbidimetría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Ambos 0 - 14 Años Inf 300,00 UI/mL Ambos Sup - 15 Años Inf 200,00 UI/mL
PCNA **ANTÍGENO NUCLEAR DE PROLIFERACIÓN NUCLEAR (PCNA) ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/160 Interpretación: Positivo: Sup= 1/160
AGPF **ANTIGENO PLASMODIUM, SANGRE TOTAL**	Inmunocromatografía.	2	Rec. 3 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Adjuntar extensión junto con la muestra de sangre total-EDTA.	Negativo

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
GENPLT **ANTÍGENOS PLAQUETARIOS (HPA) GENOTIPO, SANGRE TOTAL**	Reacción en cadena de la polimerasa.	15	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Indicado en informe adjunto
AHIB **ANTÍGENOS SOLUBLES HEPATICOS (M2, LKM1, LC1, SLA, SP100, GP210, PML, Ro52, BPO, F-actina) ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunoblot.	4	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Ac BPO: No se detecta Ac PML: No se detecta Ac Ro52: No se detecta Ac LC1: No se detecta Ac AMA2: No se detecta Ac F-Actina: No se detecta Ac GP210: No se detecta Ac LKM1: No se detecta Ac Sla: No se detecta Ac SP100: No se detecta
AGSB **ANTIMONIO, AGUA**	Absorción atómica.	15	Rec. 100 mL Agua (1 x Envase aséptico) [Refr.] Alt. 100 mL Agua (1 x Envase aséptico) (<2 Ác.nítrico)	Agua de diálisis Inf 0,01 mg/L Agua de red Inf 0,05 mg/L
ANTO **ANTIMONIO, ORINA**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	5	Rec. 10 mL Orina final jornada [Refr.]	: BEIs® (ACGIH®): Final de la jornada laboral Inf 35,00 µg/g creat : No expuestos Inf 1,00 µg/g creat
SBSG **ANTIMONIO, SANGRE TOTAL**	Absorción atómica.	9	Rec. 2 mL Sangre total EDTA Dipotásico (libre trazas metales) (1 x Tubo Sangre EDTA metales traza) [Refr.]	Inf 6,00 µg/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
AMH **ANTIMULLERIANA HORMONA, SUERO**	Quimioluminiscencia.	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Respuesta ovárica a estimulación hormonal: Insuficiente: Inf 0,93 ng/mL Respuesta ovárica a estimulación hormonal: Hiperestimulación: Sup 1,770 ng/mL Respuesta ovárica a estimulación hormonal: Alta (Riesgo de SHO): Sup 4,900 ng/mL Adultos Hombres 0,730 - 16,050 ng/mL Mujeres 18 - 25 Años 0,960 - 13,340 ng/mL Mujeres 26 - 30 Años 0,170 - 7,370 ng/mL Mujeres 31 - 35 Años 0,070 - 7,350 ng/mL Mujeres 36 - 40 Años 0,030 - 7,150 ng/mL Mujeres 41 - 45 Años Inf 3,270 ng/mL Mujeres 46 - 9999 Años Inf 1,150 ng/mL
ANALB **ANTINUCLEARES (ANA) ANTICUERPOS, LÍQUIDO BIOLÓGICO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	4	Rec. 1 mL Líquido biológico [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/20 Interpretación: Positivo: Sup= 1/20
ANALS **ANTINUCLEARES (ANA) ANTICUERPOS, LÍQUIDO SINOVIAL**	Inmunofluorescencia Indirecta.	4	Rec. 1 mL Líquido sinovial [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/40 Interpretación: Positivo: Sup= 1/40
ACAN **ANTINUCLEARES (ANA) ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	ANAs: Interpretación: Negativo: Inf 1/160
ARGLC **ANTIRECEPTORES GABA (B) , LCR**	Inmunofluorescencia Indirecta en células transfectadas	6	Rec. 1 mL LCR (1 x Tubo Polipropileno) [Refr.]	Negativo
ARGS **ANTIRECEPTORES GABA (B) , SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta en células transfectadas	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
AIII **ANTITROMBINA III (ACTIVIDAD), PLASMA**	Técnica Cromogénica.	3	Rec. 1 mL Plasma Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) [Refr.] Estabilidad: 2 días en plasma separado. No es necesario estar en ayunas.	80,00 - 130,00 %
A3A **ANTITROMBINA III ANTIGÉNICA (CONCENTRACION), PLASMA**	Nefelometría.	4	Rec. 1 mL Plasma Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) [Cong.] Rec. 1 mL Plasma (1 x Tubo sangre citrato.) [Cong.] Separar y congelar inmediatamente.	19,00 - 31,00 mg/dL
G7392 **ANTLEY-BIXLER, SÍNDROME DE · POR · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	POR *1*
G08089 **ANTLEY-BIXTLER SIN ANOMALÍAS GENITALES, SÍNDROME DE · FGFR2 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FGFR2 *1*
G01004 **AORTA-TEJIDO CONECTIVO, ENFERMEDAD DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABCC6, ACTA2, ADAMTS2, B3GAT3, B4GALT7, CBS, CHST14, COL1A2, COL3A1, COL5A1, COL5A2, EFEMP2, ELN, ENPP1, FBLN5, FBN1, FBN2, FKBP14, FLNA, LOX, MED12, MYH11, MYLK, NOTCH1, PLOD1, PRKG1, SKI, SLC2A10, SLC39A13, SMAD3, SMAD4, TGFB2, TGFB3, TGFBR1, TGFBR2, TNXB *36*
G01180 **AORTOPATÍAS · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ACTA2, ARIH1, ASPH, BGN, COL3A1, COL5A1, COL5A2, EFEMP2, ELN, FBLN5, FBN1, FBN2, FKBP14, FLNA, FOXE3, IPO8, LOX, MFAP5, MYH11, MYLK, NOTCH1, PLOD1, PMEPA1, PRKG1, SECISBP2, SKI, SLC2A10, SMAD2, SMAD3, SMAD4, TGFB2, TGFB3, TGFBR1, TGFBR2, THSD4

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G08091 **APERT, SÍNDROME DE · FGFR2 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FGFR2	*1*
G08090 **APERT, SÍNDROME DE · FGFR2(p.S252W, p.P253R) · HOT SPOT**	Hot Spot	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FGFR2 [p.S252W, p.P253R]	*1*
APOA **APOLIPOPROTEÍNA A1, SUERO**	Turbidimetría.	2	Rec. 0.4 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Hombres 105,00 - 175,00 mg/dL Mujeres 105,00 - 205,00 mg/dL	
APOB **APOLIPOPROTEÍNA B, SUERO**	Turbidimetría.	1	Rec. 0.4 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Hombres 60,00 - 140,00 mg/dL Mujeres 55,00 - 130,00 mg/dL	
APOE **APOLIPOPROTEÍNA E, SUERO**	Nefelometría.	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	23,00 - 63,00 mg/L	
G08140 **ARACNODACTILIA CONGÉNITA CONTRACTURAL · FBN2 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Indicado en informe adjunto FBN2	*1*
ARILSL **ARILSULFATASA-A (LEUCODISTROFIA METACROMATICA Y MUCOSULFATIDOSIS), SANGRE**	Colorimétrico.	30	Rec. 10 mL Sangre total Heparina litio La muestra debe recibirse en un plazo de 12 horas máximo tras su obtención. Indispensable aviso previo.	Indicado en informe adjunto	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ASAOR **ARILSULFATASA-A, ORINA**	Espectrometría.	12	Rec. 10 mL Orina [Cong.] Debido a que el pH de la muestra de orina interfiere en el resultado para esta determinación, se precisa verificación del pH en origen y garantizar que el pH de la muestra remitida está en el intervalo 6,0 - 6,3. Orina de micción u orina de 24 horas	41,00 - 78,00 nmol/h/mL
ARIP **ARIPIPRAZOL Y METABOLITOS, SUERO**	Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectrometría de masas.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.]	Aripiprazol en suero: I.Terapéutico: 100,00 - 350,00 µg/L Aripiprazol total en suero: I.Terapéutico: 150,00 - 500,00 µg/L Dihidroaripiprazol en suero: µg/L No se dispone de valores de referencia. Valorar a criterio clínico. Ratio Dihidroaripiprazol / Aripiprazol: 0,30 - 0,50
R16S **ARN RIBOSOMAL (16S), MUESTRA BIOLÓGICA**	PCR-Real Time.	8	Rec. 0.5 mL Líquido sinovial (1 x Tubo estéril heparinizado) [Refr.] Rec. 0.5 mL Líquido pleural (1 x Tubo estéril) [Refr.] Rec. 0.5 mL Líquido amniótico (1 x Tubo estéril) [Refr.] No se acepta muestra de sangre total. Se aceptan líquidos biológicos estériles con cultivos negativos.	RNA ribosomal 16S (bacterias) (Resultado): No se detecta

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ARRHD **ARRAY HD POSTNATAL, SANGRE TOTAL**	Array- SNPs	20	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 1 Muestra/s Sangre seca en papel de filtro (1 x Papel de filtro Whatman 903) Alt. 1 Muestra/s DNA Extraido (1 x Microtubos DNAse, RNAse Free) [Cong.] Se requiere consentimiento informado.	
ARRPOS **ARRAY POSTNATAL, SANGRE TOTAL**	Array- SNPs	15	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Se requiere consentimiento informado.	
ARRPRE **ARRAY PRENATAL, MUESTRA BIOLÓGICA**	Array- SNPs	10	Rec. 15 mL Líquido amniótico [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Vellosidad corial [Refr.] Se requiere consentimiento informado.	
ARRAB **ARRAY RESTOS ABORTIVOS, MUESTRA BIOLÓGICA**	Array- SNPs	10	Rec. 1 Muestra/s Restos abortivos [Refr.] Enviar con medio de cultivo o suero fisiológico en contenedor hermético y estéril. Se requiere consentimiento informado.	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G01005 **ARRITMIA CARDIACA RELACIONADA A ANKIRINA-B · ANK2 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ANK2 *1*
G01188 **ARRITMIA FAMILIAR BÁSICO · PANEL · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25		
G01006 **ARRITMIAS · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABCB4, ABCC9, ACADVL, ACTC1, ACTN2, AKAP9, ANK2, ANK3, *89* ANKRD1, CACNA1C, CACNA1D, CACNA2D1, CACNA2D4, CACNB2, CALM1 , CALM3, CASQ2, CAV3, CHRM2, CTNNA3, DES, DSC2, DSG2, DSP, DTNA, EMD, FHL2, FLNC , GATA4, GATA6, GJA1, GJA5, GPD1L, HCN4, JPH2, JUP, KCNA5, KCND2, KCND3, KCNE1, KCNE2, KCNE3, KCNH2, KCNJ2, KCNJ5, KCNJ8, KCNK3, KCNQ1, LAMA2, LDB3, LMNA, MYBPC3, MYH6, MYH7, NKX2-5, NKX2-6, NOS1AP, NPPA, OBSCN, PKP2, PLN, PRKAG2, RANGRF, RBM20, RYR2, SCN10A, SCN1B, SCN2B, SCN3B, SCN4B, SCN5A, SEMA3A, SNTA1, TAZ, TBX20, TBX5, TGFB3, TMEM43, TMEM70, TNNC1, TNNI3, TNNI3K, TNNT2, TPM1, TRDN, TRPM4, TTN, TTR, ZFHX3
ARSIO **ARSÉNICO INORGÁNICO Y METABOLITOS METILADOS, ORINA FINAL JORNADA**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	7	Rec. 2 mL Orina final semana laboral [Refr.]	VLB®-INSST: (Arsénicos y compuestos inorgánicos solubles) Inf 35,00 ug/L Límite de cuantificación: 5,00 ug/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ARSE **ARSENICO, SANGRE**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	4	Rec. 1 mL Sangre total EDTA Dipotásico (libre trazas metales) (1 x Tubo Sangre EDTA metales traza) [Refr.]	- La concentración de arsénico "total" en sangre no es el indicador adecuado para valorar el índice de exposición laboral al arsénico. Inf 10,00 µg/L - La concentración de arsénico "total" en sangre puede estar fuertemente condicionado por el tipo de dieta. La posible presencia de arsénico en alimentos de origen marino, especialmente en bivalvos (almejas, ostras, mejillones), en crustáceos (cangrejos, langostas), en ciertos peces de aguas frías que se alimentan en el fondo marino y en algas marinas, debe tenerse en cuenta en la interpretación del resultado. Las formas orgánicas de arsénico que se encuentran en alimentos de origen marino (principalmente la arsenobetaina y la arsenocolina, también conocidas como "arsénico de los peces", generalmente se consideran no tóxicas y se excretan por la orina 48 horas después de haber sido ingeridas (ATSDR, 2007). - Se recomienda la medida del arsénico inorgánico en orina final de jornada laboral para valorar el índice de exposición laboral.
AGAS **ARSENICO, AGUA**	Absorción atómica.	15	Rec. 100 mL Agua (1 x Envase aséptico) [Refr.] Alt. 100 mL Agua (1 x Envase aséptico) (<2 Ác.nítrico)	Agua de diálisis Inf 0,01 mg/L Agua de red Inf 0,01 mg/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ARSOC **ARSENICO, ORINA**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	4	Rec. 1 mL Orina (1 x Tubo 10 mL.) [Refr.]	1- La concentración de arsénico "total" en orina no es el indicador adecuado para valorar el índice de exposición laboral al arsénico. Inf 100,00 µg/L 2- La concentración de arsénico "total" en orina puede estar fuertemente condicionado por el tipo de dieta. La posible presencia de arsénico en alimentos de origen marino, especialmente en bivalvos (almejas, ostras, mejillones), en crustáceos (cangrejos, langostas), en ciertos peces de aguas frías que se alimentan en el fondo marino y en algas marinas, debe tenerse en cuenta en la interpretación del resultado. Las formas orgánicas de arsénico que se encuentran en alimentos de origen marino (principalmente la arsenobetaina y la arsenocolina, también conocidas como "arsénico de los peces", generalmente se consideran no tóxicas y se excretan por la orina 48 horas después de haber sido ingeridas (ATSDR, 2007). 3- Se recomienda la medida del arsénico inorgánico en orina de final de jornada laboral para valorar el índice de exposición laboral
G08092 **ARTROGRIPOSIS · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CHST14, ECEL1, FBN2, MYBPC1, MYH3, MYH8, NALCN, PIEZO2, TNNI2, TNNT3, TPM2 *2,1*
ASLU **ASCARIS LUMBRICOIDES (ASCARIDIASIS) IGG ANTICUERPOS, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 11,00 NTU Indeterminado: 9,00 - 11,00 NTU Positivo: Sup= 11,00 NTU
ACRASG **ASIALOGLICOPROTEINA ANTICUERPOS ANTI-RECEPTOR (ANTI-ASGPR), SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	25	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 1/10 Indeterminado: 1/10 1/14,90 Positivo: Sup= 1/15
G11166 **ASPERGER, SUSCEPTIBILIDAD A SÍNDROME DE · NLGN3, NLGN4X · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	NLGN3, NLGN4X *2*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ACGBAL **ASPERGILLUS ANTÍGENO (GALACTOMANANO), LAVADO BRONCOALVEOLAR**	Enzimoinmunoanálisis	4	Rec. 1 mL Lavado broncoalveolar [Refr.] Solamente se aceptan muestras de lavado broncoalveolar. - Contenedor estéril Enviar tubo tapado en bolsa naranja. Dejar nota indicando la prueba en la bolsa.	Inf 0,50 Índice
ACG **ASPERGILLUS ANTÍGENO (GALACTOMANANO), SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	4	Rec. 1 mL Suero tubo tapado (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Enviar tubo tapado en bolsa naranja. Dejar nota indicando la prueba en la bolsa. Dejar reposar 30 minutos para la retracción del coágulo y centrifugar entre los 30 y 60 minutos tras la extracción. No destapar. Remitir al laboratorio el tubo primario.	Inf 0,50 Índice
PASPF **ASPERGILLUS FLAVUS PRECIPITINAS, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	El resultado hace referencia a la concentración de IgG específica. Negativo: Inf 1,00 Indeterminado: 1,00 - 2,00 Positivo: Sup 2,00
A-AF **ASPERGILLUS FUMIGATUS ANTICUERPOS, SUERO**	Hemaglutinación.	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 1/320 Indeterminado: 1/320 Positivo: Sup= 1/640

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
PASPFU **ASPERGILLUS FUMIGATUS PRECIPITINAS, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	El resultado hace referencia a la concentración de IgG específica. Negativo: Inf 1,00 U/mL Indeterminado: 1,00 - 2,00 U/mL Positivo: Sup 2,00 U/mL
PRASNI **ASPERGILLUS NIDULANS PRECIPITINAS, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 1,00 U/mL Indeterminado: 1,00 - 2,00 U/mL Positivo: Sup 2,00 U/mL
PASPN **ASPERGILLUS NIGER PRECIPITINAS, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	El resultado hace referencia a la concentración de IgG específica. Negativo: Inf Indeterminado: 1,00 - 2,00 Positivo: Sup 2,00
DNAS **ASPERGILLUS SPP DNA, MUESTRA RESPIRATORIA**	Reacción en cadena de la polimerasa.	8	Rec. 1 mL Esputo [Refr.] Rec. 1 mL BAS [Refr.] Rec. 1 mL BAL [Refr.] No añadir ningun tipo de sustancia conservante ni antiséptica.	DNA Aspergillus spp en muestra respiratoria (resultado): No se detecta
PASPT **ASPERGILLUS TERREUS PRECIPITINAS, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	El resultado hace referencia a la concentración de IgG específica. Negativo: Inf Indeterminado: 1,00 - 2,00 Positivo: Sup 2,00
AGASTHE **ASTROVIRUS ANTIGENO, HECES**	Inmunocromatografía.	2	Rec. 2 g Heces [Refr.] No congelar y descongelar la muestra en repetidas ocasiones.	Negativo

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G14109 **ATAXIA - TELANGIECTASIA · ATM · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ATM	*1*
G11290 **ATAXIA CEREBELOSA CON NEUROPATÍA Y ARREFLEXIA VESTIBULAR BILATERAL, SÍNDROME DE· RFC1 · A. FRAGMENT**	Análisis de Fragmentos	37	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	RFC1	
G11230 **ATAXIA CON DÉFICIT DE VITAMINA E · TTPA · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TTPA	*1*
G11155 **ATAXIA DE FRIEDREICH (FRDA) · FXN · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FXN	*1*
G11006 **ATAXIA DE FRIEDREICH · FXN · A.FRAGMENTOS**	Análisis de Fragmentos	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FXN	*1*
G11280 **ATAXIA DE FRIEDREICH · FXN · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FXN	*1*
G11007 **ATAXIA EPISÓDICA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CACNA1A, CACNB4, KCNA1, SCN2A, SLC1A3	*5*
G11131 **ATAXIA EPISÓDICA 2 · CACNA1A · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CACNA1A	*1*
G11008 **ATAXIA ESPÁSTICA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AFG3L2, KIF1C, MARS2, MTPAP, SACS, VAMP1	*6*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G11292 **ATAXIA ESPINOCEREBELAR AMPLIADO · (SCA1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 17, 27B, 36, FXN, RFC1) · A.FRAGMENTOS**	Análisis de Fragmentos	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ATXN1, ATXN10, ATXN2, ATXN3, ATXN7, ATXN8, CACNA1A, FGF14, FXN, NOP56, PPP2R2B, RFC1, TBP *13*
G11132 **ATAXIA ESPINOCEREBELAR AR 1 · SETX · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SETX *1*
G11198 **ATAXIA ESPINOCEREBELAR CON EPILEPSIA · POLG · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	POLG *1*
G11009 **ATAXIA ESPINOCEREBELAR TIPO 1 · ATXN1 · A.FRAGMENTOS**	Análisis de Fragmentos	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ATXN1 *1*
G11010 **ATAXIA ESPINOCEREBELAR TIPO 10 · ATXN10 · A.FRAGMENTOS**	Análisis de Fragmentos	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ATXN10 *1*
G11208 **ATAXIA ESPINOCEREBELAR TIPO 12 · PPP2R2B · A. FRAGMENTOS**	Análisis de Fragmentos	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PPP2R2B *1*
G11238 **ATAXIA ESPINOCEREBELAR TIPO 14 (SCA 14) · PRKCG · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PRKCG *1*
G11207 **ATAXIA ESPINOCEREBELAR TIPO 17 · TBP · A. FRAGMENTOS**	Análisis de Fragmentos	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TBP *1*
G11011 **ATAXIA ESPINOCEREBELAR TIPO 2 · ATXN2 · A.FRAGMENTOS**	Análisis de Fragmentos	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ATXN2 *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G11305 **ATAXIA ESPINOCEREBELAR TIPO 27B (SCA27B) . FGF14 . A.FRAGMENTOS**	Análisis de Fragmentos	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FGF14	*1*
G11012 **ATAXIA ESPINOCEREBELAR TIPO 3 · ATXN3 · A.FRAGMENTOS**	Análisis de Fragmentos	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ATXN3	*1*
G11310 **ATAXIA ESPINOCEREBELAR TIPO 31 · BEAN1 · A.FRAGMENTOS**	Análisis de Fragmentos	35	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Se informa para cada paciente BEAN1	*1*
G11209 **ATAXIA ESPINOCEREBELAR TIPO 31 · PLEKHG4 (c.-16C>T) · HOT SPOT**	Hot Spot	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PLEKHG4 [c.-16C>T]	*1*
G11182 **ATAXIA ESPINOCEREBELAR TIPO 36 (SCA36) · NOP56 · A.FRAGMENTOS**	Análisis de Fragmentos	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	NOP56	*1*
G11013 **ATAXIA ESPINOCEREBELAR TIPO 6 · CACNA1A · A.FRAGMENTOS**	Análisis de Fragmentos	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CACNA1A	*1*
G11014 **ATAXIA ESPINOCEREBELAR TIPO 7 · ATXN7 · A.FRAGMENTOS**	Análisis de Fragmentos	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ATXN7	*1*
G11206 **ATAXIA ESPINOCEREBELAR TIPO 8 · ATXN8 · A.FRAGMENTOS**	Análisis de Fragmentos	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ATXN8	*1*
G11273 **ATAXIA ESPINOCEREBELOSA TIPO 5 · SPTBN2 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SPTBN2	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G9546 **ATAXIA ESPINOCEREBOLOSA TIPO 23 · PDYN · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PDYN	*1*
G3126 **ATAXIA TELANGIECTASIA - LOUIS-BAR, SÍNDROME · ATM · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ATM	*1*
G7470 **ATAXIA TELANGIECTASIA - LOUIS-BAR, SÍNDROME · ATM, MRE11 · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ATM, MRE11	*2*
G11301 **ATAXIAS ESPINOCEREBELARES (SCA1, 2, 3, 6, 7) · PERFIL · A.FRAGMENTOS**	Análisis de Fragmentos	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA (2 tubos)) [Refr.]	ATXN1, ATXN2, ATXN3, ATXN7, CACNA1A	*5*
G11300 **ATAXIAS ESPINOCEREBELARES (SCA1,2,3,6,7,8,10,12,17,36) · PERFIL · A. FRAGMENTOS**	Análisis de Fragmentos	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA (2 tubos)) [Refr.] Plazo de entrega orientativo dependiendo de la complejidad en la secuenciación del Gen estudiado y de las caracteristicas genotípicas inherentes al paciente.	: Indicado en informe adjunto ATXN1, ATXN10, ATXN2, ATXN3, ATXN7, ATXN8, CACNA1A, NOP56, PPP2R2B, TBP	*10*
G11015 **ATAXIAS HEREDITARIAS · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABCB7, ABHD12, ACO2, AFG3L2, ANO10, APTX, ATCAY, ATM, ATP8A2, BEAN1, C10orf2, CACNA1A, CACNA1G, CACNB4, CASK, CCDC88C, CLCN2, CLN5, CYP27A1, DNMT1, EEF2, ELOVL4, FGF14, FLVCR1, FMR1, FXN, GOSR2, GRID2, GRM1, ITPR1, KCNA1, KCNC3, KCND3, KCNJ10, KIAA0226, KIF1C, LAMA1, MARS2, MTPAP, OPHN1, PDYN, PEX7, PHYH, PMPCA, PNKP, PNPLA6, POLG, PRKCG, PTF1A, RNF216, SACS, SCN2A, SETX, SIL1, SLC1A3, SLC52A2, SLC9A6, SNX14, SPTBN2, SQSTM1, SYNE1, SYT14, TDP1, TGM6, TPP1, TTBK2, TTC19, TTPA, TUBB4A, TXN2, VAMP1, VLDLR, WFS1, WWOX, ZNF592	*75*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G11016 **ATAXIAS HEREDITARIAS AD · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BEAN1, CACNA1A, CACNA1G, CACNB4, CCDC88C, DNMT1, EEF2, ELOVL4, FGF14, GRID2, ITPR1, KCNA1, KCNC3, KCND3, PDYN, PRKCG, SCN2A, SLC1A3, SPTBN2, SQSTM1, TGM6, TTBK2, TUBB4A, VAMP1 *24*
G11017 **ATAXIAS HEREDITARIAS AR · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABHD12, ACO2, AFG3L2, ANO10, APTX, ATCAY, ATM, ATP8A2, C10orf2, CLCN2, CLN5, CYP27A1, FLVCR1, FXN, GOSR2, GRID2, GRM1, KCNJ10, KIAA0226, KIF1C, LAMA1, MARS2, MTPAP, PEX7, PHYH, PMPCA, PNKP, PNPLA6, POLG, PTF1A, RNF216, SACS, SETX, SIL1, SLC52A2, SNX14, SPTBN2, SYNE1, SYT14, TDP1, TPP1, TTC19, TTPA, TXN2, VLDLR, WFS1, WWOX, ZNF592 *48*
G11018 **ATAXIAS HEREDITARIAS LX · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABCB7, CASK, FMR1, OPHN1, SLC9A6 *5*
G08007 **ATELOSTEOGÉNESIS II · SLC26A2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SLC26A2 *1*
G08006 **ATELOSTEOGÉNESIS TIPO I Y II · FLNB · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FLNB *1*
ATXT **ATOMOXETINA, SUERO**	Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectrometría de masas.	12	Rec. 1.1 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Cong.]	36,00 - 160,00 µg/L
DNAV **ATOPOBIUM VAGINAE DNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	Reacción en cadena de la polimerasa.	8	Rec. 1 Muestra/s Frotis cervicovaginal [Refr.]	DNA Atopobium vaginae (resultado): No se detecta
G11204 **ATROFIA DENTATO-RUBRO-PÁLIDO-LUISIANA (DRPLA) · ATN1 (expansión CAG) · A. FRAGMENTOS**	Análisis de Fragmentos	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ATN1 *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G12072 **ATROFIA GIRATA DE LA COROIDES Y LA RETINA · OAT · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	OAT	*1*
G11021 **ATROFIA MUSCULAR ESPINAL (EXCLUYENDO SMN1) · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ASAH1, ATP7A, BICD2, BSCL2, DCTN1 , DNAJB2 , DYNC1H1, EXOSC3, FBXO38, GARS, HSPB1, HSPB3, HSPB8, IGHMBP2, PLEKHG5, TRPV4, UBA1, VAPB	*18*
G11293 **ATROFIA MUSCULAR ESPINAL · SMN1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SMN1	*1*
G3002 **ATROFIA MUSCULAR ESPINAL · SMN1(del/dup (Ex7) ; dosis SMNdel/dup (Ex7) ; dosis SMN) · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SMN1 [del/dup (Ex7) ; dosis SMN MLPA]	*1*
G11022 **ATROFIA MUSCULAR ESPINAL DISTAL CONGÉNITA NO PROGRESIVA · TRPV4 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TRPV4	*1*
G11023 **ATROFIA MUSCULAR ESPINAL ESCAPULOPERONEAL · TRPV4 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TRPV4	*1*
G12006 **ATROFIA ÓPTICA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ACO2, AUH, C10orf2, C12ORF65, CISD2, DNA2, DNM1L, MFN2, MTPAP, NDUFS1, NR2F1, OPA1, OPA3, POLG, RTN4IP1, SLC25A4, SPG7, TIMM8A, TMEM126A, WFS1, YME1L1	*21*
G12062 **ATROFIA ÓPTICA TIPO 1 · OPA1 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	OPA1	*1*
G12007 **ATROFIA ÓPTICA TIPO 1 · OPA1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	OPA1	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G9532 **AUTOINFLAMATORIAS SISTÉMICAS HEREDITARIAS, ENFERMEDADES · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CD2BP1, MEFV , MVK , NLRP3, NOD2, TNFRSF1A	*6*
G17009 **AUTOINFLAMATORIO FAMILIAR (SIMILAR A BEHÇET), SÍNDROME · TNFAIP3 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TNFAIP3	*1*
516 **AUTOPSIA COMPLETA**	Tinción / Observación microscópica.	5	Rec. 1 Pieza/s Tejido	Se informa para cada paciente	
2655 **AUTOPSIA FETAL**	Tinción / Observación microscópica.	5	Rec. 1 Pieza/s Tejido	Se informa para cada paciente	
517 **AUTOPSIA PARCIAL**	Tinción / Observación microscópica.	5	Rec. 1 Pieza/s Tejido	Se informa para cada paciente	
G12047 **AXENFEL RIEGER, SÍNDROME DE · FOXC1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FOXC1	*1*
G12067 **AXENFELD RIEGER, SÍNDROME DE · FOXC1 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FOXC1	*1*
AZF **AZOOSPERMIA/OLIGOESPERMA SEVERA · CROMOSOMA Y (MICRODELECIONES AZFa, AZFb, AZFc) · A.FRAGMENTOS**	Multiplex PCR+Análisis de fragmentos.	10	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CROMOSOMA Y	*1*
B5701 **B5701 (ALELO HLA-B*57:01), SANGRE TOTAL**	Multiplex PCR-Real Time.	7	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Se informa para cada paciente	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
BADIG **BABESIA DIVERGENS (PIROPLASMOSIS) ANTICUERPOS IGG, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	9	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo
DNBA **BABESIA SPP DNA, SANGRE TOTAL**	PCR-Real Time.	7	Rec. 3 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.]	DNA Babesia spp (resultado): No se detecta
DNABA **BACILLUS ANTHRACIS DNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	Reacción en cadena de la polimerasa.	6	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 5 mL BAS [Refr.] Rec. 2 g Heces [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Exudado de herida [Refr.] Rec. 1 mL Esputo [Refr.]	No se detecta
BACLO **BACLOFENO, SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	9	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.] No utilizar tubos con gel separador.	I.Terapéutico: 0,08 - 0,60 mg/L Toxicidad: Sup 1,10 mg/L
OLIG **BANDAS OLIGOCLONALES IgG, LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO**	Isoelectroenfoque.	9	Rec. 500 uL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 1 mL LCR (1 x Tubo estéril) [Refr.] Se precisan ambas muestras.	No se detecta presencia de bandas oligoclonales
BOLIGM **BANDAS OLIGOCLONALES IGM, LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO**	Isoelectroenfoque.	30	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 0.5 mL LCR (1 x Contenedor estéril) [Refr.] Se precisan ambas muestras.	Indicado en informe adjunto

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
COBARSAI **BARBITAL CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SALIVA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	3	Rec. 1 mL Saliva [Refr.]	Incertidumbre de medida 4 ng/mL Límite de cuantificación 25 ng/mL
COBARSTI **BARBITAL CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SANGRE**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	3	Rec. 10 mL Sangre total Oxalato/Fluoruro (1 x Tubo Sangre Total-Oxalato/Fluoruro) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total Heparina litio (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Tubo oxalato potásico/Fluoruro sódico Ref. SAP 600088318	Incertidumbre de medida 4 ng/mL Límite de cuantificación 25 ng/mL
CBOM **BARBITÚRICOS CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), ORINA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	12	Rec. 10 mL Orina (1 x Contenedor 70 mL) [Refr.]	Se utiliza como criterio de Positividad que la concentración sea superior o igual al valor del límite de cuantificación más el valor de incertidumbre del ensayo. En caso contrario, el resultado es Negativo. Amobarbital : Incertidumbre de medida 5 ng/mL Amobarbital : Límite de cuantificación 25 ng/mL Barbital : Incertidumbre de medida 5 ng/mL Barbital : Límite de cuantificación 25 ng/mL Butabarbital : Incertidumbre de medida 5 ng/mL Butabarbital : Límite de cuantificación 25 ng/mL Butalbital : Incertidumbre de medida 5 ng/mL Butalbital : Límite de cuantificación 25 ng/mL Fenobarbital : Incertidumbre de medida 5 ng/mL Fenobarbital : Límite de cuantificación 25 ng/mL Pentobarbital : Incertidumbre de medida 5 ng/mL Pentobarbital : Límite de cuantificación 25 ng/mL Secobarbital : Incertidumbre de medida 5 ng/mL Secobarbital : Límite de cuantificación 25 ng/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
BAR **BARBITÚRICOS, ORINA**	Enzimoinmunoanálisis	1	Rec. 10 mL Orina [Refr.] Cadena de custodia Se calibra con secobarbital.	Negativo El valor discriminante de la técnica es 200 ng/mL
G09017 **BARDET BIEDL, SÍNDROME DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ARL6, BBIP1, BBS1, BBS10, BBS12, BBS2, BBS4, BBS5, BBS7, BBS9, C8ORF37, ccdc28b, CEP290, LZTFL1, MKKS, MKS1, SDCCAG8, TMEM67, TRIM32, TTC8, WDPCP *21*
AGBA **BARIO, AGUA**	Absorción atómica.	15	Rec. 100 mL Agua (1 x Envase aséptico) [Refr.] Alt. 100 mL Agua (1 x Envase aséptico) (<2 Ác.nítrico)	Agua de diálisis Inf 0,10 mg/L
BASU **BARIO, SUERO**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	4	Rec. 1 mL Suero (libre trazas metales) (1 x Tubo Suero metales traza) [Refr.]	No expuestos Inf 60,00 µg/L Límite de cuantificación: 1,00 µg/L
G01007 **BARTH, SÍNDROME DE · TAZ · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TAZ *1*
BAHQG **BARTONELLA QUINTANA ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/64 Interpretación: Positivo: Sup= 1/64
BAHQM **BARTONELLA QUINTANA ANTICUERPOS IgM, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/12 Interpretación: Positivo: Sup= 1/12

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
DBHQ **BARTONELLA (B.HENSELAE, B.QUINTANA, B. CLARRIDGEIAE) DNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	PCR-Real Time.	8	Rec. 3 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 3 mL Humor vitreo/acuoso (1 x Escobillón seco.) [Cong.] Alt. 3 mL LCR (1 x Tubo estéril) [Refr.] Alt. 1 Pieza/s Tejido parafinado (1 x Recipiente de plástico) Alt. 1 Muestra/s Absceso (1 x Escobillón seco.) [Refr.]	: No se detecta
BAHG **BARTONELLA (ROCHALIMAEA) HENSELAE (ARAÑAZO DE GATO) ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/512 Interpretación: Positivo: Sup= 1/512
BAHM **BARTONELLA (ROCHALIMAEA) HENSELAE (ARAÑAZO DE GATO) ANTICUERPOS IgM, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/12 Interpretación: Positivo: Sup= 1/12
G02005 **BART-PUMPFREY, SÍNDROME DE · GJB2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GJB2 *1*
G09052 **BARTTER TIPO 3, 4B, SÍNDROME DE · CLCNKB · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CLCNKB *1*
G16030 **BARTTER TIPO 4A, SÍNDROME DE · BSND · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BSND *1*
G09038 **BARTTER, SÍNDROME · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BSND, CASR , CLCNKA, CLCNKB, KCNJ1, MAGED2, SLC12A1, SLC12A3 *8*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G02006 **BEARE-STEVENSON CUTIS GIRATA, SÍNDROME DE · FGFR2 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FGFR2	*1*
G03108 **BECKWITH-WIEDEMANN, SÍNDROME DE · 11p15 · MS-MLPA**	MS-MLPA (Metilación específica-MLPA)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	[11p15]	*1*
G03109 **BECKWITH-WIEDEMANN, SÍNDROME DE · CDKN1C · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CDKN1C	*1*
G12009 **BEHR, SÍNDROME DE · OPA1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	OPA1	*1*
CDOH **BENZODIACEPINAS CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), ORINA**	Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectrometría de masas.	5	Rec. 1 mL Orina (1 x Contenedor 70 mL) [Refr.] Cadena de custodia	Se utiliza como criterio de Positividad que la concentración sea superior o igual al valor del límite de cuantificación más el valor de incertidumbre del ensayo. En caso contrario, el resultado es Negativo. 7-amino-clonazepam : Incertidumbre de medida 4,4 ng/mL 7-amino-clonazepam : Límite de cuantificación 25 ng/mL 7-amino-flunitrazepam : Incertidumbre de medida 4,8 ng/mL 7-amino-flunitrazepam : Límite de cuantificación 25 ng/mL Alprazolam : Incertidumbre de medida 4,8 ng/mL Alprazolam : Límite de cuantificación 25 ng/mL Clonazepam : Incertidumbre de medida 5 ng/mL Clonazepam : Límite de cuantificación 25 ng/mL Diazepam : Incertidumbre de medida 3,8 ng/mL Diazepam : Límite de cuantificación 25 ng/mL Flunitrazepam : Incertidumbre de medida 5 ng/mL Flunitrazepam : Límite de cuantificación 25 ng/mL Lorazepam : Incertidumbre de medida 3,9 ng/mL Lorazepam : Límite de cuantificación 25 ng/mL Nordiazepam : Incertidumbre de medida 4,1 ng/mL Nordiazepam : Límite de cuantificación 25 ng/mL Oxazepam : Incertidumbre de medida 3,8 ng/mL Oxazepam : Límite de cuantificación 25 ng/mL	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
BSLP **BENZODIACEPINAS CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SALIVA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 1 mL Saliva [Refr.]	7-amino-clonazepam : Incertidumbre de medida 0,5 ng/mL 7-amino-clonazepam : Valor de corte recomendado: 2,00 ng/mL 7-amino-flunitrazepam : Incertidumbre de medida 0,6 ng/mL 7-amino-flunitrazepam : Valor de corte recomendado: 2,00 ng/mL Alprazolam : Incertidumbre de medida 0,8 ng/mL Alprazolam : Valor de corte recomendado: 2,00 ng/mL Clonazepam : Incertidumbre de medida 0,7 ng/mL Clonazepam : Valor de corte recomendado: 2,00 ng/mL Diazepam : Incertidumbre de medida 0,5 ng/mL Diazepam : Valor de corte recomendado: 2,00 ng/mL Flunitrazepam : Incertidumbre de medida 1,1 ng/mL Flunitrazepam : Valor de corte recomendado: 3,00 ng/mL Lorazepam : Incertidumbre de medida 0,5 ng/mL Lorazepam : Valor de corte recomendado: 2,00 ng/mL Nordiazepam : Incertidumbre de medida 0,6 ng/mL Nordiazepam : Valor de corte recomendado: 2,00 ng/mL Oxazepam : Incertidumbre de medida 0,6 ng/mL Oxazepam : Valor de corte recomendado: 2,00 ng/mL
BSAI **BENZODIACEPINAS CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SANGRE**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 10 mL Sangre total Oxalato/Fluoruro (1 x Tubo Sangre Total-Oxalato/Fluoruro) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total Heparina litio (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Tubo oxalato potásico/Fluoruro sódico Ref. SAP 600088318	7-amino-clonazepam : Incertidumbre de medida 0,3 ng/mL 7-amino-clonazepam : Valor de corte recomendado: 2,00 ng/mL 7-amino-flunitrazepam : Incertidumbre de medida 0,3 ng/mL 7-amino-flunitrazepam : Valor de corte recomendado: 2,00 ng/mL Alprazolam : Incertidumbre de medida 0,6 ng/mL Alprazolam : Valor de corte recomendado: 2,00 ng/mL Clonazepam : Incertidumbre de medida 0,7 ng/mL Clonazepam : Valor de corte recomendado: 2,00 ng/mL Diazepam : Incertidumbre de medida 0,3 ng/mL Diazepam : Valor de corte recomendado: 2,00 ng/mL Flunitrazepam : Incertidumbre de medida 1,1 ng/mL Flunitrazepam : Valor de corte recomendado: 3,00 ng/mL Lorazepam : Incertidumbre de medida 0,4 ng/mL Lorazepam : Valor de corte recomendado: 2,00 ng/mL Nordiazepam : Incertidumbre de medida 0,4 ng/mL Nordiazepam : Valor de corte recomendado: 2,00 ng/mL Oxazepam : Incertidumbre de medida 0,3 ng/mL Oxazepam : Valor de corte recomendado: 2,00 ng/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
BZO **BENZODIACEPINAS, ORINA**	Enzimoinmunoanálisis	1	Rec. 10 mL Orina (1 x Tubo 10 mL.) [Refr.] Cadena de custodia	Negativo El valor discriminante de la técnica es 200 ng/mL
AGBR **BERILIO, AGUA**	Absorción atómica.	15	Rec. 100 mL Agua (1 x Envase aséptico) [Refr.] Alt. 100 mL Agua (1 x Envase aséptico) (<2 Ác.nítrico) Acidificar a pH < 2.	Agua de diálisis Inf 0,01 mg/L
BERI **BERILIO, SUERO**	Espectrometría Absorción Atómica / Cámara de grafito.	14	Rec. 1 mL Suero (libre trazas metales) (1 x Tubo Suero metales traza) [Refr.]	Inf 3,00 µg/L
G04054 **BERNARD-SOULIER, SÍNDROME DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GP1BA, GP1BB, GP9 *3*
G12010 **BESTOFINOPATÍA AR · BEST1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BEST1 *1*
NGF **BETA - NGF, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	17	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Separar y congelar inmediatamente.	Inf 14,00 pg/mL
TBPLCR **BETA - TRACE PROTEINA, LCR**	Nefelometría - Turbidimetría.	7	Rec. 2 mL LCR [Refr.]	LCR 8,89 - 25,9 mg/L Límite de cuantificación: Inf 0,22 mg/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
TBPMB **BETA - TRACE PROTEINA, MUESTRA BIOLÓGICA**	Nefelometría - Turbidimetría.	7	Rec. 2 mL Secreción nasal (1 x Tubo estéril) [Refr.] Alt. 2 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 2 mL Orina (1 x Contenedor estéril) [Refr.]	Secreción nasal/ótica Presencia de LCR improbable: Inf 0,70 mg/L Secreción nasal/ótica Presencia de LCR en secreción probable: Sup= 1,29 mg/L Secreción nasal/ótica Es necesario el envío de muestra de suero para poder analizar la secreción en paralelo con el suero e interpretar el resultado: 0,70 - 1,29 mg/L Suero Inf 0,70 mg/L Orina Inf= 3,75 mg/L
B2DEFH **BETA 2 DEFENSINA, HECES**	Enzimoinmunoanálisis	13	Rec. 10 g Heces [Refr.]	8,00 - 60,00 ng/mL
AAGP **BETA 2 GLICOPROTEINA 1 IgA ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunoanálisis con detección fluorescente	4	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 7,00 U/mL Indeterminado: 7,00 - 10,00 U/mL Positivo: Sup 10,00 U/mL
BETAM **BETA 2 GLICOPROTEINA 1 IgG ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunoanálisis con detección fluorescente	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Muestra alternativa: plasma.	Negativo: Inf 7,00 U/mL Indeterminado: 7,00 - 10,00 U/mL Positivo: Sup 10,00 U/mL
BETMM **BETA 2 GLICOPROTEINA 1 IgM ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunoanálisis con detección fluorescente	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 7,00 U/mL Indeterminado: 7,00 - 10,00 U/mL Positivo: Sup 10,00 U/mL
B2LCR **BETA 2 MICROGLOBULINA, LCR**	Turbidimetría.	5	Rec. 1 mL LCR [Refr.]	0,60 - 2,10 mg/L
BMOR **BETA 2 MICROGLOBULINA, ORINA**	Turbidimetría.	1	Rec. 2 mL Orina [Refr.]	Inf 0,30 µg/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
BM24 **BETA 2 MICROGLOBULINA, ORINA 24H**	Turbidimetría.	3	Rec. 2 mL Orina 24h. (alícuota) (1 x Contenedor 2500 mL.) [Refr.]	Excreción (24h): 30,00 - 370,00 µg/24h Volumen de orina remitido (diuresis): 600,00 - 1600,00 mL
B2MIG **BETA 2 MICROGLOBULINA, SUERO**	Turbidimetría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Ambos 0 - 60 Años 0,80 - 2,40 mg/L Ambos Sup - 60 Años Inf= 3,00 mg/L
B2TR **BETA 2 TRANSFERRINA, SUERO Y SECRECIÓN NASAL**	Isoelectroenfoque.	11	Rec. 0.3 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 0.3 mL Secreción nasal (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Beta 2 transferrina en secreción nasal: Negativo Beta 2 transferrina en suero: Negativo
CARO **BETA CAROTENO, SUERO**	Cromatografía Líquida Alta Resolución / Espectrometria.	6	Rec. 0.25 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Cong.] Muestra protegida de la luz Previo a la toma de muestras sanguíneas, se deberá evitar el consumo de zanahoria y naranja. Asimismo, se puede detectar un aumento en las concentraciones plasmáticas tras la aplicación de bronceadores tópicos, así como una disminución de estas posterior a la administración de kanamicina, metformina, neomicina y anticonceptivos orales.	100,00 - 850,00 ug/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
BDGLUS **BETA D-GLUCANO EN SUERO**	Espectrometría.	14	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Cong.]	Este método no detecta Cryptococcus, Zygomycetes ni Blastomyces dermatitidis. Interpretación: Negativo: Inf 70,00 pg/mL Interpretación: Indeterminado: 70,00 - 95,00 pg/mL Interpretación: Positivo: Sup= 95,00 pg/mL
MORQ **BETA GALACTOSIDASA (Gangliosidosis GM1 Y Morquio B), SANGRE TOTAL**	Fluorimetría.	15	Rec. 10 mL Sangre total Heparina litio (1 x Tubo sangre heparina litio) La muestra debe recibirse en un plazo de 12 horas máximo tras su obtención. Para envío de la muestra contactar previamente con CIC para determinar fecha de envío. Hoja de solicitud y Consentimiento Informado - Resumen de la historia clínica del paciente y consentimiento informado específicos.	86,00 - 419,00 nmol/h/mg prot
BBDH **BETA HIDROXIBUTIRATO, SUERO**	Enzimático UV.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	Nota: Los valores de referencia son orientativos. En condiciones de ayuno los valores aumentan significativamente. Ambos 0 - 14 Años 0,02 - 0,27 mmol/L Ambos Sup - 14 Años 0,02 - 0,43 mmol/L
BCLUCL **BETA-GLUCOCEREBROSIDASA (ENF DE GAUCHER), LEUCOCITOS**	Fluorimetría.	30	Rec. 10 mL Sangre total Heparina litio Indispensable aviso previo.	3,50 - 14,00 nmol/h/mg pr

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
BGCSS **BETA-GLUCOCEREBROSIDASA (ENFERMEDAD DE GAUCHER), SANGRE SECA**	Fluorimetría.	17	Rec. 1 Muestra/s Sangre seca en papel de filtro (1 x Papel de filtro Whatman 903) Recoger gotas de sangre sin anticoagulante en papel de filtro. Dejar secar al aire libre durante 1 hora. Guardar en nevera en bolsa de plástico cerrada hasta el envío. Volumen mínimo: 2 círculos de 10 mm - Volumen óptimo: 4 círculos de 10 mm	1,30 - 10,06 mmol/Lxh
BGLUCS **BETA-GLUCURONIDASA, SUERO**	Fluorimetría.	30	Rec. 5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Ayuno. Evitar hemolisis. Antes de centrifugar dejar retraer el coagulo. Separar el suero en otro tubo antes de las 2 h de la obtención de la muestra y congelar.	13,00 - 101,00 nmol/h/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
EBHX **BETA-HEXOSAMINIDASA ESTUDIO, SUERO**	Electroforesis + Fluorimetría	30	Rec. 5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Separar y congelar inmediatamente. Ayuno mínimo de 8 horas. Criterios de rechazo: Hemólisis, Lipemia, Contaminación -Esperar a que se retraiga el coágulo y centrifugar Centrifugar la sangre a 2500 rpm 10 minutos a Tª ambiente en las primeras 2 h de su obtención, separar el sobrenadante y congelar inmediatamente a -20ºC	Indicado en informe adjunto
BHPV **BETA-PAPILOMAVIRUS (B-HPV) DNA DETECCIÓN/TIPIFICACIÓN, MUESTRA BIOLÓGICA**	PCR-Secuenciación.	7	Rec. 1 Muestra/s Biopsia (1 x Contenedor con solución salina) [Refr.] Alt. 1 Muestra/s Lesión de piel [Refr.] Las lesiones cutáneas por Papilomavirus no suelen ser húmedas. Lo más recomendado es biopsia de lesión, o en caso de no poder tomarla de esta forma, raspado con un instrumento cortante y después recoger descamación pasando torunda e introduciendo en vial estéril.	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G04040 **BETA-TALASEMIA - TROMBOCITOPENIA LIGADA AL X · GATA1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GATA1 *1*
BICO **BICARBONATO, ORINA**	Espectrometría.	7	Rec. 10 mL Orina [Refr.]	20,00 - 50,00 mmol/L
BIC **BICARBONATO, SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero tubo tapado (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Enviar tubo tapado en bolsa naranja. Dejar nota indicando la prueba en la bolsa.	Neonatos Ambos 0 - 2 Meses 17,00 - 24,00 mmol/L Ambos 2 - 24 Meses 16,00 - 24,00 mmol/L Adultos 21,00 - 31,00 mmol/L Ambos 3 - 4 Años 19,00 - 24,00 mmol/L
AGBICA **BICARBONATOS, AGUA**	Espectrometría.	10	Rec. 100 mL Agua (1 x Envase aséptico) [Refr.]	mg/L No disponibles
BCTG **BICTEGRAVIR, SUERO**	Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectrometría de masas.	21	Rec. 3 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Cong.]	I.Terapéutico: Máximo 4,50 - 7,7 mg/L I.Terapéutico: Mínimo 1,70 - 3,5 mg/L
BD **BILIRRUBINA DIRECTA, SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Proteger de la luz.	Inf 0,30 mg/dL
BI **BILIRRUBINA INDIRECTA, SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Proteger de la luz.	Bilirrubina directa: Inf 0,30 mg/dL Bilirrubina total: Ambos 0 - 1 Días 2,00 - 6,00 mg/dL Bilirrubina total: Ambos 1 - 2 Días 6,00 - 10,00 mg/dL Bilirrubina total: Ambos 2 - 5 Días 4,00 - 8,00 mg/dL Bilirrubina total: Ambos 5 - 365 Días Inf 1,00 mg/dL Bilirrubina total: Ambos 1 - 17 Años Inf 1,00 mg/dL Bilirrubina total: Ambos Sup - 17 Años Inf 1,20 mg/dL Bilirrubina indirecta: Inf 0,90 mg/dL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
BTLC **BILIRRUBINA TOTAL, LCR**	Espectrometría.	1	Rec. 2 mL LCR (1 x Tubo protegido de la luz) [Refr.] Proteger de la luz.	Inf 1,10 mg/dL	
BTL **BILIRRUBINA TOTAL, LIQUIDO BIOLOGICO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Líquido biológico [Refr.] Proteger de la luz.	mg/dL Interpretación según criterio clínico	
BT **BILIRRUBINA TOTAL, SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Proteger de la luz.	Ambos 0 - 1 Días 2,00 - 6,00 mg/dL Ambos 1 - 2 Días 6,00 - 10,00 mg/dL Ambos 2 - 5 Días 4,00 - 8,00 mg/dL Ambos 5 - 365 Días Inf 1,00 mg/dL Ambos 1 - 17 Años Inf 1,00 mg/dL Ambos Sup - 17 Años Inf 1,20 mg/dL	
G03003 **BIOGÉNESIS PERIXOSOMAL 1B (NALD/IRD), DESORDEN DE · PEX1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PEX1	*1*
G03004 **BIOGENÉSIS PERIXOSOMAL 9B, DESORDEN DE · PEX7 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PEX7	*1*
ELF **BIOMARCADOR FIBROSIS HEPÁTICA, SUERO**	Inmunoanálisis	9	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	Fibrosis ausente o leve: Inf 7,70 Fibrosis grave: Sup 9,80 Fibrosis moderada: 7,70 - 9,70	
G15003 **BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · (1p36)/(19q13) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	[(1p36) y (19p13)]	*1*
G15017 **BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · ALK(2p23) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	ALK [2p23]	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G15004 **BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · BCL2(18q21.3) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	BCL2 [18q21.3]	*1*
G15108 **BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · BCL2/IGH (t(14;18)(q32.3;q21.3)) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	BCL2/IGH [t(14;18)(q32.3;q21.3)]	*1*
G15005 **BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · BCL6(3q27.3) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	BCL6 [3q27.3]	*1*
G15051 **BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · BRAF(V600X) · HOT SPOT**	Hot Spot	7	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	BRAF [V600K, V600E2, V600D, V600M, V600G]	*1*
G15006 **BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · CCND1(BCL1)(11q13) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	CCND1(BCL1) [11q13]	*1*
G15093 **BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · CCND1(BCL1)/IGH(t(11;14)(q13;q32)) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	CCND1(BCL1)/IGH [t(11;14)(q13;q32)]	*1*
G15190 **BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · CDKN2A (9P21.3), CDKN2B (9P21.3) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	CDKN2A [[9p21.3]] , CDKN2B [[9p21.3]]	*2*
G15008 **BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · C-MYC (8q24) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	C-MYC [8q24]	*1*
G15009 **BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · DDIT3 (CHOP)(12q13) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	DDIT3 (CHOP) [12q13]	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G15026 **BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · EGFR(18, 19, 20, 21) · HOT SPOT**	Hot Spot	7	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	EGFR [exones 18, 19, 20, 21]	*1*
G15136 **BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · ERBB2 (20) · HOT SPOT**	Hot Spot	7	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	ERBB2	*1*
G15020 **BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · EWSR1(22q12) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	EWSR1 [22q12]	*1*
G15072 **BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · FGFR2 (10q26) BA REORDENAMIENTO · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	FGFR2 [10q26]	*1*
G15010 **BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · FUS(16p11) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	FUS [16p11]	*1*
G15184 **BIOMARCADORES EN TUMORES SOLIDOS · H3-3A (G34R/V) · HOT SPOT**	Hot Spot	7	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	H3-3A [G34R/V]	*1*
G15185 **BIOMARCADORES EN TUMORES SOLIDOS · H3-3A (K27M) · HOT SPOT**	Hot Spot	7	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado (1 x (Ninguno))	H3-3A [K27M]	*1*
G9009 **BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · HER2/NEU (ERBB2) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	HER2/NEU (ERBB2)	*1*
G15078 **BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · IDH1(R132), IDH2(R172) · HOT SPOT**	Hot Spot	7	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	IDH1 [R132H] , IDH2 [R172W]	*2*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G15088 **BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · IGH(14q32) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	IGH [14q32]	*1*
G15073 **BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · INESTABILIDAD DE MICROSATÉLITES (MSI) · A. FRAGMENTOS**	Análisis de Fragmentos	7	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 1 Pieza/s Tejido tumoral parafinado (1 x Envase aséptico) Rec. 1 Pieza/s Tejido sano parafinado (1 x Envase aséptico)	MSI	*1*
G15047 **BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · KIT(9, 11, 13, 17), PDGFRA(12, 14, 18) · HOT SPOT**	Hot Spot	7	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	KIT [exones 9, 11, 13, 17] , PDGFRA [exones 12, 14, 18]	*2*
G15046 **BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · KIT(9,11,13,17) · HOT SPOT**	Hot Spot	7	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado [Refr.]	KIT [exones 9,11,13,17]	*1*
G15024 **BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · KRAS(2, 3, 4) · HOT SPOT**	Hot Spot	7	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	KRAS [exones 2, 3, 4]	*1*
G15007 **BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · MALT1(18q22) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	MALT1 [18q22]	*1*
G15011 **BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · MDM2(12q15) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	MDM2 [12q15]	*1*
G15018 **BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · MET(7q31.2) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	MET [7q31.2]	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G15043 **BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · MGMT(METILACION PROMOTOR) · METILACIÓN**	Test de Metilación.	7	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	MGMT [Metilación]	*1*
G15095 **BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · MLH1(METILACION PROMOTOR) · METILACIÓN**	Test de Metilación.	7	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	MLH1	*1*
G15015 **BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · MYCN(2p24) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	MYCN [2p24]	*1*
G15025 **BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · NRAS(2, 3, 4) · HOT SPOT**	Hot Spot	7	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	NRAS [exones 2, 3, 4]	*1*
G15044 **BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · NTRK1(1q23.1) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	NTRK1 [1q23.1]	*1*
G15069 **BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · NTRK2 (9q21.3) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	NTRK2 [9q21.3]	*1*
G15070 **BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · NTRK3 (15q25.3) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	NTRK3 [15q25.3]	*1*
G15048 **BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · PDGFRA(12,14,18) · HOT SPOT**	Hot Spot	7	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	PDGFRA [exones 12, 14, 18]	*1*
G15016 **BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · RET(10q11.21) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	RET [10q11.21]	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G15019 **BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · ROS1(6q22) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	ROS1 [6q22]	*1*
G15101 **BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · TERT (C228T, C250T) · HOT SPOT**	Hot Spot	7	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	TERT [C228T, C250T]	*1*
G15058 **BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · TP53 · SANGER**	Secuenciación Sanger	10	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	TP53	*1*
G15014 **BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · TP53(17p13) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	TP53 [17p13]	*1*
G15125 **BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS BÁSICO · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	12	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	AKT1, ALK, ARAF, ARID1A, ATM, BRAF, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDK12, CHEK1, CHEK2, EGFR, ERBB2, ERBB3, ESR1, EZH2, FANCA, FANCL, FGFR1, FGFR2, FGFR3, HRAS, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, MAP2K1, MAP2K2, MET, MLH1, MRE11A, MSH2, MSH6, NBN, NRAS, NTRK1, NTRK2, NTRK3, PALB2, PDGFRA, PIK3CA, PMS2, POLE, RAD51B, RAD51C, RAD51D, RAD54L, RAF1, RET, ROS1, TERT, TP53, TR, TSC1, TSC2	*56*
G15182 **BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · EGFR (7P11) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	EGFR [7p11]	*1*
G15151 **BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · FGFR3 (4p16.3) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	FGFR3	*1*
G15181 **BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · IRF4 (MUM1) (6P25) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado		

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G15159 **BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · PIK3CA (E542K, E545K/Q, H1047L/R) · HOT SPOT**	Hot Spot	7	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	PIK3CA [E542K, E545K/Q, H1047L/R] *1*
G15160 **BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · POLE (P286R, V411L, S297F, A456P, S459F) · HOT SPOT**	Secuenciación Sanger	7	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	POLE [[P286R, V411L, S297F, A456P, S459F]] *1*
G15156 **BIOMARCADORES EN TUMORES SÓLIDOS · RET · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	18	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	RET *1*
2969 **BIOPSIA CASO EXTERNO / 2ª OPINIÓN · DIAGNÓSTICO**	Interpretación	5	Rec. 1 Pieza/s Tejido	Se informa para cada paciente
2OPB **BIOPSIA CASO EXTERNO / 2ª OPINIÓN · TECNIFICACIÓN (BLOQUE) + DIAGNÓSTICO**	Interpretación	5	Rec. 1 Pieza/s Tejido	Se informa para cada paciente
505 **BIOPSIA GRUPO 1 - SENCILLA**	Tinción / Observación microscópica.	3	Rec. 1 Pieza/s Tejido	Se informa para cada paciente
506 **BIOPSIA GRUPO 2 - COMPLICADA / PIEZA QUIRURGICA.PEQUEÑA**	Tinción / Observación microscópica.	4	Rec. 1 Pieza/s Tejido (1 x Contenedor con formol)	Se informa para cada paciente
507 **BIOPSIA GRUPO 3 - ALTA COMPLEJIDAD / PIEZA QUIRURGICA. CON DISECCIÓN**	Tinción / Observación microscópica.	4	Rec. 1 Pieza/s Tejido	Se informa para cada paciente
508 **BIOPSIA GRUPO 4 - PIEZA QUIRURGICA CON CIRUGÍA RADICAL**	Tinción / Observación microscópica.	4	Rec. 1 Pieza/s Tejido	Se informa para cada paciente

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
509 **BIOPSIA INTRAOPERATORIA**	Tinción / Observación microscópica.	4	Rec. 1 Pieza/s Tejido	Se informa para cada paciente
524 **BIOPSIA MUSCULAR - ESTUDIO ENZIMATICO**	Tinción / Observación microscópica.	4	Rec. 1 Pieza/s Tejido	Se informa para cada paciente
B200N **BIOTA200 - INTOLERANCIA ALIMENTARIA + MICROBIOTA**	No se aplica.	20	Rec. 1 Muestra/s Heces (1 x Kit específico) [Refr.] Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 1 mL Plasma (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Heces recogidas en kit específico (550000528) facilitado por el laboratorio. Seguir instrucciones facilitadas en el kit. Las muestras deben llegar al laboratorio central de lunes a miércoles, evitando vísperas de festivos. Se requiere peticionario específico cumplimentado.	Trazadora B200: Indicado en informe adjunto
VITH **BIOTINA (VITAMINA H), SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	7	Rec. 2 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Deficiencia Inf 100,00 ng/L Nivel óptimo Sup 250,00 ng/L Nivel subóptimo 100,00 - 250,00 ng/L
BIOT **BIOTINIDASA ACTIVIDAD, SUERO**	Espectrometría.	32	Rec. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.]	7,80 - 13,10 nmol/mL/min Límite de cuantificación: 0,10 nmol/mL/min

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G03093 **BIOTINIDASA, DEFICIENCIA DE · BTD · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BTD *1*
BIPSU **BIPERIDENO, SUERO**	Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectrometría de masas.	20	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] - El motivo de la prescripción - La edad, altura y peso del paciente, siempre que sea posible - La fecha de inicio del tratamiento y / o la fecha de cualquier cambio de dosis - La fecha y hora de la toma de muestra la fecha y hora de la última dosis - Los datos de la dosis (cantidad administrada, frecuencia, vía de administración) - Resumen historia clínica del paciente Para una correcta validación del resultado, todas las solicitudes siempre debe contener: -Dosis administrada, frecuencia y vía de administración	1,00 - 6,50 µg/L
G14093 **BIRT-HOGG-DUBE, SÍNDROME DE · FLCN · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FLCN *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G4145 **BIRT-HOGG-DUBÉ, SÍNDROME DE · FLCN · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FLCN *1*
BISFO **BISFENOL A, ORINA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	14	Rec. 5 mL Orina (primera micción) [Refr.]	Valores orientativos basados en Cha BS, Koh SB, Park JH, Eom A, Lee KM, Choi HS (2008). Influence of occupational exposure to bisphenol A on the sex hormones of male epoxy resin painters. Mol Cell Toxicol 4(3):230-234. No están descritos valores límites biológicos de exposición profesional (VLB) INSST 2023. Bisfenol A en orina: Inf 2,00 ug/g creat
BI/O **BISMUTO, ORINA**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	10	Rec. 1 mL Orina [Refr.]	Inf 5,00 µg/L Toxicidad: Sup 50,00 µg/L
BISS **BISMUTO, SANGRE TOTAL**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	7	Rec. 1 mL Sangre total EDTA Dipotásico (libre trazas metales) (1 x Tubo Sangre EDTA metales traza) [Refr.] Se puede hacer con muestra en tubo libre de metales y anticoagulante Heparina Sódica.	Inf 10,00 µg/L
DNBHO **BLASTOCYSTIS HOMINIS DNA, HECES**	PCR-Real Time.	4	Rec. 3 g Heces (1 x Recipiente estéril) [Cong.] Congelar inmediatamente.	DNA Blastocystis hominis: No se detecta
G14121 **BLASTOMA PLEUROPULMONAR · DICER1 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	DICER1 *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G17023 **BLAU, SÍNDROME DE · NOD2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	NOD2 *1*
G9701 **BLEFAROFIMOSIS, EPICANTO INVERSO Y PTOSIS · FOXL2 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FOXL2 *1*
G02040 **BLOOM, SÍNDROME DE · BLM · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BLM *1*
BORPG **BORDETELLA PARAPERTUSSIS ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/100 Interpretación: Positivo: Sup= 1/100
BOM **BORDETELLA PARAPERTUSSIS ANTICUERPOS IgM, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/100 Interpretación: Positivo: Sup= 1/100
BOPEA **BORDETELLA PERTUSSIS (TOSFERINA) ANTICUERPOS IgA, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 1,00 Indice Positivo: Sup= 1,00 Indice
BOPEG **BORDETELLA PERTUSSIS (TOSFERINA) ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 40,00 UI/mL Indeterminado: 40,00 - 99,99 UI/mL Positivo: Sup= 100,00 UI/mL
BOPEM **BORDETELLA PERTUSSIS (TOSFERINA) ANTICUERPOS IgM, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 0,80 Ratio Indeterminado: 0,80 - 1,09 Ratio Positivo: Sup= 1,10 Ratio

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
DNABPP **BORDETELLA PARAPERTUSSIS DNA, EXUDADO**	Nested-PCR.	5	Rec. 1 Muestra/s Exudado [Refr.] Alternativa: Exudado nasofaríngeo u orofaríngeo recogido con un hisopo seco.	DNA Bordetella parapertussis (resultado): No se detecta
DNABP **BORDETELLA PERTUSSIS DNA, EXUDADO**	PCR-Real Time.	5	Rec. 1 Muestra/s Exudado (1 x Escobillón seco.) [Refr.] Alt. 1 Muestra/s Frotis nasofaringeo [Refr.] Alt. 1 Muestra/s Aspirado nasofaringeo [Refr.] Alternativa: Exudado nasofaríngeo u orofaríngeo recogido con un hisopo seco.	No se detecta
AGBO **BORO, AGUA**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	22	Rec. 100 mL Agua (1 x Envase aséptico) [Refr.]	Límite agua potable Inf 1.00 mg/L
BOS **BORO, SUERO**	Plasma acoplado inductivamente / Espectroscopia de Emisión Óptica	10	Rec. 1 mL Suero (libre trazas metales) (1 x Tubo Suero metales traza) [Refr.]	10,00 - 100,00 µg/L
BBG **BORRELIA BURGDORFERI (ENFERMEDAD DE LYME) ANTICUERPOS IGG (IFI), SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/100 Interpretación: Positivo: Sup= 1/100
BORCR **BORRELIA BURGDORFERI (ENFERMEDAD DE LYME) ANTICUERPOS IgG, LCR**	Quimioluminiscencia.	6	Rec. 1 mL LCR [Refr.]	Negativo: Inf 4,50 UA/mL Indeterminado: 4,50 - 5,50 UA/mL Positivo: Sup 5,50 UA/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
BBGE **BORRELIA BURGDORFERI (ENFERMEDAD DE LYME) ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Quimioluminiscencia.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 10,00 UA/mL Indeterminado: 10,00 - 14,00 UA/mL Positivo: Sup= 15,00 UA/mL
LYME **BORRELIA BURGDORFERI (ENFERMEDAD DE LYME) ANTICUERPOS IGM (IFI), SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/10 Interpretación: Positivo: Sup= 1/10
BOMCR **BORRELIA BURGDORFERI (ENFERMEDAD DE LYME) ANTICUERPOS IGM, LCR**	Inmunofluorescencia Indirecta.	6	Rec. 1 mL LCR [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/2 Interpretación: Positivo: Sup= 1/2
BBM **BORRELIA BURGDORFERI (ENFERMEDAD DE LYME) ANTICUERPOS IgM, SUERO**	Quimioluminiscencia.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 0,90 Índice Indeterminado: 0,90 - 1,0 Índice Positivo: Sup= 1,10 Índice
ABLW **BORRELIA BURGDORFERI (ENFERMEDAD DE LYME) CONFIRMATORIO WESTERNBLOT ANTICUERPOS IgG, LCR**	Western-Blot.	6	Rec. 1 mL LCR (1 x Tubo estéril) [Refr.]	En este confirmatorio se identifican anticuerpos frente a las proteínas correspondientes a las especies de Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii, Borrelia afzelii y Borrelia spielmanii. Proteína P17: No se detecta Proteína P19: No se detecta Proteína P21: No se detecta Proteína P25 (OspC): No se detecta Proteína P30: No se detecta Proteína P83: No se detecta Proteína VIse: No se detecta

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
WEBG **BORRELIA BURGDORFERI (ENFERMEDAD DE LYME) CONFIRMATORIO WESTERNBLOT ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Western-Blot.	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	No se detecta No se detecta No se detecta No se detecta No se detecta No se detecta No se detecta No se detecta No se detecta No se detecta La detección de banda de antígeno VIsE puede interpretarse como resultado de anticuerpos IgG positivo. La detección de una banda débil de antígeno VIsE se puede considerar resultado positivo para IgG siempre y cuando se detecte al menos una banda de antígeno específica para p83, p39, p31, p30, p25, p21, p19 ó p17 La detección de una banda débil (positivo débil) se interpreta siempre como resultados indeterminado. La detección de 2 o más bandas de antígeno distintas de VIsE puede interpretarse también como resultado de anticuerpos IgG positivo.
ABLM **BORRELIA BURGDORFERI (ENFERMEDAD DE LYME) CONFIRMATORIO WESTERNBLOT ANTICUERPOS IgM, LCR**	Western-Blot.	6	Rec. 1 mL LCR (1 x Tubo estéril) [Refr.]	Proteína P17: No se detecta Proteína P19: No se detecta Proteína P21: No se detecta Proteína P25 (OspC): No se detecta Proteína P30: No se detecta Proteína P31 (OspA): No se detecta Proteína P39 (BmpA): No se detecta Proteína P83: No se detecta Proteína Vise: No se detecta

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
WEBM **BORRELIA BURGDORFERI (ENFERMEDAD DE LYME) CONFIRMATORIO WESTERNBLOT ANTICUERPOS IgM, SUERO**	Western-Blot.	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	No se detecta No se detecta No se detecta No se detecta No se detecta No se detecta No se detecta No se detecta No se detecta
DNBB **BORRELIA BURGDORFERI DNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	PCR-Real Time.	4	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 2 mL LCR (1 x Tubo estéril) [Cong.] Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío.	DNA Borrelia burdogferi en muestra biológica (resultado): No se detecta
G08008 **BRAQUIDACTILIA TIPO A1 · IHH · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	IHH *1*
G08009 **BRAQUIDACTILIA TIPO B1 · ROR2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ROR2 *1*
G08010 **BRAQUIDACTILIA-ARTROPATÍA DIGITAL FAMILIAR · TRPV4 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TRPV4 *1*
G08011 **BRAQUIOLMIA TIPO 3 · TRPV4 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TRPV4 *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G16001 **BRAQUIO-ÓTICO 1, SÍNDROME · EYA1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	EYA1 *1*
G16002 **BRAQUÍO-OTO-RENAL, SÍNDROME · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	EYA1, SALL1, SIX1, SIX5, TFAP2A *5*
G16003 **BRAQUIOOTORRENAL 1 CON/SIN CATARATA, SÍNDROME · EYA1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	EYA1 *1*
G19020 **BRECANRISK**	Hot Spot	28	Rec. 10 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Peticionario específico debidamente cumplimentado y firmado. Remitir informe clínico	
G19021 **BRECANRISK CHECK**	Pipeline bioinformático	15	Rec. 1 Muestra/s Densidad mamaria (1 x (Ninguno)) Remitir peticionario cumplimentado a fecha del nuevo análisis, con los nuevos datos fenotípicos y reproductivos (Densidad mamaria)	
BRIVA **BRIVARACETAM, SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 1 mL Suero [Cong.]	0,50 - 0,90 mg/L Toxicidad Sup 1,80 mg/L Límite de cuantificación: 0,08 mg/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
BRO **BROMAZEPAM, SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.] -Dosis administrada, frecuencia y vía de administración La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis. Rechazo: Muestra hemolizada, lipémica y/o ictérica	I.Terapéutico: 50,00 - 200,00 µg/L Toxicidad: 300,00 - 400,00 µg/L Conc.Letal: Sup 2000,00 µg/L Límite de cuantificación: 10,00 µg/L
BROM **BROMURO, SUERO**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Valor biológico orientativo (BLW, bromuro de metilo): Inf 12 mg/L I.Terapéutico: 75,00 - 100,00 mg/L Toxicidad: 500,00 - 1500,00 mg/L
BROR **BROMUROS, ORINA**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	5	Rec. 10 mL Orina [Refr.]	Inf 5,00 mg/L Toxicidad: Sup 1500,00 mg/L
G10001 **BRONQUIECTASIA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ARMC4, C21ORF59, CCDC39, CCDC40, CCDC65, CFTR, DNAAF1, DNAAF2, DNAH11, DNAH5, DNAI1, DNAI2, DNAL1, DRC1, DYX1C1, HYDIN, NME8, RSPH1, RSPH3, RSPH4A, RSPH9, SCNN1A, SCNN1B, SCNN1G, SPAG1, TIMP3, ZMYND10 27
BRAB **BRUCELLA ABORTUS ANTICUERPOS, SUERO**	Aglutinación	3	Rec. 2 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/80 Interpretación: Positivo: Sup= 1/80

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
BRUGLCR **BRUCELLA ANTICUERPOS IGG, LCR**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL LCR (1 x Tubo Polipropileno) [Refr.]	Negativo: Inf 1,00 Índice
BRUCG **BRUCELLA ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	4	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 0,80 Indice Indeterminado: 0,80 - 1,09 Indice Positivo: Sup= 1,10 Indice
BRUMLCR **BRUCELLA ANTICUERPOS IGM, LCR**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL LCR (1 x Tubo Polipropileno) [Refr.]	Negativo: Inf 1,00 Índice
BRUCM **BRUCELLA ANTICUERPOS IgM, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	4	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	La POSITIVIDAD en IgM puede ser compatible con INFECCION RECIENTE. Interpretación: Negativo: Inf 0,80 Indice Interpretación: Indeterminado: 0,80 - 1,09 Indice Interpretación: Positivo: Sup 1,10 Indice
BRME **BRUCELLA MELLITENSIS ANTICUERPOS, SUERO**	Aglutinación	3	Rec. 2 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/80 Interpretación: Positivo: Sup= 1/80
ACBRU **BRUCELLA SP. ANTICUERPOS- AGLUTINACION EN TUBO, SUERO**	Hemaglutinación.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/80 Interpretación: Positivo: Sup= 1/80

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
DNBR **BRUCELLA SPP DNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	Nested-PCR.	8	Rec. 2 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 2 mL Orina (1 x Contenedor estéril) [Refr.] Alt. 2 mL LCR (1 x Tubo estéril) [Cong.] Alt. 1 Pieza/s Tejido parafinado (1 x Bolsa transporte muestras Anatomía Patológica) Alt. 1 Pieza/s Tejido (1 x Contenedor con solución salina) (Suero fisiológico)[Cong.] Alt. 1 Muestra/s Heces (1 x Contenedor estéril) [Refr.]	No se detecta
G01008 **BRUGADA, SÍNDROME DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABCC9, CACNA1C, CACNA1D, CACNA2D1, CACNB2, GPD1L, HCN4, KCND2, KCND3, KCNE3, KCNH2, KCNJ8, PKP2, RANGRF, SCN10A, SCN1B, SCN2B, SCN3B, SCN5A, SEMA3A, TRPM4 *21*
G01161 **BRUGADA, SÍNDROME DE · SCN5A · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SCN5A *1*
G3020 **BRUTON (AGAMMAGLOBULINEMIA), ENFERMEDAD DE · BTK · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BTK *1*
BUNU **BUN (NITRÓGENO UREICO), SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	BUN (nitrógeno uréico): 8,00 - 24,00 mg/dL Urea: 17,00 - 49,00 mg/dL
COBUPPE **BUPRENORFINA CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), CABELLO**	Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectrometría de masas.	10	Rec. 200 mg Cabello (1 x Kit específico)	Valor de corte recomendado: 102,00 pg/mg

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
COBUPSA **BUPRENORFINA CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SALIVA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 1 mL Saliva [Refr.]	Incertidumbre de medida 0,7 ng/mL Límite de cuantificación 2 ng/mL
COBUPST **BUPRENORFINA CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SANGRE**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 10 mL Sangre total Oxalato/Fluoruro (1 x Tubo Sangre Total-Oxalato/Fluoruro) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total Heparina litio [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total EDTA [Refr.] Tubo oxalato potásico/Fluoruro sódico Ref. SAP 600088318	Incertidumbre de medida 0,7 ng/mL Límite de cuantificación 2 ng/mL
COBUPOR **BUPRENORFINA CONFIRMACIÓN, ORINA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 1 mL Orina [Refr.] Cadena de custodia	Incertidumbre de medida: 0,50 ng/mL Límite de cuantificación: 2,00 ng/mL
DNBPMB **BURKHOLDERIA PSEUDOMALLEI DNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	PCR-Real Time.	6	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Exudado de herida (1 x Escobillón seco.) [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Biopsia (1 x Contenedor con solución salina) [Refr.]	No se detecta
G7428 **BUSCHKE-OLLENDORFF, SÍNDROME DE · LEMD3 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	LEMD3 *1*
COBTBSAI **BUTABARBITAL CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SALIVA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	3	Rec. 1 mL Saliva [Refr.]	Incertidumbre de medida 3 ng/mL Límite de cuantificación 25 ng/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
COBTBSTI **BUTABARBITAL CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SANGRE**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	3	Rec. 10 mL Sangre total Oxalato/Fluoruro (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total Heparina litio (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Tubo oxalato potásico/Fluoruro sódico Ref. SAP 600088318	Incertidumbre de medida 3 ng/mL Límite de cuantificación 25 ng/mL
COBTLSAI **BUTALBITAL CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SALIVA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	3	Rec. 1 mL Saliva [Refr.]	Incertidumbre de medida 2 ng/mL Límite de cuantificación 25 ng/mL
COBTLSTI **BUTALBITAL CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SANGRE**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	3	Rec. 10 mL Sangre total Oxalato/Fluoruro (1 x Tubo Sangre Total-Oxalato/Fluoruro) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total Heparina litio (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Tubo oxalato potásico/Fluoruro sódico Ref. SAP 600088318	Incertidumbre de medida 2 ng/mL Límite de cuantificación 25 ng/mL
ANBO **BUTANOL, ORINA**	Cromatografía de Gases / Ionización de Llama.	10	Rec. 3 mL Orina final jornada (1 x Tubo 10 mL.) [Refr.]	Excreción (creatinina): Índice Biológico de Exposición orientativo (BAT) según DFG : Inf 10,00 mg/g crea Creatinina en orina : mg/dL Interpretación según criterio clínico

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G03119 **BUTIRIL-COLINESTERASA, DEFICIENCIA DE · BCHE · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BCHE *1*
ACC1Q **C1Q ANTICUERPOS, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	12	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 10,00 U/mL Positivo: Sup= 10,00 U/mL
C125L **CA 125 ANTÍGENO (MARCADOR TUMORAL OVARIO), MUESTRA BIOLOLÓGICA**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Líquido biológico [Refr.] Alt. 1 mL LCR [Refr.]	UI/mL Interpretación según criterio clínico
C125 **CA 125 ANTÍGENO (MARCADOR TUMORAL OVARIO), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Inf 35,00 UI/mL
CA15 **CA 15.3 ANTÍGENO (MARCADOR TUMORAL DE MAMA), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Inf 32,40 U/mL
CA19L **CA 19.9 ANTIGENO (MARCADOR TUMORAL), MUESTRA BIOLÓGICA**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Líquido biológico (1 x Tubo estéril) [Refr.]	U/mL Se informa para cada paciente
CA19 **CA 19.9 ANTÍGENO (MARCADOR TUMORAL), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Inf 37,00 U/mL
CA199LC **CA 19.9 ANTÍGENO (MARCADOR TUMORAL), LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 0.5 mL LCR [Refr.]	Inf 2,06 U/mL
CA242 **CA 242 (MARCADOR TUMORAL), SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	10	Rec. 1.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Inf 44,00 U/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
CA27 **CA 27.29 ANTÍGENO, SUERO**	Quimioluminiscencia.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Inf 38,60 U/mL
CA50 **CA 50 ANTÍGENO (MARCADOR TUMORAL), SUERO**	Radioinmunoanálisis.	4	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Inf= 23,50 U/mL
CA72 **CA 72.4 (MARCADOR TUMORAL GASTROINTESTINAL), SUERO**	Electroquimioluminiscencia.	4	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Valores séricos aumentados de CA 72-4 pueden aparecer en pacientes que padecen alguna enfermedad benigna como pancreatitis, cirrosis hepática, neumopatía, enfermedades ováricas benignas, quistes ováricos, afecciones mamarias y enfermedades gastrointestinales benignas Inf 6,90 U/mL
G01158 **CADASIL · NOTCH3 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	NOTCH3 *1*
G01104 **CADASIL 1 (ARTERIOPATÍA CEREBRAL AD CON INFARTO SUBCORTICAL Y LEUCOENCEFALOPATÍA 1) · NOTCH3 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	NOTCH3 *1*
NFLLC **CADENA LIGERA DE NEUROFILAMENTOS (NFL), LCR**	Quimioluminiscencia.	12	Rec. 0.5 mL LCR (1 x Tubo Polipropileno) [Cong.]	Ambos 0 - 29 Años Inf 380,00 pg/mL Ambos 30 - 39 Años Inf 560,00 pg/mL Ambos 40 - 59 Años Inf 890,00 pg/mL Ambos Sup - 59 Años Inf 1850,00 pg/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
NFLSU **CADENA LIGERA DE NEUROFILAMENTOS (NFL), PLASMA**	Quimioluminiscencia.	12	Rec. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo Polipropileno) [Cong.] Alt. 1 mL Suero (1 x Tubo Polipropileno) [Cong.]	Ambos 18 - 29 Años Inf 9,40 pg/mL Ambos 30 - 39 Años Inf 9,60 pg/mL Ambos 40 - 49 Años Inf 13,30 pg/mL Ambos 50 - 59 Años Inf 21,20 pg/mL Ambos 60 - 69 Años Inf 28,10 pg/mL Ambos 70 - 90 Años Inf 46,80 pg/mL
CLKLLB **CADENAS LIGERAS KAPPA LIBRE (FREELITE), LCR**	Turbidimetría.	3	Rec. 1 mL LCR [Refr.]	Inf 1,96 mg/L
QCLO **CADENAS LIGERAS KAPPA/LAMBDA, ORINA**	Nefelometría.	1	Rec. 2 mL Orina 24h. (alícuota) [Refr.]	Cadenas ligeras kappa: Inf 7,00 mg/L Cadenas ligeras lambda: Inf 5,00 mg/L
QCLS **CADENAS LIGERAS KAPPA/LAMBDA, SUERO**	Turbidimetría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Cociente kappa/lambda: 1,35 - 2,65 Cadenas ligeras kappa: 170,00 - 370,00 mg/dL Cadenas ligeras lambda: 90,00 - 210,00 mg/dL
CCLO **CADENAS LIGERAS LIBRES KAPPA/LAMBDA (FREELITE), ORINA**	Turbidimetría.	2	Rec. 3 mL Orina 24h. (alícuota) [Refr.]	Cadenas ligeras kappa libre (Freelite) en orina (BARCELONA): Inf 32,90 mg/L Cadenas ligeras lambda libre (Freelite) en orina (BARCELONA): Inf 3,79 mg/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
CLLB **CADENAS LIGERAS LIBRES KAPPA/LAMBDA (FREELITE), SUERO**	Turbidimetría.	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Cociente kappa/lambda libre: Pacientes con función renal conservada: 0,26 - 1,65 Cociente kappa/lambda libre: Pacientes con insuficiencia renal: FG: Inf30 mL/min/1,73m2 0,54 - 3,30 Cociente kappa/lambda libre: Pacientes con insuficiencia renal: FG: 30 - 44 mL/min/1,73m2 0,48 - 3,38 Cociente kappa/lambda libre: Pacientes con insuficiencia renal: FG: 45 - 49 mL/min/1,73m2 0,46 - 2,62 Cadenas ligeras kappa libre: Pacientes con función renal conservada: 3,30 - 19,40 mg/L Cadenas ligeras kappa libre: Pacientes con insuficiencia renal: FG: Inf30 mL/min/1,73m2 11,70 - 265,10 mg/L Cadenas ligeras kappa libre: Pacientes con insuficiencia renal: FG: 30 - 44 mL/min/1,73m2 8,80 - 103,30 mg/L Cadenas ligeras kappa libre: Pacientes con insuficiencia renal: FG: 45 - 49 mL/min/1,73m2 7,80 - 83,60 mg/L Cadenas ligeras lambda libre: Pacientes con función renal conservada: 5,71 - 26,30 mg/L Cadenas ligeras lambda libre: Pacientes con insuficiencia renal: FG: Inf30 mL/min/1,73m2 12,60 - 150,90 mg/L Cadenas ligeras lambda libre: Pacientes con insuficiencia renal: FG: 30 - 44 mL/min/1,73m2 8,20 - 73,2 mg/L Cadenas ligeras lambda libre: Pacientes con insuficiencia renal: FG: 45 - 49 mL/min/1,73m2 7,30 - 65,10 mg/L
CKLO **CADENAS LIGERAS LIBRES KAPPA/LAMBDA, ORINA**	Nefelometría.	3	Rec. 1 mL Orina 24h. (alícuota) [Refr.] Volumen indispensable.	Cadenas ligeras Kappa Libres: Inf 10,00 mg/L Cadenas ligeras Lambda Libres: Inf 10,00 mg/L
CALI **CADENAS LIGERAS LIBRES KAPPA/LAMBDA, SUERO**	Nefelometría - Turbidimetría.	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Cadenas Ligeras Kappa libres : 6,70 - 22,40 mg/L Cadenas Ligeras Lambda libres: 8,30 - 27,00 mg/L Cociente Kappa/Lambda libres: 0,31 - 1,56
IGAP **CADENAS PESADAS IGA KAPPA/LAMBDA, SUERO**	Turbidimetría.	2	Rec. 5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Cociente IgA-K / IgA-L:: 0,91 - 2,42 IgA-Kappa:: 0,59 - 2,98 g/L IgA-Lambda:: 0,43 - 2,04 g/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
IGGH **CADENAS PESADAS IGG KAPPA/LAMBDA, SUERO**	Turbidimetría.	2	Rec. 5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	
AGCD **CADMIO, AGUA**	Absorción atómica.	15	Rec. 100 mL Agua (1 x Envase aséptico) [Refr.] Alt. 100 mL Agua (1 x Envase aséptico) (<2 Ác.nítrico)	Agua de diálisis Inf 0,01 mg/L Agua de red Inf 0,05 mg/L
CDOR **CADMIO, ORINA**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	5	Rec. 1 mL Orina [Refr.]	Excreción (creatinina): Población no expuesta Inf 1,00 µg/g crea Excreción (creatinina): VLB®-INSST: (Cadmio y compuestos inorgánicos) Inf 2,00 µg/g crea Los valores son más elevados en fumadores y ex fumadores Creatinina en orina : mg/dL Interpretación según criterio clínico
CDFJ **CADMIO, ORINA FINAL DE JORNADA**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	5	Rec. 10 mL Orina final jornada [Refr.] El momento del muestreo no es un factor crítico.	Cadmio en orina de final de jornada: VLB®-INSST: (Cadmio y compuestos inorgánicos) Inf 2,00 µg/g creat : Límite de cuantificación: 1,00 µg/L
CD/E **CADMIO, SANGRE TOTAL**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	3	Rec. 1 mL Sangre total EDTA Dipotásico (libre trazas metales) (1 x Tubo Sangre EDTA metales traza) [Refr.] Se puede hacer con muestra en tubo libre de metales y anticoagulante Heparina Sódica.	Población no expuesta Inf 1,00 µg/L VLB®-INSST: (Cadmio y compuestos inorgánicos) Inf 5,00 µg/L Límite de cuantificación: Inf 0,60 µg/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
CAFE **CAFEINA, SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] - Fecha de inicio de tratamiento y / o la fecha de cualquier cambio de dosis - La hoja de seguimiento médico - Los datos de dosis (cantidad administrada, frecuencia, vía de administración) - Los motivos de la prescripción (eficacia y / o una prueba de toxicidad) -Edad, peso y altura (si es posible) Indicar la fecha y hora de toma de muestras y la fecha y hora de la última dosis No utilizar tubos con gel separador.	2,00 - 10,00 mg/L
G08093 **CAFFEY, ENFERMEDAD DE · COL1A1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	COL1A1 *1*
CACO **CALCIO CORREGIDO POR ALBÚMINA, SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Calcio total corregido por albúmina: Ambos 0 - 10 Días 7,60 - 10,40 mg/dl Calcio total corregido por albúmina: Ambos 10 - 365 Días 9,00 - 11,00 mg/dl Calcio total corregido por albúmina: Ambos 1 - 2 Años 9,00 - 11,00 mg/dl Calcio total corregido por albúmina: Ambos 2 - 12 Años 8,80 - 10,80 mg/dl Calcio total corregido por albúmina: Ambos Sup - 12 Años 8,80 - 10,60 mg/dl

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
CACP **CALCIO CORREGIDO POR PROTEÍNAS, SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Calcio total corregido por proteínas: Ambos 0 - 10 Días 7,60 - 10,40 mg/dL Calcio total corregido por proteínas: Ambos 10 - 365 Días 9,00 - 11,00 mg/dL Calcio total corregido por proteínas: Ambos 1 - 2 Años 9,00 - 11,00 mg/dL Calcio total corregido por proteínas: Ambos 2 - 12 Años 8,80 - 10,80 mg/dL Calcio total corregido por proteínas: Ambos Sup - 12 Años 8,80 - 10,60 mg/dL
CAO **CALCIO EN ORINA DE MICCIÓN (CONCENTRACIÓN)**	Espectrometría.	1	Rec. 5 mL Orina (1 x Contenedor 25 mL.) [Refr.]	mg/dL Interpretación según criterio clínico
CAERI **CALCIO ERITROCITARIO, SANGRE**	Absorción atómica.	5	Rec. 400 uL Sangre total Heparina litio [Refr.]	1,12 - 1,58 mmol/L
CAI **CALCIO IONICO, SUERO**	Electrodo Selectivo de Iones.	2	Rec. 1 mL Suero tubo tapado (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] La ingestión excesiva de leche y derivados puede incrementar los niveles. Enviar tubo tapado en bolsa naranja. Dejar nota indicando la prueba en la bolsa. Una vez centrifugadas sin destapar, las muestras son estables 70 h a 4ºC.	1,05 - 1,30 mmol/L
AGCA **CALCIO, AGUA**	Absorción atómica.	15	Rec. 100 mL Agua (1 x Envase aséptico) [Refr.] Alt. 100 mL Agua (1 x Envase aséptico) (<2 Ác.nítrico)	Agua de diálisis Inf 2,00 mg/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
CO **CALCIO, ORINA 24H**	Espectrometría.	1	Rec. 5 mL Orina 24h. (alícuota) (1 x Contenedor 2500 mL.) [Refr.] Emplear la dieta especifica recomendada por el laboratorio. Remitir el espécimen al laboratorio tan pronto como se haya completado la recogida. Se recomienda orina de 24 horas	Concentración: mg/dL Excreción (24h): 100,00 - 240,00 mg/24h Volumen de orina remitido (diuresis): 600,00 - 1600,00 mL
CAT **CALCIO, SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] La ingestión excesiva de leche y derivados puede incrementar los niveles.	Ambos 0 - 10 Días 7,60 - 10,40 mg/dL Ambos 10 - 365 Días 9,00 - 11,00 mg/dL Ambos 1 - 2 Años 9,00 - 11,00 mg/dL Ambos 2 - 12 Años 8,80 - 10,80 mg/dL Ambos Sup - 12 Años 8,80 - 10,60 mg/dL
CCCM **CALCIO/CREATININA COCIENTE, ORINA**	Espectrometría.	3	Rec. 1 mL Orina (1 x Contenedor 2500 mL.) [Refr.]	Excreción (creatinina): Inf 0,20 mg/mg mg/dL Interpretación según criterio clínico Creatinina en orina : mg/dL Interpretación según criterio clínico
CACR **CALCIO/CREATININA COCIENTE, ORINA 24H**	Espectrometría.	1	Rec. 5 mL Orina 24h. (alícuota) (1 x Contenedor 2500 mL.) [Refr.]	Cociente calcio / creatinina en orina de 24 horas: Inf 0,20 mg/mg Concentración: mg/dL
CALCI5 **CALCITONINA (5'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	4	Rec. 1 mL Suero 5 m (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	pg/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
CALCI1 **CALCITONINA (1'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	4	Rec. 1 mL Suero 1 m (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	pg/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
CALCI10 **CALCITONINA (10'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	4	Rec. 1 mL Suero 10 m (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	pg/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
CALCI2 **CALCITONINA (2'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	4	Rec. 1 mL Suero 2 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	pg/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
CALCI20 **CALCITONINA (20'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	4	Rec. 1 mL Suero 20 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	pg/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
CALCI3 **CALCITONINA (3'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	4	Rec. 1 mL Suero 3 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	pg/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
CALCI **CALCITONINA, SUERO**	Quimioluminiscencia.	4	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Separar y congelar inmediatamente.	Hombres Inf 8,40 pg/mL Mujeres Inf 5,00 pg/mL
CALB **CALCULO BILIAR ESTUDIO INFRARROJOS**	Espectrometría de infrarrojos.	12	Rec. 1 Muestra/s Cálculo biliar Remitir en seco.	Se informa para cada paciente
CALC **CALCULO RENAL ESTUDIO INFRARROJOS**	Espectrometría de infrarrojos.	12	Rec. 1 Muestra/s Cálculo renal Remitir en seco.	Se informa para cada paciente

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
CALSAL **CALCULO SALIVAR, ESTUDIO INFRARROJOS**	Espectrometría de infrarrojos.	5	Rec. 1 Muestra/s Cálculo salival Remitir en seco.	Se informa para cada paciente
CALP **CALPROTECTINA, HECES**	Quimioluminiscencia.	3	Rec. 5 g Heces [Refr.] Rechazo: Muestra hemorrágica	No son indicativos de inflamación del tracto intestinal.: Inf 50,00 µg/g heces Trastorno intestinal leve y/o excluir otras patologías (Inflamación por AINE, diverticulitis, etc.): 50,00 - 120,00 µg/g heces Resultado positivo de inflamación intestinal con indicación de completar estudio diagnóstico / revisión terapia.: Sup 120,00 µg/g heces
CALPPL **CALPROTECTINA, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	Inf 3000,00 ng/mL
CAJEA **CAMPYLOBACTER JEJUNI ANTICUERPOS IgA, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	8	Rec. 2 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 0,80 Índice Indeterminado: 0,80 - 1,09 Índice Positivo: Sup= 1,10 Índice
CAJEG **CAMPYLOBACTER JEJUNI ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	8	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 0,80 Índice Indeterminado: 0,80 - 1,09 Índice Positivo: Sup= 1,10 Índice
DNCJMB **CAMPYLOBACTER JEJUNI DNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	Nested-PCR.	5	Rec. 5 mL Sangre total EDTA [Refr.] Rec. 1 g Heces (1 x Contenedor estéril) [Refr.] Biopsia fresca en suero fisiológico, refrigerada Muestras alternativas:	No se detecta

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
CANCA **CANALES DE CALCIO (TIPO P) ANTICUERPOS, SUERO**	Radioinmunoanálisis.	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Los anticuerpos contra los canales de calcio (VGCC) pueden clasificarse por sus características electrofisiológicas en al menos 4 subtipos (L, N, P y T). La detección de anticuerpos contra los canales de calcio tipo P es fundamental para el diagnóstico del Síndrome de Lambert Eaton, estando presentes en aproximadamente el 85-90% de los pacientes. V.Discriminante: Negativo: Inf 30,00 pmol/L V.Discriminante: Positivo: Sup= 30,00 pmol/L
CANCAL **CANALES DE CALCIO ANTICUERPOS, LCR**	Radioinmunoprecipitación.	6	Rec. 1 mL LCR (1 x Tubo estéril) [Cong.]	Inf 40,00 pmol/L
ACKC **CANALES DE POTASIO ANTICUERPOS (IFI), LCR**	Inmunofluorescencia Indirecta en células transfectadas	6	Rec. 1 mL LCR [Refr.]	CASPR2: Negativo LGI1: Negativo
ACKS **CANALES DE POTASIO ANTICUERPOS (IFI), SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta en células transfectadas	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	CASPR2: Negativo LGI1: Negativo
ACKL **CANALES DE POTASIO ANTICUERPOS, LCR**	Ensayo celular + Inmunohistoquímica	16	Rec. 1 mL LCR [Refr.]	CASPR2: Negativo LGI1: Negativo
G01172 **CANALOPATÍAS CARDIACAS · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AIP, AK1, CASQ2, CCDC141, CDAN1, DNAJC21, FOXO1A, GCLC, GHSR, GPI, IGFALS, KCNJ2, KCNJ5, KCNJ8, KCNQ1, KCNQ2, KIF23, KLB, KLF1, MAPKAPK3, NOS1AP, NT5C3A, PIEZO1, PKLR, PKP2, PTRF, RAD54L, RANGRF, RPL27, RPS28, RPS29, RYR2, SCN10A, SCN1B, SCN2B, SCN3B, SCN4B, SCN5A, SEMA3A, SEMA7A, SLMAP, SNTA1, TPI1, TRDN, TRPM4 *45*
G03110 **CANAVAN, ENFERMEDAD DE · ASPA · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ASPA *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G03111 **CANAVAN, ENFERMEDAD DE · ASPA · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ASPA *1*
G14132 **CÁNCER DE MAMA · BARD1 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BARD1 *1*
CANDG **CANDIDA ALBICANS ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/160
CANDM **CANDIDA ALBICANS ANTICUERPOS IgM, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/20 Interpretación: Positivo: Sup= 1/20
CANDA **CANDIDA ALBICANS ANTICUERPOS IgA, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/160 Interpretación: Positivo: Sup= 1/160

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
DCAM **CANDIDA ALBICANS DNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	PCR-Real Time.	5	Rec. 2 mL Orina [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Secreción vaginal [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Citología líquida [Refr.] Alt. 3 mL Médula ósea (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 1 Muestra/s Saliva [Refr.] Alt. 1 Muestra/s Líquido biológico (1 x Recipiente estéril) [Refr.] Alt. 1 Muestra/s Exudado de herida [Refr.] Alt. 1 Muestra/s BAS [Refr.] Alt. 1 Muestra/s BAL [Refr.] Enviar los escobillones secos, sin medio. Estabilidad de la muestra: Refrigerada: 7 días. Congelada: 1 mes. Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío.	DNA Candida albicans: No se detecta

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
DCSM **CANDIDA SPP DNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	PCR-Real Time.	6	Rec. 2 mL Orina (primera micción) [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Exudado vaginal [Refr.] Rec. 1 mL LCR [Refr.] Secreción vaginal en torunda de dacrón con vástago de plástico. Se acepta torunda en medio de transporte (Stuart o Amies refrigerado) y frasco SurePath. Rechazo: Torunda de algodón y/o vástago de madera.	DNA Candida spp (resultado): No se detecta
HONH **CANDIDA, HECES**	Cultivo en medios generales, de enriquecimiento y/o específicos	7	Rec. 5 g Heces (1 x Contenedor estéril) [Refr.]	Las especies de Candida forman parte de la microbiota normal del tracto gastrointestinal. El aislamiento de Candida sp. en cultivo de heces, sin otros signos o síntomas clínicos, generalmente representa colonización, no infección, y por tanto no se recomienta tratamiento
G02051 **CANDLE (DERMATOSIS NEUTROFÍLICA ATÍPICA LIPODISTROFIA TEMPERATURA ELEVADA), SÍNDROME DE · PSMB8 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PSMB8 *1*
COCBDSAI **CANNABIDIOL CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SALIVA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 1 mL Saliva [Refr.]	Incertidumbre de medida 0,7 ng/mL Límite de cuantificación 2 ng/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
COCBDSTI **CANNABIDIOL CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SANGRE**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 10 mL Sangre total Oxalato/Fluoruro (1 x Tubo Sangre Total-Oxalato/Fluoruro) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total Heparina litio (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Tubo oxalato potásico/Fluoruro sódico Ref. SAP 600088318	Incertidumbre de medida 0,7 ng/mL Límite de cuantificación 2 ng/mL
COCBSAI **CANNABINOL CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SALIVA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 1 Muestra/s Saliva (1 x Kit específico) [Refr.]	Incertidumbre de medida 0,7 ng/mL Límite de cuantificación 2 ng/mL
COCBSTI **CANNABINOL CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SANGRE**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 10 mL Sangre total Oxalato/Fluoruro (1 x Tubo Sangre Total-Oxalato/Fluoruro) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total Heparina litio (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Tubo oxalato potásico/Fluoruro sódico Ref. SAP 600088318	Incertidumbre de medida 0,7 ng/mL Límite de cuantificación 2 ng/mL
CANNP **CANNABIS CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), CABELLO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	20	Rec. 1 g Cabello Recoger cabello de la zona entre la nuca y la coronilla, lo más próximo a la raiz.	: Valor de corte recomendado: 60,00 pg/mg

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
COD9OR **CANNABIS CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), ORINA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 10 mL Orina [Refr.] Cadena de custodia	Incertidumbre de medida 2 ng/mL Límite de cuantificación 10 ng/mL Se utiliza como criterio de Positividad que la concentración sea superior o igual al valor del límite de cuantificación más el valor de incertidumbre del ensayo. En caso contrario, el resultado es Negativo.
COCANSA **CANNABIS CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SALIVA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 1 mL Saliva [Refr.]	Incertidumbre de medida 0,5 ng/mL Límite de cuantificación 2 ng/mL
COCANST **CANNABIS CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SANGRE**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 10 mL Sangre total Oxalato/Fluoruro (1 x Tubo Sangre Total-Oxalato/Fluoruro) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total Heparina litio (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Tubo oxalato potásico/Fluoruro sódico Ref. SAP 600088318	Incertidumbre de medida 0,6 ng/mL Límite de cuantificación 2 ng/mL
UIBC **CAPACIDAD LATENTE DE FIJACION DE HIERRO, SUERO**	No se aplica.	2	Rec. 2 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	: 110,00 - 330,00 µg/dL
CAFH **CAPACIDAD TOTAL DE FIJACION DE HIERRO (TIBC), SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Capacidad total de fijación del hierro: 235,00 - 450,00 ug/dL Transferrina: 200,00 - 360,00 mg/dL
G3219 **CARASIL, SÍNDROME DE · HTRA1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	HTRA1 *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
CAEP **CARBAMACEPINA EPÓXIDO, SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 3 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Carbamacepina (para epóxido): 4,00 - 12,00 mg/L Carbamazepina 10:11 epóxido : 0,50 - 3,00 mg/L Ratio carbamacepina epoxido/carbamacepina : 0,07 - 0,25 mg/L
CARBL **CARBAMAZEPINA LIBRE, SUERO**	Quimioluminiscencia.	12	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.] Extracción antes de la toma de la mañana.	1,00 - 3,00 mg/L
CARB **CARBAMAZEPINA, SUERO**	Inmunoanálisis enzimático	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	4,00 - 10,00 µg/mL
CARBO **CARBOXIHEMOGLOBINA, SANGRE TOTAL**	Espectrometría de absorción molecular	2	Rec. 2 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Utilizar tubo con vacio (tipo Vacutainer). Final de la jornada laboral. En muestras de entorno clínico (no laboral), la estabilidad es de 2 horas refrigerada.	Fumadores Inf 8.00 % No Fumadores Inf 1,00 % Toxicidad Sup 17,00 % VLB®-INSST: Final de la jornada laboral (Monóxido de carbono) Inf 3,50 % Límite de cuantificación: Inf 0,10 %
COHB **CARBOXIHEMOGLOBINA, SANGRE TOTAL (JERINGA)**	Espectrometría.	2	Rec. 1 mL Sangre total (1 x Jeringa) [Refr.]	Inf 3,50 %
CEAL **CARCINOEMBRIONARIO ANTÍGENO (CEA), MUESTRA BIOLOLÓGICA**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Líquido biológico [Refr.]	ng/mL Interpretación según criterio clínico

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
CEA **CARCINOEMBRIONARIO ANTÍGENO (CEA), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] No es necesario estar en ayunas.	Inf 5,00 ng/mL
G14002 **CARCINOMA DE CÉLULAS RENALES · HNF1A · SANGER**	Secuenciación Sanger	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	HNF1A *1*
G2009 **CARCINOMA MEDULAR DE TIROIDES · RET (exones 5, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16) · HOT SPOT**	Hot Spot	15	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	RET [exones 5, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16] *1*
G14003 **CARCINOMA MEDULAR DE TIROIDES · RET · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	15	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	RET *1*
G7425 **CARCINOMA PAPILAR RENAL · MET · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	MET *1*
G7424 **CARCINOMA PAPILAR RENAL · MET · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	15	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	MET *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
CARDIO **CARDIO inCode Score, SANGRE TOTAL**	SNaPshot	30	Rec. 1 mL Sangre total EDTA [Refr.] Muestra alternativa: Saliva (kit Oragene-DNA) No es necesario estar en ayunas ni suspender medicación. Requisitos imprescindibles: consentimiento informado (código MPP20) y cuestionario clínico (código MPP19).	Se informa para cada paciente
G01105 **CARDIOFACIOCUTANEO 2, SÍNDROME · KRAS · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	KRAS *1*
G01106 **CARDIOFACIOCUTÁNEO, SÍNDROME · BRAF · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BRAF *1*
ACLA **CARDIOLIPINA ANTICUERPOS IgA, SUERO**	Inmunoanálisis con detección fluorescente	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 14,00 APL-U/mL Indeterminado: 14,00 - 20,00 APL-U/mL Positivo: Sup 20,00 APL-U/mL
ACLGMA **CARDIOLIPINA ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Inmunoanálisis con detección fluorescente	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Como prueba complementaria se recomienda solicitar Beta-2-Glicoproteina IgG . Negativo: Inf 10,00 GPL-U/mL Positivo Débil: 10,00 - 40,00 GPL-U/mL Positivo: Sup 40,00 GPL-U/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ACLMMA **CARDIOLIPINA ANTICUERPOS IgM, SUERO**	Inmunoanálisis con detección fluorescente	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Como prueba complementaria se recomienda solicitar Beta-2-Glicoproteina IgM . Negativo: Inf 10,00 MPL-U/mL Positivo Débil: 10,00 - 40,00 MPL-U/mL Positivo: Sup 40,00 MPL-U/mL
G1242 **CARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA · MYBPC3 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	MYBPC3 *1*
G01009 **CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ACTC1, ACVR1, ACVR2B, ALDH1A2, ANKRD1, CITED2, CRELD1, ELN, ETS1, FOXH1, GATA4, GATA6, GDF1, GJA1, HAND1, HAND2, IRX4, JAG1, LEFTY2, MED13L, MYH11, MYH6, MYH7, MYOCD, NKX2-5, NKX2-6, NODAL, NOTCH1, PDGFRA, SMAD6, TAB2, TBX1, TBX20, TBX5, TDGF1, TFAP2B, VEGFA, ZFPM2, ZIC3 *39*
CVHV6 **CARGA VIRAL HERPES VIRUS TIPO 6, PLASMA**	PCR-Real Time.	6	Rec. 2 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Alt. 2 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Cong.]	Intervalo de detección: 100 - 1.000.000 copias/mL
MEDU **CARIOTIPO HEMATOLÓGICO**	Cariotipo	10	Rec. 5 mL Sangre total Heparina sódica (1 x Tubo sangre heparina sódica) Rec. 5 mL Médula ósea Heparina sódica (1 x Tubo sangre heparina sódica)	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
CA02 **CARIOTIPO, LÍQUIDO AMNIÓTICO**	Cariotipo	20	Rec. 20 mL Líquido amniótico (2 x Tubo cónico 10 mL.) [Refr.] - Condiciones de la toma de muestra: Esterilidad máxima. En contenedor estéril (tubo estéril) con tapon de rosca. Se requiere consentimiento informado. - Semana 15 - 18 de embarazo (condiciones ideales)	El presente resultado no incluye los hallazgos interpretados como variantes de la normalidad (European Cytogeneticists Association (ECA)) y está sujeto a las limitaciones propias de este tipo de estudios como pueden ser, entre otras, la presencia de ciertas situaciones en mosaico, anomalías cromosómicas de pequeño tamaño, discrepancias entre tejidos y la contaminación con células maternas. Para la interpretación de este tipo de análisis, se recomienda adjuntar los datos clínicos relevantes de paciente y/o familiares relacionados. El presente informe debe ser interpretado dentro del contexto clínico del paciente y según criterios médicos.
CAFB **CARIOTIPO, PIEL (FIBROBLASTOS)**	Cultivo celular. Identificación por bandas G (ISCN 2016)	20	Rec. 1 Muestra/s Cultivo de Fibroblastos en piel [Refr.] Muestra en contenedor estéril y solución salina estéril (refrigerada)	El presente resultado no incluye los hallazgos interpretados como variantes de la normalidad (European Cytogeneticists Association (ECA)) y está sujeto a las limitaciones propias de este tipo de estudios como pueden ser, entre otras, la presencia de ciertas situaciones en mosaico, anomalías cromosómicas de pequeño tamaño, discrepancias entre tejidos y la contaminación con células maternas. Para la interpretación de este tipo de análisis, se recomienda adjuntar los datos clínicos relevantes de paciente y/o familiares relacionados. El presente informe debe ser interpretado dentro del contexto clínico del paciente y según criterios médicos.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
CARI **CARIOTIPO, SANGRE TOTAL**	Cariotipo	15	Rec. 6 mL Sangre total Heparina sódica (1 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 6 mL Sangre total Heparina litio (1 x Tubo sangre heparina litio) [Refr.] - Indicar edad, sexo y motivo de solicitud. Se requiere consentimiento informado.	Se informa para cada paciente
CACU **CARIOTIPO, SANGRE TOTAL CORDÓN UMBILICAL**	Cariotipo	11	Rec. 5 mL Sangre total fetal - cordón umbilical Heparina sódica [Refr.]	
CRA **CARIOTIPO, TEJIDO (RESTOS ABORTIVOS)**	Cariotipo	20	Rec. 1 Pieza/s Tejido fetal fresco - restos abortivos [Refr.] Muestra en contenedor estéril y solución salina estéril (refrigerada)	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
CAD2 **CARIOTIPO, VELLOSIDAD CORIAL (CULTIVO)**	Cariotipo	20	Rec. 1 Muestra/s Vellosidad corial (1 x Tubo genética vell.corial (cónico 30 mL).) Es necesario enviar muestra materna (Sangre total EDTA o torunda bucal) Se requiere consentimiento informado. - Condiciones de la toma de muestra: Esterilidad máxima. En contenedor estéril (tubo estéril) con tapon de rosca. - Cantidad mínima que se necesita: 30 mg - Criterios de rechazo: muestra contaminada o decidua materna. - Semana 9 - 13 semanas de embarazo (condiciones ideales)	El presente resultado no incluye los hallazgos interpretados como variantes de la normalidad (European Cytogeneticists Association (ECA)) y está sujeto a las limitaciones propias de este tipo de estudios como pueden ser, entre otras, la presencia de ciertas situaciones en mosaico, anomalías cromosómicas de pequeño tamaño, discrepancias entre tejidos y la contaminación con células maternas. Para la interpretación de este tipo de análisis, se recomienda adjuntar los datos clínicos relevantes de paciente y/o familiares relacionados. El presente informe debe ser interpretado dentro del contexto clínico del paciente y según criterios médicos.
CALO **CARNITINA LIBRE, ORINA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	9	Rec. 10 mL Orina 24h. (alícuota) [Cong.]	Carnitina libre en orina: Ambos 0 - 32 Días 0,30 - 1,10 mg/24h Carnitina libre en orina: Ambos 33 - 365 Días 0,10 - 6,5 mg/24h Carnitina libre en orina: Ambos 1 - 3 Años 3,00 - 11,0 mg/24h Carnitina libre en orina: Ambos 3 - 8 Años 3,00 - 16,0 mg/24h Carnitina libre en orina: Hombres Sup - 8 Años 15,20 - 41,20 mg/24h Carnitina libre en orina: Mujeres Sup - 8 Años 2,20 - 25,60 mg/24h

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
QCAR **CARNITINA TOTAL Y LIBRE, PLASMA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	11	Rec. 2 mL Plasma Heparina litio (1 x Tubo sangre heparina litio) [Cong.] Rec. 2 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.]	Carnitina libre: 10,00 - 74,00 µmol/L Carnitina total: 25,00 - 69,00 µmol/L
G03122 **CARNITINA, DEFICIENCIA DE · SLC22A5 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SLC22A5 *1*
CASP2IFL **CASPR2 NEURONALES ANTICUERPOS, LCR**	Inmunofluorescencia Indirecta en células transfectadas	6	Rec. 1 mL LCR [Refr.]	Negativo
CASP2IFS **CASPR2 NEURONALES ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta en células transfectadas	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo Tejido: Células Transfectadas
CATA **CATALASA ERITROCITARIA, SANGRE TOTAL**	Espectrometría.	30	Rec. 3 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] La estabilidad de la muestra es 24h refrigerada. La muestra debe enviarse directamente al Laboratorio Central de Barcelona, antes de las 15h. No realizar extracciones en viernes ni en vísperas de festivos. Es necesario enviar un tubo único para esta determinación. Bolsa transporte muestras Especiales.	23,00 - 47,00 U/gHb/seg-1

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G12011 **CATARATA 34 · FOXE3 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FOXE3 *1*
G12012 **CATARATA CON DISTROFIA CORNEAL TEMPRANA · PAX6 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PAX6 *1*
G12013 **CATARATA HEREDITARIA NO SINDRÓMICA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AGK, BFSP1, BFSP2, CHMP4B, CRYAA, CRYAB, CRYBA1, CRYBA4, CRYBB1, CRYBB2, CRYBB3, CRYGB, CRYGC, CRYGD, CRYGS, EPHA2, FOXE3, FYCO1, GCNT2, GJA3, GJA8, HSF4, LIM2, LSS, MAF, MIP, NHS, PITX3, TDRD7, VIM, WFS1 *31*
G12014 **CATARATA HEREDITARIA SINDRÓMICA + NO SINDRÓMICA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ADAMTSL4, AGK, BCOR, BEST1, BFSP1, BFSP2, CHMP4B, CRYAA, CRYAB, CRYBA1, CRYBA4, CRYBB1, CRYBB2, CRYBB3, CRYGB, CRYGC, CRYGD, CRYGS, CTDP1, EPHA2, EYA1, FOXE3, FTL, FYCO1, GALK1, GALT, GCNT2, GJA3, GJA8, HSF4, LIM2, LSS, MAF, MIP, MSMO1, NF2, NHS, PITX3, RAB3GAP1, RECQL4, SIL1, SLC33A1, TDRD7, VIM, VSX2, WFS1 *46*
G12015 **CATARATA HEREDITARIA SINDRÓMICA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ADAMTSL4, BCOR, BEST1, CTDP1, EYA1, FTL, GALK1, GALT, MSMO1, NF2, RAB3GAP1, RECQL4, SIL1, SLC33A1, VSX2 *15*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
CATO **CATECOLAMINAS FRACCIONADAS, ORINA**	Cromatografía Líquida Alta Resolución / Electroquímica.	6	Rec. 10 mL Orina 24h. (alícuota) (1 x Contenedor 2500 mL.) (Ác. clorhídrico 6N)[Refr.] No cumplimiento dieta No ingerir 5 días antes de la recolección de la orina; té, café, plátano, chocolate, vainilla, queso, bebidas carbonatadas ni ningún tipo de medicamento especialmente de salicilatos, medicación hipotensora y contrastes con yodo. Preservar la orina con HCl 6N (20 ml) pH=1 - 3 Evitar cualquier tipo de ejercicio físico no habitual . Evitar el estrés. (3 días antes de la toma de muestra)	Adrenalina: 4,00 - 20,00 µg/24 h : Límite de cuantificación: 4,00 µg/L Dopamina: 62,00 - 446,00 µg/24 h : Límite de cuantificación: 7,00 µg/L Noradrenalina: 23,00 - 105,00 µg/24 h : Límite de cuantificación: 4,00 µg/L
CATP **CATECOLAMINAS FRACCIONADAS, PLASMA**	Cromatografía Líquida Alta Resolución / Electroquímica.	6	Rec. 2 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.]	Adrenalina: Inf 84,00 pg/mL Adrenalina: Posición ortostática Inf 150,00 pg/mL Adrenalina: Posición supina Inf 84,00 pg/mL Dopamina: Inf 85,00 pg/mL Noradrenalina: Inf 420,00 pg/mL
G08012 **CATSHL, SÍNDROME DE · FGFR3 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FGFR3 *1*
G11158 **CAVERNOMATOSIS CEREBRAL FAMILIAR · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CCM2, KRIT1, PDCD10 *3*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G11133 **CAVERNOSA CEREBRAL, MALFORMACIÓN HEREDITARIA · KRIT1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	KRIT1	*1*
CEFTR **CEFTRIAXONA, SUERO**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	9	Rec. 3 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Cong.]	- La concentración residual debe estar entre 20 y 100 mg / L para una infección no documentada. - La concentración residual debe ser superior o igual a 40 veces a la Concentración Mínima inhibitoria (CMI) para una infección documentada. Toxicidad: Sup= 100,00 mg/L	
G12059 **CEGUERA NOCTURNA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CABP4, CACNA1F, CACNA2D4, CHM, CYP4V2, GNAT1, GNB3, GPR179, GRK1, GRM6, LRIT3, NYX, PDE6B, RDH5, RHO, RLBP1, RPE65, SAG, SLC24A1, TRPM1	*20*
G12063 **CEGUERA NOCTURNA ESTACIONARIA TIPO 1E · GPR179 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GPR179	*1*
QDQ2 **CELIAQUIA (HAPLOTIPO HLA DQ2.5), SUSCEPTIBILIDAD A · DQA1*0501/05 DQB1*0201/02 · PCR**	PCR-SSO.	5	Rec. 1 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	DQ2: Se informa para cada paciente HLA [DQA1*0501/05, DQB1*0201/02]	*1*
QDQ8 **CELIAQUIA (HAPLOTIPO HLA DQ8) SUSCEPTIBILIDAD A · DQA1*0301 DQB1*0302 · PCR**	PCR-SSO.	5	Rec. 1 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	DQ8: Se informa para cada paciente HLA [DQA1*0301 y DQB1*0302]	*1*
SCEL **CELIAQUIA, SUSCEPTIBIIDAD A · HAPLOTIPO HLA DQ2.5 Y DQ8 · PCR**	PCR-SSO.	5	Rec. 1 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío.	DQ2: Se informa para cada paciente DQ8: Se informa para cada paciente HLA [DQA1*0501/05, DQB1*0201/02] , HLA [DQA1*0301 y DQB1*0302]	*2*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ACPG **CÉLULA PARIETAL ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/40 Interpretación: Positivo: Sup= 1/40
CESEM **CELULAS DE SEZARY, FROTIS SANGUINEO**	Tinción.	4	Rec. 1 Frotis Extensión hematológica (1 x Extensiones directas.) [Refr.] Remitir junto muestra de sangre en tubo EDTA o en su defecto, orientación diagnóstica.	% Ausencia
ENDO **CELULAS ENDOTELIALES ANTICUERPOS IGG, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	8	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 1/100 Positivo: Sup= 1/100
SPNK **CÉLULAS NATURAL KILLER (LGL) · NK (CD3-CD16+CD56+) NKT (CD3+CD56+)**	Citometría de flujo.	7	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA)	Linfocitos NK CD3-/CD16+/CD56+: 5,35 - 30,93 % Linfocitos T tipo LGL (NKT CD3+ CD56+): 1,10 - 14,90 %
SUNK **CÉLULAS NATURAL KILLER (LGL) · NK (CD3-CD16+CD56+) NKT (CD3+CD56+) Y COEXPRESIONES**	Citometría de flujo.	7	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA)	Linfocitos NK CD3-/CD16+/CD56+: 5,35 - 30,93 % Coexpresión CD3-CD56+CD16+: Inf 9,60 % Coexpresión CD3-CD56-CD16+: Inf 1,20 % Coexpresión CD3-CD56+CD16-: Inf 1,20 % Linfocitos T tipo LGL (NKT CD3+ CD56+): 1,10 - 14,90 %
ACEN **CENTRÓMERO ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] No es necesario estar en ayunas.	Interpretación: Negativo: Inf 1/160 Interpretación: Positivo: Sup= 1/160

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G01186 **CEREBROVASCULAR, ACCIDENTE Y TRASTORNOS VASCULARES OTROS ÓRGANOS · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABCA1, ABCC6, ABCG5, ABCG8, ACAD9, ACE, ACTA2, ACTC1, ACVRL1, ADA2, ADAMTS2, AEBP1, AGXT, AKT1, ALDH18A1, ALG8, ALMS1, ALOX5AP, ALX4, ANGPTL3, ANTXR1, APOA1, APOA2, APOA5, APOB, APOC2, APOC3, APOE, APP, ASS1, ATP6V1A, ATP6V1E1, ATP7A, B3GALT6, B4GALT7, BGN, BICC1, BMPR2, BRAF, C1R, C1S, CACNA1D, CACNA1H, CBL, CCM2, CD46, CETP, CFH, CFI, CHST14, CITED2, CLCN2, COL12A1, COL1A1, COL1A2, COL3A1, COL4A1, COL4A2, COL5A1, COL5A2, COLGALT1, CPS1, CPT2, CRELD1, CST3, CYP11B1, DDX58, DLST, DOCK6, DOCK8, DPM3, DSE, DYRK1B, EDN1, EFEMP2, EIF2AK4, ELN, ENG, ENPP1, EPAS1, EPHB4, EPHX2, EPOR, F10, F13A1, F13B, F2, F5, F7, F8, F9, FANCA, FANCC, FANCD2, FANCE, FANCF, FANCI, FANCL, FBLN5, FBN1, FBN2, FGA, FGB, FGG, FH, FKBP14, FLNA, FLNC, FN1, FOXE3, FOXF1, G6PC3, GAA, GANAB, GATA4, GATA6, GBA1, GBE1, GCKR, GDF2, GDNF, Genoma mitocondrial, GGCX, GHR, GLA, GLMN, GNAQ, GP1BA, GP1BB, GPD1, GPIHBP1, GUCY1A1, GYS1, HABP2, HBB, HRG, HSD11B2, HTRA1, IFIH1, IL6, ITGA2B, ITGB3, IVD, JAG1, JAK2, KCNK3, KCNQ1, KDR, KIF1B, KRAS, KRIT1, LCAT, LDLR, LDLRAP1, LIPA, LIPC, LMAN1, LMBRD1, LMF1, LMNA, LOX, LPL, LRP6, LTBP4, LZTR1, MAP2K1, MAP2K2, MAPK1, MAT2A, MAX, MCFD2, MEF2A, MFAP5, MMACHC, MMUT, MPL, MRAS, MSX2, MTHFR, MTTP, MYBPC3, MYH11, MYH6, MYH7, MYLK, MYPN, NF1, NKX2-5, NOS3, NOTCH1, NOTCH3, NPPA, NR2F2, NR3C1, NRAS, OTC, PCCA, PCCB, PCNT, PCSK9, PDCD10, PDGFB, PDGFRB, PGM1, PIK3CA, PLD1, PLOD1, PLOD3, PMM2, PNP, PPP1CB, PRDM5, PRDX1, PRKAG2, PRKCH, PRKG1, PROC, PROS1, PROZ, PTEN, PTPN11, RAF1, RASA1, RASA2, RET, RFT1, RIN2, RIT1, RNF213, ROBO4, RRAS, RRAS2, RYR1, RYR2, SAMD9, SAMD9L, SAR1B, SCN5A, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, SERPINC1, SERPIND1, SERPINE1, SHOC2, SKI, SLC19A2, SLC20A2, SLC25A11, SLC2A10, SLC39A13, SLX4, SMAD3, SMAD4, SMAD6, SMAD9, SOS1, SOS2, SPARC, SPRED1, STAP1, STAT1, STIM1, TAB2, TBX20, TBX4, TECRL, TEK, TERT, TGFB2, TGFB3, TGFBR1, TGFBR2, THBD, THPO, THSD1, TLL1, TMEM127, TNNI3, TNNI3K, TNNT2, TNXB, TP53, TREX1, TTR, VHL, WAS, WFS1, WIPF1, XYLT1, XYLT2, YY1AP1, ZNF469
CERO **CERULOPLASMINA, ORINA**	Turbidimetría.	1	Rec. 1 mL Orina [Refr.]	mg/L Interpretación según criterio clínico

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
CP **CERULOPLASMINA, SUERO**	Turbidimetría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	20,00 - 60,00 mg/dL
CH50 **CH 50 (COMPLEMENTO 50%), SUERO**	Inmunoanálisis	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Separar y congelar inmediatamente.	Sup 39,80 U/mL
G11025 **CHARCOT MARIE TOOTH AXONAL AD, ENFERMEDAD DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AARS, DHTKD1, DNAJB2 , DNM2, DYNC1H1, GARS, GDAP1, HARS, HSPB1, HSPB8, KIF1B, KIF5A, LMNA, LRSAM1, MARS, MFN2, MME, MPZ, NAGLU, NEFH, NEFL, RAB7A, TRPV4, VCP *24*
G11026 **CHARCOT MARIE TOOTH AXONAL AR, ENFERMEDAD DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GDAP1, IGHMBP2, LMNA, LRSAM1, MED25, MFN2, MME, SPG11, TRIM2 *9*
G11287 **CHARCOT MARIE TOOTH AXONAL, ENFERMEDAD DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Indicado en informe adjunto AARS, AIFM1, DHTKD1, DNAJB2, DNM2, DYNC1H1, GARS, GDAP1, GJB1, HARS, HSPB1, HSPB8, IGHMBP2, KIF1B, KIF5A, LMNA, LRSAM1, MARS, MED25, MFN2, MME, MORC2, MPZ, NAGLU, NEFH, NEFL, PDK3, PRPS1, RAB7A, SPG11, TRIM2, TRPV4, VCP
G11027 **CHARCOT MARIE TOOTH DESMIELINIZANTE AD, ENFERMEDAD DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ARHGEF10, EGR2, FBLN5, LITAF, MPZ, NEFL, PMP22 *7*
G11028 **CHARCOT MARIE TOOTH DESMIELINIZANTE AR, ENFERMEDAD DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	EGR2, FGD4, FIG4, GDAP1, HK1, MTMR2, NDRG1, PRX, SBF1, SBF2, SH3TC2, SURF1 *12*
G11029 **CHARCOT MARIE TOOTH INTERMEDIO AD, ENFERMEDAD DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	DNM2, GNB4, HOXD10, INF2, MPZ, NEFL, YARS *7*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G11030 **CHARCOT MARIE TOOTH INTERMEDIO AR, ENFERMEDAD DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	COX6A1, FIG4, GDAP1, KRAS, PLEKHG5	*5*
G11035 **CHARCOT MARIE TOOTH LIGADA AL CROMOSOMA X TIPO 1, ENFERMEDAD DE · GJB1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GJB1	*1*
G11031 **CHARCOT MARIE TOOTH LX, ENFERMEDAD DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AIFM1, GJB1, PDK3, PRPS1	*4*
G11195 **CHARCOT MARIE TOOTH TIPO 1A, ENFERMEDAD DE · PMP22 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PMP22	*1*
G11034 **CHARCOT MARIE TOOTH TIPO 1A, ENFERMEDAD DE · PMP22 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PMP22	*1*
G11216 **CHARCOT MARIE TOOTH TIPO 1C, ENFERMEDAD DE · LITAF · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	LITAF	*1*
G3037 **CHARCOT MARIE TOOTH TIPO 1E, ENFERMEDAD DE · PMP22 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PMP22	*1*
G11032 **CHARCOT MARIE TOOTH TIPO 2M, ENFERMEDAD DE · DNM2 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	DNM2	*1*
G11218 **CHARCOT MARIE TOOTH TIPO 4F, ENFERMEDAD DE · PRX · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PRX	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G01010 **CHARCOT MARIE TOOTH, ENFERMEDAD DE · LMNA · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	LMNA	*1*
G11134 **CHARCOT MARIE TOOTH, ENFERMEDAD DE · MFN2 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	MFN2	*1*
G11033 **CHARCOT MARIE TOOTH, ENFERMEDAD DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AARS, AIFM1, ARHGEF10, COX6A1, DHTKD1, DNAJB2 , DNM2, DYNC1H1, EGR2, FGD4, FIG4, GARS, GDAP1, GJB1, GNB4, HARS, HK1, HOXD10, HSPB1, HSPB8, IGHMBP2, INF2, KARS, KIF1B, LITAF, LMNA, LRSAM1, MARS, MED25, MFN2, MME, MPZ, MTMR2, NAGLU, NDRG1, NEFH, NEFL, PDK3, PLEKHG5, PMP22, PRPS1, PRX, RAB7A, SBF1, SBF2, SH3TC2, SPG11, SURF1, TRIM2, TRPV4, VCP, YARS	*52*
G3114 **CHARCOT MARIE-TOOTH (1B, 2I, 2J, FORMA INTERMEDIA AD) · MPZ · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	MPZ	*1*
G11217 **CHARCOT-MARIE-TOOTH TIPO 2D, ENFERMEDAD DE · GARS · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GARS	*1*
G11298 **CHARCOT-MARIE-TOOTH TIPO 2S , ENFERMEDAD DE · IGHMBP2 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	IGHMBP2	*1*
G11213 **CHARCOT-MARIE-TOOTH TIPO 4C, SÍNDROME · SH3TC2 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SH3TC2	*1*
G16004 **CHARGE, SÍNDROME · CHD7 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CHD7	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G7441 **CHARGE, SÍNDROME DE · CHD7 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CHD7 *1*
CHMB **CHEQUEO COMPLETO HOMBRE**	No se aplica.	2	Rec. 5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 3 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 25 mL Orina (1 x Contenedor 25 mL.) [Refr.] Documentación: Peticionario general. Ayuno mínimo de 10 horas	: Indicado en informe adjunto
CHMJ **CHEQUEO COMPLETO MUJER**	No se aplica.	2	Rec. 5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 3 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 25 mL Orina (1 x Contenedor 25 mL.) [Refr.] Documentación: Peticionario general. Ayuno mínimo de 10 horas	: Indicado en informe adjunto

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
CHDC **CHEQUEO DEPORTIVO COMPLETO**	No se aplica.	3	Rec. 8.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 5 mL Suero (libre trazas metales) (1 x Tubo Suero metales traza) [Refr.] Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 25 mL Orina (primera micción) (1 x Contenedor 25 mL.) [Refr.] Ayuno mínimo de 12 horas.	: Indicado en informe adjunto

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
PVNO **CHEQUEO SALUD Y BIENESTAR**	No se aplica.	11	Rec. 8.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 3.5 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.] Rec. 3 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 2 mL Plasma Fluoruro EDTA (1 x Tubo fluoruro inhibidor glucolisis) [Refr.] Rec. 10 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo protegido de la luz) [Refr.] Rec. 1 mL Suero (libre trazas metales) (1 x Tubo Suero metales traza) [Refr.] Ayuno mínimo de 10 horas Peticionario general. Realizar la extracción en horario compatible con el envío de la muestra el mismo día de la extracción.	: Indicado en informe adjunto
CHKG **CHIKUNGUNYA ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Enviar la muestra en un tubo estéril en un embalaje de seguridad biológica	Interpretación: Negativo: Inf 0,80 Índice Interpretación: Indeterminado: 0,80 - 1,10 Índice Interpretación: Positivo: Sup 1,10 Índice

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
CHKM **CHIKUNGUNYA ANTICUERPOS IgM, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Enviar la muestra en un tubo estéril en un embalaje de seguridad biológica	Interpretación: Negativo: Inf 0,80 Índice Interpretación: Indeterminado: 0,80 - 1,10 Índice Interpretación: Positivo: Sup 1,10 Índice
RNACHI **CHIKUNGUNYA VIRUS (CHIKV) RNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	PCR-Real Time.	12	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Alt. 1 Pieza/s Biopsia (1 x Contenedor estéril) [Cong.] Alt. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Alt. 1 mL LCR (1 x Tubo estéril) [Cong.]	No se detecta
G02007 **CHILD, SÍNDROME DE · NSDHL · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	NSDHL *1*
CHGL **CHLAMYDIA PNEUMONIAE ANTICUERPOS IgG, LCR**	Inmunofluorescencia Indirecta.	8	Rec. 1 mL LCR (1 x Tubo estéril) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/2 Interpretación: Positivo: Sup= 1/2
CHML **CHLAMYDIA PNEUMONIAE ANTICUERPOS IgM, LCR**	Inmunofluorescencia Indirecta.	8	Rec. 1 mL LCR (1 x Tubo estéril) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/2 Interpretación: Positivo: Sup= 1/2
DNCP **CHLAMYDIA PNEUMONIAE DNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	Nested-PCR.	7	Rec. 1 mL Líquido biológico [Refr.] Alt. 1 mL Esputo [Cong.]	No se detecta * Esta prueba tiene una sensiblidad del 99% y una especificidad del 98%.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
CLANA **CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgA ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/12 Interpretación: Positivo: Sup= 1/12
CLNGE **CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgG ANTICUERPOS, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 0,80 Índice Indeterminado: 0,80 - 1,09 Índice Positivo: Sup= 1,10 Índice
CLNME **CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgM ANTICUERPOS, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 0,80 Índice Indeterminado: 0,80 - 1,09 Índice Positivo: Sup= 1,10 Índice
CLPSA **CHLAMYDIA PSITTACI ANTICUERPOS IgA, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/12 Interpretación: Positivo: Sup= 1/12
CLAG **CHLAMYDIA PSITTACI ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/64 Interpretación: Positivo: Sup= 1/64
CLAM **CHLAMYDIA PSITTACI ANTICUERPOS IgM, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/12 Interpretación: Positivo: Sup= 1/12
DNCPS **CHLAMYDIA PSITTACI DNA, SANGRE TOTAL**	Nested-PCR.	8	Rec. 3 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No se detecta
CLATG **CHLAMYDIA TRACHOMATIS ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/64 Interpretación: Positivo: Sup= 1/64

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
CLATM **CHLAMYDIA TRACHOMATIS ANTICUERPOS IgM, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/12 Interpretación: Positivo: Sup= 1/12
CLAA **CHLAMYDIA TRACHOMATIS ANTICUERPOS IgA, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/12 Interpretación: Positivo: Sup= 1/12
DNCT **CHLAMYDIA TRACHOMATIS DNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	PCR-Real Time.	5	Rec. 5 mL Orina (primera micción) (1 x Tubo 5 mL.) [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Exudado uretral [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Exudado endocervical [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Exudado conjuntival [Refr.] Alt. 5 mL Semen (1 x Tubo 5 mL.) [Refr.] Alt. 5 mL Líquido sinovial (1 x Tubo 5 mL.) [Refr.] Alt. 1 Muestra/s Raspado corneal [Refr.] Alt. 1 Muestra/s Humor vitreo/acuoso [Refr.] Alt. 1 Muestra/s Biopsia corneal [Refr.] El ensayo ha sido desarrollado para muestras de exudados celulares y/u orina. En muestras de otra procedencia puede verse comprometida la sensibilidad del método.	DNA de Chlamydia trachomatis: No se detecta

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
DNCL **CHLAMYDIA TRACHOMATIS SEROVAR L (LGV) DNA, MUESTRA BIOLOGICA**	PCR-Real Time.	5	Rec. 1 Muestra/s Exudado genital (1 x Escobillón seco.) [Refr.] Rec. 1 mL Orina (1 x Tubo 5 mL.) [Refr.]	: No se detecta
AGCL **CHLAMYDIA TRACHOMATIS, PRUEBA DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO, EXUDADO**	PCR-Real Time.	2	Rec. 1 Muestra/s Frotis [Refr.] Mujeres/Hombres: Escobillón seco	Nota: La prueba realizada permite detectar la infección por Chlamydia trachomatis conforme a las más recientes recomendaciones de las guías clínicas, garantizando el máximo rendimiento diagnóstico incluso en infecciones muy recientes o asintomáticas (Sensibilidad 95.2% y Especificidad 99.4%). No se detecta
AGCHO **CHLAMYDIA TRACHOMATIS, PRUEBA DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO, ORINA**	PCR-Real Time.	2	Rec. 10 mL Orina [Refr.] Sólo indicada para hombres	Nota: La prueba realizada permite detectar la infección por Chlamydia trachomatis conforme a las más recientes recomendaciones de las guías clínicas, garantizando el máximo rendimiento diagnóstico incluso en infecciones muy recientes o asintomáticas (Sensibilidad 95.2% y Especificidad 99.4%). No se detecta
AGNIA **CIANIDA, AGUA**	Absorción atómica.	15	Rec. 100 mL Agua (1 x Envase aséptico) [Refr.]	Agua de diálisis Inf 0,02 mg/L
G03005 **CICLO DE UREA, TRASTORNO DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ARG1, ASL, ASS1, CPS1, GLUD1, NAGS, OAT, OTC, SLC25A13,*11* SLC25A15, SLC7A7
CICLFO **CICLOFOSFAMIDA, ORINA**	Cromatografía de Gases / Espectrometría Masas.	12	Rec. 10 mL Orina (primera micción) (1 x Tubo 10 mL.) [Refr.]	Exposición a Ciclofosfamida Inf 0,005 mg/L
CICLF **CICLOFOSFAMIDA, SUERO**	Cromatografía de gases.	9	Rec. 2 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.]	Inf 30,00 mg/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
CIHEX **CICLOHEXANOL, ORINA**	Cromatografía de Gases / Ionización de Llama.	10	Rec. 10 mL Orina final jornada [Refr.]	VLB®-INSST: Final de la jornada laboral (Ciclohexanona) Inf 8,00 mg/L	
CICL **CICLOSPORINA, SANGRE TOTAL**	Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectrometría de masas.	4	Rec. 3 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Valle: Terapia inicial- Trasplante corazón: 250,00 - 350,00 ng/mL Valle: Terapia inicial- Trasplante hígado: 100,00 - 150,00 ng/mL Valle: Terapia inicial- Trasplante hígado: 225,00 - 300,00 ng/mL Valle: Terapia mantenimiento- Trasplante corazón: 100,00 - 250,00 ng/mL Valle: Terapia mantenimiento- Trasplante renal: 100,00 - 150,00 ng/mL Valle: Trasplante renal: 150,00 - 225,00 ng/mL Post-dosis: 2 h post administración Dependiendo del protocolo, órgano trasplantado y fase postrasplante.: 600,00 - 1500,00 ng/mL Límite de cuantificación: 10,00 ng/mL Se ha recomendado cada vez más monitorizar el nivel C2 (2 h post administración) en lugar del C0 (Valle), especialmente en trasplante renal, porque predice mejor la exposición total al fármaco (AUC). El intervalo terapéutico habitual para la C2 oscila entre 600-1500 ng/mL dependiendo del protocolo, órgano trasplantado y fase postrasplante. Nota: En fecha 12 de mayo de 2025, el kit comercial utilizado para el análisis de los niveles de inmunosupresores ha sido sustituido. Se recomienda tener en cuenta este cambio en la interpretación de los resultados analíticos, a fin de garantizar un seguimiento clínico adecuado de los pacientes.	
G08013 **CILIOPATÍAS ESQUELÉTICAS (SÍNDROME DE COSTILLA CORTA C/S POLIDACTILIA) · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CEP120, DYNC2H1, EVC1, EVC2, IFT122, IFT140, IFT172, IFT43, IFT80, NEK1, TCTN3, TTC21B, WDR19, WDR34, WDR35, WDR60	*16*
G11235 **CINCA, SÍNDROME · NLRP3 (3,4,6) · HOT SPOT**	Hot Spot	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	NLRP3 [exones 3,4,6]	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G11234 **CINCA, SÍNDROME · NLRP3 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	NLRP3 *1*
CININ **CININÓGENO DE ALTO PESO MOLECULAR, PLASMA**	Técnica coagulométrica.	32	Rec. 2.7 mL Plasma Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) [Cong.] Enviar plasma citrato congelado en nieve carbónica. Se requiere aviso previo al laboratorio. Se requiere información clínica.	80,00 - 140,00 %
CMOHS **CIRUGÍA DE MOHS**	Tinción / Observación microscópica.	5	Rec. 1 Pieza/s Tejido	Se informa para cada paciente
CISTC **CISTATINA C, SUERO**	Nefelometría.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	0,62 - 1,11 mg/L
TENIA **CISTICERCOSIS (TAENIA SOLIUM) ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	10	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 1 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.]	El diagnóstico de la infección por Taenia solium no puede basarse exclusivamente en el resultado de este procedimiento de enzimoinmunoanálisis, sino que debe interpretarse juntamente con el resto de los procedimientos complementarios y de los hallazgos clínicos. Negativo: Inf 9,00 NTU Indeterminado: 9,00 - 11,00 NTU Positivo: Sup 11,00 NTU
CIOR **CISTINA, ORINA 24H**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	11	Rec. 10 mL Orina 24h. (alícuota) (1 x Contenedor 2500 mL.) [Refr.]	Excreción (24h): Ambos 10 - 49 Días 2,20 - 3,3 mg/24h Excreción (24h): Ambos 1 - 12 Años 5,00 - 31,0 mg/24h Excreción (24h): Ambos Sup - 12 Años Inf 38,00 mg/24h Volumen de orina remitido (diuresis): 600,00 - 1600,00 mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G03190 **CISTINOSIS · CTNS · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA (2 tubos)) [Refr.]	CTNS	*1*
G03123 **CISTINOSIS · CTNS · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CTNS	*1*
G03195 **CISTINURIA · PREPL, SLC3A1, SLC7A9 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]		
G03006 **CISTINURIA · SLC3A1, SLC7A9 · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SLC3A1, SLC7A9	*2*
G0111 **CISTINURIA · SLC7A9 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SLC7A9	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ESCIT **CITALOPRAM, SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	6	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis. El contenedor recomendado es el tubo seco (sin gel separador) para evitar procesos de adsorción del fármaco. En caso de no disponer de tubo seco, la extracción se puede realizar en tubo con gel separador, separando el suero dentro de las 2 horas posteriores a la recolección y transfiriéndolo a un tubo de alícuota para su transporte al laboratorio. Rechazo: Muestra hemolizada, lipémica y/o ictérica	50,00 - 110,00 ug/L I.Terapéutico: 50,00 - 110,00 ug/L Toxicidad: Sup 220,00 ug/L Límite de cuantificación: 5,00 ug/L
CITOANAL **CITOLOGÍA ANAL**	Tinción de Papanicolaou / Observación microscópica.	4	Rec. 1 Muestra/s Frotis anal	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
514 **CITOLOGÍA GINECOLÓGICA**	Tinción de Papanicolaou / Observación microscópica.	3	Rec. 1 Muestra/s Frotis cervicovaginal	Se informa para cada paciente
CCF **CITOLOGÍA GINECOLÓGICA · MEDIO LÍQUIDO**	Tinción de Papanicolaou / Observación microscópica.	3	Rec. 1 Muestra/s Frotis Utilizar tubos suministrados por nuestro laboratorio.	Se informa para cada paciente
512 **CITOLOGÍA NO GINECOLÓGICA**	Tinción / Observación microscópica.	3	Rec. 50 mL Orina [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Frotis	Se informa para cada paciente
510 **CITOLOGIA PAAF ÓRGANOS PROFUNDOS · DIAGNOSTICO**	Tinción de Papanicolaou / Observación microscópica.	3	Rec. 1 Muestra/s PAAF [Refr.]	Se informa para cada paciente
2967 **CITOLOGIA PAAF ÓRGANOS PROFUNDOS · DIAGNOSTICO Y CONTROL**	Tinción de Papanicolaou / Observación microscópica.	3	Rec. 1 Muestra/s PAAF [Refr.]	Se informa para cada paciente
511 **CITOLOGIA PAAF ÓRGANOS SUPERFICIALES · DIAGNOSTICO**	Tinción de Papanicolaou / Observación microscópica.	3	Rec. 1 Muestra/s PAAF [Refr.]	Se informa para cada paciente
2968 **CITOLOGIA PAAF ÓRGANOS SUPERFICIALES · DIAGNOSTICO Y CONTROL**	Tinción de Papanicolaou / Observación microscópica.	3	Rec. 1 Muestra/s PAAF [Refr.]	Se informa para cada paciente

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
QCMC **CITOMEGALOVIRUS (CMV) DNA CUANTITATIVO, MUESTRA BIOLÓGICA**	PCR-Real Time.	5	Rec. 1 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Rec. 1 mL LCR (1 x Tubo estéril) [Cong.] Alt. 1 Pieza/s Biopsia Suero fisiológico (1 x Recipiente estéril) [Refr.] Alt. 1 Pieza/s Biopsia Suero fisiológico (1 x Recipiente de plástico) [Refr.] Alt. 1 Muestra/s Tejido parafinado (1 x Recipiente de plástico) Alt. 1 Muestra/s Placenta (1 x Recipiente estéril) [Refr.] Alt. 1 mL Orina (1 x Recipiente estéril) [Cong.] Alt. 1 mL Médula ósea EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Alt. 1 mL Líquido amniótico (1 x Tubo estéril) [Cong.] Alt. 1 mL Humor vitreo/acuoso (1 x Tubo estéril) [Cong.] Alt. 1 mL BAS (1 x Tubo estéril) [Cong.] Alt. 1 mL BAL (1 x Tubo estéril) [Cong.] Sólo se acepta muestra de orina para bebés.	Límite de detección: 178 UI/mL. Límite superior de cuantificación: 100.000.000 UI/mL.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
QCMV **CITOMEGALOVIRUS (CMV) DNA SCREENING, MUESTRA BIOLÓGICA**	PCR-Real Time.	5	Rec. 3 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 3 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Rec. 1 mL LCR (1 x Tubo estéril) [Cong.] Alt. 3 mL Médula ósea (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 1 Muestra/s Tejido parafinado Alt. 1 Muestra/s Tejido [Refr.] Alt. 1 Muestra/s Placenta [Refr.] Alt. 1 Muestra/s Humor vitreo/acuoso [Cong.] Alt. 1 mL Orina [Cong.] Alt. 1 mL Líquido amniótico [Cong.] Alt. 1 mL Lavado broncoalveolar [Cong.] Alt. 1 mL Aspirado bronquial [Cong.] Ensayo acreditado para muestras de Plasma, Sangre total y LCR Sólo se acepta muestra de orina para bebés.	DNA Citomegalovirus: No se detecta La sensibilidad y la especificidad de la técnica es de un 100%. El límite de detección es 178 UI/mL.
CMVSR **CITOMEGALOVIRUS (CMV), RESISTENCIA (UL97, UL54) SCREENING, ORINA**	Técnica de secuenciación	15	Rec. 10 mL Orina [Cong.]	No se detecta

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
CMVSRS **CITOMEGALOVIRUS (CMV), RESISTENCIA (UL97, UL54) SCREENING, SANGRE TOTAL**	Técnica de secuenciación	15	Rec. 2 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] La muestra de orina sólo está indicada para recién nacidos o casos en los que no es posible la obtención de muestra de sangre.	No se detecta
CMVAV **CITOMEGALOVIRUS ANTICUERPOS IGG TEST DE AVIDEZ DE LAS IGG, SUERO**	Quimioluminiscencia.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Un índice de avidez inferior al 15 % se considera avidez baja, compatible con infección aguda o reciente. Interpretación: Baja Avidez: Inf 15,00 % Interpretación: Moderada Avidez: 15,00 - 25,00 % Interpretación: Alta Avidez: Sup 25,00 % Un índice de avidez superior o igual al 25 % se considera avidez alta, compatible con infección antigua.
CITOGCR **CITOMEGALOVIRUS ANTICUERPOS IGG, LCR**	Enzimoinmunoanálisis	4	Rec. 300 uL LCR [Refr.]	UA/mL Interpretación según criterio clínico
CMVGB **CITOMEGALOVIRUS ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 12,00 UI/mL Indeterminado: 12,00 - 14,00 UI/mL Positivo: Sup 14,00 UI/mL
CITOMCR **CITOMEGALOVIRUS ANTICUERPOS IGM, LCR**	Enzimoinmunoanálisis	4	Rec. 300 uL LCR [Refr.]	Índice Interpretación según criterio clínico
CMVMB **CITOMEGALOVIRUS ANTICUERPOS IgM, SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 18,00 UI/mL Indeterminado: 18,00 - 22,00 UI/mL Positivo: Sup 22,00 UI/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G7385 **CITOMETRÍA ENFERMEDAD CELÍACA (LINFOCITOS INTRAEPITELIALES DUODENO), BIOPSIA DUODENAL**	Citometría de flujo.	9	Rec. 1 Pieza/s Biopsia intestinal [Refr.] Para la extracción de la muestra es necesario contar con un medio de cultivo específico proporcionado por el laboratorio. Coordinar previamente toma y envío de muestras con el laboratorio.	
ANCA **CITOPLASMA DE NEUTROFILOS (ANCA) ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	C-ANCA: Interpretación: Negativo: Inf 1/20 C-ANCA: Interpretación: Positivo: Sup= 1/20 P-ANCA: Interpretación: Negativo: Inf 1/20 P-ANCA: Interpretación: Positivo: Sup= 1/20 X-ANCA: Interpretación: Negativo: Inf 1/20 X-ANCA: Interpretación: Positivo: Sup= 1/20
G03117 **CITRULINEMIA · ASS1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ASS1 *1*
CKMBM **CK MB CREATINQUINASA MB (MASA), SUERO**	Quimioluminiscencia.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Hombres Inf 5,20 ng/mL Mujeres Inf 3,10 ng/mL
G11135 **CK, SÍNDROME · NSDHL · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	NSDHL *1*
G00136 **CLASIFICACIÓN DE VARIANTE GENÉTICA**	Clasificación de variante genética	20		

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
COCLSA **CLOBAZAM CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SALIVA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	3	Rec. 1 mL Saliva [Refr.]	Incertidumbre de medida 1 ng/mL Límite de cuantificación 5 ng/mL
CLNC **CLOBAZAM, NORCLOBAZAM Y RATIO, SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	6	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.] -Dosis administrada, frecuencia y vía de administración La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis. No utilizar tubos con gel separador. Rechazo: Muestra hemolizada, lipémica y/o ictérica	Clobazam: I.Terapéutico: 30,00 - 300,00 µg/L Clobazam: Conc.Tóxica: Sup 500,00 µg/L Clobazam: Límite de cuantificación: 10,00 µg/L Norclobazam: I.Terapéutico: 300,00 - 3000,00 µg/L Norclobazam: Conc.Tóxica: Sup 5000,00 µg/L Norclobazam: Límite de cuantificación: 50,00 µg/L Ratio norclobazam / clobazam: Inf 10,00

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
CLDE				
CLOMIPRAMINA + DESMETILCLOMIPRAMINA, SUERO	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	6	Rec. 100 uL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.] La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis. El contenedor recomendado es el tubo seco (sin gel separador) para evitar procesos de adsorción del fármaco. En caso de no disponer de tubo seco, la extracción se puede realizar en tubo con gel separador, separando el suero dentro de las 2 horas posteriores a la recolección y transfiriéndolo a un tubo de alícuota para su transporte al laboratorio. -Dosis administrada, frecuencia y vía de administración Rechazo: Muestra hemolizada, lipémica y/o ictérica	Intervalo terapéutico (clomipramina + desmetilclomipramina): 230 - 450 µg/L Toxicidad (clomipramina + desmetilclomipramina): Sup450 µg/L Clomipramina (Anafranil): Límite de cuantificación: 10,00 µg/L Desmetilclomipramina (Norclomipramina): Límite de cuantificación: 12,00 µg/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
CNZ **CLONAZEPAM (RIVOTRIL), SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	6	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.] La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis. No utilizar tubos con gel separador. Rechazo: Muestra hemolizada, lipémica y/o ictérica	I.Terapéutico: 20,00 - 70,00 µg/L Toxicidad: Sup 80,00 µg/L Límite de cuantificación: 2,00 µg/L
G18022 **CLOPIDOGREL, RESPUESTA A · CYP2C19 · HOT SPOT**	Secuenciación Sanger	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	
AGCO **CLORAMINAS, AGUA**	Espectrometría.	15	Rec. 100 mL Agua (1 x Envase aséptico) [Refr.]	Agua de diálisis Inf 0,10 mg/L Agua de red Inf 2,00 mg/L
CLZPS **CLORAZEPATO (NORDIAZEPAM), SUERO**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	8	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] -Dosis administrada, frecuencia y vía de administración	Los resultados se expresan como NORDIAZEPAM (el clorazepato se convierte a Nordiazepam por efecto del HCl gástrico). I.Terapéutico: Acción Anticonvulsiva 0,60 - 1,50 µg/mL I.Terapéutico: Acción Sedante 0,09 - 0,20 µg/mL Conc.Tóxica: Acción Anticonvulsiva Sup 2,00 µg/mL Conc.Tóxica: Acción Sedante Sup 1,00 µg/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
CDZPX **CLORDIAZEPÓXIDO (LIBRIUM), SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	6	Rec. 500 uL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 500 uL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis. Rechazo: Muestra hemolizada, lipémica y/o ictérica	I.Terapéutico: 400,00 - 3000,00 µg/L Toxicidad: Sup 3500,00 µg/L Límite de cuantificación: 60,00 µg/L
CLORI **CLORO EN ORINA DE MICCIÓN (CONCENTRACIÓN)**	Electrodo Selectivo de Iones.	1	Rec. 2 mL Orina [Refr.]	mEqu/L Interpretación según criterio clínico
POCRL **CLORO LIBRE, AGUA DIALISIS**	Espectrometría.	7	Rec. 100 mL Agua de diálisis (1 x Envase aséptico) [Refr.]	Cloro combinado residual Inf 2,00 mg/L Cloro libre residual Inf 1,00 mg/L
AGC **CLORO TOTAL, AGUA**	Absorción atómica.	5	Rec. 100 mL Agua (1 x Envase aséptico) [Refr.]	Agua de diálisis Inf 0,10 mg/L Agua de red Inf 2,00 mg/L
CLL **CLORO, LÍQUIDO BIOLÓGICO**	Electrodo Selectivo de Iones.	1	Rec. 1 mL Líquido biológico [Refr.]	mEq/L Interpretación según criterio clínico
CLCL **CLORO, LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO**	Electrodo Selectivo de Iones.	1	Rec. 1 mL LCR [Refr.]	120,00 - 130,00 mEq/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
CLO **CLORO, ORINA 24H**	Electrodo Selectivo de Iones.	1	Rec. 1 mL Orina 24h. (alícuota) (1 x Contenedor 2500 mL.) [Refr.]	Cloro: 110,00 - 250,00 mEqu/24h
CL **CLORO, SUERO**	Electrodo Selectivo de Iones.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	99,00 - 109,00 mEq/L
CLFORS **CLOROFORMO, SANGRE TOTAL**	Cromatografía de Gases / Ionización de Llama.	9	Rec. 3 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,50 mg/L
CLQUI **CLOROQUINA, SUERO**	Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectrometría de masas.	13	Rec. 2 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Cong.]	I.Terapéutico: Profilaxis malaria: 12,80 - 32.00 ng/mL I.Terapéutico: Terapia malaria: 96,00 - 192,00 ng/mL I.Terapéutico: Tratamiento artritis reumatoide: 200,00 - 400,00 ng/mL
CLORP **CLORPROMACINA, SUERO**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	8	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] -Dosis administrada, frecuencia y vía de administración	I.Terapéutico: Adultos 30,00 - 300,00 µg/L I.Terapéutico: Niños 40,00 - 80,00 µg/L Toxicidad: Sup 600,00 µg/L Límite de cuantificación: 10,00 µg/L
AGCLO **CLORUROS, AGUA**	Absorción atómica.	5	Rec. 100 mL Agua (1 x Envase aséptico) [Refr.] Alt. 100 mL Agua (1 x Envase aséptico) (<2 Ác.nítrico)	Agua de diálisis Inf 50,00 mg/L Agua de red Inf 250,00 mg/L
DNCD **CLOSTRIDIOIDES DIFFICILE (TOXINA B) DNA, HECES**	PCR-Real Time.	3	Rec. 1 mL Líquido biológico [Refr.] Rec. 1 g Heces [Refr.]	DNA Clostridioides difficile (Toxina B): No se detecta
TCBHE **CLOSTRIDIUM BOTULINUM TOXINA DETECCIÓN, HECES**	Cultivo + PCR	14	Rec. 10 g Heces (1 x Recipiente estéril) [Cong.]	No se detecta

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
TCBSU **CLOSTRIDIUM BOTULINUM TOXINA, SUERO**	Cultivo + PCR	15	Rec. 5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	Negativo
TET **CLOSTRIDIUM TETANI ANTITOXINA ANTICUERPOS IGG, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Se recomienda revacunación.: Inf 0,50 UI/mL Protección insuficiente: Inf= 0,10 UI/mL Inmunidad Adquirida: Sup 0,50 UI/mL
CLOXA **CLOXACILINA, SUERO**	Ultra-High-Performance Liquid Chromatography—Electrospray Ionization-tandem Mass Spectrometry (UHPLC-ESI/MS)	9	Rec. 2 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Cong.] No utilizar tubos con gel separador. Se requiere peticionario específico.	20,00 - 50,00 mg/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
CLOZ **CLOZAPINA, SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	6	Rec. 100 uL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.] -Dosis administrada, frecuencia y vía de administración La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis. El contenedor recomendado es el tubo seco (sin gel separador) para evitar procesos de adsorción del fármaco. En caso de no disponer de tubo seco, la extracción se puede realizar en tubo con gel separador, separando el suero dentro de las 2 horas posteriores a la recolección y transfiriéndolo a un tubo de alícuota para su transporte al laboratorio. Rechazo: Muestra hemolizada, lipémica y/o ictérica	I.Terapéutico: 350,00 - 600,00 µg/L Toxicidad: Sup 600,00 µg/L Límite de cuantificación: 28,00 µg/L
G4229 **COAGULACIÓN, DESÓRDENES DE LA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ANO6, F10, F11, F12, F13A1, F13B, F2, F5, F7, F8, F9, FGA, FGB, FGG, GGCX, GP1BA, GP1BB, GP9, KLKB1, LMAN1, MCFD2, SERPINE1, SERPINF2, THBD, VKORC1, VWF

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G04011 **COAGULACIÓN, TRASTORNOS DE LA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	F10, F11, F12, F13A1, F13B, F2, F5, F7, F8, F9, FGA, FGB, FGG, GGCX, KNG1, LMAN1, MCFD2, SERPINE1, SERPINF2, VKORC1, VWF *21*
G04012 **COAGULACIÓN, TROMBOLÍTICOS Y DE PLAQUETAS (HEMORRAGIAS), TRASTORNOS DE LA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABCG5, ABCG8, ADAMTS13, ANKRD26, ANO6, AP3B1, BLOC1S3, BLOC1S6, CD36, COL3A1, CYCS, DIAPH1 , DTNBP1, EGLN1, EPAS1, ETV6(TEL), F10, F11, F12, F13A1, F13B, F2, F5, F7, F8, F9, FERMT3, FGA, FGB, FGG, FLI1, FLNA, GATA1, GATA2, GFI1B, GGCX, GP1BA, GP1BB, GP6, GP9, HOXA11, HPS1, HPS3, HPS4, HPS5, HPS6, HRG, ITGA2B, ITGB3, KLKB1, KNG1, LMAN1, LYST, MASTL, MCFD2, MPL, MYH9, NBEA, NBEAL2, P2RY12, PLA2G4A, PLAT, PLAU, PLG, PROC, PROS1, PTPN11, RASGRP2, RBM8A, RNU4ATAC, RUNX1, SERPINC1, SERPIND1, SERPINE1, SERPINF2, STIM1 , STXBP2, TBXA2R, TBXAS1, THBD, THPO, TUBB1, VIPAS39, VKORC1, VWF, WAS, WIPF1 *87*
COO **COBALTO, ORINA FINAL DE JORNADA LABORAL**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	5	Rec. 1 mL Orina final jornada (1 x Tubo 10 mL.) [Refr.]	VLB®-INSST: Final de la semana laboral (Cobalto y compuestos inorgánicos excepto óxidos) Inf 15,00 µg/L Límite de cuantificación: Inf 1,00 µg/L
COB **COBALTO, SANGRE TOTAL**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	4	Rec. 1 mL Sangre total EDTA Dipotásico (libre trazas metales) (1 x Tubo Sangre EDTA metales traza) [Refr.] Se puede hacer con muestra en tubo libre de metales y anticoagulante Heparina Sódica.	VLB®-INSST: Final de la semana laboral (Cobalto y compuestos inorgánicos excepto óxidos) Inf 1,00 µg/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
COS **COBALTO, SUERO**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	4	Rec. 1 mL Suero (libre trazas metales) (1 x Tubo Suero metales traza) [Refr.]	Valores interpretativos: Prótesis e implantes No existe desgaste: Inf= 2,00 µg/L Valores interpretativos: Prótesis e implantes Riesgo de desgaste:: 2,00 - 10,00 µg/L Valores interpretativos: Prótesis e implantes Incremento del desgaste:: Sup= 10,00 µg/L Valores interpretativos: Protección mínima Intoxicación sistémica:: Sup= 20,00 µg/L
CUES **COBRE (ESPECTROMETRÍA VISIBLE), SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 0.4 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.4 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rechazo: Muestra Hemolizada	Ambos 0 - 6 Meses 20,00 - 70,00 µg/dL Ambos 6 - 12 Meses 90,00 - 190,00 µg/dL Ambos 1 - 6 Años 90,00 - 190,00 µg/dL Ambos 6 - 12 Años 80,00 - 160,00 µg/dL Hombres Sup - 12 Años 70,00 - 140,00 µg/dL Mujeres Sup - 12 Años 80,00 - 155,00 µg/dL
CUG **COBRE ERITROCITARIO, SANGRE**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	5	Rec. 1 mL Sangre total EDTA Dipotásico (libre trazas metales) (1 x Tubo Sangre EDTA metales traza) [Refr.] Se puede hacer con muestra en tubo libre de metales y anticoagulante Heparina Sódica.	43,00 - 91,00 µg/dL
CULS **COBRE LIBRE, SUERO**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	5	Rec. 3 mL Suero (libre trazas metales) (1 x Tubo Suero metales traza) [Refr.]	Valores superiores a 20 µg/dL pueden ser compatibles con enfermedad de Wilson
AGCU **COBRE, AGUA**	Absorción atómica.	15	Rec. 100 mL Agua (1 x Envase aséptico) [Refr.] Alt. 100 mL Agua (1 x Envase aséptico) (<2 Ác.nítrico)	Agua de diálisis Inf 0,10 mg/L Agua de red Inf 0,02 mg/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
CUOR **COBRE, ORINA 24H**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	5	Rec. 10 mL Orina 24h. (alícuota) (1 x Contenedor 2500 mL.) [Refr.]	Excreción (24h): Inf 60,00 µg/24 h : Límite de cuantificación: 6,00 µg/L
CUOF **COBRE, ORINA FINAL DE JORNADA**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	5	Rec. 10 mL Orina final jornada [Refr.]	Cobre en orina final de jornada : Personal expuesto µg/g creat No establecido. Cobre en orina final de jornada : Población no expuesta Hombres 9,00 - 43,00 µg/g creat Cobre en orina final de jornada : Población no expuesta Mujeres 7,00 - 72,00 µg/g creat : Límite de cuantificación: 6,00 µg/L
CU **COBRE, SUERO**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	3	Rec. 1 mL Suero (libre trazas metales) (1 x Tubo Suero metales traza) [Refr.]	Ambos 0 - 6 Meses 30,00 - 70,00 µg/dL Ambos 6 - 12 Meses 90,00 - 190,00 µg/dL Embarazadas Mujeres 118,00 - 302,00 µg/dL Ambos 1 - 6 Años 90,00 - 190,00 µg/dL Ambos 6 - 12 Años 80,00 - 160,00 µg/dL Hombres Sup - 12 Años 70,00 - 140,00 µg/dL Mujeres Sup - 12 Años 80,00 - 155,00 µg/dL
CUTH **COBRE, TEJIDO HEPATICO**	Absorción atómica.	47	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	10,00 - 35,00 µg/g de tejido Enfermedad de Wilson: Superior a 250 µg/g de tejido hepático.
CUOL **COBRE/CREATININA, ORINA**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	5	Rec. 10 mL Orina [Refr.]	Cobre en orina de micción: Hombres 9,00 - 43,00 µg/g creat Cobre en orina de micción: Mujeres 7,00 - 72,00 µg/g creat Cobre en orina de micción: Ambos 2 - 6 Años 9,00 - 58,00 µg/g creat Cobre en orina de micción: Ambos 7 - 11 Años 7,00 - 46,00 µg/g creat Cobre en orina de micción: Ambos 12 - 17 Años 5,00 - 18,00 µg/g creat

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
COCETOR **COCAETILO CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), ORINA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 10 mL Orina [Refr.]	Se utiliza como criterio de Positividad que la concentración sea superior o igual al valor del límite de cuantificación más el valor de incertidumbre del ensayo. En caso contrario, el resultado es Negativo. Incertidumbre de medida 4,3 ng/mL Límite de cuantificación 25 ng/mL
COCETSAI **COCAETILO CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SALIVA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 1 mL Saliva [Refr.]	Incertidumbre de medida 2,2 ng/mL Límite de cuantificación 8 ng/mL
COCETSTI **COCAETILO CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SANGRE**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 10 mL Sangre total Oxalato/Fluoruro (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total Heparina litio (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Tubo oxalato potásico/Fluoruro sódico Ref. SAP 600088318	Incertidumbre de medida 1,5 ng/mL Límite de cuantificación 8 ng/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
COCP **COCAINA CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), CABELLO**	Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectrometría de masas.	10	Rec. 1 g Cabello (1 x Kit específico) Pauta para la recogida: 1. Recogida - Cortar unos 2-3 mechones de cabello justo en la parte que queda en la base en contacto con la nuca. Puede cortarse con tijeras de acero inoxidable o navaja. - Cortar mechones de cabello de las partes más cercanas a la nuca y en cantidad suficiente para el análisis. 2. Colocar el cabello dentro de la tarjeta de recogida. Rotular con el nombre del paciente, dirección y teléfono. No olvidar cumplimentar los todos los datos que constan en la ficha junto con la bolsa que se adjunta.	Confirmación de Benzoilecgonina en cabello : Valor de corte recomendado: Negativo: Inf 98,00 pg/mg Confirmación de Benzoilecgonina en cabello : Valor de corte recomendado: Positivo: Sup= 98,00 pg/mg Confirmación de Cocaina en cabello : Valor de corte recomendado: Negativo: Inf 610,00 pg/mg Confirmación de Cocaina en cabello : Valor de corte recomendado: Positivo: Sup= 610,00 pg/mg
COOR **COCAINA CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), ORINA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 10 mL Orina [Refr.]	Benzoilecgonina : Incertidumbre de medida 3,9 ng/mL Benzoilecgonina : Límite de cuantificación 25 ng/mL Cocaína : Incertidumbre de medida 3,3 ng/mL Cocaína : Límite de cuantificación 25 ng/mL Se utiliza como criterio de Positividad que la concentración sea superior o igual al valor del límite de cuantificación más el valor de incertidumbre del ensayo. En caso contrario, el resultado es Negativo.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
COCSA **COCAINA CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SALIVA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 1 mL Saliva [Refr.]	Benzoilecgonina : Incertidumbre de medida 1,9 ng/mL Benzoilecgonina : Límite de cuantificación 8 ng/mL Cocaína : Incertidumbre de medida 2 ng/mL Cocaína : Límite de cuantificación 8 ng/mL
COCS **COCAINA CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SANGRE**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 10 mL Sangre total Oxalato/Fluoruro (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total Heparina litio (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Tubo oxalato potásico/Fluoruro sódico Ref. SAP 600088318	Benzoilecgonina : Incertidumbre de medida 1,6 ng/mL Benzoilecgonina : Límite de cuantificación 8 ng/mL Cocaína : Incertidumbre de medida 1,3 ng/mL Cocaína : Límite de cuantificación 8 ng/mL
PCOC **COCAÍNA, ORINA**	Enzimoinmunoanálisis Múltiple.	1	Rec. 10 mL Orina (1 x Tubo 10 mL.) [Refr.] Si es un consurmo normal aguanta de 1 a 3 días y si es elevado has 3 semanas.	Negativo Permite la detección de benzoilecgonina, cocaína, cocaetileno y ecgonina en la muestra. El valor discriminante de la técnica es 150 ng/mL
COCC **COCCIDIOIDES INMITIS ANTICUERPOS, SUERO**	Aglutinación de Partículas.	12	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo
G11249 **COCKAYNE, SÍNDROME DE · ERCC6, ERCC8 · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ERCC6, ERCC8 2
G07001 **COENZIMA Q10, DEFICIENCIA DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ANO10, APTX, COQ2, COQ4 , COQ6, COQ7, COQ9, ETFA, ETFB, ETFDH, PDSS1, PDSS2 12

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
CQ10 **COENZIMA Q10, SUERO**	Cromatografía Líquida Alta Resolución / Espectrometria UV.	11	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Alt. 1 mL Plasma Heparina litio (1 x Tubo 5 mL.) [Cong.] Muestra protegida de la luz SEPARAR EN EL MOMENTO DE LA EXTRACCION	0,35 - 1,94 mg/L
CDFOXP **COEXPRESIÓN CD3+CD4+FOXP3+, SANGRE TOTAL**	Citometría de flujo.	8	Rec. 1 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA)	0,80 - 4,30 %
CIIH **COFACTOR II HEPARINA (ACTIVIDAD), PLASMA**	Espectrometría.	32	Rec. 1 mL Plasma Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) [Cong.] Separar y congelar inmediatamente.	60,00 - 145,00 %
G11211 **COFFIN-LOWRY, SÍNDROME · RPS6KA3 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	RPS6KA3 *1*
G11281 **COFFIN-SIRIS TIPO 1, SÍNDROME DE · ARID1B · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ARID1B *1*
G11275 **COFFIN-SIRIS TIPO 3, SÍNDROME DE · SMARCB1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SMARCB1 *1*
G11276 **COFFIN-SIRIS, SÍNDROME DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ARID1A, ARID1A, ARID1B, ARID2, DPF2, SMARCA4, SMARCB1, SMARCC2, SMARCD1, SMARCE1, SOX11

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G11246 **COHEN, SÍNDROME DE · VPS13B · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	VPS13B	*1*
G11274 **COHESINOPATÍAS/CORNELIA DE LANGE, SÍNDROME · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ANKRD11, ESCO2, HDAC8, NIPBL, RAD21, SMC1A, SMC3	*7*
G11285 **COL4A1, SÍNDROMES RELACIONADOS CON · COL4A1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	COL4A1	*1*
ACOL **COLAGENO TIPO II ANTICUERPOS, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	30	Rec. 2 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	índice Negativo	
G08114 **COLÁGENO, DEFECTOS DEL · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	COL10A1, COL11A1, COL11A2, COL17A1, COL18A1, COL1A1, COL1A2, COL2A1, COL3A1, COL4A1, COL4A2, COL4A3, COL4A4, COL4A5, COL4A6, COL5A1, COL5A2, COL6A1, COL6A2, COL6A3, COL7A1, COL9A1, COL9A2, COL9A3	*24*
G15213 **COLANGIOCARCINOMA AMPLIADO · PANEL · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	12	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	Se informa para cada paciente APC, ARID1A, ARID2, ATM, AXIN1, BAP1, BRAF, CCND1, CDH1, CDKN2A, CTNNB1, DNAJB1, EGFR, ERBB2, EZH2, FGF19, FGFR1, FGFR2, FGFR3, GNAS, HNF1A, HRAS, IDH1, IDH2, IGF2, KEAP1, KRAS, MAP2K1, MAPK1, MET, MSI, NFE2L2, NRAS, NRG1, NTRK1, NTRK2, NTRK3, PBRM1, PIK3C2G, PIK3CA, POLE, PRKACA, PTEN, RB1, RET, RHOA, RNF43, ROS1, SMAD4, STK11, TERT, TGFBR2, TMB, TP53, TSC1, TSC2	*56*
G05004 **COLESTASIS · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABCB11, ABCB4, AKR1D1, ATP8B1, BAAT, EPHX1, JAG1, MYO5B, NR1H4, SERPINA1, SLC25A13, TJP2	*12*
G05022 **COLESTASIS INTRAHEPÁTICA TIPO 3 · ABCB4 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABCA4	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G4039 **COLESTASIS INTRAHEPÁTICA TIPO 3 · ABCB4 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABCB4 *1*
CH **COLESTEROL HDL, SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Ayuno mínimo de 6 h	Hombres Sup 40,00 mg/dL Mujeres Sup 50,00 mg/dL
G01149 **COLESTEROL LDL, ALTERACIÓN NIVELES DE · LDLR · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	LDLR *1*
G01001 **COLESTEROL LDL, ALTERACIÓN NIVELES DE · LDLR · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	LDLR *1*
CLD **COLESTEROL LDL, SUERO**	Cálculo.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Ayuno mínimo de 6 h	Colesterol HDL: Hombres Sup 40,00 mg/dL Colesterol HDL: Mujeres Sup 50,00 mg/dL Colesterol total: Inf 200,00 mg/dL Colesterol LDL: Valor recomendado: Prevención secundaria y RCV muy alto Inf 55,00 mg/dL Colesterol LDL: Valor recomendado: RCV alto Inf 70,00 mg/dL Colesterol LDL: Valor recomendado: RCV bajo Inf 116,00 mg/dL Colesterol LDL: Valor recomendado: RCV medio Inf 100,00 mg/dL Triglicéridos: Inf 150,00 mg/dL
CNHD **COLESTEROL NO HDL, SUERO**	Cálculo.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Ayuno mínimo de 6 h	Colesterol HDL: Hombres Sup 40,00 mg/dL Colesterol HDL: Mujeres Sup 50,00 mg/dL Colesterol no HDL: Riesgo Cardiovascular alto: Inf 100,00 mg/dL Colesterol no HDL: Riesgo Cardiovascular medio: Inf 130,00 mg/dL Colesterol no HDL: Prevención secundaria y Riesgo cardiovascular muy alto: Inf 85,00 mg/dL Colesterol no HDL: Inf 130,00 mg/dL Colesterol total: Inf 200,00 mg/dL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
CTL **COLESTEROL TOTAL, LÍQUIDO BIOLÓGICO**	Enzimático.	1	Rec. 1 mL Líquido biológico [Refr.] Ayuno mínimo de 6 h	mg/dL No se dispone de valores de referencia. Valorar a criterio clínico.
CT **COLESTEROL TOTAL, SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Ayuno mínimo de 6 h	Inf 200,00 mg/dL
CV **COLESTEROL VLDL, SUERO**	Cálculo.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Ayuno mínimo de 6 h	VLDL: Inf 30,00 mg/dL Triglicéridos: Inf 150,00 mg/dL
CHO **COLINESTERASA PSEUDOCOLINESTERASA, SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 3 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 3 mL Plasma Heparina litio (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Hombres 4620,00 - 11500,00 U/L Mujeres 3930,00 - 10800,00 U/L
G15209 **COLORRECTAL EXTENDIDO, NEOPLASIA · PANEL · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	12	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	Se informa para cada paciente *56* AKT1, ALK, APC, AR, ARID1A, BRAF, BRIP1, CTNNB1, EGFR, EML4/ALK, EPCAM, EPHB2, ERBB2, ERBB3, ESR1, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FOXL2, GNA11, GNAQ, GNAS, HRAS, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, MAP2K1, MAP2K2, MET, MLH1, MSH2, MSH6, MSI, MTOR, MYC, NRAS, NTRK1, NTRK2, NTRK3, PDGFRA, PIK3CA, PMS2, POLD1, POLE, PTEN, RAD50, RAF1, RB1, RET, RNF43, ROS1, SMAD4, SMARCA4, TMB, TP53
G14138 **COLORRECTAL HEREDITARIO, CÁNCER · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	15	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Se informa para cada paciente APC, ATM, AXIN2, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, EPCAM, EPCAM, FAN1, GALNT12 [Región 3'SCG5] , GREM1, MLH1, MLH3, MSH2, MSH3, MSH6, MUTYH, NTHL1, PMS2, POLD1, POLE, PTEN, RNF43, RPS20, SCG5, SMAD4, STK11, TP53

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G14007 **COLORRECTAL NO POLIPÓSICO HEREDITARIO (SD. DE LYNCH) , CÁNCER · PANEL · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2	*5*
G14008 **COLORRECTAL NO POLIPÓSICO HEREDITARIO (SD. DE LYNCH), CÁNCER · PANEL A · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	15	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	MLH1, MSH2, MSH6, PMS2	*4*
G2024 **COLORRECTAL NO POLIPÓSICO HEREDITARIO, CÁNCER · MLH1 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	MLH1	*1*
G2029 **COLORRECTAL NO POLIPÓSICO HEREDITARIO, CÁNCER · MLH1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	15	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	MLH1	*1*
G2015 **COLORRECTAL NO POLIPÓSICO HEREDITARIO, CÁNCER · MLH1, MSH2 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Indispensable remitir informe clínico y consentimiento informado.	MLH1, MSH2	*2*
G2025 **COLORRECTAL NO POLIPÓSICO HEREDITARIO, CÁNCER · MSH2 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	MSH2	*1*
G2026 **COLORRECTAL NO POLIPÓSICO HEREDITARIO, CÁNCER · MSH2 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	15	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	MSH2	*1*
G2028 **COLORRECTAL NO POLIPÓSICO HEREDITARIO, CÁNCER · MSH6 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	15	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	MSH6	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G14092 **COLORRECTAL NO POLIPÓSICO HEREDITARIO, CÁNCER · MSH6, EPCAM · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	EPCAM, MSH6	*2*
G14010 **COLORRECTAL NO POLIPÓSICO HEREDITARIO, CÁNCER · PANEL B · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	15	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	APC, AXIN2, BMPR1A, CDH1, CHEK2, GALNT12, GREM1, MLH1, MUTYH, NTHL1, POLD1, POLE, PTEN, RPS20, SMAD4, STK11, TP53	*17*
G14098 **COLORRECTAL NO POLIPÓSICO HEREDITARIO, CÁNCER · PMS2 (EXONES 12-15) · SANGER**	Secuenciación Sanger	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PMS2 [exones 12,13,14,15]	*1*
G9512 **COLORRECTAL NO POLIPÓSICO HEREDITARIO, CÁNCER · PMS2 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PMS2	*1*
G14119 **COLORRECTAL NO POLIPÓSICO HEREDITARIO, CÁNCER · PMS2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PMS2	*1*
G14005 **COLORRECTAL NO POLIPÓSICO HEREDITARIO, CÁNCER · TGFBR2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TGFBR2	*1*
G14011 **COLORRECTAL POLIPÓSICO HEREDITARIO, CÁNCER · APC · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	APC	*1*
G2006 **COLORRECTAL POLIPÓSICO HEREDITARIO, CÁNCER · APC · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	15	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	APC	*1*
G14105 **COLORRECTAL POLIPÓSICO HEREDITARIO, CÁNCER · MUTYH · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	MUTYH	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G14104 **COLORRECTAL POLIPÓSICO HEREDITARIO, CÁNCER · MUTYH · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	15	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	MUTYH	*1*
G2031 **COLORRECTAL POLIPÓSICO, CÁNCER · APC, MUTYH · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	15	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	APC, MUTYH	*2*
G07002 **COMPLEJO I, DEFICIENCIA DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FOXRED1, NDUFA1, NDUFA11, NDUFAF1, NDUFAF2, NDUFAF3, NDUFAF4, NDUFAF5, NDUFB11, NDUFB3, NDUFB9, NDUFS1, NDUFS2, NDUFS3, NDUFS4, NDUFS6, NDUFV1, NDUFV2, NUBPL	*19*
G07003 **COMPLEJO II, DEFICIENCIA DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SDHA, SDHAF1, SDHD	*3*
G07004 **COMPLEJO III, DEFICIENCIA DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BCS1L, CYC1, TTC19, UQCRC2, UQCRQ	*5*
G07005 **COMPLEJO IV, DEFICIENCIA DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	COX10, COX14, COX20, COX6B1, COX8A, FASTKD2, PET100, SCO1, TACO1	*9*
G07006 **COMPLEJO V, DEFICIENCIA DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ATP5A1, ATP5E, ATPAF2, TMEM70	*4*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
CCRM **COMPLEJOS DE LA CADENA RESPIRATORIA MITOCONDRIAL (ENFERMEDADES MITOCONDRIALES), FIBROBLASTOS**	Espectrometría.	90	Rec. 1 Muestra/s Cultivo de Fibroblastos en piel Biopsia de cara ineterna del brazo desinfectada con alcohol de 96ºC. Enviar biopsia en tubo de rosca con cierre hermético y medio de cultivo estéril. Condiciones de obtención: No congelar la muestra. Debe recibirse en el laboratorio en un plazo de 24-48 horas tras su obtención.	
CIQA **COMPLEMENTO C1 ESTERASA INHIBIDOR ACTIVIDAD, PLASMA**	Técnica Cromogénica.	4	Rec. 1 mL Plasma Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) [Cong.]	70,00 - 130,00 %
C1IE **COMPLEMENTO C1 ESTERASA INHIBIDOR, SUERO**	Nefelometría.	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	21,00 - 39,00 mg/dL
C1Q **COMPLEMENTO C1Q, SUERO**	Nefelometría.	5	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	15,70 - 30,60 mg/dL
CC2 **COMPLEMENTO C2, SUERO**	Turbidimetría.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	1,09 - 2,45 mg/dL Límite de cuantificación: 0,23 mg/dL
C3A **COMPLEMENTO C3 PROACTIVADOR (PROPERDINA FACTOR B), SUERO**	Nefelometría - Turbidimetría.	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	23,40 - 53,30 mg/dL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
C3LB **COMPLEMENTO C3, LÍQUIDO BIOLÓGICO**	Turbidimetría.	2	Rec. 0.5 mL Líquido sinovial [Refr.]	
C3 **COMPLEMENTO C3, SUERO**	Turbidimetría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	90,00 - 180,00 mg/dL
C4LB **COMPLEMENTO C4, LÍQUIDO BIOLÓGICO**	Turbidimetría.	2	Rec. 0.5 mL Líquido sinovial [Refr.]	
C4 **COMPLEMENTO C4, SUERO**	Turbidimetría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	10,00 - 40,00 mg/dL
C5 **COMPLEMENTO C5, SUERO**	Nefelometría.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	9,02 - 16,70 mg/dL
C5B9 **COMPLEMENTO C5B-9, PLASMA**	Inmunofluorescencia directa.	21	Rec. 2.7 mL Plasma Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) [Cong.] Venopunción en condiciones de esterilidad; centrifugación de la sangre total a 2500 rpm durante 15 minutos para obtener plasma pobre en plaquetas.	Normal: Inf 1,50 % Indeterminado: 1,50 - 2,00 % Positivo: Sup 2,00 % Nota: % de superficie cubierta por c5b9 determinada por microscopía de fluorescencia. Multiplicativo respecto al control en números absolutos.
COM7 **COMPLEMENTO C7, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	30	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	70,00 - 130,00 %

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G03132 **COMPLICACIONES MICROVASCULARES DE LA DIABETES TIPO 6, SUSCEPTIBILIDAD A · SOD2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SOD2	*1*
G9551 **CONDRODISPLASIA METAFISARIA TIPO SCHMID · COL10A1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	COL10A1	*1*
G08014 **CONDRODISPLASIA PUNCTATA RIZOMÉLICA TIPO 1 · PEX7 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PEX7	*1*
G14015 **CONDROSARCOMA · EXT1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	EXT1	*1*
G06061 **CONDUCTOS MULLERIANOS PERSISTENTES 1, SÍNDROME DE · AMH · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AMH	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
COBZP **CONFIRMACIÓN BENZODIACEPINAS (LC-MS/MS), CABELLO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	10	Rec. 1 g Cabello	Confirmación de 7-amino-Clonazepam en cabello: Valor de corte recomendado por la EDWTS, 2022: 0,05 pg/mg Confirmación de 7-amino Flunitrazepam en cabello: Valor de corte recomendado por la EDWTS, 2022: 0,05 pg/mg Confirmación de Alprazolam en cabello: Valor de corte recomendado por la EDWTS, 2022: 0,05 pg/mg Confirmación de Clonazepam en cabello: Valor de corte recomendado por la EDWTS, 2022: 0,05 pg/mg Confirmación de Diazepam en cabello: Valor de corte recomendado por la EDWTS, 2022: 0,05 pg/mg Confirmación de Flunitrazepam en cabello: Valor de corte recomendado por la EDWTS, 2022: 0,05 pg/mg Confirmación de Lorazepam en cabello: Valor de corte recomendado por la EDWTS, 2022: 0,05 pg/mg Confirmación de Nordiazepam en cabello: Valor de corte recomendado por la EDWTS, 2022: 0,05 pg/mg Confirmación de Oxazepam en cabello: Valor de corte recomendado por la EDWTS, 2022: 0,05 pg/mg Confirmación de Zolpidem en cabello: Valor de corte recomendado por la EDWTS, 2022: 0,05 pg/mg
G00115 **CONFIRMACIÓN DE CNV · ddPCR**	Digital droplet PCR (ddPCR)	35	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	
G00116 **CONFIRMACIÓN DE CNV ADICIONAL · ddPCR**	Digital droplet PCR (ddPCR)	35	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
CODROCA **CONFIRMATORIO DROGAS, CABELLO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	10	Rec. 1 g Cabello (1 x Kit específico)	Confirmación de anfetamina en cabello : Valor de corte recomendado: 254,00 pg/mg Confirmación de Benzoilecgonina en cabello : Valor de corte recomendado: Negativo: Inf 98,00 pg/mg Confirmación de Benzoilecgonina en cabello : Valor de corte recomendado: Positivo: Sup= 98,00 pg/mg : Valor de corte recomendado: 60,00 pg/mg Confirmación de Cocaina en cabello : Valor de corte recomendado: Negativo: Inf 610,00 pg/mg Confirmación de Cocaina en cabello : Valor de corte recomendado: Positivo: Sup= 610,00 pg/mg Confirmación de MDA en cabello : Valor de corte recomendado: 244,00 pg/mg Confirmación de MDEA en cabello : Valor de corte recomendado: 240,00 pg/mg Confirmación de MDMA en cabello : Valor de corte recomendado: 246,00 pg/mg Confirmación de metanfetamina en cabello: Valor de corte recomendado: 255,00 pg/mg
CONT1S **CONTACTINA 1 ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunocitoquímica.	22	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo
G11036 **CONTRACTURA CONGÉNITA LETAL TIPO 5, SÍNDROME DE · DNM2 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	DNM2 *1*
G11125 **CONTRACTURAL CONGÉNITO LETAL, SÍNDROME · DNM2 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	DNM2 *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G08123 **CONTRACTURAS CONGÉNITAS (INLUYENDO MIASTENIA) · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ACTA1, ADCY6, AGRN, ALG14, ALG2, ALG3, ASCC1, BIN1, CHAT, CHMP1A, CHRNA1, CHRNB1, CHRND, CHRNE, CHRNG, CHST14, CNTN1, COLQ, DNM2, DOK7, DPAGT1, ECEL1, EGR2, ERBB3, ERCC1, ERCC5, ERCC6, EXOSC3, FBN1, FBN2, FHL1, FKBP10, FKTN, FLVCR2, GBE1, GFPT1, GLE1, GMPPB, KAT6B, KLHL41, LAMB2, LMNA, LRP4, MUSK, MYBPC1, MYH2, MYH3, MYH8, NALCN, NEB, PIEZO2, PIP5K1C, PLEC, PLOD2, PLOD3, PREPL, PSMB8, RAPSN, RIPK4, SCARF2, SCN4A, SKI, SLC39A13, SLC5A7, SYT2, TNNI2, TNNT1, TNNT3, TPM2, TPM3, UBA1, VIPAS39, VPS33B, ZC4H2, ZMPSTE24 *75*
G08122 **CONTRACTURAS CONGÉNITAS · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ACTA1, ADCY6, ALG3, ASCC1, BIN1, CHAT, CHMP1A, CHRNA1, CHRNB1, CHRND, CHRNE, CHRNG, CHST14, CNTN1, COLQ, DNM2, DOK7, ECEL1, EGR2, ERBB3, ERCC1, ERCC5, ERCC6, EXOSC3, FBN1, FBN2, FHL1, FKBP10, FKTN, FLVCR2, GBE1, GLE1, KAT6B, KLHL41, LMNA, MUSK, MYBPC1, MYH2, MYH3, MYH8, NALCN, NEB, PIEZO2, PIP5K1C, PLOD2, PLOD3, PSMB8, RAPSN, RIPK4, SCARF2, SKI, SLC39A13, TNNI2, TNNT1, TNNT3, TPM2, TPM3, UBA1, VIPAS39, VPS33B, ZC4H2, ZMPSTE24 *62*
CAIREBH **CONTROL DE AIRE (ESTUDIO DE BACTERIAS Y HONGOS)**	Cultivo en medios selectivos y diferenciales	7	Rec. 1 Muestra/s Aire	
CAIREB1 **CONTROL DE AIRE 1 (ESTUDIO DE BACTERIAS)**	Cultivo en medios selectivos y diferenciales	7	Rec. 1 Muestra/s Aire	
CAIREH1 **CONTROL DE AIRE 1 (ESTUDIO DE HONGOS)**	Cultivo en medios selectivos y diferenciales	7	Rec. 1 Muestra/s Aire	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
BRU **COOMBS BRUCELLA, SUERO**	Aglutinación	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	- Títulos inferior o igual 1/80: Resultado no significativo. - Título 1/160: Contacto con Brucella por enfermedad o sensibilización profesional, o reactividad inespecífica frente a otros microorganismos. Valorar el significado con los datos clínicos y epidemiológicos. - Titulos superior o igual 1/320: Resultado significativo. Descartar enfermedad crónica con otras pruebas complementarias (Hemocultivo o PCR).
COOD **COOMBS DIRECTO, SANGRE TOTAL**	Aglutinación de Partículas.	1	Rec. 1 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo
QAIR **COOMBS INDIRECTO (TITULACION E IDENTIFICACION), SANGRE TOTAL**	Aglutinación	6	Rec. 3 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 3 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No se detecta Titulación Ac Irregulares: Título Se informa para cada paciente
COOI **COOMBS INDIRECTO, SANGRE TOTAL**	Aglutinación de Partículas.	1	Rec. 1 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo
CPTN **COPEPTINA, PLASMA**	Quimioluminiscencia.	25	Rec. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.]	Copeptina: Osmolaridad 270-280 mOsm/Kg 0,81 - 11,60 pmol/L Copeptina: Osmolaridad 281-285 mOsm/Kg 1,00 - 13,70 pmol/L Copeptina: Osmolaridad 286-290 mOsm/Kg 1,50 - 15,30 pmol/L Copeptina: Osmolaridad 291-295 mOsm/Kg 2,30 - 24,50 pmol/L Copeptina: Osmolaridad 296-300 mOsm/Kg 2,40 - 28,20 pmol/L
HFC **COPROCULTIVO**	Cultivo en medios generales, de enriquecimiento y/o específicos	3	Rec. 1 mL Heces [Refr.] Se recomienda enviar al laboratorio en las 24 horas tras la recogida.	Negativo

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G7307 **COPROPORFIRIA HEREDITARIA · CPOX · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CPOX *1*
G03103 **COPROPORFIRIA HEREDITARIA · CPOX · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CPOX *1*
G01011 **CORAZÓN-MANO TIPO ESLOVENIA, SÍNDROME DE · LMNA · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	LMNA *1*
G11277 **COREA BENIGNA HEREDITARIA · NKX2-1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	NKX2-1 *1*
VCMLPC **CORIOMENINGITIS LINFOCÍTICO VIRUS (LCMV) RNA, MUESTRA BIOLOGICA**	Nested-PCR.	12	Rec. 1 mL Líquido biológico (1 x Tubo estéril) [Cong.] Alt. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Alt. 1 mL Líquido amniótico (1 x Tubo estéril) [Cong.] Alt. 1 mL LCR (1 x Tubo estéril) [Cong.] IMPRESCINDIBLE: Adjuntar resúmen de la historia clínica.	No se detecta
G08094 **CORNELIA DE LANGE 1, SÍNDROME DE · NIPBL · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	NIPBL *1*
G08125 **CORNELIA DE LANGE, SÍNDROME DE · SMC1A · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SMC1A *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
SARS2GAB **CORONAVIRUS SARS COV-2 ANTICUERPOS IgG (CMIA-Cuantitativo), SUERO**	Inmunoanálisis quimioluminiscente de micropartículas (CMIA)	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Determinación frente a proteína S del virus SARS-CoV-2 El cálculo del resultado se ha adaptado con arreglo al estándar internacional publicado por la OMS (diciembre 2020). http://www.who.int/publications/m/item/WHO-BS-2020.2403 Negativo: Inf 7,10 BAU/mL Positivo: Sup= 7,10 BAU/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
RNCO **CORONAVIRUS SARS COV-2 RNA**	PCR-Real Time.	1	Rec. 1 Muestra/s Exudado nasal [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Exudado faringeo [Refr.] ·Nacional: Se aconseja envío en medio de transporte Viral Vircell (Ref. LD0115). En caso de no disponer de medio de transporte, enviar en escobillón seco. ·Internacional: Envío en medio de transporte Viral Vircell (Ref. LD0115). Imprescindible enviar la muestra en bolsa naranja y contenedor de bioseguridad PATHOPACK (Ref. 027829). Estabilidad de la muestra: ·Viral Vircell: 72 h refrigerado. 7 días congelado. ·Escobillón seco: 48 h refrigerado. 7 días congelado. Se requiere peticionario específico.	RNA Coronavirus SARS-CoV-2: Negativo
RNCOLB **CORONAVIRUS SARS COV-2 RNA, LAVADO BUCAL**	PCR-Real Time.	1	Rec. 2 mL Lavado bucal	Negativo

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
RNCOSA				
CORONAVIRUS SARS COV-2 RNA, SALIVA	PCR-Real Time.	1	Rec. 2 mL Saliva (1 x Kit específico) Consideraciones previas: - Limpiar de residuos la cavidad bucal bebiendo agua 30 minutos antes de la toma de muestra - No comer, beber, fumar o mascar chicle durante ese tiempo - Es importante asegurarse que la muestra tomada es saliva y no esputo - Una vez realizada la toma de la muestra conservarla a temperatura ambiente hasta su recogida. Las muestras deben llegar al laboratorio en un plazo máximo de 24h desde su recogida. Instrucciones para la toma de muestra: - El paciente deberá acumular saliva en la boca. La producción de saliva puede ser estimulada pensando en sus comidas favoritas o estimulando las mejillas y el paladar con la lengua. - Depositar la saliva en el dispositivo a través del embudo y asegurarse de que no se crean burbujas, soplando o dando pequeños toques en el	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
			dispositivo. - Repetir las veces que sean necesarias hasta la obtención de 2mL de muestra. Existen unas marcas de medida le ayudarán a saber hasta donde debe llegar la muestra. - Retirar el embudo por el que se ha introducido la muestra y cerrar el tubo con el tapón que se adjunta en el kit.	
CRTTS **CORTACTINA ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunoblot.	17	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	No se detecta
CTCSTB **CORTICOSTERONA (COMPUESTO B), SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	9	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.]	Ambos 0 - 1 Meses 0,05 - 7,29 ng/mL Ambos 1 - 12 Meses 0,10 - 5,61 ng/mL Ambos 1 - 4 Años 0,23 - 1,36 ng/mL Ambos 4 - 6 Años 0,35 - 1,50 ng/mL Ambos 6 - 15 Años 0,16 - 3,35 ng/mL Ambos 15 - 18 Años 0,31 - 5,55 ng/mL Hombres Sup - 18 Años 0,60 - 14,77 ng/mL Mujeres Sup - 18 Años 0,62 - 23,16 ng/mL
COR10 **CORTISOL (10'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 10 m [Refr.]	µg/dL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
COR15 **CORTISOL (15'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 15 m. [Refr.]	µg/dL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
COR150 **CORTISOL (150'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero -15 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	µg/dL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba.
COR20 **CORTISOL (20'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 20 m. [Refr.]	µg/dL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
COR240 **CORTISOL (240'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 240 m. [Refr.]	µg/dL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
COR30 **CORTISOL (30'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 30 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	µg/dL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
COR45 **CORTISOL (45'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 45 m. [Refr.]	µg/dL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
COR60 **CORTISOL (60'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 60 m. [Refr.]	µg/dL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
COR90 **CORTISOL (90'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 90 m. [Refr.]	µg/dL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
COR120 **CORTISOL (120'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 120 m. [Refr.]	µg/dL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
COSAL12 **CORTISOL (12H), SALIVA**	Quimioluminiscencia.	6	Rec. 1 mL Saliva 12 h (1 x Salivette) [Cong.] Rechazo: Muestras contaminadas con sangre.	ng/mL Interpretación según criterio clínico
COSAL16 **CORTISOL (16H), SALIVA**	Quimioluminiscencia.	6	Rec. 1 mL Saliva 16 h (1 x Salivette) [Cong.] Rec. 1 mL Saliva (1 x Salivette) [Cong.] Rechazo: Muestras contaminadas con sangre.	Inf 3,14 ng/mL
COR180 **CORTISOL (180'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 180 m. [Refr.]	µg/dL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
CORS20H **CORTISOL (20H), SALIVA**	Quimioluminiscencia.	6	Rec. 1 mL Saliva 20 h (1 x Salivette) [Cong.]	Inf 3,22 ng/mL
COS23H **CORTISOL (23H), SALIVA**	Quimioluminiscencia.	6	Rec. 1 mL Saliva 23 h (1 x Salivette) [Cong.] Rechazo: Muestras contaminadas con sangre.	ng/mL Interpretación según criterio clínico
COSAL24 **CORTISOL (24H), SALIVA**	Quimioluminiscencia.	6	Rec. 1 mL Saliva 24 h (1 x Salivette) [Cong.] Rechazo: Muestras contaminadas con sangre.	Inf 1,08 ng/mL
COSAL6 **CORTISOL (6H), SALIVA**	Quimioluminiscencia.	6	Rec. 1 Muestra/s Saliva 6 h (1 x Salivette) [Refr.] Rechazo: Muestras contaminadas con sangre.	Inf 3,88 ng/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
COSAL8 **CORTISOL (8H), SALIVA**	Quimioluminiscencia.	6	Rec. 1 mL Saliva 8 h (1 x Salivette) [Cong.] Rechazo: Muestras contaminadas con sangre.	Inf 8,03 ng/mL
CLMI **CORTISOL LIBRE, ORINA / CREATININA**	Radioinmunoanálisis.	4	Rec. 10 mL Orina [Cong.] No acidificar.	Excreción (creatinina): Hombres 0 - 2 Años 3,00 - 120,00 µg/g creat Excreción (creatinina): Mujeres 0 - 2 Años 3,00 - 120,00 µg/g creat Excreción (creatinina): Mujeres 3 - 8 Años 2,20 - 89,00 µg/g creat Excreción (creatinina): Hombres 3 - 8 Años 2,20 - 89,00 µg/g creat Excreción (creatinina): Hombres 9 - 12 Años 1,40 - 56,00 µg/g creat Excreción (creatinina): Mujeres 9 - 12 Años 1,40 - 56,00 µg/g creat Excreción (creatinina): Mujeres 13 - 17 Años 1,00 - 42,00 µg/g creat Excreción (creatinina): Hombres 13 - 17 Años 1,00 - 42,00 µg/g creat Excreción (creatinina): Mujeres Sup - 18 Años 0,70 - 85,00 µg/g creat Excreción (creatinina): Hombres Sup - 18 Años 1,00 - 119,00 µg/g creat Creatinina en orina : mg/dL Interpretación según criterio clínico
CLUR **CORTISOL LIBRE, ORINA 24H**	Radioinmunoanálisis.	4	Rec. 10 mL Orina 24h. (alícuota) (1 x Contenedor 2500 mL.) [Cong.] No acidificar.	Excreción (24h): 30,00 - 197,00 nmol/24 h Volumen de orina remitido (diuresis): 600,00 - 1600,00 mL
CORO **CORTISOL TOTAL, ORINA 24H**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 10 mL Orina 24h. (alícuota) (1 x Contenedor 2500 mL.) [Refr.]	Cortisol total en orina de 24 horas: 4,30 - 176,00 µg/24 h Volumen de orina remitido (diuresis): 600,00 - 1600,00 mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
CORDE **CORTISOL TRAS DEXAMETASONA, SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	µg/dL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
COSAL **CORTISOL, SALIVA**	Quimioluminiscencia.	6	Rec. 1 mL Saliva (1 x Salivette) [Cong.] Rechazo: Muestras contaminadas con sangre. Kit especifico Salivette.	1,13 - 8,03 ng/mL
COR **CORTISOL, SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Toma de muestras entre las 8 h y 9 h de la mañana Ritmo circadiano: Este parámetro biológico tiene un ritmo circadiano (concentración máxima en la mañana), con una amplitud suficientemente significativas como para tener una influencia significativa en la interpretación clínica	3,70 - 19,40 µg/dL Despues de las 17:00 2,90 - 17,30 µg/dL
PLACOR **CORTISONA, PLASMA**	Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectrometría de masas.	21	Rec. 1 mL Plasma Heparina litio (1 x Tubo sangre heparina litio) [Cong.]	0,60 - 3,50 µg/dL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ADIF **CORYNEBACTERIUM DIPHTERIAE ANTICUERPOS IGG, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Protección a largo plazo.: Sup 1,00 UI/mL Protección inmune existente, pero se recomienda vacunar.: 0,01 - 0,10 UI/mL Protección básica: 0,10 - 1,00 UI/mL Sin protección: Inf 0,01 UI/mL
G01153 **COSTELLO, SÍNDROME DE · HRAS · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	HRAS *1*
COTI **COTININA (METABOLITO DE LA NICOTINA), ORINA**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Orina [Refr.]	Fumadores Sup= 500,00 µg/L No Fumadores Inf 500,00 µg/L
COTIS **COTININA (METABOLITO DE LA NICOTINA), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Fumadores Sup= 25,00 ng/mL No Fumadores Inf 25,00 ng/mL
G14016 **COWDEN, SÍNDROME DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	15	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AKT1, KLLN, PIK3CA, SDHB, SDHD, SEC23B *6*
QCOA **COXIELLA BURNETTI ANTICUERPOS IgA (FIEBRE Q) (FASE I + II), SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Ac Coxiella burnetti IgA fase I: Interpretación: Negativo: Inf 1/12 Ac Coxiella burnetti IgA fase I: Interpretación: Positivo: Sup= 1/12 Ac Coxiella burnetti IgA fase II: Interpretación: Negativo: Inf 1/12 Ac Coxiella burnetti IgA fase II: Interpretación: Positivo: Sup= 1/12
CXGL **COXIELLA BURNETTI ANTICUERPOS IgG (FIEBRE Q) (FASE I + II), LCR**	Inmunofluorescencia Indirecta.	8	Rec. 1 mL LCR (1 x Tubo Polipropileno) [Refr.]	Ac Coxiella fase II IgG: Interpretación: Negativo: Inf 1/2 Ac Coxiella fase II IgG: Interpretación: Positivo: Sup= 1/2 Ac Coxiella fase I IgG: Interpretación: Negativo: Inf 1/2 Ac Coxiella fase I IgG: Interpretación: Positivo: Sup= 1/2

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
QCOG **COXIELLA BURNETTI ANTICUERPOS IgG (FIEBRE Q) (FASE I + II), SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Ac Coxiella burnetti IgG fase II: Interpretación: Negativo: Inf 1/64 Ac Coxiella burnetti IgG fase II: Interpretación: Positivo: Sup= 1/64 Ac Coxiella burnetti IgG fase I: Interpretación: Negativo: Inf 1/64 Ac Coxiella burnetti IgG fase I: Interpretación: Positivo: Sup= 1/64 Si fase II Sup Fase I: Sugestivo de infección aguda Si fase II Inf Fase I: Sugestivo de infección crónica o convaleciente
CBIIG **COXIELLA BURNETTI ANTICUERPOS IgG (FIEBRE Q) (FASE II), SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/128 Interpretación: Positivo: Sup= 1/128
QCOL **COXIELLA BURNETTI ANTICUERPOS IgM (FIEBRE Q) (FASE I + II), LCR**	Inmunofluorescencia Indirecta.	8	Rec. 1 mL LCR (1 x Tubo Polipropileno) [Refr.]	Ac Coxiella fase II IgM: Negativo: Inf 1/2 Ac Coxiella fase II IgM: Positivo: Sup= 1/2 Ac Coxiella fase I IgM: Negativo: Inf 1/2 Ac Coxiella fase I IgM: Positivo: Sup= 1/2
QCOM **COXIELLA BURNETTI ANTICUERPOS IgM (FIEBRE Q) (FASE I + II), SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Ac Coxiella burnetti IgM fase II: Interpretación: Negativo: Inf 1/12 Ac Coxiella burnetti IgM fase II: Interpretación: Positivo: Sup= 1/12 Ac Coxiella burnetti IgM fase I: Interpretación: Negativo: Inf 1/12 Ac Coxiella burnetti IgM fase I: Interpretación: Positivo: Sup= 1/12
CBIIM **COXIELLA BURNETTI ANTICUERPOS IgM (FIEBRE Q) (FASE II), SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/64 Interpretación: Positivo: Sup= 1/64

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
DNCB **COXIELLA BURNETTI DNA, SANGRE TOTAL**	Nested-PCR.	5	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Si la infección cursa con meningoencefalitis se podría detectar en LCR, pero no es la muestra más recomendada (Mandar congelado. Estabilidad: 1 semana) Muestra alternativa: Abceso (tejido)	No se detecta
CXAG **COXSACKIE A ANTICUERPOS IgG , SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Ac Coxsackie A16 IgG: Negativo: Inf 1/100 Ac Coxsackie A24 IgG: Negativo: Inf 1/100 Ac Coxsackie A7 IgG: Negativo: Inf 1/100 Ac Coxsackie A9 IgG: Negativo: Inf 1/100
CXAM **COXSACKIE A ANTICUERPOS IgM , SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Ac Coxsackie A16 IgM: Negativo: Inf 1/10 Ac Coxsackie A24 IgM: Negativo: Inf 1/10 Ac Coxsackie A7 IgM: Negativo: Inf 1/10 Ac Coxsackie A9 IgM: Negativo: Inf 1/10
COXBA **COXSACKIE B (SEROTIPOS 1-6) ANTICUERPOS IgA, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/10 Interpretación: Positivo: Sup= 1/10
COXG **COXSACKIE B (SEROTIPOS 1-6) ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/100
COXBC **COXSACKIE B (SEROTIPOS 1-6) ANTICUERPOS IgM, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/10 Interpretación: Positivo: Sup= 1/10

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G08015 **CRANEOSINOSTOSIS (EXTENDIDO) · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CYP26B1, EFNB1, ERF, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FREM1, GLI3, IL11RA, MSX2, RAB23, TCF12, TWIST1, ZIC1 *14*
G08138 **CRANEOSINOSTOSIS (BÁSICO) · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	EFNB1, FGFR1, FGFR3, MSX2, TWIST1
G4122 **CRANEOSINOSTOSIS · FGFR1 (exón 7), FGFR2 (exón 7), FGFR3 (exones 7,9) · HOT SPOT**	Hot Spot	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FGFR1 [7] , FGFR2 [7] , FGFR3 [7, 9] *3*
G08016 **CRANEOSINOSTOSIS 1 · TWIST1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TWIST1 *1*
G08017 **CRANIOFACIAL-SORDERA-MANO, SÍNDROME DE · PAX3 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PAX3 *1*
G08018 **CRANIOSINOSTOSIS NO ESPECÍFICA · FGFR2 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FGFR2 *1*
CKMB **CREATINA QUINASA MB (CK-MB)**	Enzimático.	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Inf 24,00 U/L
CRTO **CREATINA, ORINA 24H**	Espectrometría.	6	Rec. 1 mL Orina 24h. (alícuota) (1 x Contenedor 2500 mL.) [Refr.]	Excreción (24h): Inf 250,00 mg/24 h Volumen de orina remitido (diuresis): 600,00 - 1600,00 mL
CRTN **CREATINA, SUERO**	Espectrometría.	7	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Hombres 0,17 - 0,69 mg/dL Mujeres 0,35 - 0,93 mg/dL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
CTI **CREATININA , SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Ayuno de 3 horas.	Ambos 0 - 30 Días 0,31 - 0,98 mg/dL Ambos 30 - 365 Días 0,16 - 0,39 mg/dL Ambos 1 - 12 Años 0,26 - 0,77 mg/dL Hombres Sup - 12 Años 0,67 - 1,17 mg/dL Mujeres Sup - 12 Años 0,51 - 0,95 mg/dL	
CRLB **CREATININA, LÍQUIDO BIOLÓGICO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Líquido biológico [Refr.]	mg/dL Interpretación según criterio clínico	
CREOR **CREATININA, ORINA**	Colorimétrico.	1	Rec. 1 mL Orina [Refr.]	mg/dL Interpretación según criterio clínico	
CREO **CREATININA, ORINA 24H**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Orina 24h. (alícuota) (1 x Contenedor 2500 mL.) [Refr.]	Excreción (24h): Hombres 1000,00 - 2000,00 mg/24h Excreción (24h): Mujeres 800,00 - 1800,00 mg/24h Volumen de orina remitido (diuresis): 600,00 - 1600,00 mL	
G03007 **CREATININA, TRASTORNOS DE · GAMT, GATM · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GAMT, GATM	*2*
G01012 **CREATININFOSFOQUINASA, ELEVACIÓN EN SUERO DE · CAV3 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CAV3	*1*
CPK **CREATINQUINASA TOTAL (CK NAC), SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Hombres Inf 171,00 U/L Mujeres Inf 145,00 U/L	
G4120 **CREUTZFELD-JACOB, ENFERMEDAD · PRNP (E200K) · HOT SPOT**	Hot Spot	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PRNP [E200K]	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G11302 **CREUTZFELD-JACOB, ENFERMEDAD DE · PRNP · A. FRAGMENTOS**	Análisis de Fragmentos	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Indicado en informe adjunto PRNP	*1*
G11223 **CREUTZFELD-JACOB, ENFERMEDAD DE · PRNP · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PRNP	*1*
G1018 **CRI DU CHAT, SÍNDROME DE · 5p15.2 · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	[5p15.2]	*1*
G05018 **CRIGLER-NAJJAR/GILBERT, SÍNDROME DE · UGT1A1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	UGT1A1	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
CRIOA **CRIOAGLUTININAS, SUERO**	Aglutinación de Partículas.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 1 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Extracción y preparación de la muestra: - Calentar a 37 ºC el material de extracción y los tubos. - Extracción 1 tubo sangre EDTA y 1 tubo suero. - Inmediatamente tras la extracción poner el tubo de suero a 37 ºC (baño o estufa) hasta la retracción del coágulo (30 - 60 minutos) - Centrifugar el suero a temperatura ambiente. - Separar el suero. - Envío: refrigerado suero y sangre EDTA. EVITAR CAMBIOS DE TEMPERATURA DURANTE EL TRANSPORTE	Negativo
CRIO **CRIOGLOBULINAS, SUERO**	Precipitación.	10	Rec. 2 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Técnica de producción IN SITU. En caso de no ser posible, consultar con el laboratorio.	Negativo
CRYP **CRIPTOSPORIDIUM ANTIGENO, HECES**	Inmunocromatografía.	2	Rec. 5 g Heces (1 x Recipiente estéril) [Refr.]	Negativo

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
CRIS **CRISTALES, MUESTRA BIOLOGICA**	Microscopia óptica por luz polarizada.	3	Rec. 5 mL Líquido sinovial [Refr.] Liquido Sinovial refrigerado, enviar la totalidad de la muestra a ser posible. En caso de ser alícuota, homogeneizar previamente la muestra.	Ausencia
AGCR **CROMO, AGUA**	Absorción atómica.	15	Rec. 100 mL Agua (1 x Envase aséptico) [Refr.] Alt. 100 mL Agua (1 x Envase aséptico) (<2 Ác.nítrico)	Agua de diálisis Inf 0,01 mg/L Agua de red Inf 0,05 mg/L
CRO **CROMO, ORINA FINAL JORNADA**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	5	Rec. 10 mL Orina final jornada (1 x Contenedor 25 mL.) [Refr.]	VLB®-INSST: Exposición a compuestos de Cromo (VI): Inf 7,50 µg/L Límite de cuantificación: 0,80 µg/L
CROM **CROMO, SUERO**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	4	Rec. 1 mL Suero (libre trazas metales) (1 x Tubo Suero metales traza) [Refr.] Final de la jornada laboral.	Valores interpretativos: Prótesis e implantes No existe desgaste: Inf= 5,00 µg/L Valores interpretativos: Prótesis e implantes Riesgo de desgaste:: Sup 5,00 µg/L Límite de cuantificación: 0,80 - 0,8 µg/L
CROMO **CROMOGRANINA A, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Separar y congelar antes de las 3 horas después de la extracción.	Inf 108,00 ng/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
CGB **CROMOGRANINA B, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	16	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	Inf 1,50 ng/mL NOTA: Determinación realizada mediante un procedimiento EIA de tipo RUO. Los valores reportados tienen carácter orientativo. Límite orientativo: Inf 18 ng/mL	
G13004 **CROMOSOMA 1 · CKS1B (1p32), CDKN2C (1q21) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	CDKN2C [1q21] , CKS1B [1p32]	2
G06030 **CROMOSOMA 1 · SUBTELÓMEROS · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.		

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G13016 **CROMOSOMA 2 · ALK(2p23) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	ALK [2p23] *1*
G06041 **CROMOSOMA 2 · SUBTELÓMEROS · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G7037 **CROMOSOMA 4 · FIP1L1/CHIC2/PDGFR ALFA (4q12) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	FIP1L1/CHIC2/PDGFR ALFA [4q12] *1*
G06046 **CROMOSOMA 4 · SUBTELÓMEROS · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G13022 **CROMOSOMA 5 · PDGFRB(5q32) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	PDGFRB [5q33] *1*
G06047 **CROMOSOMA 5 · SUBTELÓMEROS · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G13023 **CROMOSOMA 6 · MYB (6q22-q23) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	MYB [6q22-q23] *1*
G06048 **CROMOSOMA 6 · SUBTELÓMEROS · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G13024 **CROMOSOMA 7 · KMT2E (7q22), CUL1 (7q36) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	CUL1 [7q36] , KMT2E [7q22]	*2*
G06049 **CROMOSOMA 7 · SUBTELÓMEROS · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.		

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G13025 **CROMOSOMA 8 · C-MYC (8q24) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	C-MYC [8q24] *1*
G13026 **CROMOSOMA 8 · FGFR1(8p11) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	FGFR1 [8p11] *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G06050 **CROMOSOMA 8 · SUBTELÓMEROS · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.		
G13048 **CROMOSOMA 9 · CDKN2A (9p21.3), CDKN2B (9p21.3) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	CDKN2A [9p21.3] , CDKN2B [9p21.3]	2

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G06051 **CROMOSOMA 9 · SUBTELÓMEROS · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	
G06031 **CROMOSOMA 10 · SUBTELÓMEROS · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G7049 **CROMOSOMA 11 · ATM (11q22) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	ATM [11q22]	*1*
G13047 **CROMOSOMA 11 · BIRC3(11q22.2) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	BIRC3 [11q22.2]	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G13051 **CROMOSOMA 11 · MLL (11q23) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	MLL [11q23] *1*
G06032 **CROMOSOMA 11 · SUBTELÓMEROS · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G13007 **CROMOSOMA 12 · ETV6(TEL)(12p13) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	ETV6(TEL) [12p13] *1*
G13008 **CROMOSOMA 12 · GLI (12q13) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	GLI [12q13] *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G06033 **CROMOSOMA 12 · SUBTELÓMEROS · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.		
G13009 **CROMOSOMA 13 · DLEU1 (13q14) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	DLEU1 [13q14]	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G06034 **CROMOSOMA 13 · SUBTELÓMEROS · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	
G13010 **CROMOSOMA 14 · IGH (14q32) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	IGH [14q32] *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G06035 **CROMOSOMA 14 · SUBTELÓMEROS · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.		
G7155 **CROMOSOMA 14 · TCL1A (14q32) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	TCL1A [14q32]	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G06036 **CROMOSOMA 15 · SUBTELÓMEROS · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	
G13011 **CROMOSOMA 16 · CBFB (16q21-22) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	CBFB [16q21-22] *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G06037 **CROMOSOMA 16 · SUBTELÓMEROS · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	
G13012 **CROMOSOMA 17 · RARA(17q21) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	RARA [17q21] *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G06038 **CROMOSOMA 17 · SUBTELÓMEROS · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	
G7015 **CROMOSOMA 17 · TP53 (17p13) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	TP53 [17p13] *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G13014 **CROMOSOMA 18 · BCL2(18q21.3) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	BCL2 [18q21.3] *1*
G13015 **CROMOSOMA 18 · MALT1(18q21) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	MALT1 [18q21] *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G06039 **CROMOSOMA 18 · SUBTELÓMEROS · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	
G06040 **CROMOSOMA 19 · SUBTELÓMEROS · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G7005 **CROMOSOMA 20 · PTPRT (20q12) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	Se informa para cada paciente *1* PTPRT [20q12]
G06042 **CROMOSOMA 20 · SUBTELÓMEROS · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G06054 **CROMOSOMA 21 · DSCR4 (21q22) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	DSCR4 [21q22] *1*
G06043 **CROMOSOMA 21 · SUBTELÓMEROS · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	
G06044 **CROMOSOMA 22 · SUBTELÓMEROS · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G13018 **CROMOSOMA 3 · BCL6 (3q27.3) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	BCL6 [3q27.3] *1*
G13019 **CROMOSOMA 3 · EVI1(3q26.2) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	EVI1 [3q26.2] *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G06045 **CROMOSOMA 3 · SUBTELÓMEROS · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.		
G7010 **CROMOSOMA 5 · EGR1 (5q31), RSP14 (5q33) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	EGR1 [5q31] , RSP14 [5q33]	2

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G7006 **CROMOSOMA 7 · MET(7q31) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	MET [(7q31)] *1*
G13124 **CROMOSOMA 9 · JAK2 (9p24)· FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	JAK2 [9p24] *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G06053 **CROMOSOMA Y · SRY(Yp11.2) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	SRY [Yp11.2] *1*
G13134 **CROMOSOMA 11 · CCND1(BCL1)(11Q13) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	CCND1(BCL1) [11q13] *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G06052 **CROMOSOMAS X,Y · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	
G06029 **CROMOSOMAS X,Y · SUBTELÓMEROS · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
CTX **CROSSLAPS (CTX), PLASMA**	Quimioluminiscencia.	4	Rec. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Obtener la muestra a primera hora de la mañana, en ayunas. Centrifugar y separar el plasma en alícuota. Remitir refrigerado.	Postmenopausia Mujeres 0,18 - 1,02 µg/L Premenopausia Mujeres 0,14 - 0,69 µg/L Hombres 0 - 29 Años 0,24 - 1,02 µg/L Mujeres 0 - 29 Años 0,15 - 0,97 µg/L Mujeres 30 - 39 Años 0,15 - 0,64 µg/L Hombres 30 - 39 Años 0,23 - 0,94 µg/L Hombres 40 - 49 Años 0,18 - 0,80 µg/L Mujeres 40 - 49 Años 0,13 - 0,67 µg/L Mujeres 50 - 59 Años 0,18 - 1,06 µg/L Hombres 50 - 59 Años 0,16 - 0,74 µg/L Hombres 60 - 69 Años 0,13 - 0,75 µg/L Mujeres 60 - 69 Años 0,17 - 0,97 µg/L Mujeres Sup - 70 Años 0,15 - 0,86 µg/L Hombres Sup - 70 Años 0,12 - 0,78 µg/L	
G08019 **CROUZON CON ACANTOSIS NÍGRICANS, SÍNDROME DE · FGFR3 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FGFR3	*1*
G08096 **CROUZON, SÍNDROME DE · FGFR2 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FGFR2	*1*
G08095 **CROUZON, SÍNDROME DE · FGFR2(8,10) · HOT SPOT**	Hot Spot	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FGFR2 [8,10]	*1*
AGCLCR **CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS ANTIGENO, LCR**	Inmunocromatografía.	2	Rec. 1 mL LCR [Refr.] Interferencia con presencia de leucocitos, plaquetas, fibrina u otros contaminantes.	Negativo	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
CRIPT **CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS ANTIGENO, SUERO**	Inmunocromatografía.	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Interferencia con presencia de leucocitos, plaquetas, fibrina u otros contaminantes.	Negativo
DNCN **CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS DNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	Nested-PCR.	7	Rec. 1.5 mL Sangre total EDTA [Refr.] Alt. 1 mL LCR [Refr.] Alt. 1 mL Humor vitreo/acuoso [Refr.]	* Esta prueba tiene una sensiblidad del 99% y una especificidad del 98%. : No se detecta
DNACRIH **CRYPTOSPORIDIUM SPP DNA, HECES**	PCR-Real Time.	3	Rec. 5 g Heces (1 x Recipiente estéril) [Refr.]	No se detecta
G8004 **CUANTIFICACIÓN DE CD34 EN LEUCOAFÉRESIS Y SANGRE PERIFÉRICA**	Citometría de flujo.	2	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) Rec. 1 Muestra/s Aféresis EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) - Realizar la extracción únicamente de lunes a miércoles laborables. Festivos y vísperas consultar. Se debe avisar de la extracción para coordinar entrega urgente al departamento.	
CR2 **CUERPOS REDUCTORES (MUESTRA 2), HECES**	Colorimétrico.	2	Rec. 1 g Heces 2a muestra [Refr.]	Negativo

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
CR3 **CUERPOS REDUCTORES (MUESTRA 3), HECES**	Colorimétrico.	2	Rec. 1 g Heces 3a muestra [Refr.]	Negativo
CR **CUERPOS REDUCTORES, HECES**	Colorimétrico.	2	Rec. 1 g Heces [Refr.]	Interpretación: Negativo
ASTT **CULTIVO (BACTERIAS + HONGOS), ASPIRADO TRAQUEAL**	Cultivo en medios generales, de enriquecimiento y/o específicos	7	Rec. 1 Muestra/s Aspirado traqueal (1 x Contenedor estéril) [Refr.]	Bacterias: Negativo Hongos: Negativo
VBIL **CULTIVO (CON SALMONELLA Y ANAEROBIOS), LÍQUIDO BILIAR**	Cultivo en medios selectivos y diferenciales	5	Rec. 1 mL Secreción biliar [Refr.]	
EC157 **CULTIVO [E COLI O157:H7], HECES**	Cultivo en medios selectivos y diferenciales	5	Rec. 1 mL Heces [Refr.]	
CULAN **CULTIVO ANAEROBIO, MUESTRA BIOLÓGICA**	Cultivo en medios selectivos y diferenciales	5	Rec. 1 mL Líquido biológico [Refr.]	
CDH1 **CULTIVO CLOSTRIDIUM, HECES**	Cultivo en medios selectivos y diferenciales	3	Rec. 2 g Heces [Refr.]	
CONS1 **CULTIVO CONTROL SUPERFICIE**	Cultivo en medios selectivos y diferenciales	7	Rec. 1 Muestra/s Superficie de contacto [Refr.]	
LEGAG **CULTIVO DE LEGIONELLA, AGUA**	Cultivo en medios generales, de enriquecimiento y/o específicos	12	Rec. 1000 mL Agua (1 x Envase estéril con tiosulfato)	Negativo

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
CHP **CULTIVO HELICOBACTER PYLORI**	Cultivo en medios específicos de Agar Pylori	20	Rec. 1 Muestra/s Biopsia gástrica (1 x Contenedor estéril) [Refr.] La biopsia se debe introducir en un medio de transporte semisólido. Recomendamos portagem-pylori (referencia MM30-20) (SOLICITAR VIALES ESPECIALES DE RECOGIDA DE MUESTRA).	No se detecta
MICO **CULTIVO MICOLOGICO**	Cultivo micológico en medios generales o específicos.	30	Rec. 1 Muestra/s Uña Rec. 1 mL Líquido biológico [Refr.]	Se informa para cada paciente
PMICO2 **CULTIVO MICOLOGICO (2a MUESTRA)**	Cultivo micológico en medios generales o específicos.	30	Rec. 1 Muestra/s Uña [Refr.] Rec. 1 mL Líquido biológico [Refr.]	
PMICO3 **CULTIVO MICOLOGICO (3a MUESTRA)**	Cultivo micológico en medios generales o específicos.	30	Rec. 1 Muestra/s Uña [Refr.] Rec. 1 mL Líquido biológico [Refr.]	
PMICO4 **CULTIVO MICOLOGICO (4a MUESTRA)**	Cultivo micológico en medios generales o específicos.	30	Rec. 1 Muestra/s Uña Rec. 1 mL Líquido biológico [Refr.]	
CUL2 **CULTIVO MUESTRAS BIOLÓGICAS/IDENTIFICACIÓN 2ª**	Cultivo en medios generales, de enriquecimiento y/o específicos	3	Rec. 1 Muestra/s Exudado [Refr.]	Se informa para cada paciente

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
LOW **CULTIVO MYCOBACTERIUM/LOWENSTEIN**	Cultivo bacteriológico en medios específicos.	60	Rec. 5 mL Esputo [Refr.] Rec. 5 mL BAS [Refr.] Rec. 5 mL BAL [Refr.] Rec. 10 mL Orina [Refr.]	Se informa para cada paciente
PLOW1L **CULTIVO MYCOBACTERIUM/LOWENSTEIN EN MEDIO LÍQUIDO, MUESTRA BIOLOGICA**	Cultivo bacteriológico en medios específicos.	37	Rec. 1 mL Líquido biológico [Refr.]	Se informa para cada paciente
LOW2 **CULTIVO MYCOBACTERIUM/LOWESTEIN (2 MUESTRAS)**	Cultivo bacteriológico en medios específicos.	47	Rec. 5 mL Esputo [Refr.] Rec. 5 mL BAS [Refr.] Rec. 5 mL BAL [Refr.] Rec. 10 mL Orina [Refr.]	Lowestein muestra 1: Se informa para cada paciente Lowestein muestra 2: Se informa para cada paciente
LOW3 **CULTIVO MYCOBACTERIUM/LOWESTEIN (3 MUESTRAS)**	Cultivo bacteriológico en medios específicos.	47	Rec. 5 mL Esputo [Refr.] Rec. 5 mL BAS [Refr.] Rec. 5 mL BAL [Refr.] Rec. 10 mL Orina [Refr.]	Lowestein muestra 1: Se informa para cada paciente Lowestein muestra 2: Se informa para cada paciente Lowestein muestra 3: Se informa para cada paciente
MYC **CULTIVO MYCOPLASMA / UREAPLASMA**	Cultivo bacteriológico en medios específicos.	3	Rec. 1 Muestra/s Frotis (Medio especial para Mycoplasma)[Refr.] Vol. mín: 200 ul de esperma, orina o hisopo uretral / vaginal con medio de transporte (o hisopo en medio especial para Mycoplasma)	Se informa para cada paciente Mediante la técnica del cultivo bacteriológico, no puede descartarse la presencia de Mycoplasma genitalium, por lo que en caso de sospecha se recomienda su diagnóstico mediante técnicas moleculares. Un resultado positivo para Mycoplasma hominis y/o Ureaplasma spp puede ser interpretado como colonización del tracto genital. Valorar según clínica y factores de riesgo del paciente
MYC2 **CULTIVO MYCOPLASMA / UREAPLASMA (2a MUESTRA)**	Cultivo bacteriológico en medios específicos.	3	Rec. 1 Muestra/s Frotis (Medio especial para Mycoplasma)[Refr.]	
ER **CULTIVO RECTAL PARA ESTREPTOCOCO GRUPO B**	Cultivo bacteriológico en medios específicos.	3	Rec. 1 Muestra/s Exudado rectal (1 x Escobillón con medio de transporte.) [Refr.]	Se informa para cada paciente

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
EVRSB **CULTIVO VAGINAL + RECTAL PARA ESTREPTOCOCO GRUPO B**	Cultivo bacteriológico en medios específicos.	3	Rec. 1 Muestra/s Exudado vaginal (1 x Escobillón con medio de transporte.) [Refr.]	Se informa para cada paciente
EVSB **CULTIVO VAGINAL PARA ESTREPTOCOCO GRUPO B**	Cultivo bacteriológico en medios específicos.	3	Rec. 1 Muestra/s Exudado vaginal (1 x Escobillón con medio de transporte.) [Refr.]	Se informa para cada paciente
ABC **CULTIVO, ABSCESO**	Cultivo en medios generales, de enriquecimiento y/o específicos	5	Rec. 1 Muestra/s Exudado (1 x Escobillón con medio de transporte.) Rec. 1 Muestra/s Absceso (1 x Escobillón con medio de transporte.)	
ASP **CULTIVO, ASPIRADO PULMONAR/BRONQUIAL**	Cultivo en medios generales, de enriquecimiento y/o específicos	7	Rec. 1 mL Aspirado bronquial [Refr.]	
DREN **CULTIVO, DRENAJE QUIRÚRGICO**	Cultivo en medios generales, de enriquecimiento y/o específicos	5	Rec. 1 Muestra/s Líquido drenaje [Refr.]	
QESC **CULTIVO, ESPUTO**	Cultivo en medios generales, de enriquecimiento y/o específicos	7	Rec. 2 mL Esputo [Refr.]	Esputo (bacterias): Negativo Esputo (hongos): Negativo
QES2 **CULTIVO, ESPUTO (2a MUESTRA)**	Cultivo en medios generales, de enriquecimiento y/o específicos	7	Rec. 2 mL Esputo [Refr.]	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
QES3 **CULTIVO, ESPUTO (3a MUESTRA)**	Cultivo en medios generales, de enriquecimiento y/o específicos	7	Rec. 2 mL Esputo [Refr.]	
CULPI **CULTIVO, ESTUDIO DE COLONIZACIÓN**	Cultivo en medios selectivos y diferenciales	5	Rec. 1 Muestra/s Exudado rectal (1 x Escobillón con medio de transporte.) Rec. 1 Muestra/s Exudado nasal (1 x Escobillón con medio de transporte.) Rec. 1 Muestra/s Exudado faringeo (1 x Escobillón con medio de transporte.)	
BENDC **CULTIVO, EXUDADO ENDOCERVICAL**	Cultivo en medios generales, de enriquecimiento y/o específicos	5	Rec. 1 Muestra/s Exudado endocervical (1 x Escobillón con medio de transporte.) [Refr.]	Se informa para cada paciente
EFC **CULTIVO, EXUDADO FARÍNGEO**	Cultivo en medios generales, de enriquecimiento y/o específicos	3	Rec. 1 Muestra/s Exudado faringeo (1 x Escobillón con medio de transporte.)	
QOTI **CULTIVO, EXUDADO OTICO**	Cultivo en medios generales, de enriquecimiento y/o específicos	7	Rec. 1 Muestra/s Frotis (1 x Escobillón con medio de transporte.) [Refr.]	
OTI2 **CULTIVO, EXUDADO OTICO (2a MUESTRA)**	Cultivo en medios generales, de enriquecimiento y/o específicos	7	Rec. 1 mL Frotis (1 x Escobillón con medio de transporte.) [Refr.]	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ERG **CULTIVO, EXUDADO RECTAL**	Cultivo bacteriológico en medios específicos.	4	Rec. 1 mL Exudado rectal (1 x Escobillón con medio de transporte para anaerobios.) [Refr.] Si la solicitud está relacionada con el descarte de Streptococcus agalactiae, solicitar cultivos específicos para Estreptococo del Grupo B: - ER: CULTIVO RECTAL PARA ESTREPTOCOCO GRUPO B - EVRSB: CULTIVO VAGINAL + RECTAL PARA ESTREPTOCOCO GRUPO B	
UMB **CULTIVO, EXUDADO UMBILICAL**	Cultivo en medios generales, de enriquecimiento y/o específicos	4	Rec. 1 Muestra/s Exudado [Refr.]	
BEUC **CULTIVO, EXUDADO URETRAL**	Cultivo en medios generales, de enriquecimiento y/o específicos	3	Rec. 1 Muestra/s Exudado uretral [Refr.]	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
BEVC **CULTIVO, EXUDADO VAGINAL**	Cultivo en medios generales, de enriquecimiento y/o específicos	4	Rec. 1 Muestra/s Exudado vaginal (1 x Escobillón con medio de transporte.) [Refr.] Si la solicitud está relacionada con el descarte de Streptococcus agalactiae, solicitar cultivos específicos para Estreptococo del Grupo B: - EVSB: CULTIVO VAGINAL PARA ESTREPTOCOCO GRUPO B - EVRSB: CULTIVO VAGINAL + RECTAL PARA ESTREPTOCOCO GRUPO B	Se informa para cada paciente
BEVUL **CULTIVO, EXUDADO VULVAR**	Cultivo en medios generales, de enriquecimiento y/o específicos	3	Rec. 1 Muestra/s Exudado vulvar [Refr.]	Se informa para cada paciente
BGLAN **CULTIVO, GLANDE**	Cultivo en medios generales, de enriquecimiento y/o específicos	3	Rec. 1 Muestra/s Exudado genital [Refr.]	
EHC **CULTIVO, HERIDA**	Cultivo en medios generales, de enriquecimiento y/o específicos	5	Rec. 1 Muestra/s Exudado de herida [Refr.]	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
CUHQ **CULTIVO, HERIDA QUIRÚRGICA**	Cultivo en medios generales, de enriquecimiento y/o específicos	5	Rec. 1 Muestra/s Herida quirurgica (1 x Escobillón con medio de transporte.) [Refr.]	
BAL **CULTIVO, LAVADO BRONCOALVEOLAR**	Cultivo en medios generales, de enriquecimiento y/o específicos	7	Rec. 1 mL Lavado broncoalveolar [Refr.]	
LCRC **CULTIVO, LCR**	Cultivo en medios generales, de enriquecimiento y/o específicos	5	Rec. 1 mL LCR [Refr.]	Negativo
CULLEM2 **CULTIVO, LECHE MATERNA**	Cultivo en medios generales, de enriquecimiento y/o específicos	5	Rec. 1 mL Leche materna [Refr.] Si el envio supera las 24H, remitir la muestra congelada	
ELL **CULTIVO, LENGUA/BOCA**	Cultivo en medios generales, de enriquecimiento y/o específicos	3	Rec. 1 Muestra/s Frotis lingual (1 x Escobillón con medio de transporte.) [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Frotis bucal (1 x Escobillón con medio de transporte.) [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Exudado (1 x Escobillón con medio de transporte.) [Refr.]	
LART **CULTIVO, LÍQUIDO ARTICULAR (SINOVIAL)**	Cultivo en medios generales, de enriquecimiento y/o específicos	5	Rec. 1 mL Líquido articular (1 x Contenedor estéril) [Refr.]	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
LASC **CULTIVO, LÍQUIDO ASCÍTICO**	Cultivo en medios generales, de enriquecimiento y/o específicos	5	Rec. 1 mL Líquido ascítico [Refr.]	
LPCA **CULTIVO, LÍQUIDO PERICÁRDICO**	Cultivo en medios generales, de enriquecimiento y/o específicos	5	Rec. 1 mL LÍquido pericárdico [Refr.]	
LPER **CULTIVO, LÍQUIDO PERITONEAL**	Cultivo en medios generales, de enriquecimiento y/o específicos	5	Rec. 1 mL Líquido peritoneal [Refr.]	
LPLC **CULTIVO, LÍQUIDO PLEURAL**	Cultivo en medios generales, de enriquecimiento y/o específicos	5	Rec. 1 mL Líquido pleural [Refr.]	
MO **CULTIVO, MÉDULA ÓSEA**	Cultivo en medios generales, de enriquecimiento y/o específicos	5	Rec. 1 Muestra/s Médula ósea [Refr.]	
BBP **CULTIVO, MUESTRA BALANOPREPUCIAL**	Cultivo en medios generales, de enriquecimiento y/o específicos	3	Rec. 1 Muestra/s Muestra balanoprepucial (1 x Escobillón con medio de transporte.) [Refr.]	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
CULTI **CULTIVO, MUESTRA BIOLÓGICA**	Cultivo en medios generales, de enriquecimiento y/o específicos	5	Rec. 1 Muestra/s Frotis lingual (1 x Escobillón con medio de transporte.) [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Frotis bucal (1 x Escobillón con medio de transporte.) [Refr.] Rec. 1 mL Líquido biológico (1 x Tubo estéril) [Refr.]	Se informa para cada paciente
CULSO2 **CULTIVO, PRÓTESIS ARTICULARES**	Sonicación + Cultivo en medios generales, de enriquecimiento y/o específicos	10	Rec. 1 Pieza/s Prótesis articular (1 x Recipiente estéril) [Refr.]	Se informa para cada paciente
CATET **CULTIVO, PUNTA DE CATÉTER**	Cultivo en medios generales, de enriquecimiento y/o específicos	5	Rec. 1 Muestra/s Catéter [Refr.]	
EC **CULTIVO, SECRECIÓN CONJUNTIVAL**	Cultivo en medios generales, de enriquecimiento y/o específicos	4	Rec. 1 Muestra/s Exudado conjuntival [Refr.]	
EC2 **CULTIVO, SECRECIÓN CONJUNTIVAL (2a MUESTRA)**	Cultivo en medios generales, de enriquecimiento y/o específicos	4	Rec. 1 Muestra/s Exudado conjuntival [Refr.]	
EN **CULTIVO, SECRECIÓN NASAL**	Cultivo en medios generales, de enriquecimiento y/o específicos	3	Rec. 1 Muestra/s Secreción nasal [Refr.]	
EN2 **CULTIVO, SECRECIÓN NASAL (2a MUESTRA)**	Cultivo en medios generales, de enriquecimiento y/o específicos	3	Rec. 1 Muestra/s Secreción nasal [Refr.]	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
BSEM **CULTIVO, SEMEN**	Cultivo en medios generales, de enriquecimiento y/o específicos	5	Rec. 1 Muestra/s Semen [Refr.]	Negativo
BENDO **CULTIVO, TEJIDO ENDOMETRIAL**	Cultivo en medios generales, de enriquecimiento y/o específicos	5	Rec. 1 Muestra/s Toma endometrial (1 x Recipiente estéril) [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Toma endometrial (1 x Escobillón con medio de transporte.) [Refr.]	Se informa para cada paciente
G01013 **CUTIS LAXA · ELN · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ELN *1*
G02008 **CUTIS LAXA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ALDH18A1, ATP6V0A2, ATP7A, EFEMP2, ELN, FBLN5, LTBP4, PYCR1, RIN2, SLC2A10 *10*
G02009 **CUTIS LAXA AD TIPO 2 · FBLN5 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FBLN5 *1*
G02010 **CUTIS LAXA AR TIPO IIA · ATP6V0A2 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ATP6V0A2 *1*
G02011 **CUTIS LAXA AR TIPO TIPO IA · FBLN5 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FBLN5 *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
CYFRA **CYFRA 21.1 (MARCADOR TUMORAL DE PULMON), SUERO**	Quimioluminiscencia.	6	Rec. 1 mL Suero [Refr.]	En caso de cirrosis hepática o insuficiencia renal también puede observarse una concentración superior al intervalo de referencia Inf= 2,37 ng/mL
CY21LP **CYFRA 21.1 EN LÍQUIDO PLEURAL**	Quimioluminiscencia.	6	Rec. 1 mL Líquido pleural [Refr.]	ng/mL Interpretación según criterio clínico
DIME **D DÍMEROS, PLASMA**	Inmunoturbidimetría.	1	Rec. 1 mL Plasma Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) [Refr.]	Inf 500,00 ng/mL
DR2LC **D2R ANTICUERPOS (RECEPTOR 2 DOPAMINA), LCR**	Inmunofluorescencia Indirecta en células transfectadas	14	Rec. 0.5 mL LCR [Refr.] - Se precisa resumen de la historia clínica del paciente.	Negativo
DR2SU **D2R ANTICUERPOS (RECEPTOR 2 DOPAMINA), SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta en células transfectadas	14	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo
G01014 **DEFECTO ATRIOVENTRICULAR TIPO 4 · GATA4 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GATA4 *1*
G01015 **DEFECTO DEL SEPTO ATRIAL TIPO 2 · GATA4 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GATA4 *1*
G01016 **DEFECTO DEL SEPTO ATRIAL TIPO 5 · ACTC1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ACTC1 *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G01017 **DEFECTO DEL SEPTO VENTRICULAR TIPO 1 · GATA4 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GATA4 *1*
G11174 **DEFICIENCIA AISLADA DE SULFITO OXIDASA · SUOX · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SUOX *1*
G03151 **DEFICIENCIA CARBAMOIL-FOSFATO SINTETASA 1 · CPS1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CPS1 *1*
G03133 **DEFICIENCIA COMBINADA CONGÉNITA DE HORMONAS PITUITARIAS · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	HESX1, LHX3, LHX4, OTX2 , POU1F1, PROP1 *6*
G15126 **DEFICIENCIA EN RECOMBINACIÓN HOMÓLOGA (HRD) · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	12	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	[MSI, TMB, Inestabilidad Genómica (GIS)] , ATM, ATR, BARD1, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDK12, CHEK1, CHEK2, FANCA, FANCC, FANCE, FANCG, FANCL, InestabilidadGenómica(GIS), MSI, NBN, PALB2, PTEN, RAD50, RAD51, RAD51B, RAD51C, RAD51D, RAD54L, TMB, TP53
G12016 **DEGENERACIÓN MACULAR RELACIONADA CON LA EDAD TIPO 3 · FBLN5 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FBLN5 *1*
DHESS16 **DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA) (16h), SALIVA**	Enzimoinmunoanálisis	1	Rec. 1 mL Saliva 16 h (1 x Tubo sin aditivos) [Cong.] No usar Salivetes	Interpretación según criterio clínico
DHEA20 **DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA) (20'), SUERO**	Radioinmunoanálisis.	3	Rec. 1 mL Suero 20 m. [Refr.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
DHESS22 **DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA) (22h), SALIVA**	Enzimoinmunoanálisis	1	Rec. 1 mL Saliva 22 h (1 x Tubo sin aditivos) [Cong.] No usar Salivetes	pg/mL Interpretación según criterio clínico
DHES24H **DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA) (24 H'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	
DHE30 **DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA) (30'), SUERO**	Radioinmunoanálisis.	3	Rec. 1 mL Suero 30 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
DHE60 **DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA) (60'), SUERO**	Radioinmunoanálisis.	3	Rec. 1 mL Suero 60 m. [Refr.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
DHESS6 **DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA) (6h), SALIVA**	Enzimoinmunoanálisis	1	Rec. 1 mL Saliva 6 h (1 x Tubo sin aditivos) [Cong.] No usar Salivetes	pg/mL Interpretación según criterio clínico
DHEA **DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA) , SUERO**	Radioinmunoanálisis.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Adultos Hombres 1,87 - 15,01 ng/mL Adultos Mujeres 1,65 - 13,50 ng/mL Mujeres 6 - 9 Años 0,18 - 1,89 ng/mL Hombres 6 - 9 Años 0,13 - 1,87 ng/mL Mujeres 10 - 11 Años 1,12 - 2,24 ng/mL Hombres 10 - 11 Años 0,31 - 2,05 ng/mL Hombres 12 - 14 Años 0,83 - 2,58 ng/mL Mujeres 12 - 14 Años 0,98 - 3,60 ng/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
DESA **DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA), SALIVA**	Enzimoinmunoanálisis	10	Rec. 1 mL Saliva (1 x Tubo sin aditivos) [Cong.] No usar Salivetes Rechazo: Muestras contaminadas con sangre. Durante los 30 minutos antes de obtener la muestra de saliva no ingiera alimentos, no beba, no fume ni mastique chicle.	A.M (Anterior a mediodía) Mujeres 14 - 39 Años 101,00 - 687,00 pg/mL P.M (Posterior a mediodía) Mujeres 14 - 39 Años 46,00 - 406,00 pg/mL P.M (Posterior a mediodía) Hombres 16 - 39 Años 83,60 - 457,00 pg/mL A.M (Anterior a mediodía) Hombres 16 - 39 Años 117,00 - 747,00 pg/mL A.M (Anterior a mediodía) Hombres 40 - 76 Años 58,00 - 480,00 pg/mL P.M (Posterior a mediodía) Hombres 40 - 76 Años 48,00 - 262,00 pg/mL P.M (Posterior a mediodía) Mujeres 40 - 85 Años 39,00 - 198,00 pg/mL A.M (Anterior a mediodía) Mujeres 40 - 85 Años 68,00 - 397,00 pg/mL
DHES10 **DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO (DHEAS) (10'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 10 m [Refr.]	µmol/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
DHES-15 **DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO (DHEAS) (-15'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero -15 m. [Refr.]	µmol/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
DHES20 **DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO (DHEAS) (20'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 20 m. [Refr.]	µmol/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
DHES30 **DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO (DHEAS) (30'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 30 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	µmol/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
DHES45 **DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO (DHEAS) (45'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 45 m. [Refr.]	µmol/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
DHES60 **DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO (DHEAS) (60'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 60 m. [Refr.]	µmol/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
DHES90 **DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO (DHEAS) (90'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 90 m. [Refr.]	µmol/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
DHES120 **DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO (DHEAS) (120'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 120 m. [Refr.]	µmol/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
SDHE12 **DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO (DHEAS) (12h), SALIVA**	Enzimoinmunoanálisis	7	Rec. 1 mL Saliva 12 h (1 x Salivette) [Cong.] Rechazo: Muestras contaminadas con sangre.	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
SDHE16 **DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO (DHEAS) (16h), SALIVA**	Enzimoinmunoanálisis	7	Rec. 1 mL Saliva 16 h (1 x Salivette) [Cong.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
DHEA180 **DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO (DHEAS) (180'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 180 m. [Refr.]	µmol/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
DHES240 **DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO (DHEAS) (240'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 240 m. [Refr.]	µmol/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
DHEA24 **DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO (DHEAS) (24h'), SALIVA**	Enzimoinmunoanálisis	1	Rec. 1 mL Saliva 24 h (1 x Salivette) [Cong.]	0,20 - 2,70 ng/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
SDHE8 **DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO (DHEAS) (8h), SALIVA**	Enzimoinmunoanálisis	7	Rec. 1 mL Saliva 8 h (1 x Salivette) [Cong.] Rechazo: Muestras contaminadas con sangre.	Hombres 0,20 - 2,70 ng/mL Mujeres 0,20 - 2,50 ng/mL
SDHES **DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO (DHEAS), SALIVA**	Enzimoinmunoanálisis	7	Rec. 1 mL Saliva (1 x Salivette) [Cong.] No usar Salivetes Rechazo: Muestras contaminadas con sangre.	Hombres 0,20 - 2,70 ng/mL Mujeres 0,20 - 2,50 ng/mL
DHES **DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO (DHEAS), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Ambos 0 - 2 Meses 28,90 - 40,70 umol/L Ambos 2 - 6 Meses 0,65 - 15,60 umol/L Ambos 6 - 12 Meses 0,15 - 4,79 umol/L Ambos 1 - 6 Años 0,13 - 3,03 umol/L Ambos 6 - 9 Años 0,14 - 4,14 umol/L Ambos 9 - 13 Años 0,90 - 7,30 umol/L Ambos 13 - 16 Años 1,50 - 12,50 umol/L Mujeres 16 - 19 Años 3,96 - 15,50 umol/L Hombres 16 - 19 Años 3,36 - 18,20 umol/L Hombres 20 - 24 Años 6,50 - 14,60 umol/L Mujeres 20 - 24 Años 3,60 - 11,10 umol/L Mujeres 25 - 34 Años 2,60 - 13,90 umol/L Hombres 25 - 34 Años 4,60 - 16,10 umol/L Hombres 35 - 44 Años 3,80 - 13,10 umol/L Mujeres 35 - 44 Años 2,00 - 11,10 umol/L Mujeres 45 - 54 Años 1,50 - 7,70 umol/L Hombres 45 - 54 Años 3,70 - 12,10 umol/L Hombres 55 - 64 Años 1,30 - 9,80 umol/L Mujeres 55 - 64 Años 0,80 - 4,90 umol/L Mujeres 65 - 70 Años 0,90 - 2,10 umol/L Hombres 65 - 70 Años 6,20 - 7,70 umol/L Ambos Sup - 70 Años Inf 2,10 umol/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ADNB **DELTA 4 ANDROSTENDIONA, SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Postmenopausia Mujeres Inf 2,10 ng/mL Premenopausia Mujeres 0,40 - 3,40 ng/mL Hombres 2 - 6 Años Inf 0,29 ng/mL Mujeres 2 - 6 Años Inf 0,34 ng/mL Mujeres 7 - 11 Años Inf 2,41 ng/mL Hombres 7 - 11 Años Inf 0,74 ng/mL Mujeres 12 - 16 Años 0,42 - 3,41 ng/mL Hombres 12 - 16 Años 0,25 - 2,21 ng/mL Hombres 17 - 21 Años 0,44 - 2,65 ng/mL Mujeres 17 - 21 Años 0,70 - 4,31 ng/mL Hombres Sup - 21 Años 0,50 - 3,50 ng/mL
ADN30B **DELTA 4 ANDROSTENODIONA (30'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 30 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
ADN60B **DELTA 4 ANDROSTENODIONA (60'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 60 m. [Refr.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
ADN120B **DELTA 4 ANDROSTENODIONA (120') , SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 120 m. [Refr.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
ADN180B **DELTA 4 ANDROSTENODIONA (180') , SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 180 m. [Refr.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
G3054 **DELTA-BETA TALASEMIA · HBB · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	HBB *1*
G11037 **DEMENCIA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CHMP2B, CSF1R, DCTN1 , DNMT1, FUS, GRN, HNRNPA2B1, ITM2B, MAPT, PRNP, PSEN1, PSEN2, SIGMAR1, SQSTM1, TARDBP , TBK1 , TBP, TREM2, TYROBP, UBQLN2, VCP *21*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G3203 **DEMENCIA FRONTOTEMPORAL · GRN · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GRN *1*
AGVDNS1 **DENGUE VIRUS (ANTIGENO NS1), SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	4	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Muestra alternativa: plasma-EDTA.	La detección del antígeno NS1 se recomienda para el diagnóstico precoz de la fiebre del dengue. La muestra debe tomarse durante los días 1-7 después de la aparición de los síntomas. Un resultado negativo no excluye la infección si se toma la muestra después de esta fecha. En este caso, se recomienda la detección de anticuerpos IgM e IgG para el diagnóstico. Negativo: Inf 0,8 Índice Indeterminado: 0,80 - 1,10 Índice Positivo: Sup= 1,10 Índice
STVDEL **DENGUE VIRUS (DENV) RNA (SUBTIPADO), LCR**	PCR-Real Time.	12	Rec. 1 mL LCR [Cong.] Rechazo: Muestras refrigeradas por más de 24 horas	Se informa para cada paciente
STVDES **DENGUE VIRUS (DENV) RNA (SUBTIPADO), SUERO**	PCR-Real Time.	12	Rec. 5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Rechazo: Muestras refrigeradas por más de 24 horas	Se informa para cada paciente
RNDELC **DENGUE VIRUS (DENV) RNA, LCR**	PCR-Real Time.	12	Rec. 1 mL LCR [Cong.] Muestras refrigeradas por más de 24 horas	No se detecta
RNADEN **DENGUE VIRUS (DENV) RNA, SUERO**	PCR-Real Time.	12	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Alt. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo 5 mL.) [Cong.] Rechazo: Muestras refrigeradas por más de 24 horas	No se detecta

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
DENG **DENGUE VIRUS ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Inmunocromatografía.	4	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	En la infección primaria aparecen anticuerpos IgM a los 3-5 días desde el inicio aunque pueden detectarse incluso a los 8 meses de la infección. En la infección secundaria aparecen anticuerpos IgG pudiendo asímismo presentar reacciones cruzadas con otros flavivirus (fiebre amarilla, encefalitis J) son menos frecuentes con anticuerpos IgM que con anticuerpos IgG. Negativo
DENM **DENGUE VIRUS ANTICUERPOS IgM, SUERO**	Inmunocromatografía.	4	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	En la infección primaria aparecen anticuerpos IgM a los 3-5 días desde el inicio aunque pueden detectarse incluso a los 8 meses de la infección. En la infección secundaria aparecen anticuerpos IgG pudiendo asímismo presentar reacciones cruzadas con otros flavivirus (fiebre amarilla, encefalitis J) son menos frecuentes con anticuerpos IgM que con anticuerpos IgG. Negativo
G09018 **DENYS-DRASH, SÍNDROME DE · WT1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	WT1 *1*
G07019 **DEPLECIÓN DEL ADN MITOCONDRIAL, FORMA MIOPATÍCA, SÍNDROME DE · TK2 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TK2 *1*
G07007 **DEPLESIÓN MITOCONDRIAL · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AGK, DGUOK, FBXL4, MGME1, MPV17, OPA1, POLG, RRM2B, SLC25A4, SUCLA2, SUCLG1, TFAM, TK2, TWNK, TYMP *15*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
MIOS **DERMATOMIOSITIS - MIOSITIS (MDA5,TIF1,NXP2,SAE1,KU,MI2A, MI2B, PL12,PL7,SRP PM-SCL100,PM-SCL75, JO1,EJ,OJ,RO52) ANTICUERPOS , SUERO**	Inmunoblot.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Coagulación alterada Después de 24h horas de la obtención del suero, conservarlo congelado.	Ac EJ (glicil tRNA sintetasa): No se detecta Ac OJ (isoluecil tRNA sintetasa): No se detecta Anticuerpos Jo-1: No se detecta Anticuerpos KU: No se detecta Anticuepos MDA5 (CADM140): No se detecta Anticuerpos Mi2a: No se detecta Anticuerpos Mi2b: No se detecta Anticuerpos NXP2: No se detecta Anticuerpos TIF1-Gamma (P155): No se detecta Anticuerpos PL-12: No se detecta Anticuerpos PL-7: No se detecta Anticuerpos PM100: No se detecta Anticuerpos PM75: No se detecta Anticuerpos Ro-52: No se detecta Anticuerpos SAE1: No se detecta Anticuerpos SRP: No se detecta
G02012 **DERMATOPATÍA RESTRICTIVA · LMNA · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	LMNA *1*
G03172 **DESMIELINIZACIÓN CEREBRAL POR DEFICIENCIA DE METIONINA ADENOSILTRANSFERASA · MAT1A · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	MAT1A *1*
DPLO **DESOXIPIRIDINOLINA LIBRE, ORINA**	Quimioluminiscencia.	7	Rec. 1 mL Orina (segunda micción) (1 x Tubo 5 mL.) [Refr.] Segunda micción de la mañana.	Creatinina en orina : mg/dL Interpretación según criterio clínico Excreción (creatinina): Hombres 2,30 - 5,40 nmol/mmol Cr Excreción (creatinina): Mujeres 3,00 - 7,40 nmol/mmol Cr

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
TXPVSA **DETECCIÓN TOXINA DE PANTON VALENTINE (S. aureus), MUESTRA BIOLÓGICA**	Reacción en cadena de la polimerasa.	5	Rec. 1 Colonia/s Cepa Bacteriana (1 x Placa de cultivo) [Refr.] Rec. 1 Colonia/s Cepa Bacteriana (1 x Escobillón con medio de transporte.) [Refr.] El uso previo de antibióticos como la Clindamicina o el Linezolid inhabiliten la concentración de las toxinas de LPV (leucocidina de Panton-Valentine). Se acepta muestra de Cepa Bacteriana de S. aureus enviada en escobillón con medio de transporte (AMIES)	No se detecta
SRYD **DETERMINACIÓN PRESENCIA/AUSENCIA SRY · PCR**	Reacción en cadena de la polimerasa.	5	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Se informa para cada paciente
G19027 **DETOXIFICACIÓN HEPÁTICA, TEST GENÉTICO DE · PANEL · HOT SPOT**	Hot Spot (MassArray)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CAT, CDA, CFTR, COMT, CYP19A1, CYP1A1, CYP1A2, CYP1B1, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C19, CYP2C8, CYP2C9, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4, CYP3A5, CYP3A7, CYP4B1, CYP4F2, CYP8A1, DPYD, FMO1, GSTM1, GSTM3, GSTP1, GSTT1, MTHFR, NAT1, NAT2, OGG1, POR, SLC15A2, SLCO1B1, SOD1, SOD2, SULT1A1, SULT1A2, TBXAS1, TPMT, UGT1A1, UGT2B15
DEXAM **DEXAMETASONA, SUERO**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	7	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.]	50,00 - 265,00 ng/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
CODXOR **DEXTROPROPOXIFENO CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), ORINA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 1 mL Orina [Refr.]	Se utiliza como criterio de Positividad que la concentración sea superior o igual al valor del límite de cuantificación más el valor de incertidumbre del ensayo. En caso contrario, el resultado es Negativo. Incertidumbre de medida 3,3 ng/mL Límite de cuantificación 25 ng/mL
CODXSAI **DEXTROPROPOXIFENO CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SALIVA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 1 mL Saliva [Refr.]	Incertidumbre de medida 0,6 ng/mL Límite de cuantificación 2 ng/mL
16CODXSI **DEXTROPROPOXIFENO CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SANGRE**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 10 mL Sangre total Oxalato/Fluoruro (1 x Tubo Sangre Total-Oxalato/Fluoruro) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total Heparina litio (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Tubo oxalato potásico/Fluoruro sódico Ref. SAP 600088318	Incertidumbre de medida 0,3 ng/mL Valor de corte recomendado: 2,00 ng/mL
G03008 **DIABETES DE LA EDAD MADURA QUE SE PRESENTA EN EL JOVEN (MODY) · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABCC8, APPL1, BLK, CEL, GCK, HNF1A, HNF1B, HNF4A, INS, KCNJ11, KLF11, NEUROD1, PAX4, PDX1, RFX6 *15*
G03009 **DIABETES HEREDITARIA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABCC8, AKT2, ALMS1, BLK, CEL, CISD2, CP, DCAF17, EIF2AK3, FBP1, FOXP3, GATA6, GCK, GLIS3, GLUD1, HADH, HNF1A, HNF1B, HNF4A, IER3IP1 , INS, INSR, KCNJ11, KLF11, MNX1, NEUROD1, NEUROG3, PAX4, PAX6, PCBD1, PDX1, PGM1, PLIN1, POLD1, PPARG, PPP1R3A, PTF1A, RFX6, SLC16A1, SLC19A2, SLC29A2, SLC29A3, SLC2A2, UCP2, WFS1, ZFP57 *46*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G03152 **DIABETES INSÍPIDA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AQP2, AVP, AVPR2	*3*
G03101 **DIABETES INSÍPIDA CENTRAL HEREDITARIA · AVP · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AVP	*1*
G03084 **DIABETES INSÍPIDA NEFROGÉNICA · AQP2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AQP2	*1*
G03083 **DIABETES INSÍPIDA NEFROGÉNICA · AVPR2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AVPR2	*1*
G03010 **DIABETES MELLITUS · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABCC8, AKT2, GCK, HNF1B, PAX4, PPARG, PPP1R3A	*7*
G03011 **DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE 20 · HNF1A · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	HNF1A	*1*
G4051 **DIABETES MELLITUS NEONATAL · KCNJ11 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	KCNJ11	*1*
G03012 **DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE · ABCC8 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABCC8	*1*
G03013 **DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE · GCK · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GCK	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G03014 **DIABETES MELLITUS PERMANENTE NEONATAL · ABCC8 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABCC8	*1*
G03015 **DIABETES MELLITUS PERMANENTE NEONATAL · GCK · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GCK	*1*
G03016 **DIABETES MELLITUS PERMANENTE NEONATAL CON/SIN CARACTERISTICAS NEUROLÓGICAS · ABCC8 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABCC8	*1*
G03017 **DIABETES MELLITUS TRANSITORIA NEONATAL TIPO 2 · ABCC8 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABCC8	*1*
G03018 **DIABETES MELLITUS TRANSITORIA NEONATAL TIPO 3 · ABCC8 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABCC8	*1*
G03019 **DIABETES MELLITUS TRANSITORIA NEONATAL TIPO 3 · GCK · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GCK	*1*
G03020 **DIABETES NEONATAL · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABCC8, EIF2AK3, FOXP3, GATA6, GCK, GLIS3, IER3IP1 , INS, KCNJ11, MNX1, PCBD1, PDX1, PTF1A, RFX6, SLC2A2, ZFP57	*16*
G05005 **DIARREA CONGÉNITA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	DGAT1, EPCAM, GUCY2C, LCT, MYO5B, NEUROG3, SLC26A3, SPINT2	*8*
G08020 **DIASPLASIA DIASTRÓFICA · SLC26A2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SLC26A2	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
DIA **DIAZEPAM (VALIUM), SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.] -Dosis administrada, frecuencia y vía de administración La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis. Rechazo: Muestra hemolizada, lipémica y/o ictérica	I.Terapéutico: 100,00 - 2500,00 µg/L Conc.Tóxica: 3000,00 - 5000,00 µg/L Límite de cuantificación: 25,00 µg/L
DIBU **DIBUCAINA NUMERO, SUERO**	Espectrometría.	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Heterozigotos 30,00 - 75,00 % Homozigotos Inf 30,00 % Normal Sup 75,00 %
DICLOR **DICLOROBENCENO 1,2, SANGRE TOTAL**	Cromatografía de gases.	15	Rec. 10 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 140,00 µg/L
DICL **DICLOROMETANO, ORINA**	Cromatografía de Gases / Captura Electrónica.	10	Rec. 3 mL Orina final jornada (1 x Tubo 5 mL.) [Refr.]	BEIs® (ACGIH®): (Diclorometano) Inf 0,30 mg/L VLB®-INSST: Final de la jornada laboral (Diclorometano) Inf 0,30 mg/L Límite de cuantificación: Inf 0.05 mg/L
DICLS **DICLOROMETANO, SANGRE TOTAL**	Cromatografía de Gases / Captura Electrónica.	11	Rec. 3 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Muestreo: final de turno o jornada laboral	V. indicativo: (Cloruro de metileno) Inf= 0,50 mg/L El biomarcador más específico y recomendado para evaluar la exposición al cloruro de metileno es el diclorometano en orina Límite de cuantificación: 0,01 mg/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
DNDFH **DIENTAMOEBA FRAGILIS DNA, HECES**	PCR-Real Time.	4	Rec. 1 g Heces [Cong.] - Contenedor estéril	Interpretación según criterio clínico
CODIFPE **DIFENHIDRAMINA CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), CABELLO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	10	Rec. 200 mg Cabello (1 x Kit específico) Recoger cabello de la zona entre la nuca y la coronilla, lo más próximo a la raiz.	Valor de corte recomendado: 97,00 pg/mg
CODIFOR **DIFENHIDRAMINA CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), ORINA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 10 mL Orina [Refr.]	Se utiliza como criterio de Positividad que la concentración sea superior o igual al valor del límite de cuantificación más el valor de incertidumbre del ensayo. En caso contrario, el resultado es Negativo. Incertidumbre de medida 4 ng/mL Límite de cuantificación 25 ng/mL
CODIFSAI **DIFENHIDRAMINA CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SALIVA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 1 mL Saliva [Refr.]	Incertidumbre de medida 0,6 ng/mL Límite de cuantificación 2 ng/mL
CODIFSTI **DIFENHIDRAMINA CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SANGRE**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 10 mL Sangre total Oxalato/Fluoruro (1 x Tubo Sangre Total-Oxalato/Fluoruro) [Refr.] Rec. 10 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total Heparina litio (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Tubo oxalato potásico/Fluoruro sódico Ref. SAP 600088318	Incertidumbre de medida 0,4 ng/mL Límite de cuantificación 2 ng/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G03023 **DIFERENCIACIÓN SEXUAL (DSD), DESORDEN DE · PANEL A · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AKR1C2 , AR, ATRX, CBX2, DMRT1, GATA4, HSD17B3, POR, WT1, ZFPM2	*10*
G03024 **DIFERENCIACIÓN SEXUAL (DSD), DESORDEN DE · PANEL B · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AKR1C2 , AKR1C4 , AR, ARX, ATRX, BMP15, CBX2, CYB5A , CYP11A1 , CYP11B1 , CYP17A1, CYP19A1, CYP21A2, DHH, DMRT1, DMRT2 , FGFR2, FOXL2, GATA4, HSD17B3, HSD17B4, HSD3B2 , LHCGR, MAP3K1, NR0B1, NR3C1 , NR5A1, POR, RSPO1 , SOX3, SOX9, SRD5A2, SRY, STAR, TSPYL1, WNT4, WT1, ZFPM2	*38*
G03025 **DIFERENCIACIÓN SEXUAL (DSD), DESORDEN DE · PANEL C · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CYP21A2, DHH, MAP3K1, NR0B1, NR5A1, SOX9, SRD5A2, SRY, WNT4	*9*
G03021 **DIFERENCIACIÓN SEXUAL 46,XX, DESORDEN DE (DSD 46,XX) · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ARX, CYP11B1 , CYP19A1, CYP21A2, HSD17B4, HSD3B2 , NR3C1 , NR5A1, POR, RSPO1 , SOX3, SOX9, SRY, WNT4	*14*
G03022 **DIFERENCIACIÓN SEXUAL 46,XY, DESORDEN DE (DSD 46,XY) · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AKR1C2 , AKR1C4 , AR, ARX, ATRX, BMP15, CBX2, CYB5A , CYP11A1 , CYP17A1, CYP19A1, DHH, DMRT1, FGFR2, FOXL2, GATA4, HSD17B3, HSD3B2 , LHCGR, MAP3K1, NR0B1, NR5A1, POR, SOX9, SRD5A2, SRY, STAR, TSPYL1, WNT4, WT1, ZFPM2	*31*
G01146 **DIGEORGE, SÍNDROME DE · TBX1 (del 22q11.2) · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TBX1	*1*
DIG1 **DIGESTION, HECES**	Observación microscópica / Examen directo.	3	Rec. 1 g Heces [Refr.]	Se informa para cada paciente	
DIGI **DIGITOXINA, SUERO**	Quimioluminiscencia.	2	Rec. 5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] -Dosis administrada, frecuencia y vía de administración	I.Terapéutico: 10,00 - 25,00 ng/mL Conc.Tóxica: Sup 45,00 ng/mL	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
DIGO **DIGOXINA, SUERO**	Inmunoturbidimetría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] -Dosis administrada, frecuencia y vía de administración	0,80 - 2,00 ng/mL
DHT60 **DIHIDROTESTOSTERONA (60'), SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	7	Rec. 1 mL Suero 60 m. [Refr.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
DHT **DIHIDROTESTOSTERONA (EIA) , SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Adultos Hombres 143,00 - 842,00 pg/mL Niñas Mujeres 0 - 10 Años Inf 88,9 pg/mL Niños Hombres 0 - 10 Años Inf 85,700 pg/mL Niños Hombres 10 - 14 Años 11,10 - 875,6 pg/mL Niñas Mujeres 10 - 14 Años 22,50 - 280,6 pg/mL Niños Hombres 15 - 18 Años 70,30 - 1260,9 pg/mL Niñas Ambos 15 - 18 Años 62,60 - 760,3 pg/mL Adultos Mujeres 18 - 50 Años Inf 596 pg/mL Adultos Mujeres Sup - 51 Años Inf 431,00 pg/mL
ADMA **DIMETILARGININA ASIMÉTRICA (ADMA), SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	8	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	0,26 - 0,64 µmol/L
G11227 **DISCAPACIDAD INTELECTUAL ASOCIADA AL SITIO FRÁGIL FRAXE · FMR2 · A. FRAGMENTOS**	Análisis de Fragmentos	19	Rec. 1 Muestra/s Sangre seca en papel de filtro (1 x Papel de filtro Whatman 903) Recoger gotas de sangre sin anticoagulante en papel de filtro Whatman 903. Dejar secar al aire libre durante 1 hora. Guardar en nevera en bolsa de plástico cerrada hasta el envío.	FMR2 *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G9721 **DISCAPACIDAD INTELECTUAL NO SINDRÓMICA AR · TUSC3 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TUSC3	*1*
G11189 **DISCAPACIDAD INTELECTUAL/AUTISMO, EXOMA ENFOCADO A · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	30	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Indicado en informe adjunto	
G10022 **DISCINESIA CILIAR PRIMARIA 3 · DNAH5 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Se informa para cada paciente DNAH5	*1*
G11191 **DISCINESIA PAROXÍSTICA CINESIGÉNICA · PRRT2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PRRT2	*1*
G11270 **DISCINESIA PAROXÍSTICA NO CINESIGÉNICA · PNKD · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PNKD	*1*
G08116 **DISCONDROSTEOSIS DE LERI-WEILL · SHOX · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SHOX	*1*
G08115 **DISCONDROSTEOSIS DE LERI-WEILL · SHOX · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SHOX	*1*
G08117 **DISCONDROSTEOSIS DE LERI-WEILL · SHOX · SANGER+MLPA**	Secuenciación Sanger + MLPA	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SHOX	*1*
G11289 **DISFUNCIÓN MITOCONDRIAL MÚLTIPLE TIPO 1, SÍNDROME DE · NFU1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	NFU1	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G12017 **DISGENESIA DEL SEGMENTO ANTERIOR TIPO 3 · FOXC1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FOXC1	*1*
G12018 **DISGENESIA DEL SEGMENTO ANTERIOR TIPO 3 · FOXE3 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FOXE3	*1*
G12019 **DISGENESIA DEL SEGMENTO ANTERIOR TIPO 5, MÚLTIPLES SUBTIPOS · PAX6 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PAX6	*1*
G06013 **DISGENESIA OVÁRICA 1 · FSHR · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FSHR	
G03102 **DISGENESIA TIROIDEA · PANEL · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FOXE1, NKX2-1, PAX8, TPO, TSHR	*5*
G03175 **DISHORMONOGÉNESIS TIROIDEA FAMILIAR · IYD · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	IYD	*1*
G7472 **DISLIPEMIAS - HIPERCOLESTEROLEMIA Y OTRAS DISLIPIDEMIAS · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABCA1, ABCG5, ABCG8, ANGPTL3, APOA1, APOA5, APOB, APOC2, APOE, CETP, CREB3L3, GPD1, GPIHBP1, LCAT, LDLR, LDLRAP1, LIPA, LMF1, LPL, MTTP, PCSK9, SAR1B	*22*
G03115 **DISMINUCIÓN DE DENSIDAD ÓSEA (INLUYENDO OSTEOGÉNIESIS IMPERFECTA), TRASTORNOS CON · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ALPL, ANO5, BMP1, CLCN5, COL1A1, COL1A2, CRTAP, FGF23, FKBP10, IFITM5, LRP5, NBAS, P4HB, PHEX, PLOD2, PPIB, SERPINF1, SERPINH1, SLC34A3, SP7	*20*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
UPD14 **DISOMIA UNIPARENTAL (UPD) SCREENING, MUESTRA BIOLÓGICA**	Reacción en cadena de la polimerasa.	15	Rec. 5 mL Sangre total EDTA [Refr.] Rec. 5 mL Líquido amniótico [Refr.] Alt. 1 Muestra/s Vellosidad corial [Refr.] En caso de estudio postnatal remitir 5 mL de sangre total con EDTA de cada uno de los progenitores y del paciente. En caso de estudio prenatal remitir 5 mL de sangre total con EDTA de cada uno de los progenitores y muestra de vellosidad corial (no debe ser hemática) o de líquido amniótico (mínimo 3mL).		
G08021 **DISOSTOSIS ACROFACIAL DE WEYERS · EVC1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	EVC1	*1*
G08022 **DISOSTOSIS ACROFACIAL DE WEYERS · EVC2 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	EVC2	*1*
G08118 **DISOSTOSIS ESPONDILOCOSTAL · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	DLL3, HES7, LFNG, MESP2, RIPPLY2, TBX6	*6*
G08119 **DISOSTOSIS ESPONDILOCOSTAL AUTOSÓMICA RECESIVA · HES7 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	HES7	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G08136 **DISOSTOSIS ESPONDILOCOSTAL 5 · TBX6 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TBX6 *1*
G03026 **DISPLASIA ADRENAL CONGÉNITA · NR0B1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	NR0B1 *1*
G08024 **DISPLASIA ACROCAPITOFEMORAL · IHH · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	IHH *1*
G08025 **DISPLASIA ACROMÍCRICA · FBN1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FBN1 *1*
G08026 **DISPLASIA BOOMERANG · FLNB · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FLNB *1*
G08139 **DISPLASIA CAMPOMÉLICA (CON/SIN REVERSIÓN SEXUAL) · SOX9 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SOX9 *1*
G08028 **DISPLASIA CAMPOMÉLICA (CON/SIN REVERSIÓN SEXUAL) · SOX9 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SOX9 *1*
G08027 **DISPLASIA CAMPOMÉLICA · SOX9 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SOX9 *1*
G08029 **DISPLASIA CLEIDOCRANEAL · RUNX2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	RUNX2 *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G11172 **DISPLASIA CORTICA COMPLEJA CON MALFORMACIONES · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	KIF2A, KIF5C, TUBA8, TUBB2B, TUBB3, TUBG1	*6*
G08130 **DISPLASIA CRANEOFRONTONASAL · EFNB1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	EFNB1	*1*
G08030 **DISPLASIA CRANIOFACIAL-ESQUELÉTICA-DERMATOLÓGICA · FGFR2 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FGFR2	*1*
G08031 **DISPLASIA CZECH · COL2A1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	COL2A1	*1*
G08032 **DISPLASIA DE KNIEST · COL2A1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	COL2A1	*1*
G08033 **DISPLASIA DE LA CHAPELLE · SLC26A2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SLC26A2	*1*
G02041 **DISPLASIA ECTODÉRMICA · PANEL A · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	EDA, EDAR, EDARADD, GJB6, HOXC13, KRT74, KRT85, MSX1, NECTIN1, NFKBIA, TP63, WNT10A	*12*
G02013 **DISPLASIA ECTODÉRMICA · PANEL B · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AXIN2, EDA, EDA2R, EDAR, EDARADD, GJB2, GJB6, GRHL2, IKBKG, NECTIN1, NFKBIA, PVRL1, PVRL4, TP63, TRAF6, WNT10A	*16*
G02014 **DISPLASIA ECTODÉRMICA 2 TIPO CLOUSTON · GJB6 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GJB6	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G1581 **DISPLASIA ECTODÉRMICA HIPOHIDRÓTICA · PANEL · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	EDA, EDAR, EDARADD	*3*
G4169 **DISPLASIA ECTODÉRMICA HIPOHIDRÓTICA CON INMUNODEFICIENCIA · IKBKG · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	IKBKG	*1*
G02052 **DISPLASIA ECTODÉRMICA HIPOHIDRÓTICA TIPO 1 · EDA · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	EDA	*1*
G08034 **DISPLASIA EPIFISARIA MÚLTIPLE CON MIOPÍA Y SORDERA · COL2A1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	COL2A1	*1*
G08035 **DISPLASIA EPIFISARIA MÚLTIPLE TIPO 5 · MATN3 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	MATN3	*1*
G08036 **DISPLASIA EPIFISARIA MÚLTIPLE/PSEUDOACONDROPLASIA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	COL9A1, COL9A2, COL9A3, COMP, MATN3, SLC26A2	*6*
G08037 **DISPLASIA EPIFISIARIA MÚLTIPLE · SLC26A2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SLC26A2	*1*
G08038 **DISPLASIA EPIFISIARIA MÚLTIPLE TIPO 1 · COMP · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	COMP	*1*
G11039 **DISPLASIA ESPONDILODIAFISIARIA TIPO MAROTEAUX · TRPV4 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TRPV4	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G08039 **DISPLASIA ESPONDILOEPIFISARIA CONGÉNITA · COL2A1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	COL2A1	*1*
G08040 **DISPLASIA ESPONDILOEPIMETAFISARIA · MATN3 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	MATN3	*1*
G08041 **DISPLASIA ESPONDILOEPIMETAFISARIA TIPO STRUDWICK · COL2A1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	COL2A1	*1*
G08042 **DISPLASIA ESPONDILOMETAFISARIA TIPO KOZLOWSKY · TRPV4 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TRPV4	*1*
G08043 **DISPLASIA ESQUELÉTICAS POR GENES DE COLÁGENO · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	COL10A1, COL11A1, COL11A2, COL1A1, COL1A2, COL2A1, COL9A1, COL9A2, COL9A3	*9*
G08044 **DISPLASIA FRONTOMETAFISARIA TIPO 1 · FLNA · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FLNA	*1*
G08045 **DISPLASIA GELEOFÍSICA TIPO 2 · FBN1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FBN1	*1*
G08046 **DISPLASIA MANDIBULOACRAL · LMNA · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	LMNA	*1*
G08047 **DISPLASIA METAFISIARIA CON HIPOPLASIA MAXILAR CON/SIN BRAQUIDACTILIA · RUNX2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	RUNX2	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G08048 **DISPLASIA METATRÓPICA · TRPV4 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TRPV4	*1*
G7335 **DISPLASIA ODONTO-ÓNICO-DÉRMICA · WNT10A · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	WNT10A	*1*
G08023 **DISPLASIA ÓSEA DE BENT, SÍNDROME DE · FGFR2 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FGFR2	*1*
G08049 **DISPLASIA ÓSEA TERMINAL · FLNA · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FLNA	*1*
G08050 **DISPLASIA OSTEOGLOFÓNICA · FGFR1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FGFR1	*1*
G08051 **DISPLASIA PLATISPONDÍLICA ESQUELÉTICA TIPO TORRANCE · COL2A1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	COL2A1	*1*
G03089 **DISPLASIA SEPTO-ÓPTICA · HESX1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	HESX1	*1*
G08053 **DISPLASIA TANATOFÓRICA TIPO I Y II · FGFR3 · HOT SPOT**	Hot Spot	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FGFR3 [p.Arg248Cys, p.Ser249Cys, p.Gly370Cys, p.Ser371Cys, P.Tyr373Cys, p.Lys650Met, p.Lys650Glu, p.Ter807extTer101; c.2419T>C, c.2419T>A, c.2419T>G, c.2420 G>T, c.2421A>T, c.2421A>C, c.2421A>G]	*1*
G08052 **DISPLASIA TANATOFÓRICA TIPO I Y II · FGFR3 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FGFR3	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G01018 **DISPLASIA VALVULAR CARDIACA · FLNA · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FLNA *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G08054 **DISPLASIAS ESQUELÉTICAS · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABCC9, ACAN, ACP5, ACTB, ACTG1, ACVR1, ADAMTS10, ADAMTS17, ADAMTSL2, AFF3, AGA, AGPS, AIFM1, AKT1, AKT2, ALG9, ALPL, ALX1, ALX3, ALX4, AMER1, ANAPC1, ANKH, ANO5, ANTXR2, APC2, ARHGAP25, ARHGAP31, ARID1A, ARID1B, ARSB, ARSK, ARSL, ASAH1, ASXL1, ATP6V0A2, ATR, AVP, B3GALT6, B3GAT3, B4GALT7, BANF1, BCL11B, BGN, BHLHA9, BMP1, BMP2, BMPER, BMPR1B, BNIP1, BPNT2, BTF3P11, CA2, CANT1, CASR, CBFB, CC2D2A, CCDC8, CCN6, CCNQ, CDC45, CDC6, CDC73, CDH3, CDK10, CDKN1C, CDT1, CENPE, CEP120, CEP152, CEP290, CFAP410, CHST11, CHST14, CHST3, CHSY1, CILK1, CKAP2L, CLCN5, CLCN7, COG1, COG4, COL10A1, COL11A1, COL11A2, COL1A1, COL1A2, COL27A1, COL2A1, COL9A1, COL9A2, COL9A3, COLEC10, COLEC11, COMP, COPB2, CREB3L1, CREBBP, CRIPT, CRTAP, CSF1R, CSGALNACT1, CSPP1, CTSA, CTSK, CUL7, CYP26B1, CYP27B1, CYP2R1, CYP3A4, DDR2, DDRGK1, DDX58, DHCR24, DHODH, DLL3, DLL4, DLX3, DLX5, DLX6, DMP1, DNA2, DNAJC21, DNMT3A, DOCK6, DONSON, DSE, DVL1, DVL3, DYM, DYNC2H1, DYNC2I1, DYNC2I2, DYNC2LI1, DYNLT2B, EBP, EDN1, EDNRA, EED, EFL1, EFNB1, EFTUD2, EIF2AK3, EIF4A3, ELMO2, EN1, ENPP1, EOGT, EP300, EPS15L1, ERF, ESCO2, EVC2, EXOC6B, EXT1, EXT2, EXTL3, EZH2, FAM111A, FAM20C, FANCB, FAR1, FBLN1, FBN1, FBN2, FERMT3, FGD1, FGF10, FGF16, FGF23, FGF9, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FIG4, FKBP10, FLNA, FLNB, FMN1, FN1, FZD2, GALNS, GALNT3, GBA, GCM2, GDF3, GDF5, GDF6, GINS2, GJA1, GLB1, GLI1, GLI2, GLI3, GMNN, GNAI3, GNAS, GNPNAT1, GNPTAB, GNPTG, GNS, GORAB, GPC3, GPC4, GPC6, GPX4, GREM1, GRK2, GSC, GUSB, HAAO, HDAC4, HDAC8, HES7, HHAT, HNRNPC, HNRNPK, HOXA11, HOXA13, HOXD13, HPGD, HRAS, HS2ST1, HSPA9, HSPG2, HYAL1, IARS2, ID4, IDH1, IDH2, IDS, IDUA, IFIH1, IFITM5, IFT122, IFT140, IFT172, IFT43, IFT52, IFT80, IFT81, IHH, IKBKG, IL11RA, IL1RN, IL6ST, INPPL1, INTU, KAT6B, KCNJ2, KDELR2, KIAA0586, KIAA0753, KIAA0825, KIF22, KIF5B, KIF7, KL, KYNU, LAMA5, LBR, LEMD3, LFNG, LIFR, LMBR1, LMNA, LMX1B, LONP1, LPIN2, LRP4, LRP5, LRRK1, LTBP1, LTBP2, LTBP3, MAB21L2, MAFB, MAN2B1, MANBA, MAP2K1, MAP3K20, MAP3K7, MAPKAPK5, MASP1, MATN3, MBTPS1, MBTPS2, MCM3, MCM5, MCM7, MECOM, MEGF8, MEOX1, MESD, MESP2, MET, MGP, MID1, MIR140, MKS1, MMP13, MMP14, MMP2, MMP9, MNX1, MSX2, MTAP, MTX2, MYCN, MYH3, MYO18B, NADSYN1, NAGLU, NANS, NBAS, NEK1, NEPRO, NEU1, NF1, NFIX, NIPBL, NKX3-2, NLRP3, NMNAT1, NOG, NOTCH1, NOTCH2, NPPC, NPR2, NPR3, NRAS, NSD1, NSDHL, NSMCE2, NXN, OBSL1, OFD1, ORC1, ORC4, ORC6, OSTM1, P3H1, P4HB, PAM16, PAPSS2, PCNT, PCYT1A,

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
				PDE3A, PDE4D, PDGFRB, PEX5, PEX7, PGM3, PHEX, PIGV, PIK3CA, PISD, PITX1, PLCB3, PLCB4, PLEKHM1, PLOD2, PLS3, POLE, POLR1A, POLR1B, POLR1C, POLR1D, POLR3A, POLR3B, POLR3GL, POP1, POR, PORCN, PPIB, PRKACA, PRKACB, PRKAR1A, PRKG2, PRMT7, PRRX1, PTDSS1, PTH1R, PTHLH, PTPN11, PYCR1, RAB23, RAB33B, RAD21, RASGRP2, RBBP8, RBM8A, RBPJ, RECQL4, RFLNA, RINT1, RIPPLY2, RMRP, RNU12, RNU4ATAC, ROR2, RPGRIP1L, RPL13, RSPO2, RSPRY1, RUNX2, SALL1, SALL4, SBDS, SCUBE3, SEC23A, SEC24D, SERPINF1, SERPINH1, SETD2, SF3B4, SFRP4, SGK3, SGMS2, SGSH, SH3BP2, SH3PXD2B, SHH, SHOX, SIK3, SIX1, SIX2, SKI, SLC10A7, SLC17A5, SLC25A24, SLC26A2, SLC29A3, SLC34A3, SLC35B2, SLC35D1, SLC39A13, SLC4A2, SLCO2A1, SLCO5A1, SMAD2, SMAD3, SMAD4, SMAD6, SMARCA4, SMARCAL1, SMARCB1, SMARCE1, SMC1A, SMC3, SMCHD1, SMO, SMS, SNRPB, SNX10, SOST, SOX9, SP7, SPARC, SPECC1L, SQSTM1, SRP54, SULF1, SUMF1, SUZ12, TAB2, TBC1D24, TBCE, TBX15, TBX3, TBX4, TBX5, TBX6, TBXAS1, TCF12, TCIRG1, TCOF1, TCTN3, TENT5A, TFAP2B, TGDS, TGFB1, TGFB2, TGFB3, TGFBR1, TGFBR2, THPO, TMCO1, TMEM165, TMEM216, TMEM38B, TMEM53, TMEM67, TNFRSF11A, TNFRSF11B, TNFSF11, TONSL, TOP2B, TP63, TRAF3IP1, TRAF7, TRAIP, TRAPPC2, TREM2, TRIP11, TRPS1, TRPV4, TRPV6, TTC21B, TWIST1, TXNL4A, TYROBP, UBA2, UFSP2, VAC14, VCP, VDR, VPS33A, WDR19, WDR35, WNT1, WNT10B, WNT3, WNT5A, WNT6, WNT7A, XRCC4, XYLT1, XYLT2, ZIC1, ZIC3, ZMPSTE24, ZNF462, ZSWIM6	
G08129 **DISPLASIAS ESQUELÉTICAS MESOMÉLICAS · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BMPR1B, GDF5, GPC6, NPR2, RECQL4, ROR2, SULF1, WNT5A	*8*
G08055 **DISPLASIAS ESQUELÉTICAS PRENATAL AMPLIADO · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ALPL, COL11A1, COL1A1, COL1A2, COL2A1, CRTAP, DYNC2H1, EVC, EVC2, FGFR3, FLNB, IFT122, IFT43, IFT80, LEPRE1, PHEX, PPIB, SLC26A2, SOX9, TRIP11, TTC21B, WDR19, WDR35	*123*
G08056 **DISPLASIAS ESQUELÉTICAS PRENATAL BÁSICO · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	COL1A1, COL1A2, COL2A1, CRTAP, FGFR3, LEPRE1, SLC26A2, SOX9	*8*
G02015 **DISQUERATOSIS CONGÉNITA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CTC1, DKC1, NHP2, NOP10, RTEL1, TERC, TERT, TINF2, USB1, WRAP53	*10*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G02016 **DISQUERATOSIS CONGÉNITA AD TIPO 1 · TERC · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TERC	*1*
G02017 **DISQUERATOSIS CONGÉNITA AD TIPO 3 · TINF2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TINF2	*1*
G02018 **DISQUERATOSIS CONGÉNITA LIGADA AL CROMOSOMA X · DKC1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	DKC1	*1*
G11040 **DISTONÍA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ADCY5, ANO3, ATP1A3, CIZ1, COL6A3, DRD2 , EKD2, GCH1, GNAL, MR1, PNKD , PRKRA , PRRT2 , RELN, SGCE , SLC2A1 , SPR , TAF1, TH , THAP1 , TOR1A , TUBB4A	*22*
G11232 **DISTONIA DOPA-SENSIBLE · GCH1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GCH1	*1*
G3088 **DISTONÍA GENERALIZADA · THAP1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	THAP1	*1*
G11229 **DISTONIA MIOCLONICA (DYT11) · SGCE · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SGCE	*1*
G11228 **DISTONIA MIOCLONICA (DYT11) · SGCE · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SGCE	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G3087 **DISTONÍA PRIMARIA (DYT 1) · TOR1A (c.907_909delGAG) · HOT SPOT**	Hot Spot	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Indispensable remitir informe clínico y consentimiento informado.	TOR1A [c.907_909delGAG]	*1*
G3156 **DISTONIA PRIMARIA DE TORSIÓN · TOR1A · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TOR1A	*1*
G3213 **DISTONÍA PRIMARIA DOPA-SENSIBLE AD · GCH1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GCH1	*1*
G12020 **DISTROFIA DE CONOS Y BASTONES · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABCA4, ADAM9, AIPL1, ATF6, BEST1, C8ORF37, CABP4, CACNA1F, CACNA2D4, CDHR1, CERKL, CNGA3, CNGB3, CNNM4, CRX, EYS, FSCN2, GNAT2, GUCA1A, GUCY2D, KCNV2, PCYT1A, PDE6C, PDE6H, PITPNM3, PROM1, PRPH2, RAB28, RAX2, RDH5, RGS9, RGS9BP, RIMS1, RPE65, RPGR, RPGRIP1, SEMA4A, SPATA7, UNC119	*39*
G12058 **DISTROFIA DE CONOS Y BASTONES TIPO 2 · CRX · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CRX	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G12068 **DISTROFIA DE RETINA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABCA4, ABCC6, ABHD12, ACBD5, ACO2, ADAM9, ADAMTS18, *329* ADGRA3, ADGRV1, ADIPOR1, AFG3L2, AGBL5, AHI1, AHR, AIPL1, AIRE, ALMS1, AMN, ARL13B, ARL2BP, ARL6, ARMS2, ARSG, ATF6, ATOH7, ATP13A2, ATXN7, B3GLCT, BBIP1, BBS1, BBS10, BBS12, BBS2, BBS4, BBS5, BBS7, BBS9, BCOR, BEST1, BMP4, C10ORF11 , C12ORF65, C1QTNF5, C2, C21orf2, C2orf71, C3, C5orf42, C8ORF37, CA4, CABP4, CACNA1F, CACNA2D4, CAPN5, CC2D2A, CDH23, CDH3, CDHR1, CEP164, CEP19, CEP250, CEP290, CEP41, CEP78 , CERKL, CFB, CFH, CHM, CIB2, CLN3, CLN5, CLN6 , CLN8 , CLRN1, CNGA1, CNGA3, CNGB1, CNGB3, CNNM4, COL11A1, COL11A2, COL18A1, COL2A1, COL4A1, COL9A1, COL9A2, CRB1, CRX, CSPP1, CTNNA1, CTNNB1, CTSD, CUBN, CYP1B1, CYP27A1, CYP2R1, CYP4V2, DHDDS, DHX38, DMD, DRAM2, DTHD1, EFEMP1, ELOVL4, EMC1, ERCC6, ERCC8, ESPN, EYS, FAM161A, FBLN5, FLVCR1, FOXC1, FOXE3, FRAS1, FREM1, FREM2, FSCN2, FUT2, FZD4, GDF6, GNAT1, GNAT2, GNB3, GNPTAB, GNPTG, GP1BA, GPR143, GPR179, GRIP1, GRK1, GRM6, GRN, GUCA1A, GUCA1B, GUCY2D, HARS, HCCS, HGSNAT, HK1, HMCN1, HMX1, HTRA1, IDH3B, IFT140, IFT172, IFT27, IFT81, IKBKG, IMPDH1, IMPG1, IMPG2, INPP5E, INVS, IQCB1, IRX5, ITM2B, JAG1, KCNJ13, KCNV2, KCTD7 , KIAA1549, KIF11, KIF7, KIZ, KLHL7, LAMA1, LCA5, LRAT, LRIT3, LRP2, LRP5, LZTFL1, MAK, MERTK, MFN2, MFRP , MFSD8 , MIR204, MKKS, MKS1, MVK , MYO7A, MYOC, NBAS, NDP, NEK2, NEUROD1, NMNAT1, NPHP1, NPHP3, NPHP4, NR2E3, NR2F1, NRL, NYX, OAT, OCA2, OFD1, OPA1, OPA3, OPN1LW, OPN1MW, OPN1SW, OTX2, P3H2, PANK2, PAX2, PAX6, PCDH15, PCYT1A, PDAP1, PDE6A, PDE6B, PDE6C, PDE6G, PDE6H, PDZD7, PEX1, PEX2, PEX7, PGK1, PHYH, PITPNM3, PITX2, PITX3, PLA2G5, PLK4, PNPLA6, POC1B, POMGNT1, PPT1 , PRCD, PROM1, PRPF3, PRPF31, PRPF4, PRPF6, PRPF8, PRPH2, PRPS1, RAB28, RAX2, RB1, RBP3, RBP4, RCBTB1, RD3, RDH11, RDH12, RDH5, REEP6, RGR, RGS9, RGS9BP, RHO, RIMS1, RLBP1, ROM1, RP1, RP1L1, RP2, RP9, RPE65, RPGR, RPGRIP1, RPGRIP1L, RS1, RTN4IP1, SAG, SCAPER, SDCCAG8, SEMA4A, SLC24A1, SLC24A5, SLC25A46, SLC38A8, SLC45A2, SLC7A14, SMOC1, SNRNP200, SOX2, SPATA7, SPG7, SRD5A3, STRA6, TCTN1, TCTN2, TCTN3, TEAD1, TIMM8A, TIMP3, TMEM126A, TMEM216, TMEM237, TMEM67, TOPORS, TPP1, TREX1, TRIM32, TRNT1, TRPM1, TSPAN12, TTC21B, TTC8, TTLL5, TTPA, TUB, TUBGCP4, TUBGCP6, TULP1, TYR, TYRP1, UNC119, USH1C, USH1G, USH2A, VAX1, VCAN, VPS13B, VSX2, WDPCP, WDR19, WFS1, WHRN, WT1, ZNF408, ZNF423, ZNF513

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G12021 **DISTROFIA DISTRÓFICA DE CÓRNEA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AGBL1, CHST6, COL8A2, CYP4V2, KRT12, KRT3, OVOL2, PIKFYVE, PITX2, SLC4A11, TACSTD2, TCF4 , TGFBI, UBIAD1, ZEB1	*15*
G11279 **DISTROFIA FACIOESCAPULOHUMERAL TIPO 1 · HAPLOTIPO SSLP · A. FRAGMENTOS**	PCR-Análisis de fragmentos.	15	Rec. 10 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]		
G11183 **DISTROFIA FACIOESCAPULOHUMERAL TIPO 1 · D4Z4 · SB**	Southern-Blot.	60	Rec. 10 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Se precisan 3 tubos de sangre total EDTA. La cantidad mínima de muestra necesaria son 10 mL.	D4Z4	*1*
G11278 **DISTROFIA FACIOESCAPULOHUMERAL TIPO 2 · HIPOMETILACION REGIÓN D4Z4 · SB**	Southern-Blot.	60	Rec. 10 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Indicado en informe adjunto	
G11157 **DISTROFIA FACIOESCAPULOHUMERAL TIPO 2 · SMCHD1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SMCHD1	*1*
G9708 **DISTROFIA MACULAR JUVENIL · CDH3 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CDH3	*1*
G12080 **DISTROFIA MACULAR VITELIFORME · PANEL · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Indicado en informe adjunto BEST1, PRPH2	*2*
G12022 **DISTROFIA MACULAR VITELIFORME TIPO 2 · BEST1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BEST1	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G3003 **DISTROFIA MIOTÓNICA TIPO I DE STEINERT · DMPK · A.FRAGMENTOS**	Análisis de Fragmentos	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No se detecta DMPK	*1*
G11255 **DISTROFIA MIOTÓNICA TIPO I DE STEINERT · DMPK · SOUTHERN BLOT**	Southern-Blot.	42	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	DMPK	*1*
G3060 **DISTROFIA MIOTÓNICA TIPO II · CNBP (ZNF9) · A. FRAGMENTOS**	Análisis de Fragmentos	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CNBP	*1*
G11055 **DISTROFIA MUSCULAR · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ACTA1, ALG13, ANO5, B3GALNT2, CAPN3, CAV3, CHKB, COL12A1, COL6A1, COL6A2, COL6A3, DAG1, DES, DMD, DNAJB6, DOLK, DPM1, DPM2, DPM3, DYSF, EMD, FHL1, FKRP, FKTN, GAA, GMPPB, HNRNPDL, ISPD, ITGA7, ITGA9, LAMA2, LARGE, LMNA, MYOT, PLEC, POMGNT1, POMGNT2, POMK, POMT1, POMT2, SEPN1, SGCA, SGCB, SGCD, SGCG, SMCHD1, SUN2, SYNE1, SYNE2, TCAP, TMEM43, TMEM5, TNPO3, TRAPPC11, TRIM32, TTN, VCP	*57*
G11041 **DISTROFÍA MUSCULAR CON COLUMNA RÍGIDA TIPO 1 · SEPN1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SEPN1	*1*
G11269 **DISTROFIA MUSCULAR CONGÉNITA · LAMA2 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	LAMA2	*1*
G11268 **DISTROFIA MUSCULAR CONGÉNITA · LAMA2 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	LAMA2	*1*
G11043 **DISTROFIA MUSCULAR CONGÉNITA · LMNA · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	LMNA	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G11042 **DISTROFIA MUSCULAR CONGÉNITA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ACTA1, B3GALNT2, CHKB, COL12A1, COL6A1, COL6A2, COL6A3, DAG1, DPM1, DPM2, DPM3, FHL1, FKRP, FKTN, GMPPB, ISPD, ITGA7, LAMA2, LARGE, LMNA, PLEC, POMGNT1, POMGNT2, POMK, POMT1, POMT2, SEPN1, TCAP, TMEM5, TRAPPC11	*30*
G11271 **DISTROFIA MUSCULAR CONGÉNITA TIPO FUKUYAMA · FKTN · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FKTN	*1*
G11044 **DISTROFIA MUSCULAR DE CINTURAS · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ANO5, CAPN3, CAV3, DAG1, DES, DNAJB6, DPM3, DYSF, FKRP, FKTN, GAA, GMPPB, HNRNPDL, ISPD, LMNA, MYOT, PLEC, POMGNT1, POMT1, POMT2, SGCA, SGCB, SGCD, SGCG, TCAP, TNPO3, TRAPPC11, TRIM32, TTN, VCP	*30*
G3157 **DISTROFIA MUSCULAR DE CINTURAS AD · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CAV3, DNAJB6, HNRNPDL, LMNA, MYOT, TNPO3	*6*
G11045 **DISTROFIA MUSCULAR DE CINTURAS AD TIPO 1B · LMNA · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	LMNA	*1*
G11136 **DISTROFIA MUSCULAR DE CINTURAS TIPO 2A · CAPN3 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CAPN3	*1*
G3512 **DISTROFIA MUSCULAR DE CINTURAS TIPO 2B · DYSF · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	DYSF	*1*
G3513 **DISTROFIA MUSCULAR DE CINTURAS TIPO 2B · DYSF · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	DYSF	*1*
G11046 **DISTROFIA MUSCULAR DE CINTURAS TIPO 2C · SGCG · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SGCG	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G11047 **DISTROFIA MUSCULAR DE CINTURAS TIPO 2D · SGCA · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SGCA	*1*
G11048 **DISTROFIA MUSCULAR DE CINTURAS TIPO 2E · SGCB · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SGCB	*1*
G11049 **DISTROFIA MUSCULAR DE CINTURAS TIPO 2F · SGCD · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SGCD	*1*
G11050 **DISTROFIA MUSCULAR DE CINTURAS TIPO 2J · TTN · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TTN	*1*
G11051 **DISTROFIA MUSCULAR DE CINTURAS TIPO IC · CAV3 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CAV3	*1*
G11052 **DISTROFIA MUSCULAR DE EMERY - DREIFUSS · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	EMD, FHL1, LMNA, SMCHD1, SUN2, SYNE1, SYNE2, TMEM43	*8*
G01019 **DISTROFIA MUSCULAR DE EMERY-DREIFUSS · EMD · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	EMD	*1*
G11053 **DISTROFIA MUSCULAR DE EMERY-DREIFUSS · FHL1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FHL1	*1*
G01020 **DISTROFIA MUSCULAR DE EMERY-DREIFUSS · LMNA · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	LMNA	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G11054 **DISTROFIA MUSCULAR DE EMERY-DREIFUSS AD TIPO 7 · TMEM43 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TMEM43	*1*
G11202 **DISTROFIA MUSCULAR OCULOFARÍNGEA · PABPN1 (expansión GCN) · A. FRAGMENTOS**	Análisis de Fragmentos	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PABPN1	*1*
G11056 **DISTROFIA MUSCULAR TIBIAL TARDÍA · TTN · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TTN	*1*
G11057 **DISTROFIA MUSCULAR TIPO BECKER · DMD · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	DMD	*1*
G11058 **DISTROFIA MUSCULAR TIPO DUCHENNE · DMD · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	DMD	*1*
G11059 **DISTROFIA MUSCULAR TIPO DUCHENNE · DMD · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	DMD	*1*
G11060 **DISTROGLICANOPATÍAS · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ALG13, B3GALNT2, B3GNT1, DAG1, DOLK, DPM1, DPM2, DPM3, FKRP, FKTN, GMPPB, ISPD, LARGE, POMGNT1, POMGNT2, POMK, POMT1, POMT2, TMEM5	*19*
DIUOR **DIURÉTICOS, ORINA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	7	Rec. 10 mL Orina [Refr.]	Negativo	
DNCNA **DNA Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorroheae, muestra anal**	Reacción en cadena de la polimerasa.	5	Rec. 1 Muestra/s Exudado rectal [Refr.]	No se detecta	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
DNCNOR **DNA Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorroheae, muestra oral**	PCR-Real Time.	5	Rec. 1 Muestra/s Exudado bucal [Refr.]	
DNCNC **DNA Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorroheae, muestra vaginal**	Reacción en cadena de la polimerasa.	5	Rec. 1 Muestra/s Exudado cervical [Refr.]	No se detecta
DNCNO **DNA Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorroheae, orina**	PCR-Real Time.	5	Rec. 10 mL Orina [Refr.]	No se detecta
DNCCH **DNA CYCLOSPORA CAYETANENSIS EN HECES**	Reacción en cadena de la polimerasa.	4	Rec. 3 g Heces (1 x Recipiente estéril) [Cong.] Congelar inmediatamente.	No se detecta
DNHBSE **DNA HEPATITIS B CUALITATIVA EN PLASMA SEMINAL**	PCR-Real Time.	10	Rec. 1.5 mL Plasma seminal [Cong.] Plasma seminal: Recoger la muestra de semen en un contenedor estéril. Transferir la muestra a tubos de centrífuga estériles (utilizando pipetas estériles). Centrifugar los tubos a 400 g durante 10 minutos. Traspasar el plasma seminal (sobrenadante) a un tubo estéril y congelar - Enviar congelado	No se detecta

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G07016 **DNA MITOCONDRIAL · mtDNA · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mtDNA *1*
PADNA **DNA NATIVO (NDNA) ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] No es necesario estar en ayunas.	Interpretación: Negativo: Inf 1/10 Interpretación: Positivo: Sup= 1/10
ADNA **DNA NATIVO ANTICUERPOS (NDNA), SUERO**	Inmunoanálisis con detección fluorescente	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 10,00 UI/mL Indeterminado: 10,00 - 15,00 UI/mL Positivo: Sup 15,00 UI/mL
DHIVLE **DNA PROVIRAL HIV TIPO 1 - LAVADO ESPERMÁTICO**	RT-PCR	8	Rec. 1 mL Lavado seminal (1 x Tubo sin aditivos) [Cong.]	
DNHBTH **DNA VIRAL HEPATITIS B, TEJIDO HEPÁTICO**	PCR-Real Time.	6	Rec. 1 Muestra/s Tejido Hepático [Cong.]	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
DNVM **DNA VIRUS DE LA VIRUELA DEL MONO (MONKEYPOX), MUESTRA BIOLÓGICA**	PCR-Real Time.	3	Rec. 1 Muestra/s Exudado (1 x Escobillón seco.) [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Exudado (1 x Escobillón con medio de transporte para virus) [Refr.] Muestra recomendada: Exudado de lesión cutánea (vesículas, pústulas). Contactar con el laboratorio antes de solicitar el estudio. Es imprescindible adjuntar los datos de contacto del médico solicitante junto con la clínica del paciente. Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío.	DNA Virus de la viruela del mono (Monkeypox): No se detecta
DNP **DNP (DESOXIRIBONUCLEOPROTEINA) ANTICUERPOS, SUERO**	Aglutinación de Partículas.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo
PATR2HJ3 **DOS INDIVIDUOS ADICIONALES LEGAL (PRUEBAS PATERNIDAD/PARENTESCO)**	PCR-Análisis de fragmentos.	12	Rec. 2 Muestra/s Frotis bucal (2 x Kit específico) Contactar con el laboratorio antes de solicitar el estudio. Kit especial con cadena de custodia + hoja de solicitud de paternidad judicial 2 hisopos bucales (sin medio) por paciente	Indicado en informe adjunto

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
DOXE **DOXEPINA, SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	6	Rec. 100 uL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.] -Dosis administrada, frecuencia y vía de administración La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis. El contenedor recomendado es el tubo seco (sin gel separador) para evitar procesos de adsorción del fármaco. En caso de no disponer de tubo seco, la extracción se puede realizar en tubo con gel separador, separando el suero dentro de las 2 horas posteriores a la recolección y transfiriéndolo a un tubo de alícuota para su transporte al laboratorio. Rechazo: Muestra hemolizada, lipémica y/o ictérica	I.Terapéutico: 10,00 - 200,00 µg/L Conc.Tóxica: Sup 500,00 µg/L Límite de cuantificación: 8,00 µg/L
DPPXL **DPPX ANTICUERPOS, LCR**	Inmunofluorescencia Indirecta en células transfectadas	6	Rec. 2 mL LCR [Refr.]	Negativo

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
DPPXS **DPPX ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta en células transfectadas	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo
DR4 **DROGAS DE ABUSO, ORINA**	Enzimoinmunoanálisis	1	Rec. 10 mL Orina [Refr.]	Anfetaminas y metanefetaminas: Negativo Valor discriminante: Anfetaminas y metanfetaminas : 500 ng/mL Cannabis : 50 ng/mL Cocaína : 150 ng/mL Opiaceos : 2000 ng/mL Negativo Negativo Negativo
G08134 **DWARFISMO PRIMORDIAL Y HUESOS DELGADOS · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ATR, CCDC8, CDKN1C, CENPE, CEP152, COG4, CRIPT, CUL7, DNA2, FAM111A, NSMCE2, OBSL1, PCNT, POLE, RBBP8, RNU4ATAC, TBCE, TRAIP, XRCC4 *19*
ECA **ECA (ENZIMA CONVERSORA DE LA ANGIOTENSINA), SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rechazo: Muestra Hemolizada	13,30 - 63,90 U/L
ECAL **ECA (ENZIMA CONVERTIDORA DE LA ANGIOTENSINA), LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO**	Espectrometría.	7	Rec. 600 uL LCR [Refr.]	Inf 11,3 U/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
QHCON **ECHINOCOCCOSIS - CONFIRMACIÓN SEROLOGÍA, SUERO**	Inmunoblot.	7	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Se debe realizar primero la prueba de screening antes de realizar la prueba confirmatoria de equinococosis. Si no desea que se realice la prueba de screening, el laboratorio debe informarnos de los resultados de la prueba de screening que se llevó a cabo para el paciente en cuestión.	Negativo
QH **ECHINOCOCCUS GRANULOSUS (HIDATIDOSIS) ANTICUERPOS, SUERO**	Hemaglutinación.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 1/160 Indeterminado: 1/160 1/160 Positivo: Sup 1/160
DNECGR **ECHINOCOCCUS GRANULOSUS DNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	Reacción en cadena de la polimerasa.	8	Rec. 2 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Quiste hidatídico (1 x Contenedor con solución salina) [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Biopsia (1 x Contenedor con solución salina)	No se detecta
ECHIG **ECHINOCOCCUS SP ANTICUERPOS IgG (EIA), SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 9,00 NTU Indeterminado: 9,00 - 11,00 NTU Positivo: Sup 11,00 NTU

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G12023 **ECTOPIAS LENTIS · FBN1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FBN1 *1*
COEDDPSA **EDDP (2-ETILIDENO-1,5-DIMETIL-3,3-DIFENILPIRROLIDINA) CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SALIVA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	3	Rec. 1 mL Saliva [Refr.]	Incertidumbre de medida 2 ng/mL Límite de cuantificación 10 ng/mL
COEDDPST **EDDP (2-ETILIDENO-1,5-DIMETIL-3,3-DIFENILPIRROLIDINA) CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SANGRE**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	3	Rec. 10 mL Sangre total Oxalato/Fluoruro (libre trazas metales) (1 x Tubo Sangre Total-Oxalato/Fluoruro) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total Heparina litio (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Tubo oxalato potásico/Fluoruro sódico Ref. SAP 600088318	Incertidumbre de medida 2 ng/mL Límite de cuantificación 10 ng/mL
IHQEGFR **EGFR- INMUNOHISTOQUIMICA CON KIT HOMOLOGADO (FARMACODIAGNÓSTICO)**	Inmunohistoquímica.	15	Rec. 1 Muestra/s Tejido	
G1162 **EHLERS DANLOS TIPO VI, SÍNDROME DE · PLOD1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PLOD1 *1*
G01168 **EHLERS-DANLOS (BÁSICO), SÍNDROME DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ADAMTS2, ATP7A, B3GAT3, B4GALT7, CHST14, COL1A1, COL1A2, COL3A1, COL5A1, COL5A2, FKBP14, FLNA, FLNB, KIF22, PLOD1, SLC39A13, TNXB, XYLT1 *18*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G01116 **EHLERS-DANLOS (EXTENDIDO), SÍNDROME DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ADAMTS2, ALDH18A1, ATP6V0A2, ATP7A, B3GAT3, B4GALT7, C1R, C1S, CHST14, COL12A1, COL1A1, COL1A2, COL3A1, COL5A1, COL5A2, CRTAP, DSE, EFEMP2, ELN, FBLN5, FBN1, FKBP14, FLNA, FLNB, KIF22, PLOD1, PRDM5, PYCR1, RIN2, SLC39A13, SMAD3, TGFB2, TGFB3, TGFBR1, TGFBR2, TNXB, XYLT1, ZNF469	*38*
G01170 **EHLERS-DANLOS CLÁSICO TIPO I Y II, SÍNDROME DE · COL5A1, COL5A2 · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	COL5A1, COL5A2	*2*
G01107 **EHLERS-DANLOS CLÁSICO, SÍNDROME DE · COL1A1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	COL1A1	*1*
G01178 **EHLERS-DANLOS CLÁSICO, SÍNDROME DE · COL5A1 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Se informa para cada paciente COL5A1	
G01108 **EHLERS-DANLOS CLÁSICO, SÍNDROME DE · COL5A1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	COL5A1	*1*
G01167 **EHLERS-DANLOS PERIODONTAL, SÍNDROME DE · C1S, C1R · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	C1R, C1S	*2*
G01110 **EHLERS-DANLOS POR DEFICIENCIA DE TEXINA X, SÍNDROME · TNXB · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TNXB	*1*
G01111 **EHLERS-DANLOS TIPO CARDIACO VALVULAR, SÍNDROME DE · COL1A2 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	COL1A2	*1*
G01140 **EHLERS-DANLOS TIPO CIFOESCOLIÓTICO Y SORDERA, SÍNDROME DE · FKBP14 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FKBP14	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G01112 **EHLERS-DANLOS TIPO IV, SÍNDROME DE · COL3A1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	COL3A1	*1*
G01152 **EHLERS-DANLOS TIPO IV, SÍNDROME DE · COL3A1, TNXB · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	COL3A1, TNXB	*2*
G01113 **EHLERS-DANLOS TIPO VIIA, SÍNDROME DE · COL1A1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	COL1A1	*1*
G01114 **EHLERS-DANLOS TIPO VIIB, SÍNDROME DE · COL1A2 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	COL1A2	*1*
DNAE **EHRLICHIA (E. EWINGII - E. CHAFFEENSIS) y ANAPLASMA DNA, SANGRE TOTAL**	PCR-Real Time.	5	Rec. 2 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.]	DNA Anaplasma phagocytophila: No se detecta DNA Ehrlichia chaffeensis: No se detecta DNA Ehrlichia ewingii: No se detecta	
AECH **EHRLICHIA CHAFFEENSIS ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	7	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 64,00 Interpretación: Positivo: Sup= 64,00	
A-EC **EHRLICHIA CHAFFEENSIS ANTICUERPOS IGM, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	7	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 1/64 Positivo: Sup= 1/64	
ELP **ELASTASA PANCREATICA 1, HECES**	Enzimoinmunoanálisis	4	Rec. 5 g Heces [Refr.] Se recomienda remitir la muestra al finalizar el episodio diarreico.	Sup 200,00 µg/g heces Insuficiencia pancreática exocrina grave Inf 100,00 µg/g heces Insuficiencia pancreática exocrina leve a moderada 100,00 - 200,00 µg/g heces Normal Sup= 200,00 µg/g heces	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ELAS **ELASTASA, PLASMA**	Enzimoinmunoanálisis	15	Rec. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.]	19,00 - 78,00 µg/L
G08057 **ELLIS-VAN CREVELD, SÍNDROME DE · EVC1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	EVC1 *1*
G08058 **ELLIS-VAN CREVELD, SÍNDROME DE · EVC2 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	EVC2 *1*
SCL **ENA III (SCL-70) ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunoanálisis con detección fluorescente	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] No es necesario estar en ayunas.	Interpretación: Negativo: Inf 7,00 U/mL Interpretación: Indeterminado: 7,00 - 10,00 U/mL Interpretación: Positivo: Sup 10,00 U/mL
G08059 **ENANISMO PARASTREMÁTICO · TRPV4 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TRPV4 *1*
ENASG **ENAS SCREEN (RO, LA, SM, RNP, JO1, SCL70), SUERO**	Inmunoanálisis con detección fluorescente	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	El ensayo ENA screening incluye la determinación en conjunto de los anticuerpos dirigidos contra las proteínas recombinantes humanas: U1RNP (RNP70, A, C), SS-A/Ro (60kDa/52kDa), SS-B/La, Centrómero B, SCl-70, Jo-1 y péptido sintético SmD3. En consecuencia, un resultado negativo en este estudio conjunto de ENAs implica que ninguno de los anticuerpos dirigidos contra las mencionadas proteínas individuales es detectable. Interpretación: Negativo: Inf 0,70 Ratio Interpretación: Indeterminado: 0,70 - 1,00 Ratio Interpretación: Positivo: Sup 1,00 Ratio

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G11261 **ENCEFALOPATÍA EPILÉPTICA DE INICIO TEMPRANO · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AARS, ACTL6B, ALG13, ARHGEF9, ARV1, ARX, CACNA1A, CAD *66* CDKL5, CPLX1, CUX2, DENND5A, DMXL2, DNM1, DOCK7, EEF1A2, FGF12, FRRS1L, GABBR2, GABRA1, GABRA2, GABRA5, GABRB1, GABRB3, GABRG2, GLS, GNAO1, GRIN2B, GRIN2D, HCN1, HNRNPU , ITPA, KCNA2, KCNB1, KCNQ2, KCNT1, MDH2, NECAP1, NTRK2, PARS2, PCDH19, PHACTR1, PIGA, PIGQ, PLCB1, PNKP, SCN1A, SCN1B, SCN2A, SCN3A , SCN8A, SCN9A, SIK1, SLC12A5, SLC13A5, SLC25A12, SLC25A22, SLC35A2, SPTAN1, ST3GAL3, STXBP1, SYNJ1, SZT2, TBC1D24, UBA5, WWOX
G11137 **ENCEFALOPATÍA EPILÉPTICA DE INICIO TEMPRANO 2 · CDKL5 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CDKL5 *1*
G9714 **ENCEFALOPATÍA MITOCONDRIAL INFANTIL POR DÉFICIT DE TK2 · TK2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TK2 *1*
G3125 **ENCEFALOPATÍA POR DEFICIENCIA GLUT1 · SLC2A1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SLC2A1 *1*
G9657 **ENCEFALOPATIA POR GLICINA (HIPERGLICEMIA NO CETÓSICA) · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AMT, GCSH, GLDC *3*
G11061 **ENCEFALOPATÍA PROGRESIVA CON/SIN LIPODISTROFIA · BSCL2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BSCL2 *1*
AENDM **ENDOMISIO ANTICUERPOS IgA, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Los resultados de anticuerpos anti-endomisio IgA deben ser interpretados de forma conjunta con la inmunoglobulina IgA para descartar un posible déficit Interpretación: Negativo: Inf 1/5 Interpretación: Positivo: Sup= 1/5

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
AENDG **ENDOMISIO ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 5,00 Interpretación: Positivo: Sup= 5,00
AENM **ENDOMISIO ANTICUERPOS IgM, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/5 Interpretación: Positivo: Sup= 1/5
AGTC **ENDOTOXINAS BACTERIANAS, AGUA DIÁLISIS**	Técnica Cromogénica.	30	Rec. 100 mL Agua de diálisis (1 x Envase aséptico) [Cong.]	Inf 0,01 EU/mL
G17031 **ENFERMEDAD GRANULOMATOSA CRÓNICA · CYBB · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 10 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA (2 tubos)) [Refr.]	CYBB *1*
G09043 **ENFERMEDAD RENAL TUBULOINTERSTICIAL AD · UMOD · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 5 mL Sangre total EDTA [Refr.]	UMOD [16p12.3] *1*
G09037 **ENFERMEDAD RENAL TUBULOINTERSTICIAL AUTOSÓMICA DOMINANTE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	HNF1B, MUC1, REN, UMOD *4*
G17017 **ENFERMEDADES AUTOINFLAMATORIAS · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ACP5, ADAM17, AP3B1, CARD14, CECR1, ELANE, IL10, IL10RA, IL10RB, IL1RN, IL36RN, LPIN2 , MEFV , MVK , NLRP1, NLRP12, NLRP3, NOD2, PLCG2, PSMB8, PSTPIP1 , RAB27A, SH3BP2, SLC29A3, TMEM173, TNFAIP3, TNFRSF11A, TNFRSF1A , TRNT1 *29*
G11226 **ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS · PANEL · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CRHR1, GRN, MAPT *3*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G12071 **ENFERMEDADES QUE AFECTAN A LA RETINA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABCA4, ABCC6, ABHD12, ACO2, ADAM9, ADAMTS18, ADGRV1, ADIPOR1, AFG3L2, AGBL5, AHI1, AHR, AIPL1, AIRE, ALMS1, ARL2BP, ARL6, ARSG, ATF6, ATOH7, ATXN7, BBS1, BBS10, BBS12, BBS2, BBS4, BBS5, BBS7, BBS9, BEST1, C12ORF65, C1QTNF5, C21orf2, C2orf71, C8ORF37, CA4, CABP4, CACNA1F, CACNA2D4, CAPN5, CC2D2A, CDH23, CDH3, CDHR1, CEP164, CEP19, CEP250, CEP290, CEP78 , CERKL, CFH, CHM, CIB2, CLN3, CLN5, CLN6 , CLN8 , CLRN1, CNGA1, CNGA3, CNGB1, CNGB3, CNNM4, COL18A1, COL4A1, CRB1, CRX, CSPP1, CTNNA1, CTNNB1, CTSD, CYP2R1, CYP4V2, DHDDS, DHX38, DMD, DRAM2, EFEMP1, ELOVL4, ERCC6, ERCC8, ESPN, EYS, FAM161A, FLVCR1, FZD4, GNAT1, GNAT2, GNB3, GNPTG, GPR143, GPR179, GRK1, GRM6, GUCA1A, GUCA1B, GUCY2D, HARS, HCCS, HGSNAT, HK1, HMX1, IDH3B, IFT140, IFT172, IFT27, IFT81, IKBKG, IMPDH1, IMPG1, IMPG2, INPP5E, IQCB1, JAG1, KCNJ13, KCNV2, KIAA1549, KIF11, KIZ, KLHL7, LAMA1, LCA5, LRAT, LRIT3, LRP2, LRP5, LZTFL1, MAK, MERTK, MFRP , MFSD8 , MIR204, MKKS, MKS1, MVK , MYO7A, NBAS, NDP, NEUROD1, NMNAT1, NPHP1, NPHP3, NPHP4, NR2E3, NRL, NYX, OAT, OFD1, OPN1LW, OPN1MW, OPN1SW, OTX2, PANK2, PAX2, PCDH15, PCYT1A, PDE6A, PDE6B, PDE6C, PDE6G, PDE6H, PEX1, PEX2, PEX7, PGK1, PHYH, PLA2G5, PLK4, PNPLA6, POC1B, POMGNT1, PPT1 , PRCD, PROM1, PRPF3, PRPF31, PRPF4, PRPF6, PRPF8, PRPH2, PRPS1, RAB28, RAX2, RBP3, RBP4, RCBTB1, RD3, RDH11, RDH12, RDH5, REEP6, RGR, RGS9, RHO, RLBP1, RP1, RP1L1, RP2, RP9, RPE65, RPGR, RPGRIP1, RPGRIP1L, RS1, RTN4IP1, SAG, SCAPER, SDCCAG8, SEMA4A, SLC24A1, SLC25A46, SLC38A8, SNRNP200, SPATA7, SRD5A3, TIMM8A, TIMP3, TMEM237, TOPORS, TPP1, TREX1, TRIM32, TRNT1, TRPM1, TSPAN12, TTC8, TTLL5, TTPA, TUB, TUBGCP4, TUBGCP6, TULP1, USH1C, USH1G, USH2A, VCAN, VPS13B, WDPCP, WDR19, WHRN, ZNF408, ZNF423 *242*
G07015 **ENOIL-COA HIDRATASA 1 DE CADENA CORTA, DEFICIENCIA MITOCONDRIAL DE · ECHS1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ECHS1 *1*
NSELCR **ENOLASA ESPECIFICA NEURONAL - NSE, LCR**	Quimioluminiscencia.	5	Rec. 1 mL LCR [Refr.]	Inf 13,00 µg/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ENO **ENOLASA ESPECIFICA NEURONAL - NSE, SUERO**	Quimioluminiscencia.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Si la prueba no se realiza el mismo día de la recogida de la muestra, el suero debe separarse del sedimento y conservarse en un tubo diferente.	Inf 18,30 ug/L
AMEB **ENTAMOEBA HISTOLYTICA (AMEBIASIS) ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 0,90 Índice Indeterminado: 0,90 - 1,10 Índice Positivo: Sup 1,10 Índice
ATENHI **ENTAMOEBA HISTOLYTICA (AMEBIASIS) ANTICUERPOS TOTALES, SUERO**	Hemaglutinación.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 1/80 Indeterminado: 1/80 1/160 Positivo: Sup= 1/320
DNENT **ENTAMOEBA HISTOLYTICA DNA, HECES/EXUDADO**	PCR-Real Time.	3	Rec. 1 Muestra/s Exudado [Refr.] Rec. 1 g Heces [Refr.]	No se detecta
ENTA **ENTAMOEBA HYSTOLITICA ANTIGENO, HECES**	Inmunocromatografía.	2	Rec. 5 g Heces [Refr.]	Negativo

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
QRNE **ENTEROVIRUS (ETV) RNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	PCR-Real Time.	5	Rec. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Rec. 1 mL LCR [Cong.] Alt. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 5 g Heces [Cong.] Alt. 0.5 mL LÍquido pericárdico [Cong.] Muestra de heces únicamente para pacientes pediátricos.	RNA Enterovirus: No se detecta
ENTVG **ENTEROVIRUS IgG ANTICUERPOS, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	8	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 1,00 Índice
ENTVTIP **ENTEROVIRUS SPP. RNA IDENTIFICACIÓN, MUESTRA BIOLÓGICA**	Técnica de secuenciación	13	Rec. 3 mL Aspirado nasofaringeo [Refr.] Alt. 5 g Heces [Refr.] Alt. 4 mL Sangre total EDTA [Refr.] Alt. 1 Muestra/s Frotis (1 x Escobillón con medio de transporte viral Vircell) [Refr.] Alt. 1 mL LCR [Cong.] Criterios de rechazo Muestra de suero	No se detecta
ENVOPG **ENVOPLAQUINA ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	30	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	Negativo: Inf 1,00 Ratio Positivo: Sup= 1,00 Ratio

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
EHCIT **EOSINA 5-MALEIMIDA (EMA BINDING TEST)-TEST DE UNIÓN, SANGRE TOTAL**	Citometría de flujo.	17	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] No realizar la determinación si en los 120 días previos el paciente ha recibido una transfusión de concentrados de hematíes	Un resultado entre 16 % y 21 % sugiere esferocitosis y un resultado Sup 21 % es compatible con esferocitosis hereditaria. Inf 16,00
EOSIN **EOSINÓFILOS, MOCO NASAL**	Tinción / Observación microscópica.	5	Rec. 1 Muestra/s Frotis (1 x Recipiente estéril) [Refr.] Enviar frotis de moco nasal realizado en el momento de la recogida (es necesario frotis con muestra fresca).	Se informa para cada paciente
BP230 **EPIDERMICOS ANTICUERPOS (BPAG1/BP230), SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	12	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Inf 20,00 UA/mL
BP180 **EPIDERMICOS ANTICUERPOS (BPAG2/BP180), SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	12	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Inf 20,00 UA/mL
DESM **EPIDERMICOS ANTICUERPOS (DESMOGLEINA 1 Y 3), SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	11	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Ac Desmogleína 1: Negativo: Inf 20,00 U/mL Ac Desmogleína 3: Negativo: Inf 20,00 U/mL
AEPI **EPIDERMIS ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Membrana basal: Interpretación: Negativo: Inf 1/10 Membrana basal: Interpretación: Positivo: Sup= 1/10 Sustancia intercelular: Interpretación: Negativo: Inf 1/10 Sustancia intercelular: Interpretación: Positivo: Sup= 1/10

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G7332 **EPIDERMOLISIS BULLOSA · LAMB3 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	LAMB3	*1*
G02019 **EPIDERMOLISIS BULLOSA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	COL17A1, COL7A1, DSP, DST, EXPH5, FERMT1, ITGA3, ITGA6, ITGB4, KRT1, KRT10, KRT14, KRT5, LAMA3, LAMB3, LAMC2, MMP1, PKP1, PLEC, TGM5	*20*
G11179 **EPILEPSIA (BÁSICO) · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GABRG2, KCNQ2, KCNQ3 , PCDH19, SCN1A, SCN2A, SCN9A	*7*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G11063 **EPILEPSIA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AARS, ABAT , ABCC8, ACY1, ADAR, ADRA2B, ADSL , ALDH4A1 , ALDH5A1 , ALDH7A1 , ALG11, ALG13, AMT, AP1S2, AP4E1, ARFGEF2, ARG1, ARHGEF9, ARX, ASAH1, ASPM, ATN1, ATP13A2, ATP1A2 , ATP1A3, ATP6AP2, ATP7A, ATRX, AUH, BCKDHB, BCKDK, BCS1L, BRAF, BRAT1 , BRWD3, BTD, C10orf2, C12orf57, CACNA1A, CACNA1H , CACNA2D1, CACNB4, CARS2 , CASK, CASR , CBL, CDKL5, CERS1, CHD2, CHRNA2, CHRNA4, CHRNA7, CHRNB2, CLCN2, CLCN4, CLN3, CLN5, CLN6 , CLN8 , CNTN2 , CNTNAP2 , COG6, COQ2, COQ4 , COX6B1, CPA6, CPS1, CPT2, CSNK1G1, CSTB, CTSD, CTSF, CUL4B, D2HGDH, DCX, DEAF1, DENND5A, DEPDC5 , DIAPH1 , DKC1, DLD, DLG3, DNAJC5 , DNAJC6, DNM1, DOCK6, DOCK7, DOLK, DYNC1H1, DYRK1A , EEF1A2, EFHC1 , EHMT1 , EIF2B1, EIF2B5, EPHX1, EPM2A, ERMARD, FARS2, FASN , FLNA, FOLR1 , FOXG1 , FOXRED1, FRRS1L, FTSJ1, FUCA1, GABBR1, GABBR2, GABRA1, GABRA5, GABRA6, GABRB1, GABRB2, GABRB3, GABRD, GABRE, GABRG1, GABRG2, GABRG3, GABRP, GABRQ, GABRR1, GABRR2, GAL , GAMT, GATM, GBA, GCK, GCSH, GDI1, GFAP, GK, GLB1, GLDC, GLRA1, GLRB, GLUL, GLYCTK, GNAO1, GOSR2, GPHN , GRIA3, GRIN2A, GRIN2B, GRIN2D, GRN, GTPBP3, HAX1, HCN1, HCN3, HCN4, HEPACAM, HEXA, HNRNPU , HSD17B10, HSPG2, IER3IP1 , IL1RAPL1, IQSEC2, ITPA, JMJD1C , KANSL1 , KCNA1, KCNA2, KCNB1, KCNC1 , KCNH1, KCNH2, KCNH5, KCNJ1, KCNJ10, KCNJ11, KCNMA1 , KCNQ1, KCNQ2, KCNQ3 , KCNT1, KCTD7 , KDM5C, KIAA2022, KIF1A, KIF2A, KIF5C, KPNA7, LGI1 , LIAS , LMNB2 , MAGI2, MAOA, MAPK10, MBD5, MBTPS2, MCCC2, MDH2, MECP2, MED17, MFSD8 , MOCS1, MOCS2, MTHFR, MTOR, MYO5A, NDUFA1, NDUFA2, NDUFAF3, NDUFAF6, NDUFV1, NECAP1, NEDD4L , NEU1, NGLY1 , NHLRC1 , NHS, NLGN3, NPC1, NPRL3 , NRXN1 , OPHN1, PCDH19, PDHA1, PGK1, PIGA, PIGG , PIGN , PIGO , PIGQ, PIGT, PLCB1, PMM2, PNKD , PNKP, PNPO , POLG, PPT1 , PRDM8 , PRICKLE1 , PRICKLE2 , PRRT2 , PSAT1, PURA , QARS , RAB27A, RAB3GAP1, RANBP2 , RELN, RFT1, RNASEH2A, RNASEH2B, RNASEH2C, ROGDI , RYR3 , SAMHD1, SATB2 , SCARB2 , SCN1A, SCN1B, SCN2A, SCN3A , SCN4A, SCN5A, SCN8A, SCN9A, SERPINI1 , SETD2 , SGCE , SIK1, SLC12A1, SLC12A2, SLC12A5, SLC12A7, SLC13A5, SLC19A3 , SLC25A12, SLC25A22, SLC2A1 , SLC35A2, SLC35A3 , SLC6A1 , SLC6A8, SLC9A6, SNAP25, SNIP1, SPATA5 , SPTAN1, SRPX2, ST3GAL3, ST3GAL5 , STRADA , STX1B , STXBP1, SUOX, SYN1, SYNGAP1, SYNJ1, SZT2, TBC1D24, TBCE, TBL1XR1 , TCF4 , TNK2, TPK1 , TPP1, TREX1, TSC1, TSC2, TUBB, TUBB2A, TUBB3, TUBG1, UBA5, UBE3A , VDAC1, WDR45, WWOX, ZDHHC9, ZEB2	*3,18*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G3130 **EPILEPSIA CON CRISIS CONVULSIVAS FEBRILES, SÍNDROME DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ARX, CDKL5, CHRNA2, CHRNA4, CHRNB2, KCNQ2, KCNQ3 , LGI1 , PCDH19, SCN1A, SCN1B, SCN2A, SLC2A1 , STXBP1	*14*
G11184 **EPILEPSIA CON CRISIS FEBRILES · PANEL A · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CPA6, GABRD, GABRG2, GPR98, SCN1A, SCN1B, SCN2A, SCN9A	*8*
G11185 **EPILEPSIA CON CRISIS FEBRILES · PANEL B · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ATP1A2 , CHD2, CPA6, DYRK1A , GABRA1, GABRD, GABRG2, GPR98, HCN1, KCNQ2, PRRT2 , SCN1A, SCN1B, SCN2A, SCN9A, SLC12A5, TBC1D24	*17*
G11178 **EPILEPSIA DE INCIO TEMPRANO (DRAVET) · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CHD2, GABRA1, GABRG2, PCDH19, SCN1A, SCN1B, SCN2A, SCN9A, STXBP1	*9*
G11064 **EPILEPSIA DE INICIO TEMPRANO · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AARS, ALG13, ARHGEF9, ARV1, ARX, BRAT1 , CACNA1A, CACNA1H , CASK, CDKL5, CHD2, DNM1, DOCK7, EEF1A2, FGF12, FOLR1 , FRRS1L, GABRA1, GABRB1, GABRB3, GABRG2, GNAO1, GRIN1 , GRIN2A, GRIN2B, GRIN2D, HCN1, ITPA, KCNA2, KCNB1, KCNQ2, KCNQ3 , KCNT1, NECAP1, PCDH19, PIGA, PIGO , PIGQ, PLCB1, PNKP, PNPO , PURA , SCN1A, SCN1B, SCN2A, SCN8A, SCN9A, SIK1, SLC12A5, SLC13A5, SLC25A12, SLC25A22, SLC2A1 , SLC35A2, SPTAN1, ST3GAL3, STXBP1, SYNGAP1, SZT2, TBC1D24, UBA5, WWOX	*62*
G11065 **EPILEPSIA DE INICIO TEMPRANO · PCDH19 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PCDH19	*1*
G11260 **EPILEPSIA DE INICIO TEMPRANO · SCN1A · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SCN1A	*1*
G11066 **EPILEPSIA DE INICIO TEMPRANO · SCN1A · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SCN1A	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G11138 **EPILEPSIA DEPENDIENTE DE PIRIDOXINA · ALDH7A1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ALDH7A1	*1*
G11233 **EPILEPSIA FAMILIAR DEL LÓBULO TEMPORAL · LGI1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	LGI1	*1*
G11067 **EPILEPSIA FOCAL CON TRASTORNO DEL LENGUAJE CON/SIN RETRASO MENTAL · GRIN2A · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GRIN2A	*1*
G11068 **EPILEPSIA GENERALIZADA CON CONVULSIONES FEBRILES · SCN1A · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SCN1A	*1*
G11210 **EPILEPSIA MIOCLÓNICA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ADRA2B, CERS1, CSTB, EPM2A, GOSR2, KCTD7 , LMNB2 , NHLRC1 , PRICKLE1 , SCARB2 , TBC1D24	*11*
G3121 **EPILEPSIA NOCTURNA DEL LÓBULO FRONTAL TIPO 1 · CHRNA4 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CHRNA4	*1*
EBGCR **EPSTEIN BARR (VCA) ANTICUERPOS IGG, LCR**	Inmunofluorescencia Indirecta.	3	Rec. 0.5 mL LCR (1 x Tubo estéril) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/2 Interpretación: Positivo: Sup= 1/2	
EBG **EPSTEIN BARR (VCA) ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Quimioluminiscencia.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Muestra alternativa: plasma citrato, EDTA y heparina.	Negativo: Inf 20,00 U/mL Positivo: Sup= 20,00 U/mL	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
EBMCR **EPSTEIN BARR (VCA) ANTICUERPOS IGM, LCR**	Inmunofluorescencia Indirecta.	3	Rec. 0.5 mL LCR (1 x Tubo estéril) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/2 Interpretación: Positivo: Sup= 1/2
EBM **EPSTEIN BARR (VCA) ANTICUERPOS IgM, SUERO**	Quimioluminiscencia.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Muestra alternativa: plasma citrato, EDTA y heparina.	Negativo: Inf 20,00 U/mL Indeterminado: 20,00 - 40,00 U/mL Positivo: Sup 40,00 U/mL
AVIGEB **EPSTEIN BARR ANTICUERPOS IgG (TEST DE AVIDEZ PARA LAS IgG), SUERO**	Quimioluminiscencia.	9	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Baja Avidez: Inf 40,00 % Moderada Avidez: 40,00 - 60,00 % Alta Avidez: 60,00 - 100,00 % Una Alta Avidez es compatible con una infección antigua. Una Baja Avidez es compatible con una infección aguda primaria.
EBNAM **EPSTEIN BARR ANTÍGENO NUCLEAR (EBNA) ANTICUERPOS IgM , SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/20 Interpretación: Positivo: Sup= 1/20
EBEAA **EPSTEIN BARR EARLY ANTÍGENO IgA ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/10 Interpretación: Positivo: Sup= 1/10
EBEA **EPSTEIN BARR EARLY ANTÍGENO IgG ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/20 Interpretación: Positivo: Sup= 1/20
EBEAM **EPSTEIN BARR EARLY ANTÍGENO IgM ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/10 Interpretación: Positivo: Sup= 1/10

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
MONI **EPSTEIN BARR HETEROFILOS (MONONUCLEOSIS INFECCIOSA) ANTICUERPOS, SUERO**	Aglutinación de Partículas.	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	No se detecta
EBER **EPSTEIN BARR HIBRIDACIÓN IN SITU VIRUS (EBER), BIOPSIA**	Hibridación cromogénica in situ.	5	Rec. 1 Muestra/s Tejido	Se informa para cada paciente
EBNAG **EPSTEIN BARR, ANTÍGENO NUCLEAR (EBNA), ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	4	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/20 Interpretación: Positivo: Sup= 1/20
EBNAGQ **EPSTEIN BARR, ANTÍGENO NUCLEAR (EBNA), ANTICUERPOS IgG, SUERO (QUIMIOLUMINISCENCIA)**	Quimioluminiscencia.	4	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 5,00 U/mL Indeterminado: 5,00 - 20,00 U/mL Positivo: Sup 20,00 U/mL
QEBC **EPSTEIN-BARR VIRUS (EBV) DNA CARGA VIRAL, MUESTRA BIOLÓGICA**	PCR-Real Time.	10	Rec. 2 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Alt. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 2 mL LCR (1 x Tubo estéril) [Cong.] Separar y congelar inmediatamente.	: Límite de cuantificación Sup 526316,00 copias/mL : Límite de detección 500,00 copias/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
DVEB **EPSTEIN-BARR VIRUS (EBV) DNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	PCR-Real Time.	4	Rec. 3 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Rec. 1 mL LCR (1 x Tubo estéril) [Cong.] Alt. 2 mL Lavado broncoalveolar (1 x Tubo estéril) [Refr.] Alt. 1 Muestra/s Tejido parafinado (1 x Contenedor estéril) Alt. 1 Muestra/s Tejido (1 x Contenedor con solución salina) [Refr.] Alt. 1 mL Médula ósea EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 1 mL Aspirado bronquial (1 x Tubo estéril) [Refr.] Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío.	La sensibilidad y la especificidad de la técnica es de un 100%. El límite de detección es 65 copias/mL. DNA del virus Epstein Barr: No se detecta	
G04039 **ERITROCITOSIS FAMILIAR · EPOR · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	EPOR	*1*
G4150 **ERITROCITOSIS HEREDITARIA · EPOR (exones 7, 8) · HOT SPOT**	Hot Spot	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	EPOR [7,8]	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
ACEPO **ERITROPOYETINA ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunoblot.	12	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Congelar antes de 4 horas desde la extracción Suero sin gel separador.	Negativo	
EPO **ERITROPOYETINA, SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina litio (1 x Tubo sangre heparina litio) [Refr.]	4,30 - 29,00 UI/L	
G02020 **ERITROQUERATODERMIA VARIABLE Y PROGRESIVA TIPO 1 · GJB3 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GJB3	*1*
G08097 **ESCAFOCEFALIA Y ANOMALÍA DE AXENFEL-RIEGER · FGFR2 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FGFR2	*1*
G08098 **ESCAFOCEFALIA, RETRUSIÓN MAXILAR Y RETRASO MENTAL · FGFR2 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FGFR2	*1*
G11069 **ESCAPULOPERONEAL NEUROGÉNICO TIPO KEASER, SÍNDROME DE · DES · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	DES	*1*
G11126 **ESCAPULOPERONEAL TIPO MIOPÁTICO, SÍNDROME · MYH7 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	MYH7	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
DNAECO **ESCHERICHIA COLI DNA, MUESTRA BIOLOGICA**	PCR-Electroforesis capilar.	11	Rec. 1 Muestra/s Heces (1 x Contenedor 25 mL.) [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Biopsia (1 x Contenedor con solución salina) [Refr.] Rec. 1 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 0.5 mL LCR (1 x Tubo estéril) [Refr.]	No se detecta
DNECEH **ESCHERICHIA COLI ENTEROHEMORRÁGICO (EHEC), DNA (TOXINA SHIGA), HECES**	Reacción en cadena de la polimerasa.	5	Rec. 25 g Heces (1 x Contenedor estéril) [Refr.] Congelada: Más de dos días. Muestra recomendada: Heces diarreicas, cepas aisladas en caso de tenerlas. Refrigerada: Durante menos de dos días.	No se detecta
DNAECEH **ESCHERICHIA COLI ENTEROPATOGÉNICO (EPEC) DNA, HECES**	Reacción en cadena de la polimerasa.	5	Rec. 1 Muestra/s Heces [Refr.] Congelada: Más de dos días. Muestra recomendada: Heces diarreicas, cepas aisladas en caso de tenerlas. Refrigerada: Durante menos de dos días.	Inf No se detecta

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
EYMS **ESCITALOPRAM Y METABOLITOS, SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	6	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.] La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis. El contenedor recomendado es el tubo seco (sin gel separador) para evitar procesos de adsorción del fármaco. En caso de no disponer de tubo seco, la extracción se puede realizar en tubo con gel separador, separando el suero dentro de las 2 horas posteriores a la recolección y transfiriéndolo a un tubo de alícuota para su transporte al laboratorio.	Cociente Desmetilescitalopram - Escitalopram: 0,30 - 1,00 Desmetilescitalopram: ug/L Indicado en informe adjunto Escitalopram: 15,00 - 80,00 ug/L
G11070 **ESCLEROSIS AMIOTRÓFICA LATERAL · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ALS2, ANG, C9orf72, CHMP2B, DAO, DCTN1 , ERBB4, ERLIN2, FIG4, FUS, HNRNPA1, HNRNPA2B1, MATR3, NEFH, OPTN, PFN1, PNPLA6, PRPH, REEP1, SETX, SIGMAR1, SOD1, SPAST, SPG11, SQSTM1, TAF15, TARDBP , TBK1 , UBQLN2, VAPB, VCP *31*
G11291 **ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA · C9ORF72 · A. FRAGMENTOS**	PCR-Análisis de fragmentos+TP PCR.	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	C9orf72 *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G4183 **ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA · SOD1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SOD1	*1*
G11219 **ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA TIPO 8 · VAPB · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	VAPB	*1*
G4138 **ESCLEROSIS TUBEROSA · TSC1 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TSC1	*1*
G11140 **ESCLEROSIS TUBEROSA · TSC1, TSC2 · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TSC1, TSC2	*2*
G4139 **ESCLEROSIS TUBEROSA · TSC2 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TSC2	*1*
G11139 **ESCLEROSIS TUBEROSA 1 · TSC1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TSC1	*1*
G11141 **ESCLEROSIS TUBEROSA 2 · TSC2 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TSC2	*1*
COESOR **ESCOPOLAMINA CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), ORINA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 10 mL Orina [Refr.]	Se utiliza como criterio de Positividad que la concentración sea superior o igual al valor del límite de cuantificación más el valor de incertidumbre del ensayo. En caso contrario, el resultado es Negativo. Incertidumbre de medida 2 ng/mL Límite de cuantificación 10 ng/mL	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
COESSA **ESCOPOLAMINA CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SALIVA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 1 mL Saliva [Refr.]	Incertidumbre de medida 2 ng/mL Límite de cuantificación 10 ng/mL
COESST **ESCOPOLAMINA CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SANGRE**	Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectrometría de masas.	5	Rec. 10 mL Sangre total Oxalato/Fluoruro (1 x Tubo Sangre Total-Oxalato/Fluoruro) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total Heparina litio (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Tubo oxalato potásico/Fluoruro sódico Ref. SAP 600088318	Incertidumbre de medida 2 ng/mL Límite de cuantificación 10 ng/mL
ESCP **ESCOPOLAMINA CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS),CABELLO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 1 g Cabello (1 x Kit específico)	
G04001 **ESFEROCITOSIS 5 HEREDITARIA · EPB42 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	EPB42 *1*
G04018 **ESFEROCITOSIS HEREDITARIA · ANK1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ANK1 *1*
G04007 **ESFEROCITOSIS HEREDITARIA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ANK1, EPB41, EPB42, RHAG, SLC4A1, SPTA1, SPTB *7*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ESCAR **ESLICARBAZEPINA , SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	I.Terapéutico: 5,00 - 30,00 µg/mL
AAEPS **ESPERMÁTICOS ANTICUERPOS, PLASMA SEMINAL**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 3 mL Plasma seminal [Refr.] Recoger el eyaculado fresco, centrifugar a temperatura ambiente y separar el sobrenadante. Evite congelar y descongelar repetidamente el plasma seminal. Almacene los tubos cerrados, ya que pueden ser un peligro de contaminación o alteración de la concentración.	Negativo: Inf= 60,00 U/mL Positivo: Sup 60,00 U/mL Esta técnica identifica anticuerpos IgG
ESPER **ESPERMATOZOIDES ANTICUERPOS, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 0.6 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] No es necesario estar en ayunas.	Negativo: Inf 75,00 U/mL Positivo: Sup= 75,00 U/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
CONVAS				
ESPERMATOZOIDES RECUENTO (CONTROL POST-VASECTOMÍA), SEMEN	Microscopia.	2	Rec. 3 mL Plasma seminal [Refr.] Recogida de esperma: Preparación de la muestra para envío a laboratorio: MATERIAL: - Refrigeratium Medium (Cód.: 007114)- El reactivo se sirve en viales de 5 mL. Una vez abierto, se debe alicuotar en tubos 0,5 mL y congelar las alícuotas a -10ºC de manera inmediata. - Tubos estériles para alícuotas (Cód.: LT0032) tapones (Cód: 014799) - Pipetas (Cód.: LD0089) de 1 mL PROCESADO DE LA MUESTRA: 1. Descongelar una alícuota de Refrigeration Medium a Tª ambiente. 2. Mezclar suavemente la muestra de semen remitida y añadir 0,5 mL al tubo de Refrigeration Medium. 3. Mezclar suavemente para homogenizar. 4. Es imprescindible enviar conjuntamente al laboratorio a Tª ambiente la alícuota preparada y el resto del	

MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
		eyaculado, en el mismo bote donde lo recogió el paciente. La muestra así tratada tiene una estabilidad de 6-8 horas. Si el paciente solicita las determinaciones de Seminograma y Fragmentación espermática, la recolección de las muestras deben ser de dos tomas por separado, respetando las condiciones pre-analíticas entre ambas tomas. No recepcionar muestras los sábados, vísperas de festivo y festivos - La muestra se debe obtener en un contenedor estéril que cierre bien (solicitar al laboratorio/obtener en farmacia) - El paciente debe guardar entre 3-7 días de abstinencia hasta el día de la toma. - Para los análisis postvasectomía, antes de recoger la muestra es necesario haber tenido como mínimo de veinte a treinta eyaculaciones después de la intervención quirúrgica. Pauta para la recogida: 1. Recoger todo el eyaculado por masturbación manual y	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
			directamente en el contenedor estéril. 2. No será válida la obtención de la muestra mediante el uso de preservativos, coitus interruptus o cualquier otra forma de estimulación. 3. No conserven el contenedor con la muestra en la nevera. 4. El contenedor se debe mantener tapado y entregar en posición vertical en el laboratorio, dentro de la primera hora después de la obtención de la muestra.	
ESQU **ESQUISTOSOMIASIS ANTICUERPOS TOTALES, SUERO**	Hemaglutinación indirecta.	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 1/160
SNOR **ESTAÑO, ORINA**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	5	Rec. 1 mL Orina final jornada [Refr.] ENVIAR EN FRASCO ESTÉRIL	Excreción (creatinina): Inf 50,00 µg/g crea
ESTSA **ESTAÑO, SANGRE TOTAL**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	7	Rec. 1 mL Sangre total EDTA Dipotásico (libre trazas metales) EDTA Dipotásico (libre trazas metales) (1 x Tubo Sangre EDTA metales traza) [Refr.]	Inf 50,00 µg/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
GRA **ESTEATORREA (GRASA EN HECES)**	Gravimetría.	8	Rec. 5 g Heces [Refr.] Las heces deberán recogerse en un recipiente limpio y seco. Evite la contaminación con orina o papel higiénico. Recoger una muestra de las heces, del tamaño mínimo de una nuez, excretadas durante tres días. Es necesario mantener la muestra refrigerada (en la nevera) dentro de los contenedores suministados hasta la entrega de muestras en el laboratorio (lo antes posible). Dieta con contenido normal de grasas tres días antes y posterior a la recogida. NO utilizar enemas, laxantes o aceites minerales y es conveniente no estar en tratamiento con antibiótico.	Inf 20,00 g/100gr
G01174 **ESTENOSIS SUPRAVALVULAR AÓRTICA · ELN · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 10 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ELN *1*
G01021 **ESTENOSIS SUPRAVALVULAR AÓRTICA · ELN · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ELN *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ESTER **ESTEROLES ESTUDIO, SUERO**	Cromatografía de gases.	16	Rec. 3 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] IMPRESCINDIBLE: Adjuntar resúmen de la historia clínica. Proteger de la luz. Rechazo: Muestras descongeladas y mantenidas a Tª ambiente más de 2 h, hemolizadas, lipémicas ó con presencia de fibrina.	Indicado en informe adjunto
ESTI **ESTIRENO, SANGRE TOTAL**	Cromatografía de Gases / Ionización de Llama.	10	Rec. 1 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Final de la jornada laboral.	VLB®-INSST: Final de la jornada laboral (Estireno) Inf 0,20 mg/L
BE2MS **ESTRADIOL ULTRASENSIBLE (LC-MS/MS), SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	14	Rec. 1 mL Suero [Refr.]	Hombres 10,00 - 40,00 pg/mL Mujeres 15,00 - 350,00 pg/mL Menopausia: de manera orientativa Mujeres Inf 10,00 pg/mL Niñas Inf 20,00 pg/mL Niños Inf 13,00 pg/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
E3L **ESTRIOL LIBRE, SUERO**	Quimioluminiscencia.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Hombres Inf 0,07 ng/mL 27 semanas de gestación Mujeres 2,30 - 6,40 ng/mL 28 semanas de gestación Mujeres 2,30 - 7,00 ng/mL 29 semanas de gestación Mujeres 2,30 - 7,70 ng/mL 30 semanas de gestación Mujeres 2,40 - 8,60 ng/mL 31 semanas de gestación Mujeres 2,60 - 9,90 ng/mL 32 semanas de gestación Mujeres Sup 2,80 ng/mL 33 semanas de gestación Mujeres Sup 3,00 ng/mL 34 semanas de gestación Mujeres Sup 3,30 ng/mL 35 semanas de gestación Mujeres Sup 3,90 ng/mL 36 semanas de gestación Mujeres Sup 4,70 ng/mL 37 semanas de gestación Mujeres Sup 5,60 ng/mL 38 semanas de gestación Mujeres Sup 6,60 ng/mL 39 semanas de gestación Mujeres Sup 7,30 ng/mL 40 semanas de gestación Mujeres Sup 7,60 ng/mL No embarazadas Mujeres Inf 0,07 ng/mL
ES3O **ESTRIOL TOTAL, ORINA**	Enzimoinmunoanálisis	8	Rec. 10 mL Orina 24h. (alícuota) (1 x Recipiente estéril) [Refr.]	Embarazo: - Hasta la semana 36 pueden alcanzarse valores aproximados de 45,0 mg/24h. - Los resultados dependen de la función de la unidad feto-placentaria y pueden situarse entre un 50 % y un 200 % por encima de los valores basales. Estriol total en orina: Inf 4,00 mg/24 h

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ES3 **ESTRIOL TOTAL, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Hombres Inf 8,50 ng/mL Mujeres Inf 8,50 ng/mL 17-20 semanas gestación 5,49 - 25,30 ng/mL 21-24 semanas gestación 6,73 - 41,40 ng/mL 25-28 semanas gestación 13,40 - 50,28 ng/mL 29-32 semanas gestación 17,49 - 54,91 ng/mL 33-36 semanas gestación 18,52 - 61,62 ng/mL 37 semanas gestación - parto 21,97 - 84,83 ng/mL
ESTRSA **ESTRIOL, SALIVA**	Enzimoinmunoanálisis	12	Rec. 1 mL Saliva (1 x Tubo sin aditivos) [Refr.] No usar Salivetes	22 semanas de gestación 200,00 - 1200 pg/mL 26 semanas de gestación 500,00 - 1900,00 pg/mL 30 semanas de gestación 1000,00 - 2600,00 pg/mL 34 semanas de gestación 1900,00 - 4500,00 pg/mL 37 semanas de gestación 2800,00 - 6200,00 pg/mL 39 semanas de gestación 3300,00 - 7300,00 pg/mL Premenopausia Inf 32,00 pg/mL
MESO **ESTROBALANCE - METABOLISMO ESTROGENOS, ORINA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	15	Rec. 10 mL Orina [Cong.]	16-alfa-OH estrona: Hombres 0,20 - 3,4 ng/mg creat 16-alfa-OH estrona: Mujeres 0 - 55 Años 0,30 - 20,5 ng/mg creat 16-alfa-OH estrona: Mujeres Sup - 55 Años 0,10 - 1,6 ng/mg creat 2OHE - 2-OH estrona: Hombres 0,20 - 6,40 ng/mg crea 2OHE - 2-OH estrona: Mujeres 0 - 55 Años 0,40 - 42,80 ng/mg crea 2OHE - 2-OH estrona: Mujeres Sup - 55 Años 0,60 - 4,20 ng/mg crea Ratio 2/16: Hombres Sup 0,30 Ratio 2/16: Mujeres 0 - 55 Años Sup 0,30 Ratio 2/16: Mujeres Sup - 55 Años Sup 1,90

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ET4 **ESTRONA, SUERO**	Radioinmunoanálisis.	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] En mujeres, Indicar fase menstrual.	Hombres 38,90 - 101,70 pg/mL ACO Mujeres 48,10 - 231,4 pg/mL Fase Folicular Mujeres 38,90 - 131,7 pg/mL Fase Luteal Mujeres 54,10 - 179,3 pg/mL Gestación 1º trimestre Mujeres 246,00 - 2774 pg/mL Gestación 2º trimestre Mujeres 569,00 - 5781 pg/mL Periovulación Mujeres 70,30 - 246,8 pg/mL Postmenop. con THS Mujeres 51,30 - 455 pg/mL Postmenop. sin THS Mujeres 35,60 - 96,6 pg/mL
SRS **ESTRONCIO, SANGRE TOTAL**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	9	Rec. 1 mL Sangre total EDTA Dipotásico (libre trazas metales) (1 x Tubo Sangre EDTA metales traza) [Refr.] Se puede hacer con muestra en tubo libre de metales y anticoagulante Heparina Sódica.	15,00 - 60,00 µg/L
RT20 **ESTUDIO 20 IGE (ALIMENTOS)**	Enzimoinmunoanálisis	9	Rec. 4 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 4 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Ayuno de 4 horas Indicar edad y sexo. Peticionario general.	Indicado en el informe adjunto

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
EAIL **ESTUDIO AMPLIADO DEL INMUNOFENOTIPO LINFOCITARIO**	Citometría de flujo.	7	Rec. 3 mL Sangre total EDTA [Refr.] Ayuno mínimo de 6 h No realizar ejercicio intenso antes de la toma. Realizar la extracción de lunes a miércoles laborables, evitando vísperas de festivos. Realizar la extracción en horario compatible con el envío de la muestra el mismo día de la extracción.	
PLCR **ESTUDIO CELULAR EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO**	Observación microscópica.	5	Rec. 1 mL LCR (1 x Tubo estéril) [Cong.] Rec. 1 mL LCR	Glucosa:: 40,00 - 80,00 mg/dL Proteínas: Ambos 0 - 10 Días 15,00 - 130,00 mg/dL Proteínas: Ambos 10 - 365 Días 15,00 - 45,00 mg/dL Proteínas: Ambos Sup - 1 Años 15,00 - 45,00 mg/dL
CEL **ESTUDIO CELULAR LIQUIDO BIOLOGICO, VARIAS**	Observación microscópica.	3	Rec. 1 mL Líquido sinovial [Refr.] Rec. 1 mL Líquido pleural [Refr.] Rec. 1 mL Líquido ascítico [Refr.] Rec. 1 mL LCR [Refr.]	Valor indicativo: Líquido Cefalorraquídeo : Inf5 leuc/mm3 Líquido Ascitico: Inf 300 leuc/mm3 Líquido Pleural: Ausencia Sugestivo de exudado : Sup 1000 leuc/mm3 Sugestivo de trasudado: Inf 1000 leuc/mm3 Líquido sinovial: Inf 200 leucocitos/mm3; polimorfonucleares Inf 25%
MOSA **ESTUDIO CITOLOGICO EN SANGRE PERIFERICA, SANGRE TOTAL**	Tinción / Observación microscópica.	4	Rec. 1 Frotis Extensión hematológica (1 x Extensiones directas.) [Refr.] Remitir junto muestra de sangre en tubo EDTA o en su defecto, orientación diagnóstica.	Eosinófilos : Inf 5,00 % Linfocitos : 18,00 - 45,00 % Monocitos : Inf 9,00 % Neutrófilos segmentados : 45,00 - 72,00 %

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ELPLT **ESTUDIO DE LIBERACIÓN PLAQUETAR, SANGRE**	Turbidimetría.	17	Rec. 10 mL Sangre total Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) Coordinar previamente toma y envío de muestras con el laboratorio. El análisis debe realizarse antes de que transcurran 6 horas desde la toma de muestra. Evitar remitir la muestra en fines de semana y vísperas de festivos.	Se informa para cada paciente
LSIN **ESTUDIO DE LÍQUIDO SINOVIAL**	Microscopia.	5	Rec. 0.4 mL Líquido sinovial (1 x Tubo sin aditivos) Rec. 0.4 mL Líquido sinovial (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 0.4 mL Líquido sinovial (1 x Tubo estéril heparinizado) La muestra debe llegar en la mayor brevedad posible al laboratorio para su análisis.	mg/dL Interpretación según criterio clínico

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
FQPRE **ESTUDIO DE MUTACIONES EN EL GEN CFTR (FIBROSIS QUÍSTICA), MUESTRA PRENATAL/SANGRE TOTAL MATERNA**	PCR/ARMS	10	Rec. 5 mL Sangre total EDTA [Refr.] Rec. 1.5 mL Vellosidad corial [Refr.] Rec. 1.5 mL Líquido amniótico [Refr.] Se requiere enviar 5 mL sangre EDTA de la madre para descartar una contaminación materna. Remitir informe clínico y motivo de solicitud de estudio. Peticionario específico debidamente cumplimentado y firmado.	
FQ32 **ESTUDIO DE MUTACIONES EN EL GEN CFTR (FIBROSIS QUÍSTICA), SANGRE TOTAL**	PCR/ARMS	10	Rec. 3 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CFTR [CFTRdele2,3, R334W, R553X, Y1092X(C>A), E60X, R347P, R560T, M1101K, P67L, R347H, 1811+1.6kbA>G, D1152H, G85E, A455E, 1898+1G>A, R1158X, 394delTT, 2143delT, R1162X, 444delA, 2184delA, 3659delC, R117C, 1677delTA, 2347delG, 3849+10kbC>T, R117H, V520F, W846X, S1251N, Y122X, 1717-1G>A, 2789+5G>A, 3905insT, 621+1G>T, G542X, Q890X, W1282X, 11+1G>T, S549R(T>G), 3120+1G>A, N1303K, L206W, S549N, 3272-26A>G, 1078delT, G551D, R1066C, delI507, delF508, A1006E, 1812-1G>A, A561E, 1069delCA, 2869insG, K710X, R709X, 2184insA, 712-1G>T, H199Y, P205S, V232D, polimorfismo IVS8-5T.] *1*
PPAH2 **ESTUDIO DE PARASITOS (2a MUESTRA), HECES**	Observación microscópica.	3	Rec. 1 g Heces 2a muestra (1 x Recipiente con medio Alcorfix (fijador parásitos))	
PPAH3 **ESTUDIO DE PARASITOS (3a MUESTRA), HECES**	Observación microscópica.	3	Rec. 1 Muestra/s Heces 3a muestra (1 x Recipiente con medio Alcorfix (fijador parásitos))	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
PAH **ESTUDIO DE PARASITOS, HECES**	Observación microscópica.	5	Rec. 1 g Heces (1 x Recipiente con medio Alcorfix (fijador parásitos)) Protocolo y kit especial de obtención de muestras. Kit específico COPROPACK SF-FIX (ref 600064120)	Se informa para cada paciente
PAROR **ESTUDIO DE PARÁSITOS, ORINA**	Observación microscópica.	3	Rec. 10 mL Orina [Refr.]	
BSED **ESTUDIO DE SEDIMENTO URINARIO**	Observación microscópica.	1	Rec. 25 mL Orina (1 x Contenedor 25 mL.) [Refr.]	Sedimento: Se informa para cada paciente
TRICO **ESTUDIO DE TRICHOMONAS**	Cultivo en medios selectivos y diferenciales	7	Rec. 1 Muestra/s Exudado vaginal [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Exudado uretral [Refr.]	Se informa para cada paciente
TRICOO **ESTUDIO DE TRICHOMONAS, ORINA**	Cultivo en medios selectivos y diferenciales	4	Rec. 1 mL Orina [Refr.]	
ACPLTHPA **ESTUDIO DE TROMBOPENIA CON SOSPECHA DE ALOINMUNE**	MAIPA	20	Rec. 2 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 2 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Las muestras deben llegar al laboratorio de lunes a jueves.	Negativo

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
NAD **ESTUDIO DEL NAD+, SANGRE TOTAL**	Fluorimetría.	12	Rec. 10 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Realizar la extracciónde lunes a jueves laborables. No enviar muestras de sangre que presenten hemólisis ni coágulos. Extraer 10 mL de sangre total EDTA, separar en 3 tubos criogénicos (tapa de rosca y O-ring de silicona, referencia 600044364) 500 µL de muestra en cada uno. Identificar y congelar a -80ºC. Remitir en caja de poliestireno con hielo seco.	Se informa para cada paciente
G8010 **ESTUDIO FENOTÍPICO EN HEMOGLOBINURIA PAROXÍSTICA NOCTURNA**	Citometría de flujo.	4	Rec. 3 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Realizar la extracción de lunes a miércoles laborables, evitando vísperas de festivos.	Se informa para cada paciente

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
COFL **ESTUDIO FUNCIONAL DE MICROBIOTA INTESTINAL**	No se aplica.	20	Rec. 1 Muestra/s Heces (1 x Kit específico) [Refr.] Heces recogidas en kit específico (550000528) facilitado por el laboratorio. Seguir instrucciones facilitadas en el kit. Las muestras deben llegar al laboratorio central de lunes a miércoles, evitando vísperas de festivos. Se requiere peticionario específico cumplimentado. No tomar corticoides, antibióticos ni antihistamínicos durante los 20 días anteriores a la obtención de la muestra. Pacientes que se hayan sometido a tratamientos de radioterapia o quimioterapia deben esperar al menos 4 semanas antes de realizar la toma de muestra. No se recomienda realizar este estudio en niños menores de 5 años. Para niños de 3 a 5 años, el test debe ser prescrito y supervisado por un profesional de la salud.	Escherichia coli: Inf 900000,00 CFU/g Escherichia coli: Normal: 900001,00 - 1000000000,00 CFU/g COPROFLORA - Interpretación: Indicado en informe adjunto : Se informa para cada paciente

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
DIPV **ESTUDIO FUNCIONAL DE MICROBIOTA INTESTINAL CON PATÓGENOS AMPLIADO**	No se aplica.	20	Rec. 1 Muestra/s Heces (1 x Kit específico) [Refr.] Heces recogidas en kit específico (550000528) facilitado por el laboratorio. Seguir instrucciones facilitadas en el kit. Las muestras deben llegar al laboratorio central de lunes a miércoles, evitando vísperas de festivos. Se requiere peticionario específico cumplimentado. No tomar corticoides, antibióticos ni antihistamínicos durante los 20 días anteriores a la obtención de la muestra. Pacientes que se hayan sometido a tratamientos de radioterapia o quimioterapia deben esperar al menos 4 semanas antes de realizar la toma de muestra. No se recomienda realizar este estudio en niños menores de 5 años. Para niños de 3 a 5 años, el test debe ser prescrito y supervisado por un profesional de la salud.	Adenovirus: Inf 1,00 Blastocystis hominis: Inf 1,00 Cestodos: Inf 1,00 Escherichia coli: Inf 900000,00 CFU/g Escherichia coli: Normal: 900001,00 - 1000000000,00 CFU/g Hongos: 1,00 - 3,00 Hongos INTERPRETACIÓN: 1,00 - 3,00 CFU/g COPROFLORA - Interpretación: Indicado en informe adjunto pH: 5,80 - 6,50 Chilomastix mesnili: Inf 1,00 Cryptosporidium sp.: Inf 1,00 Cyclospora sp.: Inf 1,00 Dientamoeba fragilis: Inf 1,00 Entamoeba hystolitica: Inf 1,00 Entamoeba coli: Inf 1,00 Entamoeba hartmanni: Inf 1,00 Endolimax nana: Inf 1,00 Giardia intestinalis: Inf 1,00 Iodamoeba butchslii: Inf 1,00 Cystoisospora belli: Inf 1,00 Nemátodos: Inf 1,00 : Se informa para cada paciente Rotavirus: Inf 1,00 Trematódos: Inf 1,00

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
EIHQ **ESTUDIO INMUNOHISTOQUÍMICO BIOPSIA**	Inmunohistoquímica.	9	Rec. 1 Pieza/s Tejido	Se informa para cada paciente
OTLI **ESTUDIO LIQUIDO BIOLÓGICO**	No se aplica.	5	Rec. 1 mL Líquido biológico [Refr.]	mg/dL No se dispone de límites de referencia para esta magnitud. g/L Interpretación según criterio clínico
2658 **ESTUDIO MICROSCOPIA ELECTRÓNICA, TEJIDO**	Microscopia electrónica.	5	Rec. 1 Pieza/s Tejido	Se informa para cada paciente
G00112 **ESTUDIO MLPA · 1 SONDA · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	
G00113 **ESTUDIO MLPA · 2 SONDA · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	
G00114 **ESTUDIO MLPA · 3 SONDA · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	
387 **ESTUDIO MOLECULAR BIOPSIA · PCR COMPLEJA, TEJIDO**	Reacción en cadena de la polimerasa.	3	Rec. 1 Pieza/s Tejido	Se informa para cada paciente
386 **ESTUDIO MOLECULAR BIOPSIA · PCR SIMPLE, TEJIDO**	Reacción en cadena de la polimerasa.	3	Rec. 1 Pieza/s Tejido	Se informa para cada paciente

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
HLAA **ESTUDIO MOLECULAR GENOTIPO HLA-A (BAJA RESOLUCIÓN), SANGRE TOTAL**	PCR-SSO.	15	Rec. 10 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Anticoagulante EDTA o ACD.	Se informa para cada paciente
HLAB **ESTUDIO MOLECULAR GENOTIPO HLA-B (BAJA RESOLUCIÓN), SANGRE TOTAL**	PCR-SSO.	15	Rec. 3 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Anticoagulante EDTA o ACD.	Se informa para cada paciente
GHCBR **ESTUDIO MOLECULAR GENOTIPO HLA-C (BAJA RESOLUCION), SANGRE TOTAL**	PCR-SSP.	9	Rec. 1 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Genotipo ligando KIR (grupo HLA C) : Se informa para cada paciente LOCUS c (CLASE I): Se informa para cada paciente
GHLDPB1A **ESTUDIO MOLECULAR GENOTIPO HLA-DPB1 (ALTA RESOLUCIÓN), SANGRE TOTAL**	PCR-SSO.	15	Rec. 6 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 6 mL Sangre total Ác.citrato dextrosa (1 x Tubo sangre A.C.D.) [Refr.]	Indicado en informe adjunto
HDRA **ESTUDIO MOLECULAR GENOTIPO HLA-DRB1 (ALTA RESOLUCIÓN), SANGRE TOTAL**	PCR-SBT	17	Rec. 6 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 6 mL Sangre total Ác.citrato dextrosa (1 x Tubo sangre A.C.D.) [Refr.]	Genotipo HLA DR de alta resolución resultado: Se informa para cada paciente
HLADR **ESTUDIO MOLECULAR HLA-DRB1 (BAJA RESOLUCIÓN) , SANGRE TOTAL**	PCR-SSO.	12	Rec. 3 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Se informa para cada paciente

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ESNAI **ESTUDIO NEUTROPENIA AUTOINMUNE**	No se aplica.	32	Rec. 6 Muestra/s Sangre total EDTA (6 x Tubo 10 mL.) [Refr.] Rec. 10 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Sangre total EDTA (1 x Tubo 5 mL.) [Refr.] Las muestras deben llegar al laboratorio de lunes a jueves. Avisar al laboratorio antes del envío de muestra. Necesario historía clínica y nombre completos del neonato , madre y padre. Envio ideal en 24 horas. Enviar lo antes posible. Remitir todas las muestras.	Se informa para cada paciente

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G00043 **ESTUDIO ONCOHEMATOLOGÍA/CONSTITUCIONAL · UNA SONDA · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] Consultar previamente con el laboratorio disponibilidad de la sonda que se precisa. En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
MNTP **ESTUDIO PERFIL METALES NUTRIENTES Y TÓXICOS, CABELLO**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	20	Rec. 1 g Cabello - Cortar mechones de cabello de las partes más cercanas a la nuca y en cantidad suficiente para el análisis. - Cortar unos 2-3 mechones de cabello justo en la parte que queda en la base en contacto con la nuca. Puede cortarse con tijeras de acero inoxidable o navaja. - Horizontalmente separar el cabello a la altura de a mitad de la parte de detrás de la nuca, separándolo hacia arriba apoyándolo en la cabeza. - Remitir el cabello sin tintes ni contaminantes externos. - Si está permanentado, esperar a que pase un tiempo para la recogida. - Si tiene tinte, recoger la muestra después de un mes de haber sido teñido, escogiendo aquellas partes que se vean no teñidas. 1. Recogida 2. Colocar el cabello dentro de la tarjeta de recogida. Rotular con el nombre del paciente, dirección y teléfono. No olvidar cumplimentar los todos los datos que	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
			constan en la ficha junto con la bolsa que se adjunta. 3. Lleve la muestra al laboratorio lo antes posible. Disponible documento completo con esquemas en web. Pauta para la recogida: Personas con el cabello corto: Personas con el cabello largo: RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA RECOGIDA DE CABELLO PARA LA DETERMINACIÓN DE METALES Y TÓXICOS	
G15157 **ESTUDIO TUMOR SÓLIDO· UNA SONDA · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado Consultar previamente con el laboratorio disponibilidad de la sonda que se precisa.	
ETAM **ETAMBUTOL, SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	9	Rec. 2 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Cong.] Alt. 2 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] No utilizar tubos con gel separador.	Después de 3h 2,00 - 5,00 mg/L Después de 8h 1,00 - 2,00 mg/L
ETAN **ETANERCEPT, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	17	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Indicar la dosis y la frecuencia de administración y la fecha de la última dosis del fármaco.	Ac Etarnecept: Negativo Etanercept: Se informa para cada paciente

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ETORAC **ETANOL (ENZIMÁTICO), ORINA**	Enzimático.	4	Rec. 1 mL Orina [Refr.]	
G03106 **ETANOL, METABOLISMO DEL · ALDH2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ALDH2 *1*
ETOO **ETANOL, ORINA**	Cromatografía de Gases / Ionización de Llama.	3	Rec. 10 mL Orina [Refr.] Enviar alícuota única. Cadena de custodia La estabilidad indicada corresponde a muestras conservadas en su contenedor primario sin abrir	Etanol (alcohol) en orina: Inf 1,80 g/g creat

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ALCOH **ETANOL, SANGRE TOTAL**	Cromatografía de Gases / Ionización de Llama.	3	Rec. 1 mL Sangre total Oxalato/Fluoruro (1 x Tubo Sangre Total-Oxalato/Fluoruro) [Refr.] Alt. 1 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Es necesario enviar un tubo único para esta determinación. Evitar cámara de aire en el tubo. Tubo oxalato potásico/Fluoruro sódico Ref. SAP 600088318 Desinfectar vena sin alcohol.	Incertidumbre (a 0,05 g/L) : 0,01 g/L Incertidumbre en el rango de 0,3 a 0,5 g/L: 0,07 g/L Límite de cuantificación: 0,05 g/L Tolerancia: Hasta 0,5 g/L* Hasta 0,3 g/L** * Tasa máxima en conductores ** Tasa máxima en vehículos destinados al transporte de mercancías con una masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos, vehículos destinados al transporte de viajeros de más de nueve plazas, o de servicio público, al transporte escolar y de menores, al de mercancías peligrosas o de servicio de urgencia o transportes especiales así como los conductores noveles (durante los dos años siguientes a la obtención del permiso o licencia que les habilita para conducir). Referencia bibliográfica: Reglamento General de Circulación (Real Decreto 1428/2003). La incertidumbre de medida de esta magnitud está calculada en todo el rango de trabajo y a disposición del cliente que lo solicite. Los resultados obtenidos solo están relacionados con la muestra ensayada.
ETGLO **ETIL GLUCURÓNIDO, ORINA**	Inmunoanálisis	4	Rec. 10 mL Orina (1 x Contenedor 25 mL.) [Refr.]	Inf 500,00 ng/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ETGLS **ETIL GLUCURÓNIDO, SUERO**	Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectrometría de masas.	12	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	mg/L Interpretación según criterio clínico
ETGLSU **ETILENGLICOL, SUERO**	Cromatografía de gases.	2	Rec. 2 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Extracción antes de la toma de la mañana.	Inf 0,10 g/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ETOS				
ETOSUXIMIDA, SUERO	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Cong.] -Dosis administrada, frecuencia y vía de administración La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis. El contenedor recomendado es el tubo seco (sin gel separador) para evitar procesos de adsorción del fármaco. En caso de no disponer de tubo seco, la extracción se puede realizar en tubo con gel separador, separando el suero dentro de las 2 horas posteriores a la recolección y transfiriéndolo a un tubo de alícuota para su transporte al laboratorio.	I.Terapéutico: 30,00 - 100,00 mg/L Toxicidad: Sup 120,00 mg/L Límite de cuantificación: 10,00 mg/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
EVER **EVEROLIMUS, SANGRE TOTAL**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	4	Rec. 1 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Muestra extraída en pre dosis.	Terapia triple (ciclosp. A; corticos.) en transplante renal: 3,00 - 8,00 ng/mL Límite de cuantificación: 0,50 ng/mL Nota: En fecha 12 de mayo de 2025, el kit comercial utilizado para el análisis de los niveles de inmunosupresores ha sido sustituido. Se recomienda tener en cuenta este cambio en la interpretación de los resultados analíticos, a fin de garantizar un seguimiento clínico adecuado de los pacientes.
FKOH **EXÁMEN CON KOH**	Tinción / Observación microscópica.	2	Rec. 1 Muestra/s Uña (1 x Contenedor estéril) Rec. 1 Muestra/s Escamas de piel (1 x Contenedor estéril)	
EF **EXAMEN EN FRESCO, MUESTRA BIOLÓGICA**	Observación microscópica / Examen directo.	5	Rec. 1 Muestra/s Frotis (1 x Portaobjetos) [Refr.]	Se informa para cada paciente
EFH **EXAMEN MICROSCÓPICO EN FRESCO, HECES**	Microscopia.	3	Rec. 1 g Heces [Refr.]	Se informa para cada paciente
G06065 **EXCLUSIÓN DE CONTAMINACIÓN MATERNA · QF-PCR**	QF-PCR.	10	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Frotis bucal (1 x Escobillón forense (libre de RNAsa, DNAsa y DNA))	
G9995 **EXOMA COMPLETO**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	30	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G00108 **EXOMA COMPLETO + GENOMA MITOCONDRIAL**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	30	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Indicado en informe adjunto
G00117 **EXOMA COMPLETO DÚO**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	30	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	
G00125 **EXOMA COMPLETO DÚO + GENOMA MITOCONDRIAL**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	30	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Indicado en informe adjunto
G00042 **EXOMA COMPLETO PRENATAL**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	20	Rec. 10 mL Líquido biológico [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Vellosidad corial [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Restos abortivos [Refr.] Rec. 1 Muestra/s DNA Extraido Es necesario enviar muestra materna (Sangre total EDTA o torunda bucal)	
G00110 **EXOMA COMPLETO PRENATAL + GENOMA MITOCONDRIAL**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Indicado en informe adjunto
G00118 **EXOMA COMPLETO PRENATAL DÚO**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	
G00119 **EXOMA COMPLETO PRENATAL TRÍO**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G9996 **EXOMA COMPLETO TRÍO**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	30	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Es conveniente que junto a la muestra del probando puedan hacer llegar muestras de los padres (identificadas independientemente), cada uno de ellos acompañado de un consentimiento informado. La muestra de los progenitores será necesaria en el esclarecimiento de algunas variantes.	
G00109 **EXOMA COMPLETO TRIO + GENOMA MITOCONDRIAL**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	30	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Indicado en informe adjunto
G08128 **EXOSTOSIS MÚLTIPLE · EXT1, EXT2 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] - Resumen de la historia clínica del paciente. Se requiere consentimiento informado. - En caso que proceda y si está disponible, copia del informe del caso índice familiar.	EXT1, EXT2 2
G08127 **EXOSTOSIS MÚLTIPLE · EXT1, EXT2 · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	EXT1, EXT2 2

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G7330 **EXOSTOSIS MULTIPLE TIPO 1 · EXT1 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	EXT1 *1*
G08060 **EXOSTOSIS MÚLTIPLE TIPO 1 · EXT1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	EXT1 *1*
G08061 **EXOSTOSIS MÚLTIPLE TIPO 2 · EXT2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	EXT2 *1*
G0001 **EXTRACCIÓN DE DNA FECAL (EXCL. AMBAR)**	Extracción de ADN en columnas de sílica.	5	Rec. 5 g Heces (1 x Recipiente de plástico) [Refr.]	
G03164 **FABRY, ENFERMEDAD DE · GLA · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GLA *1*
G03027 **FABRY, ENFERMEDAD DE · GLA · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GLA *1*
G11296 **FACOMATOSIS · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AKT1, ATM, CCND1, GNAQ, HRAS, IFNG, KLLN, KRAS, LZTR1, MRE11A, NBN, NF1, NF2, NRAS, PCNA, PIK3CA, PTEN, SDHB, SDHC, SDHD, SEC23B, SMARCB1, SPRED1, STK11, TSC1, TSC2, VHL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
IGF2 **FACTOR DE CRECIMIENTO 2 INSULIN LIKE (IGF II), SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	22	Rec. 400 uL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Ayuno de 8 horas. Ayuno mínimo de 8 horas. Centrifugar a 3000 rpm 10 minutos Condiciones de obtención: Este estudio no se realiza rutinariamente. Fecha de entrega orientativa. Consultar con el laboratorio antes de enviar las muestras. Tratamiento pre-analítico:	373,00 - 1058,00 ng/mL
VEGFD **FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR TIPO D (VEGF-D), SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	16	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Cong.]	137,00 - 752,00 pg/mL
PIGF **FACTOR DE CRECIMIENTO PLACENTARIO, SUERO**	TRACE	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	10 semanas de gestación Mujeres 16,20 - 55,00 pg/mL 11 semanas de gestación Mujeres 19,00 - 61,00 pg/mL 12 semanas de gestación Mujeres 21,30 - 96,70 pg/mL 13 semanas de gestación Mujeres 25,20 - 100,40 pg/mL 14 semanas de gestación Mujeres 34,30 - 132,00 pg/mL 15-19 semanas gestación Mujeres 43,00 - 348,00 pg/mL 20-24 semanas gestación Mujeres 183,00 - 868,00 pg/mL 25-28 semanas gestación Mujeres 145,00 - 1000,00 pg/mL 29-33 semanas gestación Mujeres 71,00 - 1157,00 pg/mL 34-36 semanas gestación Mujeres 41,00 - 752,00 pg/mL 37 semanas gestación - parto Mujeres 37,00 - 750,00 pg/mL 8 semanas de gestación Mujeres 9,30 - 28,90 pg/mL 9 semanas de gestación Mujeres 11,70 - 37,80 pg/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
TGFB **FACTOR DE CRECIMIENTO TRANSFORMADOR BETA (TGFB), PLASMA**	Enzimoinmunoanálisis	32	Rec. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] En caso de hemólisis o lipemia consultar con el facultativo para valorar la conveniencia de hacer el análisis. Muestra alternativa: suero congelado	1,40 - 8,20 ng/mL
VEGF **FACTOR DE CRECIMIENTO VASCULAR ENDOTELIAL (VEGF-A), PLASMA**	Enzimoinmunoanálisis	32	Rec. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.]	Inf 129,00 pg/mL
TNFA **FACTOR DE NECROSIS TUMORAL (TNF ALFA), SUERO**	Quimioluminiscencia.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	Inf 13,7 pg/mL
ACGMCSF **FACTOR ESTIMULANTE DE COLONIAS DE GRANULOCITOS Y MACRÓFAGOS ANTICUERPOS (ANTI-GM-CSF), SUERO**	Western-Blot.	7	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina litio (1 x Tubo sangre heparina litio) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo
GDF15P **FACTOR GDF-15, SUERO**	Inmunoanálisis	30	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Cong.]	Ambos 0 - 29 Años Inf 690,00 pg/mL Ambos Sup - 30 Años Inf 1290 pg/mL
FICO **FACTOR I DEL COMPLEMENTO, SUERO**	Inmunodifusión Radial.	10	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	20,00 - 70,00 mg/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
FAC2 **FACTOR II DE LA COAGULACIÓN, PLASMA**	Técnica coagulométrica.	6	Rec. 1 mL Plasma Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) [Cong.] Separar y congelar inmediatamente.	75,00 - 145,00 %
AFI **FACTOR INTRÍNSECO ANTICUERPOS, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 1,00 Índice Positivo: Sup= 1,00 Índice
FAC9 **FACTOR IX DE LA COAGULACIÓN, PLASMA**	Técnica coagulométrica.	6	Rec. 1 mL Plasma Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) [Cong.] Rechazo: Muestras a temperatura ambiente más de 2 horas. Separar y congelar inmediatamente.	65,00 - 140,00 %
C3FN **FACTOR NEFRITICO (C3 NEFRITICO), SUERO**	Hemólisis.	10	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] 1 mL de suero en tubo sin gel separador y congelar inmediatamente tras centrifugar	Negativo
FRL **FACTOR REUMATOIDE, MUESTRA BIOLÓGICA**	Turbidimetría.	2	Rec. 1 mL Líquido biológico [Refr.] Suero, líquido pleural y articular (sinovial), siempre y cuando la muestra no sea muy viscosa.	UI/mL Interpretación según criterio clínico

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
FR **FACTOR REUMATOIDE, SUERO**	Turbidimetría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Inf 14,00 UI/mL
FAC5 **FACTOR V DE LA COAGULACIÓN, PLASMA**	Técnica coagulométrica.	6	Rec. 1 mL Plasma Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) [Cong.] Rechazo: Muestras a temperatura ambiente más de 2 horas. Separar y congelar inmediatamente.	70,00 - 165,00 %
FAC7 **FACTOR VII DE LA COAGULACIÓN, PLASMA**	Técnica coagulométrica.	6	Rec. 1 mL Plasma Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) [Cong.] Rechazo: Muestras a temperatura ambiente más de 2 horas. Separar y congelar inmediatamente.	65,00 - 180,00 %
FA8 **FACTOR VIII ANTIGENICO, PLASMA**	Enzimoinmunoanálisis	7	Rec. 1 mL Plasma Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) [Cong.] Separar y congelar inmediatamente.	63,00 - 199,00 %
FAC8 **FACTOR VIII DE LA COAGULACION, PLASMA**	Técnica coagulométrica.	6	Rec. 1 mL Plasma Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) [Cong.] Rechazo: Muestras a temperatura ambiente más de 2 horas. Separar y congelar inmediatamente.	55,00 - 200,00 %

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
IF8 **FACTOR VIII INHIBIDOR, PLASMA**	Técnica coagulométrica.	10	Rec. 2 mL Plasma Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) [Cong.] El plama congelado es estable durante varios años. Muestra coagulada, volumen insuficiente (menos de 1 ml). Separar y congelar inmediatamente.	Bajo título de inhibidor: Inf= 5,00 UB Alto título de inhibidor: Sup 5,00 UB No se detecta: Inf= 0,50 UB
FVVB **FACTOR VON WILLEBRAND ACTIVIDAD (COFACTOR DE LA RISTOCETINA), PLASMA**	Turbidimetría.	6	Rec. 1 mL Plasma Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) [Cong.] Rechazo: Muestras a temperatura ambiente más de 2 horas. Separar y congelar inmediatamente.	Grupo 0 40,00 - 200,00 % Grupo A, B, AB 60,00 - 200,00 %
FVW **FACTOR VON WILLEBRAND ANTIGENICO, PLASMA**	Turbidimetría.	6	Rec. 1 mL Plasma Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) [Cong.] Rechazo: Muestras a temperatura ambiente más de 2 horas. Separar y congelar inmediatamente.	50,00 - 160,00 % Con la edad y en ciertas situaciones (embarazo, uso de la píldora anticonceptiva, esfuerzo físico, estrés) se observa un aumento de las concentraciones del factor von Willebrand antigénico (VWF:Ag). En sujetos del grupo 0 se observan concentraciones inferiores de factor von Willebrand antigénico si se comparan con sujetos de los grupos A, B y AB.
MFVW **FACTOR VON WILLEBRAND ESTUDIO MULTIMERICO, PLASMA**	Electroforesis en Agarosa.	42	Rec. 1 mL Plasma Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) [Cong.] Separar y congelar inmediatamente.	Se informa para cada paciente

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
FAC10 **FACTOR X DE LA COAGULACIÓN, PLASMA**	Técnica coagulométrica.	6	Rec. 1 mL Plasma Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) [Cong.] Rechazo: Muestras a temperatura ambiente más de 2 horas. Separar y congelar inmediatamente.	70,00 - 150,00 %
FXI **FACTOR XI DE LA COAGULACIÓN, PLASMA**	Técnica coagulométrica.	6	Rec. 1 mL Plasma Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) [Cong.] Rechazo: Muestras a temperatura ambiente más de 2 horas. Separar y congelar inmediatamente.	55,00 - 150,00 %
FXII **FACTOR XII DE LA COAGULACIÓN, PLASMA**	Técnica coagulométrica.	6	Rec. 1 mL Plasma Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) [Cong.] Rechazo: Muestras a temperatura ambiente más de 2 horas.	55,00 - 180,00 %
GFXII **FACTOR XII, DEFICIENCIA PARCIAL DE · F12(C46T) · HOT SPOT**	Hot Spot	7	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Indicado en informe adjunto *1* F12 [C46T]
FXIII **FACTOR XIII DE LA COAGULACION, PLASMA**	Técnica coagulométrica.	6	Rec. 1 mL Plasma Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) [Cong.] Rechazo: Muestras refrigeradas más de 48h. Separar y congelar inmediatamente.	60,00 - 150,00 %

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G06005 **FALLO EN ESPERMATOGÉNESIS · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AURKC, CATSPER1, DPY19L2, KLHL10, NOS1, NR5A1, PLCZ1, SEPT12, SPATA16, SYCP3, USP9Y *11*
G04051 **FALLO MEDULAR · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AP3B1, BRCA2, BRIP1, CSF3R, CTC1, CXCR4, DKC1, ELANE, ERCC4, FANCA, FANCB, FANCC, FANCD2, FANCE, FANCF, FANCG, FANCI, FANCL, FANCM, G6PC3, GATA1, GATA2, GFI1, HAX1, JAGN1, LAMTOR2, LYST, MPL, NHP2, NOP10, PALB2, RAB27A, RAC2, RAD51C, RBM8A, RMRP, RPL11, RPL15, RPL26, RPL35A, RPL5, RPS10, RPS17, RPS19, RPS24, RPS26, RPS7, RTEL1, RUNX1, SBDS, SLC37A4, SLX4, SMARCD2, SRP72, TAZ, TERC, TERT, TINF2, USB1, VPS13B, VPS45, WAS, WIPF1, WRAP53, XRCC2 *65*
G06007 **FALLO OVÁRICO PREMATURO · PANEL A · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AIRE, BMP15, CYP17A1, CYP19A1, DIAPH2, ERCC6, FIGLA, FOXL2, FSHR, GALT, LHCGR, LMNA, NOBOX, NOG, NR5A1, PGRMC1, POF1B, POLG, POR, PSMC3IP, SOHLH1, STAR *22*
G06008 **FALLO OVÁRICO PREMATURO · PANEL B · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BMP15, CYP17A1, CYP19A1, DIAPH2, ERCC6, FIGLA, FOXL2, FSHR, GALT, LHCGR, LMNA, NOBOX, NR5A1, POF1B, POLG, POR, PSMC3IP, STAR *18*
G09002 **FANCONI RENAL TUBULAR CON MODY TIPO 4, SÍNDROME DE · HNF4A · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	HNF4A *1*
G09003 **FANCONI RENAL, SÍNDROME DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	EHHADH, HNF4A, SLC34A1 *3*
FASC **FASCIOLA HEPATICA (DISTOMATOSIS) ANTICUERPOS, SUERO**	Hemaglutinación.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 1/160 Indeterminado: 1/160 1/160 Positivo: Sup= 1/320
DNFHMB **FASCIOLA HEPÁTICA DNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	Reacción en cadena de la polimerasa.	6	Rec. 50 g Heces Rec. 1 mL Secreción biliar	No se detecta

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
COFCPE **FENCICLIDINA CONFIRMACION (LC-MS/MS), CABELLO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	10	Rec. 200 mg Cabello (1 x Kit específico) Recoger cabello de la zona entre la nuca y la coronilla, lo más próximo a la raiz.	98,00 pg/mg
COFCOR **FENCICLIDINA CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), ORINA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 10 mL Orina [Refr.]	Se utiliza como criterio de Positividad que la concentración sea superior o igual al valor del límite de cuantificación más el valor de incertidumbre del ensayo. En caso contrario, el resultado es Negativo. Incertidumbre de medida 5 ng/mL Límite de cuantificación 25 ng/mL
COFCSAI **FENCICLIDINA CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SALIVA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 1 mL Saliva [Refr.]	Incertidumbre de medida 0,6 ng/mL Límite de cuantificación 2 ng/mL
COFCSTI **FENCICLIDINA CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SANGRE**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 10 mL Sangre total Oxalato/Fluoruro (1 x Tubo Sangre Total-Oxalato/Fluoruro) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total Heparina litio (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Tubo oxalato potásico/Fluoruro sódico Ref. SAP 600088318	Incertidumbre de medida 0,4 ng/mL Límite de cuantificación 2 ng/mL
PCP **FENCICLIDINA, ORINA**	Inmunocromatografía.	1	Rec. 10 mL Orina [Refr.]	Negativo: Inf= 25,00

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
CFTS **FENILALANINA / TIROSINA, PLASMA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	6	Rec. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Alt. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Rechazo: Muestra Hemolizada	Fenilalanina/tirosina: Inf 3,00 Fenilalanina: Ambos 0 - 2 Años 27,00 - 121,00 µmol/L Fenilalanina: Ambos 2 - 18 Años 37,00 - 91,00 µmol/L Fenilalanina: Ambos Sup - 18 Años 41,00 - 88,00 µmol/L Tirosina: Ambos 0 - 2 Años 23,00 - 128,00 µmol/L Tirosina: Ambos 2 - 18 Años 35,00 - 101,00 µmol/L Tirosina: Ambos Sup - 18 Años 37,00 - 95,00 µmol/L
SCFALASS **FENILALANINA SOBRECARGA, SANGRE SECA**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	20	Rec. 1 Muestra/s Sangre seca en papel de filtro (1 x Papel de filtro Whatman 903)	Se informa para cada paciente
G03189 **FENILCETONURIA · PAH · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA (2 tubos)) [Refr.]	PAH *1*
G03028 **FENILCETONURIA · PAH · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PAH *1*
FEN **FENITOÍNA / DIFENILHIDANTOÍNA, SUERO**	Inmunoanálisis enzimático	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Muestra alternativa:Plasma. No se puede utilizar sangre entera. Rechazo: Plasma con anticoagulantes: Heparina, citrato, oxalato y EDTA.	10,00 - 20,00 mg/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
FENLISU **FENITOINA LIBRE, SUERO**	Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectrometría de masas.	4	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 1 mL Plasma (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Extracción antes de la toma de la mañana.	I.Terapéutico: 0,50 - 2,00 mg/L
COFNBSAI **FENOBARBITAL CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SALIVA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	3	Rec. 1 mL Saliva [Refr.]	Incertidumbre de medida 4 ng/mL Límite de cuantificación 25 ng/mL
FENO **FENOBARBITAL, SUERO**	Inmunoanálisis enzimático	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	15,00 - 40,00 µg/mL
FETO **FENOL ORINA**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	9	Rec. 5 mL Orina final jornada [Refr.]	Excreción (creatinina): VLB®-INSST: Final de la jornada laboral (Fenol) Inf 120,00 mg/g crea Excreción (creatinina): Límite de cuantificación: Inf 1,00 mg/g crea : Límite de cuantificación: Inf 1,0 mg/L
FA1AT **FENOTIPO DE ALFA 1 ANTITRIPSINA**	Isoelectroenfoque.	20	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Cong.] Rechazo: Muestras lipémicas, con turbidez o con trazas de fribrina	Alfa 1 Antitripsina: 90,00 - 200,00 mg/dL Fenotipo: Interpretación: Alelo M: Normal de alfa 1 antitripsina Alelo S: Valor del 60% de alfa 1 antitripsina Alelo Z: Valor del 15% de alfa 1 antitripsina
FERSSF **FENOTIPO ERITROCITARIO SS (ESTUDIO FAMILIAR)**	Hemaglutinación.	7	Rec. 3 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Evitar remitir la muestra en fines de semana y vísperas de festivos.	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
EIFE **FENOTIPO ERITROCITARIO, SANGRE TOTAL**	Hemaglutinación.	10	Rec. 10 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) Evitar remitir la muestra en fines de semana y vísperas de festivos.	Se informa para cada paciente
FERH **FENOTIPO FACTOR RH (D,C,c,E,e), SANGRE TOTAL**	Hemaglutinación.	5	Rec. 10 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) Evitar remitir la muestra en fines de semana y vísperas de festivos.	Fenotipo Rh C: Se informa para cada paciente Fenotipo Rh c: Se informa para cada paciente Fenotipo Rh D: Se informa para cada paciente Fenotipo Rh E: Se informa para cada paciente Fenotipo Rh e: Se informa para cada paciente
COFENTOR **FENTANILO CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), ORINA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 5 mL Orina [Refr.]	Incertidumbre de medida 0,90 ng/mL Límite de cuantificación 5,00 ng/mL Se utiliza como criterio de Positividad que la concentración sea superior o igual al valor del límite de cuantificación más el valor de incertidumbre del ensayo. En caso contrario, el resultado es Negativo.
COFENTSA **FENTANILO CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SALIVA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 1 mL Saliva [Refr.]	Incertidumbre de medida: 0,40 ng/mL Límite de cuantificación: 2,00 ng/mL
COFENTST **FENTANILO CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SANGRE TOTAL**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 10 mL Sangre total Oxalato/Fluoruro (1 x Tubo Sangre Total-Oxalato/Fluoruro) [Refr.] Alt. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Tubo oxalato potásico/Fluoruro sódico Ref. SAP 600088318	Incertidumbre de medida: 0,40 ng/mL Límite de cuantificación: 2,00 ng/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G14018 **FEOCROMOCITOMA · RET · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	15	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	RET	*1*
G14022 **FEOCROMOCITOMA-PARAGANGLIOMA HEREDITARIO · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	15	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	KIF1B, MAX, RET, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, TMEM127, VHL	*10*
G14131 **FEOCROMOCITOMA-PARAGANGLIOMA HEREDITARIO · PANEL A · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	MAX, SDHA, TMEM127	*3*
G14091 **FEOCROMOCITOMA-PARAGANGLIOMA HEREDITARIO · PANEL B · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SDHAF1, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD	*5*
G14023 **FEOCROMOCITOMA-PARAGANGLIOMA HEREDITARIO · SDHB · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SDHB	*1*
G14111 **FEOCROMOCITOMA-PARAGANGLIOMA HEREDITARIO · SDHB · SANGER**	Secuenciación Sanger	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SDHB	*1*
G14112 **FEOCROMOCITOMA-PARAGANGLIOMA HEREDITARIO · SDHC · SANGER**	Secuenciación Sanger	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SDHC	*1*
G14090 **FEOCROMOCITOMA-PARAGANGLIOMA HEREDITARIO 1 (PGL1) · SDHD · SANGER**	Secuenciación Sanger	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SDHD	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
FERGL **FERRITINA GLICOSILADA, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	12	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Para poder realizar la determinación de ferritina glicosilada es necesario una valor de ferritina superior a 100 ng/mL.	50,00 - 80,00 %
FERRI **FERRITINA, SUERO**	Turbidimetría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Hombres 24,00 - 336,00 ng/mL Mujeres 11,00 - 307,00 ng/mL
G1802 **FG CARDIO (COMPLETO)**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	20	Rec. 6 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Saliva (1 x Oragene-DNA OG-500/ Oracollect-DNA OCR-100) Cumplimentar peticionario específico obligatorio. Se requiere consentimiento informado.	ABCB1, ABCG2, ACE, ADD1, ADRB1, ADRB2, AGTR1, APOA1, APOB, CACNA1C, CYP1A2, CYP2C19, CYP2C9, CYP2D6, CYP3A4, CYP3A5, GNB3, HMGCR, ITGB3, LDLR, LPL, LTC4S, NPPA, SLCO1B1, SREBP-1, VKORC1
G11142 **FG-2, SÍNDROME · FLNA · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FLNA *1*
G01022 **FIBRILACIÓN ATRIAL FAMILIAR TIPO 7 · KCNA5 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	KCNA5 *1*
G01024 **FIBRILACIÓN AURICULAR · KCNE2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	KCNE2 *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G01025 **FIBRILACIÓN AURICULAR · KCNJ2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	KCNJ2 *1*
G01026 **FIBRILACIÓN AURICULAR · KCNQ1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	KCNQ1 *1*
G01023 **FIBRILACIÓN AURICULAR · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABCB4, ABCC9, CACNA2D4, CACNB2, EMD, GATA4, GATA6, GJA1, GJA5, HCN4, JPH2, KCNA5, KCND3, KCNE1, KCNE2, KCNE3, KCNH2, KCNH2*, KCNJ2, KCNJ5, KCNJ8, KCNQ1, LDB3, LMNA, NKX2-5, NKX2-6, NPPA, NUP155, RYR2, SCN10A, SCN1B, SCN2B, SCN3B, SCN4B, SCN5A, TBX5, TNNI3K *37*
G1200 **FIBRILACIÓN AURICULAR, FAMILIAR · SCN5A · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SCN5A *1*
FIBR **FIBRINÓGENO DERIVADO, PLASMA**	Técnica coagulométrica.	1	Rec. 1 mL Plasma Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) [Refr.]	200,00 - 400,00 mg/dL
FIBVC **FIBRINÓGENO DIRECTO (VON CLAUSS), PLASMA**	Técnica coagulométrica.	1	Rec. 1 mL Plasma Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) [Refr.] Centrifugar lo antes posible durante 15 min de 1500 a 2500 x g y separar sobrenadante.	200,00 - 400,00 mg/dL
FGF23 **FIBROBLASTO FACTOR 23 DE CRECIMIENTO, PLASMA**	Enzimoinmunoanálisis	17	Rec. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.]	23,20 - 95,40 pg/mL
G08062 **FIBROCONDROGÉNESIS TIPO 1 · COL11A1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	COL11A1 *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G08137 **FIBRODISPLASIA OSIFICANTE PROGRESIVA · ACVR1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ACVR1 *1*
FBMX **FIBROMAX**	Cálculo.	5	Rec. 2 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	
FBNC **FIBRONECTINA, PLASMA**	Nefelometría.	1	Rec. 1 mL Plasma Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) [Refr.] Rec. 1 mL Plasma (1 x Tubo sangre citrato.) [Refr.]	25,00 - 40,00 mg/dL
G05006 **FIBROSIS HEPÁTICA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AHI1, ANKS6, ARL13B, ARL6, B9D1, B9D2, BBS1, BBS10, BBS12, BBS2, BBS4, BBS5, BBS7, BBS9, C5orf42, CC2D2A, CEP164, CEP290, CEP41, EVC, EVC2, GLIS2, IFT122, IFT80, INPP5E, INVS, IQCB1, KIF7, MKKS, MKS1, NEK8, NPHP1, NPHP3, NPHP4, OFD1, PKD1, PKD2 , PKHD1, RPGRIP1L, TCTN1, TCTN2, TCTN3, TMEM138, TMEM216, TMEM231, TMEM237, TMEM67, TRIM32, TTC21B, TTC8, WDR19, WDR35, ZNF423 *2,3*
FIB4 **FIBROSIS HEPÁTICA FIB-4 ÍNDICE, SUERO + SANGRE TOTAL**	Cálculo.	1	Rec. 2 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Índice FIB-4: Riesgo de fibrosis hepática avanzada: Ambos 0 - 65 Años Baja probabilidad: Inf 1,30 Índice FIB-4: Riesgo de fibrosis hepática avanzada: Ambos 0 - 65 Años Alta probabilidad: Sup 2,67 Índice FIB-4: Riesgo de fibrosis hepática avanzada: Ambos Sup - 65 Años Baja probabilidad: Inf 2,00 Índice FIB-4: Riesgo de fibrosis hepática avanzada: Ambos Sup - 65 Años Alta probabilidad: Sup 2,67 Índice FIB-4: Riesgo de fibrosis hepática avanzada: Ambos 0 - 65 Años Indeterminado: 1,30 - 2,67 Índice FIB-4: Riesgo de fibrosis hepática avanzada: Ambos Sup - 65 Años Indeterminado: 2,00 - 2,67

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G10002 **FIBROSIS PULMONAR · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABCA3, DKC1, MUC5B, NKX2-1, RTEL1, SFTPA1, SFTPA2, SFTPB, SFTPC, SFTPD, TERC, TERT, TINF2 *13*
G10007 **FIBROSIS QUÍSTICA · CFTR · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CFTR *1*
G10008 **FIBROSIS QUÍSTICA · CFTR · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CFTR *1*
G4054 **FIBROSIS QUÍSTICA · CFTR(DF508) · HOT SPOT**	Hot Spot	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CFTR [DF508] *1*
FBTS **FIBROTEST, SUERO**	Cálculo.	5	Rec. 5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	130,00 - 300,00 mg/dL Apolipoproteína A1: Hombres 105,00 - 175,00 mg/dL Apolipoproteína A1: Mujeres 105,00 - 205,00 mg/dL Bilirrubina total: Ambos 0 - 1 Días 2,00 - 6,00 mg/dL Bilirrubina total: Ambos 1 - 2 Días 6,00 - 10,00 mg/dL Bilirrubina total: Ambos 2 - 5 Días 4,00 - 8,00 mg/dL Bilirrubina total: Ambos 5 - 365 Días Inf 1,00 mg/dL Bilirrubina total: Ambos 1 - 17 Años Inf 1,00 mg/dL Bilirrubina total: Ambos Sup - 17 Años Inf 1,20 mg/dL Gamma-glutamil transferasa (GGT): Hombres Inf 55,00 U/L Gamma-glutamil transferasa (GGT): Mujeres Inf 38,00 U/L Alanina aminotransferasa (ALT/GPT): Hombres Inf 45,00 U/L Alanina aminotransferasa (ALT/GPT): Mujeres Inf 34,00 U/L Haptoglobina: 30,00 - 200,00 mg/dL Haptoglobina: Límite de cuantificación: 7,60 mg/dL
G11161 **FIEBRE MEDITERRANEA FAMILIAR · MEFV · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	MEFV *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G11160 **FIEBRE MEDITERRANEA FAMILIAR · MEFV · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	MEFV *1*
G11143 **FIEBRE RECURRENTE FAMILIAR (INCLUYE FIEBRE MEDITERRANEA) · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ADA2, ELANE, IL1RN, LPIN2 , MEFV , MVK , NLRC4, NLRP12, NLRP3, PSMB8, PSTPIP1 , RAB27A, TMEM173, TNFRSF1A , TRNT1 *15*
AFIL **FILARIA ANTICUERPOS, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 1,00 Índice
DNFIL **FILARIA DNA, SANGRE TOTAL**	Reacción en cadena de la polimerasa.	4	Rec. 3 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No se detecta
CKD **FILTRADO GLOMERULAR CKD-EPI**	Espectrometría de absorción molecular + cálculo	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	En función de la estimación del Filtrado Glomerular (FGe) se contemplan los siguientes estadios: Estadio 1 FGe normal o elevada (FGe Sup 90 ml/min) Estadio 2 Disminución leve de la FGe (FGe = 60-89 ml/min) Estadio 3a Disminución leve-moderada de la FGe (FGe = 45-59 ml/min) Estadio 3b Disminución moderada de la FGe (FGe = 30-44 ml/min) Estadio 4 Disminución severa de la FGe (FGe = 15-29 ml/min) Estadio 5 Enfermedad renal crónica terminal (FGe Inf15 ml/min) La definición de ERC requiere la presencia de un FGe Inf 60 durante al menos tres meses o de lesión renal (por alteraciones en el sedimento, albuminuria, pruebas de imagen o anatomía patológica.) Creatinina: Ambos 0 - 30 Días 0,31 - 0,98 mg/dL Creatinina: Ambos 30 - 365 Días 0,16 - 0,39 mg/dL Creatinina: Ambos 1 - 12 Años 0,26 - 0,77 mg/dL Creatinina: Hombres Sup - 12 Años 0,67 - 1,17 mg/dL Creatinina: Mujeres Sup - 12 Años 0,51 - 0,95 mg/dL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
FGCC **FILTRADO GLOMERULAR ESTIMADO POR CISTATINA C, SUERO**	Nefelometría.	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Cistatina C: 0,62 - 1,11 mg/L
RNVN **FLAVIVIRUS (FIEBRE DEL NILO OCCIDENTAL) RNA, MUESTRA BIOLOGICA**	PCR-Real Time.	6	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 3 mL LCR (1 x Tubo estéril) [Cong.] SIEMPRE congeladas (preferiblemente a -80ºC). Enviar con nieve carbónica Tubo estéril + recipiente de seguridad biólogica	No se detecta
RNAFA **FLAVIVIRUS AMARIL (FIEBRE AMARILLA) RNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	PCR-Real Time.	6	Suero, plasma en primera semana de síntomas; Después líquido cefalorraquídeo, líquido peritoneal o líquido pleural, dependiendo de presentación. A veces puede encontrarse en orina; Si el paciente ha fallecido biopsia hepática obtenida por punción u otro método. Sangre EDTA refrigerada (estabilidad<48h). Descatalogado para envios transoceánicos	No se detecta

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
FLECA **FLECAINIDA [APOCARD] ®, SUERO**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	7	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.] No utilizar tubos con gel separador. Se requiere peticionario específico.	Conc. potencialmente Tóxica: Sup 1000,00 µg/L I.Terapéutico: Adultos 300,00 - 800,00 µg/L I.Terapéutico: Niños 200,00 - 500,00 µg/L Conc.Tóxica: Sup 1600,00 µg/L
FLUCO **FLUCONAZOL, SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.] Especificar dosis y otros antifúngicos suministrados. La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis. El contenedor recomendado es el tubo seco (sin gel separador) para evitar procesos de adsorción del fármaco. En caso de no disponer de tubo seco, la extracción se puede realizar en tubo con gel separador, separando el suero dentro de las 2 horas posteriores a la recolección y transfiriéndolo a un tubo de alícuota para su transporte al laboratorio. Rechazo: Muestra hemolizada, lipémica y/o ictérica	2,00 - 15,00 mg/L Toxicidad: Sup 20,00 mg/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
FLUNS **FLUNITRAZEPAM, SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.] La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis. Rechazo: Muestra hemolizada, lipémica y/o ictérica	I.Terapéutico: 5,00 - 15,00 µg/L Toxicidad: Sup 50,00 µg/L Límite de cuantificación: 2,00 µg/L
G18010 **FLUOROPIRIMIDINAS, RESPUESTA A · DPYD · HOT SPOT**	Hot Spot	10	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	DPYD [c.1236G>A; c.1679T>G; c.1905+1 G>A; c.2846A>T] *1*
AGF **FLUORURO, AGUA**	Cromatografía de intercambio iónico en columna (detección fluorimétrica).	15	Rec. 100 mL Agua (1 x Envase aséptico) [Refr.]	Agua de diálisis Inf 0,20 mg/L Agua de red Inf 1,50 mg/L
FL/O **FLUORURO, ORINA FINAL DE JORNADA**	Electrodo Selectivo de Iones.	5	Rec. 2 mL Orina final jornada (1 x Tubo 5 mL.) [Refr.]	VLB®-INSST: Final de la jornada laboral (Fluoruro de hidrógeno, fluoruros) Inf 3,00 mg/L Límite de cuantificación: 0,10 mg/L
FLORIJ **FLUORURO, ORINA INICIO DE JORNADA**	Electrodo Selectivo de Iones.	5	Rec. 2 mL Orina inicio jornada (1 x Tubo 5 mL.) [Refr.]	VLB®-INSST: Inicio de la jornada laboral (Fluoruro de hidrógeno, fluoruros) Inf 2,00 mg/L Límite de cuantificación: 0,10 mg/L
FLS **FLUORURO, SUERO**	Electrodo Selectivo de Iones.	12	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Inf 0,20 mg/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
FLUO **FLUOXETINA Y NORFLUOXETINA (PROZAC), SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	7	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis. El contenedor recomendado es el tubo seco (sin gel separador) para evitar procesos de adsorción del fármaco. En caso de no disponer de tubo seco, la extracción se puede realizar en tubo con gel separador, separando el suero dentro de las 2 horas posteriores a la recolección y transfiriéndolo a un tubo de alícuota para su transporte al laboratorio. Rechazo: Muestra hemolizada, lipémica y/o ictérica	I. terapéutico: Fluoxetina + Norfluoxetina : 120 - 500 µg/L Toxicidad: Fluoxetina + Norfluoxetina: Superior a 1000 µg/L NOTA: La norfluoxetina es un metabolito activo, su nivel es importante cuando la fluoxetina es muy baja o indetectable. Cuando la fluoxetina está en la zona terapéutica, el nivel asociado de la norfluoxetina confirma una buena respuesta al tratamiento. Fluoxetina : Límite de cuantificación: 10,00 µg/L Norfluoxetina: Límite de cuantificación: 15,00 µg/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
FLURO **FLURAZEPAM, SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	6	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.] Muestra extraída en pre dosis. No utilizar tubos con gel separador. Rechazo: Muestra hemolizada, lipémica y/o ictérica	I.Terapéutico: 75,00 - 165,00 µg/L Conc.Tóxica: Sup 330,00 µg/L Límite de cuantificación: 3,00 µg/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
FLUVO **FLUVOXAMINA, SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	6	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis. El contenedor recomendado es el tubo seco (sin gel separador) para evitar procesos de adsorción del fármaco. En caso de no disponer de tubo seco, la extracción se puede realizar en tubo con gel separador, separando el suero dentro de las 2 horas posteriores a la recolección y transfiriéndolo a un tubo de alícuota para su transporte al laboratorio. Rechazo: Muestra hemolizada, lipémica y/o ictérica	I.Terapéutico: 60,00 - 230,00 µg/L Toxicidad: Sup 500,00 µg/L Límite de cuantificación: 0,00 - 12,00 µg/L
FAP **FOSFATASA ÁCIDA PROSTÁTICA (PAP) ACTIVIDAD, SUERO**	Cálculo.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Fosfatasa ácida total: Hombres Inf 5,50 U/L Fosfatasa ácida total: Mujeres Inf 4,50 U/L Fosfatasa ácida prostática: Hombres 0,40 - 2,60 U/L Fosfatasa ácida prostática: Mujeres Inf 0,30 U/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
FAPIE **FOSFATASA ACIDA PROSTÁTICA (PAP) CONCENTRACIÓN, SUERO**	Quimioluminiscencia.	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Conservar refrigerado después de la extracción hasta su congelación.	Inf 2,30 ng/mL
FATR **FOSFATASA ACIDA TARTRATO RESISTENTE, SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Inf 3,90 UI/L
FAC **FOSFATASA ACIDA TOTAL, SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Hombres Inf 5,50 U/L Mujeres Inf 4,50 U/L
FALOS **FOSFATASA ALCALINA OSEA, SUERO**	Quimioluminiscencia.	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Adultos 5,50 - 24,6 µg/L Ambos 0 - 1 Años 21,00 - 102 µg/L Ambos 2 - 5 Años 17,00 - 89 µg/L Ambos 6 - 9 Años 33,00 - 104 µg/L Ambos 10 - 11 Años 42,00 - 117 µg/L Mujeres 12 Años 15,00 - 132 µg/L Hombres 12 Años 24,00 - 144 µg/L Hombres 13 Años 32,00 - 138 µg/L Mujeres 13 Años 10,00 - 79 µg/L Mujeres 14 Años Inf 54 µg/L Hombres 14 Años Inf 145 µg/L Hombres 15 Años 4,00 - 117 µg/L Mujeres 15 Años 4,00 - 45 µg/L Mujeres 16 Años 6,00 - 31 µg/L Hombres 16 Años 5,00 - 74 µg/L Hombres 17 - 19 Años 7,00 - 32 µg/L Mujeres 17 - 19 Años 6,00 - 22 µg/L
FALL **FOSFATASA ALCALINA TOTAL, LÍQUIDO BIOLÓGICO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Líquido biológico [Refr.] Ayuno mínimo de 8 horas.	U/L Interpretación según criterio clínico

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
FAL **FOSFATASA ALCALINA TOTAL, SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Ayuno mínimo de 8 horas.	Hombres 0 - 1 Años 76,00 - 383,00 U/L Mujeres 0 - 1 Años 48,00 - 406,00 U/L Mujeres 1 - 10 Años 69,00 - 325,00 U/L Hombres 1 - 10 Años 86,00 - 345,00 U/L Hombres 10 - 13 Años 42,00 - 362,00 U/L Mujeres 10 - 13 Años 51,00 - 332,00 U/L Mujeres 13 - 15 Años 50,00 - 162,00 U/L Hombres 13 - 15 Años 74,00 - 390,00 U/L Hombres 15 - 18 Años 52,00 - 171,00 U/L Mujeres 15 - 18 Años 47,00 - 119,00 U/L Ambos Sup - 18 Años 30,00 - 120,00 U/L
AFEG **FOSFATIDIL ETANOLAMINA ANTICUERPOS IGG, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	9	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Los resultados positivos deben confirmarse en un plazo de 12 semanas Negativo: Inf 10,00 Indice
AFEM **FOSFATIDIL ETANOLAMINA ANTICUERPOS IGM, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	9	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 10,00 Indice
AFIG **FOSFATIDILINOSITOL ANTICUERPOS IGG, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	10	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 10,00 Índice Positivo: Sup= 10,00 Índice
AFIM **FOSFATIDILINOSITOL ANTICUERPOS IGM, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	10	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 10,00 Índice Positivo: Sup= 10,00 Índice
AFOA **FOSFATIDILSERINA ANTICUERPOS IgA, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 12,00 RU/mL
AFOG **FOSFATIDILSERINA ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 12,00 RU/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
AFOM **FOSFATIDILSERINA ANTICUERPOS IgM, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 12,00 RU/mL
PRTP **FOSFATO, REABSORCIÓN TUBULAR DE, ORINA**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 1 mL Orina 24h. (alícuota) (1 x Contenedor 2500 mL.) [Refr.] Necesarios orina de 24 h y suero.	Creatinina: Ambos 0 - 30 Días 0,31 - 0,98 mg/dL Creatinina: Ambos 30 - 365 Días 0,16 - 0,39 mg/dL Creatinina: Ambos 1 - 12 Años 0,26 - 0,77 mg/dL Creatinina: Hombres Sup - 12 Años 0,67 - 1,17 mg/dL Creatinina: Mujeres Sup - 12 Años 0,51 - 0,95 mg/dL Fósforo: Ambos 0 - 5 Años 4,30 - 5,40 mg/dL Fósforo: Hombres 5 - 14 Años 3,70 - 5,40 mg/dL Fósforo: Mujeres 5 - 14 Años 4,00 - 5,20 mg/dL Fósforo: Mujeres 14 - 16 Años 3,50 - 4,90 mg/dL Fósforo: Hombres 14 - 16 Años 3,50 - 5,30 mg/dL Fósforo: Ambos 16 - 18 Años 3,10 - 4,70 mg/dL Fósforo: Ambos Sup - 18 Años 2,50 - 4,50 mg/dL Concentración: mg/dL Reabsorción tubular de fosfatos en orina de 24 horas: 73,00 - 87,00 %
PKFS **FOSFOFRUCTOCINASA (PFK), SANGRE TOTAL**	Espectrometría.	17	Rec. 5 mL Sangre total Heparina sódica (1 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Evitar extracciones viernes, fines de semana o vísperas de festivos. Indicar edad, sexo, motivo de la petición y adjuntar siempre hemograma y recuento de reticulocitos. Sin efectos de transfusión reciente (mínimo 1 mes).	6,20 - 13,90 U/g Hb
G9583 **FOSFOGLICERATO QUINASA 1, DEFICIENCIA DE · PGK1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PGK1 *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
FOLI **FOSFOLÍPIDOS, SUERO**	Enzimático.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	125,00 - 366,00 mg/dL
G07008 **FOSFORILACIÓN OXIDATIVA COMBINADA, DEFICIENCIA DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AARS2, AIFM1, ATP5A1, C12ORF65, CARS2 , EARS2, ELAC2, FARS2, GFM1, LYRM4, MARS2, MRPL3, MRPL44, MRPS16, MRPS22, MTFMT, MTO1, NARS2, PNPT1, RMND1, SFXN4, SLC25A26, TARS2, TRMT10C, TSFM, TUFM, TXN2, VARS2 *28*
POO **FÓSFORO, ORINA**	Espectrometría.	1	Rec. 10 mL Orina (1 x Contenedor 25 mL.) [Refr.]	Inf mg/dL Interpretación según criterio clínico
OP **FÓSFORO, ORINA 24H**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Orina 24h. (alícuota) (1 x Contenedor 2500 mL.) [Refr.]	Excreción (24h): 400,00 - 1300,00 mg/24h Concentración: mg/dL Volumen de orina remitido (diuresis): 600,00 - 1600,00 mL
P **FÓSFORO, SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Ambos 0 - 5 Años 4,30 - 5,40 mg/dL Hombres 5 - 14 Años 3,70 - 5,40 mg/dL Mujeres 5 - 14 Años 4,00 - 5,20 mg/dL Mujeres 14 - 16 Años 3,50 - 4,90 mg/dL Hombres 14 - 16 Años 3,50 - 5,30 mg/dL Ambos 16 - 18 Años 3,10 - 4,70 mg/dL Ambos Sup - 18 Años 2,50 - 4,50 mg/dL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G06055 **FRAGMENTACIÓN DE CADENA SIMPLE Y DOBLE EN ADN ESPERMÁTICO · ENSAYO COMET**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	20	Rec. 1 mL Semen (1 x Contenedor estéril) [Cong.] - Las muestras deben recogerse con máximo 3 días de abstinencia (4-5 en casos de oligozoospermia). - La muestra debe enviarse en criotubos: o Si la muestra es normozoospérmica: se recomienda enviar 2 criotubos por cada técnica solicitada. o Si la muestra es oligozoospérmica: se recomienda enviar un mayor volumen en mas criotubos. Se requiere un mínimo de ~1M espermatozoides totales para realizar los test. Para concentraciones menores, consultar con el laboratorio. - Es necesario adjuntar la hoja de petición específica del estudio - Avisar al laboratorio antes - La congelación debe hacerse, como máximo, 1h después de la eyaculación. - Contactar previamente con el laboratorio para coordinar toma y envío de muestra. No realizar toma de muestras ni	

MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
		viernes ni vísperas de festivo.	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ADNES **FRAGMENTACIÓN DNA ESPERMÁTICO SCREENING (SCD), SEMEN**	Dispersión de la cromatina SCD.	10	Rec. 5 mL Semen (1 x Contenedor 25 mL.) [Cong.] La muestra debe ir acompañada de hoja de petición en la que se indiquen los datos del paciente y la prueba solicitada, así como del informe del seminograma realizado previamente. PREANALÍTICA A SEGUIR POR EL PACIENTE: - El paciente debe guardar entre 3-7 días de abstinencia hasta el día de la toma. - Antes de la recogida de la muestra debe lavarse bien manos y zona genital. - Llevar al laboratorio antes de 15 minutos tras la toma de la muestra, a una temperatura no mayor de 22ºC para que no inicie fragmentación por reacción térmica. PREANALÍTICA A SEGUIR POR EL CENTRO DE RECOGIDA: - Una vez en el Centro de recogida, se congelará inmediatamente la muestra (entre -16ºC y -20ºC). Estabilidad máxima: 1 mes.En caso de requerir conservar la muestra durante más	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
			tiempo, debe criopreservarse. Si el paciente solicita las determinaciones de Seminograma y Fragmentación espermática, la recolección de las muestras deben ser de dos tomas por separado, respetando las condiciones pre-analíticas entre ambas tomas.	
DNAFT **FRANCISELLA TULARENIS DNA, SUERO**	Reacción en cadena de la polimerasa.	8	Rec. 3 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	
FRTUG **FRANCISELLA TULARENSIS (TULAREMIA) ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	10	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 10,00 U/mL Indeterminado: 10,00 - 15,00 U/mL Positivo: Sup 15,00 U/mL
FRTUM **FRANCISELLA TULARENSIS (TULAREMIA) ANTICUERPOS IgM, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	10	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 10,00 U/mL Indeterminado: 10,00 - 15,00 U/mL Positivo: Sup 15,00 U/mL
FRAN **FRANCISELLA TULARENSIS (TULAREMIA) ANTICUERPOS, SUERO**	Aglutinación de Partículas.	7	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo
G09019 **FRASIER, SÍNDROME DE · WT1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	WT1 *1*
G4168 **FRUCTOSA, INTOLERANCIA A · ALDOB (A150P,A175D,N335K) · HOT SPOT**	Hot Spot	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ALDOB [A150P,A175D,N335K] *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G0112 **FRUCTOSA, INTOLERANCIA A · ALDOB · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ALDOB *1*
G4174 **FRUCTOSA, INTOLERANCIA A · ALDOB · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ALDOB *1*
FRUOR **FRUCTOSA, ORINA**	Espectrometría.	3	Rec. 10 mL Orina [Refr.]	Adultos Inf 100,00 mg/L Niños Inf 200,00 mg/L Recién Nacidos Inf 700,00 mg/L
FRUCS **FRUCTOSA, PLASMA SEMINAL**	Espectrometría.	3	Rec. 1 mL Plasma seminal [Cong.]	150,00 - 500,00 mg/dL
FRUCT **FRUCTOSA, SUERO**	Espectrometría.	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Inf 10,00 mg/dL
FRUC **FRUCTOSAMINA, SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	205,00 - 285,00 µmol/L
G7471 **FUCOSIDOSIS · FUCA1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FUCA1 *1*
G03192 **FUMARASA, DEFICIENCIA DE · FH · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FH *1*
G03143 **FUMARASA, DEFICIENCIA DE · FH · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FH

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
FUNG **FUNGIGRAMA**	Concentración inhibitoria mínima	6	Rec. 1 Muestra/s Frotis [Refr.]	
FUROS **FUROSEMIDA, SUERO**	Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectrometría de masas.	7	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.] Proteger de la luz.	I.Terapéutico: 2,00 - 5,00 mg/L
G15205 **FUSIONES EN TUMOR SÓLIDO · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	15	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	Se informa para cada paciente
GABAP **GABAPENTINA, SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Cong.] -Dosis administrada, frecuencia y vía de administración La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis. No utilizar tubos con gel separador.	I.Terapéutico: 0,50 - 6,00 mg/L Toxicidad: Sup 25,00 mg/L Límite de cuantificación: 0,40 mg/L
AGAD **GAD ANTICUERPOS, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 10,00 UI/mL Positivo: Sup= 10,00 UI/mL
GALCEL **GALACTOCEREBROSIDASA (ENF DE KRABBE), LEUCOCITOS**	Fluorimetría.	30	Rec. 10 mL Sangre total Heparina litio [Refr.] Indispensable aviso previo.	10,00 - 78,00 nmol/17h/mg pr

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G03126 **GALACTOQUINASA, DEFICIENCIA DE · GALK1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GALK1 *1*
G1FOER **GALACTOSA 1 FOSFATO ERITROCITARIA, SANGRE TOTAL**	Espectrometría.	16	Rec. 2 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) La muestra debe recepcionarse dentro de las 24 horas posteriores a su obtención. Coordinar previamente toma y envío de muestras con el laboratorio.	No se detecta
GALSU **GALACTOSA EN SUERO**	Espectrometría.	10	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	Inf 0,30 mg/dL
GA **GALACTOSA, PLASMA**	Espectrometría.	16	Rec. 3 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Se debe hacer ingesta de leche de tres a cuatro horas antes de la extracción	Ambos 0 - 3 Meses Inf 300 µmol/L Ambos 4 - 12 Meses Inf 175 µmol/L Límite de detección Inf 0,01 µmol/L Ambos Sup - 1 Años Inf 175 µmol/L
G03174 **GALACTOSEMIA · GALT · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GALT *1*
G03029 **GALACTOSEMIA · GALT · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GALT *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
GGTL **GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASA, LÍQUIDO BIOLÓGICO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Líquido biológico (1 x Tubo estéril) [Refr.] Ayuno mínimo de 8 horas.	U/L Interpretación según criterio clínico
GGT **GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASA, SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Ayuno mínimo de 8 horas.	Hombres Inf 55,00 U/L Mujeres Inf 38,00 U/L
IFGAM **GAMMA INTERFERON, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	10	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	Inf 0,58 UI/mL
GTO **GAMMA TOCOFEROL, SUERO**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Separar y congelar inmediatamente. Proteger de la luz.	0,50 - 3,00 mg/L
AGHBOR **GAMMA-HIDROXIBUTIRATO ÁCIDO (ÉXTASIS LÍQUIDO), ORINA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	7	Rec. 5 mL Orina (1 x Contenedor 25 mL.) [Cong.]	Negativo: Inf 10,00 mg/L Positivo: Sup= 10,00 mg/L Límite de cuantificación: 10,00 mg/L
GANCI **GANCICLOVIR**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	7	Rec. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	I.Terapéutico: Máximo 6,00 - 12,00 mg/L I.Terapéutico: Mínimo 0,20 - 1,00 mg/L
ACGBS **GANGLIOS BASALES ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Hemólisis, Lipemia, Contaminación	Interpretación: Negativo: Inf 1/10 Interpretación: Positivo: Sup= 1/10

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
QGGA **GANGLIÓSIDOS (SULFÁTIDOS, GM1,GM2,GM3,GM4,GD1A,GD1B,GD2,GD3,GT1A,GT1B,GQ1B) IgG, LCR**	Inmunodot	10	Rec. 1 mL LCR [Cong.]	Ac Gangliosidos IgG GD1A: No se detecta Ac Gangliosidos IgG GD1B: No se detecta Ac Gangliosidos IgG GD2: No se detecta Ac Gangliosidos IgG GD3: No se detecta Ac Gangliosidos IgG GM1: No se detecta Ac Gangliosidos IgG GM2: No se detecta Ac Gangliosidos IgG GM3: No se detecta Ac Gangliosidos IgG GM4: No se detecta Ac Gangliosidos IgG GQ1B: No se detecta Ac Gangliosidos IgG GT1A: No se detecta Ac Gangliosidos IgG GT1B: No se detecta Ac Sulfátide IgG: No se detecta
GAGP **GANGLIÓSIDOS (SULFATIDOS, GM1,GM2,GM3,GM4,GD1A,GD1B,GD2,GD3,GT1A,GT1B,GQ1B) IgG, SUERO**	Inmunodot	10	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	GD1A: No se detecta GD1B: No se detecta GD2: No se detecta GD3: No se detecta GM1: No se detecta GM2: No se detecta GM3: No se detecta GQ1B: No se detecta GT1A: No se detecta GT1B: No se detecta Sulfátide: No se detecta
QGAM **GANGLIÓSIDOS (SULFÁTIDOS,GM1,GM2,GM3,GM4,GD1A,GD1B,GD2,GD3,GT1A,GT1B,GQ1B) IgM, LCR**	Inmunodot	10	Rec. 1 mL LCR [Cong.]	Ac Gangliósidos IgM GD1A: No se detecta Ac Gangliósidos IgM GD1B: No se detecta Ac Gangliósidos IgM GD3: No se detecta Ac Gangliosidos IgM GM1: No se detecta Ac Gangliosidos IgM GM2: No se detecta Ac Gangliósidos IgM GM4: No se detecta Ac Gangliósidos IgM GQ1B: No se detecta Ac Gangliósidos IgM GT1A: No se detecta Ac Gangliósidos IgM GT1B: No se detecta Ac Gangliósidos IgM GD2: No se detecta Ac Gangliósidos IgM GM3: No se detecta Ac Sulfátide IgM: No se detecta

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
GAMP **GANGLIÓSIDOS (SULFATIDOS,GM1,GM2,GM3,GM4,GD1A,GD1B,GD2,GD3,GT1A,GT1B,GQ1B) IGM, SUERO**	Inmunodot	10	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	GD1A: No se detecta GD1B: No se detecta GD3: No se detecta GM1: No se detecta GM2: No se detecta GM4: No se detecta GQ1B: No se detecta GT1A: No se detecta GT1B: No se detecta GD2: No se detecta GM3: No se detecta Sulfátide: No se detecta
DNGV **GARDNERELLA VAGINALIS DNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	Reacción en cadena de la polimerasa.	6	Rec. 1 Muestra/s Frotis uretral [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Frotis cervicovaginal [Refr.] Alt. 10 mL Orina (primera micción) (1 x Contenedor estéril) [Refr.] Las muestras de frotis uretral y orina aplican exclusivamente en hombres, siendo el frotis uretral la muestra de elección.	DNA Gardnerella vaginalis: No se detecta
G14028 **GÁSTRICO FAMILIAR (INCLUYE GÁSTRICO DIFUSO), CÁNCER · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	15	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	APC, BMPR1A, CDH1, EPCAM, MAP3K6, MLH1, MSH2, MSH6, PDGFRA, PMS1, PMS2, PTEN, SDHA, SDHB, SDHC, SDHD, SMAD4, STK11, TP53 *19*
G14025 **GÁSTRICO FAMILIAR DIFUSO, CÁNCER · CDH1 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CDH1 *1*
G14026 **GÁSTRICO FAMILIAR DIFUSO, CÁNCER · CDH1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	15	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CDH1 *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
GASR **GASTRINA , SUERO**	Radioinmunoanálisis.	4	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Ayuno mínimo de 10 horas El suero debe congelarse en un plazo máximo de 4 horas.	23,10 - 113,30 pg/mL
G03173 **GAUCHER (FORMAS PERINATAL, TIPOS I, II, III Y IIIC), ENFERMEDAD DE · GBA (c.84dupG; c.115+1G>A; p.Asn409Ser; p.Leu483Pro)· HOT SPOT**	Hot Spot	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GBA [c.84dupG; c.115+1G>A; p.Asn409Ser; p.Leu483Pro] *1*
G03030 **GAUCHER (FORMAS PERINATAL, TIPOS I, II, III Y IIIC), ENFERMEDAD DE · GBA · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GBA *1*
G00001 **GENOMA**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	40	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	
G00120 **GENOMA CLÍNICO DÚO**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	40	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	
G00135 **GENOMA CLÍNICO TRÍO**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	40	Rec. 4 mL Sangre total EDTA EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
GRHIVS **GENOTIPO DE RESISTENCIAS DE HIV-1, SANGRE TOTAL**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	22	Rec. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Alt. 1 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo 5 mL.) [Refr.] Se requiere una carga viral reciente igual o superior a 1000 copias/mL. Indicar valor del resultado de la carga viral.	Se informa para cada paciente
HLAR **GENOTIPO HLA A ALTA RESOLUCIÓN**	PCR-SBT	17	Rec. 10 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Genotipo HLA A Alta resolución resultado: Se informa para cada paciente
HBAR **GENOTIPO HLA B ALTA RESOLUCION, SANGRE TOTAL**	PCR-SBT	17	Rec. 10 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Genotipo HLA B de alta resolución resultado: Se informa para cada paciente
HDQA **GENOTIPO HLA DQ DE ALTA RESOLUCIÓN**	PCR-SSO.	7	Rec. 10 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Genotipo HLA DQ de alta resolución resultado: Se informa para cada paciente
GHLB5 **GENOTIPO HLA-B*51/52 (HLA B5), SANGRE TOTAL**	Multiplex PCR-Real Time.	7	Rec. 1 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Se informa para cada paciente
HLCA **GENOTIPO HLAC DE ALTA RESOLUCIÓN**	PCR-SBT	22	Rec. 10 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Genotipo HLA C de alta resolución resultado: Se informa para cada paciente

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
GKHC **GENOTIPO KIR + HLA-C CLASE I, SANGRE TOTAL**	PCR-SSP.	9	Rec. 3 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GENOTIPO 2DL1: Ausencia GENOTIPO 2DL2: Ausencia GENOTIPO 2DL3: Ausencia GENOTIPO 2DL4: Ausencia GENOTIPO 2DL5: Ausencia GENOTIPO 2DP1: Ausencia GENOTIPO 2DS1: Ausencia GENOTIPO 2DS2: Ausencia GENOTIPO 2DS3: Ausencia GENOTIPO 2DS4: Ausencia GENOTIPO 2DS5: Ausencia GENOTIPO 3DL1: Ausencia GENOTIPO 3DL2: Ausencia GENOTIPO 3DL3: Ausencia GENOTIPO 3DP1: Ausencia GENOTIPO 3DS1: Ausencia Genotipo ligando KIR (grupo HLA C) : Se informa para cada paciente HAPLOTIPO KIR : Se informa para cada paciente LOCUS c (CLASE I): Se informa para cada paciente
GEKIR **GENOTIPO KIR, SANGRE TOTAL**	PCR-SSCP.	9	Rec. 3 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GENOTIPO 2DL1: Ausencia GENOTIPO 2DL2: Ausencia GENOTIPO 2DL3: Ausencia GENOTIPO 2DL4: Ausencia GENOTIPO 2DL5: Ausencia GENOTIPO 2DP1: Ausencia GENOTIPO 2DS1: Ausencia GENOTIPO 2DS2: Ausencia GENOTIPO 2DS3: Ausencia GENOTIPO 2DS4: Ausencia GENOTIPO 2DS5: Ausencia GENOTIPO 3DL1: Ausencia GENOTIPO 3DL2: Ausencia GENOTIPO 3DL3: Ausencia GENOTIPO 3DP1: Ausencia GENOTIPO 3DS1: Ausencia HAPLOTIPO KIR : Se informa para cada paciente

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
GENTA **GENTAMICINA, SUERO**	Inmunoanálisis enzimático	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] -Dosis administrada, frecuencia y vía de administración Obtener la muestra de sangre previamente a la administración del fármaco. Usualmente se determina la concentración en predosis matinal y en ayunas.	Pico: Intervalo Terapéutico: 6,00 - 10,00 µg/mL Concentraciones séricas recomendadas: Infecciones graves: 6,00 - 8,00 µg/mL Infecciones muy graves: 8,00 - 10,00 µg/mL Para dosificación con ampliación de intervalo (c/24h): 15 - 20 µg/mL Concentración Tóxica: Sup12,00 µg/mL µg/mL . Valle: Intervalo Terapéutico: 0,50 - 2,00 µg/mL Concentraciones séricas recomendadas Infecciones graves: 0,50 - 1,50 µg/mL Infecciones muy graves: 1,00 - 2,00 µg/mL Para dosificación con ampliación de intervalo (c/24h): Inf 0,5 µg/mL Concentración Tóxica: Sup2,00 µg/mL
GHREL **GHRELINA, SUERO**	Radioinmunoanálisis.	17	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Ayuno mínimo de 8 horas. Realizar extracción en frio y congelar inmediatamente. Separar el suero en otro contenedor (no congelar en tubo primario)	En ayunas 911,00 - 1715,00 pg/mL
GHRH **GHRH - HORMONA LIBERADORA DE HORMONA DE CRECIMIENTO, PLASMA**	Radioinmunoanálisis.	24	Rec. 2 mL Plasma EDTA Aprotinina (1 x Tubo Sangre EDTA Aprotinina) [Cong.] Congelar inmediatamente en menos de 1 hora.	Inf 60,00 ng/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
QUIRGIA2 **GIARDIA ANTÍGENO (2a MUESTRA), HECES**	Inmunocromatografía.	2	Rec. 1 g Heces 2a muestra (1 x Contenedor estéril) [Refr.]	Negativo
QUIRGIA3 **GIARDIA ANTÍGENO (3a MUESTRA), HECES**	Inmunocromatografía.	2	Rec. 1 g Heces 3a muestra (1 x Contenedor estéril) [Refr.]	Negativo
QUIRGIAR **GIARDIA ANTÍGENO, HECES**	Inmunocromatografía.	5	Rec. 1 g Heces (1 x Recipiente estéril) [Refr.] No congelar y descongelar la muestra.	Negativo
DNGIA **GIARDIA LAMBLIA DNA, HECES**	PCR-Real Time.	3	Rec. 5 g Heces [Refr.]	No se detecta
GIARAE **GIARDIA LAMBLIA IgA (EIA) ANTICUERPOS, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	5	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 5,00 U/mL Indeterminado: 5,00 - 10,00 U/mL Positivo: Sup 10,00 U/mL Los antígenos presentes en este procedimiento (EIA) son quistes de Giardia Lamblia inactivados, los cuales pueden presentar menor positividad que los antígenos usados en el anterior procedimiento (IFI) que eran trofozoítos
GIARGE **GIARDIA LAMBLIA IgG (EIA) ANTICUERPOS, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	5	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 10,00 U/mL Indeterminado: 10,00 - 16,00 U/mL Positivo: Sup 16,00 U/mL Los antígenos presentes en este procedimiento (EIA) son quistes de Giardia Lamblia inactivados, los cuales pueden presentar menor positividad que los antígenos usados en el anterior procedimiento (IFI) que eran trofozoítos

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
GIARME **GIARDIA LAMBLIA IgM (EIA) ANTICUERPOS, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	5	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 25,00 U/mL Indeterminado: 25,00 - 30,00 U/mL Positivo: Sup 30,00 U/mL Los antígenos presentes en este procedimiento (EIA) son quistes de Giardia Lamblia inactivados, los cuales pueden presentar menor positividad que los antígenos usados en el anterior procedimiento (IFI) que eran trofozoítos
G4277 **GITELMAN, SÍNDROME DE · SLC12A3 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SLC12A3 *1*
APAR **GLANDULA PARATIROIDES ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	7	Rec. 2 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/10 Interpretación: Positivo: Sup= 1/10
GSPG **GLANDULA SALIVAR PARÓTIDA ANTICUERPOS IGG, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	8	Rec. 0.3 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 1/10 Positivo: Sup= 1/10
G12024 **GLAUCOMA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CYP1B1, FOXC1, LMX1B, LTBP2, MYOC, NTF4, OPA1, OPTN, PAX6, PITX2, TBK1 , WDR36 *12*
AGLIDA **GLIADINA DEAMINADA ANTICUERPOS IGA, SUERO**	Inmunoanálisis con detección fluorescente	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Para enfermedad celíaca Sensibilidad diagnóstica: 82,7% Especificidad diagnóstica: 98,4% Negativo: Inf 7,00 U/mL Indeterminado: 7,00 - 10,00 U/mL Positivo: Sup 10,00 U/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
AGLIDG **GLIADINA DEAMINADA ANTICUERPOS IGG, SUERO**	Inmunoanálisis con detección fluorescente	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Para enfermedad celíaca Sensibilidad diagnóstica: 87,8% Especificidad diagnóstica: 98,4% Negativo: Inf 7,00 U/mL Indeterminado: 7,00 - 10,00 U/mL Positivo: Sup 10,00 U/mL
RGLCLA **GLICINA RECEPTOR ANTICUERPOS, LCR**	Ensayo celular	16	Rec. 2 mL LCR [Refr.]	Indicado en informe adjunto
RGSULA **GLICINA RECEPTOR ANTICUERPOS, SUERO**	Ensayo celular	16	Rec. 2 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Indicado en informe adjunto
G03031 **GLICOSILACIÓN, TRASTORNO DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ALG1, ALG11, ALG12, ALG13, ALG2, ALG3, ALG6, ALG8, ALG9, ATP6V0A2, B3GALTL, B4GALT1, COG1, COG4, COG5, COG6, COG7, COG8, DDOST, DHDDS, DOLK, DPAGT1, DPM1, DPM2, DPM3, GNE, MAN1B1, MGAT2, MOGS, MPDU1, MPI, PGM1, PMM2, RFT1, SEC23B, SLC35A1, SLC35A2, SLC35C1, SRD5A3, TMEM165, TUSC3 *41*
GLIPOR **GLIFOSATO, ORINA**	Cromatografía de Gases / Espectrometría Masas.	14	Rec. 5 mL Orina	Límite de detección: 0,1 µg/L Personas expuestas 1,00 - 238,00 µg/L Personas sin exposición específica Inf 0,80 µg/L
TRANS **GLOBULINA LIgADORA DE CORTISOL - TRANSCORTINA- CBG, SUERO**	Radioinmunoanálisis.	15	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	Hombres 22,00 - 55,00 mg/L Mujeres 40,00 - 154,00 mg/L
G09050 **GLOMERULOESCLEROSIS FOCAL SEGMENTARIA 4 · APOL1· SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	APOL1 *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
GLUCA120 **GLUCAGÓN ESTIMULACIÓN (120 MINUTOS), PLASMA**	Radioinmunoanálisis.	7	Rec. 2 mL Plasma 120 m. EDTA Aprotinina (1 x Tubo Sangre EDTA Aprotinina) [Cong.] Separar y congelar inmediatamente. Ayuno mínimo de 12 horas.	pg/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
GLUCA15 **GLUCAGON ESTIMULACION (15 MINUTOS), PLASMA**	Radioinmunoanálisis.	7	Rec. 2 mL Plasma 15 m. EDTA Aprotinina (1 x Tubo Sangre EDTA Aprotinina) [Cong.] Ayuno mínimo de 12 horas. Separar y congelar inmediatamente.	pg/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
GLUCA150 **GLUCAGÓN ESTIMULACIÓN (150 MINUTOS), PLASMA**	Radioinmunoanálisis.	7	Rec. 2 mL Plasma 150 m. EDTA Aprotinina (1 x Tubo Sangre EDTA Aprotinina) [Cong.] Separar y congelar inmediatamente. Ayuno mínimo de 12 horas.	pg/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
GLUCA180 **GLUCAGÓN ESTIMULACIÓN (180 MINUTOS), PLASMA**	Radioinmunoanálisis.	7	Rec. 2 mL Plasma 180 m. EDTA Aprotinina (1 x Tubo Sangre EDTA Aprotinina) [Cong.] Separar y congelar inmediatamente. Ayuno mínimo de 12 horas.	pg/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
GLUCA30 **GLUCAGÓN ESTIMULACIÓN (30 MINUTOS), PLASMA**	Radioinmunoanálisis.	7	Rec. 2 mL Plasma 30 m. EDTA Aprotinina (1 x Tubo Sangre EDTA Aprotinina) [Cong.] Separar y congelar inmediatamente. Ayuno mínimo de 12 horas.	pg/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
GLUCA60 **GLUCAGÓN ESTIMULACIÓN (60 MINUTOS), PLASMA**	Radioinmunoanálisis.	7	Rec. 2 mL Plasma 60 m. EDTA Aprotinina (1 x Tubo Sangre EDTA Aprotinina) [Cong.] Separar y congelar inmediatamente. Ayuno mínimo de 12 horas.	pg/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
GLUCA90 **GLUCAGÓN ESTIMULACIÓN (90 MINUTOS), PLASMA**	Radioinmunoanálisis.	7	Rec. 2 mL Plasma 90 m. EDTA Aprotinina (1 x Tubo Sangre EDTA Aprotinina) [Cong.] Separar y congelar inmediatamente. Ayuno mínimo de 12 horas.	pg/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
GLP1 **GLUCAGON LIKE PEPTIDE (GLP-1), PLASMA**	Radioinmunoanálisis.	32	Rec. 2 mL Plasma EDTA Aprotinina (1 x Tubo Sangre EDTA Aprotinina) [Cong.] Centrifugar a 3000 rpm 10 minutos Obtener la muestra entre la 8 y las 9 horas de la mañana. Plazo de entrega aproximado. Consultar con el laboratorio. Tratamiento preanalítico:	4,30 - 28,60 pmol/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
GLUCA **GLUCAGÓN, PLASMA**	Radioinmunoanálisis.	7	Rec. 2 mL Plasma EDTA Aprotinina (1 x Tubo Sangre EDTA Aprotinina) [Cong.] Separar y congelar inmediatamente. Ayuno mínimo de 12 horas.	Inf 208,00 pg/mL
G03032 **GLUCOGENOSIS · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AGL, ALDOA, ALDOB, ENO3, FBP1, G6PC, GAA, GBE1, GYG1, GYS1, GYS2, LAMP2, LDHA, PFKM, PGAM2, PGK1, PGM1, PHKA1, PHKA2, PHKB, PHKG2, PRKAG2, PRKAG3, PYGL, PYGM, SLC2A2, SLC37A4 *27*
G03071 **GLUCOGENOSIS 5 · PYGM · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PYGM *1*
G03072 **GLUCOGENOSIS 7 · PFKM · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PFKM *1*
G03127 **GLUCOGENOSIS TIPO 1A · G6PC · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	G6PC *1*
G1509 **GLUCOGENOSIS TIPO IV · GBE1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GBE1 *1*
G1159 **GLUCOGENOSIS TIPO V · PYGM (R49X,G204S,Y84X,W797R, del708/709) · HOT SPOT**	Hot Spot	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PYGM [R49X,G204S,Y84X,W797R,del708/709] *1*
G03149 **GLUCOGENOSIS V (ENFERMEDAD DE McArdle) · PYGM (1,2-5,17,19,20) · HOT SPOT**	Hot Spot	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PYGM [1,2-5,17,19,20] *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
GS6 **GLUCOSA (6'), SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero 6 m (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 1 mL Plasma 6 m. Fluoruro EDTA (1 x Tubo fluoruro inhibidor glucolisis) [Refr.]	mg/dL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
GS10 **GLUCOSA (10') SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero 10 m (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 1 mL Plasma Fluoruro EDTA (1 x Tubo fluoruro inhibidor glucolisis) [Refr.]	mg/dL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
GS15 **GLUCOSA (15') SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero 15 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 1 mL Plasma 15 m. Fluoruro EDTA (1 x Tubo fluoruro inhibidor glucolisis) [Refr.]	mg/dL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
GS20 **GLUCOSA (20'), SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero 20 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 1 mL Plasma 20 m. Fluoruro EDTA (1 x Tubo fluoruro inhibidor glucolisis) [Refr.]	mg/dL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
G30 **GLUCOSA (30'), SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero 30 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 1 mL Plasma 30 m. Fluoruro EDTA (1 x Tubo fluoruro inhibidor glucolisis) [Refr.]	mg/dL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G45 **GLUCOSA (45') SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero 45 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 1 mL Plasma 45 m. Fluoruro EDTA (1 x Tubo fluoruro inhibidor glucolisis) [Refr.]	mg/dL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
G60 **GLUCOSA (60') SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero 60 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 1 mL Plasma 60 m. Fluoruro EDTA (1 x Tubo fluoruro inhibidor glucolisis) [Refr.]	mg/dL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
G90 **GLUCOSA (90') SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero 90 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 1 mL Plasma 90 m. Fluoruro EDTA (1 x Tubo fluoruro inhibidor glucolisis) [Refr.]	mg/dL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
CGL **GLUCOSA (100 g. - Basal, 60', 120', 180'), SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero 180 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 1 mL Suero 120 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 1 mL Suero 60 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación resultados: - Basal: Inf105 mg/dL - 60 minutos: Inf190 mg/dL - 120 minutos: Inf165 mg/dL - 180 minutos: Inf145 mg/dL Se considera diagnóstico de diabetes gestacional si dos o más resultados son iguales o superiores a los límites indicados. Si solamente un resultado excede los límites sería diagnosticada de intolerancia a la glucosa en el embarazo y se recomendaría repetir la prueba en tres o cuatro semanas. Recomendado por el Grupo Español de Diabetes y Embarazo (GEDE, 2021) y promovida por el National Diabetes Data Group (NDDG).

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G120 **GLUCOSA (120'), SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero 120 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 1 mL Plasma 120 m. Fluoruro EDTA (1 x Tubo fluoruro inhibidor glucolisis) [Refr.]	mg/dL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
G150 **GLUCOSA (150'), SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero 150 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 1 mL Plasma 150 m. Fluoruro EDTA (1 x Tubo fluoruro inhibidor glucolisis) [Refr.]	mg/dL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
G180 **GLUCOSA (180'), SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero 180 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 1 mL Plasma 180 m. Fluoruro EDTA (1 x Tubo fluoruro inhibidor glucolisis) [Refr.]	mg/dL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
G210 **GLUCOSA (210'), SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero 210 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 1 mL Plasma 210 m. Fluoruro EDTA (1 x Tubo fluoruro inhibidor glucolisis) [Refr.]	mg/dL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
G240 **GLUCOSA (240'), SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero 240 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 1 mL Plasma 240 m. Fluoruro EDTA (1 x Tubo fluoruro inhibidor glucolisis) [Refr.]	mg/dL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G300 **GLUCOSA (300'), SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero 300 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 1 mL Plasma 300 m. Fluoruro EDTA (1 x Tubo fluoruro inhibidor glucolisis) [Refr.]	mg/dL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
G360 **GLUCOSA (360'), SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero 360 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 1 mL Plasma 360 m. Fluoruro EDTA (1 x Tubo fluoruro inhibidor glucolisis) [Refr.]	mg/dL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
CG **GLUCOSA (75 g. - Basal, 60', 120'), SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero 120 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 1 mL Suero 60 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Glucosa 120 min (75g de Glucosa): Inf 140,00 mg/dL : 74,00 - 106,00 mg/dL
GOS **GLUCOSA (TEST DE O'SULLIVAN)**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 1 mL Plasma Fluoruro EDTA (1 x Tubo fluoruro inhibidor glucolisis) [Refr.]	: 74,00 - 106,00 mg/dL Glucosa (Test de O'Sullivan): Inf 140,00 mg/dL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
GS **GLUCOSA , SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 1 mL Plasma Fluoruro EDTA (1 x Tubo fluoruro inhibidor glucolisis) [Refr.] Ayuno mínimo de 6 h Centrifugar (<1h tras extracción), y conservar en frío después de la extracción, remitir tubo primario, no es necesario alicuotar.	74,00 - 106,00 mg/dL
G6PD **GLUCOSA 6 FOSFATO DESHIDROGENASA (G6PDH) ERITROCITARIA, SANGRE TOTAL**	Enzimático UV.	3	Rec. 2 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Adjuntar datos hematíes y hemoglobina si es posible.	G6PDH eritrocitaria: 7,90 - 16,30 UI/g Hb
GOR **GLUCOSA CUANTIFICADA EN ORINA**	Espectrometría.	1	Rec. 10 mL Orina [Refr.]	Inf 50,00 mg/dL
GSCR **GLUCOSA LCR**	Espectrometría.	4	Rec. 1 mL LCR [Refr.]	40,00 - 80,00 mg/dL
GDD **GLUCOSA POSTPRANDIAL, SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 1 mL Plasma Fluoruro EDTA (1 x Tubo fluoruro inhibidor glucolisis) [Refr.]	Inf 120,00 mg/dL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
GSL **GLUCOSA, LÍQUIDO BIOLOGICO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Líquido biológico [Refr.]	mg/dL No se dispone de límites de referencia para esta magnitud.
GSLS **GLUCOSA, LÍQUIDO SINOVIAL**	Espectrometría.	4	Rec. 1 mL Líquido sinovial (1 x Tubo 5 mL.) [Refr.]	mg/dL Interpretación según criterio clínico
G24 **GLUCOSA, ORINA 24H**	Espectrometría.	1	Rec. 10 mL Orina 24h. (alícuota) (1 x Contenedor 2500 mL.) [Refr.]	Excreción (24h): Inf 500,00 mg/24h Volumen de orina remitido (diuresis): 600,00 - 1600,00 mL
G1177 **GLUCOSA-6-FOSFATO DESHIDROGENASA (ANEMIA HEMOLÍTICA), DEFICIENCIA DE · G6PD · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	G6PD *1*
GLUCO **GLUCOSAMINOGLUCANOS-MUCOPOLISACARIDOSIS (SCREENING), ORINA**	Espectrometría.	27	Rec. 50 mL Orina 24h. (alícuota) [Cong.] Se acepta muestra de orina parcial en niños y bebés.	Indicado en informe adjunto
GLDH **GLUTAMATO DESHIDROGENASA (GLDH), SUERO**	Espectrometría.	9	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Hombres Inf 7,00 U/L Mujeres Inf 5,00 U/L
G03087 **GLUTARIL-COA DESHIDROGENASA, DEFICIENCIA DE · GCDH · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GCDH *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
GLUO **GLUTATION OXIDADO-REDUCIDO**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	37	Rec. 500 uL Suero (1 x Kit específico) [Cong.] Se precisa KIT ESPECÍFICO. Obtener 8 ml de sangre en un tubo facilitado y mezclar por inversión como mínimo 5 veces. Centrifugar 10 min a 3000 rpm durante la hora siguiente a la obtención de la muestra. Transferir 500 µL de suero claro por análisis (glutatión total, glutatión oxidado y reducido) en el tubo específico con conservante (solicitar al laboratorio), y verificar que cierra bien el tapón del tubo. Mezclar el suero transferido con ayuda de un vórtex. Envíar la muestra al laboratorio central de Barcelona congelada dentro de las 24 horas posteriores a la extracción de la muestra. Kit Ref SAP: 600063597	Glutation oxidado: 0,16 - 0,50 µmol/L Glutation reducido: 3,80 - 5,50 µmol/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
GT **GLUTATION TOTAL**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	30	Rec. 500 uL Suero (1 x Kit específico) [Cong.] Se precisa KIT ESPECÍFICO. Obtener 8 ml de sangre en un tubo facilitado y mezclar por inversión como mínimo 5 veces. Centrifugar 10 min a 3000 rpm durante la hora siguiente a la obtención de la muestra. Transferir 500 µL de suero claro por análisis (glutatión total, glutatión oxidado y reducido) en el tubo específico con conservante (solicitar al laboratorio), y verificar que cierra bien el tapón del tubo. Mezclar el suero transferido con ayuda de un vórtex. Envíar la muestra al laboratorio central de Barcelona congelada dentro de las 24 horas posteriores a la extracción de la muestra. Kit Ref SAP: 600063597	3,80 - 5,50 µmol/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
GLDT **GLUTEN DETECT , HECES**	Enzimoinmunoanálisis	10	Rec. 1 g Heces [Cong.] - Contenedor estéril. -Heces frescas (aproximadamente entre 1-2 g o ml en caso de muestras líquidas). -Importante evitar que la muestra entre en contacto con orina -Recoger la muestra en un envase limpio, seco y sin ningún aditivo o conservante añadido.	Gluten detect: Negativo: Inf 0,16 µg GIP / gr
G12069 **GOLDMANN-FAVRE, SÍNDROME DE · NR2E3 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	NR2E3 *1*
GOLI **GOLIMUMAB / ANTICUERPOS ANTI-GOLIMUMAB, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	7	Rec. 2 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Extracción realizada antes de la siguiente toma. Indicar la primera toma, la frecuencia, la dosis y la fecha de la última dosis. Remitir informe clínico y motivo de solicitud de estudio.	Ac. Golimumab: Inf 10,00 UA/mL
G14032 **GORLIN-GOLTZ (NEVO DE CÉLULAS BASALES), SÍNDROME DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	15	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PTCH1, PTCH2, SUFU *3*
G14033 **GORLIN-GOLTZ (NEVO DE CÉLULAS BASALES), SÍNDROME DE · PTCH1 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PTCH1 *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G14034 **GORLIN-GOLTZ (NEVO DE CÉLULAS BASALES), SÍNDROME DE · PTCH1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	15	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PTCH1 *1*
GRAM **GRAM**	Tinción / Observación microscópica.	2	Rec. 1 Muestra/s Portaobjetos	Se informa para cada paciente
GRAM2 **GRAM (2ª MUESTRA)**	Tinción / Observación microscópica.	2	Rec. 1 Muestra/s Portaobjetos	
ACNEUTI **GRANULOCITARIOS (NEUTROFILOS) ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	7	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo
COGRAN **GRANULOCITOS- CAPACIDAD OXIDATIVA, SANGRE TOTAL**	Citometría de flujo.	16	Rec. 10 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica)	Inf Se informa para cada paciente

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G1412 **GRANULOMATOSA CRÓNICA, ENFERMEDAD · NCF1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] - Resumen de la historia clínica del paciente. Plazo de entrega orientativo dependiendo de la complejidad en la secuenciación del Gen estudiado y de las caracteristicas genotípicas inherentes al paciente. Se requiere consentimiento informado. - En caso que proceda y si está disponible, copia del informe del caso índice familiar.	NCF1 *1*
G17015 **GRANULOMATOSA CRÓNICA, ENFERMEDAD · PANEL · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CYBA, CYBB, NCF2, NCF4 *4*
GRIFO **GRIFO, ANALISIS BASICO DE AGUA**	No se aplica.	17	Rec. 500 mL Agua (1 x Envase estéril con tiosulfato) [Refr.] Rec. 2000 mL Agua (1 x Envase aséptico) [Refr.] Las muestras deben llegar al laboratorio de lunes a jueves.	Indicado en informe adjunto

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
PRESP **GRIPE A,B y SARS CoV-2 , MUESTRA NASOFARÍNGEA**	RT-PCR	1	Rec. 1 Muestra/s Exudado nasal (1 x Escobillón con medio de transporte para virus) [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Exudado faringeo (1 x Escobillón con medio de transporte para virus) [Refr.]	PCR Virus gripe A (MDX) : Negativo PCR Virus gripe B (MDX) : Negativo Detección de ARN de SARS-CoV-2 (MDX diasorin): Negativo
GENABO **GRUPO SANGUÍNEO (ABO) GENOTIPO, SANGRE TOTAL**	Reacción en cadena de la polimerasa.	9	Rec. 2 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Se informa para cada paciente
GRU **GRUPO SANGUÍNEO HEMÁTICO (ABO) Y RH, SANGRE TOTAL**	Hemaglutinación.	2	Rec. 1 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Sangre proveniente de cordocentesis	Grupo sanguíneo: Se informa para cada paciente Factor Rh (D): Se informa para cada paciente
GUDC **GUANIDINOACETATO Y CREATINA (DEFICIENCIA DE CREATINA CEREBRAL), ORINA**	Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectrometría de masas.	30	Rec. 10 mL Orina [Cong.]	Cociente Creatina/creatinina: Ambos 0 - 6 Años 0,03 - 1,8 mmol/mol creat Cociente Creatina/creatinina: Ambos 7 - 12 Años 0,03 - 1,44 mmol/mol creat Cociente Creatina/creatinina: Ambos Sup - 12 Años 0,02 - 0,40 mmol/mol creat Guanidino acetato: Ambos 0 - 6 Años 13,00 - 124,00 mmol/mol creat Guanidino acetato: Ambos 7 - 12 Años 8,00 - 94,00 mmol/mol creat Guanidino acetato: Ambos Sup - 12 Años 11,00 - 84,00 mmol/mol creat

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
GUCR **GUANIDINOACETATO Y CREATINA (DEFICIENCIAS DE CREATINA CEREBRAL), PLASMA**	Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectrometría de masas.	16	Rec. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Ayuno de 8 horas. Centrifugar la muestra de sangre a 2500rpm 10 minutos a temperatura ambiente en las primeras 2 horas de su obtención, separar el sobrenadante a otro tubo y congelarlo inmediatamente a -20ºC.	Creatina: Ambos 0 - 11 Años 15,00 - 118,00 µmol/L Creatina: Ambos Sup - 11 Años 18,00 - 112,00 µmol/L Guanidinoacetato: Ambos 0 - 11 Años 0,70 - 2,70 µmol/L Guanidinoacetato: Ambos Sup - 11 Años 1,20 - 3,60 µmol/L
PMETIN **GUTSCREEN**	No se aplica.	20	Rec. 60 mL Orina (primera micción) (1 x Kit específico) [Refr.] Documentación: Peticionario general. Utilizar kit específico. Bote de orina con tapa amarilla (contiene conservante en polvo).	Se informa para cada paciente
DNHD **HAEMOPHILUS DUCREYI DNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	Nested-PCR.	8	Rec. 2 Muestra/s Exudado genital [Refr.] Rec. 1 mL Orina [Refr.]	DNA Haemophilus ducreyi: No se detecta
DNHI **HAEMOPHILUS INFLUENZAE DNA SEROGRUPO B, MUESTRA BIOLÓGICA**	Nested-PCR.	8	Rec. 1 mL Sangre total EDTA [Refr.] Rec. 1 mL Líquido pleural [Refr.] Rec. 1 mL LCR [Refr.] Rec. 1 mL BAL [Refr.]	DNA Haemophilus influenzae (resultado): No se detecta
AHAE **HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B ANTICUERPOS IGG, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Contacto previo 0,15 - 1,00 µg/mL Nivel protector Sup 1,00 µg/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G02042 **HAJDU-CHENEY, SÍNDROME DE · NOTCH2 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	NOTCH2 *1*
G3127 **HALLERVORDEN - SPATZ, ENFERMEDAD DE · PANK2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PANK2 *1*
HALS **HALOPERIDOL, SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	6	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Se aconseja toma de muestra 12 horas después de la última dosis. El contenedor recomendado es el tubo seco (sin gel separador) para evitar procesos de adsorción del fármaco. En caso de no disponer de tubo seco, la extracción se puede realizar en tubo con gel separador, separando el suero dentro de las 2 horas posteriores a la recolección y transfiriéndolo a un tubo de alícuota para su transporte al laboratorio. Rechazo: Muestra hemolizada, lipémica y/o ictérica	I.Terapéutico: 5,00 - 17,00 µg/L Toxicidad: Sup 50,00 µg/L Límite de cuantificación: 1,00 µg/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
HAM **HAM TEST, SANGRE TOTAL**	Hemólisis.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 1 mL Sangre total Ác.citrato dextrosa (1 x Tubo sangre A.C.D.) [Refr.] Evitar remitir la muestra en fines de semana y vísperas de festivos.	Negativo
HAMA **HAMA [HUMAN ANTI MOUSE ANTIBODIES], SUERO**	Enzimoinmunoanálisis Múltiple.	17	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo
HANTA **HANTAVIRUS ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	7	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Para valoración clínica del paciente se recomienda la determinación simultánea de IgM e IgG. Rogamos adjunten edad e información clínica del paciente indicando sospecha de patología renal o respiratoria.	Interpretación: Negativo: Inf 1/100 Interpretación: Positivo: Sup= 1/100

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
HANTAM **HANTAVIRUS ANTICUERPOS IgM, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	7	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Para valoración clínica del paciente se recomienda la determinación simultánea de IgM e IgG. Rogamos adjunten edad e información clínica del paciente indicando sospecha de patología renal o respiratoria.	Interpretación: Negativo: Inf 1/100 Interpretación: Positivo: Sup= 1/100
HAPT **HAPTOGLOBINA, SUERO**	Turbidimetría.	1	Rec. 0.4 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.4 mL Plasma Heparina litio (1 x Tubo sangre heparina litio) [Refr.] Alt. 0.4 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	30,00 - 200,00 mg/dL Límite de cuantificación: 7,60 mg/dL
G08099 **HARTSFIELD, SÍNDROME DE · FGFR1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FGFR1 *1*
HG24 **HCG BETA (GONADOTROFINA CORIONICA), ORINA**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Orina 24h. (alícuota) (1 x Envase aséptico) [Refr.] Muestra alternativa: orina de micción Volumen indispensable.	Excreción (24h): Inf 30,00 U/24h Volumen de orina remitido (diuresis): 600,00 - 1600,00 mL
HCGO **HCG BETA (GONADOTROFINA CORIONICA), ORINA MICCIÓN**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Orina (1 x Envase aséptico) [Refr.]	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
HCG **HCG BETA (GONADOTROFINA CORIÓNICA), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Gestación Mujeres 4 Semanas 5,00 - 100,00 mUI/mL Gestación Mujeres 5 Semanas 200,00 - 3000,00 mUI/mL Gestación Mujeres 6 Semanas 10000,00 - 80000,00 mUI/mL Gestación Mujeres 7 - 14 Semanas 90000,00 - 500000,00 mUI/mL Gestación Mujeres 15 - 26 Semanas 5000,00 - 80000,00 mUI/mL Gestación Mujeres 27 - 40 Semanas 3000,00 - 15000,00 mUI/mL Inf 5,00 mUI/mL
HCGL **HCG BETA LIBRE (GONADOTROFINA CORIONICA LIBRE), SUERO**	TRACE	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Hombres: Inferior a 0.3 ng/mL Mujeres: - No gestantes: Inferior a 0.3 ng/mL - Gestantes de: Semana 8 87.49 ng/mL Semana 9 81.84 ng/mL Semana 10 67.17 ng/mL Semana 11 51.95 ng/mL Semana 12 40.49 ng/mL Semana 13 34.19 ng/mL Semana 14 23.52 ng/mL Semana 15 18.80 ng/mL Semana 16 18.33 ng/mL Semana 17 11.02 ng/mL Semana 18 9.19 ng/mL Semana 19 5.21 ng/mL (Los valores expresados son las medianas por semana de gestación)
VHE4 **HE-4 ANTÍGENO (MARCADOR TUMORAL OVARIO), SUERO**	Electroquimioluminiscencia.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] No quimioterapia previa en 7 días	Inf 140,00 pmol/L
G03033 **HEIMLER TIPO 1, SÍNDROME DE · PEX1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PEX1 *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
HPA **HELICOBACTER PYLORI ANTICUERPOS IgA, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 8,00 U/mL Indeterminado: 8,00 - 12,00 U/mL Positivo: Sup 12,00 U/mL
HPG **HELICOBACTER PYLORI ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Quimioluminiscencia.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 0,79 U/mL Indeterminado: 0,80 - 0,89 U/mL Positivo: Sup 0,90 U/mL
HPM **HELICOBACTER PYLORI ANTICUERPOS IgM, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 8,00 U/mL Indeterminado: 8,00 - 12,00 U/mL Positivo: Sup 12,00 U/mL
AGHE **HELICOBACTER PYLORI ANTIGENO, HECES**	Inmunocromatografía.	2	Rec. 1 g Heces (1 x Contenedor estéril) [Refr.] No congelar y descongelar la muestra. -Heces frescas (aproximadamente entre 1-2 g o ml en caso de muestras líquidas).	Negativo

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
DNHPMB **HELICOBACTER PYLORI DNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	PCR-Real Time.	6	Rec. 1 Pieza/s Biopsia gástrica parafinada (1 x Envase aséptico) Rec. 1 Pieza/s Biopsia gástrica (1 x Contenedor con solución salina) [Refr.] Rec. 1 mL Jugo gástrico (1 x Contenedor estéril) [Refr.] Alt. 1 Muestra/s Heces (1 x Contenedor estéril) [Cong.] Alt. 1 mL Saliva (1 x Tubo estéril) [Refr.]	No se detecta	
G11244 **HELSMOORTEL-VAN DER AA, SÍNDROME DE · ADNP · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ADNP	*1*
G04031 **HEMOCROMATOSIS · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	HAMP, HFE, HFE2, SLC40A1, TFR2	*5*
G04064 **HEMOCROMATOSIS TIPO 1 · HFE · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	HFE	*1*
G04030 **HEMOCROMATOSIS TIPO 1 · HFE · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	HFE	*1*
GENET **HEMOCROMATOSIS TIPO 1 · HFE(C282Y, H63D) · RT-PCR**	RT-PCR	7	Rec. 1 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Se informa para cada paciente HFE [C282Y, H63D]	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G04037 **HEMOCROMATOSIS TIPO 2 · HAMP · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	HAMP *1*
G04036 **HEMOCROMATOSIS TIPO 2 · HJV · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	HJV *1*
G04038 **HEMOCROMATOSIS TIPO 3 · TFR2 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TFR2 *1*
G4075 **HEMOCROMATOSIS TIPO 4 · SLC40A1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SLC40A1 *1*
SCAE **HEMOCULTIVO (MEDIO PARA GERMENES AEROBIOS) (1a MUESTRA), SANGRE TOTAL**	Cultivo en medios selectivos y diferenciales	6	Rec. 1 Muestra/s Sangre total (1 x Frasco hemocultivo.)	Negativo
SCAE2 **HEMOCULTIVO (MEDIO PARA GERMENES AEROBIOS) (2a MUESTRA), SANGRE TOTAL**	Cultivo en medios selectivos y diferenciales	6	Rec. 1 Muestra/s Sangre total (1 x Frasco hemocultivo.)	
SCAE3 **HEMOCULTIVO (MEDIO PARA GERMENES AEROBIOS) (3a MUESTRA), SANGRE TOTAL**	Cultivo en medios selectivos y diferenciales	6	Rec. 1 Muestra/s Sangre total (1 x Frasco hemocultivo.)	
SCANA **HEMOCULTIVO (MEDIO PARA GERMENES ANAEROBIOS) (1a MUESTRA), SANGRE TOTAL**	Cultivo en medios selectivos y diferenciales	6	Rec. 1 Muestra/s Sangre total (1 x Frasco hemocultivo.)	Negativo
SCANA2 **HEMOCULTIVO (MEDIO PARA GERMENES ANAEROBIOS) (2a MUESTRA), SANGRE TOTAL**	Cultivo en medios selectivos y diferenciales	6	Rec. 1 Muestra/s Sangre total (1 x Frasco hemocultivo.)	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
SCANA3 **HEMOCULTIVO (MEDIO PARA GERMENES ANAEROBIOS) (3a MUESTRA), SANGRE TOTAL**	Cultivo en medios selectivos y diferenciales	6	Rec. 1 Muestra/s Sangre total (1 x Frasco hemocultivo.)	
QSC **HEMOCULTIVO AEROBIO/ANAEROBIO (1ª MUESTRA), SANGRE TOTAL**	Cultivo en medios selectivos y diferenciales	6	Rec. 1 Muestra/s Sangre total (1 x Frasco hemocultivo.)	Hemocultivo aerobio (1ª muestra): Negativo Hemocultivo anaerobio (1ª muestra): Negativo
QSC2 **HEMOCULTIVO AEROBIO/ANAEROBIO (2ª MUESTRA), SANGRE TOTAL**	Cultivo en medios selectivos y diferenciales	6	Rec. 1 Muestra/s Sangre total (1 x Frasco hemocultivo.)	
QSC3 **HEMOCULTIVO AEROBIO/ANAEROBIO (3ª MUESTRA), SANGRE TOTAL**	Cultivo en medios selectivos y diferenciales	6	Rec. 1 Muestra/s Sangre total	
G04057 **HEMOFAGOCÍTICO, SÍNDROME · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	LYST, NLRC4, PRF1, RAB27A, SH2D1A, STX11, STXBP2, UNC13D, XIAP *9*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G04052 **HEMOFILIA A · F8 (INVERSIÓN INTRÓN 22)· RT-PCR**	Reacción en cadena de la polimerasa.	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] - Resumen de la historia clínica del paciente. Plazo de entrega orientativo dependiendo de la complejidad en la secuenciación del Gen estudiado y de las caracteristicas genotípicas inherentes al paciente. Se requiere consentimiento informado. - En caso que proceda y si está disponible, copia del informe del caso índice familiar.	F8	*1*
G04066 **HEMOFILIA A · F8 (INVERSIÓN INTRÓN 1) · RT-PCR**	RT-PCR	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	F8 [[intrón 1]]	*1*
G04002 **HEMOFILIA A · F8 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	F8 [MLPA]	*1*
G04003 **HEMOFILIA A · F8 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	F8	*1*
G04058 **HEMOFILIA B · F9 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	F9	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G04010 **HEMOFILIA B · F9 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	F9 *1*
HA2 **HEMOGLOBINA A2, SANGRE TOTAL**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	5	Rec. 3 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	2,20 - 3,50 %
HF **HEMOGLOBINA F (FETAL), SANGRE TOTAL**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	3	Rec. 3 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Ambos 0 - 10 Días 60,00 - 85,00 % Ambos 10 - 60 Días Inf 50,00 % Ambos 60 - 120 Días Inf 15,00 % Ambos 120 - 180 Días Inf 5,00 % Ambos 180 - 730 Días Inf 5,00 % Ambos Sup - 2 Años Inf 1,00 %
HA1C **HEMOGLOBINA GLICOSILADA A1C, SANGRE TOTAL**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	1	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Ayuno mínimo de 6 h	Se consideran normales los niveles de HbA1c inferiores a 5.7% (inferior a 39 mmol/mol). Valores entre 5.7 - 6.4% (39 a 47 mmol/mol) se consideran criterio de prediabetes (factor de riesgo de progresión a diabetes mellitus y de enfermedad cardiovascular). Valores superiores o igual a 6.5% (48 mmol/mol) se consideran diagnósticos de diabetes mellitus. (Criterios de la ADA, 2024). Hemoglobina A1c: Inf 5,70 % Hemoglobina A1c: Inf 39,00 mmol/mol
EEFH **HEMOGLOBINAS (ELECTROFORESIS), SANGRE TOTAL**	Electroforesis en Agarosa.	8	Rec. 3 mL Sangre total Heparina sódica (1 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Rec. 3 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No se observan hemoglobinas anómalas
HBANO **HEMOGLOBINAS ANÓMALAS, SANGRE**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	3	Rec. 3 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Se consideran hemoglobinas anómalas, variantes compatibles con hemoglobinas S, C, D u otras, diferentes de Fetal y A2. - No se detecta

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
QEHB **HEMOGLOBINAS ANORMALES (ESTUDIO DE TALASEMIAS), SANGRE TOTAL**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	5	Rec. 3 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Hemoglobina A2: 2,20 - 3,50 % Hemoglobinas anormales: - No se detecta Hemoglobina Fetal: Ambos 0 - 10 Días 60,00 - 85,00 % Hemoglobina Fetal: Ambos 10 - 60 Días Inf 50,00 % Hemoglobina Fetal: Ambos 60 - 120 Días Inf 15,00 % Hemoglobina Fetal: Ambos 120 - 180 Días Inf 5,00 % Hemoglobina Fetal: Ambos 180 - 730 Días Inf 5,00 % Hemoglobina Fetal: Ambos Sup - 2 Años Inf 1,00 %
G04061 **HEMOGLOBINOPATÍAS · PANEL·SANGER + MLPA**	Secuenciación Sanger + MLPA	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	HBA1, HBA1, HBA2, HBA2, HBB *5*
G04042 **HEMOGLOBINURIA PAROXÍSTICA NOCTURNA · PIGA · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PIGA *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
H **HEMOGRAMA**	Citometría de flujo.	1	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Basófilos: Ambos 0 - 3 Días Inf 0,35 x10³/mm³ Basófilos: Ambos 3 - 14 Días Inf 0,25 x10³/mm³ Basófilos: Ambos 14 - 365 Días Inf 0,20 x10³/mm³ Basófilos: Ambos Sup - 1 Años Inf 0,20 x10³/mm³ Basófilos %: Ambos 0 - 3 Días Inf 2,25 % Basófilos %: Ambos 3 - 14 Días Inf 1,75 % Basófilos %: Ambos 14 - 365 Días Inf 1,50 % Basófilos %: Ambos 1 - 4 Años Inf 1,50 % Basófilos %: Ambos Sup - 4 Años Inf 1,75 % CHCM: Ambos 0 - 14 Días 29,00 - 36,00 g/dL CHCM: Ambos 14 - 30 Días 29,00 - 35,00 g/dL CHCM: Ambos 30 - 365 Días 29,00 - 35,00 g/dL CHCM: Ambos 1 - 12 Años 30,00 - 36,00 g/dL CHCM: Ambos 12 - 65 Años 31,50 - 36,00 g/dL CHCM: Ambos Sup - 65 Años 31,50 - 36,00 g/dL Eosinófilos: Ambos 0 - 14 Días 0,03 - 1,10 x10³/mm³ Eosinófilos: Ambos 14 - 180 Días 0,05 - 0,95 x10³/mm³ Eosinófilos: Ambos 180 - 365 Días 0,05 - 0,85 x10³/mm³ Eosinófilos: Ambos 1 - 6 Años 0,03 - 0,75 x10³/mm³ Eosinófilos: Ambos 6 - 18 Años 0,02 - 0,70 x10³/mm³ Eosinófilos: Ambos Sup - 18 Años 0,02 - 0,50 x10³/mm³ Eosinófilos %: Ambos 0 - 3 Días Inf 5,50 % Eosinófilos %: Ambos 3 - 30 Días 0,50 - 7,00 % Eosinófilos %: Ambos 30 - 365 Días 0,50 - 6,00 % Eosinófilos %: Ambos Sup - 1 Años 0,50 - 5,50 % Hemoglobina: Ambos 0 - 14 Días 13,20 - 21,70 g/dL Hemoglobina: Ambos 14 - 30 Días 10,70 - 17,20 g/dL Hemoglobina: Ambos 30 - 365 Días 9,40 - 14,60 g/dL Hemoglobina: Ambos 1 - 12 Años 10,20 - 14,60 g/dL Hemoglobina: Hombres 12 - 65 Años 12,50 - 17,20 g/dL Hemoglobina: Mujeres 12 - 65 Años 12,00 - 15,60 g/dL Hemoglobina: Mujeres Sup - 65 Años 11,80 - 15,80 g/dL Hemoglobina: Hombres Sup - 65 Años 12,50 - 17,20 g/dL HCM: Hombres 0 - 14 Días 32,00 - 39,50 pg HCM: Mujeres 0 - 14 Días 30,00 - 39,50 pg HCM: Ambos 14 - 30 Días 27,50 - 36,50 pg HCM: Hombres 30 - 365 Días 23,00 - 35,00 pg HCM: Mujeres 30 - 365 Días 23,00 - 35,50 pg HCM: Ambos 1 - 12 Años 23,50 - 31,50 pg HCM: Ambos 12 - 65 Años 26,00 - 33,50 pg HCM: Mujeres 12 - 65 Años 26,00 - 33,50 pg HCM: Hombres 12 - 65 Años 26,00 - 33,50 pg HCM: Ambos Sup - 65 Años 27,00 - 34,00 pg Hematocrito: Ambos 0 - 14 Días 41,00 - 66,00 % Hematocrito: Ambos 14 - 30 Días 39,00 - 60,00 %

MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
			Hematocrito: Ambos 30 - 365 Días 31,00 - 54,00 % Hematocrito: Ambos 1 - 12 Años 28,00 - 43,50 % Hematocrito: Hombres 12 - 65 Años 36,50 - 50,50 % Hematocrito: Mujeres 12 - 65 Años 35,50 - 45,50 % Hematocrito: Mujeres Sup - 65 Años 35,00 - 45,50 % Hematocrito: Hombres Sup - 65 Años 37,00 - 49,00 % Hematíes: Ambos 0 - 14 Días 3,90 - 6,25 x10&6/mm³ Hematíes: Ambos 14 - 30 Días 3,50 - 5,50 x10&6/mm³ Hematíes: Ambos 30 - 365 Días 3,10 - 5,15 x10&6/mm³ Hematíes: Ambos 1 - 12 Años 3,70 - 5,25 x10&6/mm³ Hematíes: Hombres 12 - 65 Años 4,10 - 5,75 x10&6/mm³ Hematíes: Mujeres 12 - 65 Años 3,90 - 5,20 x10&6/mm³ Hematíes: Mujeres Sup - 65 Años 3,85 - 5,20 x10&6/mm³ Hematíes: Hombres Sup - 65 Años 4,00 - 5,65 x10&6/mm³ Leucocitos: Ambos 0 - 3 Días 9,00 - 28,20 x10³/mm³ Leucocitos: Ambos 3 - 30 Días 7,20 - 21,60 x10³/mm³ Leucocitos: Ambos 30 - 365 Días 6,60 - 16,20 x10³/mm³ Leucocitos: Ambos 1 - 12 Años 4,80 - 15,00 x10³/mm³ Leucocitos: Ambos 12 - 18 Años 4,50 - 11,40 x10³/mm³ Leucocitos: Ambos Sup - 18 Años 3,90 - 10,50 x10³/mm³ Linfocitos: Ambos 0 - 3 Días 1,80 - 11,20 x10³/mm³ Linfocitos: Ambos 3 - 30 Días 2,00 - 13,60 x10³/mm³ Linfocitos: Ambos 30 - 365 Días 2,70 - 12,60 x10³/mm³ Linfocitos: Ambos 1 - 6 Años 1,80 - 10,00 x10³/mm³ Linfocitos: Ambos 6 - 18 Años 1,20 - 6,00 x10³/mm³ Linfocitos: Ambos Sup - 18 Años 1,10 - 4,50 x10³/mm³ Linfocitos %: Ambos 0 - 3 Días 18,00 - 52,00 % Linfocitos %: Ambos 3 - 30 Días 26,00 - 60,00 % Linfocitos %: Ambos 30 - 365 Días 30,00 - 67,00 % Linfocitos %: Ambos 1 - 12 Años 22,00 - 63,00 % Linfocitos %: Ambos 12 - 18 Años 20,00 - 47,00 % Linfocitos %: Ambos Sup - 18 Años 20,00 - 44,00 % Monocitos: Ambos 0 - 14 Días 0,20 - 2,50 x10³/mm³ Monocitos: Ambos 14 - 30 Días 0,20 - 2,30 x10³/mm³ Monocitos: Ambos 30 - 180 Días 0,25 - 1,90 x10³/mm³ Monocitos: Ambos 180 - 365 Días 0,20 - 1,45 x10³/mm³ Monocitos: Hombres 1 - 12 Años 0,15 - 1,20 x10³/mm³ Monocitos: Mujeres 1 - 12 Años 0,10 - 1,20 x10³/mm³ Monocitos: Ambos Sup - 12 Años 0,10 - 0,95 x10³/mm³ Monocitos %: Ambos 0 - 14 Días 3,00 - 17,50 % Monocitos %: Ambos 14 - 30 Días 2,50 - 17,50 % Monocitos %: Ambos 30 - 180 Días 2,00 - 15,00 % Monocitos %: Ambos 180 - 365 Días 2,00 - 12,00 % Monocitos %: Ambos 1 - 12 Años 1,50 - 10,00 % Monocitos %: Ambos Sup - 12 Años 1,50 - 11,60 % Neutrófilos: Ambos 0 - 3 Días 3,30 - 22,30 x10³/mm³

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
				Neutrófilos: Ambos 3 - 30 Días 1,30 - 10,70 x10³/mm³ Neutrófilos: Ambos 30 - 365 Días 1,30 - 8,70 x10³/mm³ Neutrófilos: Ambos 1 - 12 Años 1,50 - 8,70 x10³/mm³ Neutrófilos: Ambos 12 - 18 Años 1,70 - 7,90 x10³/mm³ Neutrófilos: Ambos Sup - 18 Años 1,50 - 7,70 x10³/mm³ Neutrófilos %: Ambos 0 - 3 Días 29,00 - 74,00 % Neutrófilos %: Ambos 3 - 30 Días 17,00 - 62,00 % Neutrófilos %: Ambos 30 - 365 Días 17,00 - 63,00 % Neutrófilos %: Ambos 1 - 12 Años 22,00 - 74,00 % Neutrófilos %: Ambos 12 - 18 Años 36,00 - 77,00 % Neutrófilos %: Ambos Sup - 18 Años 42,00 - 77,00 % Plaquetas: Ambos 0 - 7 Días 220,00 - 490,00 x10³/mm³ Plaquetas: Ambos 7 - 30 Días 230,00 - 520,00 x10³/mm³ Plaquetas: Ambos 30 - 365 Días 240,00 - 550,00 x10³/mm³ Plaquetas: Ambos 1 - 6 Años 200,00 - 490,00 x10³/mm³ Plaquetas: Ambos 6 - 18 Años 160,00 - 415,00 x10³/mm³ Plaquetas: Ambos Sup - 18 Años 150,00 - 370,00 x10³/mm³ RDW: 11,50 - 15,50 % VCM: Ambos 0 - 14 Días 91,00 - 124,00 fL VCM: Ambos 14 - 30 Días 86,00 - 118,00 fL VCM: Ambos 30 - 365 Días 72,00 - 111,00 fL VCM: Ambos 1 - 12 Años 72,00 - 93,00 fL VCM: Ambos 12 - 65 Años 78,00 - 99,00 fL VCM: Ambos Sup - 65 Años 80,00 - 101,00 fL VPM: 7,00 - 12,00 fL
G09032 **HEMOLÍTICO URÉMICO ATÍPICO, SÍNDROME · CD46 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CD46 *1*
HPX **HEMOPEXINA, SUERO**	Nefelometría.	8	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	0,50 - 1,15 g/L
HEMOR **HEMOSIDERINA, ORINA**	Tinción.	5	Rec. 10 mL Orina [Refr.]	Negativo

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
PF4 **HEPARINA PF4 ANTICUERPOS (EIA), PLASMA**	Enzimoinmunoanálisis	5	Rec. 0.5 mL Plasma Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) [Cong.] En caso de necesitar resultado urgente, contactar con el laboratorio Rechazo: Muestras refrigeradas o a temperatura ambiente más de 24 horas. Rechazo: Presencia de agregados de fibrina Se requiere doble centrifugación de la muestra.	Negativo: Inf 1,0 Índice
ACHEP **HEPARINA PF4 ANTICUERPOS, PLASMA**	Inmunoturbidimetría.	5	Rec. 1 mL Plasma Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) [Cong.] Rechazo: Presencia de agregados de fibrina Se requiere doble centrifugación de la muestra. Separar y congelar inmediatamente.	Inf 1,00 U/mL
RNVHA **HEPATITIS A VIRUS (HAV) RNA, SUERO**	PCR-Real Time.	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Alt. 1 Muestra/s Heces (1 x Envase aséptico) [Cong.] Alt. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.]	No se detecta

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
HVAG **HEPATITIS A VIRUS (VHA) (IgG ANTI-VHA) ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Inmunoanálisis quimioluminiscente de micropartículas (CMIA)	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Paciente no inmunizado: Inf 1,00 Indice Paciente inmunizado: Sup= 1,00 Indice
HVA **HEPATITIS A VIRUS (VHA) (IgM ANTI-VHA) ANTICUERPOS IgM, SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 1,00 Positivo: Sup= 1,00

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
CVHB **HEPATITIS B VIRUS (HBV) DNA CARGA VIRAL, PLASMA**	PCR-Real Time.	6	Rec. 1.5 mL Plasma seminal (1 x Tubo estéril) [Cong.] Rec. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Rec. 1 mL Plasma CPDA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Rec. 1 mL Plasma CPD (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Rec. 1 mL Plasma CP2D (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Alt. 1 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo 5 mL.) [Refr.] Separar el plasma mediante centrifugación entre 800 y 1600 x g durante 20 minutos a temperatura ambiente (entre 15 y 30ºC) antes de que transcurran 24 h tras extracción. Transferir a tubo estéril de polipropileno. Congelar para su transporte y remitir la muestra congelada. Para centros sin centrifugadora, realizar el envío de sangre total en tubo Vacutainer PTT (Becton Dickinson). Nota: revisar estabilidades en el apartado anterior. Plasma seminal: Recoger la muestra de semen en un contenedor estéril. Transferir la muestra a	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
			tubos de centrífuga estériles (utilizando pipetas estériles). Centrifugar los tubos a 400 g durante 10 minutos. Traspasar el plasma seminal (sobrenadante) a un tubo estéril y congelar - Enviar congelado	
GVHB **HEPATITIS B VIRUS (HBV) DNA GENOTIPO, SUERO**	PCR-Real Time.	6	Rec. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] CV mínima de 500 UI/mL Muestra alternativa: suero congelado. Separar el plasma mediante centrifugación entre 800 y 1600 x g durante 20 minutos a temperatura ambiente (entre 15 y 30ºC) antes de que transcurran 24 h tras extracción. Transferir a tubo estéril de polipropileno. Congelar para su transporte y remitir la muestra congelada.	Se informa para cada paciente

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
PCHB **HEPATITIS B VIRUS (HBV) DNA, PLASMA**	PCR-Real Time.	7	Rec. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Separar el plasma mediante centrifugación entre 800 y 1600 x g durante 20 minutos a temperatura ambiente (entre 15 y 30ºC) antes de que transcurran 24 h tras extracción. Transferir a tubo estéril de polipropileno. Congelar para su transporte y remitir la muestra congelada. Muestra alternativa: suero congelado.	No se detecta
ERVB **HEPATITIS B VIRUS (HBV) RESISTENCIA ANTIVIRALES (LAMIVUDINA, ENTECAVIR, EMTRICITABINA, ADEFOVIR, TELBIVUDINA,TENOFOVIR) PANEL, SUERO**	Nested-PCR + secuenciación	10	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Se requiere una carga viral reciente igual o superior a 2000 copias/mL. Indicar valor del resultado de la carga viral.	Adefovir: Se informa para cada paciente Emtricitabina: Se informa para cada paciente Entecavir: Se informa para cada paciente Lamivudina: Se informa para cada paciente Telbivudina: Se informa para cada paciente Tenofovir: Se informa para cada paciente
AGBEAB **HEPATITIS B VIRUS (VHB) (AGHBE) ANTÍGENO (E), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 1,00 Positivo: Sup= 1,00
AGBSC **HEPATITIS B VIRUS (VHB) (AGHBS) ANTIGENO DE SUPERFICIE (CONFIRMATORIO), SUERO**	Ensayo de neutralización con medida mediante quimioluminiscencia	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	No se confirma la positividad del antígeno de superficie.: Inf 50,00 Se confirma la positividad del antígeno de superficie.: Sup= 50,00

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
AGBSAB **HEPATITIS B VIRUS (VHB) (AGHBS) ANTÍGENO DE SUPERFICIE, SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 1,00 Positivo: Sup= 1,00
ACBCAB **HEPATITIS B VIRUS (VHB) (ANTI-VHBC) AC. TOTALES ANTI-CORE, SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	No se detecta: Inf 1,00 Positivo: Sup= 1,00
ACBEAB **HEPATITIS B VIRUS (VHB) (ANTI-VHBE) ANTIGENO(E) ANTICUERPOS, SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	No se detecta: 1,00 - 999,00 Positivo: Inf= 1,00
ACBS **HEPATITIS B VIRUS (VHB) (ANTI-VHBS) ANTICUERPOS SUPERFICIE (CUANTITATIVO), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 10,00 mUI/mL Positivo: Sup= 10,00 mUI/mL
ACBCMM **HEPATITIS B VIRUS (VHB) (IgM ANTI-VHBC) ANTÍGENO CORE ANTICUERPOS IgM, SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 1,00 Positivo: Sup= 1,00
HCVM **HEPATITIS C IGM ANTICUERPOS, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	No se detecta: Inf 1,00 Índice Positivo: Sup 1,00 Índice
VHCS **HEPATITIS C VIRUS (HCV) RNA VIRAL, SEMEN**	PCR-Real Time.	7	Rec. 1 mL Semen (1 x Contenedor estéril) [Cong.]	RNA viral hepatitis C: No se detecta

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
CARG **HEPATITIS C VIRUS (HCV) RNA CARGA VIRAL, PLASMA**	PCR-Real Time.	6	Rec. 1.5 mL Plasma seminal (1 x Tubo estéril) [Cong.] Rec. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Rec. 1 mL Plasma CPDA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Rec. 1 mL Plasma CPD (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Rec. 1 mL Plasma CP2D (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Alt. 1 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo 5 mL.) [Refr.] Separar el plasma mediante centrifugación entre 800 y 1600 x g durante 20 minutos a temperatura ambiente (entre 15 y 30ºC) antes de que transcurran 24 h tras extracción. Transferir a tubo estéril de polipropileno. Congelar para su transporte y remitir la muestra congelada. Para centros sin centrifugadora, realizar el envío de sangre total en tubo Vacutainer PTT (Becton Dickinson). Nota: revisar estabilidades en el apartado anterior. Plasma seminal: Recoger la muestra de semen en un contenedor estéril. Transferir la muestra a	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
			tubos de centrífuga estériles (utilizando pipetas estériles). Centrifugar los tubos a 400 g durante 10 minutos. Traspasar el plasma seminal (sobrenadante) a un tubo estéril y congelar - Enviar congelado	
EGEN **HEPATITIS C VIRUS (HCV) RNA GENOTIPO, PLASMA**	Multiplex PCR-Real Time.	8	Rec. 2 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Separar el plasma mediante centrifugación entre 800 y 1600 x g durante 20 minutos a temperatura ambiente (entre 15 y 30ºC) antes de que transcurran 24 h tras extracción. Transferir a tubo estéril de polipropileno. Congelar para su transporte y remitir la muestra congelada. CV mínima de 500 UI/mL	Se identifican los subtipos: 1, 1a, 2 (2a/2b), 3, 4, 5a y 6. Se informa para cada paciente Límite de detección: 500 UI/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
PCHC **HEPATITIS C VIRUS (HCV) RNA, PLASMA**	PCR-Real Time.	7	Rec. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Separar el plasma mediante centrifugación entre 800 y 1600 x g durante 20 minutos a temperatura ambiente (entre 15 y 30ºC) antes de que transcurran 24 h tras extracción. Transferir a tubo estéril de polipropileno. Congelar para su transporte y remitir la muestra congelada. Muestra alternativa: suero congelado.	No se detecta
HCVRA **HEPATITIS C VIRUS (HCV), RESISTENCIA ANTIVIRALES PROTEASA NS3 SECUENCIACIÓN, PLASMA**	Técnica de secuenciación	7	Rec. 3 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Se requiere una carga viral reciente igual o superior a 2000 copias/mL. Indicar valor del resultado de la carga viral.	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
HCRAS **HEPATITIS C VIRUS (HCV), RESISTENCIA ANTIVIRALES (GENOTIPO 1A,1B) (NS5A) SECUENCIACIÓN, PLASMA**	Técnica de secuenciación	20	Rec. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Imprescindible conocer el el Genotipo de HC para procesar. Las muestras deben ser centrifugadas para separar el suero o plasma antes de 6 horas si están a temperatura ambiente (15-25°C) o antes de 24 horas si están a 2-8ºC Muestra alternativa: suero. Para pacientes con VHC de genotipo (subtipo) 1a o 1b. Se requiere una carga viral reciente igual o superior a 1000 copias/mL. Indicar valor del resultado de la carga viral.	Se informa para cada paciente

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
RNS5A **HEPATITIS C VIRUS (HCV), RESISTENCIA ANTIVIRALES (NS5A) SECUENCIACIÓN, PLASMA**	RT-PCR-Secuenciación.	20	Rec. 3 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Imprescindible conocer el el Genotipo de HC para procesar. Las muestras deben ser centrifugadas para separar el suero o plasma antes de 6 horas si están a temperatura ambiente (15-25°C) o antes de 24 horas si están a 2-8ºC Muestra alternativa: suero. Se requiere una carga viral reciente igual o superior a 2000 copias/mL. Indicar valor del resultado de la carga viral.	Se informa para cada paciente

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
PQ80 **HEPATITIS C VIRUS (HCV), RESISTENCIA ANTIVIRALES (Q80K - NS3) SECUENCIACIÓN, PLASMA**	Técnica de secuenciación	20	Rec. 1.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Las muestras deben ser centrifugadas para separar el suero o plasma antes de 6 horas si están a temperatura ambiente (15-25°C) o antes de 24 horas si están a 2-8ºC Muestra alternativa: suero. Para pacientes con VHC de genotipo (subtipo) 1a. Se requiere una carga viral reciente igual o superior a 1000 copias/mL. Indicar valor del resultado de la carga viral.	Se informa para cada paciente
AGHCV **HEPATITIS C VIRUS (VHC) ANTIGENO, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	12	Rec. 2 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf= 1,50 pg/mL Positivo: Sup 1,50 pg/mL
HCV **HEPATITIS C VIRUS (VHC) VIRUS (ANTI-VHC) ANTICUERPOS, SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	No se detecta: Inf 0,80 Indeterminado: 0,80 - 1,00 Positivo: Sup= 1,00

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
HCVC **HEPATITIS C VIRUS (VHC) VIRUS (ANTI-VHC) CONFIRMATORIO WESTERNBLOT ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunoblot.	5	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Las proteínas estudiadas en el ensayo son: CORE (C1, C2); NS3; NS4; NS5; E2 NEGATIVO: - Ausencia de bandas de antígeno de VHC. - Presencia de una banda de antígeno de VHC con reactividad (+/-), excepto si se observa reactividad en la banda del antigeno NS3. INDETERMINADO: - Presencia de una banda de antígeno de VHC con reactividad (1+) o superior. - Presencia de la banda de antígeno NS3 con reactividad (+/-) o superior y todas las demás bandas antigénicas negativas. POSITIVO: - Presencia de al menos dos bandas de antígenos de VHC con reactividad (+/-) o superior.
RNVHDS **HEPATITIS D VIRUS (HDV) RNA CARGA VIRAL, PLASMA**	PCR-Real Time.	12	Rec. 2 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.]	Límite de detección: 20 copias/mL
RDEL **HEPATITIS D VIRUS (HDV) RNA, SUERO**	Nested-PCR.	4	Rec. 3 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	No se detecta
HDV **HEPATITIS D VIRUS (VHD) (IgM ANTI-VHD) ANTICUERPOS IgM, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	No se detecta: Inf 0,90 Indice Indeterminado: 0,90 - 1,10 Indice Positivo: Sup 1,10 Indice
HVDG **HEPATITIS D VIRUS (VHD) ANTICUERPOS TOTALES (IgG+IgM), SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	No se detecta: Inf 0,90 Indice Indeterminado: 0,90 - 1,10 Indice Positivo: Sup 1,10 Indice

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ADEL **HEPATITIS D VIRUS (VHD) ANTÍGENO DELTA, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 0,90 Indice Indeterminado: 0,90 - 1,09 Indice Positivo: Sup= 1,10 Indice
RNVEHE **HEPATITIS E VIRUS (HEV) RNA, HECES**	PCR-Real Time.	4	Rec. 10 g Heces (1 x Contenedor estéril) [Cong.]	No se detecta
RNAVHE **HEPATITIS E VIRUS (HEV) RNA, PLASMA**	PCR-Real Time.	4	Rec. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Alt. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	No se detecta
HEG **HEPATITIS E VIRUS (VHE) ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Quimioluminiscencia.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 0,30 UI/mL Positivo: Sup= 0,30 UI/mL
HVEM **HEPATITIS E VIRUS (VHE) ANTICUERPOS IgM, SUERO**	Quimioluminiscencia.	10	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 1,00 Índice Positivo: Sup= 1,00 Índice
GENVHE **HEPATITIS E VIRUS (VHE) GENOTIPO, MUESTRA BIOLOGICA**	Secuenciación Sanger	6	Rec. 5 g Heces (1 x Recipiente estéril) [Cong.] Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Rec. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Alt. 1 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
PCHG **HEPATITIS G VIRUS (HGV) RNA, SUERO**	Nested-PCR.	8	Rec. 2 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	Sup No se detecta
HEPCIB **HEPCIDINA 25 (BIOACTIVA), SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	10	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 1 mL Plasma Heparina sódica (1 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Plasma Heparina litio (1 x Tubo sangre heparina litio) [Refr.] Alt. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 1 mL Plasma Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) [Refr.]	1,49 - 41,46 ng/mL
IHQHER2 **HER2- INMUNOHISTOQUIMICA CON KIT HOMOLOGADO (FARMACODIAGNÓSTICO)**	Inmunohistoquímica.	15	Rec. 1 Muestra/s Tejido parafinado	
G14001 **HEREDITARIO EXTENDIDO, CÁNCER · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	15	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AIP, AKT1, ALK, APC, AR, ATM, ATRX, AXIN2, BAP1, BARD1, BLM, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDC73, CDH1, CDK4, CDKN1B, CDKN2A, CHEK2, CTNNA1, DDB2, DICER1, DIS3L2, DLST, EGLN1, EGLN2, EPCAM, ERCC1, ERCC2, ERCC3, ERCC4, ERCC5, ERCC6, FAN1, FH, FLCN, GALNT12, GCM2, GPC3, GPR101, GREM1, HNF1A, HNF1B, HOXB13, KIF1B, KIT, LZTR1, MAX, MC1R, MDH2, MEN1, MET, MITF, MLH1, MLH3, MNX1, MSH2, MSH3, MSH6, MSR1, MUTYH, NBN, NF1, NF2, NFIX, NSD1, NTHL1, PALB2, PDGFRA, PHOX2B, PMS2, POLD1, POLE, POLH, POT1, PRKAR1A, PTCH1, PTCH2, PTEN, RAD50, RAD51, RAD51C, RAD51D, RB1, RECQL, RECQL4, RET, RNF43, RPS20, SCG5, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, SLC25A11, SMAD4, SMARCA4, SMARCB1, SMARCE1, STK11, SUFU, TERT, TGFBR2, TMEM127, TP53, TSC1, TSC2, VHL, WRN, WT1, XPA, XPC, XRCC3 *116*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G14089 **HEREDITARIO, CÁNCER · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	15	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	APC, ATM, AXIN2, BAP1, BARD1, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CDK4, CDKN2A, CHEK2, CTNNA1, EPCAM, FH, FLCN, GREM1, HOXB13, MEN1, MET, MITF, MLH1, MSH2, MSH3, MSH6, MUTYH, NBN, NTHL1, PALB2, PMS2, POLD1, POLE, PTEN, RAD51C, RAD51D, RET, SDHA, SDHB, SDHC, SDHD, SMAD4, STK11, TERT, TP53, TSC1, TSC2, VHL *48*
COHESA **HEROÍNA CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SALIVA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 1 mL Saliva [Refr.]	Incertidumbre de medida 1,4 ng/mL Límite de cuantificación 5 ng/mL
COHERST **HEROÍNA CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SANGRE**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	3	Rec. 10 mL Sangre total Oxalato/Fluoruro (1 x Tubo Sangre Total-Oxalato/Fluoruro) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total Heparina litio (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Tubo oxalato potásico/Fluoruro sódico Ref. SAP 600088318	Incertidumbre de medida 0,8 ng/mL Límite de cuantificación 5 ng/mL
HSGCR **HERPES SIMPLE I ANTICUERPOS IGG, LCR**	Enzimoinmunoanálisis	5	Rec. 1 mL LCR [Refr.]	Índice Interpretación según criterio clínico
HSIG **HERPES SIMPLE I ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 0,80 Índice Indeterminado: 0,80 - 1,10 Índice Positivo: Sup= 1,10 Índice
HSMCR **HERPES SIMPLE I ANTICUERPOS IGM, LCR**	Enzimoinmunoanálisis	5	Rec. 300 uL LCR [Refr.]	Índice Interpretación según criterio clínico

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
HSIM **HERPES SIMPLE I ANTICUERPOS IgM, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 1,10 Índice Positivo: Sup= 1,10 Índice
AHRG12 **HERPES SIMPLE I Y II ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	0,90 - 1,09 Indice Negativo: Inf 0,90 Indice Positivo: Sup= 1,10 Indice
AHRM12 **HERPES SIMPLE I Y II ANTICUERPOS IGM, SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 0,90 Índice Indeterminado: 0,90 - 1,10 Índice Positivo: Sup 1,10 Índice
HS2GCR **HERPES SIMPLE II ANTICUERPOS IGG, LCR**	Enzimoinmunoanálisis	5	Rec. 1 mL LCR [Refr.]	Índice Interpretación según criterio clínico
HSIIG **HERPES SIMPLE II ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 0,80 Índice Indeterminado: 0,80 - 1,09 Índice Positivo: Sup= 1,10 Índice
HS2MCR **HERPES SIMPLE II ANTICUERPOS IGM, LCR**	Enzimoinmunoanálisis	5	Rec. 1 mL LCR [Refr.]	Índice Interpretación según criterio clínico
HSIIM **HERPES SIMPLE II ANTICUERPOS IgM, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 1,10 Índice Positivo: Sup= 1,10 Índice

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
QDNH **HERPES SIMPLEX 1/2 VIRUS (HHSV-1/2) DNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	PCR-Real Time.	4	Rec. 1 Muestra/s Frotis [Refr.] Rec. 1 mL LCR [Refr.] Rec. 1 mL Exudado vaginal [Refr.] Alt. 5 mL Orina [Refr.] Alt. 1 mL Sangre total EDTA [Refr.] Alt. 1 mL Plasma (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 1 mL Líquido amniótico (1 x Recipiente estéril) [Refr.] Alt. 1 mL Humor vitreo/acuoso [Refr.] Envío de líquido amniótico: solo tienen valor clínico las muestras procedentes de embarazos por encima de las 19 semanas.	DNA Herpes simple 1+2: No se detecta
HVM **HERPES VIRUS HUMANO TIPO 6 (HVH-6) ANTICUERPOS IgM, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/10 Interpretación: Positivo: Sup= 1/10

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
DHE6 **HERPES VIRUS HUMANO TIPO 6 (HHV-6) DNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	PCR-Real Time.	7	Rec. 5 mL Orina (1 x Contenedor 25 mL.) [Refr.] Rec. 3 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 2 mL Esputo (1 x Contenedor estéril) [Refr.] Rec. 1 mL LCR (1 x Tubo estéril) [Cong.] Alt. 1 mL Humor vitreo/acuoso [Refr.] Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío.	DNA del virus Herpes 6 (resultado): No se detecta
HS6GLB **HERPES VIRUS HUMANO TIPO 6 (HVH-6) ANTICUERPOS IGG, MUESTRA BIOLOGICA**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL LCR [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/2 Interpretación: Positivo: Sup= 1/2
HVG **HERPES VIRUS HUMANO TIPO 6 (HVH-6) ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/10
HS6MLB **HERPES VIRUS HUMANO TIPO 6 (HVH-6) ANTICUERPOS IGM, MUESTRA BIOLOGICA**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL LCR [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/2 Interpretación: Positivo: Sup= 1/2

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
HV7G **HERPES VIRUS HUMANO TIPO 7 (HVH-7) ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	9	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Para hacer un diagnóstico de seroconversión es conveniente averiguar si hay un aumento de 2 a 3 veces del título de anticuerpos en un intervalo de 2 a 3 semanas.	Interpretación: Negativo: Inf 1/20 Interpretación: Positivo: Sup= 1/20
HV7M **HERPES VIRUS HUMANO TIPO 7 (HVH-7) ANTICUERPOS IgM, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	9	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] La presencia de estos anticuerpos es compatible con infección reciente.	Interpretación: Negativo: Inf 1/10 Interpretación: Positivo: Sup= 1/10
DHE7 **HERPES VIRUS HUMANO TIPO 7 (HHV-7) DNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	PCR-Real Time.	7	Rec. 3 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 2 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Rec. 1 mL LCR (1 x Tubo estéril) [Cong.] Alt. 2 mL Esputo (1 x Contenedor estéril) [Refr.] Alt. 1 mL Humor vitreo/acuoso [Refr.] Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío.	DNA del virus Herpes 7 (resultado): No se detecta

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
DHE8 **HERPES VIRUS HUMANO TIPO 8 (HHV-8) DNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	PCR-Real Time.	6	Rec. 5 mL Orina (1 x Contenedor 25 mL.) [Refr.] Rec. 3 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 2 mL Esputo (1 x Contenedor estéril) [Refr.] Rec. 1 mL LCR (1 x Tubo Polipropileno) [Cong.] Alt. 1 mL Humor vitreo/acuoso [Refr.] Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío.	DNA del virus Herpes 8 (resultado): No se detecta
G05017 **HETEROTAXIA VISCERAL · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ACVR2B, CRELD1, FOXH1, GDF1, GRK5, LEFTY2, NKX2-5, NODAL, PKD1L1, ZIC3 *10*
G01027 **HETEROTOPIA PERIVENTRICULAR · FLNA · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FLNA *1*
HCERI **HEXOQUINASA (HK) ERITROCITARIA, SANGRE TOTAL**	Espectrometría.	17	Rec. 5 mL Sangre total Heparina litio (1 x Tubo sangre heparina litio) [Refr.] Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Indicar edad, sexo y motivo de solicitud. Las muestras deben llegar a nuestro laboratorio de lunes a miércoles,nunca los Viernes ni vísperas de festivos.	0,62 - 1,26 UL/g Hb

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
525 **HIBRIDACIÓN ADN CONVENCIONAL (FISH U OTRAS), BIOPSIA**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	5	Rec. 1 Pieza/s Tejido	Se informa para cada paciente
521 **HIBRIDACIÓN IN SITU VIRUS, BIOPSIA**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	5	Rec. 1 Pieza/s Tejido	Se informa para cada paciente
CURE **HIDRATOS DE CARBONO, ORINA**	Espectrometría.	3	Rec. 10 mL Orina [Refr.] - Contenedor estéril	No se detecta
G3160 **HIDROCEFALIA CONGÉNITA · L1CAM · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	L1CAM *1*
HIDR **HIDROPERÓXIDOS, ORINA**	Espectrometría.	7	Rec. 10 mL Orina [Cong.] Orina primera hora de la mañana.	49,00 - 70,00 µmol/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
HPRN **HIDROXIPROLINA, ORINA (M.NORDIN)**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	6	Rec. 1 mL Orina Nordin [Refr.] La noche anterior al examen, el paciente deberá evitar beber, comer o fumar a partir de las 21h. A las 7h de la mañana orinar y desechar dicha micción. A continuación, el paciente deberá beber 250ml. de agua destilada y seguirá evitando beber otros líquidos, comer o fumar. A las 9h el paciente debe orinar en un recipiente estéril y entregarlo al laboratorio para la determinación de: Hidroxiprolina y Creatinina	Hidroxiprolina en orina concentración (método Nordin): Límite de cuantificación: Inf 2,20 mg/L Hidroxiprolina en orina (método Nordin): 9,00 - 25,00 mg/g crea

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
HPOR **HIDROXIPROLINA, ORINA 24H**	Cromatografía Líquida Alta Resolución / Espectrometria UV.	6	Rec. 1 mL Orina 24h. (alícuota) (1 x Contenedor 2500 mL.) [Refr.] No ingerir 3 días antes de la toma de muestra : Cualquier tipo de carne pescado o marisco, caldos, salsas, conservas, alubias, garbanzos, lentejas, habas, frutos secos, dulces, helados, licores. Dieta exenta de gelatinas y colágeno Alimentos permitidos: Queso, huevos, leche, legumbres verdes, arroz, pan blanco, naranjas, manzanas, peras, agua sin gas. Al tercer día de dieta, el paciente recogerá la orina de 24 horas acidificada según lo establecido en el manual MP-RMP-4: Recomendaciones generales para la recogida de orina de 24 horas con ácido.	Hidroxiprolina en orina de 24 horas: 13,10 - 45,90 mg/24h Hidroxiprolina en orina 24 horas (concentración): Límite de cuantificación: Inf 2,20 mg/L Volumen de orina remitido (diuresis): 600,00 - 1600,00 mL
AGFE **HIERRO, AGUA**	Absorción atómica.	5	Rec. 100 mL Agua (1 x Envase aséptico) [Refr.]	mg/L No establecido.
FEO **HIERRO, ORINA 24H**	Espectrometría.	2	Rec. 1 mL Orina 24h. (alícuota) (1 x Contenedor 2500 mL.) [Refr.]	Prueba de eliminación: Inf1000 ug/6h Excreción (24h): Inf 200,00 µg/24h

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
FEOR **HIERRO, ORINA FINAL DE JORNADA**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	12	Rec. 10 mL Orina final jornada (1 x Tubo 10 mL.) [Refr.]	Inf 650,00 ug/L	
FE **HIERRO, SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Hombres 65,00 - 170,00 ug/dL Mujeres 50,00 - 170,00 ug/dL	
FETH **HIERRO, TEJIDO HEPÁTICO**	Absorción atómica.	47	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado - Resumen de la historia clínica del paciente.	160,00 - 1674,00 µg/g de tej	
G1512 **HIPER IGD, SÍNDROME DE · MVK · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	MVK	*1*
G17001 **HIPER IGE (JOB), SÍNDROME DE · STAT3 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	STAT3	*1*
G17028 **HIPER IGE, SÍNDROME DE · DOCK8 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	DOCK8	*1*
G17032 **HIPER IGE, SÍNDROME DE · DOCK8, STAT3 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]		
G17027 **HIPER IGE, SÍNDROMES DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	DOCK8, SPINK5, STAT3, TYK2	*4*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G03187 **HIPERALDOSTERISMO SENSIBLE A CORTICOIDES · HIBRIDO CYP11B1/CYP11B2 · A. FRAGMENTOS**	Análisis de Fragmentos	30	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CYP11B1 [Híbrido] , CYP11B2 [Híbrido]	*2*
G03160 **HIPERALDOSTERONISMO FAMILIAR · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CACNA1H , CLCN2, KCNJ5	*3*
G03036 **HIPERANDROGENISMO TIPO NO-CLÁSICO DEBIDO A DEFICIENCIA DE 21-HIDROXILASA · CYP21A2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CYP21A2	*1*
G7325 **HIPERBILIRRUBINEMIA TIPO ROTOR · SLCO1B1, SLCO1B3 · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SLCO1B1, SLCO1B3	*2*
G09053 **HIPERCALCEMIA HIPOCALCIÚRICA · CASR · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]		
G09027 **HIPERCALCEMIA HIPOCALCIÚRICA · CASR · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CASR	*1*
G01154 **HIPERCOLESTEROLEMIA · APOB (Arg3500Gln) · HOT SPOT**	Hot Spot	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	APOB [Arg3500Gln]	*1*
G01028 **HIPERCOLESTEROLEMIA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABCG5, ABCG8, APOB, APOE, LDLR, LDLRAP1, LIPA, PCSK9	*8*
G01029 **HIPERCOLESTEROLEMIA DEBIDA A DEFECTO EN EL LIGANDO APO B · APOB · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	APOB	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G01030 **HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR · LDLR · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	LDLR	*1*
G01031 **HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR · PCSK9 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PCSK9	
G11241 **HIPEREKPLEXIA HEREDITARIA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GLRA1, GLRB, GPHN , SLC6A5	*4*
G03037 **HIPERFENALANINEMIA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GCH1, PAH, PCBD1, PTS, QDPR	*5*
G12081 **HIPERFERRITINEMIA HEREDITARIA-CATARATA, SINDROME DE · FTL (REGION IRE) · HOT SPOT**	Secuenciación Sanger	20	Rec. 4 mL Sangre total (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]		
G17026 **HIPER-IGM LIGADO AL CROMOSOMA X, SÍNDROME DE · CD40LG · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CD40LG	*1*
G03038 **HIPERINSULINEMIA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABCC8, AKT2, GCK, GLUD1, HADH, HNF1A, HNF4A, INSR, KCNJ11, PGM1, SLC16A1, UCP2	*12*
G03039 **HIPERINSULINISMO HIPOGLICÉMICO FAMILIAR TIPO 2 · ABCC8 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABCC8	*1*
G01137 **HIPERLIPOPROTEINEMIA · LPL · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	LPL	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G09004 **HIPEROXALURIA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AGXT, GRHPR, HOGA1	*3*
G09031 **HIPEROXALURIA PRIMARIA TIPO 1 · AGXT · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AGXT	*1*
G09045 **HIPEROXALURIA PRIMARIA TIPO 1 Y 2 · AGXT, GRHPR · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] - Resumen de la historia clínica del paciente. Se requiere consentimiento informado. - En caso que proceda y si está disponible, copia del informe del caso índice familiar.	AGXT, GRHPR	*2*
G09040 **HIPEROXALURIA PRIMARIA TIPO 3 · HOGA1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	HOGA1	*1*
G0119 **HIPERPARATIROIDISMO FAMILIAR AISLADO · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AIRE, CASR , CDC73, CDKN1B, GCM2, MEN1, PTH, PTH1R, RET	*9*
G03171 **HIPERPLASIA ADRENAL CONGÉNITA · PANEL · NGS + SANGER**	Secuenciación NGS + Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CYP11A1 , CYP11B1 , CYP17A1, CYP21A2, HSD3B2 , POR, STAR	*7*
G03098 **HIPERPLASIA ADRENAL CONGÉNITA DEBIDO A DEFICIENCIA DE 21-HIDROXILASA · CYP21A2 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CYP21A2	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G03040 **HIPERPLASIA ADRENAL CONGÉNITA DEBIDO A DEFICIENCIA DE 21-HIDROXILASA · CYP21A2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CYP21A2	*1*
G03099 **HIPERPLASIA ADRENAL CONGÉNITA DEBIDO A DEFICIENCIA DE 21-HIDROXILASA · CYP21A2 · SANGER+MLPA**	Secuenciación Sanger + MLPA	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 1 mL ADN extraido (1 x Microtubos DNAse, RNAse Free) [Refr.] ADN extraído: concentración 50 ng/µL	CYP21A2 [MLPA]	*1*
G4006 **HIPERPLASIA ADRENAL POR DEFICIENCIA 21-HIDROXILASA · CYP21A2 · HOT SPOT**	Hot Spot	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] - Resumen de la historia clínica del paciente y consentimiento informado específicos.	CYP21A2 [Pro30Leu, Val281Leu, Arg339His, Pro453Ser, Ile172Asn, Gly424Ser, Arg426His, IVS2+5g>A, Ile236Asn, Val237Gluc, Met239Lys, F306+T, Gln318Ter, Arg356Trp, exón 3 del8bp, IVS2-13C>G ó I2G (c.293-13 C>G)]	*1*
G03096 **HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA POR DEFICIENCIA DE 11-BETA-HIDROXILASA · CYP11B1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CYP11B1	*1*
G03097 **HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA POR DEFICIENCIA DE 3-BETA-HIDROXIESTEROIDE DESHIDROGENASA · HSD3B2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	HSD3B2	*1*
G03136 **HIPERPLASIA SUPRARRENAL POR DEFICIENCIA DE CITOCROMO P450 OXIDOREDUCTASA · POR · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	POR	*1*
G01189 **HIPERTENSION ARTERIAL PULMONAR · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25			

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G01032 **HIPERTENSIÓN PULMONAR · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ACVRL1, BMPR1B, BMPR2, CAV1, EIF2AK4, ENG, FOXF1, GDF2, KCNA5, KCNK3, NOTCH3, RASA1, SMAD4, SMAD9, TBX4	*2,5*
G01033 **HIPERTENSIÓN PULMONAR PRIMARIA ASOCIADA A FENFLURAMINA O DEXFENFLURAMINA · BMPR2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BMPR2	*1*
G01034 **HIPERTENSIÓN PULMONAR PRIMARIA FAMILIAR CON/SIN HHT · BMPR2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BMPR2	*1*
G11071 **HIPERTERMIA MALIGNA · CACNA1S, RYR1 · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CACNA1S, RYR1	*2*
G1582 **HIPOACONDROPLASIA / ACONDROPLASIA · FGFR3 (exones 7, 9, 10, 12, 13, 15) · HOT SPOT**	Secuenciación Sanger	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FGFR3 [7, 9, 10, 12, 13, 15]	*1*
G08063 **HIPOACONDROPLASIA · FGFR3 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FGFR3	*1*
G03178 **HIPOALDOSTERONISMO CONGÉNITO DEBIDO A CMO I / CMO II · CYP11B2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CYP11B2	*1*
G01117 **HIPOALFALIPOPROTEINEMIA PRIMARIA · APOA1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	APOA1	*1*
G01035 **HIPOBETALIPOPROTEINEMIA · APOB · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	APOB	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G03147 **HIPOBETALIPOPROTEINEMIA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ANGPTL3, APOB, MTTP, SAR1B	*4*
G01118 **HIPOBETALIPOPROTEINEMIA FAMILIAR 2 · ANGPTL3 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ANGPTL3	*1*
G4116 **HIPOCONDROPLASIA · FRFR3 (N540K) · HOT SPOT**	Hot Spot	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FGFR3 [N540K]	*1*
HIPOC **HIPOCRETINA-1, LCR**	Radioinmunoanálisis.	10	Rec. 1 mL LCR [Cong.] Plazo de entrega aproximado. Consultar con el laboratorio.	Sup 200,00 pg/mL	
G08064 **HIPOFOSFATASIA DE LA ADOLESCENCIA · ALPL · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ALPL	*1*
G08065 **HIPOFOSFATASIA DE LA INFANCIA · ALPL · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ALPL	*1*
G08066 **HIPOFOSFATASIA DEL ADULTO · ALPL · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ALPL	*1*
G1110 **HIPOFOSFATEMIA AD · FGF23 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FGF23	*1*
G08067 **HIPOFOSFATEMIA DOMINANTE LIGADA AL CROMOSOMA X · PHEX · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PHEX	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G08143 **HIPOFOSFATEMIA DOMINANTE LIGADA AL CROMOSOMA X · PHEX, FGF23 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Indicado en informe adjunto FGF23, PHEX	*2*
G03041 **HIPOGLICEMIA DE LA INFANCIA SENSIBLE A LEUCINA · ABCC8 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABCC8	*1*
G03042 **HIPOGLICEMIA HIPERINSULINEMIA FAMILIAR TIPO 1 · ABCC8 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABCC8	*1*
G03043 **HIPOGONADISMO · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CHD7, DUSP6, FGF17, FGF8, FGFR1, FLRT3, FSHB, GNRH1, GNRHR, HESX1, HS6ST1, IL17RD, KAL1, KISS1, KISS1R, NR0B1, NSMF, POLR3B, PROK2, PROKR2, SEMA3A, SPRY4, TAC3, TACR3, WDR11	*25*
G03044 **HIPOGONADISMO CON ALTERACIÓN HIPOTÁLAO/HIPÓFISIS · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	LHX3, NR0B1, PROP1, SOX2	*4*
G03045 **HIPOGONADISMO CON OBESIDAD · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ENPP1, LEP, LEPR	*3*
G06002 **HIPOGONADISMO HIPOGONADOTRÓPICO TIPO 5 CON/SIN ANOSMIA · CHD7 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CHD7	*1*
G03179 **HIPOGONADISMO HIPOGONADOTRÓPICO · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ANOS1, CHD7, CUL4B, DCAF17, DUSP6, FEZF1, FGF17, FGF8, FGFR1, FLRT3, FSHB, GLI2, GNRH1, GNRHR, HAMP, HESX1, HFE, HFE2, HS6ST1, IL17RD, KISS1, KISS1R, LHB, LHCGR, LHX3, LHX4, NR0B1, NSMF, PROK2, PROKR2, PROP1, SEMA3A, SEMA3E, SEMA7A, SLC29A3, SLC40A1, SOX10, SOX2, SOX3, SPRY4, TAC3, TACR3, TFR2, WDR11	*44*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G03046 **HIPOGONADISMO HIPOGONADOTROPO TIPO 2 CON/SIN ANOSMIA · FGFR1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FGFR1	*1*
G03094 **HIPOPARATIROIDIMO · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AIRE, CASR , CHD7, CYP24A1, FAM111A, GATA3, GCM2, GNAS, HADHA, HADHB, PDE4D, PRKAR1A, PTH, PTH1R, SOX3, STX16, TBCE, TBX1	*18*
G03153 **HIPOPLASIA DE CÉLULAS DE LEYDIG · LHCGR · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	LHCGR	
G12025 **HIPOPLASIA DEL NERVIO ÓPTICO · PAX6 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PAX6	*1*
G12026 **HIPOPLASIA FOVEAL TIPO 1 · PAX6 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PAX6	*1*
G11171 **HIPOPLASIA PONTOCEREBELOSA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AMPD2, CHMP1A, CLP1, EXOSC3, PCLO, RARS2, SEPSECS, TSEN15, TSEN2, TSEN34, TSEN54, VPS53, VRK1	*13*
G03047 **HIPOSPADIAS TIPO 1 LIGADAS AL CROMOSOMA X · AR · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AR	*1*
G03170 **HIPOTIROIDISMO PRIMARIO Y RESISTENCIA A LAS HORMONAS TIROIDEAS · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	DUOX2, DUOXA2, FOXE1, GNAS, HESX1, IGSF1, NKX2-1, NKX2-5, PAX8, POU1F1, PROP1, SECISBP2, SLC16A2, SLC26A4, SLC5A5, TBL1X , TG, THRA, THRB, TPO, TSHB, TSHR	*22*
G10003 **HIPOVENTILACIÓN CENTRAL CONGÉNITA, SÍNDROME DE · RET · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	RET	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G10004 **HIPOVENTILACIÓN CENTRAL, SÍNDROME DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ASCL1, BDNF, EDN3, GDNF, PHOX2B, RET *6*
HXANOR **HIPOXANTINA, ORINA**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	30	Rec. 1 mL Orina (1 x Tubo 5 mL.) [Refr.] Muestra de orina de 24 horas (la eliminación de la hipoxantina es constante)	Negativo
G05007 **HIRSCHSPRUNG Y ASOCIADOS, ENFERMEDAD DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ASCL1, BBS1, BDNF, DHCR7, EDN3, EDNRB, GDNF, IKBKAP, L1CAM, MKKS, PHOX2B, RET, RMRP, SNAI2, ZEB2 *15*
G05008 **HIRSCHSPRUNG, ENFERMEDAD DE · PANEL A · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ECE1, EDN3, EDNRB, GDNF, NRTN, PHOX2B, RET, SOX10, TCF4 , ZEB2 *10*
G05009 **HIRSCHSPRUNG, ENFERMEDAD DE · PANEL B · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ASCL1, BBS1, BDNF, DHCR7, ECE1, EDN3, EDNRB, GDNF, IKBKAP, L1CAM, MKKS, NRTN, PHOX2B, RET, RMRP, SNAI2, SOX10, TCF4 , ZEB2 *19*
HISTHE **HISTAMINA, HECES**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 5 g Heces (1 x Recipiente estéril) [Cong.]	Inf 959,00 ng/g heces
HO24 **HISTAMINA, ORINA**	Radioinmunoanálisis.	6	Rec. 10 mL Orina 24h. (alícuota) (1 x Contenedor 2500 mL.) [Cong.]	Excreción (24h): Inf 60,00 µg/24 h Volumen de orina remitido (diuresis): 600,00 - 1600,00 mL
HORC **HISTAMINA, ORINA / CREATININA**	Radioinmunoanálisis.	6	Rec. 10 mL Orina [Cong.]	Creatinina en orina : mg/dL Interpretación según criterio clínico Excreción (creatinina): 10,00 - 35,00 µg/g creat

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
HIS **HISTAMINA, PLASMA**	Radioinmunoanálisis.	6	Rec. 3 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.]	Inf 0,11 µg/dL
HIST **HISTAMINA, SANGRE TOTAL**	Radioinmunoanálisis.	6	Rec. 4 mL Sangre total Heparina litio (1 x Tubo sangre heparina litio) [Refr.] Evitar remitir la muestra en fines de semana y vísperas de festivos.	2,00 - 20,00 µg/dL
H3MO **HISTIDINA 3 METIL, ORINA**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	22	Rec. 10 mL Orina [Cong.] La orina se ha de congelar en 1 hora tras la extracción.	Ambos 6 - 12 Meses 19,00 - 47,00 mmol/mol crea Prematuros 3,10 - 93,00 mmol/mol crea Recién Nacidos 18,00 - 39,00 mmol/mol crea Ambos 1 - 2 Años 22,00 - 57,00 mmol/mol crea Ambos 2 - 4 Años 20,00 - 59,00 mmol/mol crea Ambos 4 - 7 Años 21,00 - 61,00 mmol/mol crea Ambos 7 - 13 Años 18,00 - 59,00 mmol/mol crea Ambos Sup - 13 Años 18,00 - 47,00 mmol/mol crea
H3MP **HISTIDINA 3 METIL, PLASMA**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	17	Rec. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] El plasma se ha de congelar en 1 hora tras la extracción.	Adultos Inf 5,00 µmol/L Prematuros Inf 5,00 µmol/L Recién Nacidos 5,00 - 23,00 µmol/L
AHIST **HISTONAS ANTICUERPOS, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 20,00 RU/mL Positivo: Sup= 20,00 RU/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
HCMB **HISTOPLASMA CAPSULATUM ANTICUERPOS, MUESTRA BIOLOLÓGICA**	Inmunodifusión Doble.	5	Rec. 1 mL Líquido biológico [Refr.] Alt. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 1 mL Líquido ascítico [Refr.] Alt. 1 mL LCR [Refr.] Alt. 1 mL BAL [Refr.]	Banda H: Negativo Banda M: Negativo
ACHC **HISTOPLASMA CAPSULATUM ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunodifusión Doble.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Banda H: Negativo Banda M: Negativo
DNHC **HISTOPLASMA CAPSULATUM DNA, ORINA/MUESTRA BIOLÓGICA**	Nested-PCR.	6	Rec. 10 mL Orina [Refr.] Rec. 1 mL Líquido pleural [Refr.] Alt. 1 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 1 mL ADN extraido (1 x Microtubos DNAse, RNAse Free) [Cong.] Menor sensibilidad LCR. Muestras alternativas: Sangre periférica-EDTA (Refrigerada, 4 días), biopsia (Refrigerada, 5 días), tejido en parafina, BAL (Congelada, 5 días)	No se detecta
HIV **HIV1+HIV2 SIDA VIRUS (ANTI HIV 1+ HIV 2 + p24) ANTICUERPOS, SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	No se detecta: Inf 1,00 Positivo: Sup 1,00 Positivo: Sup= 1,00

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
HIVLCR **HIV1+HIV2 SIDA VIRUS (ANTI HIV 1+ HIV 2) ANTICUERPOS + P24 ANTIGENO, LCR**	Quimioluminiscencia.	5	Rec. 1 mL LCR [Refr.]	Negativo: Inf 1,00 Índice Positivo: Sup 1,00 Índice
WB **HIV1+HIV2 SIDA VIRUS (ANTI HIV 1+ HIV 2) CONFIRMATORIO WESTERNBLOT ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunoblot.	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo
G17033 **HLA ALTA RESOLUCIÓN · PANEL · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-DPA1, HLA-DPB1, HLA-DQA1, HLA-DQB1, HLA-DRB1 *8*
B27 **HLA- B27 GENOTIPO, SANGRE TOTAL**	Multiplex PCR-Real Time.	3	Rec. 1 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	El informe ha de ser interpretado por un especialista dentro del contexto clínico y la historia familiar del paciente, en conjunto con otros hallazgos de laboratorio. Se recomienda asesoramiento genético. *1* En este estudio no se analizan otras variantes distintas a la estudiada. La variación genómica normal/polimórfica en la muestra del paciente puede interferir en la detección de la variante. HLA [B27]
ACHLAI **HLA CLASE I ANTICUERPOS ESTUDIO (CRIBADO), SUERO**	Inmunoanálisis	11	Rec. 5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	Def. Parcial DPD: No se detecta
ACHLACR **HLA CLASE I Y II ANTICUERPOS ESTUDIO (CRIBADO), SUERO**	Inmunoanálisis	20	Rec. 5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	Negativo
B27C **HLA-B27 ANTIGENOS DE HISTOCOMPATIBILIDAD B27, SANGRE TOTAL**	Citometría de flujo.	2	Rec. 3 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] No es necesario estar en ayunas.	Negativo

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
HLADQBR **HLA-DQ (Baja resolución) GENOTIPO, SANGRE TOTAL**	PCR-SSO.	12	Rec. 3 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Genotipo HLA DQA1: Indicado en informe adjunto Genotipo HLA DQB1: Indicado en informe adjunto
ACHMGCOA **HMGCOA REDUCTASA ANTICUERPOS, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	12	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Inf 20,00 UA/mL
HOLTCB **HOLO -TRANSCOBALAMINA, SUERO**	Quimioluminiscencia.	5	Rec. 2 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	25,10 - 165,00 pmol/L
G01036 **HOLT-ORAM, SÍNDROME DE · TBX5 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TBX5 *1*
HOM **HOMOCISTEINA, ORINA**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 10 mL Orina [Refr.]	Inf 20,00 µmol/L
HOMOCA **HOMOCISTEINA, SUERO**	Inmunoanálisis quimioluminiscente de micropartículas (CMIA)	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Centrifugar (<1h tras extracción), y conservar en frío después de la extracción. En caso de que el transporte de la muestra supere las 48 horas, debe de enviarse alicuota congelada.	Hombres 5,46 - 16,20 µmol/L Mujeres 4,44 - 13,56 µmol/L
G03082 **HOMOCISTEINURIA · CBS (Ile278Thr, Gly307Ser, c.844ins68) · HOT SPOT**	Hot Spot	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CBS [Ile278Thr, Gly307Ser, c.844ins68] *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G03081 **HOMOCISTEINURIA · CBS · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CBS *1*
G7272 **HOMOCISTINURIA · MTHFR · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	MTHFR
MTHA **HOMOCISTINURIA. DEFICIENCIA PARCIAL DE MTHFR · MTHFR(A1298C) · HOT SPOT**	Hot Spot	7	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Se informa para cada paciente *1* MTHFR [A1298C]
MTHFR **HOMOCISTINURIA. DEFICIENCIA PARCIAL DE MTHFR · MTHFR(C677T) · HOT SPOT**	Hot Spot	7	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Se informa para cada paciente *1* MTHFR [C677T]
PHON2 **HONGOS [EX. MICOLÓGICO] CULTIVO (2a MUESTRA), MUESTRA BIOLÓGICA**	Cultivo micológico en medios generales o específicos.	3	Rec. 1 Pieza/s Uña (1 x Tubo estéril) Rec. 1 Muestra/s Exudado (1 x Escobillón con medio de transporte.) [Refr.] Rec. 1 mL Frotis lingual (1 x Escobillón con medio de transporte.) [Refr.] Rec. 1 mL Frotis bucal (1 x Escobillón con medio de transporte.) [Refr.]	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
PHON3 **HONGOS [EX. MICOLÓGICO] CULTIVO (3a MUESTRA), MUESTRA BIOLÓGICA**	Cultivo micológico en medios generales o específicos.	3	Rec. 1 Pieza/s Uña (1 x Tubo estéril) Rec. 1 Muestra/s Frotis bucal (1 x Escobillón con medio de transporte.) [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Exudado (1 x Escobillón con medio de transporte.) [Refr.] Rec. 1 mL Frotis lingual (1 x Escobillón con medio de transporte.) [Refr.]	
PHON **HONGOS [EX. MICOLÓGICO] CULTIVO, MUESTRA BIOLÓGICA**	Cultivo micológico en medios generales o específicos.	3	Rec. 1 Muestra/s Uña (1 x Tubo estéril) [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Exudado (1 x Escobillón con medio de transporte.) [Refr.] Rec. 1 mL Frotis lingual (1 x Escobillón con medio de transporte.) [Refr.] Rec. 1 mL Frotis bucal (1 x Escobillón con medio de transporte.) [Refr.]	Negativo
DNHDER **HONGOS DERMATÓFITOS DNA (DETECCIÓN), MUESTRA BIOLÓGICA**	Reacción en cadena de la polimerasa.	8	Rec. 1 Muestra/s Uña (1 x Contenedor estéril) [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Escamas de piel (1 x Contenedor estéril) [Refr.]	No se detecta

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
DNHOID **HONGOS DNA (IDENTIFICACIÓN), MUESTRA BIOLÓGICA**	Técnica de secuenciación	8	Rec. 1 mL Líquido biológico (1 x Recipiente estéril) [Refr.] Muestras según el tipo de lesión: Tiña: pelos o escamas de cuero cabelludo. Herpes circinados de piel lampiña o eczemas marginados: Escamas del borde de la lesión. Oncomicosis: Fragmentos de uñas.	No se detecta

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
DNHP **HONGOS PATÓGENOS DNA DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN, MUESTRA BIOLÓGICA**	Nested-PCR + secuenciación	22	Rec. 1 Muestra/s Biopsia (1 x Contenedor con solución salina) [Refr.] Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Rec. 1 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 1 mL Orina (1 x Contenedor estéril) [Refr.] Rec. 1 mL Líquido sinovial (1 x Tubo estéril heparinizado) [Cong.] Rec. 1 mL Líquido biológico (1 x Tubo estéril) [Refr.] Rec. 1 mL LCR (1 x Tubo estéril) [Cong.] Rec. 1 mL Humor vitreo/acuoso (1 x Tubo estéril) [Cong.] Rec. 1 mL Esputo (1 x Contenedor estéril) [Refr.] Rec. 1 mL BAL (1 x Tubo estéril) [Refr.] No es recomendable el envío de uñas para la detección de hongos patógenos porque además de éstos se amplificarían hongos no patógenos y nos sería imposible distinguirlos mediante secuenciación.	DNA de hongos patógenos en muestra biológica (resultado): No se detecta

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
HONO **HONGOS, ORINA**	Cultivo en medios generales, de enriquecimiento y/o específicos	3	Rec. 1 mL Orina [Refr.]	La candiduria en pacientes asintomáticos casi siempre representa una colonización y no está recomendado el tratamiento antifúngico a menos que el paciente pertenezca a un grupo de alto riesgo. Ante la presencia de candidas en mujeres se recomienda descartar candidiasis vaginal.
ACTH3 **HORMONA ADRENOCORTICOTROPA (ACTH) (3'), PLASMA**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Plasma 3 m. EDTA [Cong.]	pg/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
ACTH10 **HORMONA ADRENOCORTICOTROPA (ACTH) (10'), PLASMA**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Plasma 10 m. EDTA [Cong.]	pg/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
ACTH15 **HORMONA ADRENOCORTICOTROPA (ACTH) (15'), PLASMA**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Plasma 15 m. EDTA [Cong.]	pg/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
ACTH30 **HORMONA ADRENOCORTICOTROPA (ACTH) (30'), PLASMA**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Plasma 30 m. EDTA [Cong.]	pg/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
ACTH45 **HORMONA ADRENOCORTICOTROPA (ACTH) (45'), PLASMA**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Plasma 45 m. EDTA [Cong.]	pg/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
ACTH60 **HORMONA ADRENOCORTICOTROPA (ACTH) (60'), PLASMA**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Plasma 60 m. EDTA [Cong.]	pg/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
ACTH90 **HORMONA ADRENOCORTICOTROPA (ACTH) (90'), PLASMA**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Plasma 90 m. EDTA [Cong.]	pg/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ACTH120 **HORMONA ADRENOCORTICOTROPA (ACTH) (120'), PLASMA**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Plasma 120 m. EDTA [Cong.]	pg/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
ACTH180 **HORMONA ADRENOCORTICOTROPA (ACTH) (180'), PLASMA**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Plasma 180 m. EDTA [Cong.]	pg/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
ACTH75 **HORMONA ADRENOCORTICOTROPA (ACTH) (75'), PLASMA**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Plasma 75 m. EDTA [Cong.]	pg/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba.
QACT **HORMONA ADRENOCORTICOTROPA (ACTH) RITMO (8h-20h), PLASMA**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Plasma basal [Cong.] Rec. 1 mL Plasma 20h. [Cong.]	La ACTH presenta un ritmo de secreción circadiana, regulado por los ciclos de luz y oscuridad. La concentración de ACTH alcanza el punto máximo al despertar y va disminuyendo a lo largo del día, hasta llegar a una concentración mínima alrededor de la media noche. Otros factores como el dolor, la fiebre y la hipoglucemia estimulan también la secreción de ACTH. La secreción de ACTH se utiliza para evaluar la funcionalidad del eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal. ACTH 20 h: Inf 20,00 pg/mL ACTH 8 h: Inf 40,00 pg/mL
ACTH **HORMONA ADRENOCORTICOTROPA (ACTH), PLASMA**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Separar y congelar antes de las 2 horas después de la extracción.	Inf 48,80 pg/mL
ACTHDE **HORMONA ADRENOCORTICOTROPA (ACTH), PLASMA TRAS DEXAMETASONA**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Plasma tras dexametasona EDTA [Cong.]	pg/mL Interpretación según criterio clínico

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
AMHPF **HORMONA ANTIMULLERIANA, SANGRE SECA (DBS)**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 Muestra/s Sangre seca en papel de filtro (1 x Papel de filtro Whatman 903)	
HGHEJ **HORMONA DE CRECIMIENTO - SOMATOTROPINA POST EJERCICIO (HGH) , SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Sup 7,40 ng/mL
G03124 **HORMONA DE CRECIMIENTO, DEFICIENCIA AISLADA DE · GH1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GH1 *1*
HGH10 **HORMONA DE CRECIMIENTO-SOMATOTROPINA (HGH) (10'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 10 m [Refr.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
HGH15 **HORMONA DE CRECIMIENTO-SOMATOTROPINA (HGH) (15'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 15 m. [Refr.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
HGH-15 **HORMONA DE CRECIMIENTO-SOMATOTROPINA (HGH) (-15'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero -15 m. [Refr.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
HGH20 **HORMONA DE CRECIMIENTO-SOMATOTROPINA (HGH) (20'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 20 m. [Refr.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
HGH30 **HORMONA DE CRECIMIENTO-SOMATOTROPINA (HGH) (30'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 30 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
HGH45 **HORMONA DE CRECIMIENTO-SOMATOTROPINA (HGH) (45'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 45 m. [Refr.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
HGH60 **HORMONA DE CRECIMIENTO-SOMATOTROPINA (HGH) (60'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 60 m. [Refr.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
HGH90 **HORMONA DE CRECIMIENTO-SOMATOTROPINA (HGH) (90'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 90 m. [Refr.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
HGH120 **HORMONA DE CRECIMIENTO-SOMATOTROPINA (HGH) (120'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 120 m. [Refr.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
HGH150 **HORMONA DE CRECIMIENTO-SOMATOTROPINA (HGH) (150'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 150 m. [Refr.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
HGH180 **HORMONA DE CRECIMIENTO-SOMATOTROPINA (HGH) (180'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 180 m. [Refr.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
HGH210 **HORMONA DE CRECIMIENTO-SOMATOTROPINA (HGH) (210'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	4	Rec. 1 mL Suero 210 m. [Refr.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
HGH240 **HORMONA DE CRECIMIENTO-SOMATOTROPINA (HGH) (240'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 240 m. [Refr.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
HGH300 **HORMONA DE CRECIMIENTO-SOMATOTROPINA (HGH) (300'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	4	Rec. 1 mL Suero 300 m. [Refr.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
HGH75 **HORMONA DE CRECIMIENTO-SOMATOTROPINA (HGH) (75'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 75 m. [Refr.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
HGH **HORMONA DE CRECIMIENTO-SOMATOTROPINA (HGH), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Hombres Inf 1,23 ng/mL Mujeres Inf 6,88 ng/mL
TSH10 **HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES (TSH) (10'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 10 m [Refr.]	mUI/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
TSH20 **HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES (TSH) (20'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 20 m. [Refr.]	mU/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
TSH30 **HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES (TSH) (30'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 30 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	mU/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
TSH45 **HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES (TSH) (45'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 45 m. [Refr.]	mU/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
TSH60 **HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES (TSH) (60'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 60 m. [Refr.]	mU/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
TSH **HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES (TSH), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Ambos 0 - 5 Días 0,70 - 15,20 mU/L Ambos 5 - 60 Días 0,70 - 11,00 mU/L Ambos 60 - 365 Días 0,70 - 8,40 mU/L Gestación 1º trimestre Inf 2,50 mU/L Gestación 2º trimestre Inf 3,50 mU/L Gestación 3º trimestre Inf 3,50 mU/L Ambos 1 - 5 Años 0,70 - 6,00 mU/L Ambos 5 - 19 Años 0,50 - 4,80 mU/L Ambos Sup - 19 Años 0,30 - 4,20 mU/L
FSH15 **HORMONA FOLICULOESTIMULANTE (FSH) (15'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 15 m. [Refr.]	UI/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
FSH20 **HORMONA FOLICULOESTIMULANTE (FSH) (20'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 20 m. [Refr.]	UI/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
FSH45 **HORMONA FOLICULOESTIMULANTE (FSH) (45'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 45 m. [Refr.]	UI/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
FSH60 **HORMONA FOLICULOESTIMULANTE (FSH) (60'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 60 m. [Refr.]	UI/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
FSH90 **HORMONA FOLICULOESTIMULANTE (FSH) (90'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 90 m. [Refr.]	UI/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
FSH120 **HORMONA FOLICULOESTIMULANTE (FSH) (120'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 120 m. [Refr.]	UI/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
FSH180 **HORMONA FOLICULOESTIMULANTE (FSH) (180'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 180 m. [Refr.]	UI/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
FSH30 **HORMONA FOLICULOESTIMULANTE (FSH) (30'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 30 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	UI/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
FSH **HORMONA FOLICULOESTIMULANTE (FSH), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] En mujeres, Indicar fase menstrual.	Hombres 0,95 - 11,95 mUI/mL Fase Folicular Mujeres 3,03 - 8,08 mUI/mL Fase Luteal Mujeres 1,38 - 5,47 mUI/mL Fase Ovulatoria Mujeres 2,55 - 16,69 mUI/mL Postmenopausia Mujeres 26,72 - 133,41 mUI/mL
CRF **HORMONA LIBERADORA DE CORTICOTROPINA (CRH), PLASMA**	Enzimoinmunoanálisis	17	Rec. 2 mL Plasma EDTA Aprotinina (1 x Tubo Sangre EDTA Aprotinina) [Cong.] Separar el plasma y congelar inmediatamente después de la extracción.	12,40 - 64,00 pg/mL
GNRH **HORMONA LIBERADORA DE GONADOTROFINA (GNRH), SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	17	Rec. 650 uL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	NOTA: Determinación realizada mediante un procedimiento EIA de tipo RUO. Los valores reportados tienen carácter orientativo. 4,09 - 11,55 ng/mL
LH15 **HORMONA LUTEINIZANTE (LH) (15'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 15 m. [Refr.]	UI/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
LH20 **HORMONA LUTEINIZANTE (LH) (20'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 20 m. [Refr.]	UI/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
LH30 **HORMONA LUTEINIZANTE (LH) (30'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 30 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	UI/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
LH45 **HORMONA LUTEINIZANTE (LH) (45'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 45 m. [Refr.]	UI/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
LH60 **HORMONA LUTEINIZANTE (LH) (60'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 60 m. [Refr.]	UI/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
LH90 **HORMONA LUTEINIZANTE (LH) (90'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 90 m. [Refr.]	UI/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
LH120 **HORMONA LUTEINIZANTE (LH) (120'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 120 m. [Refr.]	UI/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
LH180 **HORMONA LUTEINIZANTE (LH) (180'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 180 m. [Refr.]	UI/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
LH **HORMONA LUTEINIZANTE (LH), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] En mujeres, Indicar fase menstrual.	Hombres 0,57 - 12,07 mIU/mL Fase Folicular Mujeres 1,80 - 11,78 mIU/mL Fase Luteal Mujeres 0,56 - 14,00 mIU/mL Pico Ovulatorio Mujeres 7,89 - 89,08 mIU/mL Postmenop. sin THS Mujeres 5,16 - 61,99 mIU/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G03092 **HORMONA PITUITARIA, DEFICIENCIA · POU1F1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	POU1F1 *1*
G4093 **HORMONAS TIROIDEAS, RESISTENCIA A · THRB · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	THRB *1*
HTLC **HTLV 1/2 ANTICUERPOS (CONFIRMATORIO), SUERO**	Inmunoblot.	10	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Las fracciones de confirmación a considerar son: Gag P19 I/II, Gag p24 I/II, Env gp46 I/II, Env gp21 I/II. -Ninguna banda: Negativo -Una Banda: -p19 I/II o p24 I/II o gp46 I/II: Negativo -gp21: Indeterminado -Dos bandas: - gp21 no reactivo: Indeterminado - gp21 reactivo: Positivo -Tres bandas o más: Positivo.	Env gp21 I/II: Interpretación: Negativo Env gp 46 I: Interpretación: Negativo Env gp46 II: Interpretación: Negativo Gag P19 I/II: Interpretación: Negativo Gag p 19 I: Interpretación: Negativo Gag p24 I/II: Interpretación: Negativo Env gp46 I/II: Interpretación: Negativo Resultado:: Interpretación: Negativo
DNHT **HTLV I + HTLV II DNA, SANGRE TOTAL**	Reacción en cadena de la polimerasa.	8	Rec. 3 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	: No se detecta

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
HTLVLCR **HTLV I + HTLV II VIRUS T LINFOTROPICO HUMANO TIPO I / II ANTICUERPOS, LCR**	Enzimoinmunoanálisis	4	Rec. 1 mL LCR [Refr.] Se requiere recoger la muestra de LCR en tubo de polipropileno.	Índice Interpretación según criterio clínico	
HTLV **HTLV I + HTLV II VIRUS T LINFOTROPICO HUMANO TIPO I / II ANTICUERPOS, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	4	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Muestra alternativa: plasma-EDTA. No es necesario estar en ayunas.	Negativo: Inf 1,00 Índice Positivo: Sup= 1,00 Índice	
HU **HU (ANNA 1) ANTICUERPOS IGG, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo Tejido: Células Transfectadas En caso de positividad, el resultado debe ser confirmado con un método alternativo (inmunoblot). En caso de negatividad, no se descarta la existencia de un síndrome neurológico autoinmune	
HULCR **HU ANTICUERPOS, LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL LCR [Refr.]	Negativo	
G3009 **HUNTINGTON, ENFERMEDAD DE · HTT · A.FRAGMENTOS**	Análisis de Fragmentos	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	HTT	*1*
G11253 **HUNTINGTON-LIKE TIPO 1 · PRNP · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PRNP	*1*
G11303 **HUNTINGTON-LIKE TIPO 1 · PRNP · A. FRAGMENTOS**	Análisis de Fragmentos	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Indicado en informe adjunto PRNP	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G11283 **HUNTINGTON-LIKE TIPO 2, ENFERMEDAD DE · JPH3 · A.FRAGMENTOS**	Análisis de Fragmentos	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	
AIA2 **IA2 DIABETES MELLITUS INSULINO DEPENDIENTE ANTICUERPOS, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	9	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] No es necesario estar en ayunas.	Negativo: Inf 10,00 UI/mL
IBUSU **IBUPROFENO, SUERO**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	20	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Cong.] Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	I.Terapéutico: 5,00 - 50,00 mg/L Conc.Tóxica: Sup 100,00 mg/L
ICAM1S **ICAM-1 SOLUBLE (sCD54), SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	32	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Consultar plazo de entrega con el laboratorio.	70,00 - 213,00 ng/mL
G02021 **ICTIOSIS · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABCA12, ABHD5, ALDH3A2, ALOX12B, ALOXE3, AP1S1, ARCI7, CDSN, CLDN1, CSTA , CYP4F22, EBP, ELOVL4, ERCC2, ERCC3, FLG, GBA, GJA1, GJB2, GJB3, GJB4, GJB6, GTF2H5, KRT1, KRT10, KRT2, LIPN, LOR, MBTPS2, MPLKIP, NIPAL4, NSDHL, PEX7, PHYH, PIGL, PNPLA1 , POMP, PSAT1, SLC27A4, SLURP1, SNAP29, SPINK5, ST14, STIM1 , STS, SUMF1, TGM1, VPS33B *48*
G02022 **ICTIOSIS CONGÉNITA AR TIPO 1 · TGM1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TGM1 *1*
G02023 **ICTIOSIS LIGADA AL CROMOSOMA X · STS · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	STS *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G02024 **ICTIOSIS LIGADA AL CROMOSOMA X · STS · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	STS *1*
G02025 **ICTIOSIS NO SINDRÓMICA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABCA12, ALOX12B, ALOXE3, CDSN, CSTA , CYP4F22, FLG, GJB3, GJB4, KRT1, KRT10, KRT2, LIPN, LOR, NIPAL4, PNPLA1 , POMP, SLURP1, STS, TGM1 *20*
G02026 **ICTIOSIS SEMEJANTE A HYSTRIX CON SORDERA · GJB2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GJB2 *1*
G02027 **ICTIOSIS SINDRÓMICA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABHD5, ALDH3A2, AP1S1, CLDN1, EBP, ELOVL4, ERCC2, ERCC3, GBA, GJA1, GJB2, GJB6, GTF2H5, MBTPS2, MPLKIP, NSDHL, PEX7, PHYH, PIGL, PSAT1, SLC27A4, SNAP29, SPINK5, ST14, STIM1 , STS, SUMF1, VPS33B *28*
ACIRCOF **IDENTIFICACIÓN AC.IRREGULARES COMPLEJOS (ESTUDIO FAMILIAR)**	Hemaglutinación.	7	Rec. 3 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 10 mL Sangre total EDTA (4 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Se precisan ambas muestras.	
IDMMT2 **IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS POR MALDI-TOF BARCELONA (2ª MUESTRA), MUESTRA BIOLÓGICA**	Espectrometría de masas MALDI-TOF	3	Rec. 1 mL Líquido biológico	
IDMMT3 **IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS POR MALDI-TOF BARCELONA (3ª MUESTRA), MUESTRA BIOLÓGICA**	Espectrometría de masas MALDI-TOF	3	Rec. 1 mL Líquido biológico	
IDMMT **IDENTIFICACION DE BACTERIAS POR MALDI-TOF, MUESTRA BIOLOGICA**	Espectrometría de masas MALDI-TOF	3	Rec. 1 mL Líquido biológico	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
IDCRI **IDENTIFICACIÓN DE CRIOGLOBULINAS, SUERO**	Inmunoelectroforesis.	7	Rec. 1 mL Suero [Refr.]	
IDMMH **IDENTIFICACIÓN DE HONGOS POR MALDI-TOF, MUESTRA BIOLÓGICA**	Espectrometría de masas MALDI-TOF	1	Rec. 1 mL Líquido biológico	
IDMMM **IDENTIFICACIÓN DE MICOBACTERIAS POR MALDI-TOF, MUESTRA BIOLÓGICA**	Espectrometría de masas MALDI-TOF	1	Rec. 1 mL Líquido biológico	
RS242 **IgE ESPECÍFICA Acelga (Rs242) Alimentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	8	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 kU/L
F172 **IgE ESPECÍFICA Alcachofa (f172) Alimentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica (1 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina litio (1 x Tubo sangre heparina litio) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F98 **IgE ESPECÍFICA Gliadina (f98) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
F275 **IgE ESPECÍFICA Levístico (f275) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
F218 **IgE ESPECÍFICA Pimiento dulce/Pimentón dulce (Capsicum annuum) (f218) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
RT3 **IgE ESPECÍFICA Abedul (betula verrucosa) (t3) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
I205 **IgE ESPECÍFICA Abejorro (bombus terrestris) (i205) Insectos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
D70 **IgE ESPECÍFICA Acarus siro (d70) Ácaros, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
W18 **IgE ESPECÍFICA Acedera (rumex acetosella) (w18) Polen malezas, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
T223 **IgE ESPECÍFICA Aceite de palma (t223) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
F342 **IgE ESPECÍFICA Aceituna (f342) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
C320 **IgE ESPECÍFICA Acetilcisteina (c320) Medicamentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 U/mL
C51 **IgE ESPECÍFICA Ácido acetilsalicílico (c217) Medicamentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 kU/L
C702 **IgE ESPECÍFICA Ácido Ascórbico (c702) Medicamentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 U/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
C703 **IgE ESPECÍFICA Acido Benzoico (C703) Medicamentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 kU/L
ACLAV **IgE ESPECÍFICA Ácido clavulánico (c305) Medicamentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 kU/L
M202 **IgE ESPECÍFICA Acremonium kiliense (m202) Mohos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F96 **IgE ESPECÍFICA Aguacate (f96) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
W5 **IgE ESPECÍFICA Ajenjo (artemisia absinthium) (w5) Polen malezas, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F47 **IgE ESPECÍFICA Ajo (f47) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
T14 **IgE ESPECÍFICA Álamo negro (populus deltoides) (t14) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F269 **IgE ESPECÍFICA Albahaca (f269) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F237 **IgE ESPECÍFICA Albaricoque (f237) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
K87 **IgE ESPECÍFICA Alfa amilasa (k87) Ocupacional, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F11 **IgE ESPECÍFICA Alforfón (f11) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F296 **IgE ESPECÍFICA Algarroba (f296) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
O1 **IgE ESPECÍFICA Algodón fibra (o1) Ocupacional, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
K83 **IgE ESPECÍFICA Algodón semilla (k83) Ocupacional, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
T2 **IgE ESPECÍFICA Aliso gris (alnus incana) (t2) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F207 **IgE ESPECÍFICA Almeja (f207) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F20 **IgE ESPECÍFICA Almendra (f20) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
T44 **IgE ESPECÍFICA Almez (Hackberry) (t44) polen arboles, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F56 **IgE ESPECÍFICA Almorejo (f56) alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
G71 **IgE ESPECÍFICA Alpiste (phalaris arundinacea) (g71) Polen gramíneas, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
M6 **IgE ESPECÍFICA Alternaria alternata (A. tenuis) (M6) Mohos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
RM229 **IgE ESPECÍFICA Alternaria rAlt a1 (recombinante RM229) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
F335 **IgE ESPECÍFICA Altramuz (f335) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F287 **IgE ESPECÍFICA Alubia roja (f287) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
W14 **IgE ESPECÍFICA Amaranto (amaranthus retroflexus)(w14) Polen malezas, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
W1 **IgE ESPECÍFICA Ambrosia comun (ambrosia elatior) (w1) Polen malezas, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
W4 **IgE ESPECÍFICA Ambrosia falsa (franseria acanthicarpa) (w4) Polen malezas, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
W3 **IgE ESPECÍFICA Ambrosia gigante (ambrosia trifida) (w3) Polen malezas, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
W2 **IgE ESPECÍFICA Ambrosia oeste (ambrosia psilostachya) (w2) Polen malezas, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
C204 **IgE ESPECÍFICA Amoxicilina (c6) Medicamentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
C203 **IgE ESPECÍFICA Ampicilina (c5) Medicamentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F202 **IgE ESPECÍFICA Anacardo (f202) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
K79 **IgE ESPECÍFICA Anhidrido ftalico (k79) Ocupacional, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
K210 **IgE ESPECÍFICA Anhídrido maleico (k210) Ocupacional, SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F271 **IgE ESPECÍFICA Anis (pimpinella anisum) (f271) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
P4 **IgE ESPECÍFICA Anisakis (p4) Parásitos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F85 **IgE ESPECÍFICA Apio (f85) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
I208 **IgE ESPECÍFICA Apis mellifera Phospholipase A2 rApi m 1 (i208) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
I217 **IgE ESPECÍFICA Apis mellifera rApi m10 (i217) Insectos, SUERO**	ImmunoCAP®	2	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
I215 **IgE ESPECÍFICA Apis mellifera rApi m3 (i215) Insectos, SUERO**	ImmunoCAP®	2	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
I216 **IgE ESPECÍFICA Apis Mellifera rApi m5 (i216) insectos, SUERO**	ImmunoCAP®	2	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
F288 **IgE ESPECÍFICA Arándano azul (rf288) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F341 **IgE ESPECÍFICA Arándano rojo (f341) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	6	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
T1 **IgE ESPECÍFICA Arce (acer negundo) (t1) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F205 **IgE ESPECÍFICA Arenque (f205) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F9 **IgE ESPECÍFICA Arroz (f9) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
W6 **IgE ESPECÍFICA Artemisia (artemisia vulgaris) (w6) Polen malezas, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
C68 **IgE ESPECÍFICA Articaina (c231) Medicamentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
P1 **IgE ESPECÍFICA Ascaris (p1) Parásitos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
M228 **IgE ESPECÍFICA Aspergillus flavus (m228) Mohos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
M3 **IgE ESPECÍFICA Aspergillus fumigatus (m3) Mohos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
M207 **IgE ESPECÍFICA Aspergillus niger (m207) Mohos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
M36 **IgE ESPECÍFICA Aspergillus terreus (m36) Mohos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
M19 **IgE ESPECÍFICA Aspergillus versicolor (m19) Mohos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
W15 **IgE ESPECÍFICA Atriplice (atriplex lentiformis) (w15) Polen malezas, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F40 **IgE ESPECÍFICA Atún (f40) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
M12 **IgE ESPECÍFICA Aureobasidium pullulans (m12) Mohos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F17 **IgE ESPECÍFICA Avellana (f17) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F428R **IgE ESPECÍFICA Avellana rCor a 1 (PR-10) f428R Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	5	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
RF425 **IgE ESPECÍFICA Avellana rCor a 8 LTP (F425R) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	5	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
RT4 **IgE ESPECÍFICA Avellano (corylus avellana)(t4) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
G14 **IgE ESPECÍFICA Avena (avena sativa) (g14) Polen gramíneas, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F7 **IgE ESPECÍFICA Avena (f7) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
I77 **IgE ESPECÍFICA Avispa (polistes dominulus) (i77) Insectos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F331 **IgE ESPECÍFICA Azafrán (f331) Alimentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	4	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 KU/L
AZIR **IgE ESPECÍFICA Azitromicina Medicamentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
I8 **IgE ESPECÍFICA B.mori (gusano de seda) (i8) Insectos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
F3 **IgE ESPECÍFICA Bacalao (f3) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
G5 **IgE ESPECÍFICA Ballico (lolium perenne) (g5) Polen gramíneas, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F51 **IgE ESPECÍFICA Bambú - Phyllostachys pubescens (f51) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
F262 **IgE ESPECÍFICA Berenjena (f262) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
T221 **IgE ESPECÍFICA Betula verrucosa (t221) polen arboles, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
D201 **IgE ESPECÍFICA Blomia tropicalis (d201) Ácaros, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F80 **IgE ESPECÍFICA Bogavante (f80) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F54 **IgE ESPECÍFICA Boniato (f54) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F313 **IgE ESPECÍFICA Boquerón (f313) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
M7 **IgE ESPECÍFICA Botrytis cinerea (m7) Mohos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F260 **IgE ESPECÍFICA Brassica oleracea(brocoli) (f260) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
K202 **IgE ESPECÍFICA Bromelina (k202) Ocupacional, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
C285 **IgE ESPECÍFICA Bupivacaina (c285) Medicamentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 U/mL
F206 **IgE ESPECÍFICA Caballa (f206) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F50 **IgE ESPECÍFICA Caballa Japonesa (Scomber japonicus) (f50) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
F13 **IgE ESPECÍFICA Cacahuete (f13) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F93 **IgE ESPECÍFICA Cacao (f93) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F221 **IgE ESPECÍFICA Café (f221) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F225 **IgE ESPECÍFICA Calabaza (f225) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F226 **IgE ESPECÍFICA Calabaza (f226) (semilla) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F258 **IgE ESPECÍFICA Calamar (f258) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F58 **IgE ESPECÍFICA Calamar del pacífico (f58) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
M5 **IgE ESPECÍFICA Candida albicans (m5) Mohos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F220 **IgE ESPECÍFICA Canela (f220) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F23 **IgE ESPECÍFICA Cangrejo de mar (f23) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F320 **IgE ESPECÍFICA Cangrejo de rio (f320) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G4 **IgE ESPECÍFICA Canuela (festuca elatior) (g4) Polen gramíneas, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F301 **IgE ESPECÍFICA Caqui (Diospyros kaki) f301 Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
F314 **IgE ESPECÍFICA Caracol (f314) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F26 **IgE ESPECÍFICA Carne de cerdo (f26) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F213 **IgE ESPECÍFICA Carne de conejo (f213) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F88 **IgE ESPECÍFICA Carne de cordero (f88) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F83 **IgE ESPECÍFICA Carne de pollo (f83) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F27 **IgE ESPECÍFICA Carne de ternera (f27) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
G7 **IgE ESPECÍFICA Carrizo (phragmites communis) (g7) Polen gramíneas, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F265 **IgE ESPECÍFICA Carum carvi (Alcaravea) (f265) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
E3 **IgE ESPECÍFICA Caspa de caballo (e3) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
E1 **IgE ESPECÍFICA Caspa de gato (e1) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
E5 **IgE ESPECÍFICA Caspa de perro (e5) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
E4 **IgE ESPECÍFICA Caspa de vaca (e4) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F299 **IgE ESPECÍFICA Castaña (f299) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
T206 **IgE ESPECÍFICA Castaño (castanea sativa) (t206) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
T203 **IgE ESPECÍFICA Castaño de indias (t203) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
T21 **IgE ESPECÍFICA Cayeput (malaleuca leucadendron) (t21) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
O214 **IgE ESPECÍFICA CCD MUXF3, Bromelina (O214)** **Otros, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
F6 **IgE ESPECÍFICA Cebada (f6) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
G201 **IgE ESPECÍFICA Cebada (hordeum vulgare) (g201)** **Polen gramíneas, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F48 **IgE ESPECÍFICA Cebolla (f48) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
T57 **IgE ESPECÍFICA Cedro rojo (Juniperus virginiana) (t57) polen arboles, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
C7 **IgE ESPECÍFICA Cefaclor (c7) Medicamentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
CFLX **IgE ESPECÍFICA Cefalexina Medicamentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 kU/L
C55 **IgE ESPECÍFICA Cefalosporina (c55), Medicamentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 0.5 mL Suero [Refr.]	Inf 0,35
C308 **IgE ESPECÍFICA Cefuroxima (c308) Medicamentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 U/mL
W10 **IgE ESPECÍFICA Cenigo (chenopodium album) (w10) Polen malezas, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F5 **IgE ESPECÍFICA Centeno (f5) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
G12 **IgE ESPECÍFICA Centeno (secale cereale) (g12) Polen gramíneas, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F242 **IgE ESPECÍFICA Cereza (f242) alimento Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
M208 **IgE ESPECÍFICA Chaetomium globosum (m208) Mohos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F212 **IgE ESPECÍFICA Champiñón (f212) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F347 **IgE ESPECÍFICA Chenopodium quinoa (F347) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F317 **IgE ESPECÍFICA Cilantro (f317) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
T23 **IgE ESPECÍFICA Cipres (cupressus sempervirvens) (t23) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
T37 **IgE ESPECÍFICA Ciprés de los pantanos (Taxodium distichum) (t37) polen arboles, SUERO**	ImmunoCAP®	2	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
C108 **IgE ESPECÍFICA Ciprofloxacina (c307) Medicamentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 kU/L
F255 **IgE ESPECÍFICA Ciruela (f255) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
M2 **IgE ESPECÍFICA Cladosporium herbarum (m2) Mohos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F1 **IgE ESPECÍFICA Clara de huevo (f1) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
CLARIR **IgE ESPECÍFICA Claritromicina Medicamentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 kU/L
F268 **IgE ESPECÍFICA Clavo (f268) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
C306 **IgE ESPECÍFICA Clindamicina (c306) Medicamentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 kU/L
C342 **IgE ESPECÍFICA Cloranfenicol (c342) Medicamentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 kU/L
C8E **IgE ESPECÍFICA Clorhexidina (c8) Medicamentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
C310 **IgE ESPECÍFICA Cloxacilina (c310) Medicamentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	5	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 kU/L
F36 **IgE ESPECÍFICA Coco (f36) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F216 **IgE ESPECÍFICA Col (f216) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G16 **IgE ESPECÍFICA Cola zorra (alopecurus pratensis) (g16) Polen gramíneas, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F217 **IgE ESPECÍFICA Coles de bruselas (f217) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F291 **IgE ESPECÍFICA Coliflor (f291) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
E110 **IgE ESPECÍFICA Colorante amarillo-naranja (c706) Alimentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 kU/L
W203 **IgE ESPECÍFICA Colza (w203) Polen malezas, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F266 **IgE ESPECÍFICA corteza de nuez moscada (f266) Alimentos, suero**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
IGEVEHEM **IgE ESPECÍFICA Cribado venenos himenópteros (i1, i3, i75, i77, i208, i209, i210, i211, i213, i216, i220, CCD), SUERO**	Inmunoblot.	17	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo
T17 **IgE ESPECÍFICA Cryptomeria japonica (t17) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
I6 **IgE ESPECÍFICA Cucaracha (blatella germanica) (i6) Insectos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
I206 **IgE ESPECÍFICA Cucaracha americana (i206) Insectos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
I207 **IgE ESPECÍFICA Cucaracha oriental (blatta orientalis) (i207) Insectos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	10	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 KU/L
T222 **IgE ESPECÍFICA Cupressus arizonica (t222) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F281 **IgE ESPECÍFICA Curry (f281) Alimentos, SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
M16 **IgE ESPECÍFICA Curvularia lunata (m16) Mohos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
G3 **IgE ESPECÍFICA Dactylis glomerata (g3) Polen gramíneas, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F289 **IgE ESPECÍFICA Dátil (phoenix dacttylifera) (f289) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
T214 **IgE ESPECÍFICA Datilera (phoenix canariensis) (t214)** **Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
D2 **IgE ESPECÍFICA Dermatophagoides farinae(d2)** **Ácaros, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
D3 **IgE ESPECÍFICA Dermatophagoides microceras (d3)** **Ácaros, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
RD202 **IgE ESPECÍFICA Dermatophagoides p. Derp1 Rd202/s Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
RD203 **IgE ESPECÍFICA Dermatophagoides p. Derp2 Rd203/s Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
RD209 **IgE ESPECÍFICA Dermatophagoides p. rDer p 23 Rd209/s Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	2	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
D1 **IgE ESPECÍFICA Dermatophagoides pteronyssinus (d1) Ácaros, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
C350 **IgE ESPECÍFICA Dexametasona (c350) Medicamentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 U/mL
C79 **IgE ESPECÍFICA Diclofenaco sódico (voltaren) (c281) Medicamentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
W8 **IgE ESPECÍFICA Diente leon (taraxacum vulgare) (w8) Polen malezas, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
C91 **IgE ESPECÍFICA Dipirona (nolotil-metamizol) (c294) Medicamentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 kU/L
C62 **IgE ESPECÍFICA Doxiciclina (c216) Medicamentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F267 **IgE ESPECÍFICA Elettaria cardamomum (f267) Alimentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 kU/L
G70 **IgE ESPECÍFICA Elymus triticoides (g70) Polen gramíneas, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
T6 **IgE ESPECÍFICA Enebro (juniperus sabinoides) (t6) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F277 **IgE ESPECÍFICA Eneldo (f277) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
M14 **IgE ESPECÍFICA Epicoccum purpurascens (m14) Mohos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
REEPI **IgE ESPECÍFICA Epinefrina Medicamentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	7	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
E80 **IgE ESPECÍFICA Epitelio de cabra (e80) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
E83 **IgE ESPECÍFICA Epitelio de cerdo (e83) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
E6 **IgE ESPECÍFICA Epitelio de cobaya (e6) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
E82 **IgE ESPECÍFICA Epitelio de conejo (e82) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
E84 **IgE ESPECÍFICA Epitelio de hamster (e84) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
E81 **IgE ESPECÍFICA Epitelio de oveja (e81) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
E2 **IgE ESPECÍFICA Epitelio de perro (e2) epidermicos, SUERO**	Quimioluminiscencia.	2	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
E73 **IgE ESPECÍFICA Epitelio de rata (e73) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
E71 **IgE ESPECÍFICA Epitelio de ratón (e71) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
E208 **IgE ESPECÍFICA Epitelio y caspa de chinchilla (e208) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
C61 **IgE ESPECÍFICA Eritromicina (c212) Medicamentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 kU/L
I76 **IgE ESPECÍFICA Escarabajo (trogoderma angustum solier) (i76) Insectos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
O211 **IgE ESPECÍFICA Escarabajo de la harina (O211) , SUERO**	ImmunoCAP®	7	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F261 **IgE ESPECÍFICA Espárrago (f261) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F124 **IgE ESPECÍFICA Espelta (Triticum spelta) (f124) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
G8 **IgE ESPECÍFICA Espiguilla (poa pratensis) (g8) Polen gramíneas, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F214 **IgE ESPECÍFICA Espinacas (f214) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F272 **IgE ESPECÍFICA Estragón (f272) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
C66 **IgE ESPECÍFICA Estreptomicina (c295) Medicamentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
T18 **IgE ESPECÍFICA Eucalipto (eucalyptus) (t18) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
W46 **IgE ESPECÍFICA Eupatorium capillifolium (W46) polen malezas, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
D74 **IgE ESPECÍFICA Euroglypus maynei (d74) Ácaros, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
E200 **IgE ESPECÍFICA Excremento de canario (e200) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
E7 **IgE ESPECÍFICA Excremento de paloma (e7) Epidérmicos, SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
E77 **IgE ESPECÍFICA Excremento de periquito (e77) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
E218 **IgE ESPECÍFICA Excremento de pollo (e218) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F340 **IgE ESPECÍFICA Extracto de cochinilla (f340) alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
FBZ **IgE ESPECÍFICA Fenilbutazona (c419) Medicamentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 kU/L
K81 **IgE ESPECÍFICA Ficus spp (k81) Ocupacional, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
O70 **IgE ESPECÍFICA Fluido seminal (o70) Otros, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
C261 **IgE ESPECÍFICA Folcodina (C261) Medicamentos, Suero**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
K80 **IgE ESPECÍFICA Formaldehido (k80) Ocupacional, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
C375 **IgE ESPECÍFICA Fosfomicina (c375) Medicamentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 kU/L
F343 **IgE ESPECÍFICA Frambuesa (f343) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F44 **IgE ESPECÍFICA Fresa (f44) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
T15 **IgE ESPECÍFICA Fresno (fraxinus americana) (t15) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
T25 **IgE ESPECÍFICA Fresno común (t25) polen arboles, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
M9 **IgE ESPECÍFICA Fusarium moniliforme (m9) Mohos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
O215 **IgE ESPECÍFICA Galactosil-Alfa-1,3-galactosa (Anti-Gal) (o215) Otros, SUERO**	ImmunoCAP®	2	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
F311 **IgE ESPECÍFICA Gallo (f311) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F24 **IgE ESPECÍFICA Gamba (f24) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F309 **IgE ESPECÍFICA Garbanzo (f309) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
C74 **IgE ESPECÍFICA Gelatina (c74) Medicamentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
C60 **IgE ESPECÍFICA Gentamicina (c213) Medicamentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
W16 **IgE ESPECÍFICA Gilde (iva ciliata) (w16) Polen malezas, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
W204 **IgE ESPECÍFICA Girasol (w204) Polen malezas, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F79 **IgE ESPECÍFICA Gluten (f79) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
D73 **IgE ESPECÍFICA Glycyphagus domesticus (d73) Ácaros, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F297 **IgE ESPECÍFICA Goma arábiga (f297) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F246 **IgE ESPECÍFICA Goma guar (Cyamopsis tetragonolobus) (f246) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G2 **IgE ESPECÍFICA Grama mayor (cynodon dactylon) (g2) Polen gramíneas, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
G1 **IgE ESPECÍFICA Grama olor (anthoxathum odoratum) (g1) Polen gramíneas, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
K70 **IgE ESPECÍFICA Grano de cafe verde (k70) Ocupacional, SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F279 **IgE ESPECÍFICA GUINDILLA (f279) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F12 **IgE ESPECÍFICA Guisante (f12) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F182 **IgE ESPECÍFICA Haba (F182) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
F303 **IgE ESPECÍFICA Halibut (f303) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F346 **IgE ESPECÍFICA Haliotis spp (F346) alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
T5 **IgE ESPECÍFICA Haya (fagus grandifolia) (t5) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
M8 **IgE ESPECÍFICA Helminthosporium halodes (m8) Mohos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G13 **IgE ESPECÍFICA Heno blanco (holcus lanatus) (g13) Polen gramíneas, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
G6 **IgE ESPECÍFICA Hierba timotea (phleum pratense) (g6) Polen gramíneas, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
RG215 **IgE ESPECÍFICA Hierba timotea (recombinante p5b) A rPhl p 5b (g215) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F328 **IgE ESPECÍFICA Higo (f328) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F276 **IgE ESPECÍFICA Hinojo fresco (f276) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F219 **IgE ESPECÍFICA Hinojo semilla (f219) Alimentos, SUERO**	Quimioluminiscencia.	2	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F278 **IgE ESPECÍFICA Hoja de laurel (f278) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
O201 **IgE ESPECÍFICA Hoja de tabaco (o201) Otros, SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
I70 **IgE ESPECÍFICA Hormiga roja (solenopsis invicta) (i70) Insectos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F245 **IgE ESPECÍFICA Huevo (f245) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
W22 **IgE ESPECÍFICA Humulus scandens (altramuz) (w22) Polen malezas, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
E217 **IgE ESPECÍFICA Hurón (epitelio) (e217) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
C78 **IgE ESPECÍFICA Ibuprofeno (c286) Medicamentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 kU/L
F369 **IgE ESPECÍFICA Ictalurus punctatus (F369) alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
C262 **IgE ESPECÍFICA Indometacina (c282) Medicamentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 kU/L
C71 **IgE ESPECÍFICA Insulina bovina (c71) Medicamentos, SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
C73 **IgE ESPECÍFICA Insulina humana (c73) Medicamentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
C70 **IgE ESPECÍFICA Insulina porcina (c70) Medicamentos, SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
K77 **IgE ESPECÍFICA Isocianato hdi (k77) Ocupacional, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
K76 **IgE ESPECÍFICA Isocianato mdi (k76) Ocupacional, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
K75 **IgE ESPECÍFICA Isocianato tdi (k75) Ocupacional, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
K72 **IgE ESPECÍFICA Ispaghula (k72) Ocupacional, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F270 **IgE ESPECÍFICA Jengibre (f270) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
E209 **IgE ESPECÍFICA Jerbo (epitelio) (e209) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F15 **IgE ESPECÍFICA Judías blancas (f15) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F315 **IgE ESPECÍFICA Judías verdes (f315) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F60 **IgE ESPECÍFICA Jurel (f60) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
C388 **IgE ESPECÍFICA Ketoprofeno (c388) Medicamentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 kU/L
F84 **IgE ESPECÍFICA Kiwi (f84) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
W17 **IgE ESPECÍFICA Kochia scoparia (w17) Polen malezas, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
C312 **IgE ESPECÍFICA Lactosa (c312) Medicamentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 KU/L
K20 **IgE ESPECÍFICA Lana de oveja tratada (k20) Ocupacional, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 U/mL
F304 **IgE ESPECÍFICA Langosta (f304) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
K82 **IgE ESPECÍFICA Latex (k82) Ocupacional, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F300 **IgE ESPECÍFICA Leche de cabra (f300) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F325 **IgE ESPECÍFICA Leche de oveja (f325) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F2 **IgE ESPECÍFICA Leche de vaca (f2) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F231 **IgE ESPECÍFICA Leche de vaca hervida (f231) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F286 **IgE ESPECÍFICA Leche de Yegüa (f286) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F215 **IgE ESPECÍFICA Lechuga (f215) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F337 **IgE ESPECÍFICA Lenguado (f337) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F235 **IgE ESPECÍFICA Lenteja (f235) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
D71 **IgE ESPECÍFICA Lepidoglyphus destructor (d71) Ácaros, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
RLEPD2 **IgE ESPECÍFICA Lepidoglyphus destructor (RLep d 2) Ácaros, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.3 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.3 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.3 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F45 **IgE ESPECÍFICA Levadura (Saccaromyces cerevisiae) (f45) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
T212 **IgE ESPECÍFICA Libocedrus decurren (Cedro) (t212) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
C82 **IgE ESPECÍFICA Lidocaina (c82) Medicamentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 kU/L
T210 **IgE ESPECÍFICA Ligustrum vulgare (t210) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F306 **IgE ESPECÍFICA Lima (f306) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
F208 **IgE ESPECÍFICA Limón (f208) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F333 **IgE ESPECÍFICA Linaza (semilla de lino) (F333) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
C115 **IgE ESPECÍFICA Lincomicina (c289) Medicamentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 kU/L
T211 **IgE ESPECÍFICA Liquidambar styraciflua (t211) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
W9 **IgE ESPECÍFICA Llanten (plantago lanceolata) (w9) Polen malezas, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
IGELUB **IgE ESPECÍFICA Lubina Alimentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Inf 0,35 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
W207 **IgE ESPECÍFICA Lupino (w207) (lupinus spp) Polen malezas, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F324 **IgE ESPECÍFICA Lúpulo (f324) Alimentos, SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F381 **IgE ESPECÍFICA Lutjanus campechanus (F381) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
F8 **IgE ESPECÍFICA Maíz (f8) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G202 **IgE ESPECÍFICA Maiz (zea mays) (g202) Polen gramíneas, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
M227 **IgE ESPECÍFICA Malassezia spp. (m227) Mohos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
F90 **IgE ESPECÍFICA Malta (f90) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F302 **IgE ESPECÍFICA Mandarina (f302) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F91 **IgE ESPECÍFICA Mango (f91) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F49 **IgE ESPECÍFICA Manzana (f49) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
W206 **IgE ESPECÍFICA Manzanilla (w206) Polen malezas, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F294 **IgE ESPECÍFICA Maracuya (f294) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
W7 **IgE ESPECÍFICA Margarita (crysanthehum leucanthemum) (w7) Polen malezas, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
I203 **IgE ESPECÍFICA Mariposa de la harina (i203) Insectos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
O213R **IgE ESPECÍFICA MBP (proteínas de union a la maltosa) (o213) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
W45 **IgE ESPECÍFICA Medicago sativa. Alfalfa (w45) Polen malezas, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F37 **IgE ESPECÍFICA Mejillón (f37) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F274 **IgE ESPECÍFICA Mejorana (f274) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F95 **IgE ESPECÍFICA Melocotón (f95) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F87 **IgE ESPECÍFICA Melón (f87) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F332 **IgE ESPECÍFICA Menta (f332) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
C88 **IgE ESPECÍFICA Mepivacaina (scandicain) (c233) Medicamentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F307 **IgE ESPECÍFICA Merluza (f307) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
C398 **IgE ESPECÍFICA Metronidazol (c398) Medicamentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 kU/L
RX1 **IgE ESPECÍFICA Mezcla rx1 (g6, w6, w9, w21, t3 - Phleum pratense, Artemisia vulgaris, Plantago lanceolata, Parietaria judaica, Betula verrucosa), SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
RX2 **IgE ESPECÍFICA Mezcla rx2 (d2, e1, e3, e5, m6 - Dermatophagoides farinae, Cat dander, Horse dander, Dog dander, Alternaria alternata), SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo
RX3 **IgE ESPECÍFICA Mezcla rx3 (g2, g5, g17, w1, w9, w10 - Cynodon dactylon, Lolium perenne, Paspalum notatum, Ambrosia elatior, Plantago lanceolata, Chenopodium album), SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo
FX1 **IgE ESPECÍFICA Mezcla alimentos fx1 (f13, f17, f18, f20, f36 - Cacahuete, avellana, nuez de brasil, almendra, coco), SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
FX13 **IgE ESPECÍFICA Mezcla alimentos fx13 (f12, f15, f31, f35 - Guisante, alubia, zanahoria, patata), SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo
FX14 **IgE ESPECÍFICA Mezcla alimentos fx14 (f25, f214, f216, f218 - Tomate, espinaca, col, pimentón dulce), SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo
FX15 **IgE ESPECÍFICA Mezcla alimentos fx15 (f33, f49, f92, f95 - Naranja, manzana, platano, melocotón), SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
FX16 **IgE ESPECÍFICA Mezcla alimentos fx16 (f44, f94, f208, f210 - Fresa, pera, limón, piña), SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo
FX17 **IgE ESPECÍFICA Mezcla alimentos fx17 (f49, f92, f94, f95 - Manzana, plátano, pera, melocotón), SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo
FX18 **IgE ESPECÍFICA Mezcla alimentos fx18 (f12, f13, f14 - Guisante, cacahuete, soja), SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
FX2 **IgE ESPECÍFICA Mezcla alimentos fx2 (f3, f24, f37, f40, f41 - Pescado, gamba, mejillón, atún, salmón), SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo
FX20 **IgE ESPECÍFICA Mezcla alimentos fx20 (f4, f5, f6, f9 - Trigo, centeno, cebada, arroz), SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo
FX21 **IgE ESPECÍFICA Mezcla alimentos fx21 (f84, f87, f92, f95, f210 - Kiwi, melón, plátano, melocotón, piña), SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
FX22 **IgE ESPECÍFICA Mezcla alimentos fx22 (f201, f202, f203, f256 - Pacana nogal pacanero, anacardo, pistacho, nuez de nogal), SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo
FX24 **IgE ESPECÍFICA Mezcla alimentos fx24 (f17, f24, f84, f92 - Avellana, gamba, kiwi, plátano), SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo
FX25 **IgE ESPECÍFICA Mezcla alimentos fx25 (f10, f45, f47, f85 - Semilla De Sésamo, Levadura, Ajo, Apio), SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
FX26 **IgE ESPECÍFICA Mezcla alimentos fx26 (f1, f2, f13, f89 - Clara de huevo, leche, cacahuete, mostaza), SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo
FX27 **IgE ESPECÍFICA Mezcla alimentos fx27 (f3, f4, f14, f17 - Bacalao, Trigo, Soja, Avellana), SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	
FX29 **IgE ESPECÍFICA Mezcla alimentos FX29 (f33, f208, f209, f302) , SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
FX3 **IgE ESPECÍFICA Mezcla alimentos fx3 (f4, f7, f8, f10, f11 - Trigo, avena, maiz, semilla de sesamo, alforfón), SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo
FX30 **IgE ESPECÍFICA Mezcla alimentos fx30 (f84, f91, f92, f96, f293 - Kiwi, mango, platano, aguacate, papaya), SUERO**	ImmunoCAP®	6	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo
FX5E **IgE ESPECÍFICA Mezcla alimentos fx5 (f1, f2, f3, f4, f13, f14 - Clara de huevo, leche, pescado, trigo, cacahuete, soja), SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
FX7 **IgE ESPECÍFICA Mezcla alimentos fx7 (f25, f45, f47, f48, f85 - Tomate, levadura, ajo, cebolla, apio), SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo
FX70 **IgE ESPECÍFICA Mezcla alimentos fx70 (f272, f274, f273, f275 - Estragón, mejorana, tomillo, levístico), SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo
FX71 **IgE ESPECÍFICA Mezcla alimentos fx71 (f265, f266, f267, f268 - Alcaravea, macia, cardamomo, clavo), SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
FX74 **IgE ESPECÍFICA Mezcla alimentos fx74 (f3, f205, f206, f254 - Bacalao, arenque, caballa, platija), SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo
TX1 **IgE ESPECÍFICA Mezcla árboles tx1 (t1, t3, t7, t8, t10 - Acer negundo, Betula verrucosa, Quercus alba, Ulmus americana, Juglans californica), SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo
TX10 **IgE ESPECÍFICA Mezcla árboles tx10 (t2, t3, t4, t15 - Alnus incana, Betula verrucosa, Corylus avellana, Fraxinus americana), SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo
TX3 **IgE ESPECÍFICA Mezcla árboles tx3 (t6, t7, t8, t14, t20 - Juniperus sabinoides, Quercus alba, Ulmus americana, Populus deltoides, Prosopis juliflora), SUERO**	Quimioluminiscencia.	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
TX4 **IgE ESPECÍFICA Mezcla árboles tx4 (t7, t8, t11, t12, t14 - Quercus alba, Ulmus americana, Platanus acerifolia, Salix caprea, Populus deltoides), SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo
TX5 **IgE ESPECÍFICA Mezcla árboles tx5 (t2, t4, t8, t12, t14 - Alnus incana, Corylus avellana, Ulmus americana, Salix caprea, Populus deltoides), SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo
TX6 **IgE ESPECÍFICA Mezcla árboles tx6 (t1, t3, t5, t7, t10 - Acer negundo, Betula verrucosa, Fagus grandifolia, Quercus alba, Juglans californica), SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
TX7 **IgE ESPECÍFICA Mezcla árboles tx7 (t9, t12, t16, t18, t19, t21 - Olea europaea, Salix caprea, Pinus strobus, Eucalyptus spp., Acacia longifolia, Melaleuca leucadendron), SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo
TX8 **IgE ESPECÍFICA Mezcla árboles tx8 (t1, t3, t4, t7, t11 - Acer negundo, Betula verrucosa, Corylus avellana, Quercus alba, Platanus acerifolia), SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo
TX9 **IgE ESPECÍFICA Mezcla árboles tx9 (t2, t3, t4, t7, t12 - Alnus incana, Betula verrucosa, Corylus avellana, Quercus alba, Salix caprea), SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
EX1 **IgE ESPECÍFICA Mezcla epitelios animales ex1 (e1, e3, e4, e5 - Caspa de gato, caspa de caballo, caspa de vaca, caspa de perro), SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo
EX70 **IgE ESPECÍFICA Mezcla epitelios animales ex70 (e6, e82, e84, e87, e88 - Epitelio de cobaya, epitelio de conejo, epitelio de hamster, rata y ratón), SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo
GX1 **IgE ESPECÍFICA Mezcla gramíneas gx1 (g3, g4, g5, g6, g8 - Dactylis glomerata, Festuca elatior, Lolium perenne, Phleum pratense, Poa pratensis), SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
GX2 **IgE ESPECÍFICA Mezcla gramíneas gx2 (g2, g5, g6, g8, g10, g17 - Cynodon dactylon, Lolium perenne, Phleum pratense, Poa pratensis, Sorghum halepense, Paspalum notatum), SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo
GX3 **IgE ESPECÍFICA Mezcla gramíneas gx3 (g1, g5, g6, g12, g13 - Anthoxanthum odoratum, Lolium perenne, Phleum pratense, Secale cereale, Holcus lanatus), SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo
GX4 **IgE ESPECÍFICA Mezcla gramíneas gx4 (g1, g5, g7, g12, g13 - Anthoxanthum odoratum, Lolium perenne, Phragmites communis, Secale cereale, Holcus lanatus), SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
GX6 **IgE ESPECÍFICA Mezcla gramíneas gx6 (g2, g5, g10, g11, g13, g17 - Cynodon dactylon, Lolium perenne, Sorghum halepense, Bromus inermis, Holcus lanatus, Paspalum notatum), SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo
PAX5 **IgE ESPECÍFICA Mezcla Isocianatos pax5 (k75, k76, k77, k79 - Isocianatos (TDI, MDI, HDI), Ftalato anhidrido), SUERO**	ImmunoCAP®	10	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo
MX1 **IgE ESPECÍFICA Mezcla mohos mx1 (m1, m2, m3, m6 - Penicillium chrysogenum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata), SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
MX2 **IgE ESPECÍFICA Mezcla mohos mx2 (m1, m2, m3, m5, m6, m8 - Penicillium chrysogenum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria alternata, Setomelanomma rostrata), SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo
MX4 **IgE ESPECÍFICA Mezcla mohos mx4 (m3, m207, m36, m228 - A. fumigatus, A. niger, A. terreus, A. flavus), SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo
WX1 **IgE ESPECÍFICA Mezcla plantas wx1 (w1, w6, w9, w10, w11 - Ambrosia artemisiifolia (A. elatior), Artemisia vulgaris, Plantago lanceolata, Chenopodium album, Salsola kali), SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
WX2 **IgE ESPECÍFICA Mezcla plantas wx2 (w2, w6, w9, w10, w15 - Ambrosia psilostachya, Artemisia vulgaris, Plantago lanceolata, Chenopodium album, Atriplex lentiformis), SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo
WX209 **IgE ESPECÍFICA Mezcla plantas wx209 (w1, w2, w3 - Ambrosia artemisiifolia (A. elatior), Ambrosia psilostachya, Ambrosia trifida), SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo
WX3 **IgE ESPECÍFICA Mezcla plantas wx3 (w6, w9, w10, w12, w20 - Artemisia vulgaris, Plantago lanceolata, Chenopodium album, Solidago virgaurea, Urtica dioica), SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
WX5 **IgE ESPECÍFICA Mezcla plantas wx5 (w1, w6, w7, w8, w12 - Ambrosia artemisiifolia (A. elatior), Artemisia vulgaris, Chrysanthemum leucanthemum, Taraxacum vulgare, Solidago virgaurea), SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo
WX6 **IgE ESPECÍFICA Mezcla plantas wx6 (w9, w10, w11, w18 - Plantago lanceolata, Chenopodium album, Salsola kali, Rumex acetosella), SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo
WX7 **IgE ESPECÍFICA Mezcla plantas wx7 (w7, w8, w9,w10, w12 - Chrysanthemum leucanthemum, Taraxacum vulgare, Plantago lanceolata, Chenopodium album, Solidago virgaurea), SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
EX71 **IgE ESPECÍFICA Mezcla plumas ex71 (e70, e85, e86, e89 - Pluma de oca, pluma de pollo, pluma de pato, pluma de pavo), SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo
EX72 **IgE ESPECÍFICA Mezcla plumas ex72 (e78, e201, e196, e213, e214 - Pluma de periquito, pluma de canario, plumas de cacatúa ninfa, pluma de loro, pluma de pinzón), SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo
HX2 **IgE ESPECÍFICA Mezcla polvo doméstico HX2 (h2, d1, d2, i6 - Hollister-Stier Labs., Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Blatella germanica), SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
EX2 **IgE ESPECÍFICA Mezclas epitelios animales ex2 (e1, e5, e6, e87, e88 - Caspa de gato, caspa de perro, epitelio de cobaya, rata y ratón), SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo
T20 **IgE ESPECÍFICA Mezquite (prosopis juliflora) (t20) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F247 **IgE ESPECÍFICA Miel (f247) Alimentos, SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F55 **IgE ESPECÍFICA Mijo común (f55) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
T19 **IgE ESPECÍFICA Mimosa (acacia longifolia) (t19) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F211 **IgE ESPECÍFICA Mora (f211) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
T70 **IgE ESPECÍFICA Morera (morus alba) (t70) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
T71 **IgE ESPECÍFICA Morera Roja (Morus Rubra) (t71), SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
C260 **IgE ESPECÍFICA Morfina (c260) Medicamentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
I71 **IgE ESPECÍFICA Mosquito (aedes comunis) (i71) Insectos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
I73 **IgE ESPECÍFICA Mosquito rojo (chironomus thummi th) (i73) Insectos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
I71TR **IgE ESPECÍFICA Mosquito trompetero (Culex pipiens) (i71TR) Insectos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 kU/L
F89 **IgE ESPECÍFICA Mostaza (f89) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
M4 **IgE ESPECÍFICA Mucor racemosus (m4) Mohos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
ALEXIGE **IGE ESPECÍFICA MULTIPLEX (ALEX TEST), SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	10	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rechazo: Muestra Hemolizada	Indicado en informe adjunto
W230 **IgE ESPECÍFICA nAmb a 1 Ambrosia artemisiifolia (A. elatior) (w230) Polen malezas, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
C283 **IgE ESPECÍFICA Naproxeno (c283) Medicamentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 U/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F33 **IgE ESPECÍFICA Naranja (f33) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
RW231 **IgE ESPECÍFICA nArt v 1 (recombinante Artemisia vulgaris) rw231 Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
RW233 **IgE ESPECÍFICA nArt v 3 LTP (recombinante Artemisia vulgaris) rw2 Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	5	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F76 **IgE ESPECÍFICA nBos d 4; alfa-lactoalbúmina (f76) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F77 **IgE ESPECÍFICA nBos d 5; beta-lactoglobulina (f77) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
E204 **IgE ESPECÍFICA nBos d 6 BSA albúmina sérica bovina, vaca (e204) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F78 **IgE ESPECÍFICA nBos d 8; caseína (f78) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
E221 **IgE ESPECÍFICA nCan f 3 albumina sérica, perro (e221) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	4	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F440 **IgE ESPECÍFICA nCor a 9, Avellana (f440) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	4	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
T226 **IgE ESPECÍFICA nCup a1 Ciprés (recombinante T226) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
F170 **IgE ESPECÍFICA Nectarina (f170) Alimentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica (1 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina litio (1 x Tubo sangre heparina litio) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 KU/L
Q28 **IgE ESPECÍFICA Neomicina (q28) Medicamentos, SUERO**	Radioinmunoanálisis.	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Inf 0,35 kU/L
E220 **IgE ESPECÍFICA nFel d 2 albúmina sérica, gato (e220) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F233 **IgE ESPECÍFICA nGal d 1 Ovomucoid (f233) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F232 **IgE ESPECÍFICA nGal d 2 Ovoalbumin (f232) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F323 **IgE ESPECÍFICA nGal d 3 Conalbumina, Egg Gallus spp. (f323) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
K208 **IgE ESPECÍFICA nGal d4 Lisozima, huevo (k208) Ocupacional, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F431 **IgE ESPECÍFICA nGly m 5 ; beta-conglycinina, soja (f431) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
F432R **IgE ESPECÍFICA nGly m 6 Glicinina (F432R) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	5	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
T10 **IgE ESPECÍFICA Nogal (juglans californica) (t10) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
RT224 **IgE ESPECÍFICA nOle e 1 (recombinante olea europea) RT224 Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
T227R **IgE ESPECÍFICA nOlea e 7(LTP) Olivo (T227R) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	5	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
C83 **IgE ESPECÍFICA Novocaina (procaina) (c284) Medicamentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 U/mL
W232 **IgE ESPECÍFICA nSal k 1 Salsola (W232) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
E222 **IgE ESPECÍFICA nSus albúmina sérica de cerdo (e222) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F18 **IgE ESPECÍFICA Nuez de brasil (f18) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
RF354 **IgE ESPECÍFICA Nuez de brasil rBer e1 (recombinante f354) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F345 **IgE ESPECÍFICA Nuez de macadamia (f345) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F256 **IGE ESPECIFICA Nuez de Nogal (f256) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F282 **IgE ESPECÍFICA Nuez moscada (f282) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
RS201 **IgE ESPECÍFICA Nylon (rs201) Otros, SUERO**	Quimioluminiscencia.	11	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Inf 0,35 kU/L
T9 **IgE ESPECÍFICA Olivo (olea europea) (t9) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
T8 **IgE ESPECÍFICA Olmo (ulmus americana) (t8) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
RF416 **IgE ESPECÍFICA Omega 5 gliadina rTri a 19 (recombinante) (RF416) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F283 **IgE ESPECÍFICA Orégano (f283) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
E74 **IgE ESPECÍFICA Orina de rata (e74) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
E72 **IgE ESPECÍFICA Orina de ratón (e72) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
W20 **IgE ESPECÍFICA Ortiga (urtica dioica) (w20) Polen malezas, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F290 **IgE ESPECÍFICA Ostra (f290) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
K78 **IgE ESPECÍFICA Oxido etileno (k78) Ocupacional, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F201 **IgE ESPECÍFICA Pacana nogal pacanero (f201) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
T72 **IgE ESPECÍFICA Palmera reina (Arecastrum roman zoffianum) (t72) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F360 **IgE ESPECÍFICA Panga (f360) Alimentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica (1 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina litio (1 x Tubo sangre heparina litio) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 kU/L
F293 **IgE ESPECÍFICA Papaya (f293) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
C85 **IgE ESPECÍFICA Paracetamol (c209) Medicamentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 kU/L
W21 **IgE ESPECÍFICA Parietaria judaica (w21) Polen malezas, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
W19 **IgE ESPECÍFICA Parietaria officinalis (w19) Polen malezas, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
RW211 **IgE ESPECÍFICA Parietaria rPar j 2 LTP (recombinante w211) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F426R **IgE ESPECÍFICA Parvalbúmina rGad c 1 F426R (recombinante) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
G17 **IgE ESPECÍFICA Paspalum notatum (g17) Polen gramíneas, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F35 **IgE ESPECÍFICA Patata (f35) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F284 **IgE ESPECÍFICA Pavo (f284) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
T22 **IgE ESPECÍFICA Pecana (carya pecan) (t22) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
C1 **IgE ESPECÍFICA Penicilina G (c1) Medicamentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
C2 **IgE ESPECÍFICA Penicilina V (c2) Medicamentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
M209 **IgE ESPECÍFICA Penicillium Frequentans (m209) Mohos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
M1 **IgE ESPECÍFICA Penicillium notatum (m1) Mohos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F244 **IgE ESPECÍFICA Pepino (f244) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F94 **IgE ESPECÍFICA Pera (f94) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F415 **IgE ESPECÍFICA Perca Lucio (f415) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
F86 **IgE ESPECÍFICA Perejil (f86) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F312 **IgE ESPECÍFICA Pez Espada Xiphias gladius (f312) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
PHAI **IgE ESPECÍFICA Phadiatop Infantil, SUERO**	ImmunoCAP®	2	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo
PHAD **IgE ESPECÍFICA Phadiatop, SUERO**	ImmunoCAP®	2	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo
M13 **IgE ESPECÍFICA Phoma betae (m13) Mohos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
T201 **IgE ESPECÍFICA Picea excelsa- Abeto (t201) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
T217 **IgE ESPECÍFICA Pimentero (t217) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F280 **IgE ESPECÍFICA Pimienta negra (f280) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F263 **IgE ESPECÍFICA Pimienta verde (f263) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
T73 **IgE ESPECÍFICA Pino australiano (cas.equisetifolia) (t73) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
T16 **IgE ESPECÍFICA Pino blanco (pinus strobus) (t16) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
T213 **IgE ESPECÍFICA Pinus radiata (t213) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F210 **IgE ESPECÍFICA Piña (f210) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F253 **IgE ESPECÍFICA Piñones (f253) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
C52 **IgE ESPECÍFICA Pirazolona (c208) Medicamentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 kU/L
C304 **IgE ESPECÍFICA Piroxicam (c304) Medicamentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 kU/L
F203 **IgE ESPECÍFICA Pistacho (f203) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
M70 **IgE ESPECÍFICA Pityrosporum orbiculare (m70) Mohos, SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F92 **IgE ESPECÍFICA Plátano (f92) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
T11 **IgE ESPECÍFICA Platanus acerifolia (t11) - plátano Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
T241R **IgE ESPECÍFICA Platanus acerifolia rPla a 1 - plátano Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	5	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F254 **IgE ESPECÍFICA Platija (f254) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
E201 **IgE ESPECÍFICA Plumas de canario (e201) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
E213 **IgE ESPECÍFICA Plumas de loro (e213) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
E70 **IgE ESPECÍFICA Plumas de oca (e70) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
E215 **IgE ESPECÍFICA Plumas de paloma (e215) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
E86 **IgE ESPECÍFICA Plumas de pato (e86) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
E89 **IgE ESPECÍFICA Plumas de pavo (e89) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
E78 **IgE ESPECÍFICA Plumas de periquito (e78) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
E214 **IgE ESPECÍFICA Plumas de pinzón (e214) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 k/UL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
E85 **IgE ESPECÍFICA Plumas de pollo (e85) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
RT215 **IgE ESPECÍFICA Pólen de abedúl rBet v1, PR-10 (recombinante t215) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
RG208 **IgE ESPECÍFICA Pólen de Hierba timotea (nativa p4) nPhl p4 (g208) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
RG205 **IgE ESPECÍFICA Pólen de Hierba timotea (recombinante p1) rPhl p1 (g205) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
RG206 **IgE ESPECÍFICA Pólen de hierba timotea (recombinante p2) rPhl p2 (g206) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	5	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
RG209 **IgE ESPECÍFICA Pólen de Hierba timotea (recombinante p6) rPhl p6 (g209) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
RG210 **IgE ESPECÍFICA Pólen de Hierba timotea (recombinante p7) rPhl p7 (g210) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
RG212 **IgE ESPECÍFICA Polen de Hierba timotea rPhl p12 (g212) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
RG216 **IgE ESPECÍFICA Pólen grama mayor (Cynodon dactylon) nCyn d 1 (Rg216) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
RG213 **IgE ESPECÍFICA Polen Hierba timotea rPhl p 1 + rPhl p 5b (Rg213) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
RG214 **IgE ESPECÍFICA Polen Hierba timotea rPhl p7 + rPhl p12 (Rg214) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
I210 **IgE ESPECÍFICA Polistes dominulus rPol d5 (i210) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	5	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
H1 **IgE ESPECÍFICA Polvo casa (greer) (h1) Polvo doméstico, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
H2 **IgE ESPECÍFICA Polvo casa (hollister-stier) (h2) Polvo doméstico, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F209 **IgE ESPECÍFICA Pomelo (f209) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
C424 **IgE ESPECÍFICA Prednisolona (C424) Medicamentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 kU/L
C234 **IgE ESPECÍFICA Prilocaina (c234) Medicamentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 U/mL
RT216 **IgE ESPECÍFICA Profilina polen abedul rBet v2 (recombinante t216) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
C90 **IgE ESPECÍFICA Propifenazona (cibalgina) (c90) Medicamentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 kU/L
C207 **IgE ESPECÍFICA Protamina (c207) Medicamentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
E211 **IgE ESPECÍFICA Proteínas de orina de conejo (e211) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
E212R **IgE ESPECÍFICA Proteínas orina de cerdo (Re212) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
E206 **IgE ESPECÍFICA Proteínas séricas de Conejo (e206) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
E219 **IgE ESPECÍFICA Proteínas séricas de pollo (e219) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
E75 **IgE ESPECÍFICA Proteínas séricas de rata (e75) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
E76 **IgE ESPECÍFICA Proteínas séricas de ratón (e76) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F292 **IgE ESPECÍFICA Psidium guajava (guayaba) (f292) Alimentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F59 **IgE ESPECÍFICA Pulpo (f59) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F82 **IgE ESPECÍFICA Queso (tipo camb, gorg, brie, roquefort) (f82) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F81 **IgE ESPECÍFICA Queso (tipo cheddar) (f81) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F443R **IgE ESPECÍFICA r Ana o 3 Anacardo (F443R) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	4	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
F447R **IgE ESPECÍFICA r Ara h6 cacahuete (F447R) recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	4	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
F430 **IgE ESPECÍFICA rAct d 8 PR-10, Kiwi (f430) recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	4	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F0 **IgE ESPECÍFICA Rape (f361) Alimentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 KU/L
F417 **IgE ESPECÍFICA rApi g 1.01 PR-10, Apio (f417), SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
F422R **IgE ESPECÍFICA rAra h 1 cacahuete (F422R) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	5	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F423R **IgE ESPECÍFICA rAra h 2 cacahuete (F423R) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	5	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
F424R **IgE ESPECÍFICA rAra h 3 cacahuete (F424R) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	5	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
F352R **IgE ESPECÍFICA rAra h 8 PR-10, cacahuete (F352R) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	5	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F427R **IgE ESPECÍFICA rAra h 9 LTP, Cacahuete (F427R) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	5	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
M218 **IgE ESPECÍFICA rAsp f 1 Aspergillus fumigatus (m218) Mohos, SUERO**	ImmunoCAP®	5	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
M219 **IgE ESPECÍFICA rAsp f 2 Aspergillus fumigatus (M219) Mohos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
M220 **IgE ESPECÍFICA rAsp f 3 Aspergillus fumigatus (m220) Mohos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
M221 **IgE ESPECÍFICA rAsp f 4 Aspergillus fumigatus (m221) Mohos, SUERO**	ImmunoCAP®	5	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
M222 **IgE ESPECÍFICA rAsp f 6 Aspergillus fumigatus (m222) Mohos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G9 **IgE ESPECÍFICA Rastreras (agrostis stolonifera) (g9) Polen gramíneas, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
E87 **IgE ESPECÍFICA Rata (e87) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
E88 **IgE ESPECÍFICA Ratón (e88) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
T220 **IgE ESPECÍFICA rBet v 4 Betula verrucosa (t220) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
T225 **IgE ESPECÍFICA rBet v 6 Betula verrucosa (t225) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
E101R **IgE ESPECÍFICA rCan f1 Canis familiaris - perro (recombinante e101r) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	5	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
E102R **IgE ESPECÍFICA rCan f2 Canis familiaris - perro (e102r) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	4	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
E229R **IgE ESPECÍFICA rCan f4 Canis familiaris - perro (e229r) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
E226R **IgE ESPECÍFICA rCan f5 Canis familiaris - perro (e226r) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	5	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
E230R **IgE ESPECÍFICA rCan f6 Canis familiaris - perro (recombinante e230r) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
F439 **IgE ESPECÍFICA rCor a 14, Avellana (f439) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	5	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
F355 **IgE ESPECÍFICA rCyp c 1 Carp (Carpa común) (f355) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	5	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F319 **IgE ESPECÍFICA Remolacha (f319) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
E227 **IgE ESPECÍFICA rEqu c1 Equus caballus (e227) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
T55 **IgE ESPECÍFICA Retama de escobas (Cytisus scoparius) (t55) polen arboles, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
E228R **IgE ESPECÍFICA rFel d 4 gato (e228R) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
E94R **IgE ESPECÍFICA rFel d1 Felis Domesticus (gato) E94R Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	5	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
E231R **IgE ESPECÍFICA rFel d7 Felis Domesticus (gato) E231R Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F353R **IgE ESPECÍFICA rGly m 4 PR-10, Soja (F353R) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
RK215 **IgE ESPECÍFICA rHevb1 Hevea brasilensis latex (recombinante k215) recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	5	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
RK224 **IgE ESPECÍFICA rHevb11 Hevea brasilensis latex (recombinante k224 recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	5	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
RK217 **IgE ESPECÍFICA rHevb3 Hevea brasilensis latex (recombinante k217) recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	5	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
RK218 **IgE ESPECÍFICA rHevb5 Hevea brasilensis latex (recombinante k218) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
Rk220 **IgE ESPECÍFICA rHevb6,02 Hevea brasilensis latex (recombin. k220) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	5	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
RK221 **IgE ESPECÍFICA rHevb8 Hevea brasilensis latex (recombinante k221) recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
M11 **IgE ESPECÍFICA Rhizopus nigricans (m11) Mohos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F322 **IgE ESPECÍFICA Ribes sylvestre (Grosella Roja) (f322) Alimentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F441 **IgE ESPECÍFICA rJug r1 - Juglans regia (f441)** **Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
F442 **IgE ESPECÍFICA rJug r3 LTP - Juglans regia (f442)** **Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
F434 **IgE ESPECÍFICA rMal d 1; PR-10, manzana (f434)** **Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F435R **IgE ESPECÍFICA rMal d 3 LTP Manzana (F435R) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
T218 **IgE ESPECÍFICA Roble americano (t218) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
T7 **IgE ESPECÍFICA Roble blanco (quercus alba) (t7) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
T240 **IgE ESPECÍFICA rOle e 9 Olea europaea t240 Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	5	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
F248 **IgE ESPECÍFICA Romero (Rosmarinus officinalis) (f248) Alimentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 kU/L
G211R **IgE ESPECÍFICA rPh1 p11 phleum pratense (G211R) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	5	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
W234R **IgE ESPECÍFICA rPla l 1 Plantain Plantago lanceolata (w234r) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	7	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
F454R **IgE ESPECÍFICA rPru p 7 Melocotón (F454R) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
RF419 **IgE ESPECÍFICA rPru p1 PR10, Melocotón (recombinante) - f419 Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	5	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
RF420 **IgE ESPECÍFICA rPru p3 LTP Melocotón (recombinante) - f420 Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
FR421 **IgE ESPECÍFICA rPru p4 Profilin, Melocotón (recombinante) - f421 Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
F433 **IgE ESPECÍFICA rTri a 14 LTP Trigo (f433) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
W12 **IgE ESPECÍFICA Ruda dorada (solidago virgaurea) (w12) Polen malezas, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
W23 **IgE ESPECÍFICA Rumex crispus (W23) Polen malezas, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10
F41 **IgE ESPECÍFICA Salmón (f41) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F384 **IgE ESPECÍFICA Salmón Blanco (f384) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
W11 **IgE ESPECÍFICA Salsola (salsola kali) (w11) Polen malezas, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
G203 **IgE ESPECÍFICA Salt grass (distichlis spicata) (g203) Polen gramíneas, SUERO**	Quimioluminiscencia.	2	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F344 **IgE ESPECÍFICA Salvia officinalis (f344) Alimentos, SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F329 **IgE ESPECÍFICA Sandía (f329) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F308 **IgE ESPECÍFICA Sardina (f308) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F61 **IgE ESPECÍFICA Sardina japonesa (f61) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
T12 **IgE ESPECÍFICA Sauce (salix caprea) (t12) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
T205 **IgE ESPECÍFICA Sauco (sambucus nigra) (t205) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
K206 **IgE ESPECÍFICA Savinasa (k206) Ocupacional, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	10	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 kU/L
K74 **IgE ESPECÍFICA Seda cultivada (k74) Ocupacional, SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F224 **IgE ESPECÍFICA Semilla de amapola (f224) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
K84 **IgE ESPECÍFICA Semilla de girasol (k84) Ocupacional, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F227 **IgE ESPECÍFICA Semilla de remolacha (f227) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F10 **IgE ESPECÍFICA Semilla de sésamo (f10) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
K71 **IgE ESPECÍFICA Semillas de ricino (k71) Ocupacional, SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F14 **IgE ESPECÍFICA Soja (glycine max) (f14) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
G10 **IgE ESPECÍFICA Sorgo (sorghum halepense) (g10) Polen gramíneas, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
M226 **IgE ESPECÍFICA Staphylococcal entero TSST (m226) Mohos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
M80 **IgE ESPECÍFICA Staphylococcal enterotoxin A (m80) Mohos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
M81 **IgE ESPECÍFICA Staphylococcal enterotoxin B (m81) Mohos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
M223 **IgE ESPECÍFICA Staphylococcal enterotoxin C (m223) Mohos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
M10 **IgE ESPECÍFICA Stemphylium botryosum (m10) Mohos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F326 **IgE ESPECÍFICA Suero leche de oveja (f326) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F236 **IgE ESPECÍFICA Suero leche de vaca (f236)** **Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
C58 **IgE ESPECÍFICA Sulfametoxazol (c223)** **Medicamentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 kU/L
C202 **IgE ESPECÍFICA Suxametonio (succinilcolina) (c202)** **Medicamentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
I204 **IgE ESPECÍFICA Tabano (tabanus spp) (i204) Insectos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
C717 **IgE ESPECÍFICA Tartracina (c717) Medicamentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 kU/L
F222 **IgE ESPECÍFICA Té (f222) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
C235 **IgE ESPECÍFICA Tetracaina (c235) Medicamentos, SUERO**	Radioinmunoanálisis.	4	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 kU/L
C59 **IgE ESPECÍFICA Tetraciclina (c211) Medicamentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 kU/L
C440 **IgE ESPECÍFICA Tetrazepam (c440) Medicamentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 U/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F414 **IgE ESPECÍFICA Tilapia (F414) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
T208 **IgE ESPECÍFICA Tilo (tilia cordata) (t208) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
C290 **IgE ESPECÍFICA Tobramicina (c290) Medicamentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F25 **IgE ESPECÍFICA Tomate (f25) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F273 **IgE ESPECÍFICA Tomillo (thymus vulgaris) (f273) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
G11 **IgE ESPECÍFICA Trespe (bromus inermis) (g11) Polen gramíneas, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
M15 **IgE ESPECÍFICA Trichoderma viride (m15) Mohos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
M211 **IgE ESPECÍFICA Trichophyton ment. var interdigitale (m211) Mohos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
M205 **IgE ESPECÍFICA Trichophyton rubrum (m205) Mohos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
M203 **IgE ESPECÍFICA Trichosporon pullulans (M203) Mohos, SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F4 **IgE ESPECÍFICA Trigo (f4) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
G15 **IgE ESPECÍFICA Trigo (triticum sativum) (g15) Polen gramíneas, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F305 **IgE ESPECÍFICA Trigonella foenum-graecum (Fenegreco) (f305) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
C242 **IgE ESPECÍFICA Trimetoprim (c242) Medicamentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 kU/L
RF351 **IgE ESPECÍFICA Tropomiosina (recombinante de gamba pen a1) - f351 Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
D205R **IgE ESPECÍFICA Tropomiosina Rd205 (rDer P 10) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F204 **IgE ESPECÍFICA Trucha (f204) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
D72 **IgE ESPECÍFICA Tyrophagus putrescentiae(d72) Ácaros, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
M204 **IgE ESPECÍFICA Ulocladium chartarum (M204) Mohos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
M201 **IgE ESPECÍFICA Ustilago nuda (m201) Mohos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F259 **IgE ESPECÍFICA Uva (f259) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F234 **IgE ESPECÍFICA Vainilla (f234) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
I2 **IgE ESPECÍFICA Veneno avispa (dolichovespula maculata) (i2) Insectos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
I1 **IgE ESPECÍFICA Veneno de abeja (apis mellifera) (i1) Insectos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
I214 **IgE ESPECÍFICA Veneno de abeja (rApi m 2) (i214) Insectos, SUERO**	ImmunoCAP®	2	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
I75 **IgE ESPECÍFICA Veneno de abejorro (vespa crabro) (i75) Insectos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
I4 **IgE ESPECÍFICA Veneno de avispa (polistes spp.) (i4) Insectos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
I3 **IgE ESPECÍFICA Veneno de avispa (vespula spp) (i3) Insectos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
I5 **IgE ESPECÍFICA Veneno de avispón (Dolichovespula arenaria) (i5) Insectos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
I211 **IgE ESPECÍFICA Vespula vulgaris rVes v1 Phospholipase A1 (i211) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	4	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L
I209 **IgE ESPECÍFICA Vespula vulgaris rVes v5 (i209) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 kU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F338 **IgE ESPECÍFICA Vieira (f338) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
E203 **IgE ESPECÍFICA Visón (epitelio) (e203) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
C721 **IgE ESPECÍFICA Vitamina B12 (c721) Medicamentos, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,35 U/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
W13 **IgE ESPECÍFICA Xanthicum commune(w13) Polen malezas, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F75 **IgE ESPECÍFICA Yema de huevo (f75) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L
F31 **IgE ESPECÍFICA Zanahoria (f31) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,10 KU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
IGFBP **IGFBP 3 (INSULIN LIKE GROWTH FACTOR BINDING PROTEIN 3), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	Ambos 1 Años 0,70 - 3,60 µg/mL Ambos 2 Años 0,80 - 3,90 µg/mL Ambos 3 Años 0,90 - 4,30 µg/mL Ambos 4 Años 1,00 - 4,70 µg/mL Ambos 5 Años 1,10 - 5,20 µg/mL Ambos 6 Años 1,30 - 5,60 µg/mL Ambos 7 Años 1,40 - 6,10 µg/mL Ambos 8 Años 1,60 - 6,50 µg/mL Ambos 9 Años 1,80 - 7,10 µg/mL Ambos 10 Años 2,10 - 7,70 µg/mL Ambos 11 Años 2,40 - 8,40 µg/mL Ambos 12 Años 2,70 - 8,90 µg/mL Ambos 13 Años 3,10 - 9,50 µg/mL Ambos 14 Años 3,30 - 10,00 µg/mL Ambos 15 Años 3,50 - 10,00 µg/mL Ambos 16 Años 3,40 - 9,50 µg/mL Ambos 17 Años 3,20 - 8,70 µg/mL Ambos 18 Años 3,10 - 7,90 µg/mL Ambos 19 Años 2,90 - 7,30 µg/mL Ambos 20 Años 2,90 - 7,20 µg/mL Ambos 21 - 30 Años 3,40 - 7,80 µg/mL Ambos 31 - 65 Años 3,20 - 7,00 µg/mL Ambos 66 - 80 Años 2,50 - 6,20 µg/mL Ambos Sup - 81 Años 2,20 - 4,50 µg/mL Según Estadio Tanner: Mujeres / Hombres Tanner 1: 1.2-6.4 / 1.4-5.2 Tanner 2: 2.8-6.9 / 2.3-6.3 Tanner 3: 3.9-9.4 / 3.1-8.9 Tanner 4: 3.3-8.1 / 3.7-8.7 Tanner 5: 2.7-9.1 / 2.6-8.6
IGFBP30 **IGFBP 3 (INSULINE LIKE GROWTH FACTOR BINDING PROTEIN 3) - (30'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 30 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	µg/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
IGFBP45 **IGFBP 3 (INSULINE LIKE GROWTH FACTOR BINDING PROTEIN 3) - (45'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 45 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	µg/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
IGFBP60 **IGFBP 3 (INSULINE LIKE GROWTH FACTOR BINDING PROTEIN 3) - (60'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 60 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	µg/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
IGFBP90 **IGFBP 3 (INSULINE LIKE GROWTH FACTOR BINDING PROTEIN 3) - (90'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 90 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	µg/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
IGFBP120 **IGFBP 3 (INSULINE LIKE GROWTH FACTOR BINDING PROTEIN 3) - (120'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 120 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	µg/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
D70GG **IgG ESPECÍFICA Acarus siro (gd70) Ácaros, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
W18GG **IgG ESPECÍFICA Acedera (rumex acetosella) (gw18) Polen malezas, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F96GG **IgG ESPECÍFICA Aguacate (gf96) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
W5GG **IgG ESPECÍFICA Ajenjo (artemisia absinthium) (gw5) Polen malezas, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
F47GG **IgG ESPECÍFICA Ajo (gf47) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
T14GG **IgG ESPECÍFICA Álamo negro (populus deltoides) (gt14) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
K87GG **IgG ESPECÍFICA Alfa amilasa (gk87) Ocupacional, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
F11GG **IgG ESPECÍFICA Alforfón (gf11) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
K83GG **IgG ESPECÍFICA Algodón semilla (gk83) Ocupacional, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
F20GG **IgG ESPECÍFICA Almendra (gf20) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
G71GG **IgG ESPECÍFICA Alpiste (phalaris arundinacea) (gg71) Polen gramíneas, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
M6G **IgG ESPECÍFICA Alternaria alternata (A. tenuis) (gM6) Mohos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
W14GG **IgG ESPECÍFICA Amaranto (amaranthus retroflexus)(g w14) Polen malezas, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
W4GG **IgG ESPECÍFICA Ambrosia falsa (franseria acanthicarpa) (gw4) Polen malezas, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
W3GG **IgG ESPECÍFICA Ambrosia gigante (ambrosia trifida) (gw3) Polen malezas, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
W2GG **IgG ESPECÍFICA Ambrosia oeste (ambrosia psilostachya) (g w2) Polen malezas, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
C6G **IgG ESPECÍFICA Amoxicilina (gc6) Medicamentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F202GG **IgG ESPECÍFICA Anacardo (f202) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Rec. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	
K79GG **IgG ESPECÍFICA Anhidrido ftalico (gk79) Ocupacional, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
P4GG **IgG ESPECÍFICA Anisakis (gp4) Parásitos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F85GG **IgG ESPECÍFICA Apio (gf85) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
T1GG **IgG ESPECÍFICA Arce (acer negundo) (gt1) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
F9GG **IgG ESPECÍFICA Arroz (gf9) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
W6GG **IgG ESPECÍFICA Artemisia (artemisia vulgaris) (gw6) Polen malezas, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
P1GG **IgG ESPECÍFICA Ascaris (gp1) Parásitos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
M228G **IgG ESPECÍFICA Aspergillus flavus (m228) Mohos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
IGGAF **IgG ESPECÍFICA Aspergillus fumigatus (gm3) Mohos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
M207GG **IgG ESPECÍFICA Aspergillus niger (gm207) Mohos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
M36G **IgG ESPECÍFICA Aspergillus terreus (m36) Mohos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
W15GG **IgG ESPECÍFICA Atriplice (atriplex lentiformis) (gw15) Polen malezas, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
F40GG **IgG ESPECÍFICA Atún (gf40) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
M12GG **IgG ESPECÍFICA Aureobasidium pullulans (gm12) Mohos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F17GG **IgG ESPECÍFICA Avellana (gf17) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
T4GG **IgG ESPECÍFICA Avellano (GT4), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
G14GG **IgG ESPECÍFICA Avena (avena sativa) (gg14) Polen gramíneas, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F7GG **IgG ESPECÍFICA Avena (gf7) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
F3GG **IgG ESPECÍFICA Bacalao (gf3) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
G5G **IgG ESPECÍFICA Ballico (Iolium perenne) (gg5) Polen gramíneas, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
W13GG **IgG ESPECÍFICA Bardana (gw13), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
T3GG **IgG ESPECÍFICA Betula verrucosa (gt3), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
GF77 **IgG ESPECÍFICA Blactoglobulina (f77), SUERO**	ImmunoCAP®	5	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F80GG **IgG ESPECÍFICA Bogavante (gf80) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
M7GG **IgG ESPECÍFICA Botrytis cinerea (gm7) Mohos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
F13GG **IgG ESPECÍFICA Cacahuete (gf13) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F93GG **IgG ESPECÍFICA Cacao (gf93) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
M5GG **IgG ESPECÍFICA Candida albicans (gm5) Mohos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
F23GG **IgG ESPECÍFICA Cangrejo de mar (gf23) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F26GG **IgG ESPECÍFICA Carne de cerdo (gf26) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
F88GG **IgG ESPECÍFICA Carne de cordero (gf88) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
F83GG **IgG ESPECÍFICA Carne de pollo (gf83) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F27GG **IgG ESPECÍFICA Carne de ternera (gf27) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
G7GG **IgG ESPECÍFICA Carrizo (phragmites communis) (gg7) Polen gramíneas, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
E3GG **IgG ESPECÍFICA Caspa de caballo (ge3) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
E1G **IgG ESPECÍFICA Caspa de gato (ge1) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
E5G **IgG ESPECÍFICA Caspa de perro (ge5) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
T21GG **IgG ESPECÍFICA Cayeput (malaleuca leucadendron) (gt21) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F6GG **IgG ESPECÍFICA Cebada (gf6) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
F48GG **IgG ESPECÍFICA Cebolla (gf48) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
W10GG **IgG ESPECÍFICA Cenigo (chenopodium album) (gw10) Polen malezas, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F5GG **IgG ESPECÍFICA Centeno (gf5) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
G12GG **IgG ESPECÍFICA Centeno (secale cereale) (gg12) Polen gramíneas, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
F212GG **IgG ESPECÍFICA Champiñón (gf212) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
T23GG **IgG ESPECÍFICA Cipres (cupressus sempervirvens) (gt23) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
M2G **IgG ESPECÍFICA Cladosporium herbarum (gm2) Mohos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
GF1 **IgG ESPECÍFICA Clara de huevo (gf1) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F36GG **IgG ESPECÍFICA Coco (gf36) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
G16GG **IgG ESPECÍFICA Cola zorra (alopecurus pratensis) (gg16) Polen gramíneas, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
T17GG **IgG ESPECÍFICA Cryptomeria japonica (gt17) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
I6GG **IgG ESPECÍFICA Cucaracha (blatella germanica) (gi6) Insectos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
T222GG **IgG ESPECÍFICA Cupressus arizonica (gt222) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
M16GG **IgG ESPECÍFICA Curvularia lunata (gm16) Mohos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G3GG **IgG ESPECÍFICA Dactylis glomerata (g3), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
D2G **IgG ESPECÍFICA Dermatophagoides farinae(gd2) Ácaros, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
D3GG **IgG ESPECÍFICA Dermatophagoides microceras (gd3) Ácaros, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
D1G **IgG ESPECÍFICA Dermatophagoides pteronyssinus (gd1) Ácaros, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
W8GG **IgG ESPECÍFICA Diente leon (taraxacum vulgare) (gw8) Polen malezas, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
I5GG **IgG ESPECÍFICA Dolichovespula arenaria (AVISPON) (i5), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G70GG **IgG ESPECÍFICA Elymus triticoides (gg70) Polen gramíneas, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
T6GG **IgG ESPECÍFICA Enebro (juniperus sabinoides) (gt6) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
M14GG **IgG ESPECÍFICA Epicoccum purpurascens (gm14) Mohos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
E80GG **IgG ESPECÍFICA Epitelio de cabra (ge80) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
E83GG **IgG ESPECÍFICA Epitelio de cerdo (ge83) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
E6GG **IgG ESPECÍFICA Epitelio de cobaya (ge6) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
E82GG **IgG ESPECÍFICA Epitelio de conejo (ge82) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
E84GG **IgG ESPECÍFICA Epitelio de hamster (ge84) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
E73GG **IgG ESPECÍFICA Epitelio de rata (ge73) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
E71GG **IgG ESPECÍFICA Epitelio de ratón (ge71) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
I76GG **IgG ESPECÍFICA Escarabajo (trogoderma angustum solier) (gi76) Insectos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
G8GG **IgG ESPECÍFICA Espiguilla (poa pratensis) (gg8) Polen gramíneas, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
T18GG **IgG ESPECÍFICA Eucalipto (eucalyptus) (gt18) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
D74GG **IgG ESPECÍFICA Euroglypus maynei (gd74) Ácaros, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
E200G **IgG ESPECÍFICA Excremento de canario (ge200) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
E77GG **IgG ESPECÍFICA Excremento de periquito (ge77) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
E218G **IgG ESPECÍFICA Excremento de pollo (ge218) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
G4GG **IgG ESPECÍFICA Festuca elatior (g4), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
K81GG **IgG ESPECÍFICA Ficus spp (gk81) Ocupacional, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
K80GG **IgG ESPECÍFICA Formaldehido (gk80) Ocupacional, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
F44GG **IgG ESPECÍFICA Fresa (gf44) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
T15GG **IgG ESPECÍFICA Fresno (fraxinus americana) (gt15) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
M9GG **IgG ESPECÍFICA Fusarium moniliforme (gm9) Mohos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
F24GG **IgG ESPECÍFICA Gamba (gf24) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
W16GG **IgG ESPECÍFICA Gilde (iva ciliata) (gw16) Polen malezas, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
GF79 **IgG ESPECÍFICA Gluten (gf79) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
D73GG **IgG ESPECÍFICA Glycyphagus domesticus (gd73) Ácaros, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G2G **IgG ESPECÍFICA Grama mayor (cynodon dactylon) (gg2) Polen gramíneas, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
G1GG **IgG ESPECÍFICA Grama olor (anthoxathum odoratum) (gg1) Polen gramíneas, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
F12GG **IgG ESPECÍFICA Guisante (gf12) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
T5GG **IgG ESPECÍFICA Haya (fagus grandifolia) (gt5) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
M8GG **IgG ESPECÍFICA Helminthosporium halodes (gm8) Mohos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
G13GG **IgG ESPECÍFICA Heno blanco (holcus lanatus) (gg13) Polen gramíneas, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G6G **IgG ESPECÍFICA Hierba timotea (phleum pratense) (gg6) Polen gramíneas, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
I70GG **IgG ESPECÍFICA Hormiga roja (solenopsis invicta) (gi70) Insectos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
F245GG **IgG ESPECÍFICA Huevo (gf245) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
C73GG **IgG ESPECÍFICA Insulina humana (gc73) Medicamentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
K77GG **IgG ESPECÍFICA Isocianato hdi (gk77) Ocupacional, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
K76GG **IgG ESPECÍFICA Isocianato mdi (gk76) Ocupacional, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
K75GG **IgG ESPECÍFICA Isocianato tdi (gk75) Ocupacional, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
K72GG **IgG ESPECÍFICA Ispaghula (gk72) Ocupacional, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
F15GG **IgG ESPECÍFICA Judías blancas (gf15) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F84GG **IgG ESPECÍFICA Kiwi (gf84) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
M42G **IgG ESPECÍFICA Laceyella sacchari (gm42), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
F304GG **IgG ESPECÍFICA Langosta (gf304) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
K82GG **IgG ESPECÍFICA Latex (gk82) Ocupacional, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
F300GG **IgG ESPECÍFICA Leche de cabra (gf300) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
GF2 **IgG ESPECÍFICA Leche de vaca (gf2) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F231G **IgG ESPECÍFICA Leche de vaca hervida (f231) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
F235GG **IgG ESPECÍFICA Lenteja (gf235) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
D71GG **IgG ESPECÍFICA Lepidoglyphus destructor (gd71) Ácaros, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F45GG **IgG ESPECÍFICA Levadura (Saccaromyces cerevisiae) (gf45) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
F208GG **IgG ESPECÍFICA Limón (gf208) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
W9GG **IgG ESPECÍFICA Llanten (plantago lanceolata) (gw9) Polen malezas, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
GE213 **IgG ESPECÍFICA Loro (plumas) (e213), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
F8GG **IgG ESPECÍFICA Maíz (gf8) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
F90GG **IgG ESPECÍFICA Malta (gf90) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F91GG **IgG ESPECÍFICA Mango (gf91) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
F49GG **IgG ESPECÍFICA Manzana (gf49) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
W7GG **IgG ESPECÍFICA Margarita (crysanthehum leucanthemum) (gw7) Polen malezas, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F37GG **IgG ESPECÍFICA Mejillón (gf37) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
F95GG **IgG ESPECÍFICA Melocotón (gf95) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
F87GG **IgG ESPECÍFICA Melón (gf87) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
FX1GG **IgG ESPECÍFICA Mezcla alimentos fx1 (gf13, f17, f18, f20, f36 - Cacahuete, avellana, nuez de brasil, almendra, coco), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
FX2GG **IgG ESPECÍFICA Mezcla alimentos fx2 (gf3, f24, f37, f40, f41 - Pescado, gamba, mejillón, atún, salmón), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
FX3GG **IgG ESPECÍFICA Mezcla alimentos fx3 (gf4, f7, f8, f10, f11 - Trigo, avena, maiz, semilla de sesamo, alforfón), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
FX5GG **IgG ESPECÍFICA Mezcla alimentos fx5 (gf1, f2, f3, f4, f13, f14 - Clara de huevo, leche, pescado, trigo, cacahuete, soja), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
FX70GG **IgG ESPECÍFICA Mezcla alimentos fx70 (gf272, f274, f273, f275 - Estragón, mejorana, tomillo, levístico), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
FX71GG **IgG ESPECÍFICA Mezcla alimentos fx71 (gf265, f266, f267, f268 - Alcaravea, macia, cardamomo, clavo), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
TX1GG **IgG ESPECÍFICA Mezcla árboles tx1 (gt1, t3, t7, t8, t10 - Acer negundo, Betula verrucosa, Quercus alba, Ulmus americana, Juglans californica), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
TX5GG **IgG ESPECÍFICA Mezcla árboles tx5 (gt2, t4, t8, t12, t14 - Alnus incana, Corylus avellana, Ulmus americana, Salix caprea, Populus deltoides), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
TX6GG **IgG ESPECÍFICA Mezcla árboles tx6 (gt1, t3, t5, t7, t10 - Acer negundo, Betula verrucosa, Fagus grandifolia, Quercus alba, Juglans californica), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
TX7GG **IgG ESPECÍFICA Mezcla árboles tx7 (gt9, t12, t16, t18, t19, t21 - Olea europaea, Salix caprea, Pinus strobus, Eucalyptus spp., Acacia longifolia, Melaleuca leucadendron), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
TX8GG **IgG ESPECÍFICA Mezcla árboles tx8 (gt1, t3, t4, t7, t11 - Acer negundo, Betula verrucosa, Corylus avellana, Quercus alba, Platanus acerifolia), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
TX9GG **IgG ESPECÍFICA Mezcla árboles tx9 (gt2, t3, t4, t7, t12 - Alnus incana, Betula verrucosa, Corylus avellana, Quercus alba, Salix caprea), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
EX1GG **IgG ESPECÍFICA Mezcla epitelios animales ex1 (ge1, e3, e4, e5 - Caspa de gato, caspa de caballo, caspa de vaca, caspa de perro), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
EX70GG **IgG ESPECÍFICA Mezcla epitelios animales ex70 (ge6, e82, e84, e87, e88 - Epitelio de cobaya, epitelio de conejo, epitelio de hamster, rata y ratón), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
X1GG **IgG ESPECÍFICA Mezcla gramíneas gx1 (g3, g4, g5, g6, g8 - Dactylis glomerata, Festuca elatior, Lolium perenne, Phleum pratense, Poa pratensis), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
X2GG **IgG ESPECÍFICA Mezcla gramíneas gx2 (gg2, g5, g6, g8, g10, g17 - Cynodon dactylon, Lolium perenne, Phleum pratense, Poa pratensis, Sorghum halepense, Paspalum notatum), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
X3GG **IgG ESPECÍFICA Mezcla gramíneas gx3 (gg1, g5, g6, g12, g13 - Anthoxanthum odoratum, Lolium perenne, Phleum pratense, Secale cereale, Holcus lanatus), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
X4GG **IgG ESPECÍFICA Mezcla gramíneas gx4 (gg1, g5, g7, g12, g13 - Anthoxanthum odoratum, Lolium perenne, Phragmites communis, Secale cereale, Holcus lanatus), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
MX1GG **IgG ESPECÍFICA Mezcla mohos mx1 (gm1, m2, m3, m6 - Penicillium chrysogenum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
WX1GG **IgG ESPECÍFICA Mezcla plantas wx1 (gw1, w6, w9, w10, w11 - Ambrosia artemisiifolia (gA. elatior), Artemisia vulgaris, Plantago lanceolata, Chenopodium album, Salsola kali), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
WX2GG **IgG ESPECÍFICA Mezcla plantas wx2 (gw2, w6, w9, w10, w15 - Ambrosia psilostachya, Artemisia vulgaris, Plantago lanceolata, Chenopodium album, Atriplex lentiformis), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
WX3GG **IgG ESPECÍFICA Mezcla plantas wx3 (gw6, w9, w10, w12, w20 - Artemisia vulgaris, Plantago lanceolata, Chenopodium album, Solidago virgaurea, Urtica dioica), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
WX5GG **IgG ESPECÍFICA Mezcla plantas wx5 (gw1, w6, w7, w8, w12 - Ambrosia artemisiifolia (gA. elatior), Artemisia vulgaris, Chrysanthemum leucanthemum, Taraxacum vulgare, Solidago virgaurea), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
WX6GG **IgG ESPECÍFICA Mezcla plantas wx6 (gw9, w10, w11, w18 - Plantago lanceolata, Chenopodium album, Salsola kali, Rumex acetosella), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
WX7GG **IgG ESPECÍFICA Mezcla plantas wx7 (gw7, w8, w9,w10, w12 - Chrysanthemum leucanthemum, Taraxacum vulgare, Plantago lanceolata, Chenopodium album, Solidago virgaurea), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
EX71GG **IgG ESPECÍFICA Mezcla plumas ex71 (e70, e85, e86, e89 - Pluma de oca, pluma de pollo, pluma de pato, pluma de pavo), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
EX72GG **IgG ESPECÍFICA Mezcla plumas ex72 (e78, e201, e196, e213, e214 - Pluma de periquito, pluma de canario, plumas de cacatúa ninfa, pluma de loro, pluma de pinzón), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
HX2GG **IgG ESPECÍFICA Mezcla polvo doméstico hx2 (gh2, d1, d2, i6 - Hollister-Stier Labs., Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Blatella germanica), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
T20GG **IgG ESPECÍFICA Mezquite (prosopis juliflora) (gt20) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
GM22 **IgG ESPECÍFICA Micropolispora faeni (gm22), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
T19GG **IgG ESPECÍFICA Mimosa (acacia longifolia) (gt19) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
W17GG **IgG ESPECÍFICA Mirabel (kochia scoparia) (gw17) Polen malezas, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
T70GG **IgG ESPECÍFICA Morera (morus alba) (gt70) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
T71GG **IgG ESPECÍFICA Morera Roja (Morus Rubra) (t71GG), SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
I71GG **IgG ESPECÍFICA Mosquito (aedes comunis) (gi71) Insectos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
I73GG **IgG ESPECÍFICA Mosquito rojo (chironomus thummi th) (gi73) Insectos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F89GG **IgG ESPECÍFICA Mostaza (gf89) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
M4GG **IgG ESPECÍFICA Mucor racemosus (gm4) Mohos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
F33GG **IgG ESPECÍFICA Naranja (gf33) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
GF76 **IgG ESPECÍFICA nBos d 4; alfa-lactoalbúmina (gf76) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
GF78 **IgG ESPECÍFICA nBos d 8; caseína (gf78) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
GF232 **IgG ESPECÍFICA nGal d 2 Ovoalbumina (f232), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
GF233 **IgG ESPECÍFICA nGal d1 Ovomucoide (f233), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
T10GG **IgG ESPECÍFICA Nogal (juglans californica) (gt10) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
F18GG **IgG ESPECÍFICA Nuez de brasil (gf18) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F256GG **IgG ESPECÍFICA Nuez de Nogal (gf256) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
T9GG **IgG ESPECÍFICA Olivo (olea europea) (gt9) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
T8GG **IgG ESPECÍFICA Olmo (ulmus americana) (gt8) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
E74GG **IgG ESPECÍFICA Orina de rata (e74), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
E72GG **IgG ESPECÍFICA Orina de ratón (ge72) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
W20GG **IgG ESPECÍFICA Ortiga (urtica dioica) (gw20) Polen malezas, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
K78GG **IgG ESPECÍFICA Oxido etileno (gk78) Ocupacional, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
T72GG **IgG ESPECÍFICA Palmera reina (Arecastrum roman zoffianum) (gt72) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
G17GG **IgG ESPECÍFICA Panizo pampas (gg17), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
W21GG **IgG ESPECÍFICA Parietaria judaica (gw21) Polen malezas, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
W19GG **IgG ESPECÍFICA Parietaria officinalis (gw19) Polen malezas, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
F35GG **IgG ESPECÍFICA Patata (gf35) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
T22GG **IgG ESPECÍFICA Pecana (carya pecan) (gt22) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
C1GG **IgG ESPECÍFICA Penicilina G (gc1) Medicamentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
C2GG **IgG ESPECÍFICA Penicilina V (gc2) Medicamentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
M209GG **IgG ESPECÍFICA Penicillium Frequentans (gm209) Mohos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
M1GG **IgG ESPECÍFICA Penicillium notatum (gm1) Mohos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
F244GG **IgG ESPECÍFICA Pepino (gf244) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina litio) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F94GG **IgG ESPECÍFICA Pera (gf94) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
F86GG **IgG ESPECÍFICA Perejil (gf86) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
GE90 **IgG ESPECÍFICA Periquito (ge90), SUERO**	ImmunoCAP®	15	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
T16GG **IgG ESPECÍFICA Pino blanco (pinus strobus) (gt16) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
F210GG **IgG ESPECÍFICA Piña (gf210) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F203GG **IgG ESPECÍFICA Pistacho (gf203) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.	
F92GG **IgG ESPECÍFICA Plátano (gf92) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
T11GG **IgG ESPECÍFICA Platanus acerifolia (gt11) - plátano Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
E201G **IgG ESPECÍFICA Plumas de canario (ge201) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
E70GG **IgG ESPECÍFICA Plumas de oca (ge70) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
E215G **IgG ESPECÍFICA Plumas de paloma (ge215) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
E86GG **IgG ESPECÍFICA Plumas de pato (ge86) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
E89GG **IgG ESPECÍFICA Plumas de pavo (ge89) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
GE78 **IgG ESPECÍFICA Plumas de periquito (ge78) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
E85GG **IgG ESPECÍFICA Plumas de pollo (ge85) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
GE92 **IgG ESPECÍFICA Plumas, excrementos y proteínas séricas de loro (ge92), SUERO**	ImmunoCAP®	7	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
E91G **IgG ESPECÍFICA Plumas, excrementos y proteínas séricas de paloma (Ge91), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
E93G **IgG ESPECÍFICA Proteínas séricas de paloma (ge93), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
E219G **IgG ESPECÍFICA Proteinas séricas de pollo (e219) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
E75GG **IgG ESPECÍFICA Proteínas séricas de rata (ge75) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
E76GG **IgG ESPECÍFICA Proteínas séricas de ratón (ge76) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
F82GG **IgG ESPECÍFICA Queso (tipo camb, gorg, brie, roquefort) (gf82) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F81GG **IgG ESPECÍFICA Queso (tipo cheddar) (gf81) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
G9GG **IgG ESPECÍFICA Rastreras (agrostis stolonifera) (gg9) Polen gramíneas, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
E87GG **IgG ESPECÍFICA Rata (ge87) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
E88GG **IgG ESPECÍFICA Ratón (ge88) Epidérmicos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
M11GG **IgG ESPECÍFICA Rhizopus nigricans (gm11) Mohos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
T7GG **IgG ESPECÍFICA Roble blanco (quercus alba) (gt7) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
W12GG **IgG ESPECÍFICA Ruda dorada (solidago virgaurea) (gw12) Polen malezas, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
F41GG **IgG ESPECÍFICA Salmón (gf41) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
W11GG **IgG ESPECÍFICA Salsola (salsola kali) (gw11) Polen malezas, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F308GG **IgG ESPECÍFICA Sardina (gf308) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
T12GG **IgG ESPECÍFICA Sauce (salix caprea) (gt12) Polen árboles, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
K84GG **IgG ESPECÍFICA Semilla de girasol (gk84) Ocupacional, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F10GG **IgG ESPECÍFICA Semilla de sésamo (gf10) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
F14GG **IgG ESPECÍFICA Soja (glycine max) (gf14) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
G10GG **IgG ESPECÍFICA Sorgo (sorghum halepense) (gg10) Polen gramíneas, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
M24GG **IgG ESPECÍFICA Stachybotrys atra (Gm24), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.3 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.3 mL Plasma Heparina litio (1 x Tubo sangre heparina litio) [Refr.] Alt. 0.3 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
M226GG **IgG ESPECÍFICA Staphylococcal entero TSST (gm226) Mohos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
GM80 **IgG ESPECÍFICA Staphylococcal enterotoxin A (gm80) Mohos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
GM81 **IgG ESPECÍFICA Staphylococcal enterotoxin B (gm81) Mohos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
GM223 **IgG ESPECÍFICA Staphylococcal enterotoxin C (gm223) Mohos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
M10GG **IgG ESPECÍFICA Stemphylium botryosum (gm10) Mohos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F25GG **IgG ESPECÍFICA Tomate (gf25) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
M15GG **IgG ESPECÍFICA Trichoderma viride (gm15) Mohos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
GGF4 **IgG ESPECÍFICA Trigo (gf4) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G15GG **IgG ESPECÍFICA Trigo (triticum sativum) (gg15) Polen gramíneas, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
D72GG **IgG ESPECÍFICA Tyrophagus putrescentiae(g d72) Ácaros, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
I2GG **IgG ESPECÍFICA Veneno avispa (dolichovespula maculata) (gi2) Insectos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
GVAB **IgG ESPECÍFICA Veneno de abeja (apis mellifera) (gi1) Insectos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
I75GG **IgG ESPECÍFICA Veneno de abejorro (vespa crabro) (gi75) Insectos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
I4GG **IgG ESPECÍFICA Veneno de avispa (polistes spp.) (gi4) Insectos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
I3GG **IgG ESPECÍFICA Veneno de avispa (vespula spp) (gi3) Insectos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
GF75 **IgG ESPECÍFICA Yema de huevo (gf75) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
F31GG **IgG ESPECÍFICA Zanahoria (gf31) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
GD1 **IgG4 ESPECÍFICA Dermatophagoides pteronyssinus(d1), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
T19G **IgG4 ESPECÍFICA Acacia longifolia (t19), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
D70G **IgG4 ESPECÍFICA Acarus siro (d70), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
W18G **IgG4 ESPECÍFICA Acedera (w18), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
I71G **IgG4 ESPECÍFICA Aedes comunis (i71), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
G9G **IgG4 ESPECÍFICA Agrostis stolonifera (g9), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F96G **IgG4 ESPECÍFICA Aguacate (f96), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
W5G **IgG4 ESPECÍFICA Ajenjo (w5), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
F47G **IgG4 ESPECÍFICA Ajo (f47), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
K87G **IgG4 ESPECÍFICA Alfaamilasa (k87), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
G4F76 **IgG4 ESPECÍFICA Alfalactoalbumina (f76), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
F11G **IgG4 ESPECÍFICA Alforfón (f11), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F20G **IgG4 ESPECÍFICA Almendra (f20), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
G71G **IgG4 ESPECÍFICA Alpiste (g71), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
GM6 **IgG4 ESPECÍFICA Alternaria tenuis (m6), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
W14G **IgG4 ESPECÍFICA Amaranto (w14), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
W3G **IgG4 ESPECÍFICA Ambrosia gigante (w3), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
W2G **IgG4 ESPECÍFICA Ambrosia psilostachya (w2), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
C6G4 **IgG4 ESPECÍFICA Amoxicilina (c6), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
K79G **IgG4 ESPECÍFICA Anhidrido ftalico (k79), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
GP4 **IgG4 ESPECÍFICA Anisakis (p4), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G1G **IgG4 ESPECÍFICA Anthoxanthum odoratum (g1), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
F85G **IgG4 ESPECÍFICA Apio (f85), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
G4AB **IgG4 ESPECÍFICA Apis mellifera veneno de abeja (i1), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
T1G **IgG4 ESPECÍFICA Arce (t1), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
F9G **IgG4 ESPECÍFICA Arroz (f9), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
W6G **IgG4 ESPECÍFICA Artemisia vulgaris (w6), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
P1G **IgG4 ESPECÍFICA Ascaris (p1), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
GM3 **IgG4 ESPECÍFICA Aspergillus fumigatus (m3), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
M207G **IgG4 ESPECÍFICA Aspergillus niger (m207), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
W15G **IgG4 ESPECÍFICA Atriplex lentiformis (w15), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
F40G **IgG4 ESPECÍFICA Atun (f40), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
M12G **IgG4 ESPECÍFICA Aureobasidium pullulans (m12), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F17G **IgG4 ESPECÍFICA Avellana (f17), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
T4G **IgG4 ESPECÍFICA Avellano (t4), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
F7G **IgG4 ESPECÍFICA Avena (f7), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G14G **IgG4 ESPECÍFICA Avena (g14), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
I5G **IgG4 ESPECÍFICA Avispon (i5), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
F3G **IgG4 ESPECÍFICA Bacalao (f3), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F92G4 **IgG4 ESPECÍFICA Banana (f92), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
W13G **IgG4 ESPECÍFICA Bardana (w13), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
G4F77 **IgG4 ESPECÍFICA Betalactoglobulina (f77), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
T3G **IgG4 ESPECÍFICA Betula verrucosa (t3), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
I6G **IgG4 ESPECÍFICA Blatta germanica (i6) insectos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
D201G4 **IgG4 ESPECÍFICA Blomia tropicali (d201), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F80G **IgG4 ESPECÍFICA Bogavante (f80), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
F313G4 **IgG4 ESPECÍFICA Boquerón (f313) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
M7G **IgG4 ESPECÍFICA Botrytis cinerea (m7), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
E3G **IgG4 ESPECÍFICA Caballo (e3) (caspa), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
F13G **IgG4 ESPECÍFICA Cacahuete (f13), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
F93G **IgG4 ESPECÍFICA Cacao (f93), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
GCAN **IgG4 ESPECÍFICA Candida albicans (m5), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
F23G **IgG4 ESPECÍFICA Cangrejo de mar (f23), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
F88G **IgG4 ESPECÍFICA Carne de cordero (f88), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G7G **IgG4 ESPECÍFICA Carrizo (g7), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
G4F78 **IgG4 ESPECÍFICA Caseina (f78), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
GE1 **IgG4 ESPECÍFICA Caspa de gato (e1), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
GE5 **IgG4 ESPECÍFICA Caspa de perro (e5), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
E4G **IgG4 ESPECÍFICA Caspa de vaca (e4), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
T21G **IgG4 ESPECÍFICA Cayeputi (t21), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G2G4 **IgG4 ESPECÍFICA Ccynodon dactylon (g2), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
F6G **IgG4 ESPECÍFICA Cebada (f6), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
F48G **IgG4 ESPECÍFICA Cebolla (f48), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
T17G **IgG4 ESPECÍFICA Cedro del japón (t17), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
F5G **IgG4 ESPECÍFICA Centeno (f5), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
G70G **IgG4 ESPECÍFICA Centeno salvaje (g70), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F26G **IgG4 ESPECÍFICA Cerdo (f26), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
W10G **IgG4 ESPECÍFICA Chenopodium album (w10), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
M2G4 **IgG4 ESPECÍFICA Cladosporium herbarum (m2), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F1G **IgG4 ESPECÍFICA Clara de huevo (f1), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
E6G **IgG4 ESPECÍFICA Cobaya (e6) (epitelio), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
F36G **IgG4 ESPECÍFICA Coco (f36) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G16G **IgG4 ESPECÍFICA Cola zorra (g16), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
T222G **IgG4 ESPECÍFICA Cupressus arizonica (t222), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
T23G **IgG4 ESPECÍFICA Cupressus semper. (t23), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
M16G **IgG4 ESPECÍFICA Curvularia lunata (m16), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
G3G **IgG4 ESPECÍFICA Dactylis glomerata (g3), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
D3G **IgG4 ESPECÍFICA Dermatophagoides (d3), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
GD2 **IgG4 ESPECÍFICA Dermatophagoides farinae (d2), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
W8G **IgG4 ESPECÍFICA Diente león (w8), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
I2G **IgG4 ESPECÍFICA Dolichovespula Maculata I2g , SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica. mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
M14G **IgG4 ESPECÍFICA Epicoccum purpurascens (m14), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
E80G **IgG4 ESPECÍFICA Epitelio de cabra (e80), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
E83G **IgG4 ESPECÍFICA Epitelio de cerdo (e83), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
E82G **IgG4 ESPECÍFICA Epitelio de conejo (e82), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
E84G **IgG4 ESPECÍFICA Epitelio de hamster (e84), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
E81G **IgG4 ESPECÍFICA Epitelio de oveja (e81), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
E73G **IgG4 ESPECÍFICA Epitelio de rata (e73), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
E71G **IgG4 ESPECÍFICA Epitelio de ratón (e71), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
T18G **IgG4 ESPECÍFICA Eucaliptus (t18), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
D74G **IgG4 ESPECÍFICA Euroglyphus maynei (d74), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
E77G **IgG4 ESPECÍFICA Excremento de periquito (e77), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
W4G **IgG4 ESPECÍFICA Falsa ambrosia (w4), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G4G **IgG4 ESPECÍFICA Festuca elatior (g4), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
K81G **IgG4 ESPECÍFICA Ficus spp. (k81), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
K80G **IgG4 ESPECÍFICA Formaldehido (k80), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
T15G **IgG4 ESPECÍFICA Fraxinus americana (t15), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
F44G **IgG4 ESPECÍFICA Fresa (f44), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
FX1G **IgG4 ESPECÍFICA Frut.Sec Fx1g (F13,17,18,20,36), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica. No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
M9G **IgG4 ESPECÍFICA Fusarium moniliforme (m9), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
F24G **IgG4 ESPECÍFICA Gamba F24g , SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica. mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
F309G4 **IgG4 ESPECÍFICA Garbanzo (f309) alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
W16G **IgG4 ESPECÍFICA Gilde (w16), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
K84G **IgG4 ESPECÍFICA Girasol (semilla) (k84), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
F79G **IgG4 ESPECÍFICA Gluten (f79), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
D73G **IgG4 ESPECÍFICA Glycyphagus domesticus (d73), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
GX2G **IgG4 ESPECÍFICA Gramineas Gx2g (G2,5,6,8,10,17), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica. No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
F12G **IgG4 ESPECÍFICA Guisantes (f12), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
I73G **IgG4 ESPECÍFICA Gusano de sangre (i73), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
T5G **IgG4 ESPECÍFICA Haya (t5), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
M8G **IgG4 ESPECÍFICA Helminthosporium halodes (m8), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G13G **IgG4 ESPECÍFICA Holcus lanatus (g13), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
I70G **IgG4 ESPECÍFICA Hormiga roja (i70), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
F245G4 **IgG4 ESPECÍFICA Huevo (f245), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
FX5G **IgG4 ESPECÍFICA Infantil Fx5g (F1,2,3,4,13,14), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica. No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
C73G **IgG4 ESPECÍFICA Insulina humana (c73), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
K77G **IgG4 ESPECÍFICA Isocianato hdi (k77), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
K76G **IgG4 ESPECÍFICA Isocianato mdi (k76), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
K75G **IgG4 ESPECÍFICA Isocianato tdi (k75), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
K72G **IgG4 ESPECÍFICA Ispaghula (k72), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F15G **IgG4 ESPECÍFICA Judia blanca (f15), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
T10G **IgG4 ESPECÍFICA Juglans californica (t10), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
F84G **IgG4 ESPECÍFICA Kiwi (f84), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F304G4 **IgG4 ESPECÍFICA Langosta (f304), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
K82G **IgG4 ESPECÍFICA Latex (k82), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
G4F2 **IgG4 ESPECÍFICA Leche de vaca (f2), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F337G4 **IgG4 ESPECÍFICA Lenguado (f337) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
F235G4 **IgG4 ESPECÍFICA Lenteja (f235) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
D71G **IgG4 ESPECÍFICA Lepidoglyphus destructor (d71), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F45G **IgG4 ESPECÍFICA Levadura (f45), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
GG5 **IgG4 ESPECÍFICA Lolium perenne (g5), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
F8G **IgG4 ESPECÍFICA Maiz (f8) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F90G **IgG4 ESPECÍFICA Malta (f90), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
F91G **IgG4 ESPECÍFICA Mango (f91), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
F49G **IgG4 ESPECÍFICA Manzana (f49), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
W7G **IgG4 ESPECÍFICA Margarita (w7), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
F37G **IgG4 ESPECÍFICA Mejillon (f37), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
F95G **IgG4 ESPECÍFICA Melocoton (f95), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F87G **IgG4 ESPECÍFICA Melon (f87), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
F307G **IgG4 ESPECÍFICA Merluza (f307), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
T20G **IgG4 ESPECÍFICA Mesquite (t20), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
GX1G4 **IgG4 ESPECÍFICA Mezcla gx1 (g3, g4g4, g4g5, g4g6, g4g8), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
FX2G **IgG4 ESPECÍFICA Mezcla alimentos fx2 (gf3, f24, f37, f40, f41 - Pescado, gamba, mejillón, atún, salmón), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
FX3G **IgG4 ESPECÍFICA Mezcla alimentos fx3 (gf4, f7, f8, f10, f11 - Trigo, avena, maiz, semilla de sesamo, alforfón), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
FX70G **IgG4 ESPECÍFICA Mezcla alimentos fx70 (gf272, f274, f273, f275 - Estragón, mejorana, tomillo, levístico), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
FX71G **IgG4 ESPECÍFICA Mezcla alimentos fx71 (gf265, f266, f267, f268 - Alcaravea, macia, cardamomo, clavo), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
TX1G **IgG4 ESPECÍFICA Mezcla árboles tx1 (t1, t3, t7, t8, t10 - Acer negundo, Betula verrucosa, Quercus alba, Ulmus americana, Juglans californica), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
TX5G **IgG4 ESPECÍFICA Mezcla árboles tx5 (t2, t4, t8, t12, t14 - Alnus incana, Corylus avellana, Ulmus americana, Salix caprea, Populus deltoides), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
TX6G **IgG4 ESPECÍFICA Mezcla árboles tx6 (t1, t3, t5, t7, t10 - Acer negundo, Betula verrucosa, Fagus grandifolia, Quercus alba, Juglans californica), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
TX7G **IgG4 ESPECÍFICA Mezcla árboles tx7 (t9, t12, t16, t18, t19, t21 - Olea europaea, Salix caprea, Pinus strobus, Eucalyptus spp., Acacia longifolia, Melaleuca leucadendron), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
TX8G **IgG4 ESPECÍFICA Mezcla árboles tx8 (t1, t3, t4, t7, t11 - Acer negundo, Betula verrucosa, Corylus avellana, Quercus alba, Platanus acerifolia), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
TX9G **IgG4 ESPECÍFICA Mezcla árboles tx9 (t2, t3, t4, t7, t12 - Alnus incana, Betula verrucosa, Corylus avellana, Quercus alba, Salix caprea), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
EX1G **IgG4 ESPECÍFICA Mezcla epitelios animales ex1 (e1, e3, e4, e5 - Caspa de gato, caspa de caballo, caspa de vaca, caspa de perro), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
EX70G **IgG4 ESPECÍFICA Mezcla epitelios animales ex70 (ge6, e82, e84, e87, e88 - Epitelio de cobaya, epitelio de conejo, epitelio de hamster, rata y ratón), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
GX3G **IgG4 ESPECÍFICA Mezcla gramíneas gx3 (g1, g5, g6, g12, g13 - Anthoxanthum odoratum, Lolium perenne, Phleum pratense, Secale cereale, Holcus lanatus), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
GX4G **IgG4 ESPECÍFICA Mezcla gramíneas gx4 (g1, g5, g7, g12, g13 - Anthoxanthum odoratum, Lolium perenne, Phragmites communis, Secale cereale, Holcus lanatus), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
MX1G **IgG4 ESPECÍFICA Mezcla mohos mx1 (m1, m2, m3, m6 - Penicillium chrysogenum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
WX1G **IgG4 ESPECÍFICA Mezcla plantas wx1 (w1, w6, w9, w10, w11 - Ambrosia artemisiifolia (A. elatior), Artemisia vulgaris, Plantago lanceolata, Chenopodium album, Salsola kali), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
WX2G **IgG4 ESPECÍFICA Mezcla plantas wx2 (w2, w6, w9, w10, w15 - Ambrosia psilostachya, Artemisia vulgaris, Plantago lanceolata, Chenopodium album, Atriplex lentiformis), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
WX3G **IgG4 ESPECÍFICA Mezcla plantas wx3 (w6, w9, w10, w12, w20 - Artemisia vulgaris, Plantago lanceolata, Chenopodium album, Solidago virgaurea, Urtica dioica), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
WX5G **IgG4 ESPECÍFICA Mezcla plantas wx5 (gw1, w6, w7, w8, w12 - Ambrosia artemisiifolia (gA. elatior), Artemisia vulgaris, Chrysanthemum leucanthemum, Taraxacum vulgare, Solidago virgaurea), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
WX6G **IgG4 ESPECÍFICA Mezcla plantas wx6 (w9, w10, w11, w18 - Plantago lanceolata, Chenopodium album, Salsola kali, Rumex acetosella), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
WX7G **IgG4 ESPECÍFICA Mezcla plantas wx7 (w7, w8, w9,w10, w12 - Chrysanthemum leucanthemum, Taraxacum vulgare, Plantago lanceolata, Chenopodium album, Solidago virgaurea), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
EX71G **IgG4 ESPECÍFICA Mezcla plumas ex71 (e70, e85, e86, e89 - Pluma de oca, pluma de pollo, pluma de pato, pluma de pavo), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
HX2G **IgG4 ESPECÍFICA Mezcla polvo doméstico HX2 (h2, d1, d2, i6 - Hollister-Stier Labs., Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Blatella germanica), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
W17G **IgG4 ESPECÍFICA Mirabel (w17), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
T70G **IgG4 ESPECÍFICA Morus alba (t70), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
F89G **IgG4 ESPECÍFICA Mostaza (f89), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
M4G **IgG4 ESPECÍFICA Mucor racemosus (m4), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
F33G **IgG4 ESPECÍFICA Naranja (f33), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
T22G **IgG4 ESPECÍFICA Nogal pecan (t22), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F18G **IgG4 ESPECÍFICA Nuez de brasil (f18) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
F256G4 **IgG4 ESPECÍFICA Nuez de Nogal (f256) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
GT9 **IgG4 ESPECÍFICA Olea europea (t9), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
E74G **IgG4 ESPECÍFICA Orina de rata (e74), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
E72G **IgG4 ESPECÍFICA Orina de ratón (e72), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
W20G **IgG4 ESPECÍFICA Ortiga (w20), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F232G **IgG4 ESPECÍFICA Ovoalbumina (f232), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
F233G **IgG4 ESPECÍFICA Ovomucoide (f233), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
K78G **IgG4 ESPECÍFICA Óxido de etileno (k78), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
T72G **IgG4 ESPECÍFICA Palmera reina (t72), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
GW21 **IgG4 ESPECÍFICA Parietaria judaica (w21), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
W19G **IgG4 ESPECÍFICA Parietaria officinalis (w19), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F35G **IgG4 ESPECÍFICA Patata (f35), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
C2G **IgG4 ESPECÍFICA Penicilina v (c2), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
C1G **IgG4 ESPECÍFICA Penicilinag (c1), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
M209G **IgG4 ESPECÍFICA Penicillium frequentans (rm209), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
M1G **IgG4 ESPECÍFICA Penicillium notatum (m1), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
F94G **IgG4 ESPECÍFICA Pera (f94), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F86G **IgG4 ESPECÍFICA Perejil (f86), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
I206G **IgG4 ESPECÍFICA Periplaneta americana (i206), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
E78G **IgG4 ESPECÍFICA Periquito (e78) (plumas), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
GG6 **IgG4 ESPECÍFICA Phleum pratense (g6), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
T73G **IgG4 ESPECÍFICA Pino australiano (t73), SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
T16G **IgG4 ESPECÍFICA Pinus strobus (t16), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F203G4 **IgG4 ESPECÍFICA Pistacho (f203) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
W9G **IgG4 ESPECÍFICA Plantago lanceolata (w9), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
T11G **IgG4 ESPECÍFICA Platanus acerifolia (t11), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
E70G **IgG4 ESPECÍFICA Plumas de oca (e70), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
E86G **IgG4 ESPECÍFICA Plumas de pato (e86), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
E89G **IgG4 ESPECÍFICA Plumas de pavo (e89), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
E85G **IgG4 ESPECÍFICA Plumas de pollo (e85), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
G8G **IgG4 ESPECÍFICA Poa pratensis (g8), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
RG205G4 **IgG4 ESPECÍFICA Pólen de Hierba timotea (recombinante p1) rPhl p1 (g205) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
GVA **IgG4 ESPECÍFICA Polistes spp. (i4), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
F83G **IgG4 ESPECÍFICA Pollo (f83), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
E75G **IgG4 ESPECÍFICA Prot. séricas de rata (e75), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
E76G **IgG4 ESPECÍFICA Prot. séricas de ratón (e76), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
T7G **IgG4 ESPECÍFICA Quercus alba (t7), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
F81G **IgG4 ESPECÍFICA Queso (tipo cheddar) (f81), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G4M229 **IgG4 ESPECÍFICA rALT a 1 Alternaria alternata (rec m229) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.3 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.3 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.3 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
E87G **IgG4 ESPECÍFICA Rata (e87), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
E88G **IgG4 ESPECÍFICA Ratón (e88), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
E101RG4 **IgG4 ESPECÍFICA rCan f1 Canis familiaris - perro (recombinante e101r) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
E226RG4 **IgG4 ESPECÍFICA rCan f5 Canis familiaris - perro (e226r) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
G4D209 **IgG4 ESPECÍFICA rDER p 23 Dermatophagoides pteronyssinus (rec d209) Recomibnantes, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.3 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 0.3 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
M11G **IgG4 ESPECÍFICA Rhizopus nigricans (m11), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
GF420 **IgG4 ESPECÍFICA rPru p3 LTP Melocotón (f420) Recombinantes, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 3 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 3 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 3 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica.
W12G **IgG4 ESPECÍFICA Ruda dorada (w12), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
T6G **IgG4 ESPECÍFICA Sabina (t6), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
F41G **IgG4 ESPECÍFICA Salmon (f41), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
G4W11 **IgG4 ESPECÍFICA Salsola (w11), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
T12G **IgG4 ESPECÍFICA Sauce (t12), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
G12G **IgG4 ESPECÍFICA Secalae cereale (g12), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
K83G **IgG4 ESPECÍFICA Semilla de algodón (k83), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F10G **IgG4 ESPECÍFICA Semilla de sésamo (f10), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
F14G **IgG4 ESPECÍFICA Soja (f14), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
G10G **IgG4 ESPECÍFICA Sorgo (g10), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
M226G **IgG4 ESPECÍFICA Staphylococcal entero tsst (m226), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
M80G4 **IgG4 ESPECÍFICA Staphylococcal enterotoxin a (m80), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
M81G4 **IgG4 ESPECÍFICA Staphylococcal enterotoxin b (m81), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
M223G4 **IgG4 ESPECÍFICA Staphylococcal enterotoxin c (m223), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
M10G **IgG4 ESPECÍFICA Stemphylium botryosum (m10), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
F27G **IgG4 ESPECÍFICA Ternera (f27), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
T208G4 **IgG4 ESPECÍFICA Tilo de hoja pequeña (t208), SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
F25G **IgG4 ESPECÍFICA Tomate (f25), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
M15G **IgG4 ESPECÍFICA Trichoderma viride (m15), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
GF4 **IgG4 ESPECÍFICA Trigo (f4), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
G15G **IgG4 ESPECÍFICA Trigo (g15), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
I76G **IgG4 ESPECÍFICA Trogoderma angustum (i76), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
D72G **IgG4 ESPECÍFICA Tyrophagus putrescentiae (d72), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
T8G **IgG4 ESPECÍFICA Ulmus americana (t8), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
F259G4 **IgG4 ESPECÍFICA Uva (f259) Alimentos, SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
I75G **IgG4 ESPECÍFICA Vespa crabro (i75), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
I3G **IgG4 ESPECÍFICA Vespula spp. (i3), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
F75G **IgG4 ESPECÍFICA Yema de huevo (f75), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
F31G **IgG4 ESPECÍFICA Zanahoria (f31), SUERO**	ImmunoCAP®	3	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de la prueba ya que la inmunorespuesta a la inmunoterapia es específica para cada paciente y alérgeno. Se recomienda valorar una secuencia de determinaciones durante el tratamiento comparándolas con el resultado de IgG específica antes de iniciar el tratamiento a fin de identificar la existencia de una buena respuesta terapéutica. mg/L No existen valores establecidos para la interpretación de los resultados de la medida de la magnitud. El aumento de IgG4 durante la terapia inmunológica con disminución de sensibilidad al alérgeno indica una buena respuesta terapeútica. Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
IGLON5L **IGLON5 NEURONALES ANTICUERPOS, LCR**	Inmunofluorescencia Indirecta en células transfectadas	6	Rec. 1 mL LCR (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.]	Negativo
IGLON5 **IGLON5 NEURONALES ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta en células transfectadas	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Tejido: Células Transfectadas Negativo

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
DESI **IMIPRAMINA + DESIPRAMINA, SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	6	Rec. 100 uL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.] -Dosis administrada, frecuencia y vía de administración La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis. El contenedor recomendado es el tubo seco (sin gel separador) para evitar procesos de adsorción del fármaco. En caso de no disponer de tubo seco, la extracción se puede realizar en tubo con gel separador, separando el suero dentro de las 2 horas posteriores a la recolección y transfiriéndolo a un tubo de alícuota para su transporte al laboratorio. Rechazo: Muestra hemolizada, lipémica y/o ictérica	Intervalo terapéutico (Imipramina + Desipramina): 175 -300 µg/L Toxicidad: (Imipramina + Desipramina): Sup 300 µg/L Desipramina: Límite de cuantificación: 12,00 µg/L Imipramina: Límite de cuantificación: 12,00 µg/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
IMPLAN **IMPLANTEST Salud del implante**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	14	Rec. 1 Muestra/s Líquido crevicular (1 x Copan eNAT) Papel absorvente en dispositivo eNAT Collection an preservation SAP600081727. Conservación: Temperatura ambiente.	: Se informa para cada paciente
G02058 **INCONTINENCIA PIGMENTARIA · IKBKG (deleción) · PCR**	Long Range PCR	22	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Indicado en informe adjunto *1* IKBKG
G7338 **INCONTINENCIA PIGMENTARIA · IKBKG · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] - Resumen de la historia clínica del paciente. Se requiere consentimiento informado. - En caso que proceda y si está disponible, copia del informe del caso índice familiar.	IKBKG *1*
G4012 **INCONTINENCIA PIGMENTARIA · IKBKG · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	IKBKG *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
IAL **INDICE ANDROGENICO LIBRE, SUERO**	Cálculo.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Índice androgénico libre: Hombres 0 - 17 Años 0,50 - 1,50 Índice androgénico libre: Mujeres 0 - 17 Años Inf 1,50 Índice androgénico libre: Mujeres 17 - 29 Años Inf 8,50 Índice androgénico libre: Hombres 17 - 29 Años 30,00 - 128,00 Índice androgénico libre: Hombres 29 - 39 Años 24,00 - 122,00 Índice androgénico libre: Mujeres 29 - 39 Años Inf 8,50 Índice androgénico libre: Mujeres 39 - 49 Años Inf 8,50 Índice androgénico libre: Hombres 39 - 49 Años 14,00 - 126,00 Índice androgénico libre: Mujeres Sup - 49 Años Inf 6,60 Índice androgénico libre: Hombres Sup - 49 Años 18,00 - 82,00
RAAB **INDICE ATEROGENICO (APO B/APO A1), SUERO**	Cálculo.	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Apolipoproteína A1: Hombres 105,00 - 175,00 mg/dL Apolipoproteína A1: Mujeres 105,00 - 205,00 mg/dL Apolipoproteína B: Hombres 60,00 - 140,00 mg/dL Apolipoproteína B: Mujeres 55,00 - 130,00 mg/dL Ratio Apolipoproteína B / A1: Hombres Riesgo Bajo: Inf 0,70 Ratio Apolipoproteína B / A1: Hombres Riesgo Alto: Sup 0,90 Ratio Apolipoproteína B / A1: Hombres Riesgo Medio: 0,70 - 0,90 Ratio Apolipoproteína B / A1: Mujeres Riesgo Bajo: Inf 0,60 Ratio Apolipoproteína B / A1: Mujeres Riesgo Alto: Sup 0,80 Ratio Apolipoproteína B / A1: Mujeres Riesgo Medio: 0,60 - 0,80
CCHD **ÍNDICE ATEROGÉNICO COLESTEROL TOTAL/HDL, SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Colesterol HDL: Hombres Sup 40,00 mg/dL Colesterol HDL: Mujeres Sup 50,00 mg/dL Colesterol total: Inf 200,00 mg/dL Índice aterogénico CT/HDL: Hombres Inf 5,50 Índice aterogénico CT/HDL: Mujeres Inf 4,50
IAT1 **ÍNDICE ATEROGÉNICO HDL/COLESTEROL TOTAL, SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	: Sup 0,25
IAT3 **ÍNDICE ATEROGÉNICO HDL/LDL, SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
CCLH **ÍNDICE ATEROGÉNICO LDL/HDL, SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Índice Aterogénico LDL/HDL: Inf 2,50
RIE1 **ÍNDICE DE RIESGO PRENATAL PRIMER TRIMESTRE (PAPP-A Y BETA-HCG LIBRE) , SUERO**	TRACE	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Extracción de la muestra: Desde las 8 semanas a las 14 semanas. Ecografía: Desde las 11+2 semanas a las 14 semanas, con un CRL igual o superior a 45mm e igual o inferior a 84 mm.	
LSR2 **ÍNDICE DE RIESGO PRENATAL SEGUNDO TRIMESTRE (AFP Y BETA-HCG LIBRE), SUERO**	TRACE	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Extracción de la muestra: Desde las 14+1 semanas a 19+6 semanas. Únicamente es valorable el riesgo de defecto de tubo neural a partir de la semana 15 de gestación. Se requiere peticionario específico.	Si el indice de riesgo del Síndrome de Down es superior o igual a 1/250, se aconseja proseguir el estudio. Si el indice de riesgo del Síndrome Edwards es superior o igual a 1/250, se aconseja proseguir el estudio. Solo es valorable el riesgo de defecto del tubo neural a partir de la semana 15 de gestación.
TILI **INDICE DE TIROXINA LIBRE (FT4 I), SUERO**	Cálculo.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Índice de tiroxina libre: 4,20 - 14,30 Indice TBC (Thyroid Binding Capacity): 0,87 - 1,13 T3 captación (uptake): 24,00 - 35,00 % : Ambos 0 - 15 Años 5,60 - 11,70 µg/dL : Hombres Sup - 15 Años 4,60 - 10,50 µg/dL : Mujeres Sup - 15 Años 5,50 - 11,00 µg/dL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
TOUR **INDICE DE TOURTELLOTE (LCR/SUERO)**	Nefelometría - Turbidimetría.	1	Rec. 2 mL LCR (1 x Tubo Polipropileno) [Refr.] Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Índice de Tourtellote (LCR): Inf 8,00 mg/24 h
HOMA **ÍNDICE HOMA, SUERO**	Cálculo.	1	Rec. 2 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	: 74,00 - 106,00 mg/dL Insulina: 2,00 - 25,00 mU/L Índice HOMA: Inf 3,80 %
IOM32AG **INDICE OMEGA 3, SANGRE TOTAL**	Cromatografía de Gases / Ionización de Llama.	11	Rec. 3 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo protegido de la luz) [Refr.] Ayuno de 4 horas Rechazo: Muestra Hemolizada Rechazo: Muestra lipémica.	8,00 - 12,00 %
IRCO **ÍNDICE ROMA (ALGORITMO DEL RIESGO DE MALIGNIDAD OVÁRICA), SUERO**	Electroquimioluminiscencia.	6	Rec. 1 mL Suero (2 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Se aconseja indicar edad de la paciente y el estatus menstrual (pre/post menopáusica). No quimioterapia previa en 7 días	CA 125: Inf 35,00 UI/mL Indice ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm): Premenopausia Hombres Bajo riesgo de carcinoma epitelial de ovario: Inf 11,40 % Indice ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm): Premenopausia Mujeres Alto riesgo de carcinoma epitelial de ovario: Sup= 11,40 % Índice ROMA2 (postmenopáusica): Postmenopausia Bajo riesgo de carcinoma epitelial de ovario: Inf 29,90 Índice ROMA2 (postmenopáusica): Postmenopausia Alto riesgo de carcinoma epitelial de ovario: Sup 29,90 HE4 (Proteína epididimal humana): Inf 140,00 pmol/L
FESA **INDICE SATURACION TRANSFERRINA (FE SATURACION), SUERO**	Cálculo.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Ayuno mínimo de 8 horas.	Índice de saturación de transferrina: 20,00 - 55,00 %

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ITSB **INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL · PANEL BÁSICO**	PCR-Real Time.	6	Rec. 2 mL Orina (primera micción) [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Exudado vaginal (1 x Escobillón seco.) [Refr.] HOMBRES: Muestra de elección: Orina Recoger los 5-15 primeros ml de la primera micción de la mañana en un contenedor estéril, y desechar el resto para evitar la dilución de la muestra. Si no fuera posible, recoger los 5-15 primeros ml de la orina recogida 1-2h después de la última micción. MUJERES: Muestra de elección: Exudado vaginal Tomar la muestra de exudado vaginal en escobillón SECO (sin medio AMIES; Ref. 600049229). En caso de autotoma, proporcionar instrucciones a la paciente para la correcta recogida de la muestra (MP_RMP-0071). Alternativamente puede remitirse muestra de orina, según el procedimiento indicado para pacientes hombres.	Perfil ITS: Indicado en informe adjunto

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ITS **INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL · PANEL COMPLETO**	PCR-Real Time.	5	Rec. 6 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Rec. 3 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 2 mL Orina (primera micción) (1 x Contenedor estéril) [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Exudado vaginal (1 x Escobillón seco.) [Refr.] HOMBRES: Muestras de elección: Orina, plasma y suero Recoger los 5-15 primeros ml de la primera micción de la mañana en un contenedor estéril, y desechar el resto para evitar la dilución de la muestra. Si no fuera posible, recoger los 5-15 primeros ml de la orina recogida 1-2h después de la última micción. MUJERES: Muestras de elección: Exudado vaginal, plasma y suero Tomar la muestra de exudado vaginal en escobillón SECO (sin medio AMIES; Ref. 600049229). En caso de autotoma, proporcionar instrucciones a la paciente para la correcta recogida de la	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
			muestra (MP_RMP-0071). Alternativamente puede remitirse muestra de orina, según el procedimiento indicado para pacientes hombres.		
G06010 **INFERTILIDAD FEMENINA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BMP15, CYP21A2, FSHR, HESX1, LHCGR, PSMC3IP	*6*
G06011 **INFERTILIDAD MASCULINA · PANEL A · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AR, AURKC, CATSPER1, CFTR, DPY19L2, FSHR, HESX1, KLHL10, LHCGR, NOS1, NR5A1, PLCZ1, SEPT12, SPATA16, SYCP3, USP9Y	*16*
G06012 **INFERTILIDAD MASCULINA · PANEL B · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AR, CATSPER1, CFTR, FSHR, HESX1, LHCGR	*6*
IFLX **INFLIXIMAB/ ANTICUERPOS ANTI-INFLIXIMAB, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Extracción realizada antes de la siguiente toma. Indicar la primera toma, la frecuencia, la dosis y la fecha de la última dosis. Remitir informe clínico y motivo de solicitud de estudio.	Ac Infliximab: Negativo: Inf 10,00 AU/mL Infliximab: Valle 3,00 - 10,00 µg/mL	
INAME **INFLUENZA A ANTICUERPOS IgM (EIA), SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 9,00 NTU Indeterminado: 9,00 - 11,00 NTU Positivo: Sup 11,00 NTU	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
INFAGE **INFLUENZA A, ANTICUERPOS IgG (EIA),SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 9 NTU Indeterminado: 9,00 - 11,00 NTU Positivo: Sup 11,00 NTU
RNVI **INFLUENZA A, INFLUENZA B VIRUS (IFAV (H1, H3, H1PDM09), IFBV) RNA, FROTIS NASOFARÍNGEO**	PCR-Real Time.	4	Rec. 1 Muestra/s Frotis nasofaringeo (1 x Escobillón con medio de transporte viral Vircell) [Refr.] Rec. 1 mL Lavado broncoalveolar (1 x Contenedor estéril) [Refr.] Rec. 1 mL Exudado nasal (1 x Escobillón con medio de transporte para virus) [Refr.] Rec. 1 mL Aspirado bronquial (1 x Contenedor estéril) [Refr.]	RNA Influenzae A H1N1: No se detecta RNA Influenza A: No se detecta RNA Influenza B: No se detecta
INFBGE **INFLUENZA B, ANTICUERPOS IgG (EIA),SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 9,00 NTU Indeterminado: 9,00 - 11,00 NTU Positivo: Sup 11,00 NTU
INBME **INFLUENZA B, ANTICUERPOS IgM (EIA), SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 9,00 NTU Indeterminado: 9,00 - 11,00 NTU Positivo: Sup 11,00 NTU

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
AGIA **INFLUENZAE A ANTIGENO, MUESTRA BIOLÓGICA**	Inmunocromatografía.	2	Rec. 5 mL Aspirado nasofaringeo (1 x Recipiente estéril) [Refr.] Alt. 5 mL Líquido biológico (1 x Recipiente estéril) [Refr.]	Negativo
AGIB **INFLUENZAE B ANTIGENO, MUESTRA BIOLÓGICA**	Inmunocromatografía.	2	Rec. 5 mL Aspirado nasofaringeo [Refr.] Alt. 5 mL Líquido biológico [Refr.]	Negativo
PAI **INHIBIDOR DEL PLASMINÓGENO T-PA (PAI-1) ANTÍGENO, PLASMA**	Enzimoinmunoanálisis	7	Rec. 1 mL Plasma Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) [Cong.] Extracción con estasis venosa. Separar plasma pobre en plaquetas y congelar inmediatamente.	4,00 - 43,00 ng/mL
ITMP1 **INHIBIDOR TISULAR DE METALOPROTEINASAS 1, PLASMA**	Enzimoinmunoanálisis	33	Rec. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.]	39,00 - 278,00 ng/mL
G18023 **INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES, RESPUESTA A · CYP2C19 · HOT SPOT**	Secuenciación Sanger	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	
INHIA **INHIBINA A, SUERO**	Quimioluminiscencia.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Hombres Inf 2,00 pg/mL Fase Folicular Mujeres 1,80 - 90,30 pg/mL Fase Luteal Mujeres 2,70 - 97,50 pg/mL Pico Ovulatorio Mujeres 16,90 - 91,80 pg/mL Postmenopausia Mujeres Inf 2,10 pg/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
INHI **INHIBINA B, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] En mujeres, Indicar fase menstrual.	Hombres 25,00 - 325,00 pg/mL Mujeres Inf 341,00 pg/mL 3r día de ciclo Mujeres Inf 273,00 pg/mL Niñas Inf 83,00 pg/mL Niños Inf 352,00 pg/mL Postmenopausia Mujeres Inf 5,8 pg/mL
IC **INMUNOCOMPLEJOS CIRCULANTES (SISTEMA C1Q), SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 4,40 µg Eq/mL Indeterminado: 4,40 - 10,80 µg Eq/mL Positivo: Sup 10,80 µg Eq/mL
G17002 **INMUNODEFICIENCIA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ADA, AK2, AP3B1, B2M, BCL10, BCL11B, BTK, CARD11, CASP8, CD19, CD247, CD3D, CD3E, CD3G, CD40LG, CD81, CD8A, CHD7, CIITA, CORO1A, CR2, CYBB, DCLRE1C, DOCK8, FCGR3A, FOXN1, FOXP3, GATA2, ICOS, IFNAR2, IFNGR1, IFNGR2, IKBKB, IKBKG, IKZF1 (IKAROS), IL12B, IL12RB1, IL17RA, IL21, IL2RA, IL2RG, IRF7, IRF8, ITK, JAK3, LCK, LIG4, LRBA, LYST, MALT1, MS4A1, MTHFD1, NBN, NFKB1, NFKB2, NHEJ1, ORAI1, PIK3CD, PIK3R1, PRF1, PRKDC, PTPRC , RAG1, RAG2 , RFX5, RFXANK, RFXAP, RMRP, SH2D1A, SLC46A1, STAT1, STAT2, STAT5B, STIM1 , STX11, STXBP2, TAP1, TBX1, TFRC, TNFRSF13B, TNFRSF13C, TNFRSF4, TTC7A, TYK2, UNC119, UNC13D, WAS, XIAP, ZAP70 *89*
G7434 **INMUNODEFICIENCIA COMBINADA POR DEFICIENCIA DE LRBA · LRBA · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	LRBA *1*
G17010 **INMUNODEFICIENCIA COMBINADA SEVERA LIGADA AL CROMOSOMA X · IL2RG · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	IL2RG *1*
G17003 **INMUNODEFICIENCIA COMÚN VARIABLE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CD19, CD81, CR2, ICOS, IKZF1 (IKAROS), IL21, LRBA, MS4A1, NFKB1, NFKB2, TNFRSF13B, TNFRSF13C *12*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G17005 **INMUNODEFICIENCIA SEVERA COMBINADA (COMPLEMENTO DE ISC) · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AP3B1, CASP8, CD3G, CD8A, CHD7, CIITA, DOCK8, FOXN1, FOXP3, IKZF1 (IKAROS), ITK, LCK, LYST, MTHFD1, NBN, ORAI1, PNP, PRF1, RFX5, RFXANK, RFXAP, RMRP, SH2D1A, SLC46A1, STAT5B, STIM1 , STX11, STXBP2, TAP1, TBX1, TTC7A, UNC13D, XIAP, ZAP70 *34*
G17004 **INMUNODEFICIENCIA SEVERA COMBINADA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ADA, AK2, CD247, CD3D, CD3E, CORO1A, DCLRE1C, IL2RG, IL7R, JAK3, LIG4, NHEJ1, PRKDC, PTPRC , RAG1, RAG2 *16*
IFIXO **INMUNOFIJACION, ORINA**	Electroforesis en Agarosa.	3	Rec. 10 mL Orina 24h. (alícuota) [Refr.] No usar conservante que contenga ácido bórico.	Se informa para cada paciente
IFIX **INMUNOFIJACION, SUERO**	Inmunoelectroforesis.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Se informa para cada paciente
523 **INMUNOFLUORESCENCIA DIRECTA (PANEL), BIOPSIA**	Inmunofluorescencia directa.	4	Rec. 1 Pieza/s Tejido	Se informa para cada paciente
IGAHE **INMUNOGLOBULINA A (IgA), HECES**	Enzimoinmunoanálisis	15	Rec. 5 g Heces (1 x Recipiente estéril) [Cong.]	510,00 - 2040,00 µg/mL
IACR **INMUNOGLOBULINA A (IgA), LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO**	Nefelometría.	1	Rec. 1 mL LCR [Refr.]	Inf 0,60 mg/dL
ACIGA **INMUNOGLOBULINA A (IGA) ANTICUERPOS, SUERO**	Electroforesis en Agarosa.	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	No se detecta

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
IGAO **INMUNOGLOBULINA A (IGA), ORINA**	Nefelometría - Turbidimetría.	1	Rec. 1 mL Orina 24h. (alícuota) [Refr.] Orina 24 horas Orina de micción	Inf 0,25 mg/dL
IGA **INMUNOGLOBULINA A (IgA), SUERO**	Turbidimetría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Ambos 0 - 1 Años 36,00 - 79,00 mg/dL Ambos 1 - 4 Años 27,00 - 246,00 mg/dL Ambos 4 - 10 Años 34,00 - 274,00 mg/dL Ambos 10 - 16 Años 52,00 - 319,00 mg/dL Ambos 16 - 18 Años 60,00 - 337,00 mg/dL Ambos Sup - 18 Años 61,00 - 356,00 mg/dL
IGASLA **INMUNOGLOBULINA A SECRETORA (IgA SECRETORA), LAGRIMA**	Nefelometría.	3	Rec. 0.5 mL Lágrima [Refr.]	2,50 - 25,00 mg/dL
IGASMN **INMUNOGLOBULINA A SECRETORA (IGA SECRETORA), MOCO NASAL**	Nefelometría - Turbidimetría.	3	Rec. 1 mL Moco nasal [Refr.]	3,00 - 30,00 mg/dL
IGAS **INMUNOGLOBULINA A SECRETORA (IgA SECRETORA), SALIVA**	Nefelometría.	3	Rec. 1 mL Saliva [Refr.] La muestra puede ser recogida en salivette o directamente en tubo. En bebés, se puede recoger la muestra de la boca mediante un sistema de aspiración (jeringa, pipeta pasteur) y traspasar a un tubo.	2,00 - 20,00 mg/dL
IDIGD **INMUNOGLOBULINA D (IGD) IDENTIFICACIÓN, SUERO**	Electroforesis en Agarosa.	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Se efectua Inmunofijación del suero del paciente con los Antisueros: Anti-IgE, Anti-Cadenas Kappa y Anti-cadenas Lambda. Se informa para cada paciente

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
IGD **INMUNOGLOBULINA D (IGD), SUERO**	Nefelometría.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	(Megalab) Imunoglobulina IgD: Inf 13,20 mg/dL Inf 100,00 UI/mL
@IGESP **INMUNOGLOBULINA E - IgE - ESPECIFICA, SUERO**	ImmunoCAP®	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Ver anexo Alergias Interpretación: Clases Phadia Negativo (Clase 0): Inf 0,35 KU/L Interpretación: Clases Phadia Positivo (Clase 1): 0,35 - 0,70 KU/L Interpretación: Clases Phadia Positivo (Clase 2): 0,71 - 3,50 KU/L Interpretación: Clases Phadia Positivo (Clase 3): 3,51 - 17,00 KU/L Interpretación: Clases Phadia Positivo (Clase 4): 17,10 - 50,00 KU/L Interpretación: Clases Phadia Positivo (Clase 5): 50,10 - 100,00 KU/L Interpretación: Clases Phadia Positivo (Clase 6): Sup 100,00 KU/L
IDIGE **INMUNOGLOBULINA E (IGE) IDENTIFICACIÓN, SUERO**	Electroforesis en Agarosa.	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Se efectua Inmunofijación del suero del paciente con los Antisueros: Anti-IgE, Anti-Cadenas Kappa y Anti-cadenas Lambda. Se informa para cada paciente
IGELL **INMUNOGLOBULINA E TOTAL (IGE), LÁGRIMA**	Nefelometría - Turbidimetría.	1	Rec. 1 Muestra/s Lágrima [Refr.]	UI/mL Interpretación según criterio clínico
IGEMN **INMUNOGLOBULINA E TOTAL (IGE), MOCO NASAL**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Lavado nasal [Refr.] Moco nasal, obtenido mediante lavado nasal. No sirve escobillon.	Inf 10,00 UI/mL
IGESAL **INMUNOGLOBULINA E TOTAL (IGE), SALIVA**	Nefelometría - Turbidimetría.	1	Rec. 1 mL Saliva [Refr.]	UI/mL Interpretación según criterio clínico

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
IGE **INMUNOGLOBULINA E TOTAL (IGE), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Ambos 0 - 1 Años Inf 15,00 U/mL Ambos 1 - 4 Años Inf 50,00 U/mL Ambos 4 - 10 Años Inf 90,00 U/mL Ambos 10 - 15 Años Inf 150,00 U/mL Ambos Sup - 15 Años Inf 160,00 U/mL
IGCR **INMUNOGLOBULINA G (IgG), LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO**	Nefelometría.	2	Rec. 1 mL LCR [Refr.]	Inf 3,40 mg/dL
IGGO **INMUNOGLOBULINA G (IGG), ORINA**	Nefelometría - Turbidimetría.	1	Rec. 1 mL Orina 24h. (alícuota) [Refr.]	* CALIBRACION CON STANDARD DE REFERENCIA IFCC/BCR/CAP-CRM 470 Inf 0,96 mg/dL
IGG **INMUNOGLOBULINA G (IgG), SUERO**	Turbidimetría.	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Ambos 0 - 1 Años 313,00 - 1170,00 mg/dL Ambos 1 - 4 Años 295,00 - 1156,00 mg/dL Ambos 4 - 10 Años 386,00 - 1682,00 mg/dL Ambos 10 - 16 Años 503,00 - 1719,00 mg/dL Ambos 16 - 18 Años 487,00 - 1327,00 mg/dL Ambos Sup - 18 Años 767,00 - 1590,00 mg/dL
IGG1 **INMUNOGLOBULINA G1 (IGG1), SUERO**	Turbidimetría.	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Ambos 0 - 2 Años 194,00 - 842,00 mg/dL Ambos 2 - 4 Años 315,00 - 945,00 mg/dL Ambos 4 - 6 Años 306,00 - 945,00 mg/dL Ambos 6 - 8 Años 288,00 - 918,00 mg/dL Ambos 8 - 10 Años 432,00 - 1020,00 mg/dL Ambos 10 - 12 Años 423,00 - 1060,00 mg/dL Ambos 12 - 14 Años 342,00 - 1150,00 mg/dL Ambos 14 - 18 Años 315,00 - 885,00 mg/dL Ambos Sup - 18 Años 382,40 - 928,60 mg/dL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
IGG2 **INMUNOGLOBULINA G2 (IGG2), SUERO**	Turbidimetría.	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Ambos 0 - 2 Años 22,50 - 300,00 mg/dL Ambos 2 - 4 Años 36,00 - 225,00 mg/dL Ambos 4 - 6 Años 60,50 - 345,00 mg/dL Ambos 6 - 8 Años 44,00 - 375,00 mg/dL Ambos 8 - 10 Años 72,00 - 430,00 mg/dL Ambos 10 - 12 Años 76,00 - 355,00 mg/dL Ambos 12 - 14 Años 100,00 - 455,00 mg/dL Ambos 14 - 18 Años 64,00 - 495,00 mg/dL Ambos Sup - 18 Años 241,80 - 700,30 mg/dL
IGG3 **INMUNOGLOBULINA G3 (IGG3), SUERO**	Turbidimetría.	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Ambos 0 - 2 Años 18,60 - 85,30 mg/dL Ambos 2 - 4 Años 17,30 - 67,60 mg/dL Ambos 4 - 6 Años 9,90 - 122,10 mg/dL Ambos 6 - 8 Años 15,50 - 85,30 mg/dL Ambos 8 - 10 Años 12,70 - 85,30 mg/dL Ambos 10 - 12 Años 17,30 - 173,00 mg/dL Ambos 12 - 14 Años 28,30 - 125,00 mg/dL Ambos 14 - 18 Años 23,00 - 196,00 mg/dL Ambos Sup - 18 Años 21,80 - 176,10 mg/dL
IGG4 **INMUNOGLOBULINA G4 (IGG4), SUERO**	Turbidimetría.	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Ambos 0 - 2 Años 0,50 - 78,4 mg/dL Ambos 2 - 4 Años 1,00 - 53,70 mg/dL Ambos 4 - 6 Años 1,80 - 112,50 mg/dL Ambos 6 - 8 Años 0,40 - 99,20 mg/dL Ambos 8 - 10 Años 1,90 - 93,20 mg/dL Ambos 10 - 12 Años 1,60 - 115,00 mg/dL Ambos 12 - 14 Años 3,70 - 136,00 mg/dL Ambos 14 - 18 Años 11,00 - 157,00 mg/dL Ambos Sup - 18 Años 3,92 - 86,40 mg/dL
IMCR **INMUNOGLOBULINA M (IgM), LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO**	Nefelometría.	1	Rec. 1 mL LCR [Refr.]	Inf 0,08 mg/dL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
IGMO **INMUNOGLOBULINA M (IGM), ORINA**	Nefelometría - Turbidimetría.	1	Rec. 1 mL Orina 24h. (alícuota) [Refr.] Orina 24 horas Orina de micción	Inf 0,25 mg/dL
IGM **INMUNOGLOBULINA M (IgM), SUERO**	Turbidimetría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Ambos 0 - 1 Años 46,00 - 152,00 mg/dL Ambos 1 - 4 Años 37,00 - 184,00 mg/dL Ambos 4 - 10 Años 37,00 - 251,00 mg/dL Ambos 10 - 16 Años 41,00 - 244,00 mg/dL Ambos 16 - 18 Años 49,00 - 201,00 mg/dL Ambos Sup - 18 Años 37,00 - 286,00 mg/dL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
CIGG **INMUNOGLOBULINAS G (IGG1,IGG2,IGG3,IGG4), SUERO**	Turbidimetría.	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	IgG 1: Ambos 0 - 2 Años 194,00 - 842,00 mg/dL IgG 1: Ambos 2 - 4 Años 315,00 - 945,00 mg/dL IgG 1: Ambos 4 - 6 Años 306,00 - 945,00 mg/dL IgG 1: Ambos 6 - 8 Años 288,00 - 918,00 mg/dL IgG 1: Ambos 8 - 10 Años 432,00 - 1020,00 mg/dL IgG 1: Ambos 10 - 12 Años 423,00 - 1060,00 mg/dL IgG 1: Ambos 12 - 14 Años 342,00 - 1150,00 mg/dL IgG 1: Ambos 14 - 18 Años 315,00 - 885,00 mg/dL IgG 1: Ambos Sup - 18 Años 382,40 - 928,60 mg/dL IgG 2 : Ambos 0 - 2 Años 22,50 - 300,00 mg/dL IgG 2 : Ambos 2 - 4 Años 36,00 - 225,00 mg/dL IgG 2 : Ambos 4 - 6 Años 60,50 - 345,00 mg/dL IgG 2 : Ambos 6 - 8 Años 44,00 - 375,00 mg/dL IgG 2 : Ambos 8 - 10 Años 72,00 - 430,00 mg/dL IgG 2 : Ambos 10 - 12 Años 76,00 - 355,00 mg/dL IgG 2 : Ambos 12 - 14 Años 100,00 - 455,00 mg/dL IgG 2 : Ambos 14 - 18 Años 64,00 - 495,00 mg/dL IgG 2 : Ambos Sup - 18 Años 241,80 - 700,30 mg/dL IgG 3 : Ambos 0 - 2 Años 18,60 - 85,30 mg/dL IgG 3 : Ambos 2 - 4 Años 17,30 - 67,60 mg/dL IgG 3 : Ambos 4 - 6 Años 9,90 - 122,10 mg/dL IgG 3 : Ambos 6 - 8 Años 15,50 - 85,30 mg/dL IgG 3 : Ambos 8 - 10 Años 12,70 - 85,30 mg/dL IgG 3 : Ambos 10 - 12 Años 17,30 - 173,00 mg/dL IgG 3 : Ambos 12 - 14 Años 28,30 - 125,00 mg/dL IgG 3 : Ambos 14 - 18 Años 23,00 - 196,00 mg/dL IgG 3 : Ambos Sup - 18 Años 21,80 - 176,10 mg/dL IgG 4 : Ambos 0 - 2 Años 0,50 - 78,4 mg/dL IgG 4 : Ambos 2 - 4 Años 1,00 - 53,70 mg/dL IgG 4 : Ambos 4 - 6 Años 1,80 - 112,50 mg/dL IgG 4 : Ambos 6 - 8 Años 0,40 - 99,20 mg/dL IgG 4 : Ambos 8 - 10 Años 1,90 - 93,20 mg/dL IgG 4 : Ambos 10 - 12 Años 1,60 - 115,00 mg/dL IgG 4 : Ambos 12 - 14 Años 3,70 - 136,00 mg/dL IgG 4 : Ambos 14 - 18 Años 11,00 - 157,00 mg/dL IgG 4 : Ambos Sup - 18 Años 3,92 - 86,40 mg/dL
IGLC **INMUNOGLOBULINAS G, A, M (LCR)**	Nefelometría - Turbidimetría.	1	Rec. 1 mL LCR [Refr.]	Inmunoglobulina IgA en LCR:: Inf 0,60 mg/dL Inmunoglobulina IgG en LCR: Inf 3,40 mg/dL Inmunoglobulina IgM en LCR: Inf 0,08 mg/dL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
INMA **INMUNOGLOBULINAS G, A, M, (IGG, IGA, IGM), SUERO**	Nefelometría - Turbidimetría.	1	Rec. 2 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	IgA: Ambos 0 - 1 Años 36,00 - 79,00 mg/dL IgA: Ambos 1 - 4 Años 27,00 - 246,00 mg/dL IgA: Ambos 4 - 10 Años 34,00 - 274,00 mg/dL IgA: Ambos 10 - 16 Años 52,00 - 319,00 mg/dL IgA: Ambos 16 - 18 Años 60,00 - 337,00 mg/dL IgA: Ambos Sup - 18 Años 61,00 - 356,00 mg/dL IgG: Ambos 0 - 1 Años 313,00 - 1170,00 mg/dL IgG: Ambos 1 - 4 Años 295,00 - 1156,00 mg/dL IgG: Ambos 4 - 10 Años 386,00 - 1682,00 mg/dL IgG: Ambos 10 - 16 Años 503,00 - 1719,00 mg/dL IgG: Ambos 16 - 18 Años 487,00 - 1327,00 mg/dL IgG: Ambos Sup - 18 Años 767,00 - 1590,00 mg/dL IgM: Ambos 0 - 1 Años 46,00 - 152,00 mg/dL IgM: Ambos 1 - 4 Años 37,00 - 184,00 mg/dL IgM: Ambos 4 - 10 Años 37,00 - 251,00 mg/dL IgM: Ambos 10 - 16 Años 41,00 - 244,00 mg/dL IgM: Ambos 16 - 18 Años 49,00 - 201,00 mg/dL IgM: Ambos Sup - 18 Años 37,00 - 286,00 mg/dL
IGOR **INMUNOGLOBULINAS G, A, M, (IGG, IGA, IGM), ORINA**	Nefelometría - Turbidimetría.	1	Rec. 10 mL Orina 24h. (alícuota) [Refr.]	Inmunoglobulina A en orina: Inf 0,25 mg/dL Inmunoglobulina G en orina: Inf 0,96 mg/dL Inmunoglobulina M en orina: Inf 0,25 mg/dL
ISAC **INMUNOGLOBULINAS IGE ESPECIFICOS- INMUNO SOLID PHASE CHIP - (ISAC) (PERFIL DE ALERGENOS DE AMPLIO ESPECTRO A NIVEL MOLECULAR), SUERO**	ImmunoCAP ISAC	20	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Muestra alternativa: plasma-EDTA.	Se informa para cada paciente
IHQATRX **INMUNOHISTOQUIMICA ATRX, TEJIDO**	Inmunohistoquímica.	4	Rec. 1 Muestra/s Tejido parafinado	
PDL1 **INMUNOHISTOQUÍMICA · PD-L1**	Inmunohistoquímica.	7	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
527 **INMUNOHISTOQUIMICA CON KIT HOMOLOGADO (FARMACODIAGNÓSTICO)**	Inmunohistoquímica.	6	Rec. 1 Pieza/s Tejido	Se informa para cada paciente
518 **INMUNOHISTOQUIMICA LINFOMAS, TUMORES INDIFERENCIADOS · PANEL**	Inmunohistoquímica.	6	Rec. 1 Pieza/s Tejido	Se informa para cada paciente
519 **INMUNOHISTOQUIMICA MARCADORES PRONÓSTICO TUMORES · PANEL**	Inmunohistoquímica.	6	Rec. 1 Pieza/s Tejido	Se informa para cada paciente
MMRMSI **INMUNOHISTOQUIMICA MMR/MSI, TEJIDO**	Inmunohistoquímica.	7	Rec. 1 mL Tejido parafinado	
520 **INMUNOHISTOQUIMICA RECEPTORES HORMONALES · PANEL**	Inmunohistoquímica.	6	Rec. 1 Pieza/s Tejido	Se informa para cada paciente
IHQSDHB **INMUNOHISTOQUIMICA SDHB, TEJIDO**	Inmunohistoquímica.	4	Rec. 1 Muestra/s Tejido parafinado (1 x Contenedor rígido de transporte de muestras)	
INR **INR (RATIO INTERNACIONAL NORMALIZADO T.PROTROMBINA), PLASMA**	Reacción de Quick	1	Rec. 1 mL Plasma Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) [Refr.]	El resultado de INR sólo debe utilizarse para la monitorización de pacientes en tratamiento con anticoagulantes orales (antivitamina K)
G03048 **INSENSIBILIDAD A LOS ANDRÓGENOS · AR · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AR *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G03049 **INSENSIBILIDAD A LOS ANDRÓGENOS CON/SIN CÁNCER DE MAMA · AR · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AR *1*
G03135 **INSUFICIENCIA SUPRARRENAL POR DEFICIENCIA DE CYP11A1 · CYP11A1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CYP11A1 *1*
INCU **INSULINA (75g - Basal, 60',120',180'), SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero 180 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 1 mL Suero 120 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 1 mL Suero 60 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación resultados: - Patrón de respuesta norma: Insulina basal, 120 y 180 min Inf60 mUI/l - Patrón de respuesta dudoso. Insulina 120 y/o 180 min entre 60-99 mUI/l. Se recomienda seguimiento y/o pruebas adicionales (HOMA) - Diagnóstico de Resistencia a insulina: Insulina 120 y/o 180 min Sup100 mUI/l Patrón diagnóstico basado en el modelo de Kraft, 1997
AINS **INSULINA ANTICUERPOS, SUERO**	Radioinmunoanálisis.	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 8,20 %
IN3 **INSULINA (3'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 3 m. [Refr.] En caso de que vayan a transcurrir más de 48 horas desde el momento de la extracción hasta su recepción en el laboratorio, se deberá enviar una alícuota de suero congelada a -20ºC.	mU/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
IN6 **INSULINA (6'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 6 m [Refr.]	mU/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
IN10 **INSULINA (10'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 10 m [Refr.]	mU/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
IN15 **INSULINA (15'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 15 m. [Refr.]	mU/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
IN-15 **INSULINA (-15'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero -15 m. [Refr.]	mU/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
IN20 **INSULINA (20'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 20 m. [Refr.]	mU/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
IN30 **INSULINA (30'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 30 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	mU/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
IN60 **INSULINA (60'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 60 m. [Refr.]	mU/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
IN90 **INSULINA (90'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 90 m. [Refr.]	mU/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
IN120 **INSULINA (120'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 120 m. [Refr.]	mU/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
IN150 **INSULINA (150'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 150 m. [Refr.]	mU/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
IN180 **INSULINA (180'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 180 m. [Refr.]	mU/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
IN210 **INSULINA (210'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 210 m. [Refr.]	mU/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
IN240 **INSULINA (240'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 240 m. [Refr.]	mU/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
IN270 **INSULINA (270'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 270 m. [Refr.]	mU/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
IN300 **INSULINA (300'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 300 m. [Refr.]	mU/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
IN360 **INSULINA (360'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 360 m. [Refr.]	mU/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ACRI **INSULINA ANTICUERPOS IgG ANTI-RECEPTOR, SUERO**	Radioinmunoanálisis.	15	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	Inf 58,40 ng/mL
INSLI **INSULINA LIBRE, SUERO**	Quimioluminiscencia.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Centrifugar, separar y congelar suero lo antes posible.	2,90 - 19,00 mU/L
INP **INSULINA POSTPRANDIAL, SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Centrifugar (<1h tras extracción), y conservar en frío después de la extracción, remitir tubo primario, no es necesario alicuotar. En caso de que vayan a transcurrir más de 48 horas desde el momento de la extracción hasta su recepción en el laboratorio, se deberá enviar una alícuota de suero congelada a -20ºC.	mU/L Interpretación según criterio clínico

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
INSU				
INSULINA, SUERO	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Ayuno mínimo de 6 h Centrifugar (<1h tras extracción), y conservar en frío después de la extracción, remitir tubo primario, no es necesario alicuotar. En caso de que vayan a transcurrir más de 48 horas desde el momento de la extracción hasta su recepción en el laboratorio, se deberá enviar una alícuota de suero congelada a -20ºC.	2,00 - 25,00 mU/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
QUANT **INTERFERON GAMMA (QUANTIFERON TB), PLASMA**	Quimioluminiscencia.	5	Rec. 1 mL Plasma (1 x Tubo TB ANTIGEN) [Refr.] Tubos para la muestra: Propios de la prueba. Contienen reactivos específicos. Enviar las muestras de lunes a viernes. Evitar festivos. 4 tubos (1mL de muestra en cada tubo): Quantiferon TB1: tapón verde Quantiferon TB2: tapón amarillo Quantiferon Nil: tapón gris Quantiferon Mitogen: tapón morado Extracción y preparación de la muestra: 1. Extraer la sangre e introduir exactamente 1mL en cada uno de los 4 tubos 2. Mezclar el contenido de los tubos invirtiéndolos con suavidad 10 veces 3. Marcar o etiquetar los tubos sin impedir la visibilidad de su contenido. 4. Incubar los tubos a 37ºC +/- 1h, durante 16-24h 5. Centrifugar a 2.000 - 3.000 g durante 15 min. 6. Enviar los tubos al laboratorio	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
			*Estabilidad Nacional: Una vez realizado el proceso de incubación, 3 días a Temperatura ambiente Internacional: No enviar tubos primarios, si no separar en alicuotas marcadas (hasta 28 días efrigerades/ periodos más largos a temperatura igual o inferior a -20 ºC.) En caso de no disponer del material necesario para la incubación, contactar con el laboratorio.	
IL1B **INTERLEUCINA 1 BETA (IL1 BETA), SUERO**	Quimioluminiscencia.	15	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Alt. 1 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Cong.] Muestra alternativa: plasma-EDTA.	Inf= 24,2 pg/mL
IL-10 **INTERLEUCINA 10 (IL10), SUERO**	Quimioluminiscencia.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Alt. 1 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Cong.] Separar y congelar antes de las 6 horas después de la extracción.	Inf= 5,90 pg/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
IL18 **INTERLEUCINA 18 (IL18), SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	22	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Centrifugar, separar y congelar suero lo antes posible.	Intervalo esperado en adultos sanos o sin inflamación significativa : Inf 300 pg/mL NOTA: Determinación realizada mediante un procedimiento EIA de tipo RUO. Los valores reportados tienen carácter orientativo.
IL2 **INTERLEUCINA 2 (IL2), SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	15	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	Inf 9,10 pg/mL
INT2 **INTERLEUCINA 2 RECEPTOR SOLUBLE (sIL-2R), SUERO**	Quimioluminiscencia.	15	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	158,00 - 623,00 U/mL
IL-4 **INTERLEUCINA 4 (IL4), SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	15	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	Inf 38,70 pg/mL
IL5S **INTERLEUCINA 5 (IL5), SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	17	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	Inf 4,00 pg/mL
INT6 **INTERLEUCINA 6 (IL6), SUERO**	Quimioluminiscencia.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	Inf 3,40 pg/mL
IL8 **INTERLEUCINA 8 (IL8), PLASMA**	Enzimoinmunoanálisis	15	Rec. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.]	Inf 50,00 pg/mL
GENIL28B **INTERLEUQUINA 28B, GENOTIPO · IL28B (rs12979860) · RT-PCR**	PCR-Real Time.	30	Rec. 3 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G05013 **INTESTINO CORTO CONGÉNITO, SÍNDROME DE · FLNA · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FLNA	*1*
INTOL **INTOLERANCE 2**	No se aplica.	15	Rec. 5 mL Sangre total EDTA [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Frotis bucal (1 x Kit específico)	Indicado en informe adjunto	
G03095 **INTOLERANCIA A LA LACTOSA · MCM6(c.-13910 C/T, c.-22018 G/A) · HOT SPOT**	Hot Spot	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	MCM6 [c.-13910 C/T, c.-22018 G/A]	*1*
ESTMMR **INVESTIGACIÓN STAPHYLOCOCCUS AUREUS (CEPA MARSA)**	Cultivo en medios generales, de enriquecimiento y/o específicos	3	Rec. 1 Muestra/s Frotis (1 x Escobillón con medio de transporte para anaerobios.) [Refr.]		
IONO **IONOGRAMA (NA / K / CL), SUERO**	Electrodo Selectivo de Iones.	1	Rec. 1 mL Suero [Refr.]	Cloruro: 99,00 - 109,00 mEq/L Potasio: 3,50 - 5,10 mEq/L Sodio: 136,00 - 146,00 mEq/L	
G17013 **IPEX (INMUNODESREGULACIÓN-POLIENDOCRINOPATÍA-ENTEROPATÍA LIGADA A X), SÍNDROME · FOXP3 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FOXP3	*1*
G04014 **IRIDA, SÍNDROME · TMPRSS6 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TMPRSS6	*1*
G04015 **IRIDA, SÍNDROME Y DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SLC11A2, STEAP3, TF, TMPRSS6	*4*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G04029 **IRIDA, SÍNDROME Y DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES AMPLIADO · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ACVR1, ATP7B, CP, SLC11A2, STEAP3, TF, TMPRSS6 7
G18016 **IRINOTECAN, RESPUESTA A · UGT1A1 · HOT SPOT**	Secuenciación Sanger	10	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	UGT1A1 [[A(TA)7TAA]]
TI **IRREGULARES ANTICUERPOS TITULACIÓN, SANGRE TOTAL**	Aglutinación	1	Rec. 10 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Título Se informa para cada paciente
ID **IRREGULARES IDENTIFICACIÓN ANTICUERPOS, SANGRE TOTAL**	Aglutinación de Partículas.	6	Rec. 1 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No se detecta

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ISAVU **ISAVUCONAZOL, SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	6	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.] La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis. El contenedor recomendado es el tubo seco (sin gel separador) para evitar procesos de adsorción del fármaco. En caso de no disponer de tubo seco, la extracción se puede realizar en tubo con gel separador, separando el suero dentro de las 2 horas posteriores a la recolección y transfiriéndolo a un tubo de alícuota para su transporte al laboratorio. Rechazo: Muestra hemolizada, lipémica y/o ictérica	Inf 10,00 mg/L Toxicidad: Sup 5,00 mg/L
ACI **ISLOTES LANGERHANS (CÉLULAS BETA) ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/4 Interpretación: Positivo: Sup= 1/4

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ITCO **ISOCIANATOS (METABOLITOS: HDA, 2,4-TDA, 2,6-TDA Y MDA), ORINA**	Cromatografía de Gases / Espectrometría Masas.	32	Rec. 10 mL Orina final jornada [Refr.]	2,4 – toluendiamina + 2,6 – toluendiamina: Índice Biológico de Exposición orientativo (BAT) según DFG : Final de la jornada laboral 5,00 µg/g creat HDA (1,6-hexametilen diamina): Índice Biológico de Exposición orientativo (BAT) según DFG : (HDI (1,6-hexametilen diisocianato)) 15,00 µg/g creat MDA (4,4-metilen dianilina): VLB: Final de la jornada laboral (MDI (4,4-metilen difenilisocianato)) 10,00 ug/L
PIAA **ISOENZIMAS AMILASA, SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Amilasa: 28,00 - 100,00 U/L Amilasa pancreática: 8,00 - 53,00 U/L Amilasa salivar: 14,00 - 65,00 U/L
ICPK **ISOENZIMAS CREATINAFOSFOQUINASA (CK), SUERO**	Electroforesis en Agarosa.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rechazo: Plasma con anticoagulante (heparina, EDTA, citrato, fluoruro, iodoacetato).	Creatina Quinasa BB (CK-BB): 0,00 % Creatina Quinasa MB (CK-MB): Inf 3,00 % Creatina Quinasa MM (CK-MM): Sup 97,00 % Creatina Quinasa (CK): Hombres Inf 171,00 U/L Creatina Quinasa (CK): Mujeres Inf 145,00 U/L
ILDH **ISOENZIMAS LÁCTICO DESHIDROGENASA (LDH), SUERO**	Electroforesis en Agarosa.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.)	Lactato deshidrogenasa (LDH): 230,00 - 416,00 U/L LDH 1: 16,10 - 31,50 % LDH 2: 29,20 - 41,60 % LDH 3: 17,00 - 26,20 % LDH 4: 5,90 - 12,30 % LDH 5: 3,20 - 17,30 %

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ISOH **ISOHEMAGLUTININAS, SANGRE TOTAL**	Hemaglutinación.	7	Rec. 10 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo 10 mL.) [Refr.] Alt. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Isohemaglutininas anti A IgG: Interpretación según criterio clínico Isohemaglutininas anti A IgM: Interpretación según criterio clínico Isohemaglutininas anti B IgG: Interpretación según criterio clínico Isohemaglutininas anti B IgM: Interpretación según criterio clínico
ISOPORS **ISÓMEROS DE PORFIRINAS, SANGRE**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	7	Rec. 5 mL Sangre total EDTA [Refr.] Rec. 2 mL Plasma EDTA (1 x Tubo protegido de la luz) [Cong.] Se precisan ambas muestras. Proteger de la luz. Para envíos transoceánicos o nacionales que superen las 48 horas desde la extracción: Extracción 1 tubo de Sangre Total EDTA 5 mL. Centrifugar y enviar en diferentes alícuotas el plasma y la fracción celular (realizar la separación con cuidado para evitar la hemólisis y que se mezclen los elementos celulares) Previo al envío de la muestra es necesario informar del valor de hematocrito para realizar el cálculo. Las muestras deben llegar al laboratorio de lunes a jueves.	Indicado en informe adjunto

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ISON				
ISONIAZIDA, SUERO	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	8	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Condiciones de centrifugación: Tª 20+/-5ºC, 10 minutos a 1200g Congelar inmediatamente en menos de 1 hora. Extracción a las 3 horas posteriores a la toma de la medicación.	3,00 - 6,00 µg/mL A las 5-6 horas después de administración oral Dosis (mg/Kg) Acetilador lento Acetilador rápido 4 2,6 - 3,0 Inf 1,2 10 Sup 3,0 Inf 2,0 15 7,8 - 12,0 2,5 - 4,9 Toxicidad: Sup 20,00 µg/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ITRA **ITRACONAZOL, SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	6	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.] La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis. El contenedor recomendado es el tubo seco (sin gel separador) para evitar procesos de adsorción del fármaco. En caso de no disponer de tubo seco, la extracción se puede realizar en tubo con gel separador, separando el suero dentro de las 2 horas posteriores a la recolección y transfiriéndolo a un tubo de alícuota para su transporte al laboratorio. Rechazo: Muestra hemolizada, lipémica y/o ictérica	0,40 - 2,00 mg/L Toxicidad: Sup 17,00 mg/L
G08100 **JACKSON-WEISS, SÍNDROME DE · FGFR1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FGFR1 *1*
G01037 **JERVELL Y LANGE-NIELSEN, SÍNDROME DE · KCNE1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	KCNE1 *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G01038 **JERVELL Y LANGE-NIELSEN, SÍNDROME DE · KCNQ1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	KCNQ1	*1*
JO **JO1 ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunoanálisis con detección fluorescente	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 7,00 U/mL Interpretación: Indeterminado: 7,00 - 10,00 U/mL Interpretación: Positivo: Sup 10,00 U/mL	
G7474 **JOUBERT 7, SÍNDROME DE · RPGRIP1L · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	RPGRIP1L	*1*
G11212 **JOUBERT TIPO 8, SÍNDROME DE · ARL13B · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ARL13B	*1*
G11164 **JOUBERT, SÍNDROME · CEP290 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CEP290	*1*
G11163 **JOUBERT, SÍNDROME · NPHP1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	NPHP1	*1*
G11196 **JOUBERT, SÍNDROME DE · NPHP1 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	NPHP1	*1*
G11145 **JOUBERT, SÍNDROME DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AHI1, ARL13B, B9D1, C5orf42, CC2D2A, CEP290, CEP41, CSPP1, INPP5E, KIF7, MKS1, NPHP1, OFD1, RPGRIP1L, TCTN1, TCTN2, TCTN3, TMEM138, TMEM216, TMEM231, TMEM237, TMEM67, TTC21B, ZNF423	*24*
G03193 **KABUKI 2, SÍNDROME DE · KDM6A · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Indicado en informe adjunto KDM6A	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G03157 **KABUKI, SÍNDROME DE · KMT2D · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	KMT2D	*1*
G03085 **KABUKI, SÍNDROME DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	KDM6A, KMT2D	*2*
G03050 **KALLMAN TIPO 1 (HIPOGONADISMO HIPOGONADOTROPO 1 CON/SIN ANOSMIA), SÍNDROME DE · KAL1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	KAL1	*1*
G07014 **KEARNS-SAYRE, SÍNDROME DE · ADNmt · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mtDNA	*1*
G11205 **KENNEDY/AMIOATROFIA BULBOESPINAL (BSMA), ENFERMEDAD DE · AR (expansión CAG) · A. FRAGMENTOS**	Análisis de Fragmentos	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AR [expansión CAG]	*1*
KETP **KETAMINA CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), CABELLO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	10	Rec. 1 g Cabello (1 x Kit específico)	Confirmación de Ketamina en cabello : Valor de corte recomendado: 242,00 pg/mg	
COKETOR **KETAMINA CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), ORINA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 10 mL Orina [Refr.]	Se utiliza como criterio de Positividad que la concentración sea superior o igual al valor del límite de cuantificación más el valor de incertidumbre del ensayo. En caso contrario, el resultado es Negativo. Incertidumbre de medida 5,1 ng/mL Límite de cuantificación 25 ng/mL	
COKETSA **KETAMINA CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SALIVA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 1 Muestra/s Saliva (1 x Quantisal Oral Fluid)	Incertidumbre de medida 2,6 ng/mL Límite de cuantificación 10 ng/mL	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
COKETST **KETAMINA CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SANGRE**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 10 mL Sangre total Oxalato/Fluoruro (libre trazas metales) (1 x Tubo Sangre Total-Oxalato/Fluoruro) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total Heparina litio (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Tubo oxalato potásico/Fluoruro sódico Ref. SAP 600088318	Incertidumbre de medida 1,9 ng/mL Límite de cuantificación 10 ng/mL
KETSU **KETAZOLAM, SUERO**	Cromatografía Líquida Alta Resolución / Espectrometria.	7	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	20,00 - 200,00 µg/L
G11072 **KING-DENBOROUGH, SÍNDROME DE · RYR1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	RYR1 *1*
RNKK **KINGELLA KINGAE (GEN RTX) DNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	PCR-Real Time.	9	Alt. 1 Muestra/s Exudado faringeo [Refr.] Alt. 1 mL Líquido sinovial [Refr.] Alt. 1 mL Líquido pleural [Refr.]	No se detecta
DNKG **KLEBSIELLA GRANULOMATIS (DONOVANOSIS) DNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	Reacción en cadena de la polimerasa.	7	Rec. 300 uL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 100 uL LCR (1 x Tubo Polipropileno) [Refr.] Rec. 100 uL Humor vitreo/acuoso (1 x Tubo estéril) [Refr.]	: No se detecta

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
DNKP **KLEBSIELLA PNEUMONIAE DNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	Reacción en cadena de la polimerasa.	4	Rec. 1 mL Líquido biológico [Refr.]		
DNKR **KLEBSIELLA RHINOSCLEROMATIS DNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	Reacción en cadena de la polimerasa.	3	Rec. 1 Muestra/s Exudado nasal [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Exudado garganta [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Exudado faringeo [Refr.]	Klebsiella rhinoscleromatis DNA (resultado):	No se detecta
TKB **KLEIHAUER-BETKE TEST, SANGRE TOTAL**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	3	Rec. 3 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Evitar remitir la muestra en fines de semana y vísperas de festivos. Indicar si se trata de un recién nacido.	Inf 1,00 %	
FKPA **KPA KPB FENOTIPO, SANGRE TOTAL**	Hemaglutinación.	3	Rec. 10 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo 10 mL.)		
G03137 **KRABBE, ENFERMEDAD DE · GALC · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GALC	*1*
G03162 **KRABBE, ENFERMEDAD DE · GALC · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GALC	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
LACO **LACOSAMIDA, SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Cong.] La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis. No utilizar tubos con gel separador.	I.Terapéutico: 1,00 - 10,00 mg/L Toxicidad: Sup 20,00 mg/L Límite de cuantificación: 0,50 mg/L
LDHL **LACTATO DESHIDROGENASA (LDH) TOTAL, LÍQUIDO BIOLÓGICO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Líquido biológico [Refr.] Rec. 1 mL LCR [Refr.]	U/L Interpretación según criterio clínico
LDHLS **LACTATO DESHIDROGENASA (LDH) TOTAL, LÍQUIDO SINOVIAL**	Espectrometría.	1	Rec. 5 mL Líquido sinovial [Refr.]	U/L Interpretación según criterio clínico
LDH **LACTATO DESHIDROGENASA (LDH) TOTAL, SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.)	230,00 - 416,00 U/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
LACG **LACTEST - PRUEBA DE GAXILOSA, ORINA**	Espectrometría.	7	Rec. 1 mL Orina 5 h [Refr.] RECOGIDA DE MUESTRA Recomendamos defecar previamente para evitar la contaminación de la orina. Ayuno mínimo de 10 horas 1.¬Antes de iniciar el test, deberá vaciar su vejiga, desestimando dicha orina. 2.¬Tome el LacTEST disuelto en un vaso de agua y registre la hora. (Gaxilosa suministrado en farmácias con receta médica). 3.¬A partir de este momento y durante las 5 horas siguientes a la toma del LacTEST, recoja la orina en un bote de orina con medidor de volumen, evitando perder parte de ella o que se contamine con heces u otros fluidos. Al cumplirse las 5 horas intente orinar por última vez en el bote. 4.¬Mantenga la orina refrigerada en la nevera (sin congelar) hasta el momento de llevarla al laboratorio. 5.¬Enviar la muestra al laboratorio, lo antes posible y siempre antes de las 24 horas después de la última	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
			recogida. Indicar el volumen de la orina. No podrá ingerir alimentos durante las 5 horas de recogida de orina. Beba uno o dos vasos de agua (máximo 500 ml) durante el periodo que dura la recogida de orina.	
LFHE **LACTOFERRINA , HECES**	Inmunocromatografía.	6	Rec. 2 g Heces [Refr.]	Negativo
HPL **LACTOGENO PLACENTARIO, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Se requiere la semana de gestación.	Gestación Mujeres 10 - 12 Semanas 0,05 - 1,00 µg/mL Gestación Mujeres 12 - 14 Semanas 0,10 - 1,70 µg/mL Gestación Mujeres 14 - 16 Semanas 0,30 - 2,80 µg/mL Gestación Mujeres 16 - 18 Semanas 0,50 - 3,50 µg/mL Gestación Mujeres 18 - 20 Semanas 0,90 - 4,00 µg/mL Gestación Mujeres 20 - 22 Semanas 1,10 - 5,00 µg/mL Gestación Mujeres 22 - 24 Semanas 1,30 - 5,80 µg/mL Gestación Mujeres 24 - 26 Semanas 1,60 - 6,70 µg/mL Gestación Mujeres 26 - 28 Semanas 2,00 - 7,70 µg/mL Gestación Mujeres 28 - 30 Semanas 2,70 - 8,50 µg/mL Gestación Mujeres 30 - 32 Semanas 3,20 - 9,50 µg/mL Gestación Mujeres 32 - 34 Semanas 3,70 - 10,10 µg/mL Gestación Mujeres 34 - 36 Semanas 4,00 - 10,70 µg/mL Gestación Mujeres 36 - 38 Semanas 4,30 - 11,20 µg/mL Gestación Mujeres 38 - 40 Semanas 4,40 - 11,70 µg/mL Gestación Mujeres 40 - 42 Semanas 4,30 - 11,60 µg/mL Gestación Mujeres 32 - 34 Años 3,70 - 10,10 µg/mL
G03069 **LACTOSA, DEFICIENCIA CONGÉNITA DE · LCT · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	LCT *1*
G12048 **LADD, SÍNDROME DE · FGFR2 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FGFR2 *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G08068 **LADD, SÍNDROME DE · FGFR3 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FGFR3	*1*
LAMO **LAMOTRIGINA, SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Cong.] -Dosis administrada, frecuencia y vía de administración La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis. No utilizar tubos con gel separador.	1,00 - 15,00 mg/L Conc.Tóxica: Sup 20,00 mg/L Límite de cuantificación: 1,00 mg/L	
G08069 **LARGER-GIEDION, SÍNDROME DE · PANEL · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	EXT1 [MLPA] , EXT1-TRPS1 [MLPA] , TRPS1 [MLPA]	*3*
G03128 **LARON, SÍNDROME DE · GHR · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GHR	
G7401 **LARSEN Y OTROS SÍNDROMES RELACIONADOS · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	B3GALT6, B3GAT3, CANT1, CHST3, CSGALNACT1, FLNB, GZF1, IMPAD1, KIF22, XYLT1	*10*
G08101 **LARSEN, SÍNDROME DE · FLNB · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FLNB	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
LDLD **LDL- COLESTEROL, SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Ayuno mínimo de 6 h	Riesgo Cardiovascular medio: Inf 100,00 mg/dL Riesgo Cardiovascular bajo: Inf 116,00 mg/dL Prevención secundaria y Riesgo cardiovascular muy alto: Inf 55,00 mg/dL Riesgo Cardiovascular alto: Inf 70,00 mg/dL
LEFLU **LEFLUNOMIDA, SUERO**	Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectrometría de masas.	9	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	I.Terapéutico: Dosis 10 mg 8,40 - 27,60 mg/L I.Terapéutico: Dosis 25 mg 27,00 - 99,00 mg/L I.Terapéutico: Dosis 5 mg 5,90 - 11,70 mg/L
G08070 **LEGG-CALVE-PERTHES, ENFERMEDAD DE · COL2A1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	COL2A1 *1*
AGLEG **LEGIONELLA PNEUMOPHILA ANTIGENO, ORINA**	Inmunocromatografía.	3	Rec. 10 mL Orina [Refr.] UTILIZAR FRASCO ESTÉRIL	Negativo
LEGA **LEGIONELLA PNEUMOPHILA ANTICUERPOS IGA, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] No es necesario estar en ayunas.	Interpretación: Negativo: Inf 1/12
LEGG **LEGIONELLA PNEUMOPHILA ANTICUERPOS IGG, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	4	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] No es necesario estar en ayunas.	Negativo: Inf 16,00 UR/mL Indeterminado: 16,00 - 21,90 UR/mL Positivo: Sup= 22,00 UR/mL
LEGM **LEGIONELLA PNEUMOPHILA ANTICUERPOS IGM, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 0,80 Índice Indeterminado: 0,80 - 1,09 Índice Positivo: Sup= 1,10 Índice

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
DNLP **LEGIONELLA PNEUMOPHILA DNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	PCR-Real Time.	8	Rec. 2 mL Líquido biológico (1 x Tubo estéril) [Cong.] Alt. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 2 mL Líquido sinovial (1 x Tubo estéril) [Cong.] Alt. 2 mL Lavado traqueal (1 x Tubo estéril) [Cong.] Alt. 2 mL BAL (1 x Contenedor estéril) [Cong.] Alt. 10 mL Orina (1 x Contenedor estéril) [Cong.] Alt. 1 Muestra/s Biopsia (1 x Contenedor con solución salina) [Refr.] No es necesario estar en ayunas.	DNA de Legionella pneumophila (resultado): No se detecta
CULLP **LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CULTIVO**	Cultivo en medios selectivos y diferenciales	11	Rec. 1 mL Esputo [Refr.]	
G02059 **LEGIUS, SÍNDROME DE · SPRED1 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SPRED1 *1*
G01141 **LEGIUS, SÍNDROME DE · SPRED1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SPRED1 *1*
G07009 **LEIGH, ENFERMEDAD DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BCS1L, COX10, COX15, FOXRED1, NDUFA10, NDUFA12, NDUFA2, NDUFA9, NDUFAF2, NDUFAF6, NDUFS3, NDUFS4, NDUFS7, NDUFS8, SDHA, SURF1 *16*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G3014 **LEIGH, SÍNDROME DE · mt-ATP6 (T8993G) · HOT SPOT**	Hot Spot	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ATP6 [T8993G] *1*
LEINFG **LEISHMANIA INFANTUM IgG ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 1/40
LEINFM **LEISHMANIA INFANTUM IgM ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 1/12
DNLE **LEISHMANIA SPP DNA DETECCIÓN, MUESTRA BIOLÓGICA**	PCR-Real Time.	3	Rec. 1 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Rec. 1 mL Médula ósea EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Alt. 1 Muestra/s Biopsia de piel (1 x Recipiente estéril) (Suero fisiológico)[Refr.]	DNA de Leishmania (resultado): No se detecta

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
IDLEIMB **LEISHMANIA SPP DNA IDENTIFICACIÓN, MUESTRA BIOLÓGICA**	Técnica de secuenciación	4	La muestra de elección depende de la presentación clínica: -Leishmaniosis cutánea: Raspado con torunda de exudado de lesiones, biopsia de borde o biospsia de fondo de lesión. -Leishmaniosis visceral: punción de médula ósea, esplénica, ganglionar o hepática según decisión clínica. -Leismaniosis cutáneo-.mucosa: punción o biopsia de lesiones.	Se informa para cada paciente
G01119 **LEOPARD 3, SÍNDROME DE · BRAF · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BRAF *1*
G01120 **LEOPARD, SÍNDROME DE · PTPN11 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PTPN11 *1*
LEP **LEPTINA, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	7	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 1 mL Plasma Heparina litio (1 x Tubo sangre heparina litio) [Refr.] Indicar peso, talla,edad y sexo.	Los valores aumentan en función de la masa corporal. Se recomienda realizar determinaciones periódicas, ya que no es valorable una determinación aislada. IMC (Sin determinar) Ambos 0 - 10 Años Inf 7,0 ng/mL IMC (Sup. a 30) Ambos Sup - 11 Años Inf 32,00 ng/mL IMC (18,5 - 24,9) Ambos Sup - 11 Años Inf 8,30 ng/mL IMC (25 - 30) Ambos Sup - 11 Años Inf 19,30 ng/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
LEPTOT **LEPTOSPIRA ANTICUERPOS TOTALES, SUERO**	Inmunocromatografía en fase sólida	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo
LEPTG **LEPTOSPIRA SPP ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 1 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.]	Negativo: Inf 9,00 NTU Indeterminado: 9,00 - 11,00 NTU Positivo: Sup 11,00 NTU
LEPT **LEPTOSPIRA SPP ANTICUERPOS IgM, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 1 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.]	Negativo: Inf 9,00 NTU Indeterminado: 9,00 - 11,00 NTU Positivo: Sup 11,00 NTU
DLEP **LEPTOSPIRA SPP DNA DETECCIÓN, MUESTRA BIOLÓGICA**	PCR-Real Time.	5	Rec. 2 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 2 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 10 mL Orina (1 x Contenedor estéril) [Refr.] Rec. 1 mL LCR (1 x Tubo estéril) [Refr.]	Se detecta L.australis, L.autunnais, L.canicola, L.grippothyphosa, L.icterohemorrhagiae, L.interrogans y L.sejroe. DNA de Leptospira spp (resultado): No se detecta

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
DNLEPI **LEPTOSPIRA SPP DNA IDENTIFICACIÓN, MUESTRA BIOLÓGICA**	Secuenciación Sanger	5	Rec. 2 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 2 mL Sangre total (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 10 mL Orina (1 x Contenedor estéril) [Refr.] Rec. 1 mL LCR (1 x Tubo estéril) [Refr.]		
G11220 **LESCH-NYHAN, SÍNDROME DE · HPRT1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	HPRT1	*1*
G13135 **LEUCEMIA AGUDA MIELOIDE · CEBPA · SANGER**	Secuenciación Sanger	10	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 1 mL ADN extraido (1 x Microtubos DNAse, RNAse Free) [Refr.]	CEBPA	*1*
G13058 **LEUCEMIA AGUDA MIELOIDE · DNMT3A (R882) · HOT SPOT**	Hot Spot	7	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	DNMT3A [R882]	*1*
G13136 **LEUCEMIA AGUDA MIELOIDE · NPM1 · A.FRAGMENTOS**	Análisis de Fragmentos	7	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	NPM1	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G13062 **LEUCEMIA LINFÁTICA CRÓNICA (HIPERMUTACIONES SOMATICAS) · IGH · SANGER + A. FRAGMENTOS**	Secuenciación Sanger	15	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA (2 tubos)) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea EDTA (1 x Tubo sangre EDTA (2 tubos)) [Refr.] Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	IGH *1*
G13027 **LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA (LLA) · PANEL · FISH**	Panel FISH	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	BCR/ABL1 [t(9;22)(q34.1;q11.2)] , C-MYC [8q24] , ETV6(TEL)/RUNX1(AML1) [t(12;21)(p13.2;q22.1)] , IGH [14q32] , MLL [11q23] , TCF3(E2A)/PBX1 [t(1;19)(q23;p13.3)] *6*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G13028 **LEUCEMIA LINFOIDE CRÓNICA (LLC) · PANEL · FISH**	Panel FISH	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	ATM [11q22] , DLEU1 [13q14] , GLI [12q13] , TP53 [17p13]	*4*
G13147 **LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA AL DIAGNÓSTICO · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	15	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ASXL1, CEBPA, CKIT, FLT3, IDH1, IDH2, NPM1, RUNX1, TP53	*9*
G13029 **LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA (LMA) · PANEL · FISH**	Panel FISH	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	Se informa para cada paciente CBFB [16q21-22] , CUL1 [7q36] , EGR1 [5q31] , KMT2E [7q22] , MLL [11q23] , PML/RAR [t(15;17)(q24;q21)] , PTPRT [20q12] , RSP14 [5q33] , RUNX1(AML1)/RUNX1T1(ETO) [t(8;21)(q21;q22.1)]	*9*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G13137 **LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA · FLT3/ITD · A.FRAGMENTOS**	Análisis de Fragmentos	7	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 1 mL ADN extraido (1 x Microtubos DNAse, RNAse Free) [Refr.] ADN extraído: concentración 50 ng/µL	FLT3/ITD *1*
G13030 **LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA (LMC) · PANEL · FISH**	Panel FISH	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	BCR/ABL1 [t(9;22)(q34.1;q11.2)] *1*
G13067 **LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA, RESISTENCIA INHIBIDORES KINASA · BCR-ABL1 (T315I) · HOT SPOT**	Hot Spot	7	Rec. 9 mL Sangre total (2 x Tubo PAXGENE) Rec. 9 mL Médula ósea (2 x Tubo PAXGENE) Alt. 9 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 9 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BCR/ABL1 [T315I] *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G13138 **LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA, RESISTENCIA INHIBIDORES KINASA · BCR-ABL1 · HOT SPOT**	Hot Spot	10	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BCR-ABL *1*
LAP **LEUCINAMINOPEPTIDASA (LAP), SUERO**	Espectrometría.	17	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	20,00 - 55,00 U/L
LEUHE2 **LEUCOCITOS (2ª MUESTRA), HECES**	Observación microscópica / Examen directo.	1		
LEUHE3 **LEUCOCITOS (3ª MUESTRA), HECES**	Observación microscópica / Examen directo.	1		
LEUH **LEUCOCITOS, HECES**	Observación microscópica / Examen directo.	1	Rec. 5 g Heces [Refr.]	No se observan
G11295 **LEUCODISTROFIA DEL ADULTO TEMPRANO AD · LMNB1 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	
G11073 **LEUCODISTROFIA DEL ADULTO TEMPRANO AD · LMNB1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	LMNB1 *1*
G11165 **LEUCODISTROFIA METACROMÁTICA · ARSA · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ARSA *1*
G11075 **LEUCODISTROFIA Y SÍNDROMES LEUCODISTRÓFICOS (COMPLEMENTO) · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ADAR, RNASEH2A, RNASEH2B, RNASEH2C, SAMHD1 *5*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G11074 **LEUCODISTROFIA Y SÍNDROMES LEUCODISTRÓFICOS · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AARS2, ABCD1, AIMP1, ALDH3A2, ARSA, ASPA, CLCN2, COL4A1, COX15, CSF1R, CYP27A1, DARS2, EARS2, EIF2B1, EIF2B2, EIF2B3, EIF2B4, EIF2B5, FAM126A, FOLR1 , FOXRED1, GALC, GFAP, GJC2, HEPACAM, HSPD1, L2HGDH, LMNB1, MARS2, MLC1, NDUFAF5, NOTCH3, PLP1, POLR3A, POLR3B, PSAP, RNASET2, SCP2, SDHA, SDHAF1, SLC16A2, SOX10, SUMF1, TREM2, TREX1, TUBB4A, TYROBP *47*
G11146 **LEUCOENCEFALOPATÍA · EIF2B5 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	EIF2B5 *1*
LEVE **LEVETIRACETAM (KEPPRA), SUERO**	Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectrometría de masas de triple cuadrupolo	5	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Cong.] La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis. No utilizar tubos con gel separador.	I.Terapéutico: 10,00 - 40,00 mg/L Toxicidad: Sup 50,00 mg/L Límite de cuantificación: 3,00 mg/L
LEVOF **LEVOFLOXACINA, SUERO**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	9	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	Las concentraciones plasmáticas máximas deben ser de 8 a 12 veces superiores a la CMI de los gérmenes tratados, lo que corresponde a una concentración de 16 a 20 mg/L para los gérmenes menos sensibles. Debe ajustarse en función de la CMI del germen tratado. mg/L Interpretación según criterio clínico
COLEVOR **LEVOMEPROMACINA CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), ORINA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	3	Rec. 10 mL Orina [Refr.]	Se utiliza como criterio de Positividad que la concentración sea superior o igual al valor del límite de cuantificación más el valor de incertidumbre del ensayo. En caso contrario, el resultado es Negativo. Incertidumbre de medida 5 ng/mL Límite de cuantificación 25 ng/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
COLEVSAI **LEVOMEPROMACINA CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SALIVA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 1 mL Saliva [Refr.]	Incertidumbre de medida 1,8 ng/mL Límite de cuantificación 5 ng/mL
COLEVSTI **LEVOMEPROMACINA CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SANGRE**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 10 mL Sangre total Oxalato/Fluoruro (1 x Tubo Sangre Total-Oxalato/Fluoruro) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total Heparina litio (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Tubo oxalato potásico/Fluoruro sódico Ref. SAP 600088318	Incertidumbre de medida 1,8 ng/mL Límite de cuantificación 5 ng/mL
LVMP **LEVOMEPROMAZINA, SUERO**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	10	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	I.Terapéutico: 30,00 - 160,00 µg/L Conc.Tóxica: Sup 500,00 µg/L
LGI1IFL **LGI1 NEURONALES ANTICUERPOS (IFI), LCR**	Inmunofluorescencia Indirecta en células transfectadas	6	Rec. 1 mL LCR [Refr.]	Negativo
LGI1IFS **LGI1 NEURONALES ANTICUERPOS (IFI), SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta en células transfectadas	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo Tejido: Células Transfectadas
COLF **LH / FSH COCIENTE, SUERO**	Cálculo.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Cociente LH / FSH: Interpretación según criterio clínico

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
LICO **LICOPENO**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	10	Rec. 2 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Separar y congelar inmediatamente. Proteger de la luz.	10,00 - 280,00 µg/L
G03142 **LIDDLE, SÍNDROME DE · SCNN1B, SCNN1G · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SCNN1B, SCNN1G *2*
LIDO **LIDOCAINA [XILOCAÍNA CLORHIDRATO], SUERO**	Inmunofluorescencia de polarización.	11	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	- Las concentraciones terapéuticas en el tratamiento de la arritmia cardiaca están a menos de 5 mg/L. - Las concentraciones terapéuticas en el caso de la anestesia local son menos de 1 mg/L. - Las concentraciones terapéuticas en el tratamiento de convulsiones neonatales están en la zona de 3 -6 mg/L. I.Terapéutico: 1,50 - 5,00 mg/L
G14035 **LI-FRAUMENI, SÍNDROME DE · TP53 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TP53 *1*
G14036 **LI-FRAUMENI, SÍNDROME DE · TP53 · SANGER**	Secuenciación Sanger	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TP53 *1*
G14037 **LI-FRAUMENI, SÍNDROME DE · TP53 · SANGER+MLPA**	Secuenciación Sanger + MLPA	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TP53 [MLPA] *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
MATLIJEA **LINAJE VÍA MATERNO JUDICIAL (ADN mitocondrial 1 INDIVIDUO ADICIONAL)**	PCR-Análisis de fragmentos.	21	Rec. 2 Muestra/s Frotis bucal (1 x Kit específico) Contactar con el laboratorio antes de solicitar el estudio. Kit especial con cadena de custodia + hoja de solicitud de paternidad judicial 2 hisopos bucales (sin medio) por paciente	Indicado en informe adjunto
MATLINJE **LINAJE VÍA MATERNO JUDICIAL (ADN mitocondrial 2 INDIVIDUOS)**	PCR-Análisis de fragmentos.	21	Rec. 2 Muestra/s Frotis bucal (1 x Kit específico) Contactar con el laboratorio antes de solicitar el estudio. Kit especial con cadena de custodia + hoja de solicitud de paternidad judicial 2 hisopos bucales (sin medio) por paciente	Indicado en informe adjunto
PATLINJE **LINAJE VÍA PATERNA JUDICIAL (CROMOSOMA Y, 2 INDIVIDUOS)**	PCR-Análisis de fragmentos.	12	Rec. 2 Muestra/s Frotis bucal (1 x Kit específico) Contactar con el laboratorio antes de solicitar el estudio. Kit especial con cadena de custodia + hoja de solicitud de paternidad judicial 2 hisopos bucales (sin medio) por paciente	Indicado en informe adjunto

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
PATLIJEA **LINAJE VÍA PATERNA JUDICIAL (CROMOSOMA Y 1 INDIVIDUO ADICIONAL)**	PCR-Análisis de fragmentos.	12	Rec. 2 Muestra/s Frotis bucal (1 x Kit específico) Contactar con el laboratorio antes de solicitar el estudio. Kit especial con cadena de custodia + hoja de solicitud de paternidad judicial 2 hisopos bucales (sin medio) por paciente	Indicado en informe adjunto
LINDSU **LINDANO (GAMMA HEXACLOROCICLOHEXANO), SUERO**	Cromatografía de Gases / Espectrometría Masas.	24	Rec. 3 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Índice Biológico de Exposición orientativo (BAT) según DFG : Final de la jornada laboral Inf 25,00 µg/L
G17006 **LINFOCITO DESNUDO TIPO I, SÍNDROME DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CIITA, RFX5, RFXANK, RFXAP *4*
G17007 **LINFOCITO DESNUDO TIPO II, SÍNDROME DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TAP1, TAP2, TAPBP *3*
G17008 **LINFOCITO DESNUDO, SÍNDROME DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CIITA, RFX5, RFXANK, RFXAP, TAP1, TAP2, TAPBP *7*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
QLYB **LINFOCITOS · SUBPOBLACIONES T (CD3) y B (CD19), SANGRE TOTAL**	Citometría de flujo.	2	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) Evitar remitir la muestra en fines de semana y vísperas de festivos.	Linfocitos CD19 (linfocitos B): 4,70 - 19,13 % Linfocitos CD19 (linfocitos B): 72,00 - 460,00 /µL Linfocitos CD3 (linfocitos T): 54,90 - 84,03 % Linfocitos CD3 (linfocitos T): 536,00 - 1787,00 /µL Leucocitos: Ambos 0 - 3 Días 9,00 - 28,20 x10³/mm³ Leucocitos: Ambos 3 - 30 Días 7,20 - 21,60 x10³/mm³ Leucocitos: Ambos 30 - 365 Días 6,60 - 16,20 x10³/mm³ Leucocitos: Ambos 1 - 12 Años 4,80 - 15,00 x10³/mm³ Leucocitos: Ambos 12 - 18 Años 4,50 - 11,40 x10³/mm³ Leucocitos: Ambos Sup - 18 Años 3,90 - 10,50 x10³/mm³ Linfocitos: Ambos 0 - 3 Días 1,80 - 11,20 x10³/mm³ Linfocitos: Ambos 3 - 30 Días 2,00 - 13,60 x10³/mm³ Linfocitos: Ambos 30 - 365 Días 2,70 - 12,60 x10³/mm³ Linfocitos: Ambos 1 - 6 Años 1,80 - 10,00 x10³/mm³ Linfocitos: Ambos 6 - 18 Años 1,20 - 6,00 x10³/mm³ Linfocitos: Ambos Sup - 18 Años 1,10 - 4,50 x10³/mm³ Linfocitos %: Ambos 0 - 3 Días 18,00 - 52,00 % Linfocitos %: Ambos 3 - 30 Días 26,00 - 60,00 % Linfocitos %: Ambos 30 - 365 Días 30,00 - 67,00 % Linfocitos %: Ambos 1 - 12 Años 22,00 - 63,00 % Linfocitos %: Ambos 12 - 18 Años 20,00 - 47,00 % Linfocitos %: Ambos Sup - 18 Años 20,00 - 44,00 % Linfocitos en valor absoluto: Ambos 0 - 3 Días 1800,00 - 11200,00 /µL Linfocitos en valor absoluto: Ambos 0 - 6 Días 900,00 - 5500,00 /µL Linfocitos en valor absoluto: Ambos 4 - 30 Días 2000,00 - 13600,00 /µL Linfocitos en valor absoluto: Ambos 7 - 14 Días 1300,00 - 7500,00 /µL Linfocitos en valor absoluto: Ambos 15 - 29 Días 800,00 - 8300,00 /µL Linfocitos en valor absoluto: Ambos 30 - 729 Días 1100,00 - 6500,00 /µL Linfocitos en valor absoluto: Ambos 31 - 364 Días 2700,00 - 12600,00 /µL Linfocitos en valor absoluto: Ambos 1 - 6 Años 1800,00 - 10000,00 /µL Linfocitos en valor absoluto: Hombres 2 - 12 Años 750,00 - 5000,00 /µL Linfocitos en valor absoluto: Mujeres 2 - 12 Años 7500,00 - 5000,00 /µL Linfocitos en valor absoluto: Ambos 6 - 17 Años 1200,00 - 6000,00 /µL Linfocitos en valor absoluto: Ambos Sup - 12 Años 600,00 -

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
				4100,00 /µL Linfocitos en valor absoluto: Ambos Sup - 18 Años 1100,00 - 4500,00 /µL
C48L **LINFOCITOS · SUBPOBLACIONES T (CD4/CD8), LAVADO BRONCOALVEOLAR**	Citometría de flujo.	2	Rec. 1 mL Lavado broncoalveolar (1 x Contenedor estéril) [Refr.]	Linfocitos CD4 (linfocitos T4) en lavado broncoalveolar: 44,60 - 68,50 % Cociente CD4 / CD8 en lavado broncoalveolar: 1,20 - 3,30 Linfocitos CD8 (linfocitos T8) en lavado broncoalveolar: 19,30 - 39,00 %

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
QL48 **LINFOCITOS · SUBPOBLACIONES T (CD4/CD8), SANGRE TOTAL**	Citometría de flujo.	2	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) Evitar remitir la muestra en fines de semana y vísperas de festivos.	Linfocitos CD4 (linfocitos T4): 32,53 - 62,88 % Cociente CD4 / CD8: 1,00 - 5,00 Linfocitos CD4 (linfocitos T4): 309,00 - 1139,00 /µL Linfocitos CD8 (linfocitos T8): 11,55 - 38,60 % Linfocitos CD8 (linfocitos T8): 137,00 - 823,00 /µL Leucocitos: Ambos 0 - 3 Días 9,00 - 28,20 x10³/mm³ Leucocitos: Ambos 3 - 30 Días 7,20 - 21,60 x10³/mm³ Leucocitos: Ambos 30 - 365 Días 6,60 - 16,20 x10³/mm³ Leucocitos: Ambos 1 - 12 Años 4,80 - 15,00 x10³/mm³ Leucocitos: Ambos 12 - 18 Años 4,50 - 11,40 x10³/mm³ Leucocitos: Ambos Sup - 18 Años 3,90 - 10,50 x10³/mm³ Linfocitos: Ambos 0 - 3 Días 1,80 - 11,20 x10³/mm³ Linfocitos: Ambos 3 - 30 Días 2,00 - 13,60 x10³/mm³ Linfocitos: Ambos 30 - 365 Días 2,70 - 12,60 x10³/mm³ Linfocitos: Ambos 1 - 6 Años 1,80 - 10,00 x10³/mm³ Linfocitos: Ambos 6 - 18 Años 1,20 - 6,00 x10³/mm³ Linfocitos: Ambos Sup - 18 Años 1,10 - 4,50 x10³/mm³ Linfocitos %: Ambos 0 - 3 Días 18,00 - 52,00 % Linfocitos %: Ambos 3 - 30 Días 26,00 - 60,00 % Linfocitos %: Ambos 30 - 365 Días 30,00 - 67,00 % Linfocitos %: Ambos 1 - 12 Años 22,00 - 63,00 % Linfocitos %: Ambos 12 - 18 Años 20,00 - 47,00 % Linfocitos %: Ambos Sup - 18 Años 20,00 - 44,00 % Linfocitos en valor absoluto: Ambos 0 - 3 Días 1800,00 - 11200,00 /µL Linfocitos en valor absoluto: Ambos 0 - 6 Días 900,00 - 5500,00 /µL Linfocitos en valor absoluto: Ambos 4 - 30 Días 2000,00 - 13600,00 /µL Linfocitos en valor absoluto: Ambos 7 - 14 Días 1300,00 - 7500,00 /µL Linfocitos en valor absoluto: Ambos 15 - 29 Días 800,00 - 8300,00 /µL Linfocitos en valor absoluto: Ambos 30 - 729 Días 1100,00 - 6500,00 /µL Linfocitos en valor absoluto: Ambos 31 - 364 Días 2700,00 - 12600,00 /µL Linfocitos en valor absoluto: Ambos 1 - 6 Años 1800,00 - 10000,00 /µL Linfocitos en valor absoluto: Hombres 2 - 12 Años 750,00 - 5000,00 /µL Linfocitos en valor absoluto: Mujeres 2 - 12 Años 7500,00 - 5000,00 /µL Linfocitos en valor absoluto: Ambos 6 - 17 Años 1200,00 - 6000,00 /µL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
				Linfocitos en valor absoluto: Ambos Sup - 12 Años 600,00 - 4100,00 /µL Linfocitos en valor absoluto: Ambos Sup - 18 Años 1100,00 - 4500,00 /µL
TH17 **LINFOCITOS · TH17, SANGRE TOTAL**	Citometría de flujo.	9	Rec. 5 mL Sangre total Heparina litio (1 x Tubo sangre heparina litio) Alt. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) Debido a la baja estabilidad de la muestra, es imprescindible avisar para concertar día con tal de informar al departamento responsable. No enviar muestras en viernes ni vísperas de festivos. Se requieren datos completos del paciente, día y hora de la extracción y diagnóstico.	2,10 - 11,50 %
LBKK **LINFOCITOS B (CD19+) Y CADENAS LIGERAS KAPPA/LAMBDA, SANGRE TOTAL**	Citometría de flujo.	6	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA)	Linfocitos CD19 (linfocitos B): 4,70 - 19,13 % Linfocitos CD19 (linfocitos B): 72,00 - 460,00 /µL Expresión cad lig Kappa en superf de Linf B MADRID: 3,00 - 9,00 % Expresión cad lig Lambda en superf de LB MADRID: 2,00 - 6,00 %
QLBM **LINFOCITOS B · (CD19), SANGRE TOTAL**	Citometría de flujo.	2	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA)	Linfocitos CD19 (linfocitos B): 4,70 - 19,13 % Linfocitos CD19 (linfocitos B): 72,00 - 460,00 /µL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
LIBM **LINFOCITOS B · SUBPOBLACIONES, SANGRE TOTAL**	Citometría de flujo.	7	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA)	Linfocitos CD19 (linfocitos B): 4,70 - 19,13 % Linfocitos CD19 (linfocitos B): 72,00 - 460,00 /µL Linfocitos B memoria marginal (CD19+ IgD+CD27+): Sobre % total de CD19 + 7,00 - 33,00 % Linfocitos B memoria switched class (CD19+ IgM- IgD- CD27+): Sobre % total de CD19 + 8,00 - 31,00 % Linfocitos B naive (CD19+ IgD+ CD27-): Sobre % total de CD19 + 43,00 - 83,00 %
G13131 **LINFOCITOS B CLONALIDAD - REORDENAMIENTO · IGH · A.FRAGMENTOS**	Análisis de Fragmentos	10	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	IGH *1*
G13132 **LINFOCITOS B CLONALIDAD - REORDENAMIENTO · IGH, IGK · A.FRAGMENTOS**	Análisis de Fragmentos	10	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	
G15086 **LINFOCITOS B CLONALIDAD - REORDENAMIENTO · IGK · A.FRAGMENTOS**	Análisis de Fragmentos	10	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	IGK *1*
LK57 **LINFOCITOS NK CD57, SANGRE TOTAL**	Citometría de flujo.	7	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA)	Linfocitos NK CD57+ (%): 3,00 - 21,00 % Linfocitos NK CD57+ (abs): /µL Interpretación según criterio clínico

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
LNKV **LINFOCITOS NK VERDADEROS, SANGRE TOTAL**	Citometría de flujo.	7	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA)	Linfocitos NK verdaderos (CD3-CD56+CD16+CD94+) : 3,50 - 11,20 % Linfocitos NK verdaderos (CD3-CD56+CD16+CD94+) en absoluto : 70,00 - 390,00 /µL
GC165669 **LINFOCITOS NK69, SANGRE TOTAL**	Citometría de flujo.	7		
CD69 **LINFOCITOS T · (CD3+, CD69), SANGRE TOTAL**	Citometría de flujo.	5	Rec. 1 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] - Realizar la extracción únicamente de lunes a miércoles laborables. Festivos y vísperas consultar. Envio inmediato.	Inf 10,00 %
LTAC **LINFOCITOS T ACTIVADOS, SANGRE TOTAL**	Citometría de flujo.	7	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA)	Linfocitos T activados: Coexpresión CD3 HLA DR: Inf 18,00 % Linfocitos T activados (CD3/DR): 40,00 - 420,00 /µL Linfocitos CD8+ DR+: Inf 5,00 % Linfocitos T8 activados (CD8+DR+): 39,00 - 101,00 /µL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
L348 **LINFOCITOS T CD3+, CD4+, CD8+ Y COCIENTE CD4/CD8, SANGRE TOTAL**	Citometría de flujo.	2	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Linfocitos CD3 (linfocitos T): 54,90 - 84,03 % Linfocitos CD3 (linfocitos T): 536,00 - 1787,00 /µL Linfocitos CD4 (linfocitos T4): 32,53 - 62,88 % Cociente CD4 / CD8: 1,00 - 5,00 Linfocitos CD4 (linfocitos T4): 309,00 - 1139,00 /µL Linfocitos CD8 (linfocitos T8): 11,55 - 38,60 % Linfocitos CD8 (linfocitos T8): 137,00 - 823,00 /µL Leucocitos: Ambos 0 - 3 Días 9,00 - 28,20 x10³/mm³ Leucocitos: Ambos 3 - 30 Días 7,20 - 21,60 x10³/mm³ Leucocitos: Ambos 30 - 365 Días 6,60 - 16,20 x10³/mm³ Leucocitos: Ambos 1 - 12 Años 4,80 - 15,00 x10³/mm³ Leucocitos: Ambos 12 - 18 Años 4,50 - 11,40 x10³/mm³ Leucocitos: Ambos Sup - 18 Años 3,90 - 10,50 x10³/mm³ Linfocitos: Ambos 0 - 3 Días 1,80 - 11,20 x10³/mm³ Linfocitos: Ambos 3 - 30 Días 2,00 - 13,60 x10³/mm³ Linfocitos: Ambos 30 - 365 Días 2,70 - 12,60 x10³/mm³ Linfocitos: Ambos 1 - 6 Años 1,80 - 10,00 x10³/mm³ Linfocitos: Ambos 6 - 18 Años 1,20 - 6,00 x10³/mm³ Linfocitos: Ambos Sup - 18 Años 1,10 - 4,50 x10³/mm³ Linfocitos %: Ambos 0 - 3 Días 18,00 - 52,00 % Linfocitos %: Ambos 3 - 30 Días 26,00 - 60,00 % Linfocitos %: Ambos 30 - 365 Días 30,00 - 67,00 % Linfocitos %: Ambos 1 - 12 Años 22,00 - 63,00 % Linfocitos %: Ambos 12 - 18 Años 20,00 - 47,00 % Linfocitos %: Ambos Sup - 18 Años 20,00 - 44,00 % Linfocitos en valor absoluto: Ambos 0 - 3 Días 1800,00 - 11200,00 /µL Linfocitos en valor absoluto: Ambos 0 - 6 Días 900,00 - 5500,00 /µL Linfocitos en valor absoluto: Ambos 4 - 30 Días 2000,00 - 13600,00 /µL Linfocitos en valor absoluto: Ambos 7 - 14 Días 1300,00 - 7500,00 /µL Linfocitos en valor absoluto: Ambos 15 - 29 Días 800,00 - 8300,00 /µL Linfocitos en valor absoluto: Ambos 30 - 729 Días 1100,00 - 6500,00 /µL Linfocitos en valor absoluto: Ambos 31 - 364 Días 2700,00 - 12600,00 /µL Linfocitos en valor absoluto: Ambos 1 - 6 Años 1800,00 - 10000,00 /µL Linfocitos en valor absoluto: Hombres 2 - 12 Años 750,00 - 5000,00 /µL Linfocitos en valor absoluto: Mujeres 2 - 12 Años 7500,00 - 5000,00 /µL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
				Linfocitos en valor absoluto: Ambos 6 - 17 Años 1200,00 - 6000,00 /µL Linfocitos en valor absoluto: Ambos Sup - 12 Años 600,00 - 4100,00 /µL Linfocitos en valor absoluto: Ambos Sup - 18 Años 1100,00 - 4500,00 /µL
LTCS **LINFOCITOS T CITOTÓXICOS / SENESCENTES, SANGRE TOTAL**	Citometría de flujo.	7	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA)	Linfocitos T8 senescentes CD8+ CD57+ (%) MADRID: 3,00 - 21,00 % Linfocitos T citotóxicos CD8+ CD57- (%) MADRID: 6,00 - 29,00 % Linfocitos T8 senescentes (CD8+CD57+) (abs) MADRID: 60,00 - 447,00 /µL Linfocitos T8 citotóxicos CD8+CD57- (abs) MADRID: 256,00 - 777,00 /µL
G13054 **LINFOCITOS T CLONALIDAD - REORDENAMIENTO · TCRB · A.FRAGMENTOS**	Análisis de Fragmentos	10	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	TCRB *1*
G15084 **LINFOCITOS T CLONALIDAD - REORDENAMIENTO · TCRD · A.FRAGMENTOS**	Análisis de Fragmentos	10	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA (2 tubos)) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea (1 x Tubo sangre EDTA (2 tubos)) [Refr.] Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	TCRD *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G13053 **LINFOCITOS T CLONALIDAD - REORDENAMIENTO · TCRG · A.FRAGMENTOS**	Análisis de Fragmentos	10	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	TCRG *1*
G15158 **LINFOCITOS T CLONALIDAD · REORDENAMIENTO · TCRG, TCRB, TCRD · A. FRAGMENTOS**	Análisis de Fragmentos	10	Rec. 1 Pieza/s Tejido	TCRB, TCRD, TCRG *3*
TREM **LINFOCITOS T REGULADORES · TREGS, SANGRE TOTAL**	Citometría de flujo.	4	Rec. 2 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Debido a la baja estabilidad de la muestra, es imprescindible avisar para concertar día con tal de informar al departamento responsable. No enviar muestras en viernes ni vísperas de festivos. Se requieren datos completos del paciente, día y hora de la extracción y diagnóstico.	Linfocitos TREGS totales (CD4+CD25+CD127lo): 1,00 - 6,70 % Linfocitos TREGS totales (CD4+CD25+CD127lo) en absoluto: 12,00 - 80,00 /uL
G17018 **LINFOHISTIOCITOSIS HEMOFAGOCÍTICA FAMILIAR · PRF1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PRF1 *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G13031 **LINFOMA · PANEL · FISH**	Panel FISH	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	BCL2/IGH [t(14;18)(q32.3;q21.3)] , BCL6 [3q27.3] , CCND1(BCL1)/IGH [t(11;14)(q13;q32)] , C-MYC [8q24]	*4*
G04063 **LINFOPROLIFERATIVO AUTOINMUNE TIPO 5, SÍNDROME · CTLA4 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CTLA4	*1*
G17016 **LINFOPROLIFERATIVO AUTOINMUNE, SÍNDROME · FAS · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FAS	*1*
G17021 **LINFOPROLIFERATIVOS AUTOINMUNES, SÍNDROMES · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CASP10, CASP8, CTLA4, FAS, FASLG, PRKCD	*6*
G17022 **LINFOPROLIFERATIVOS, SÍNDROMES · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ITK	*1*
LIPAL **LIPASA, LÍQUIDO BIOLÓGICO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Líquido biológico [Refr.]	U/L Interpretación según criterio clínico	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
LIPO **LIPASA, ORINA**	Espectrometría.	2	Rec. 10 mL Orina [Refr.]	U/L No establecido.
LIPA **LIPASA, SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Inf 67,00 U/L
G01176 **LIPID IN CODE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	50	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	APOB, APOE, LDLR, LDLRAP1, LIPA, PCSK9
LIPG **LIPIDOGRAMA, SUERO**	Electroforesis - Densitometría	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Ayuno mínimo de 10 horas	Alfa Lipoproteínas: 15,10 - 39,90 % Beta Lipoproteínas: 42,30 - 69,50 % Indice beta / pre beta: 1,50 - 25,00 Índice beta + pre beta / alfa: Sup 1,15 Pre beta Lipoproteínas: 2,00 - 31,20 % Quilomicrones: Ausencia
LT **LÍPIDOS TOTALES, SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Colesterol total: Inf 200,00 mg/dL Lípidos totales: 350,00 - 800,00 mg/dL Triglicéridos: Inf 150,00 mg/dL
NGAL **LIPOCALINA ASOCIADA A GELATINASA NEUTRÓFILA, ORINA**	Inmunoturbidimetría.	7	Rec. 5 mL Orina [Cong.] Congelar orina inmediatamente después de centrifugar a 3000 rpm durante 10 minutos Estabilidad de la muestra: Plazo de entrega aproximado. Consultar con el laboratorio.	0,70 - 9,80 ng/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G03051 **LIPODISTROFIA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AGPAT2, AKT2, BSCL2, CAV1, CIDEC, LIPE, LMNA, LMNB1, LMNB2 , PCYT1A, PIK3R1, PLIN1, PPARG, PPP1R3A, PTRF, TBC1D4, ZMPSTE24	*17*
G02028 **LIPODISTROFIA GENERALIZADA CONGÉNITA TIPO 2 · BSCL2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BSCL2	*1*
G02043 **LIPODISTROFIA PARCIAL FAMILIAR · LMNA · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	LMNA	*1*
G02029 **LIPODISTRÓFICA GENERALIZADA CONGÉNITA TIPO 1 · AGPAT2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AGPAT2	*1*
G11215 **LIPOFUSCINOSIS CEROIDE NEURONAL · CLN3 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CLN3	*1*
G03148 **LIPOFUSCINOSIS NEURONAL CEROIDEA 1 · PPT1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PPT1	*1*
G03194 **LIPOFUSCINOSIS NEURONAL CEROIDEA · PANEL · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Indicado en informe adjunto CLN3, CLN6 , CLN8, PPT1 , TPP1	*5*
G02030 **LIPOMATOSIS ENCEFALOCRANIOCUTANEA · FGFR1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FGFR1	*1*
LBP **LIPOPOLYSACCHARID BINDING PROTEIN (LBP), SUERO**	Electroquimioluminiscencia.	7	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Inf 15,00 µg/mL	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
LPA **LIPOPROTEÍNA (A) LP(A), SUERO**	Inmunoturbidimetría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Inf 30,00 mg/dL
ACLDLO **LIPOPROTEÍNA BAJA DENSIDAD OXIDADA (LDL-OXIDADA) ANTICUERPOS, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	16	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	4000,00 - 12000,00 U/mL
LDLOX **LIPOPROTEÍNA BAJA DENSIDAD OXIDADA (LDL-OXIDADA), SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	10	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	57,70 - 133,20 ng/mL Pacientes diabéticos tipo 2 92,50 - 192,20 ng/mL Pacientes diabéticos tipo 2 con HTA 107,50 - 207,30 ng/mL Pacientes diabéticos tipo 2 sin HTA 77,70 - 144,60 ng/mL
LPSCL **LIPOSCALE**	Espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear (RMN)	20	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Ayuno mínimo de 8 horas. Realizar la extracción de lunes a miércoles laborables, evitando vísperas de festivos.	Indicado en informe adjunto
G11194 **LISENCEFALIA · PAFAH1B1 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PAFAH1B1 *1*
LELPL **LISOESFINGOLÍPIDOS, PLASMA**	Espectrometría de masas en tándem	17	Rec. 0.5 mL Plasma (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] El estudio incluye: Liso Gb1, Liso Gb3, Liso-SM, LisoSM-509	nmol/L Indicado en informe adjunto

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
LFML **LISOFOSFATIDILCOLINAS DE CADENA MUY LARGA, SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	16	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Se requiere: - Ayuno mínimo de 8 horas - Indicar Nombre, Apellidos y Fecha de Nacimiento del paciente - Resumen de la historia clínica del paciente. Criterios de rechazo: - Muestra Coagulada. - Muestra descongelada y mantenida a temperatura ambiente más de un día o a 4ºC más de una semana.	Lisofosfatidilcolinas de cadena muy larga C22 en suero (C22:0 – LPC): Inf= 0,11 µmol/L Lisofosfatidilcolinas de cadena muy larga C24 en suero (C24:0 – LPC): Inf= 0,22 µmol/L Lisofosfatidilcolinas de cadena muy larga C26 en suero (C26:0 – LPC): Inf 0,17 µmol/L
G03052 **LISOSOMALES, ENFERMEDADES · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABCD3, ABCD4, ACP2, ACY1, ADAMTSL2, ADSL , AGA, AGPS, AGXT, ALDH5A1 , ALDH7A1 , AMACR, AMT, ANTXR2, ARG1, ARSA, ARSB, ASAH1, ASPA, ATP13A2, BTD, CHIT1, CLN3, CLN5, CLN6 , CLN8 , CTNS, CTSA, CTSC, CTSD, CTSK, DHCR7, DNAJC5 , DPYD, ECM1, ETFA, ETFB, ETFDH, FOLR1 , FUCA1, GAA, GALC, GALNS, GAMT, GBA, GCDH, GCSH, GLA, GLB1, GLDC, GM2A, GNE, GNPTAB, GNPTG, GNS, GPC3, GRN, GUSB, HEXA, HEXB, HGSNAT, HPD, HRAS, HSD17B4, HYAL1, IDS, IDUA, L2HGDH, LAMP2, LMBRD1, MAN2B1, MANBA, MCOLN1, MFSD8 , MOCS1, MOCS2, NAGA, NAGLU, NEU1, NPC1, NPC2, PGK1, PHYH, PPT1 , SGSH, SLC17A5, SLC25A15, SLC46A1, SMPD1, SUGCT, SUMF1, SUOX, TCF4 , TPP1 *94*
LIO **LISOZIMA, ORINA**	Espectrometría.	4	Rec. 1 mL Orina [Refr.]	Inf 2,00 mg/L
LISO **LISOZIMA, SUERO**	Turbidimetría.	4	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	2,50 - 8,00 mg/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
LISTT **LISTERIA ANTICUERPOS, SUERO**	Aglutinación de Partículas.	4	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] - Se precisa resumen de la historia clínica del paciente. Estabilidad; Suero refrigerado 5 días Se requiere:	El procedimiento analiza los siguientes serotipos: Tipo 1:H Tipo 1:O Tipo 4b:H Tipo 4b:O Negativo: Inf 1/320
LIST **LISTERIA MONOCYTOGENES (TIPO1) ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/100 Interpretación: Positivo: Sup= 1/100
LISM **LISTERIA MONOCYTOGENES (TIPO1) ANTICUERPOS IgM, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/100 Interpretación: Positivo: Sup= 1/100
LIS4G **LISTERIA MONOCYTOGENES (TIPO4B) ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/100 Interpretación: Positivo: Sup= 1/100
LIS4M **LISTERIA MONOCYTOGENES (TIPO4B) ANTICUERPOS IgM, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/100 Interpretación: Positivo: Sup= 1/100
LIS1LC **LISTERIA MONOCYTOGENES ANTICUERPOS, LCR**	Aglutinación	3	Rec. 1 mL LCR (1 x Tubo estéril) [Cong.]	Negativo

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
DNLI **LISTERIA MONOCYTOGENES DNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	PCR-Real Time.	6	Rec. 1 mL LCR (1 x Tubo Polipropileno) [Cong.] Alt. 5 mL Lavado broncoalveolar (1 x Contenedor estéril) [Refr.] Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío.	DNA de Listeria monocytogenes: No se detecta
LI **LITIO, SUERO**	Electrodo Selectivo de Iones.	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Toma de muestra: 12 horas (mínimo) tras la dosis nocturna.	I.Terapéutico: 0,50 - 1,20 mEq/L Conc.Tóxica: Sup 2,00 mEq/L
G01150 **LOEYS DIETZ, SÍNDROME DE · SMAD2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SMAD2 *1*
G01121 **LOEYS DIETZ, SÍNDROME DE · SMAD3 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SMAD3 *1*
G01039 **LOEYS DIETZ, SÍNDROME DE · TGFB2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TGFB2 *1*
G01151 **LOEYS DIETZ, SÍNDROME DE · TGFB3 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TGFB3 *1*
G01040 **LOEYS DIETZ, SÍNDROME DE · TGFBR1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TGFBR1 *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G01041 **LOEYS DIETZ, SÍNDROME DE · TGFBR2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TGFBR2	*1*
G01122 **LOEYS-DIETZ, SÍNDROME DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SMAD3, TGFB2, TGFB3, TGFBR1, TGFBR2	*5*
G4249 **LOEYS-DIETZ, SÍNDROME DE · TGFBR1, TGFBR2 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TGFBR1, TGFBR2	*2*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
TELCRI **LONGITUD TELOMÉRICA, SANGRE TOTAL**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	23	Rec. 10 mL Sangre total EDTA (1 x Kit específico) [Refr.] Realizar la extracciónde lunes a jueves laborables. Enviar inmediatamente después de la extracción No enviar muestras de sangre que presenten hemólisis ni coágulos. Kit Ref SAP: 550000523 • Consentimiento informado específico de la Medición de la Longitud Telomérica (código MPP9). • Cuestionario clínico específico de la Medición de la Longitud Telomérica, el cual el paciente deberá cumplimentar online (www.lifelength-questionnaire.com). En el kit se proporciona el usuario y contraseña específicos para acceder al cuestionario clínico online.	Indicado en informe adjunto

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
LORA **LORAZEPAM, SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.] -Dosis administrada, frecuencia y vía de administración La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis. Rechazo: Muestra hemolizada, lipémica y/o ictérica	I.Terapéutico: 20,00 - 250,00 µg/L Conc.Tóxica: 300,00 - 500,00 µg/L Límite de cuantificación: 5,00 µg/L
LSD **LSD (DIETILAMIDA DEL ÁCIDO LISÉRGICO), ORINA**	Enzimoinmunoanálisis	2	Rec. 10 mL Orina [Refr.]	Negativo El valor discriminante de la técnica es 0,50 ng/mL
LSDP **LSD CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), CABELLO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	10	Rec. 1 g Cabello	LSD: Valor de corte recomendado: 97,00 pg/mg
COLSDOR **LSD CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), ORINA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 10 mL Orina [Refr.]	Se utiliza como criterio de Positividad que la concentración sea superior o igual al valor del límite de cuantificación más el valor de incertidumbre del ensayo. En caso contrario, el resultado es Negativo. Incertidumbre de medida 0,8 ng/mL Límite de cuantificación 5 ng/mL
COLDSSA **LSD CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SALIVA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 1 mL Saliva [Refr.]	Incertidumbre de medida 0,6 ng/mL Límite de cuantificación 2 ng/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
COLDSST **LSD CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SANGRE**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 10 mL Sangre total Oxalato/Fluoruro (1 x Tubo Sangre Total-Oxalato/Fluoruro) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total Heparina litio (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Tubo oxalato potásico/Fluoruro sódico Ref. SAP 600088318	Incertidumbre de medida 0,3 ng/mL Límite de cuantificación 2 ng/mL
LUTE **LUTEÍNA Y ZEAXANTINA**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	10	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Separar y congelar inmediatamente. Proteger de la luz.	100,00 - 500,00 µg/L
M2PKH **M2-PK PIRUVATO QUINASA (MARCADOR TUMORAL), HECES**	Enzimoinmunoanálisis	8	Rec. 5 g Heces [Cong.]	Negativo: Inf 4,00 UI/mL Indeterminado: 4,00 - 6,00 UI/mL Positivo: Sup 6,00 UI/mL
M2PK **M2-PK PIRUVATO QUINASA (MARCADOR TUMORAL), PLASMA**	Enzimoinmunoanálisis	7	Rec. 2 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.]	Inf 15,00 U/mL
MGOT **MACRO ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (AST/GOT), SUERO**	Precipitación con polietilenglicol.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	% No se dispone de límites de referencia para esta magnitud.
MACTH **MACRO CORTICOTROPINA (ACTH), PLASMA**	Precipitación con polietilenglicol.	3	Rec. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.]	% No se dispone de límites de referencia para esta magnitud.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
MACCK **MACRO CREATINA QUINASA (CK), SUERO**	Precipitación con polietilenglicol.	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Presencia Macro Creatina Quinasa (CK): 0,00 - 55 % Ausencia de Macro Creatina Quinasa (CK): 55,00 - 100,00 %
MVB12 **MACRO VITAMINA B12, SUERO**	Precipitación con polietilenglicol.	3	Rec. 2 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	% No se dispone de valores de referencia. Valorar a criterio clínico.
MACRA **MACROAMILASA, SUERO**	Precipitación enzimática.	4	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	27,00 - 100,00 %
G13068 **MACROGLOBULINEMIA DE WALDENSTROM · CXCR4(S338X) · HOT SPOT**	Hot Spot	7	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CXCR4 [S338X] *1*
G13069 **MACROGLOBULINEMIA DE WALDENSTROM · MYD88(L265P) · HOT SPOT**	Hot Spot	7	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	MYD88 [L265P] *1*
G7313 **MACROTROMBOCITOPENIA Y SORDERA NERUROSENSORIAL PROGRESIVA · MYH9 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	MYH9 *1*
MAGG **MAG (MYELIN ASSOCIATED GLYCOPROTEIN) ANTICUERPOS IGG, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	15	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/10 Interpretación: Positivo: Sup= 1/10
MAGML **MAG (MYELIN ASSOCIATED GLYCOPROTEIN) ANTICUERPOS IgM, LCR**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 0.5 mL LCR [Refr.]	Negativo

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
AMAG **MAG (MYELIN ASSOCIATED GLYCOPROTEIN) ANTICUERPOS IgM, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	15	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/10 Interpretación: Positivo: Sup= 1/10
AGMG **MAGNESIO AGUA**	Absorción atómica.	15	Rec. 100 mL Agua (1 x Envase aséptico) [Refr.] Alt. 100 mL Agua (1 x Envase aséptico) (<2 Ác.nítrico) Acidificar a pH < 2.	Agua de diálisis Inf 2,00 mg/L
MGER **MAGNESIO ERITROCITARIO , SANGRE TOTAL**	Espectrometría Absorción Atómica / Llama.	5	Rec. 1 mL Sangre total EDTA Dipotásico (libre trazas metales) (1 x Tubo Sangre EDTA metales traza) [Refr.] Se puede hacer con muestra en tubo libre de metales y anticoagulante Heparina Sódica. Criterios de rechazo Muestra hemolizada.	35,00 - 55,00 mg/L
CMCO **MAGNESIO, ORINA**	Espectrometría.	1	Rec. 10 mL Orina [Refr.]	Creatinina en orina : mg/dL Interpretación según criterio clínico Cociente magnesio/creatinina en micción: Hombres 18,00 - 110,00 mg/g crea Cociente magnesio/creatinina en micción: Mujeres 14,00 - 139,00 mg/g crea
MGO **MAGNESIO, ORINA 24H**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Orina 24h. (alícuota) (1 x Contenedor 2500 mL.) [Refr.]	Excreción (24h): 73,00 - 122,00 mg/24h Concentración:: mg/dL Volumen de orina remitido (diuresis): 600,00 - 1600,00 mL
MGSEM **MAGNESIO, PLASMA SEMINAL**	Espectrometría.	4	Rec. 1 mL Plasma seminal [Refr.]	120,00 - 160,00 mg/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
MG **MAGNESIO, SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	1,60 - 2,60 mg/dL
G01123 **MALFORMACIÓN CAPILAR-MALFORMACIÓN ARTERIOVENOSA · RASA1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	RASA1 *1*
TBARS **MALONDIALDEHIDO (MDA), PLASMA**	Espectrometría.	11	Rec. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Plasma EDTA separar y congelar rápidamente.	2,30 - 4,00 µmol/L
G01124 **MALOUF, SÍNDROME DE · LMNA · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	LMNA *1*
G15038 **MAMA (PROSIGNA-PAM 50), NEOPLASIA DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	10	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	ACTR3B, ANLN, BAG1, BCL2, BIRC5, BLVRA, CCNB1, CCNE1, CDC20, CDC6, CDH3, CENPF, CEP55, CXXC5, EGFR, ERBB2, ESR1, EXO1, FGFR4, FOXA1, FOXC1, GPR160, GRB7, KIF2C, KRT14, KRT17, KRT5, MAPT, MDM2, MELK, MIA, MKI67, MLPH, MMP11, MYBL2, MYC, NAT1, NDC80, NUF2, ORC6L, PGR, PHGDH, PTTG1, RRM2, SFRP1, SLC39A6, TMEM45B, TYMS, UBE2C, UBE2T *50*
G15208 **MAMA EXTENDIDO, NEOPLASIA DE · PANEL · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	12	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	Se informa para cada paciente *58* AKT1, AR, ARID1A, ATM, BRAF, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CBFB, CCND1, CDH1, CHEK2, EGFR, EPCAM, ERBB2, ERBB3, ESR1, FAT1, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FOXA1, GATA3, GNAS, HRAS, KRAS, MAP2K4, MAP3K1, MDM2, MED12, MET, MLH1, MSH2, MSH6, MSI, MTOR, MYC, NBN, NF1, NRAS, NTRK1, NTRK2, NTRK3, PALB2, PIK3CA, PMS2, PTEN, RAD50, RAD51C, RAD51D, RB1, RUNX1, STK11, TBX3, TERT, TMB, TP53, YAP1
G2048 **MAMA Y OVARIO HEREDITARIO (POBLACIÓN ASHKENAZI), CÁNCER DE · BRCA1 (185delAG; 5382incC), BRCA2 (6174delT) · HOT SPOT**	Hot Spot	15	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BRCA1 [185delAG; 5382inc] , BRCA2 [6174delT] *2*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G14040 **MAMA Y OVARIO HEREDITARIO, CÁNCER DE · BRCA1 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BRCA1	*1*
G14041 **MAMA Y OVARIO HEREDITARIO, CÁNCER DE · BRCA1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	15	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BRCA1	*1*
G2014 **MAMA Y OVARIO HEREDITARIO, CÁNCER DE · BRCA1, BRCA2 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BRCA1, BRCA2	*2*
G2046 **MAMA Y OVARIO HEREDITARIO, CÁNCER DE · BRCA1, BRCA2 · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	15	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BRCA1, BRCA2	*2*
G14045 **MAMA Y OVARIO HEREDITARIO, CÁNCER DE · BRCA2 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BRCA2	*1*
G14047 **MAMA Y OVARIO HEREDITARIO, CÁNCER DE · BRCA2 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	15	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BRCA2	*1*
G14046 **MAMA Y OVARIO HEREDITARIO, CÁNCER DE · BRCA2(C.156_157insAlu) · HOT SPOT**	Hot Spot	15	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BRCA2 [C.156_157insAlu]	*1*
G14120 **MAMA Y OVARIO HEREDITARIO, CÁNCER DE · CHEK2 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CHEK2	*1*
G14049 **MAMA Y OVARIO HEREDITARIO, CÁNCER DE · CHEK2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CHEK2	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G14048 **MAMA Y OVARIO HEREDITARIO, CÁNCER DE · CHEK2(1100delC) · HOT SPOT**	Hot Spot	15	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CHEK2 [1100delC]	*1*
G14113 **MAMA Y OVARIO HEREDITARIO, CÁNCER DE · PANEL · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PALB2, RAD50, RAD51C, RAD51D	*4*
G14088 **MAMA Y OVARIO HEREDITARIO, CÁNCER DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	15	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ATM, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CDKN2A, CHEK2, EPCAM, FANCC, FANCM, MEN1, MLH1, MSH2, MSH6, NBN, PALB2, PMS2, PTEN, RAD51C, RAD51D, SLX4, STK11, TP53	*23*
G14083 **MAMA Y OVARIO HEREDITARIO, CÁNCER DE · RAD51C · SANGER**	Secuenciación Sanger	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	RAD51C	*1*
BR16 **MAMA Y OVARIO, CANCER HEREDITARIO (BRCA_PLUS) · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	15	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Saliva: Oragene OG510	ATM, BARD1, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CHEK2, CTNNA1, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, NF1, PALB2, PMS2, PTEN, RAD51C, RAD51D, STK11, TP53	
G14115 **MAMA, CÁNCER DE · PALB2 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PALB2	*1*
MNOR **MANGANESO, ORINA**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	5	Rec. 10 mL Orina final jornada (1 x Tubo 10 mL.) [Refr.]	Excreción (24h): BEIs® (ACGIH®): Inf 40,00 µg/g creat Excreción (24h): Inf 1,00 µg/g creat	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
MN/W **MANGANESO, SANGRE TOTAL**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	4	Rec. 1 mL Sangre total EDTA Dipotásico (libre trazas metales) (1 x Tubo Sangre EDTA metales traza) [Refr.] Se puede hacer con muestra en tubo libre de metales y anticoagulante Heparina Sódica.	5,00 - 15,00 µg/L
MN **MANGANESO, SUERO**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	4	Rec. 1 mL Suero (libre trazas metales) (1 x Tubo Suero metales traza) [Refr.] Alt. 1 mL Plasma Heparina litio (1 x Tubo Sangre Heparina litio metales traza) [Refr.]	Inf 1,50 µg/L Límite de cuantificación: 1,20 µg/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
MAPR **MAPROTILINA, SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	6	Rec. 100 uL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.] -Dosis administrada, frecuencia y vía de administración La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis. El contenedor recomendado es el tubo seco (sin gel separador) para evitar procesos de adsorción del fármaco. En caso de no disponer de tubo seco, la extracción se puede realizar en tubo con gel separador, separando el suero dentro de las 2 horas posteriores a la recolección y transfiriéndolo a un tubo de alícuota para su transporte al laboratorio. Rechazo: Muestra hemolizada, lipémica y/o ictérica	I.Terapéutico: 75,00 - 130,00 µg/L Toxicidad: Sup 220,00 µg/L Límite de cuantificación: 12,00 µg/L
G01125 **MARFAN (LIPODISTROFIA DISTRÓFICA), SÍNDROME DE · FBN1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FBN1 *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G01177 **MARFAN TIPO 1 Y 2, SÍNDROME DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FBN1, TGFBR1, TGFBR2	
G4062 **MARFAN TIPO 1, SÍNDROME DE · FBN1 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FBN1	*1*
G01126 **MARFAN Y OTROS RELACIONADOS, SÍNDROME DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ADAMTSL4, CBS, COL3A1, FBN1, FBN2, SMAD3, TGFB2, TGFB3, TGFBR1, TGFBR2	*1,0*
G01127 **MARFAN, SÍNDROME DE · FBN1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FBN1	*1*
G12049 **MARSHALL, SÍNDROME DE · COL11A1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	COL11A1	*1*
G16005 **MARSHALL-SMITH, SÍNDROME DE · NFIX · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	NFIX	*1*
G11147 **MASA SÍNDROME - CRASH SÍNDROME · L1CAM · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	L1CAM	*1*
G01042 **MASS, SÍNDROME DE · FBN1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FBN1	*1*
G13139 **MASTOCITOSIS SISTÉMICA/LAM · KIT(D816V) · HOT SPOT**	Hot Spot	7	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	KIT [D816V]	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G18019 **MAVACAMTEN, RESPUESTA A · CYP2C19 · HOT SPOT**	Secuenciación Sanger	20	Rec. 5 mL Sangre total (1 x Tubo sangre EDTA (2 tubos)) [Refr.]	Indicado en informe adjunto CYP2C19 [CYP2C19 c.681G>A, c.636G>A]
VMAY **MAYARO VIRUS ANTICUERPOS IGG + IGM, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	12	Rec. 3 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Ac IgG virus mayaro en suero: Interpretación: Negativo: Inf 1/20 Ac IgG virus mayaro en suero: Interpretación: Positivo: Sup= 1/20 Ac IgM virus mayaro en suero: Interpretación: Negativo: Inf 1/20 Ac IgM virus mayaro en suero: Interpretación: Positivo: Sup= 1/20
G03181 **McCUNE-ALBRIGHT, SÍNDROME · GNAS · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GNAS *1*
G09044 **MCKUSICK-KAUFMAN, SÍNDROME · MKKS · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	MKKS *1*
COMDPVSA **MDPV (3,4-METILENDIOXIPIROVALERONA) CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SALIVA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	3	Rec. 1 mL Saliva [Refr.]	Incertidumbre de medida 2 ng/mL Límite de cuantificación 10 ng/mL
COMDPVST **MDPV (3,4-METILENDIOXIPIROVALERONA) CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SANGRE**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	3	Rec. 10 mL Sangre total Oxalato/Fluoruro (1 x Tubo Sangre Total-Oxalato/Fluoruro) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total Heparina litio (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Tubo oxalato potásico/Fluoruro sódico Ref. SAP 600088318	Incertidumbre de medida 2 ng/mL Límite de cuantificación 10 ng/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G01128 **MEACHAM, SÍNDROME DE · WT1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	WT1 *1*
G11267 **MECKEL, SÍNDROME DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	B9D1, B9D2, CC2D2A, CEP290, KIF14, MKS1, NPHP3, RPGRIP1L *8*
COMEFOR **MEFEDRONA CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), ORINA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	3	Rec. 10 mL Orina [Refr.]	Incertidumbre de medida 5,40 ng/mL Límite de cuantificación 25,00 ng/mL Se utiliza como criterio de Positividad que la concentración sea superior o igual al valor del límite de cuantificación más el valor de incertidumbre del ensayo. En caso contrario, el resultado es Negativo.
COMEFSA **MEFEDRONA CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SALIVA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 1 mL Saliva (1 x Quantisal Oral Fluid) [Refr.]	Incertidumbre de medida 2 ng/mL Límite de cuantificación 10 ng/mL
COMEFST **MEFEDRONA CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SANGRE**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 10 mL Sangre total Oxalato/Fluoruro (1 x Tubo Sangre Total-Oxalato/Fluoruro) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total Heparina litio (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Tubo oxalato potásico/Fluoruro sódico Ref. SAP 600088318	Incertidumbre de medida 1,50 ng/mL Valor de corte recomendado: 10,00 ng/mL Se utiliza como criterio de Positividad que la concentración sea superior o igual al valor de corte recomendado más el valor de incertidumbre del ensayo. En caso contrario, el resultado es Negativo.
G7289 **MEGAVEJIGA/MICROCOLON, SÍNDROME DE - HIPOPERISTALTISMO INTESTINAL · ACTG2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ACTG2 *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G08112 **MEIER GORLIN, SÍNDROME DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CDC6, CDT1, MCM5, ORC1, ORC4, ORC6	*6*
MELAO **MELANINA, ORINA**	Espectrometría.	6	Rec. 10 mL Orina [Cong.]	No se detecta	
ACMELA **MELANOCITOS ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/10 Interpretación: Positivo: Sup= 1/10	
G14095 **MELANOMA CUTANEO · CDK4 · SANGER**	Secuenciación Sanger	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CDK4	*1*
G14054 **MELANOMA HEREDITARIO · CDKN2A · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CDKN2A	*1*
G14055 **MELANOMA HEREDITARIO · CDKN2A · SANGER**	Secuenciación Sanger	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CDKN2A	*1*
G14056 **MELANOMA HEREDITARIO · CDKN2A · SANGER+MLPA**	Secuenciación Sanger + MLPA	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CDKN2A [MLPA]	*1*
G14130 **MELANOMA HEREDITARIO · CDKN2A, CDKN2B, CDK4 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CDK4, CDKN2A, CDKN2B	*3*
G14137 **MELANOMA HEREDITARIO · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	15	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BAP1, BRCA2, CDK4, CDKN2A, MC1R, MITF, POT1, PTEN, RB1, TERT, TP53	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
AIM **MELANOMA INHIBITORY ACTIVITY (MIA), SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	19	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	620,00 - 1508,00 pg/mL
G07011 **MELAS, SÍNDROME · MT-TL1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	MT-TL1 *1*
G07012 **MELAS, SÍNDROME · MT-TL1(m.3243A>G, m.3271T>C, m.3252A>G) · HOT SPOT**	Hot Spot	20	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	MT-TL1 [m.3243A>G, m.3271T>C, m.3252A>G] *1*
MELAM **MELATONINA (MAÑANA), SALIVA**	Radioinmunoanálisis.	11	Rec. 1 mL Saliva [Cong.]	Inf 5,00 pg/mL
MELAN **MELATONINA (NOCHE), SALIVA**	Radioinmunoanálisis.	11	Rec. 1 mL Saliva [Cong.]	Sup 10,00 pg/mL
MESAL **MELATONINA, SALIVA**	Radioinmunoanálisis.	11	Rec. 1 mL Saliva [Cong.] Para muestra nocturna la extracción debe realizarse entre las 0:00 y las 4:00 horas. Kit especifico Salivette.	De día Inf 5,00 pg/mL De noche Sup 10,00 pg/mL
MELAT **MELATONINA, SUERO**	Radioinmunoanálisis.	11	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Para muestra nocturna la extracción debe realizarse entre las 0:00 y las 4:00 horas.	De día Inf 30,00 pg/mL De noche Inf 150,00 pg/mL
G08102 **MELNICK-NEEDLES, SÍNDROME DE · FLNA · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FLNA *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
MBG **MEMBRANA BASAL GLOMERULAR (GBM) ANTICUERPOS, SUERO (EIA)**	Inmunoanálisis con detección fluorescente	2	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 7,00 U/mL Indeterminado: 7,00 - 10,00 U/mL Positivo: Sup 10,00 U/mL
AMB **MEMBRANA BASAL GLOMERULAR (GBM) ANTICUERPOS, SUERO (IFI)**	Inmunofluorescencia Indirecta.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/10 Interpretación: Positivo: Sup= 1/10
DRMLC **MENINGOENCEFALITIS, DIAGNOSTICO RAPIDO DE, LCR**	Multiplex PCR-Real Time.	1	Rec. 1 mL LCR (1 x Tubo estéril) [Refr.]	En caso de resultado positivo se informa el microoganismo detectado:Bacterias (Escherichia coli K1, Haemophilus influenza, Listeria monocitogenes, Neisseria meningitidis, Streptococcus agalactie, Streptococcus pneumoniae). Virus (Citomegalovirus, Enterovirus, Herpes simple 1 y 2, Virus herpes 6, Parechovirus, Virus varizela zoster). Hongos (Criptococcus neoformans/gatti) No se detecta
G18028 **MERCAPTOPURINA, RESPUESTA A · TPMT Y NUDT15 · HOT SPOT**	Secuenciación Sanger	20	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Se informa para cada paciente 2 NUDT15 [*2 (c.50_55dup p.(V18_V19dup)/c.415C>T p.(Arg139Cys) y *3 c.415C>T p.(Arg139Cys)] , TPMT [*2 (c.238G>C, p.(Ala80Pro)), *3A (c.460G>A, p.(Ala154Thr)/c.719A>G p.(Tyr240Cys), *3B c.460G>A, *3C (c.719A>G p.(Tyr240Cys)) p.(Ala154Thr), *4 (c.626-1G>A)]
MOIJ **MERCURIO INORGÁNICO TOTAL, ORINA INICIO DE JORNADA**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	3	Rec. 1 mL Orina inicio jornada [Refr.] Inicio de jornada (después de 16h que cese la exposición)	Mercurio en orina (inicio jornada laboral): VLB®-INSST: Inf 30,00 µg/g crea Mercurio : Límite de cuantificación: 5,00 µg/L Para exposición a mercurio elemental y compuestos inorgánicos
HGINO **MERCURIO INORGÁNICO, SANGRE TOTAL**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	3	Rec. 1 mL Sangre total EDTA Dipotásico (libre trazas metales) (1 x Tubo Sangre EDTA metales traza) [Refr.]	VLB®-INSST: Final de la semana laboral (Mercurio elemental y compuestos inorgánicos) Inf 10,00 µg/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
AGHG **MERCURIO, AGUA**	Absorción atómica.	15	Rec. 100 mL Agua (1 x Envase aséptico) [Refr.] Alt. 100 mL Agua (1 x Envase aséptico) (<2 Ác.nítrico)	Agua de diálisis Inf 0,01 mg/L Agua de red Inf 0,001 mg/L
HGPEL **MERCURIO, CABELLO**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	16	Rec. 1 g Cabello Tomar muestra de pelo lo más cercano a la nuca, sin tintes ni coloración.	2,00 - 5,00 µg/g cabello
HGHE **MERCURIO, HECES**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	7	Rec. 1 g Heces (1 x Contenedor estéril) [Refr.]	Ambos 0 - 6 Años Heces no contaminadas: Inf 2,00 ng/g heces Ambos Sup - 6 Años Heces no contaminadas: Inf 10,00 ng/g heces
HGO2 **MERCURIO, ORINA 24H**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	3	Rec. 10 mL Orina 24h. (alícuota) (1 x Contenedor 2500 mL.) [Refr.] Toma de muestra de orina 16 horas después de cesar la exposición.	Mercurio: Inf 20,00 µg/24 h Mercurio: Toxicidad: Sup 150,00 µg/24 h Mercurio: Límite de cuantificación: 5,00 µg/L
HGOR **MERCURIO, ORINA FINAL JORNADA**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	5	Rec. 1 mL Orina final jornada (1 x Tubo 10 mL.) [Refr.] Se aconseja la recogida de orina antes de empezar la jornada laboral y con 16 horas sin exposición.	Mercurio: BAT (MAK&BAT): (Mercurio elemental y compuestos inorgánicos) Inf 25,00 µg/g creat

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
MER **MERCURIO, SANGRE TOTAL**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	3	Rec. 1 mL Sangre total EDTA Dipotásico (libre trazas metales) (1 x Tubo Sangre EDTA metales traza) [Refr.] Toma de muestra al final de la semana laboral (*)	Nota: La concentración de mercurio en sangre puede aparecer elevada debido al consumo de ciertos alimentos como el pescado o por algunos suplementos alimenticios. Ante resultados elevados, se recomienda realizar la determinación de mercurio en orina para confirmar la exposición laboral como la causa de su origen Embarazadas, en periodo de lactancia o en planificación de gestación Mujeres Inf 6,40 µg/L (Mercurio elemental y compuestos inorgánicos) Ambos 0 - 13 Años Inf 6,40 µg/L Ambos Sup - 14 Años Inf 20,00 µg/L
COMESSA **MESCALINA CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SALIVA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	3	Rec. 1 mL Saliva [Refr.]	Incertidumbre de medida 2 ng/mL Límite de cuantificación 10 ng/mL
MSLP **MESOTELINA SOLUBLE, LÍQUIDO PLEURAL**	Enzimoinmunoanálisis	24	Rec. 1 mL Líquido pleural [Refr.] No es necesario estar en ayunas.	Inf 10,50 nmol/L
MESOT **MESOTELINA SOLUBLE, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	24	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] No es necesario estar en ayunas.	Inf 1,50 nmol/L
G18003 **METABOLISMO DE FÁRMACOS · ACE (POLIMORFISMO I/D INTRÓN 16) · A. FRAGMENTOS**	Análisis de Fragmentos	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ACE [Polimorfismo I/D Intrón 16] *1*
G18002 **METABOLISMO DE FÁRMACOS · COMT (Val158Met) · HOT SPOT**	Secuenciación Sanger	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	COMT [Val158Met]
G10019 **METABOLISMO DE SURFACTANTE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABCA3, CSF2RA, CSF2RB, FOXF1, NKX2-1, SFTPB, SFTPC, SLC7A7 *8*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G10014 **METABOLISMO DEL SURFACTANTE PULMONAR TIPO 3, DISFUNCIÓN DEL · ABCA3 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABCA3 *1*
G08103 **METACROMATOSIS · PTPN11 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PTPN11 *1*
COMETOR **METADONA CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), ORINA**	Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectrometría de masas.	5	Rec. 10 mL Orina [Refr.] Cadena de custodia	Incertidumbre de medida 4,3 ng/mL Límite de cuantificación 25 ng/mL Se utiliza como criterio de Positividad que la concentración sea superior o igual al valor del límite de cuantificación más el valor de incertidumbre del ensayo. En caso contrario, el resultado es Negativo.
COMETSA **METADONA CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SALIVA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 1 mL Saliva [Refr.]	Incertidumbre de medida 2,2 ng/mL Límite de cuantificación 10 ng/mL
COMETST **METADONA CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SANGRE**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 10 mL Sangre total Oxalato/Fluoruro (1 x Tubo Sangre Total-Oxalato/Fluoruro) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total Heparina litio (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Tubo oxalato potásico/Fluoruro sódico Ref. SAP 600088318	Incertidumbre de medida 2 ng/mL Límite de cuantificación 10 ng/mL
METD **METADONA, ORINA**	Inmunocromatografía.	1	Rec. 10 mL Orina [Refr.]	Inf 300,00

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
METH **METAHEMOGLOBINA, SANGRE TOTAL**	Espectrometría de absorción molecular	3	Rec. 2 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Envio en tubo especial con vacio.	VLB®-INSST: Final de la jornada laboral (Inductores de metahemoglobina) Inf 1,50 % de Hb VLB®-INSST: Final de la jornada laboral (Nitrobenceno) Inf 1,50 % de Hb Límite de cuantificación: Inf 0,10 % de Hb
G04035 **METAHEMOGLOBINEMIA HEREDITARIA · CYB5R3 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CYB5R3 *1*
MP9P **METALOPROTEINASA 9, PLASMA**	Enzimoinmunoanálisis	30	Rec. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.]	13,20 - 105,00 ng/mL
METF **METANEFRINAS FRACCIONADAS, ORINA**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	6	Rec. 10 mL Orina 24h. (alícuota) (1 x Contenedor 2500 mL.) [Refr.] Se recomienda preservar la orina con HCl (6N) (20 mL) pH=1 - 3 Suspender toda la medicación. Evitar cualquier tipo de ejercicio físico no habitual . Evitar el estrés. (3 días antes de la toma de muestra) No ingerir 5 días antes de la recolección de la orina; té, café, plátano, chocolate, vainilla, queso, bebidas carbonatadas ni ningún tipo de medicamento especialmente de salicilatos, medicación hipotensora y contrastes con yodo.	Metanefrina: Hombres Inf 375,00 µg/24 h Metanefrina: Mujeres Inf 276,00 µg/24 h Normetanefrina: Hombres 18 - 40 Años Inf 660,00 µg/24 h Normetanefrina: Mujeres 18 - 40 Años Inf 550,00 µg/24 h Normetanefrina: Mujeres 41 - 60 Años Inf 632,00 µg/24 h Normetanefrina: Hombres 41 - 60 Años Inf 779,00 µg/24 h Normetanefrina: Mujeres Sup - 60 Años Inf 669,00 µg/24 h Normetanefrina: Hombres Sup - 60 Años Inf 824,00 µg/24 h Volumen de orina remitido (diuresis): 600,00 - 1600,00 mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
MEFR **METANEFRINAS FRACCIONADAS, PLASMA**	Enzimoinmunoanálisis	7	Rec. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Separar el plasma y congelar inmediatamente después de la extracción. Mantener al paciente en reposo 30 minutos previos a la extracción. Medicamentos como agentes antihipertensivos, antidepresivos, antipsicóticos, simpaticomiméticos y L-DOPA pueden influir en los niveles plasmáticos de Metanefrinas. Las bebidas con cafeína, la nicotina y los fármacos que mejoran el estado de ánimo también pueden afectar los niveles de Metanefrinas en plasma. Además, se debe evitar el estrés y la tensión física poco antes de la extracción.	Metanefrina: Inf 100,00 pg/mL Normetanefrina: Inf 216,00 pg/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
MDMA **METANFETAMINAS (ÉXTASIS), ORINA**	Enzimoinmunoanálisis	1	Rec. 10 mL Orina [Refr.] Permite la detección de 3,4-metilendioximetanfetamina (MDMA), 3,4-metilendioxianfetamina (MDA), 3,4-metilendioxietilanfetamina (MDEA), 1,3-benzodioxol-N-metilbutanamida (MBDB), 1,3-benzodioxol butanamina (BDB), para-metoxianfetamina (PMA) y para-metoximetanfetamina (PMMA) en la muestra. Cadena de custodia Se calibra con 3,4-metilendioximetanfetamina (MDMA).	Negativo El valor discriminante de la técnica es 500 ng/mL
MET **METANFETAMINAS, ORINA**	Enzimoinmunoanálisis	1	Rec. 10 mL Orina [Refr.]	
METAO **METANOL, ORINA**	Cromatografía de Gases / Ionización de Llama.	5	Rec. 10 mL Orina final jornada [Refr.]	VLB®-INSST: Final de la jornada laboral (Metanol) Inf 15,00 mg/L
METS **METANOL, SANGRE TOTAL**	Cromatografía de Gases / Ionización de Llama.	5	Rec. 1 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] - Enviar el tubo bien tapado y sin cámara de aire. CONDICIONES PRE-ANALÍTICAS: Final de la jornada laboral.	Personal expuesto Inf 500,00 mg/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
METSU **METANOL, SUERO**	Cromatografía de gases.	2	Rec. 5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Inf 0,10 g/L
METFO **METFORMINA (DIANBEN, METFORMINA EFG), PLASMA**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	20	Rec. 1 mL Plasma (1 x Tubo sangre heparina litio) [Refr.] No utilizar tubos con gel separador.	I.Terapéutico: 0,10 - 4,00 mg/L Conc.Tóxica: Sup 5,00 mg/L
MECE **METILETILCETONA, ORINA**	Cromatografía de Gases / Ionización de Llama.	5	Rec. 1 mL Orina final jornada [Refr.] Final de la jornada laboral.	VLB®-INSST: Final de la jornada laboral (Metiletilacetona) Inf 2,00 mg/L
MFND **METILFENIDATO (RUBIFEN), SUERO**	Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectrometría de masas.	7	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Separar y congelar inmediatamente.	I.Terapéutico: Ambos 0 - 18 Años 6,00 - 26,00 µg/L I.Terapéutico: Ambos Sup - 18 Años 12,00 - 79,00 µg/L
MFDO **METILFENIDATO, ORINA**	Cromatografía de Gases / Espectrometría Masas.	7	Rec. 10 mL Orina [Refr.] Orina reciente después del consumo de la droga.	Negativo
MIBC **METILISOBUTIL CETONA, ORINA**	Cromatografía de Gases / Ionización de Llama.	5	Rec. 10 mL Orina final jornada [Refr.]	VLB®-INSST: Final de la jornada laboral (Metilisobutilcetona) Inf 1,00 mg/L
METO **METOTREXATE, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	4	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Muestra alternativa: plasma EDTA, plasma heparina refrigerada. Protegido de la luz Muestra protegida de la luz	Conc. potencialmente Tóxica: 24 horas Sup 10,00 µmol/L Conc. potencialmente Tóxica: 48 horas Sup 1,00 µmol/L Conc. potencialmente Tóxica: 72 horas Sup 0,20 µmol/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
MGLUR **MGLUR ANTICUERPOS, LCR**	Ensayo celular + Inmunohistoquímica	16	Rec. 2 mL LCR [Refr.] Se requiere recoger la muestra de LCR en tubo de polipropileno.	No se detecta
MGLURS **MGLUR ANTICUERPOS, SUERO**	Ensayo celular + Inmunohistoquímica	16	Rec. 3 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	No se detecta
MHPG **MHPG (3 METOXI 4 HIDROXIFENILETILENGLICOL), ORINA**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	21	Rec. 10 mL Orina 24h. (alícuota) (1 x Contenedor 2500 mL.) [Refr.] Muestra protegida de la luz Suspender tratamiendo con Tricíclicos 1 semana antes.	1,40 - 2,40 mg/24 h
AM12 **MI-1/MI-2 ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	La inmunofluorescencia no es la técnica de elección para analizar antigenicidades. Se debería solicitar una técnica específica (inmunoblot) para completar el estudio clínico. Interpretación: Negativo: Inf 1/160 Interpretación: Positivo: Sup= 1/160
MI2IB **MI-2 anticuerpos anti-sintetasa, suero**	Inmunoblot.	7	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Plasma EDTA, heparina o citrato.	No se detecta

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
MIANS **MIANSERINA, SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	6	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] El contenedor recomendado es el tubo seco (sin gel separador) para evitar procesos de adsorción del fármaco. En caso de no disponer de tubo seco, la extracción se puede realizar en tubo con gel separador, separando el suero dentro de las 2 horas posteriores a la recolección y transfiriéndolo a un tubo de alícuota para su transporte al laboratorio. Rechazo: Muestra hemolizada, lipémica y/o ictérica	I.Terapéutico: 15,00 - 70,00 µg/L Toxicidad: Sup 140,00 µg/L Límite de cuantificación: 4,00 µg/L	
G11076 **MIASTENIA CONGÉNITA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AGRN, ALG14, ALG2, CHAT, CHRNA1, CHRNB1, CHRND, CHRNE, CHRNG, COLQ, DOK7, DPAGT1, GFPT1, GMPPB, LAMB2, LRP4, MUSK, PLEC, PREPL, RAPSN, SCN4A, SLC5A7, SYT2	*23*
G11252 **MIASTENIA CONGÉNITA 4A, 4B, 4C · CHRNE · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CHRNE	*1*
G11294 **MIASTÉNICO CONGÉNITO, SÍNDROME · DOK7 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	DOK7	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
fMICOO **MICOFENÓLICO ÁCIDO, PLASMA**	Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectrometría de masas.	4	Rec. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis.	I.Terapéutico: Trasplante corazón-MPA comedicación inh.calcineurina-glucocorticoides: Sup= 2,00 mg/L I.Terapéutico: Trasplante hepático: 1,00 - 3,50 mg/L I.Terapéutico: Trasplante renal: Ambos 0 - 12 Años Sup= 1,30 mg/L I.Terapéutico: Trasplante renal-MPA comedicación con Ciclosporina A Ambos Sup - 12 Años Sup= 1,30 mg/L I.Terapéutico: Trasplante renal - MPA comedicación con Tacrolimus Ambos Sup - 12 Años Sup= 1,90 mg/L Límite de cuantificación: 0,40 - 0,4 mg/L
G11221 **MICRO (WARBURG), SÍNDROME · RAB3GAP1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	RAB3GAP1 *1*
G08113 **MICRO, SÍNDROME · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	RAB18, RAB3GAP1, RAB3GAP2 , TBC1D20 *4*
MALB **MICROALBUMINA (CONCENTRACIÓN), ORINA**	Turbidimetría.	1	Rec. 1 mL Orina [Refr.]	mg/dL Interpretación según criterio clínico
MCPU **MICROALBÚMINA / CREATININA ÍNDICE, ORINA**	Turbidimetría.	1	Rec. 1 mL Orina [Refr.]	Microalbúmina (concentración): mg/dL Interpretación según criterio clínico Excreción (creatinina): Inf 30,00 mg/g creat
MAL2 **MICROALBUMINA, ORINA 24H**	Turbidimetría.	1	Rec. 1 mL Orina 24h. (alícuota) (1 x Contenedor 2500 mL.) [Refr.]	Microalbumina, urina 24H: Inf 30,00 mg/24h Volumen de orina remitido (diuresis): 600,00 - 1600,00 mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
DI **MICROBIOTA INTESTINAL CON PATÓGENOS (PARÁSITOS + VIRUS)**	No se aplica.	20	Rec. 1 Muestra/s Heces (1 x Kit específico) [Refr.] Heces recogidas en kit específico (550000528) facilitado por el laboratorio. Seguir instrucciones facilitadas en el kit. Las muestras deben llegar al laboratorio central de lunes a miércoles, evitando vísperas de festivos. Se requiere peticionario específico cumplimentado. No tomar corticoides, antibióticos ni antihistamínicos durante los 20 días anteriores a la obtención de la muestra. Pacientes que se hayan sometido a tratamientos de radioterapia o quimioterapia deben esperar al menos 4 semanas antes de realizar la toma de muestra. No se recomienda realizar este estudio en niños menores de 5 años. Para niños de 3 a 5 años, el test debe ser prescrito y supervisado por un profesional de la salud.	Adenovirus: Inf 1,00 Blastocystis hominis: Inf 1,00 Cestodos: Inf 1,00 Escherichia coli: Inf 900000,00 CFU/g Escherichia coli: Normal: 900001,00 - 1000000000,00 CFU/g Hongos: 1,00 - 3,00 Hongos INTERPRETACIÓN: 1,00 - 3,00 CFU/g COPROFLORA - Interpretación: Indicado en informe adjunto pH: 5,80 - 6,50 Chilomastix mesnili: Inf 1,00 Cryptosporidium sp.: Inf 1,00 Cyclospora sp.: Inf 1,00 Dientamoeba fragilis: Inf 1,00 Entamoeba hystolitica: Inf 1,00 Entamoeba coli: Inf 1,00 Entamoeba hartmanni: Inf 1,00 Endolimax nana: Inf 1,00 Giardia intestinalis: Inf 1,00 Iodamoeba butchslii: Inf 1,00 Cystoisospora belli: Inf 1,00 Nemátodos: Inf 1,00 : Se informa para cada paciente Rotavirus: Inf 1,00 Trematódos: Inf 1,00

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
AMMV **MICROBIOTA VAGINAL PCR, ESTUDIO**	RT-PCR	7	Rec. 1 Muestra/s Exudado vaginal (1 x Copan eNAT) Alt. 1 Muestra/s Exudado vaginal (1 x Omnigene·Vaginal (OMR-130)) Exudado vaginal recogido en kit específico (Sistema de Copan e NAT) facilitado por el laboratorio. Seguir instrucciones de toma de muestra facilitadas en el kit. Se requiere peticionario específico. La paciente no debe tomar antibióticos, ni utilizar soluciones antisépticas vaginales, óvulos ni pomadas al menos un mes antes de la toma de muestra. Las pacientes que se hayan sometido a tratamientos antibióticos deben esperar al menos 1 mes antes de realizar la toma de muestra.	DNA de Mycoplasma hominis: No se detecta DNA Atopobium vaginae: UFC/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. DNA Candida albicans en muestra biológica: No se detecta DNA de Chlamydia trachomatis: No se detecta DNA de Neisseria gonorreae: No se detecta DNA Gardnerella vaginalis: UFC/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. DNA Lactobacillus spp: UFC/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. DNA Mycoplasma genitalium: No se detecta DNA Mobiluncus spp: Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. DNA Trichomona vaginales: No se detecta DNA de Ureaplasma urealyticum/parvum: No se detecta
G11299 **MICROCEFALIA · PANEL · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Indicado en informe adjunto ASPM, CDK5RAP2, CENPJ, MCPH1, STIL, WDR62

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G11168 **MICROCEFALIA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AGMO, AKT3, AP4M1, ARFGEF2, ASPM, ATR, ATRX, BUB1B, CASK, CDC6, CDK5RAP2, CDKL5, CDT1, CENPJ, CEP135, CEP152, CEP57, CEP63, CHMP1A, COX7B, DHCR7, DIAPH1 , DNA2, DNM1L, DYRK1A , EFTUD2, EIF2S3, EXOSC3, FOXG1 , IER3IP1 , KIAA1279, KIF11, KIF2A, KIF5C, LIG4, MBD5, MCM5, MCPH1, MECP2, MED17, MFF, MFSD2A, MIR17HG, MRE11A, MSMO1, MYCN, NBN, NDE1, NHEJ1, NIN, NIPBL, OPHN1, ORC1, ORC4, ORC6, PAFAH1B1, PCNT, PNKP, POMT1, PQBP1, RAB18, RAB3GAP1, RAB3GAP2 , RARS2, RBBP8, RNU4ATAC, RTTN, SEPSECS, SLC25A19, SLC9A6, STAMBP, STIL, TBC1D20, TBC1D23, TCF4 , TOE1, TRAPPC9, TSEN2, TSEN34, TSEN54, TUBA8, TUBB2B, TUBB3, TUBG1, TUBGCP4, TUBGCP6, UBE3A , VRK1, WDFY3, WDR62, WWOX, XRCC4, ZEB2, ZNF335	*94*
G11169 **MICROCEFALIA AR · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AGMO, ASPM, CDK5RAP2, CENPJ, CEP135, CEP152, MCPH1, MFSD2A, STIL, TUBGCP4, TUBGCP6, WDFY3, WDR62, ZNF335	*14*
G11258 **MICROCEFALIA AR TIPO 6 · CENPJ · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CENPJ	*1*
G12027 **MICROCÓRNEA, DISTROFIA DE CONOS Y BASTONES, CATARATAS Y ESTAFILOMA POSTERIOR (MRCS), SÍNDROME DE · BEST1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BEST1	*1*
G11284 **MICRODELECIÓN 17q12, SÍNDROME DE · 17q12 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]		
G4240 **MICRODELECIÓN 1p36, SÍNDROME DE · 1p36 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	[1p36]	*1*
G12028 **MICROFTALMIA · BCOR · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BCOR	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G4060 **MICROFTALMIA · SOX2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SOX2 *1*
G12029 **MICROFTALMIA/ANOFTALMIA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABCB6, ALDH1A3 , BCOR, BMP4, CHD7, FOXE3, FREM1, GDF3, GDF6, HCCS, MFRP , NAA10, OTX2, PAX2, PAX6, PRSS56 , RARB, RAX , RBP4, SALL2, SHH, SMOC1, SOX2, STRA6, TENM3, VAX1, VSX2 *27*
G12030 **MICROFTALMIA/ANOFTALMIA Y OTROS SINDROMES ASOCIADOS · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABCB6, ALDH1A3 , BCOR, BMP4, BMP7, C12orf57, CHD7, ERCC1, ERCC2, ERCC5, ERCC6, FOXE3, FRAS1, FREM1, FREM2, GDF3, GDF6, GJA1, GRIP1, HCCS, HESX1, HMX1, MFRP , MITF, NAA10, NDP, OCRL, OTX2, PAX2, PAX6, PRSS56 , PXDN , RAB18, RAB3GAP1, RAB3GAP2 , RARB, RAX , RBP4, SALL2, SHH, SMOC1, SOX2, STRA6, TBC1D20, TENM3, TFAP2A, VAX1, VSX2 *48*
PRMF **MICROPOLYSPORA FAENI PRECIPITINAS, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 1,00 U/mL Indeterminado: 1,00 - 2,00 U/mL Positivo: Sup 2,00 U/mL
LKM **MICROSOMALES HEPATICOS/RENALES (LKM) ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/40 Interpretación: Positivo: Sup= 1/40
DMCS **MICROSPORIDIUM SPP DNA, MUESTRA BIOLOGICA**	RT-PCR	7	Rec. 5 g Heces (1 x Contenedor estéril) [Refr.] Rec. 2 mL Orina (1 x Tubo estéril) [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Biopsia intestinal (1 x Contenedor estéril) [Refr.]	No se detecta

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
MIDAZ **MIDAZOLAM, SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	6	Rec. 500 uL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 500 uL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis. Rechazo: Muestra hemolizada, lipémica y/o ictérica	I.Terapéutico: 40,00 - 100,00 µg/L Toxicidad: Sup 100,00 µg/L Límite de cuantificación: 5,00 µg/L	
G13093 **MIELODISPLÁSICO (SMD), SÍNDROME · SF3B1 (EXONES 12, 13, 14, 15) · HOT SPOT**	Hot Spot	7	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA (2 tubos)) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea EDTA (1 x Tubo sangre EDTA (2 tubos)) [Refr.]	SF3B1 [exones 12, 13, 14, 15]	*1*
G13094 **MIELODISPLÁSICO (SMD, LMMC, LAM), SÍNDROME · ASXL1 (EXON 12, 13) · HOT SPOT**	Hot Spot	7	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ASXL1 [12]	*1*
MGRA **MIELOGRAMA, MÉDULA ÓSEA**	Tinción / Observación microscópica.	1	Rec. 1 Muestra/s Frotis (1 x Portaobjetos)		

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G13032 **MIELOMA MÚLTIPLE (MM) · PANEL · FISH**	Panel FISH	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	CDKN2C [1q21] , CKS1B [1p32] , DLEU1 [13q14] , IGH [14q32] , TP53 [17p13] *5*
G13130 **MIELOMA MÚLTIPLE (MM) CON SELECCIÓN CD138+ · PANEL · FISH**	Panel FISH	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (1 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea Heparina sódica (1 x Tubo sangre heparina sódica (2 tubos)) [Refr.]	CDKN2C [1q21] , CKS1B [1p32] , DLEU1 [13q14] , IGH [14q32] , TP53 [17p13] *5*
ACMPO **MIELOPEROXIDASA (MPO) ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunoanálisis con detección fluorescente	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 3,50 UI/mL Indeterminado: 3,50 - 5,00 UI/mL Positivo: Sup 5,00 UI/mL
G13096 **MIELOPROLIFERATIVO CRONICO (SMC), SÍNDROME · MPL(S505N) · HOT SPOT**	Hot Spot	7	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	MPL [S505N] *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G13145 **MIELOPROLIFERATIVO CRÓNICO, SÍNDROME · MPL (EXON 10) · HOT SPOT**	Hot Spot	7	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	MPL [10]	*1*
G13140 **MIELOPROLIFERATIVO CRONICO, SINDROME · MPL(W515L/K) · HOT SPOT**	Hot Spot	7	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	MPL [W515L/K]	*1*
G11077 **MIGRAÑA FAMILIAR HEMIPLÉJICA · SCN1A · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SCN1A	*1*
G11156 **MIGRAÑA FAMILIAR HEMIPLÉJICA Y OTROS SÍNDROMES RELACIONADOS · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ATP1A2 , ATP1A3, CACNA1A, PRRT2 , SCN1A, SLC2A1	*6*
MIGRAT **MIGRATEST (TEST ACTIVIDAD DE DAO)**	Radioinmunoanálisis.	7	Rec. 3.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Ayuno mínimo de 8 horas. No realizar durante el embarazo ni en caso de shock anafiláctico. Peticionario general. Adjuntar documentación junto con la muestra Realizar la extracción en horario compatible con el envío de la muestra el mismo día de la extracción.	Alta incidencia de intolerancia a la histamina : Inf 3.74 U/ml (Inf40 HDU) Posible incidencia de intolerancia a la histamina: 3.74-12.54 U/ml (40-80 HDU) Baja incidencia de intolerancia a la histamina : Sup 12.54 U/ml (Sup80 HDU)	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
MIGGEN					
MIGRATEST (TEST GENETICO DE DAO)	PCR - RT-PCR	11	Rec. 3 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Se requiere consentimiento informado. Se requiere peticionario específico. Realizar la extracción en horario compatible con el envío de la muestra el mismo día de la extracción. No es necesario estar en ayunas.	AOC1 [rs1049793, rs1049742, rs2052129, rs10156191]	*1*
MIGGEAC					
MIGRATEST (TEST GENÉTICO Y DE ACTIVIDAD DAO)	No se aplica.	11	Rec. 3.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Rec. 3 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Se requiere consentimiento informado. Se requiere peticionario específico. Realizar la extracción en horario compatible con el envío de la muestra el mismo día de la extracción. Ayuno de 8 horas. No realizar durante el embarazo ni en caso de shock anafiláctico.	Alta incidencia de intolerancia a la histamina : Inf 3.74 U/ml (Inf40 HDU) Posible incidencia de intolerancia a la histamina: 3.74-12.54 U/ml (40-80 HDU) Baja incidencia de intolerancia a la histamina : Sup 12.54 U/ml (Sup80 HDU) AOC1 [rs1049793, rs1049742, rs2052129, rs10156191]	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G1019 **MILLER-DIEKER, SÍNDROME DE · 17p13.3 · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	[17q13.3] *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
MTXP **MINERAL HAIR TEST (TÓXICOS), CABELLO**	Plasma acoplado inductivamente / Espectroscopia de Emisión Óptica	16	Rec. 1 g Cabello - Cortar mechones de cabello de las partes más cercanas a la nuca y en cantidad suficiente para el análisis. - Cortar unos 2-3 mechones de cabello justo en la parte que queda en la base en contacto con la nuca. Puede cortarse con tijeras de acero inoxidable o navaja. - Horizontalmente separar el cabello a la altura de a mitad de la parte de detrás de la nuca, separándolo hacia arriba apoyándolo en la cabeza. - Remitir el cabello sin tintes ni contaminantes externos. - Si está permanentado, esperar a que pase un tiempo para la recogida. - Si tiene tinte, recoger la muestra después de un mes de haber sido teñido, escogiendo aquellas partes que se vean no teñidas. 1. Recogida 1g de cabello de 2-3 cm (2-3 mechones), de la 2. Colocar el cabello dentro de la tarjeta de recogida. Rotular con el nombre del paciente,	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
			dirección y teléfono. No olvidar cumplimentar los todos los datos que constan en la ficha junto con la bolsa que se adjunta. 3. Lleve la muestra al laboratorio lo antes posible. Necesario rellenar cuestionario especifico. parte más cercana a la nuca. Utilizar kit de recogida especial (que proporciona el laboratorio; seguir recomendaciones). Nunca envolver la muestra en papel de aluminio. Remitir sin tintes ni contaminantes externos. Pauta para la recogida: Personas con el cabello corto: Personas con el cabello largo: RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA RECOGIDA DE CABELLO PARA LA DETERMINACIÓN DE METALES Y TÓXICOS	
G01043 **MIOCARDIOPATÍA ARRITMOGÉNICA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CTNNA3, DES, DNAJC19, DSC2, DSG2, DSP, FLNC , JUP, LDB3, LMNA, PKP2, PLN, PRKAG2, RYR2, SCN5A, TGFB3, TMEM43, TTN *18*
G01147 **MIOCARDIOPATÍA ARRITMOGÉNICA DEL VENTRÍCULO DERECHO · PKP2 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PKP2 *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G01136 **MIOCARDIOPATÍA ARRITMOGÉNICA DEL VENTRÍCULO DERECHO · DSP · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	DSP	*1*
G01047 **MIOCARDIOPATÍA ARRITMOGÉNICA DEL VENTRÍCULO DERECHO · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CTNNA3, DES, DSC2, DSG2, DSP, JUP, LDB3, LMNA, PKP2, PLN, RYR2, SCN5A, TGFB3, TMEM43, TTN	*15*
G01044 **MIOCARDIOPATÍA ARRITMOGÉNICA DEL VENTRÍCULO DERECHO · PKP2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PKP2	*1*
G01045 **MIOCARDIOPATÍA ARRITMOGÉNICA DEL VENTRÍCULO DERECHO · RYR2 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	RYR2	*1*
G01046 **MIOCARDIOPATÍA ARRITMOGÉNICA DEL VENTRÍCULO DERECHO TIPO 5 · TMEM43 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TMEM43	*1*
G01049 **MIOCARDIOPATÍA DILATADA · DMD · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	DMD	*1*
G01051 **MIOCARDIOPATÍA DILATADA · LDB3 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	LDB3	*1*
G01052 **MIOCARDIOPATÍA DILATADA · LMNA · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	LMNA	*1*
G01053 **MIOCARDIOPATÍA DILATADA · MYBPC3 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	MYBPC3	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G01054 **MIOCARDIOPATÍA DILATADA · MYH7 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	MYH7 *1*
G01048 **MIOCARDIOPATÍA DILATADA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABCC9, ACTC1, ACTN2, ANKRD1, BAG3, CAV3, CRYAB, CSRP3, CTF1, DES, DMD, DNAJC19, DOLK, DSC2, DSG2, DSP, EMD, EYA4, FHL2, FKRP, FKTN, FLNC , GATA4, GATAD1, HCN4, ILK, JUP, LAMA4, LAMP2, LDB3, LMNA, MYBPC3, MYH6, MYH7, MYPN, NEBL, NEXN, PDLIM3, PKP2, PLN, PRDM16, PSEN1, PSEN2, RAF1, RBM20, RYR2, SCN5A, SDHA, SGCD, SYNE1, SYNE2, TAZ, TBX20, TCAP, TMPO, TNNC1, TNNI3, TNNT2, TPM1, TTN, TTR, TXNRD2, VCL *63*
G01162 **MIOCARDIOPATÍA DILATADA · SCN5A · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SCN5A *1*
G01185 **MIOCARDIOPATÍA DILATADA NO COMPACTADA AMPLIADO · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABCC9, ACAD9, ACTA1, ACTC1, ACTN2, ALMS1, ALPK3, ANKRD1, ANO5, BAG3, BAG5, CAP2, CASZ1, CAV3, CAVIN4, CDH2, CPT2, CRYAB, CSRP3, CTF1, DES, DMD, DNAJC19, DOLK, DPM3, DSC2, DSG2, DSP, DTNA, EMD, EPG5, EYA4, FHL1, FHL2, FHOD3, FKRP, FKTN, FLII, FLNC, GATA4, GATA5, GATAD1, GATC, GBE1, GET3, GLA, GLB1, HADHB, HAND1, HAND2, HCN4, ILK, ISL1, JPH2, JUP, KLHL24, LAMA4, LAMP2, LDB3, LEMD2, LMNA, LMOD2, LRRC10, MEF2C, MIB1, MYBPC3, MYBPHL, MYH6, MYH7, MYL2, MYL3, MYLK3, MYPN, MYZAP, NDUFB11, NEBL, NEXN, NKX2-5, NONO, NRAP, PCCA, PCCB, PDLIM3, PGM1, PKP2, PLEKHM2, PLN, PPA2, PPCS, PPP1R13L, PRDM16, PRKAG2, PSEN1, PSEN2, QRSL1, RAB3GAP2, RAF1, RBM20, RPL3L, RYR2, SCN5A, SDHA, SDHD, SGCA, SGCB, SGCD, SLC22A5, SPEG, SYNE1, SYNE2, TAFAZZIN, TBX20, TBX5, TCAP, TMEM43, TNNC1, TNNI3, TNNI3K, TNNT2, TPM1, TSFM, TTN, TTR, TXNRD2, VCL, VEZF1, XK, ZBTB17
G01055 **MIOCARDIOPATÍA DILATADA TIPO 1D · TNNT2 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TNNT2 *1*
G01056 **MIOCARDIOPATÍA DILATADA TIPO 1FF · TNNI3 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TNNI3 *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G01057 **MIOCARDIOPATÍA DILATADA TIPO 1G · TTN · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TTN	*1*
G01058 **MIOCARDIOPATÍA DILATADA TIPO 1HH · BAG3 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BAG3	*1*
G01059 **MIOCARDIOPATÍA DILATADA TIPO 1I · DES · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	DES	*1*
G01060 **MIOCARDIOPATÍA DILATADA TIPO 1L · SGCD · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SGCD	*1*
G01061 **MIOCARDIOPATÍA DILATADA TIPO 1R · ACTC1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ACTC1	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G01179 **MIOCARDIOPATÍA FAMILIAR (+MCH, MCD, NO COMPACTADA, ARRITMOGÉNICA Y RESTRICTIVA) · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AARS2, ABCC9, ACAD9, ACADVL, ACTA1, ACTC1, ACTN2, AGK, AGL, AGPAT2, ALMS1, ALPK3, ANK2, ANKRD1, ANO5, ATP5F1E, ATP6V1A, ATPAF2, B3GAT3, BAG3, BAG5, BRAF, BSCL2, C1QBP, CACNA1C, CALR3, CAP2, CASQ2, CASZ1, CAV3, CAVIN4, CBL, CDH2, COA5, COA6, COQ2, COX15, COX6B1, CPT2, CRYAB, CSRP3, CTF1, CTNNA3, DES, DLD, DMD, DNAJC19, DOLK, DPM3, DSC2, DSG2, DSP, DTNA, ELAC2, EMD, EPG5, EYA4, FAH, FASTKD2, FBXL4, FHL1, FHL2, FHOD3, FKRP, FKTN, FLII, FLNC, FNIP1, FOXRED1, FXN, GAA, GATA4, GATA5, GATA6, GATAD1, GATC, GBE1, Genoma mitocondrial, GET3, GLA, GLB1, GNPTAB, GUSB, GYG1, GYS1, HADHB, HAND1, HAND2, HCN4, HRAS, ILK, ISL1, JPH2, JUP, KLF10, KLHL24, KRAS, LAMA4, LAMP2, LDB3, LEMD2, LIAS, LMNA, LMOD2, LRRC10, LZTR1, MAP2K1, MAP2K2, MEF2C, MIB1, MICOS13, MIPEP, MLYCD, MRAS, MRPL3, MRPL44, MRPS22, MTO1, MYBPC3, MYBPHL, MYH6, MYH7, MYL2, MYL3, MYLK2, MYLK3, MYOM1, MYOZ2, MYPN, MYZAP, NAA10, NDUFB11, NEBL, NEK8, NEXN, NF1, NKX2-5, NONO, NRAP, NRAS, OBSCN, PCCA, PCCB, PDLIM3, PGM1, PHKA1, PHKB, PKP2, PLEKHM2, PLN, PMM2, PPA2, PPCS, PPP1CB, PPP1R13L, PRDM16, PRKAG2, PSEN1, PSEN2, PTPN11, QRSL1, RAB3GAP2, RAF1, RBM10, RBM20, RIT1, RPL3L, RRAS, RYR2, SCN5A, SCO2, SDHA, SDHD, SGCA, SGCB, SGCD, SGCG, SHOC2, SLC22A5, SLC25A3, SLC25A4, SOS1, SOS2, SPEG, SURF1, SYNE1, SYNE2, TAFAZZIN, TBX20, TBX5, TCAP, TGFB3, TMEM43, TMEM70, TMOD1, TNNC1, TNNI3, TNNI3K, TNNT2, TPM1, TRIM54, TRIM63, TRMT10C, TRMT5, TSFM, TTN, TTR, TXNRD2, VARS2, VCL, VEZF1, XK, ZBTB17	
G01062 **MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA · FLNC · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FLNC	*1*
G01065 **MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA · LDB3 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	LDB3	*1*
G01066 **MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA · MYBPC3 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	MYBPC3	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G01067 **MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA · MYH7 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	MYH7	*1*
G9644 **MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA · PANEL A · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	MYBPC3, MYH7, MYL2, MYL3, TNNI3, TNNT2, TPM1	*7*
G9642 **MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA · PANEL B · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ACTC1, ACTN2, CSRP3, MYBPC3, MYH6, MYH7, MYL2, MYL3, MYOZ2, NEXN, PLN, TCAP, TNNC1, TNNI3, TNNT2, TPM1	*16*
G01063 **MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA · PANEL C · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ACTC1, ACTN2, AGL, ANKRD1, BAG3, CALR3, CASQ2, CAV3, COX15, CRYAB, CSRP3, DES, FLNC , GAA, GLA, JPH2, LAMP2, LDB3, MYBPC3, MYH6, MYH7, MYL2, MYL3, MYLK2, MYO6, MYOZ2, MYPN, NEXN, PDLIM3, PLN, PRKAG2, TAZ, TCAP, TNNC1, TNNI3, TNNT2, TPM1, TTN, TTR, VCL	*40*
G01184 **MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA AMPLIADO · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AARS2, ABCC9, ACAD9, ACADVL, ACTA1, ACTC1, ACTN2, AGK, AGL, AGPAT2, ALPK3, ANK2, ANKRD1, ATP5F1E, ATP6V1A, ATPAF2, B3GAT3, BAG3, BRAF, BSCL2, C1QBP, CACNA1C, CALR3, CASQ2, CAV3, CBL, CDH2, COA5, COA6, COQ2, COX15, COX6B1, CRYAB, CSRP3, DES, DLD, ELAC2, EPG5, FAH, FASTKD2, FBXL4, FHL1, FHL2, FHOD3, FLNC, FNIP1, FOXRED1, FXN, GAA, GATA6, GATC, Genoma mitocondrial, GLA, GLB1, GNPTAB, GUSB, GYG1, GYS1, HRAS, JPH2, KLF10, KLHL24, KRAS, LAMP2, LDB3, LIAS, LMNA, LZTR1, MAP2K1, MAP2K2, MEF2C, MICOS13, MIPEP, MLYCD, MRAS, MRPL3, MRPL44, MRPS22, MTO1, MYBPC3, MYH6, MYH7, MYL2, MYL3, MYLK2, MYOM1, MYOZ2, MYPN, NAA10, NEK8, NEXN, NF1, NRAS, OBSCN, PDLIM3, PHKA1, PHKB, PLN, PMM2, PPA2, PPP1CB, PRKAG2, PTPN11, QRSL1, RAF1, RBM10, RBM20, RIT1, RRAS, RYR2, SCO2, SDHA, SDHD, SGCG, SHOC2, SLC22A5, SLC25A3, SLC25A4, SOS1, SOS2, SURF1, TAFAZZIN, TCAP, TMEM70, TMOD1, TNNC1, TNNI3, TNNT2, TPM1, TRIM54, TRIM63, TRMT10C, TRMT5, TSFM, TTR, VARS2, VCL	
G01068 **MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA FAMILIAR · CAV3 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CAV3	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G01064 **MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA FAMILIAR TIPO 9 · TTN · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TTN *1*
G01069 **MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA TIPO 11 · ACTC1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ACTC1 *1*
G01070 **MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA TIPO 2 · TNNT2 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TNNT2 *1*
G01071 **MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA TIPO 7 · TNNI3 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TNNI3 *1*
G01073 **MIOCARDIOPATÍA NO COMPACTADA · DMD · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	DMD *1*
G01074 **MIOCARDIOPATÍA NO COMPACTADA · LDB3 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	LDB3 *1*
G01075 **MIOCARDIOPATÍA NO COMPACTADA · MYBPC3 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	MYBPC3 *1*
G01076 **MIOCARDIOPATÍA NO COMPACTADA · MYH7 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	MYH7 *1*
G01072 **MIOCARDIOPATÍA NO COMPACTADA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABCC9, ACTC1, ACTN2, ANKRD1, BAG3, CASQ2, CSRP3, DES, DMD, DMPK, DNAJC19, DSP, DTNA, FHL1, FLNC , GLA, HCN4, JPH2, LAMP2, LDB3, LMNA, MIB1, MYBPC3, MYH6, MYH7, MYL2, MYL3, NKX2-5, NNT, NOTCH1, PKP2, PLN, PRDM16, RYR2, SCN5A, TAZ, TCAP, TNNC1, TNNI3, TNNT2, TPM1, TTN, VCL *43*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G01077 **MIOCARDIOPATÍA NO COMPACTADA TIPO 6 · TNNT2 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TNNT2 *1*
G01079 **MIOCARDIOPATÍA RESTRICTIVA · FLNC · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FLNC *1*
G01078 **MIOCARDIOPATÍA RESTRICTIVA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ACTC1, BAG3, DES, FLNC , GLA, LAMP2, LMNA, MYBPC3, MYH7, MYL2, MYL3, MYPN, RCM2, TCAP, TNNC1, TNNI3, TNNT2, TPM1, TTN, TTR *20*
G01080 **MIOCARDIOPATÍA RESTRICTIVA FAMILIAR TIPO 1 · TNNI3 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TNNI3 *1*
G01081 **MIOCARDIOPATÍA RESTRICTIVA FAMILIAR TIPO 3 · TNNT2 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TNNT2 *1*
G01171 **MIOCARDIOPATÍAS COMPLETO · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABCC9, ACTC1, ACTN2, AGL, ALPK3, ANKRD1, BAG3, CALR3, CASQ2, CAV3, COX15, CRYAB, CSRP3, CTF1, CTNNA3, DES, DMD, DMPK, DNAJC19, DOLK, DSC2, DSG2, DSP, DTNA, EMD, EYA4, FHL1, FHL2, FKRP, FKTN, FLNC , GAA, GATA4, GATAD1, GLA, HCN4, ILK, JPH2, JUP, LAMA4, LAMP2, LDB3, LMNA, MIB1, MYBPC3, MYH6, MYH7, MYL2, MYL3, MYLK2, MYO6, MYOZ2, MYPN, NEBL, NEXN, NKX2-5, NNT, NOTCH1, PDLIM3, PKP2, PLN, PRDM16, PRKAG2, PSEN1, PSEN2, RAF1, RBM20, RYR2, SCN5A, SDHA, SGCD, SYNE1, SYNE2, TAZ, TBX20, TCAP, TGFB3, TMEM43, TMPO, TNNC1, TNNI3, TNNT2, TPM1, TTN, TTR, TXNRD2, VCL *87*
MIOOM **MIOGLOBINA (CONCENTRACIÓN), ORINA**	Nefelometría.	2	Rec. 5 mL Orina [Refr.]	Inf 25,00 µg/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
MIOR **MIOGLOBINA, ORINA 24H**	Nefelometría.	1	Rec. 5 mL Orina 24h. (alícuota) (1 x Contenedor 2500 mL.) [Refr.]	Excreción (24h): Inf 50,00 µg/24h Volumen de orina remitido (diuresis): 600,00 - 1600,00 mL
MIOGAB **MIOGLOBINA, SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Hombres Inf 93,00 µg/L Mujeres Inf 68,00 µg/L
MIOGB **MIOGLOBINA, SUERO**	Nefelometría.	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 1 mL Plasma EDTA [Refr.]	Inf 72,00 µg/L
G11079 **MIOPATÍA CAP TIPO 1 · TPM3 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TPM3 *1*
G11080 **MIOPATÍA CENTRONUCLEAR · DNM2 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	DNM2 *1*
G11081 **MIOPATÍA CONGÉNITA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ACTA1, BIN1, CCDC78, CFL2, CNTN1, DNM2, FHL1, FKBP14, KBTBD13, KLHL40, KLHL41, MEGF10, MTM1, MTMR14, MYF6, MYH7, NEB, PLAGL1, RYR1, SCN4A, SEPN1, TNNT1, TPM2, TPM3, TTN *25*
G11082 **MIOPATÍA CONGÉNITA CENTRAL CORE · RYR1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	RYR1 *1*
G11083 **MIOPATÍA CONGÉNITA CON DESPROPORCIÓN DE FIBRAS · TPM3 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TPM3 *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G11084 **MIOPATÍA CONGÉNITA POR DESPROPORCIÓN DEL TIPO DE FIBRA · SEPN1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SEPN1	*1*
G11085 **MIOPATÍA DE INICIO TEMPRANO CON MIOCARDIOPATÍA FATAL · TTN · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TTN	*1*
G11087 **MIOPATÍA DISTAL · FLNC · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FLNC	*1*
G11086 **MIOPATÍA DISTAL · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ANO5, BAG3, CAV3, CRYAB, DES, DNAJB6, DYSF, FLNC , GNE, HSPB1, HSPB8, KLHL9, LDB3, MATR3, MYH7, MYOT, NEB, SQSTM1, TIA1, TTN, VCP	*21*
G11088 **MIOPATÍA DISTAL DE INICIO PRECOZ DE LAING · MYH7 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	MYH7	*1*
G11089 **MIOPATÍA DISTAL TIPO TATEYAMA · CAV3 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CAV3	*1*
G11090 **MIOPATÍA ESCAPULOPERONEAL · FHL1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FHL1	*1*
G11091 **MIOPATÍA LIGADA AL CROMOSOMA X · FHL1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FHL1	*1*
G11092 **MIOPATÍA LIGADA AL CROMOSOMA X TIPO 1A · FHL1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FHL1	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G11093 **MIOPATÍA LIGADA AL CROMOSOMA X TIPO 1B · FHL1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FHL1	*1*
G0116 **MIOPATIA LIPÍDICA- CARNITINA PALMITOIL TRANSFERASA TIPOS 1 Y 2, DEFICIENCIA DE · CPT1A, CPT2 · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CPT1A, CPT2	*2*
G11094 **MIOPATÍA MINICORE CON OFTALMOPLEJIA EXTERNA · RYR1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	RYR1	*1*
G11096 **MIOPATÍA MIOFIBRILAR · FLNC · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FLNC	*1*
G11097 **MIOPATÍA MIOFIBRILAR · LDB3 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	LDB3	*1*
G11095 **MIOPATÍA MIOFIBRILAR · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ACTA1, BAG3, CRYAB, DES, DNAJB6, FHL1, FLNC , HSPB8, LDB3, MYOT, PLEC, TTN	*12*
G11098 **MIOPATÍA MIOFIBRILAR TIPO 1 · DES · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	DES	*1*
G11078 **MIOPATÍA MIOFIBRILAR TIPO 6 · BAG3 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BAG3	*1*
G07018 **MIOPATIA MITOCONDRIAL · MELAS-MERFF-NARP · HOT SPOT**	Hot Spot	20	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	MT-ATP6 [m.8993T>G/C] , MT-ND5 [m.13513G>A] , MTTK [m.8344A>G, m.8356T>C, m.8363G>A, y m.8361G>A] , MT-TL1 [m.3243A>G, m.3252A>G, m.3256C>T, m.3271T>C, m.3291T>C]	*4*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G11099 **MIOPATÍA NEMALÍNICA · NEB · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	NEB	*1*
G11100 **MIOPATÍA NEMALÍNICA AD O AR TIPO 1 · TPM3 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TPM3	*1*
G11101 **MIOPATÍA POR ACUMULACIÓN DE MIOSINA · MYH7 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	MYH7	*1*
G11102 **MIOPATÍA PROXIMAL CON FALLO RESPIRATORIO PRECOZ · TTN · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TTN	*1*
G11103 **MIOPATÍAS · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ACTA1, ACVR1, ANO5, ATP2A1, BAG3, BIN1, CACNA1S, CAV3, CCDC78, CFL2, CLN3, CNTN1, COL6A1, COL6A2, COL6A3, CRYAB, DES, DNAJB6, DNM2, DYSF, FHL1, FKBP14, FLNC , GNE, HSPB1, HSPB8, ISCU, KBTBD13, KLHL40, KLHL41, KLHL9, LAMP2, LDB3, MATR3, MEGF10, MSTN, MTM1, MTMR14, MYBPC3, MYF6, MYH2, MYH7, MYOT, NEB, PABPN1, PLAGL1, PLEC, PNPLA2, RYR1, SCN4A, SEPN1, SQSTM1, TIA1, TNNT1, TPM2, TPM3, TRIM32, TRIM54, TRIM63, TTN, VCP, VMA21	*62*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G11264 **MIOPATÍAS METABÓLICAS · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABHD5, ACAD9, ACADL, ACADM, ACADS, ACADVL, AGK, AGL, ALDOA, AMPD1, BCS1L, C12ORF65, CASQ1, CAVIN1, CHCHD10 , CHKB, COQ2, COQ8A, COQ9, COX10, COX15, CPT2, EARS2, ECHS1, ENO3, ETFA, ETFB, ETFDH, ETHE1, FARS2, FBXL4, FDX2, FKRP, FLAD1, FOXRED1, GAA, GBE1, GFER, GFM1, GYG1, GYS1, HADHA, HADHB, IARS2, ISCU, KLHL24, LAMP2, LDHA, LIPT1, LPIN1, LRPPRC, MICU1, MTFMT, NDUFA1, NDUFA10, NDUFA12, NDUFA2, NDUFA4, NDUFA9, NDUFAF2, NDUFAF5, NDUFAF6, NDUFS1, NDUFS2, NDUFS3, NDUFS4, NDUFS7, NDUFS8, NDUFV1, OPA1, PDHA1, PDHB, PDHX, PDSS2, PET100, PFKM, PGAM2, PGK1, PGM1, PHKA1, PHKA2, PHKB, PHKG2, PNPLA2, PNPLA8, PNPT1, POLG, POLG2, PUS1, PYGM, RBCK1, RYR1, SCO1, SCO2, SDHA, SDHAF1, SERAC1, SLC19A3 , SLC22A5, SLC25A20, SLC25A3, SLC25A4, SUCLA2, SUCLG1, SURF1, TACO1, TANGO2, TAZ, TK2, TMEM126B, TPK1 , TRMU, TSFM, TTC19, TWNK, TYMP, UQCRQ, VARS2, VMA21, YARS2	*120*
G11148 **MIOTONÍA CONGÉNITA (BECKER/THOMSEN) · CLCN1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CLCN1	*1*
G7303 **MIOTONÍA CONGÉNITA · CLCN1 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CLCN1	*1*
G11173 **MIOTONÍAS NO DISTRÓFICAS · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ATP2A1, CACNA1S, CAV3, CLCN1, HINT1, HSPG2, SCN4A	*7*
G11104 **MIOTÓNICOS, SÍNDROME DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ATP2A1, CAV3, CLCN1, DMPK, HSPG2, ZNF9	*6*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
MIRT **MIRTAZAPINA, SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	6	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis. El contenedor recomendado es el tubo seco (sin gel separador) para evitar procesos de adsorción del fármaco. En caso de no disponer de tubo seco, la extracción se puede realizar en tubo con gel separador, separando el suero dentro de las 2 horas posteriores a la recolección y transfiriéndolo a un tubo de alícuota para su transporte al laboratorio. Rechazo: Muestra hemolizada, lipémica y/o ictérica	I.Terapéutico: 30,00 - 80,00 µg/L Toxicidad: Sup 160,00 µg/L Límite de cuantificación: Inf 10,00 µg/L
AMA **MITOCONDRIALES ANTICUERPOS (AMA), SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/40 Interpretación: Positivo: Sup= 1/40

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
AMA2 **MITOCONDRIALES ANTICUERPOS (M2), SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	La inmunofluorescencia no es la técnica de elección para analizar antigenicidades. Se debería solicitar una técnica específica (inmunoblot) para completar el estudio clínico. Interpretación: Negativo: Inf 1/40 Interpretación: Positivo: Sup= 1/40	
AMI5 **MITOCONDRIALES ANTICUERPOS (M5), SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	12	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] No es necesario estar en ayunas.	Interpretación: Negativo: Inf 1/0 Interpretación: Positivo: Sup= 1/10	
AMA9 **MITOCONDRIALES ANTICUERPOS (M9), SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] No es necesario estar en ayunas.	Negativo: Inf 1/80	
G4181 **MITOCONDRIALES, ENFERMEDADES · mtDNA · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ATP6 [8993T] , MT-ATP6, MT-CO1, MT-CO2, MT-CO3, MT-CYB, MTND1 [3460G>A] , MT-ND1, MT-ND2, MT-ND3, MTND4 [11778G>A] , MT-ND4, MT-ND5, MTND6 [14484T>C] , MT-ND6, MT-RNR1, MT-RNR2, MTTC, MTTK [8344A>G] , MTTL1 [3243A>G] , MTTY	*21*
G07017 **MITOCONDRIALES, ENFERMEDADES · mtDNA · NGS + MLPA**	Secuenciación NGS + MLPA	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ATP6 [8993T] , MT-ATP6, MT-CO1, MT-CO2, MT-CO3, MT-CYB, mtDNA, MTND1 [3460G>A] , MT-ND1, MT-ND2, MT-ND3, MTND4 [11778G>A] , MT-ND4, MT-ND5, MTND6 [14484T>C] , MT-ND6, MT-RNR1, MT-RNR2, MTTC, MTTK [8344A>G] , MTTL1 [3243A>G] , MTTY	*22*
MITOT **MITOTANE, PLASMA**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	6	Rec. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	I.Terapéutico: 14,00 - 20,00 mg/L	
G04006 **MODULADOR DE DEFICIENCIA DE PAI-1 · SERPINE1 (4G/5G) · HOT SPOT**	Hot Spot	10	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SERPINE1 [-675 4G/5G]	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G9542 **MODY TIPO 1, 2 Y 3 · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GCK, HNF1A, HNF4A	*3*
G03053 **MODY TIPO 13 · ABCC8 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABCC8	*1*
G4048 **MODY TIPO 2 · GCK · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GCK	*1*
G03155 **MODY TIPO 4 · PDX1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PDX1	*1*
G03131 **MODY TIPO 5 · HNF1B · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	HNF1B	*1*
G03090 **MODY TIPO 5 · HNF1B · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	HNF1B	*1*
G03054 **MODY TIPO I · HNF4A · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	HNF4A	*1*
G03118 **MODY TIPO I, II, III, V, SÍNDROME · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GCK, HNF1A, HNF1B, HNF4A	*4*
G03055 **MODY TIPO II · GCK · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GCK	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G03191 **MODY TIPO III · HNF1A · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 10 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	HNF1A *1*
G03056 **MODY TIPO III · HNF1A · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	HNF1A *1*
MOGLC **MOG (MIELINA OLIGODENDROCITO GLICOPROTEINA) ANTICUERPOS IGG , LCR**	Inmunofluorescencia Indirecta en células transfectadas	6	Rec. 2 mL LCR [Refr.]	Negativo Un resultado negativo no descarta la posibilidad de que el paciente tenga un síndrome neurológico autoinmune.
MOGS **MOG (MIELINA OLIGODENDROCITO GLICOPROTEINA) ANTICUERPOS IGG , SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta en células transfectadas	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo Tejido: Células Transfectadas
MOOR **MOLIBDENO, ORINA**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	5	Rec. 1 mL Orina (1 x Contenedor 70 mL) [Refr.]	Inf 150,00 µg/L
MOSU **MOLIBDENO, SUERO**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	4	Rec. 1 mL Suero (libre trazas metales) (1 x Tubo Suero metales traza) [Refr.]	Inf 3,00 µg/L Límite de cuantificación: 1,80 µg/L
DNMC **MOLLUSCUM CONTAGIOSUM DNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	Reacción en cadena de la polimerasa.	5	Rec. 1 Muestra/s Lesión de piel (1 x Escobillón seco.) [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Exudado de herida (1 x Escobillón seco.) [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Biopsia [Refr.]	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G7311 **MOVIMIENTOS EN ESPEJO · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	DCC, DNAL4, RAD51	*3*
G11222 **MOWAT-WILSON, SÍNDROME DE · ZEB2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ZEB2	*1*
MUCOP **MUCOPOLISACARIDOS, ORINA**	Electroforesis en Agarosa.	6	Rec. 10 mL Orina 24h. (alícuota) [Refr.] Volumen indispensable.	Negativo	
G4134 **MUCOPOLISACARIDOSIS TIPO 2 - HUNTER, SÍNDROME DE · IDS · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	IDS	*1*
G9573 **MUCOPOLISACARIDOSIS TIPO 3A · SGSH · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SGSH	*1*
G03091 **MUCOPOLISACARIDOSIS TIPO 3B (SÍNDROME DE SANFILIPPO TIPO B) · NAGLU · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	NAGLU	*1*
G9575 **MUCOPOLISACARIDOSIS TIPO 3C · HGSNAT · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	HGSNAT	*1*
G9576 **MUCOPOLISACARIDOSIS TIPO 3D · GNS · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GNS	*1*
G03129 **MUCOPOLISACARIDOSIS TIPO 4B (MORQUIO) · GLB1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GLB1	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G03057 **MUCOPOLISACARIDOSIS TIPO I (IH, IS Y IH/S) · IDUA · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	IDUA	*1*
G03058 **MUCOPOLISACARIDOSIS TIPO II · IDS · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	IDS	*1*
G08072 **MUENKE, SÍNDROME DE · FGFR3 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FGFR3	*1*
G08071 **MUENKE, SÍNDROME DE · FGFR3(c.749C>G, p.Pro250Arg) · HOT SPOT**	Hot Spot	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FGFR3 [c.749C>G, p.Pro250Arg]	*1*
G01169 **MUERTE SÚBITA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	A2ML1, ABCB4, ABCC9, ACADVL, ACTA2, ACTC1, ACTN2, ADAMTSL4, AGL, AKAP9, ANK2, ANK3, ANKRD1, BAG3, BRAF, CACNA1C, CACNA1D, CACNA2D1, CACNA2D4, CACNB2, CALM1 , CALM3, CALR3, CASQ2, CAV3, CBL, CBS, CHRM2, COL3A1, COX15, CRYAB, CSRP3, CTF1, CTNNA3, DES, DMD, DMPK, DNAJC19, DOLK, DSC2, DSG2, DSP, DTNA, EMD, EYA4, FBN1, FBN2, FHL1, FHL2, FKRP, FKTN, FLNC , GAA, GATA4, GATA6, GATAD1, GJA1, GJA5, GLA, GPD1L, HCN4, HRAS, ILK, JPH2, JUP, KCNA5, KCND2, KCND3, KCNE1, KCNE2, KCNE3, KCNH2, KCNJ2, KCNJ5, KCNJ8, KCNK3, KCNQ1, KRAS, LAMA2, LAMA4, LAMP2, LDB3, LMNA, LOX, MAP2K1, MAP2K2, MAP3K8, MIB1, MYBPC3, MYH11, MYH6, MYH7, MYL2, MYL3, MYLK, MYLK2, MYO6, MYOZ2, MYPN, NEBL, NEXN, NF1, NKX2-5, NKX2-6, NNT, NOS1AP, NOTCH1, NPPA, NRAS, NSUN2, OBSCN, PDLIM3, PKP2, PLN, PRDM16, PRKAG2, PRKG1, PSEN1, PSEN2, PTPN11, RAF1, RANGRF, RBM20, RIT1, RYR2, SCN10A, SCN1B, SCN2B, SCN3B, SCN4B, SCN5A, SDHA, SEMA3A, SGCD, SHOC2, SMAD3, SNTA1, SOS1, SPRED1, SYNE1, SYNE2, SYNGAP1, TAZ, TBX20, TBX5, TCAP, TGFB2, TGFB3, TGFBR1, TGFBR2, TMEM43, TMEM70, TMPO, TNNC1, TNNI3, TNNI3K, TNNT2, TPM1, TRDN, TRPM4, TTN, TTR, TXNRD2, VCL, ZFHX3	*165*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
MUEADCJ **MUESTRA ADICIONAL COMPLEJA (PATERNIDADES)**	PCR-Análisis de fragmentos.	12	Rec. 1 Muestra/s Uña (1 x Recipiente de plástico) Contactar con el laboratorio antes de solicitar el estudio. Muestras analizadas: Uñas, palillos oídos con cera, cepillos de dientes usados varias veces por una persona, manchas de sangre y chicle.	Indicado en informe adjunto
MUSC **MUSCULO CARDIACO ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/100 Interpretación: Positivo: Sup= 1/100
MUSE **MUSCULO ESTRIADO ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/100 Interpretación: Positivo: Sup= 1/100 Tejido: Músculo estriado
MUSL **MUSCULO LISO ANTICUERPOS (SMA), SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] No es necesario estar en ayunas.	Interpretación: Negativo: Inf 1/40 Interpretación: Positivo: Sup= 1/40
G11105 **MÚSCULOS ONDULANTES, ENFERMEDAD DE · CAV3 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CAV3 *1*
MUSK **MUSK (TIROCINASA MUSCULO ESPECÍFICA) ANTICUERPOS, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	8	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Inf 0,40 U/mL Positivo: Sup= 0,40 U/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
MYBIO				
MYBIOME	Secuenciación Metagenómica Shotgun	25	Rec. 1 Muestra/s Heces (1 x Kit específico) Enviar la muestra de heces en kit COPAN hDNA Free FLOQSwabs sin medio de transporte. No tomar antibióticos, antifúngicos ni inmunosupresores durante las 6 semanas anteriores a la obtención de la muestra. No tomar probióticos durante las 3 semanas anteriores a la obtención de la muestra. En caso de haberse sometido a tratamientos de radioterapia, quimioterapia o tratamiento hormonal, esperar al menos 6 semanas antes de la obtención de la muestra. No se recomienda realizar el test BIOME200 en niños menores de 12 años. Si los padres o tutores legales de niños menores de 12 años desean realizar el test, se requiere su prescripción por parte de un profesional de la salud que se haga cargo de la supervisión de los resultados. En caso de pacientes	

MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
		embarazadas, el test deberá ser solicitado bajo la supervisión de un especialista médico. No realizar la toma de muestra si hay sangrado activo por hemorroides o menstruación o si presenta un brote de enfermedad inflamatoria intestinal. Se requiere peticionario específico. Indicar motivo del estudio. Adjuntar documentación junto con la muestra	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
MYBA200 **myBIOME + A200**	No se aplica.	25	Rec. 1 Muestra/s Heces (1 x Kit específico) Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Se requiere peticionario específico. Indicar motivo del estudio. Heces recogidas en kit específico (Ref. 550000530) facilitado por el laboratorio. Seguir instrucciones facilitadas en el kit. No tomar antibióticos, antifúngicos ni inmunosupresores durante las 6 semanas anteriores a la obtención de la muestra. En caso de haberse sometido a tratamientos de radioterapia, quimioterapia o tratamiento hormonal, esperar al menos 6 semanas antes de la obtención de la muestra. En caso de pacientes embarazadas, el test deberá ser solicitado bajo la supervisión de un especialista médico. No se recomienda realizar el test BIOME200 en niños menores de 12 años. Si los padres o tutores legales de niños menores de 12 años	

MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
		desean realizar el test, se requiere su prescripción por parte de un profesional de la salud que se haga cargo de la supervisión de los resultados.	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
PMY200 **myBIOME + A200 (SIN consulta)**	No se aplica.	25	Rec. 1 Muestra/s Heces (1 x Kit específico) Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Se requiere peticionario específico. Indicar motivo del estudio. Heces recogidas en kit específico (Ref. 550000530) facilitado por el laboratorio. Seguir instrucciones facilitadas en el kit. No tomar antibióticos, antifúngicos ni inmunosupresores durante las 6 semanas anteriores a la obtención de la muestra. En caso de haberse sometido a tratamientos de radioterapia, quimioterapia o tratamiento hormonal, esperar al menos 6 semanas antes de la obtención de la muestra. En caso de pacientes embarazadas, el test deberá ser solicitado bajo la supervisión de un especialista médico. No se recomienda realizar el test BIOME200 en niños menores de 12 años. Si los padres o tutores legales de niños menores de 12 años	

MÉTODO	P.E.	MUESTRA
		desean realizar el test, se requiere su prescripción por parte de un profesional de la salud que se haga cargo de la supervisión de los resultados.

Soja: 1,00 - 3,00 U/mL
Beta lactoglobulina: 1,00 - 3,00 U/mL
Caseína: 1,00 - 3,00 U/mL
Huevo/Clara de huevo: 1,00 - 3,00 U/mL
Leche de búfala: 1,00 - 3,00 U/mL
Leche de cabra: 1,00 - 3,00 U/mL
Leche de oveja: 1,00 - 3,00 U/mL
Leche de vaca: 1,00 - 3,00 U/mL
Yema de huevo: 1,00 - 3,00 U/mL
Almeja: 1,00 - 3,00 U/mL
Anchoa: 1,00 - 3,00 U/mL
Anguila: 1,00 - 3,00 U/mL
Arenques: 1,00 - 3,00 U/mL
Atún: 1,00 - 3,00 U/mL
Bacalao: 1,00 - 3,00 U/mL
Berberecho: 1,00 - 3,00 U/mL
Caballa: 1,00 - 3,00 U/mL
Calamar: 1,00 - 3,00 U/mL
Cangrejo: 1,00 - 3,00 U/mL
Caracolas: 1,00 - 3,00 U/mL
Carpa: 1,00 - 3,00 U/mL
Caviar: 1,00 - 3,00 U/mL
Dorada: 1,00 - 3,00 U/mL
Gamba/Langostino: 1,00 - 3,00 U/mL
Langosta: 1,00 - 3,00 U/mL
Lenguado: 1,00 - 3,00 U/mL
Lubina: 1,00 - 3,00 U/mL
Lucio: 1,00 - 3,00 U/mL
Mejillón: 1,00 - 3,00 U/mL
Merluza: 1,00 - 3,00 U/mL
Mero: 1,00 - 3,00 U/mL
Navaja: 1,00 - 3,00 U/mL
Ostra: 1,00 - 3,00 U/mL
Percebe: 1,00 - 3,00 U/mL
Pez espada: 1,00 - 3,00 U/mL
Platija: 1,00 - 3,00 U/mL
Pulpo: 1,00 - 3,00 U/mL
Rape: 1,00 - 3,00 U/mL
Rodaballo: 1,00 - 3,00 U/mL
Salmón: 1,00 - 3,00 U/mL
Sardina: 1,00 - 3,00 U/mL
Sepia: 1,00 - 3,00 U/mL
Trucha: 1,00 - 3,00 U/mL
Carne de avestruz: 1,00 - 3,00 U/mL
Carne de caballo: 1,00 - 3,00 U/mL
Carne de cabrito: 1,00 - 3,00 U/mL
Carne de cerdo: 1,00 - 3,00 U/mL
Carne de codorniz: 1,00 - 3,00 U/mL
Carne de conejo: 1,00 - 3,00 U/mL
Carne de cordero: 1,00 - 3,00 U/mL
Carne de pavo: 1,00 - 3,00 U/mL
Carne de perdiz: 1,00 - 3,00 U/mL
Carne de pato: 1,00 - 3,00 U/mL
Carne de pollo: 1,00 - 3,00 U/mL
Carne de ternera: 1,00 - 3,00 U/mL

MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
			Carne de venado: 1,00 - 3,00 U/mL Aguacate: 1,00 - 3,00 U/mL Albaricoque: 1,00 - 3,00 U/mL Algarroba: 1,00 - 3,00 U/mL Arándano: 1,00 - 3,00 U/mL Cereza: 1,00 - 3,00 U/mL Ciruela: 1,00 - 3,00 U/mL Coco: 1,00 - 3,00 U/mL Dátil: 1,00 - 3,00 U/mL Frambuesa: 1,00 - 3,00 U/mL Fresa: 1,00 - 3,00 U/mL Granada: 1,00 - 3,00 U/mL Grosella negra: 1,00 - 3,00 U/mL Grosella roja: 1,00 - 3,00 U/mL Higo: 1,00 - 3,00 U/mL Kiwi: 1,00 - 3,00 U/mL Lima: 1,00 - 3,00 U/mL Limón: 1,00 - 3,00 U/mL Lichi: 1,00 - 3,00 U/mL Mandarina: 1,00 - 3,00 U/mL Mango: 1,00 - 3,00 U/mL Manzana: 1,00 - 3,00 U/mL Melocotón: 1,00 - 3,00 U/mL Melón: 1,00 - 3,00 U/mL Mora: 1,00 - 3,00 U/mL Naranja: 1,00 - 3,00 U/mL Nectarina: 1,00 - 3,00 U/mL Aceite de oliva: 1,00 - 3,00 U/mL Papaya: 1,00 - 3,00 U/mL Pera: 1,00 - 3,00 U/mL Piña: 1,00 - 3,00 U/mL Plátano: 1,00 - 3,00 U/mL Pomelo: 1,00 - 3,00 U/mL Sandía: 1,00 - 3,00 U/mL Uva blanca/uva negra: 1,00 - 3,00 U/mL Zarzamora: 1,00 - 3,00 U/mL Almendra: 1,00 - 3,00 U/mL Anacardo: 1,00 - 3,00 U/mL Avellana: 1,00 - 3,00 U/mL Cacahuete: 1,00 - 3,00 U/mL Castaña: 1,00 - 3,00 U/mL Nuez: 1,00 - 3,00 U/mL Nuez de brasil: 1,00 - 3,00 U/mL Nuez de macadamia: 1,00 - 3,00 U/mL Pasas: 1,00 - 3,00 U/mL Piñones: 1,00 - 3,00 U/mL

MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
			Pistacho: 1,00 - 3,00 U/mL Agar agar: 1,00 - 3,00 U/mL Alga espaguetti: 1,00 - 3,00 U/mL Alga espirulina: 1,00 - 3,00 U/mL Aloe vera: 1,00 - 3,00 U/mL Café: 1,00 - 3,00 U/mL Canela: 1,00 - 3,00 U/mL Levadura de cerveza: 1,00 - 3,00 U/mL Levadura: 1,00 - 3,00 U/mL Miel: 1,00 - 3,00 U/mL Cola (nuez de cola): 1,00 - 3,00 U/mL Ruibarbo: 1,00 - 3,00 U/mL Ajo: 1,00 - 3,00 U/mL Albahaca: 1,00 - 3,00 U/mL Alcaparra: 1,00 - 3,00 U/mL Anís: 1,00 - 3,00 U/mL Azafrán: 1,00 - 3,00 U/mL Chile: 1,00 - 3,00 U/mL Cilantro: 1,00 - 3,00 U/mL Clavo: 1,00 - 3,00 U/mL Colza: 1,00 - 3,00 U/mL Comino: 1,00 - 3,00 U/mL Curry: 1,00 - 3,00 U/mL Eneldo: 1,00 - 3,00 U/mL Estragón: 1,00 - 3,00 U/mL Jengibre: 1,00 - 3,00 U/mL Hierbabuena/menta: 1,00 - 3,00 U/mL Hinojo: 1,00 - 3,00 U/mL Laurel: 1,00 - 3,00 U/mL Manzanilla: 1,00 - 3,00 U/mL Mostaza: 1,00 - 3,00 U/mL Nuez moscada: 1,00 - 3,00 U/mL Orégano: 1,00 - 3,00 U/mL Perejil: 1,00 - 3,00 U/mL Pimentón: 1,00 - 3,00 U/mL Pimienta: 1,00 - 3,00 U/mL Regaliz: 1,00 - 3,00 U/mL Romero: 1,00 - 3,00 U/mL Salvia: 1,00 - 3,00 U/mL Té negro: 1,00 - 3,00 U/mL Té verde: 1,00 - 3,00 U/mL Tomillo: 1,00 - 3,00 U/mL Vainilla: 1,00 - 3,00 U/mL Amaranto: 1,00 - 3,00 U/mL Arroz: 1,00 - 3,00 U/mL Avena: 1,00 - 3,00 U/mL

MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
			Cacao: 1,00 - 3,00 U/mL Caña de azúcar: 1,00 - 3,00 U/mL Cebada: 1,00 - 3,00 U/mL Centeno: 1,00 - 3,00 U/mL Cuscus: 1,00 - 3,00 U/mL Espelta: 1,00 - 3,00 U/mL Gluten (seitán): 1,00 - 3,00 U/mL Maíz/Aceite de maíz: 1,00 - 3,00 U/mL Malta: 1,00 - 3,00 U/mL Mijo: 1,00 - 3,00 U/mL Quinoa: 1,00 - 3,00 U/mL Salvado de trigo: 1,00 - 3,00 U/mL Aceite de girasol: 1,00 - 3,00 U/mL Semilla de lino: 1,00 - 3,00 U/mL Sémola de trigo: 1,00 - 3,00 U/mL Semilla de sésamo: 1,00 - 3,00 U/mL Tapioca/yuca: 1,00 - 3,00 U/mL Trigo: 1,00 - 3,00 U/mL Trigo negro (trigo sarraceno o alforfón): 1,00 - 3,00 U/mL Vieira: 1,00 - 3,00 U/mL Besugo: 1,00 - 3,00 U/mL Arándano rojo: 1,00 - 3,00 U/mL Lúpulo: 1,00 - 3,00 U/mL Mejorana (A200): 1,00 - 3,00 U/mL Amapola (A200): 1,00 - 3,00 U/mL Hoja de parra (A200): 1,00 - 3,00 U/mL Aceite de cardo (A200): 1,00 - 3,00 U/mL Canónigo (A200): 1,00 - 3,00 U/mL Boleto (A200): 1,00 - 3,00 U/mL Col rizada (A200): 1,00 - 3,00 U/mL Semilla de chía (A200): 1,00 - 3,00 U/mL Semilla de cáñamo (A200): 1,00 - 3,00 U/mL Baya de Goji (A200): 1,00 - 3,00 U/mL MyBIOME: Indicado en informe adjunto

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
DNML **MYCOBACTERIUM LEPRAE DNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	RT-PCR	5	Rec. 50 mL Orina [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Raspado nasal (1 x Contenedor estéril) [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Biopsia de piel (1 x Contenedor estéril) [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Biopsia de nervios engrosados (1 x Contenedor estéril) [Refr.] Rec. 1 mL LCR [Refr.] Muestra de linfa(o líquido intesticial de Lesiones activas) por punción del lóbulo de la oreja o codo si no existen lesiones activas en ese momento, exudados de lesiones infecciosas cutáneas: torunda estéril de dacrón/rayón, con vástago de aluminio o plástico, frotada intensamente sobre la mucosa del tabique nasal, y biopsias tisulares (frescas o parafinadas). Biopsia de lesiones, introducida en vial estéril hermético, preferible de polipropileno para evitar roturas durante su transporte al laboratorio. Lo ideal es enviar biopsia congelada. Si esto no es posible, biopsia refrigerada en solución	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
			salina fisiológica. Se acepta envío de biopsia incluida en parafina o fijada en formol (aunque la sensibilidad se ve disminuida) así como cortes de pieza incluida en parafina. Las biopsias frescas deben conservarse preferiblemente congeladas. Otros tejidos (nervio cubital).	
MTCR **MYCOBACTERIUM SPP y RESISTENCIAS A MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS COMPLEX, MUESTRA BIOLÓGICA**	PCR-Real Time.	4	Rec. 1 mL Esputo (1 x Contenedor estéril) [Refr.] Alt. 1 Muestra/s Biopsia (1 x Contenedor con solución salina) Alt. 1 mL Orina (1 x Contenedor estéril) [Refr.] Alt. 1 mL Humor vitreo/acuoso (1 x Tubo estéril) [Refr.] Alt. 1 mL BAS (1 x Contenedor estéril) [Refr.] Alt. 1 mL BAL (1 x Contenedor estéril) [Refr.]	Técnica: Detección de Mycobacterium tuberculosis complex y detección de ADN de resistencia a la Rifampicina (gen rpoB) y a Isoniazida (gen katG y región promotora de inhA) por PCR tiempo real Mycobacterium spp: No se detecta Resistencia a M. tuberculosis complex: : No se detecta

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
DNMG **MYCOPLASMA GENITALIUM DNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	PCR-Real Time.	5	Rec. 1 Muestra/s Exudado vaginal (1 x Escobillón seco.) [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Exudado uretral (1 x Escobillón seco.) [Refr.] Rec. 1 mL Orina (primera micción) (1 x Tubo 5 mL.) [Cong.] Alt. 1 Muestra/s Tejido parafinado Alt. 1 Muestra/s Secreción prostática (1 x Tubo estéril) [Cong.] Alt. 1 Muestra/s Lavado seminal (1 x Tubo estéril) [Cong.] Alt. 1 mL LCR (1 x Tubo estéril) [Refr.]	DNA Mycoplasma genitalium: No se detecta
AMYG **MYCOPLASMA HOMINIS ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/32 Interpretación: Positivo: Sup= 1/32
AMYM **MYCOPLASMA HOMINIS ANTICUERPOS IgM, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/32 Interpretación: Positivo: Sup= 1/32
DNMH **MYCOPLASMA HOMINIS DNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	PCR-Real Time.	5	Rec. 5 mL Orina (primera micción) [Cong.] CONGELADO: Orina (primera micción), lavado seminal o secreción prostática, LCR REFRIGERADO: Hisopo (seco), líquido amniótico TEMPERATURA AMBIENTE: Bloque tejido parafina	DNA de Mycoplasma hominis: No se detecta

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
AMYA **MYCOPLASMA PNEUMONIAE ANTICUERPOS IgA, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/12 Interpretación: Positivo: Sup= 1/12
MYGCR **MYCOPLASMA PNEUMONIAE ANTICUERPOS IGG, LCR**	Enzimoinmunoanálisis	5	Rec. 300 uL LCR [Refr.]	UA/mL Interpretación según criterio clínico
MPGGL **MYCOPLASMA PNEUMONIAE ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	4	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 16,00 UR/mL Indeterminado: 16,00 - 21,90 UR/mL Positivo: Sup= 22,00 UR/mL
MYMCR **MYCOPLASMA PNEUMONIAE ANTICUERPOS IGM, LCR**	Enzimoinmunoanálisis	5	Rec. 1 mL LCR (1 x Tubo estéril) [Refr.]	Indice Interpretación según criterio clínico
MPMGL **MYCOPLASMA PNEUMONIAE ANTICUERPOS IgM, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	4	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 0,80 Indice Indeterminado: 0,80 - 1,09 Indice Positivo: Sup= 1,10 Indice
DNMP **MYCOPLASMA PNEUMONIAE DNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	Reacción en cadena de la polimerasa.	3	Rec. 0.35 mL Líquido pleural [Refr.] Rec. 0.3 mL Lavado broncoalveolar [Refr.] Rec. 0.3 mL Esputo [Refr.] Otros: LCR, líquido articular, líquido amniótico.	No se detecta * Esta prueba tiene una sensibilidad del 98% y una especificidad del 97%
NAGO **N-ACETIL BETA D-GLUCOSAMINIDASA (NAG), ORINA**	Espectrometría.	7	Rec. 5 mL Orina [Refr.]	0,70 - 5,70 U/gr crea

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
HLDQ **NARCOLEPSIA (TIPAJE HLA-DQB1), SUSCEPTIBILIDAD A · HLA(DQB1*0602) · PCR**	PCR-SSO.	7	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Se informa para cada paciente *1* HLA [DQB1*0602]
HBCHIV **NAT TEST - VHB (DNA)/HIV-1 (RNA)/HIV-2 (RNA)/VHC (RNA) CUALITATIVO, PLASMA**	PCR-Real Time.	5	Rec. 4 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Se pueden obtener los 4mL de Plasma EDTA congelado a partir de: - Tubo K2 EDTA con gelosa centrifugado. - Tubo K2 EDTA centrifugado y separado del coágulo.	No se detecta
ACNATZ **NATALIZUMAB ANTICUERPOS, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	23	Rec. 2 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Extracción a las 4 semanas de la última injección de Natalizumab.	Negativo
G08073 **NECROSIS AVASCULAR DE LA CABEZA FEMORAL · COL2A1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	COL2A1 *1*
G09028 **NEFROLITIASIS/NEFROCALCINOSIS · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ADCY10, AGXT, APRT, CLDN19, CYP24A1, FAM20A, GRHPR, HNF4A, HOGA1, HPRT1, KCNJ1, OCRL, SLC12A1, SLC22A12, SLC26A1, SLC2A9, SLC34A1, SLC34A3, SLC3A1, SLC4A1, SLC7A9, SLC9A3R1, VDR *23*
G09029 **NEFROLITIASIS/NEFROCALCINOSIS, LIGADO AL CROMOSOMA X · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CLCN5, HPRT1, OCRL *3*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G09030 **NEFRONOPTISIS · NPHP3 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	NPHP3 *1*
G09005 **NEFRONOPTISIS · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ANKS6, CEP164, CEP290, DCDC2, GLIS2, INVS, IQCB1, NEK8, NPHP1, NPHP3, NPHP4, RPGRIP1L, SDCCAG8, SLC41A1, TMEM67, TTC21B, WDR19, XPNPEP3, ZNF423 *19*
G09046 **NEFRÓTICO 1, SÍNDROME · NPHS1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	NPHS1 *1*
G09020 **NEFRÓTICO 5, SÍNDROME · LAMB2 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	LAMB2 *1*
G09034 **NEFRÓTICO TIPO 2, SÍNDROME · NPHS2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Plazo de entrega orientativo dependiendo de la complejidad en la secuenciación del Gen estudiado y de las caracteristicas genotípicas inherentes al paciente. - Resumen de la historia clínica del paciente. Se requiere consentimiento informado. - En caso que proceda y si está disponible, copia del informe del caso índice familiar.	NPHS2 *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G9515 **NEFRÓTICO TIPO 3, SÍNDROME · PLCE1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PLCE1	*1*
G09006 **NEFRÓTICO TIPO 4, SÍNDROME DE · WT1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	WT1	*1*
G09007 **NEFRÓTICOS, SÍNDROMES · PANEL A · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ARHGDIA, COQ8B, DGKE, EMP2, ITGA3, LAMB2, NPHS1, NPHS2, NUP107, NUP205, NUP93, PLCE1, PTPRO, WT1	*14*
G09009 **NEFRÓTICOS, SÍNDROMES · PANEL B · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ACTN4, ANLN, APOL1, CD151, CD2AP, COL4A3, COL4A4, COL4A5, COQ2, GLA, INF2, LMX1B, MYO1E, PAX2, PDSS2, SCARB2 , SMARCAL1, TRPC6, TTC21B	*19*
G09008 **NEFRÓTICOS, SÍNDROMES · PANEL C · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ACTN4, ANLN, APOL1, ARHGDIA, CD151, CD2AP, COL4A3, COL4A4, COL4A5, COQ2, COQ8B, DGKE, EMP2, GLA, INF2, ITGA3, LAMB2, LMX1B, MYO1E, NPHS1, NPHS2, NUP107, NUP205, NUP93, PAX2, PDSS2, PLCE1, PTPRO, SCARB2 , SMARCAL1, TRPC6, TTC21B, WT1	*33*
DNGO **NEISSERIA GONORRHOEAE DNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	PCR-Real Time.	5	Rec. 5 mL Orina (primera micción) (1 x Tubo 5 mL.) [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Frotis (1 x Escobillón seco.) [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Exudado vaginal [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Exudado rectal [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Exudado bucal (1 x Escobillón seco.) [Refr.]	DNA de Neisseria gonorreae: No se detecta	
DNNMAWY **NEISSERIA MENINGITIDIS (SEROTIPOS A, W, Y) IDENTIFICACION, MUESTRA BIOLÓGICA**	Reacción en cadena de la polimerasa.	1	Rec. 1 mL Líquido biológico [Refr.]		

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
MENIN **NEISSERIA MENINGITIDIS ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	17	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Esta prueba tiene interés en el seguimiento de la vacunación con los polisacaridos A, C, Y y W135 de Neisseria meningitidis. Negativo: Inf= 1,00 Índice Positivo: Sup 1,00 Índice
DNNM **NEISSERIA MENINGITIDIS DNA, MUESTRA BIOLOGICA**	PCR-Real Time.	6	Rec. 1 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 1 mL LCR (1 x Tubo Polipropileno) [Cong.] Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío.	DNA de Neisseria meningitidis (resultado): No se detecta
NELFI **NELFINAVIR, SUERO**	Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectrometría de masas.	7	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	I.Terapéutico: 1000,00 - 4000,00 ng/mL
NBB **NEOBONA (NIPT) - ANEUPLOIDÍAS CROMOSOMAS 21, 18, 13, X, Y + SEXO FETAL, SANGRE TOTAL**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	5	Rec. 10 mL Sangre total (1 x Kit específico) Al menos 10 semanas de edad gestacional. KIT ESPECIAL + INSTRUCCIONES Se requiere consentimiento informado.	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
NB2 **NEOBONA GENOMEWIDE (NIPT) - ANEUPLOIDÍAS TODOS LOS CROMOSOMAS, CNVs + SEXO FETAL, SANGRE TOTAL**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	5	Rec. 10 mL Sangre total (1 x Kit específico) Al menos 10 semanas de edad gestacional. KIT ESPECIAL + INSTRUCCIONES No está indicado en mujeres que presenten gestaciones con más de 2 fetos. Se requiere consentimiento informado. Mantener y enviar a temperatura ambiente el mismo día de extracción.		
G14081 **NEOPLASIA ENDOCRINA MÚLTIPLE (IIA Y IIB) · RET · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	15	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	RET	*1*
G14085 **NEOPLASIA ENDOCRINA MÚLTIPLE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	15	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CDKN1B, MEN1, RET	*3*
G7306 **NEOPLASIA ENDOCRINA MÚLTIPLE · RET · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	RET	*1*
G14057 **NEOPLASIA ENDOCRINA MÚLTIPLE TIPO 1 · MEN1 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	MEN1	*1*
G14058 **NEOPLASIA ENDOCRINA MÚLTIPLE TIPO 1 · MEN1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	MEN1	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G14059 **NEOPLASIA ENDOCRINA MÚLTIPLE TIPO 1 · MEN1 · SANGER+MLPA**	Secuenciación NGS + MLPA	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	MEN1 [MLPA]	*1*
G14060 **NEOPLASIA ENDOCRINA MÚLTIPLE TIPO 2 · RET · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	15	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	RET	*1*
G14061 **NEOPLASIA ENDOCRINA MÚLTIPLE TIPO 4 · CDKN1B · SANGER**	Secuenciación Sanger	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CDKN1B	*1*
G13071 **NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS (LLC, SMD, LAM) · TP53 · SANGER**	Secuenciación Sanger	10	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TP53	*1*
G13072 **NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS (LMA, SMD) · RUNX1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	10	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	RUNX1	*1*
G13074 **NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS (LMA/LMMC/SMD) · SRSF2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	10	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SRSF2	*1*
G13077 **NEOPLASIAS MIELOIDES · IDH1(R132H), IDH2(R172W, R140Q) · HOT SPOT**	Hot Spot	7	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	IDH1 [R132H] , IDH2 [R172W, R140Q]	*2*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
NEOP **NEOPTERINA, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	10	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Muestra protegida de la luz	Inf 10,00 nmol/L
G02055 **NETHERTON, SÍNDROME DE· SPINK5 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SPINK5 *1*
G11181 **NEUROCANTOCITOSIS DE MCLEOD, SÍNDROME DE · XK · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	XK *1*
G11237 **NEURODEGENERACIÓN CON ACUMULACIÓN CEREBRAL DE HIERRO 2B · PLA2G6 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PLA2G6 *1*
ACNF140 **NEUROFASCINA 140 ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunocitoquímica.	23	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo
CONT155S **NEUROFASCINA 155 ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunocitoquímica.	23	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo
CONT186S **NEUROFASCINA 186 ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunocitoquímica.	23	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo
G11306 **NEUROFERRINOPATIA · FTL · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Se informa para cada paciente
G1190 **NEUROFIBROMATOSIS TIPO 1 · NF1 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	NF1 *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G11149 **NEUROFIBROMATOSIS TIPO 1 · NF1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	NF1 *1*
G11311 **NEUROFIBROMATOSIS TIPO 1 · NF1 · SECUENCIACIÓN Y EVALUACIÓN DEL EFECTO EN ARNm**	Secuenciación NGS + Sanger	45	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 5 mL Sangre total (2 x Tubo PAXGENE)	NF1 *1*
G1525 **NEUROFIBROMATOSIS TIPO 1 Y 2 · NF1, NF2 · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	NF1, NF2 *2*
G1519 **NEUROFIBROMATOSIS TIPO 2 · NF2 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	NF2 *1*
G11106 **NEUROFIBROMATOSIS TIPO 2 · NF2 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	NF2 *1*
NMOLC **NEUROMIELITIS ÓPTICA (NMO), ACUAPORINA 4 IgG ANTICUERPOS, LCR**	Inmunofluorescencia Indirecta en células transfectadas	7	Rec. 1 mL LCR [Refr.]	Interpretación: Negativo
NMO **NEUROMIELITIS ÓPTICA (NMO), ACUAPORINA 4 IgG ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta en células transfectadas	7	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo Tejido: Células Transfectadas NOTA: Un resultado negativo no excluye el diagnóstico de la enfermedad de Devic.
G11062 **NEUROMUSCULAR CONGÉNITA CON FIBRAS TIPO 1 UNIFORMES, ENFERMEDAD · RYR1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	RYR1 *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
NLCR **NEURONALES (ANTI-HU, YO ,RI, ANFIFISINA, CV2, MA2, MGT-30, AGNA, RECOVERINA) ANTICUERPOS, LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO**	Inmunoblot.	5	Rec. 1 mL LCR (1 x Tubo estéril) [Refr.] Se requiere recoger la muestra de LCR en tubo de polipropileno.	No se detecta Anticuerpos anfifisina: No se detecta Anticuerpo glia nuclear: No se detecta Anticuerpos HU: No se detecta Anticuerpos MA2: No se detecta Anticuerpos MGT-30: No se detecta Anticuerpo recoverina: No se detecta Anticuerpos RI: No se detecta Ac. neuronal cél. de purkinje (Yo) en LCR: No se detecta
LNEU **NEURONALES (ANTI-HU, YO ,RI, ANIFISINA, CV2, MA2, MGT-30, AGNA, RECOVERINA) ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunoblot.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Anticuerpos glia nuclear SOX1: No se detecta Anticuerpos anfifisina: No se detecta Anticuerpos CV2: No se detecta Anticuerpos Hu: No se detecta Anticuerpos Ma 2: No se detecta Anticuerpos MGT-30 (titin): No se detecta Ac neuronal recoverina: No se detecta Anticuerpos Ri : No se detecta Anticuerpos Yo: No se detecta
ANNA3LC **NEURONALES ANTI ANNA3 ANTICUERPOS (IFI), LCR**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 300 uL LCR [Refr.]	Negativo
MA1LC **NEURONALES ANTI MA1 ANTICUERPOS (IFI), LCR**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 300 uL LCR [Refr.]	Negativo
MA1I **NEURONALES ANTI MA1 ANTICUERPOS (IFI), SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo Tejido: Cerebelo En caso de positividad, el resultado debe ser confirmado con un método alternativo (inmunoblot). En caso de negatividad, no se descarta la existencia de un síndrome neurológico autoinmune

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
CNEU **NEURONALES ANTICUERPOS (INMUNOBLOT), SUERO**	Inmunoblot.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Anticuerpos anfifisina: No se detecta Anticuerpos CV2: No se detecta Anticuerpos Hu: No se detecta Anticuerpos Ma 2: No se detecta Anticuerpos Ri : No se detecta Anticuerpos Yo: No se detecta
AANMA **NEURONALES ANTI-MA1 ANTICUERPOS (INMUNOBLOT), LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO**	Inmunoblot.	10	Rec. 1 mL LCR (1 x Tubo estéril) [Refr.]	No se detecta
MA1 **NEURONALES ANTI-MA1 ANTICUERPOS (INMUNOBLOT), SUERO**	Inmunoblot.	10	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	No se detecta
TRIFI **NEURONALES ANTI-TR ANTICUERPO, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	4	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo Tejido: Cerebelo En caso de positividad, el resultado debe ser confirmado con un método alternativo (inmunoblot). En caso de negatividad, no se descarta la existencia de un síndrome neurológico autoinmune

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G11297 **NEUROPATÍA (AMPLIADO) · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AARS, ABCA1, ABHD12, AGXT, AIFM1, AP1S1, APOA1, APTX, ARHGEF10, ARSA, ATL1, ATL3, ATM, ATP7A, B4GALNT1, BAG3, BCKDHB, BICD2, BSCL2, C12ORF65, CCT5, CD59, CHCHD10 , CNTNAP1, COX6A1, CPOX, CTDP1, CYP27A1, DARS2, DCTN1 , DGUOK, DNAJB2, DNAJC3, DNM2, DNMT1, DRP2, DST, DYNC1H1, EGR2, ERCC6, ERCC8, ETFDH, FAH, FAM126A, FAM134B, FBLN5, FBXO38, FGD4, FIG4, FLVCR1, FXN, GALC, GAN, GARS, GBA2, GDAP1, GJB1, GJC2, GLA, GNB4, GSN, HADHA, HADHB, HARS, HEXA, HEXB, HINT1, HK1, HMBS, HSD17B4, HSPB1, HSPB8, IARS2, IGHMBP2, IKBKAP, INF2, JAG1, KCNA2, KIF1A, LITAF, LMNA, LRSAM1, LYST, MFN2, MMACHC, MME, MORC2, MPV17, MPZ, MTMR2, MTTP, MYH14, NAGA, NDRG1, NEFH, NEFL, NGF, NTRK1, OPA1, OPA3, PDHA1, PDK3, PDYN, PEX10, PEX7, PHYH, PLEKHG5, PLP1, PMM2, PMP22, PNKP, PNPLA6, POLG, POLR3A, POLR3B, PPOX, PRDM12, PRKCG, PRPS1, PRX, PTEN, PTPN11, PTRH2, RAB7A, REEP1, SACS, SBF1, SBF2, SCARB2, SCN10A, SCN11A, SCN9A, SCYL1, SETX, SH3TC2, SIGMAR1, SLC12A6, SLC25A19, SLC25A46, SLC52A2, SLC52A3, SLC5A6, SLC5A7, SORD, SOX10, SPAST, SPG11, SPG7, SPTLC1, SPTLC2, SUCLA2, SURF1, TFG, TRIM2, TRPA1, TRPV4, TTPA, TTR, TUBB3, TYMP, VCP, VPS13A, VRK1, WNK1, XK, XPA, YARS, ZFYVE26	
G11266 **NEUROPATÍA HEREDITARIA CON SUSCEPTIBILIDAD A LA PARÁLISIS POR PRESIÓN · PMP22 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PMP22	*1*
G11107 **NEUROPATÍA HEREDITARIA CON/SIN DEGENERACIÓN MACULAR RELACIONADA CON LA EDAD · FBLN5 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FBLN5	*1*
G11108 **NEUROPATÍA MOTORA DISTAL HEREDITARIA TIPO VA · BSCL2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BSCL2	*1*
G11109 **NEUROPATÍA MOTORA Y SENSITIVA HEREDITARIA TIPO IIC · TRPV4 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TRPV4	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G3022 **NEUROPATIA ÓPTICA TIPO LEBER · mtDNA (G3460A, G11778A, T14484C) · HOT SPOT**	Hot Spot	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mtDNA [G3460A, G11778A, T14484C]	*1*
G11110 **NEUROPATÍA RECURRENTE POR PRESIÓN · PMP22 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PMP22	*1*
G11240 **NEUROPATÍA SENSITIVA AUTONÓMICA HEREDITARIA TIPO 1A · SPTLC1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SPTLC1	*1*
G11111 **NEUROPATÍAS (EXCLUYENDO CMT) · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ATL1, ATP7A, BSCL2, C12ORF65, CCT5, CTDP1, DCTN1 , DNMT1, DST, FAM134B, FBLN5, GAN, HADHB, HINT1, HSD17B4, IKBKAP, KIF1A, MME, NGF, POLG, SCN11A, SLC12A6, SPTLC1, SPTLC2, TFG, WNK1	*26*
NPY **NEUROPEPTIDO Y, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	17	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	173,00 - 1033,00 pg/mL	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
NEUL **NEUROTRANSMISORES, LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	20	Rec. 1 mL LCR [Cong.]	Ratio HVA/5-HIAA en LCR: Ambos 0 - 2 Años 0,90 - 2,60 Ratio HVA/5-HIAA en LCR: Ambos 2 - 18 Años 1,20 - 4,00 5-Hidroxiindolacético (5-HIAA) en LCR: Ambos 0 - 90 Días 419,00 - 955,00 nmol/L 5-Hidroxiindolacético (5-HIAA) en LCR: Ambos 90 - 365 Días 185,00 - 570,00 nmol/L 5-Hidroxiindolacético (5-HIAA) en LCR: Ambos 1 - 4 Años 122,00 - 257,00 nmol/L 5-Hidroxiindolacético (5-HIAA) en LCR: Ambos 4 - 11 Años 65,00 - 211,00 nmol/L 5-Hidroxiindolacético (5-HIAA) en LCR: Ambos 11 - 18 Años 47,00 - 127,00 nmol/L Ratio HVA/MHPG en LCR: Ambos 0 - 10 Años 2,30 - 8,50 Ratio HVA/MHPG en LCR: Ambos 10 - 18 Años 1,10 - 4,00 Homovanílico (HVA) en LCR: Ambos 0 - 90 Días 415,00 - 1379,00 nmol/L Homovanílico (HVA) en LCR: Ambos 90 - 365 Días 325,00 - 843,00 nmol/L Homovanílico (HVA) en LCR: Ambos 1 - 4 Años 302,00 - 582,00 nmol/L Homovanílico (HVA) en LCR: Ambos 4 - 11 Años 173,00 - 590,00 nmol/L Homovanílico (HVA) en LCR: Ambos 11 - 18 Años 82,00 - 291,00 nmol/L MHPG en LCR: Ambos 0 - 150 Días 89,00 - 242,00 nmol/L MHPG en LCR: Ambos 150 - 365 Días 38,00 - 129,00 nmol/L MHPG en LCR: Ambos 3 - 18 Años 38,00 - 129,00 nmol/L MHPG en LCR: Ambos Sup - 18 Años 38,00 - 129,00 nmol/L 5-Hidroxitriptofano (5-OHTrp) en LCR: Ambos 0 - 335 Días 7,30 - 29,70 nmol/L 5-Hidroxitriptofano (5-OHTrp) en LCR: Ambos 335 - 365 Días 6,10 - 20,70 nmol/L 5-Hidroxitriptofano (5-OHTrp) en LCR: Inf 26,00 nmol/L 5-Hidroxitriptofano (5-OHTrp) en LCR: Ambos Sup - 1 Años 6,10 - 20,70 nmol/L 3-Ortometildopa (3-OMD) en LCR: Ambos 0 - 90 Días 81,30 - 299,50 nmol/L 3-Ortometildopa (3-OMD) en LCR: Ambos 90 - 365 Días 27,00 - 119,00 nmol/L 3-Ortometildopa (3-OMD) en LCR: Ambos 1 - 18 Años 5,30 - 66,90 nmol/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G8009 **NEUTRÓFILOS, ANTICUERPOS**	Citometría de flujo.	10	Rec. 5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) Muestra y volúmenes requeridos: - Neutropenia inmune: suero (5 mL) - Refrigerado - TRALI: Donante: suero refrigerado (5 mL) Receptor: suero refirgerado (5 mL) + Sangre total-EDTA (5 mL)	
G04045 **NEUTROPENIA CONGENITA · ELANE · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ELANE *1*
G04050 **NEUTROPENIA CONGÉNITA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AP3B1, CSF3R, CXCR4, ELANE, G6PC3, GATA1, GATA2, GFI1, HAX1, JAGN1, LAMTOR2, LYST, RAB27A, RAC2, SBDS, SLC37A4, SMARCD2, TAZ, USB1, VPS13B, VPS45, WAS, WIPF1 *23*
G04046 **NEUTROPENIA CONGÉNITA SEVERA TIPO 3 · HAX1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	HAX1 *1*
G04065 **NEUTROPENIA CONSTITUCIONAL BENIGNA · ACKR1 (RS2814778) · HOT SPOT**	Secuenciación Sanger	20	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Indicado en informe adjunto
G03166 **NIEMANN-PICK TIPO A Y B, SÍNDROME DE · SMPD1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SMPD1 *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G1324 **NIEMANN-PICK TIPO C, SÍNDROME DE · NPC1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	NPC1	*1*
G03167 **NIEMANN-PICK TIPO C, SÍNDROME DE · NPC1, NPC2 · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	NPC1, NPC2	*2*
G1325 **NIEMANN-PICK TIPO C, SÍNDROME DE · NPC2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	NPC2	*1*
G03168 **NIEMANN-PICK, SÍNDROME DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	NPC1, NPC2, SMPD1	*3*
G03165 **NIEMANN-PICK, SÍNDROME DE · SMPD1, NPC1, NPC2 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	NPC1, NPC2, SMPD1	*3*
NIOC **NIQUEL, ORINA**	Absorción atómica.	5	Rec. 1 mL Orina final jornada [Refr.]	BEIs® (ACGIH®): Final de la semana laboral (Compuestos solubles) Inf 30,00 µg/L BEIs® (ACGIH®): Final de la semana laboral (Níquel elemental y compuestos insolubles) Inf 5,00 µg/L Límite de cuantificación: 2,00 µg/L	
NI24 **NÍQUEL, ORINA 24H**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	4	Rec. 1 mL Orina 24h. (alícuota) (1 x Contenedor 2500 mL.) [Refr.]	Excreción (24h): Inf 10,00 µg/24h : Límite de cuantificación: 2,00 µg/L Volumen de orina remitido (diuresis): 600,00 - 1600,00 mL	
NIQ **NIQUEL, SUERO**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	4	Rec. 1 mL Suero (libre trazas metales) (1 x Tubo Suero metales traza) [Refr.]	Expuestos (orientativo) Inf= 10,00 µg/L No expuestos Inf= 2,00 µg/L	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G12032 **NISTAGMO CONGÉNITO TIPO 6 LIGADO AL CROMOSOMA X · GPR143 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GPR143 *1*
NITIS **NITISINONA, PLASMA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	8	Rec. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Se requiere peticionario específico.	Pacientes con Tirosinemia tipo I 30,00 - 60,00 µmol/L
AGNO **NITRATOS, AGUA**	Espectrometría.	12	Rec. 100 mL Agua (1 x Envase aséptico) [Refr.]	Agua de diálisis Inf 2,00 mgN/L Agua de red Inf 50,0 mgN/L
CONTSA **NITRAZEPAM CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SALIVA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	3	Rec. 1 Muestra/s Saliva (1 x Quantisal Oral Fluid) [Refr.]	Incertidumbre de medida 1 ng/mL Límite de cuantificación 5 ng/mL
NITRZ **NITRAZEPAM, SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.] -Dosis administrada, frecuencia y vía de administración La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis. No utilizar tubos con gel separador. Rechazo: Muestra hemolizada, lipémica y/o ictérica	I.Terapéutico: 30,00 - 100 µg/L Toxicidad: Sup 200,00 µg/L Límite de cuantificación: 20,00 µg/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
NMAO **N-METILACETAMIDA, ORINA**	Cromatografía de gases.	11	Rec. 10 mL Orina final jornada [Refr.]	Excreción (creatinina): VLB®-INSST: Final de la semana laboral (N-N-Dimetilacetamida) Inf 30,00 mg/g crea
METHO **N-METILFORMAMIDA, ORINA**	Cromatografía de Gases / Espectrometría Masas.	7	Rec. 10 mL Orina final jornada [Refr.]	VLB®-INSST: Final de la jornada laboral (Metilformamida) Inf 15,00 mg/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
DNANOC **NOCARDIA SPP DNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	PCR-Real Time.	6	Rec. 1 Pieza/s Biopsia de piel (1 x Contenedor estéril) (Suero fisiológico)[Refr.] Rec. 1 Muestra/s Raspado corneal (1 x Contenedor estéril) [Refr.] Rec. 1 mL Líquido pleural (1 x Contenedor estéril) [Refr.] Rec. 1 mL LÍquido pericárdico (1 x Contenedor estéril) [Refr.] Rec. 1 mL LCR (1 x Contenedor estéril) [Refr.] Rec. 1 mL Lavado broncoalveolar (1 x Contenedor estéril) [Refr.] Rec. 1 mL Humor vitreo/acuoso (1 x Contenedor estéril) [Refr.] Rec. 1 mL Esputo (1 x Contenedor estéril) [Refr.] Muestras respiratorias profundas, muestras de biopsias cutáneas o de exudados cutáneos, o muestras de biopsias cerebrales o de líquido cefalorraquídeo. Líquido pleural, líquido pericárdico, aspirado de colección purulenta, raspado corneal, humor vitreo, aspirado/punción esplénica.	No se detecta

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G01082 **NO-COMPACTACIÓN DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO TIPO 4 · ACTC1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ACTC1	*1*
G01129 **NOONAN 3, SÍNDROME DE · KRAS · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	KRAS	*1*
G01130 **NOONAN 6, SÍNDROME DE · NRAS · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	NRAS	*1*
G01131 **NOONAN 7, SÍNDROME DE · BRAF · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BRAF	*1*
G01165 **NOONAN, SÍNDROME DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BRAF, KRAS, MAP2K1, NRAS, PTPN11, RAF1, RIT1, SOS1	*8*
G01132 **NOONAN, SÍNDROME DE · PTPN11 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PTPN11	*1*
G01145 **NOONAN, SÍNDROME DE · RAF1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	RAF1	*1*
G01144 **NOONAN, SÍNDROME DE · RIT1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	RIT1	*1*
G01143 **NOONAN, SÍNDROME DE · SOS1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SOS1	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
NOR90 **NOR-90 ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	4	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] No es necesario estar en ayunas.	La inmunofluorescencia no es la técnica de elección para analizar antigenicidades. Se debería solicitar una técnica específica (inmunoblot) para completar el estudio clínico. Interpretación: Negativo: Inf 1/160
CONBUPOR **NORBUPRENORFINA CONFIRMACIÓN, ORINA**	Cromatografía de Gases / Espectrometría Masas.	12	Rec. 10 mL Orina [Refr.]	ng/mL Negativo

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
NORCLO **NORCLOZAPINA, SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	6	Rec. 100 uL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.] La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis. El contenedor recomendado es el tubo seco (sin gel separador) para evitar procesos de adsorción del fármaco. En caso de no disponer de tubo seco, la extracción se puede realizar en tubo con gel separador, separando el suero dentro de las 2 horas posteriores a la recolección y transfiriéndolo a un tubo de alícuota para su transporte al laboratorio. Rechazo: Muestra hemolizada, lipémica y/o ictérica	100,00 - 300,00 µg/L Límite de cuantificación: 24,00 µg/L
TRNOR **NOROVIRUS ANTIGENO, HECES**	Inmunocromatografía.	3	Rec. 1 g Heces (1 x Recipiente estéril) [Refr.] -Heces frescas (aproximadamente entre 1-2 g o ml en caso de muestras líquidas).	Negativo

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
RNVH **NOROVIRUS RNA, HECES**	PCR-Real Time.	4	Rec. 50 g Heces (1 x Contenedor estéril) [Cong.]	RNA de Norovirus grupo I (virus Norwalk) en heces: No se detecta RNA de Norovirus grupo II (virus Norwalk) en heces: No se detecta
G7454 **NORRIE, ENFERMEDAD DE · NDP · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	NDP *1*
NT5C1AS **NT5C1A (MUP44 ó CN-1A) ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunoblot.	11	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 1 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	No se detecta
TEPO **N-TELOPEPTIDOS NTX, ORINA**	Enzimoinmunoanálisis	10	Rec. 5 mL Orina (segunda micción) [Refr.]	Telopéptidos aminoterminales (N-terminal,NTx): Hombres 3,00 - 63,00 nmol ECO/mM cr Telopéptidos aminoterminales (N-terminal,NTx): Mujeres 5,00 - 65,00 nmol ECO/mM cr
ANNA3 **NUCLEAR ANTI-NEURONAL (ANNA-3) ANTICUERPO, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo Tejido: Cerebelo En caso de positividad, el resultado debe ser confirmado con un método alternativo (inmunoblot). En caso de negatividad, no se descarta la existencia de un síndrome neurológico autoinmune
ANUCL **NUCLEOSOMAS ANTICUERPOS, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 20,00 U/mL Positivo: Sup= 20,00 U/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
NH **NUTRIHEALTH (SIN INFORME IMPRESO), SALIVA**	Array mutacional.	30	Rec. 1 Muestra/s Saliva (1 x Kit específico) Imprescindible formulario de recogida de datos y consentimiento informado específicos Kit suministrado por el laboratorio -Durante los 30 minutos antes de obtener la muestra de saliva, el paciente no deberá ingerir alimentos, beber, fumar, mascar chicle ni lavarse los dientes. -Obtener la muestra durante el día, no a primera hora de la mañana -El paciente no debe recoger su muestra si presenta sangrado de encías. Debe esperar a que cese el sangrado.	Indicado en informe adjunto
NHE **NUTRIHEALTH (SIN INFORME IMPRESO), SANGRE TOTAL**	Array mutacional.	30	Rec. 1 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Imprescindible formulario de recogida de datos y consentimiento informado específicos	Indicado en informe adjunto
G03060 **OBESIDAD (AMPLIADO) · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ALMS1, ARL6, BBIP1, BBS1, BBS10, BBS12, BBS2, BBS4, BBS5, BBS7, BBS9, CEP290, CUL4B, GNAS, LEP, LEPR, LZTFL1, MAGEL2, MC4R, MKKS, MKS1, NR0B2, NTRK2, PCSK1, PHF6, POMC, PPARG, SDCCAG8, SIM1, TRIM32, TTC8, VPS13B, WDPCP

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G03059 **OBESIDAD · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	LEP, LEPR, MC4R, NR0B2, NTRK2, PCSK1, POMC, PPARG, SIM1	*19*
G03116 **OBESIDAD POR DEFICIENCIA CONGÉNITA DE LEPTINA Y DEL RECEPTOR DE LEPTINA ·LEP, LEPR · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	LEP, LEPR	*2*
G03061 **OBESIDAD, SÍNDROMES CON · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ALMS1, ARL6, BBIP1, BBS1, BBS10, BBS12, BBS2, BBS4, BBS5, BBS7, BBS9, CEP290, CUL4B, GNAS, LZTFL1, MAGEL2, MKKS, MKS1, PHF6, SDCCAG8, TRIM32, TTC8, VPS13B, WDPCP	*24*
G08074 **ODONTOHIPOFOSFATASIA · ALPL · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ALPL	*1*
G12033 **OFTALMOPLEJIA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	C10orf2, DGUOK, DNA2, OPA1, POLG, POLG2, RRM2B, SLC19A3 , TK2, TYMP	*10*
G07010 **OFTALMOPLEJIA EXTERNA PROGRESIVA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	DGUOK, DNA2, OPA1, POLG, POLG2, RRM2B, SLC25A4, TK2, TWNK	*9*
G07013 **OFTALMOPLEJÍA EXTERNA PROGRESIVA · POLG · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	POLG	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
OLAN				
OLANZAPINA, SUERO	Cromatografía de Gases / Espectrometría Masas.	6	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Cong.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis. El contenedor recomendado es el tubo seco (sin gel separador) para evitar procesos de adsorción del fármaco. En caso de no disponer de tubo seco, la extracción se puede realizar en tubo con gel separador, separando el suero dentro de las 2 horas posteriores a la recolección y transfiriéndolo a un tubo de alícuota para su transporte al laboratorio. Rechazo: Muestra hemolizada, lipémica y/o ictérica	I.Terapéutico: 20,00 - 80,00 µg/L Toxicidad: Sup 100,00 µg/L Límite de cuantificación: 5,00 µg/L
OLI				
OLIGOSACARIDOS, ORINA	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	45	Rec. 10 mL Orina [Cong.] Se acepta muestra de orina parcial en niños y bebés.	Se informa para cada paciente

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
DNOVMB **ONCHOCERCA VOLVULUS, MUESTRA BIOLÓGICA**	PCR-Real Time.	7	Rec. 1 Muestra/s Lesión de piel [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Biopsia de piel [Refr.] Aspirado de lesión o biopsia cutánea, dispensados en un tubo estéril de cierre hermético, preferiblemente de polipropileno.	No se detecta
G15191 **ONCODEEP · PANEL · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	18	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado Alt. 7 Muestra/s Tejido parafinado (7 x Portaobjetos de 10 µm Non-Superfrost™ Plus) [Cong.]	Indicado en informe adjunto
HER2S **ONCOGEN HER-2/NEU, SUERO**	Inmunoanálisis	4	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	Inf 15,00 ng/mL
LNEU2 **ONCONEURONALES AMPLIADO (+ Zic-4,GAD65,Tr), SUERO**	Inmunoblot.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Anticuerpos glia nuclear SOX1: No se detecta Anticuerpos anfifisina: No se detecta Anticuerpos CV2: No se detecta Anticuerpos GAD65: No se detecta Anticuerpos Hu: No se detecta Anticuerpos Ma 2: No se detecta Anticuerpos MGT-30 (titin): No se detecta Ac neuronal recoverina: No se detecta Anticuerpos Ri : No se detecta Anticuerpos neuronal PCA-Tr: No se detecta Anticuerpos Yo: No se detecta Ac neuronal Zic-4: No se detecta

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
NLCR2 **ONCONEURONALES AMPLIADO (+Zic-4, GAD65, Tr), LCR**	Inmunoblot.	5	Rec. 1 mL LCR (1 x Tubo estéril) [Refr.]	No se detecta Anticuerpos anfifisina: No se detecta Inf 0,90 Anticuerpo glia nuclear: No se detecta Anticuerpos HU: No se detecta Anticuerpos MA2: No se detecta Anticuerpos MGT-30: No se detecta Anticuerpo recoverina: No se detecta Anticuerpos RI: No se detecta No se detecta Ac. neuronal cél. de purkinje (Yo) en LCR: No se detecta
AONMBLA **ONCONEURONALES Y/O INTRACELULARES NEURONALES, ANTICUERPOS (HU, RI, YO, CV2 (CRMP5), MA (MA1,MA2/TA) (PNMA1)(PNMA2), ANFIFISINA, TR (DNER),ZIC4, SOX1, GAD, GFAP, AK5), LCR**	Ensayo celular + Inmunohistoquímica	15	Rec. 2 mL LCR [Refr.]	Indicado en informe adjunto
AONMBSU **ONCONEURONALES Y/O INTRACELULARES NEURONALES, ANTICUERPOS (HU, RI, YO, CV2 (CRMP5), MA (MA1,MA2/TA) (PNMA1)(PNMA2), ANFIFISINA, TR (DNER),ZIC4, SOX1, GAD, GFAP, AK5, PCA2), SUERO**	Ensayo celular + Inmunohistoquímica	15	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	
G15194 **ONCOSELECT · PANEL · BIOPSIA LÍQUIDA**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	14	Rec. 20 mL Sangre total (2 x Tubo Streck Cell-Free DNA BCT) Mantener y enviar a temperatura ambiente el mismo día de extracción.	Se informa para cada paciente *51* AKT, ALK [Exons transloc 21-25 Introns transloc 6, 17, 18, 19, 20, 22] , APC [exons 2 -16] , APC, AR, ARAF, ARID1A, ATM, BRAF, BRCA1, BRCA2, CCND1, CCNE1, CD74, EGFR, ERBB2 , ESR1, ETV4, ETV5, ETV6, EWSR1, EZH2, FBXW7, FGFR1, FGFR2, FGFR3, GNAS, H3F3A, HRAS, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, MET, MPL, NRAS, NRG1, NTRK1, NTRK2, PALB2, PDGFRA, PIK3CA, PTEN, RAF1, RET, ROS1, SMAD4, SMO, STK11, TP53, VHL
ONCTYMA **ONCOTYPE MAMA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	30	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G10013 **ONDINE, SÍNDROME DE · PHOX2B · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PHOX2B *1*
G10012 **ONDINE, SÍNDROME DE · PHOX2B(POLI-A) · A.FRAGMENTOS**	Análisis de Fragmentos	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PHOX2B [POLI-A] *1*
CDOE **OPIACEOS CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), CABELLO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	10	Rec. 1 g Cabello (1 x Kit específico)	Confirmación de codeína en cabello : Valor de corte recomendado: Inf 249,00 pg/mg Confirmación de 6-MAM en cabello : Valor de corte recomendado: Inf 260,00 pg/mg Confirmación de morfina en cabello : Valor de corte recomendado: Inf 244,00 pg/mg
DOOR **OPIACEOS CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), ORINA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	3	Rec. 1 mL Orina [Refr.] Cadena de custodia	6-monoacetil morfina (6AM): Incertidumbre de medida 2 ng/mL 6-monoacetil morfina (6AM): Límite de cuantificación 10 ng/mL Codeína : Incertidumbre de medida 4,2 ng/mL Codeína : Límite de cuantificación 25 ng/mL Morfina : Incertidumbre de medida 5,4 ng/mL Morfina : Límite de cuantificación 25 ng/mL Se utiliza como criterio de Positividad que la concentración sea superior o igual al valor del límite de cuantificación más el valor de incertidumbre del ensayo. En caso contrario, el resultado es Negativo.
DOSA **OPIACEOS CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SALIVA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 1 mL Saliva [Refr.]	6-monoacetil morfina (6AM) : Incertidumbre de medida 0,6 ng/mL 6-monoacetil morfina (6AM) : Límite de cuantificación 2 ng/mL Codeína : Incertidumbre de medida 1 ng/mL Codeína : Límite de cuantificación 5 ng/mL Morfina : Incertidumbre de medida 1,2 ng/mL Morfina : Límite de cuantificación 5 ng/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
CPIS **OPIACEOS CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SANGRE**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 10 mL Sangre total Oxalato/Fluoruro (1 x Tubo Sangre Total-Oxalato/Fluoruro) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total Heparina litio (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Tubo oxalato potásico/Fluoruro sódico Ref. SAP 600088318	6-monoacetil morfina (6AM) : Incertidumbre de medida 0,5 ng/mL 6-monoacetil morfina (6AM) : Valor de corte recomendado: 2,00 ng/mL Codeína : Incertidumbre de medida 1 ng/mL Codeína : Valor de corte recomendado: 5,00 ng/mL Morfina : Incertidumbre de medida 1 ng/mL Morfina : Valor de corte recomendado: 5,00 ng/mL
OPIA **OPIÁCEOS, ORINA**	Enzimoinmunoanálisis	1	Rec. 10 mL Orina (1 x Tubo 10 mL.) [Refr.]	Negativo El valor discriminante de la técnica es 2000 ng/mL
G01142 **OPITZ, SÍNDROME DE · MID1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	MID1 *1*
G03182 **ORINA CON OLOR A JARABE DE ARCE, ENFERDEMAD DE LA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BCKDHA, BCKDHB, DBT, DLD *4*
COORPST **ORIPAVINA CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SANGRE**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 10 mL Sangre total Oxalato/Fluoruro (1 x Tubo Sangre Total-Oxalato/Fluoruro) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total Heparina litio (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Tubo oxalato potásico/Fluoruro sódico Ref. SAP 600088318	Incertidumbre de medida 2 ng/mL Límite de cuantificación 10 ng/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G03062 **ORNITIN TRANSCARBAMILASA, DEFICIENCIA DE · OTC · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	OTC *1*
AUORI **ORO, ORINA**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	6	Rec. 2 mL Orina [Refr.]	Inf 50,00 µg/L
AUSU **ORO, SUERO**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	9	Rec. 3 mL Suero (libre trazas metales) (1 x Tubo Suero metales traza) [Refr.]	Inf 2,00 mg/L
OROP **OROPOUCHE ANTICUERPOS IgG + IgM, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	15	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Ac Virus Oropouche IgG: Negativo: Inf 1/20 Ac Virus Oropouche IgM: Negativo: Inf 1/20
RNOV **OROPUCHE VIRUS RNA, MUESTRA BIOLOGICA**	PCR-Real Time.	16	Rec. 1 mL Plasma EDTA [Cong.]	RNA Oropuche sp (resultado): No se detecta
OCOR **ORTOCRESOL, ORINA**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	9	Rec. 5 mL Orina final jornada [Refr.]	Orto cresol (metabolito del tolueno) en orina : VLB®-INSST: Inf 0,60 mg/g crea

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
OSMHE **OSMOLALIDAD, HECES**	Punto de congelación	5	Rec. 3 g Heces [Cong.] Imprescindible muestra en estado líquido (muestra diarreica). Necesario congelar si no se procesa antes de 30 minutos para evitar la acción de metabolismo bacteriano. No ingerir laxantes, enemas ni sales de bario 48 horas antes de la recogida de la muestra.	50,00 - 125,00 mOsm/L
OSMO **OSMOLALIDAD, ORINA**	Descenso crioscópico.	2	Rec. 10 mL Orina [Refr.]	300,00 - 1000,00 mOsm/Kg
OSMO24 **OSMOLALIDAD, ORINA 24h**	Descenso crioscópico.	2	Rec. 10 mL Orina 24h. (alícuota) (1 x Contenedor 2500 mL.) [Refr.]	300,00 - 1000,00 mOsm/Kg
OSMOS **OSMOLALIDAD, SUERO**	Descenso crioscópico.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	280,00 - 300,00 mOsm/Kg
LOSM **OSMOLARIDAD, MUESTRA BIOLOGICA**	Descenso crioscópico.	3	Rec. 1 mL Líquido biológico [Refr.]	mOsm/mL No se dispone de valores de referencia. Valorar a criterio clínico.
G08075 **OSTEOARTRITIS CON CONDRODISPLASIA LEVE · COL2A1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	COL2A1 *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
OSTE **OSTEOCALCINA (TOTAL), SUERO**	Quimioluminiscencia.	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Hombres 4,60 - 65,40 ng/mL Postmenopausia Mujeres 5,40 - 59,10 ng/mL Premenopausia Mujeres 6,50 - 42,30 ng/mL
G1148 **OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA · COL1A1, COL1A2 · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	COL1A1, COL1A2 *2*
G08076 **OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BMP1, COL1A1, COL1A2, CRTAP, FKBP10, IFITM5, LEPRE1, NBAS, PLOD2, PPIB, SERPINF1, SERPINH1, SP7 *13*
G08077 **OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA TIPO I · COL1A1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	COL1A1 *1*
G08078 **OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA TIPO II · COL1A1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	COL1A1 *1*
G08079 **OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA TIPO II · COL1A2 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	COL1A2 *1*
G08080 **OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA TIPO III · COL1A1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	COL1A1 *1*
G08081 **OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA TIPO III · COL1A2 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	COL1A2 *1*
G08082 **OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA TIPO IV · COL1A1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	COL1A1 *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G08083 **OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA TIPO IV · COL1A2 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	COL1A2 *1*
G08144 **OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA · COL1A1 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Se informa para cada paciente
G08145 **OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA · COL1A2 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	
G08104 **OTOPALATODIGITAL I, SÍNDROME · FLNA · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FLNA *1*
G08105 **OTOPALATODIGITAL II, SÍNDROME · FLNA · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FLNA *1*
AOVA **OVARIO ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/20 Interpretación: Positivo: Sup= 1/20
OXAZ **OXAZEPAM, SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.] La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis. Rechazo: Muestra hemolizada, lipémica y/o ictérica	200,00 - 1500,00 µg/L Conc.Tóxica: Sup 2000,00 µg/L Conc.Letal: 3000,00 - 5000,00 µg/L Límite de cuantificación: 25,00 µg/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
QOXC **OXCARBAZEPINA + 10-OH CARBAZEPINA, SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Cong.] La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis. No utilizar tubos con gel separador.	10-OH Carbazepina : I.Terapéutico: 5,00 - 30,00 mg/L 10-OH Carbazepina : Límite de cuantificación: 1,00 mg/L Oxcarbazepina: I.Terapéutico: 0,40 - 2,00 mg/L Oxcarbazepina: Límite de cuantificación: 0,08 mg/L NOTA: La oxcarbazepina se elimina rápidamente del suero con una semivida aparente de 1,3 a 2,3 horas. Toxicidad: (Oxcarbazepina + 10-OH-Carbazepina): Superior a 40 mg/L
COOXCOR **OXICODONA CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), ORINA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 10 mL Orina [Refr.]	Se utiliza como criterio de Positividad que la concentración sea superior o igual al valor del límite de cuantificación más el valor de incertidumbre del ensayo. En caso contrario, el resultado es Negativo. Incertidumbre de medida 5 ng/mL Límite de cuantificación 25 ng/mL
COOXCSA **OXICODONA CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SALIVA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 1 mL Saliva [Refr.]	Incertidumbre de medida 1,50 - 1,5 ng/mL Límite de cuantificación 5 ng/mL
COOXCST **OXICODONA CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SANGRE**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 10 mL Sangre total Oxalato/Fluoruro (1 x Tubo Sangre Total-Oxalato/Fluoruro) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total Heparina litio (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Tubo oxalato potásico/Fluoruro sódico Ref. SAP 600088318	Incertidumbre de medida 1,5 ng/mL Límite de cuantificación 5 ng/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G03063 **OXIDACIÓN DE ACIDOS GRASOS, TRASTORNOS DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ACAD9, ACADL, ACADM, ACADS, ACADVL, CPT1A, CPT2, ETFA, ETFB, ETFDH, GLUD1, HADH, HADHA, HADHB, HMGCL, HMGCS2, HSD17B10, LPIN1, PPARG, SLC22A5, SLC25A20, TAZ
OXIDFI **OXIDACIÓN DE SUSTRATOS ENERGÉTICOS (E.MITOCONDRIALES), FIBROBLASTOS**	Radiometrico.	92	Rec. 1 Muestra/s Cultivo de Fibroblastos en piel	Indicado en informe adjunto
OXNIT **OXIDO NÍTRICO, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	12	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	NOTA: Determinación realizada mediante un procedimiento EIA de tipo RUO. Los valores reportados tienen carácter orientativo. Límite orientativo: Inf 154,00 µmol/L
POXT **OXIESTEROLES, PLASMA**	Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectrometría de masas.	16	Rec. 1 mL Plasma (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Centrifugar la sangre a 2500 rpm 10 minutos a Tª ambiente en las primeras 2 h de su obtención, separar el sobrenadante y congelar inmediatamente a -20ºC Rechazo: Muestras descongeladas y mantenidas a Tª ambiente más de 2 h, hemolizadas, lipémicas ó con presencia de fibrina. IMPRESCINDIBLE: Adjuntar resúmen de la historia clínica.	3a, 7a, 12 a-trihidroxicoprostano en plasma: Inf 7,00 ng/mL 3b, 5a, 6b-colestanotriol en plasma: 0,50 - 8,00 ng/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
OXIT **OXITOCINA, PLASMA**	Enzimoinmunoanálisis	9	Rec. 3 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Separar el plasma y congelar inmediatamente después de la extracción.	Inf 700,00 pg/mL
PDOR **PALADIO, ORINA**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	6	Rec. 2 mL Orina [Refr.]	Inf 0,20 µg/L
PDSU **PALADIO, SUERO**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	9	Rec. 1 mL Suero (libre trazas metales) (1 x Tubo Suero metales traza) [Refr.]	Inf 0,20 µg/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
PALIP **PALIPERIDONA, SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	6	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Muestra extraída en pre dosis. El contenedor recomendado es el tubo seco (sin gel separador) para evitar procesos de adsorción del fármaco. En caso de no disponer de tubo seco, la extracción se puede realizar en tubo con gel separador, separando el suero dentro de las 2 horas posteriores a la recolección y transfiriéndolo a un tubo de alícuota para su transporte al laboratorio. Rechazo: Muestra hemolizada, lipémica y/o ictérica	Paliperidona I. terapéutico: 20 - 60 µg/L* LOQ (Límite de cuantificación) (9-hidroxirisperidona): 5 µg/L * Margen terapéutico según consenso europeo AGNP- TDM
GG **PALUDISMO (GOTA GRUESA)**	Tinción / Observación microscópica.	1	Rec. 1 mL Sangre total EDTA [Refr.]	
G15210 **PÁNCREAS EXTENDIDO, NEOPLASIA DE · PANEL · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	12	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	Se informa para cada paciente *45* AKT1, ALK, BRAF, BRCA1, BRCA2, CARD11, CCNE1, CDK6, CDKN2A, CHEK2, CTNNB1, EPHA7, ERBB2, FGFR1, FGFR2, GATA6, GNAS, KRAS, MDM2, MET, MLH1, MSH2, MSH6, MSI, NOTCH1, NRAS, NRG1, NTRK1, NTRK2, NTRK3, PALB2, PIK3CA, PIK3R3, PMS2, PTEN, RET, RNF43, ROS1, SMAD4, SMARCA4, STK11, TGFBR2, TMB, TP53, VHL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G14064 **PÁNCREAS HEREDITARIO, CÁNCER DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	15	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	APC, ATM, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, CDKN2A, CFTR, KRAS, MEN1, MLH1, MSH2, MSH6, PALB2, PMS1, PMS2, PRSS1, SMAD4, SPINK1, STK11, TP53, TSC1, TSC2, VHL	*23*
G1552 **PANCREATITIS CRÓNICA · SPINK1(N34S) · HOT SPOT**	Hot Spot	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SPINK1 [N34S]	*1*
G05010 **PANCREATITIS HEREDITARIA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CASR , CFTR, CPA1, CTRC, PRSS1, SPINK1	*6*
G05019 **PANCREATITIS HEREDITARIA · PRSS1 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PRSS1	*1*
G05020 **PANCREATITIS HEREDITARIA · PRSS1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PRSS1	*1*
G00086 **PANEL CUSTOM 1 – 2 GENES · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA (2 tubos)) [Refr.]		
G00088 **PANEL CUSTOM 26 – 300 GENES · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 5 mL Sangre total (1 x Tubo sangre EDTA (2 tubos)) [Refr.]		
G00087 **PANEL CUSTOM 3 – 25 GENES · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA (2 tubos)) [Refr.]		
G14134 **PANEL CUSTOM ONCO GERMINAL 1 – 2 GENES · PANEL · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]		

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G14136 **PANEL CUSTOM ONCO GERMINAL 26 - 300 GENES · PANEL · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (4 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	
G14135 **PANEL CUSTOM ONCO GERMINAL 3 – 25 GENES · PANEL · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	
G13111 **PANEL CUSTOM ONCOHEMATOLOGÍA 3 - 10 GENES · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	15	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	
G13114 **PANEL CUSTOM ONCOHEMATOLOGÍA +25 GENES · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	15	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	
G13110 **PANEL CUSTOM ONCOHEMATOLOGÍA 1 - 2 GENES · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	15	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	
G13112 **PANEL CUSTOM ONCOHEMATOLOGÍA 11 - 25 GENES · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	15	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	
G15148 **PANEL CUSTOM TEJIDO 1 - 2 GENES · PANEL · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	18	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	
G15179 **PANEL CUSTOM TEJIDO 3 – 10 GENES ·PANEL·NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	18	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
SEGN **PANEL DE ANTICUERPOS FRENTE AL VIRUS SARS-CoV-2**	Inmunoanálisis quimioluminiscente de micropartículas (CMIA)	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Ac SARS-CoV-2 IgG nucleocápside (Abbott): Negativo: Inf 1,40 Índice Ac SARS-CoV-2 IgG nucleocápside (Abbott): Positivo: Sup= 1,40 Índice Ac SARS-CoV-2 IgG (Abbott) (en BAU/mL): Negativo: Inf 7,10 BAU/mL Ac SARS-CoV-2 IgG (Abbott) (en BAU/mL): Positivo: Sup= 7,10 BAU/mL
PGIP **PANEL GASTROINTESTINAL DE PATÓGENOS, HECES**	Reacción en cadena de la polimerasa.	2	Rec. 1 g Heces (1 x Kit específico) Kit Ref SAP: 600063505	: No se detecta
PAGI **PANEL GINECOLOGICO (HPV, HSV1+2, CHLAMYDIA TRACHOMATIS) DETECCIÓN, TEJIDO**	Reacción en cadena de la polimerasa.	5	Rec. 1 Muestra/s Exudado [Refr.]	DNA Herpes simple 1+2: No se detecta DNA de Chlamydia trachomatis: No se detecta DNA Papilomavirus: No se detecta
G03104 **PANEL NEONATAL MOLECULAR DE ENFERMEDADES METABÓLICAS · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] - Resumen de la historia clínica del paciente. Se requiere consentimiento informado. - En caso que proceda y si está disponible, copia del informe del caso índice familiar.	ABCD1, ABCD4, ACAD8, ACADM, ACADS, ACADSB, ACADVL, ACAT1, ACSF3, AHCY, ALDH4A1, ALDH7A1 , ARG1, ARSB, ASL, ASS1, AUH, BCKDHA, BCKDHB, BTD, CBS, CD320, CFTR, CPS1, CPT1A, CPT2, CYP21A2, DBT, DMD, DNAJC19, ETFA, ETFB, ETFDH, ETHE1, FAH, FTCD, G6PD, GAA, GALC, GALE, GALK1, GALNS, GALT, GAMT, GATM, GBA, GCDH, GCH1, GLA, GNMT, GSS, HADH, HADHA, HADHB, HBA1, HBA2, HBB, HCFC1 , HLCS, HMGCL, HPD, HSD17B10, IDS, IDUA, IVD, LMBRD1, MAT1A, MCCC1, MCCC2, MCEE, MLYCD, MMAA, MMAB, MMACHC, MMADHC, MTHFR, MTR, MTRR, MUT, NAGS, NPC1, NPC2, OAT, OPA3, OTC, PAH, PC, PCBD1, PCCA, PCCB, PHGDH, PNPO , PRODH, PSAT1, PSPH, PTS, QDPR, SERAC1, SERPINA1, SLC22A5, SLC25A13, SLC25A15, SLC25A20, SMPD1, SPR , SUCLA2, SUCLG1, TAT, TAZ, TCN2, TMEM70 *111*
G03105 **PANEL NEONATAL MOLECULAR DE HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	DUOX2, DUOXA2, FOXE1, FOXI1, GNAS, IYD, KAT6B, KCNJ10, NKX21, NKX2-5, PAX8, SECISBP2, SLC16A2, SLC26A4, SLC5A5, THRA, THRB, TPO, TSHR, UBR1 *20*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G17012 **PANEL NEONATAL MOLECULAR DE INMUNODEFICIENCIA SEVERA COMBINADA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ADA, AK2, CD247, CD3D, CD3E, CD3G, CD40LG, CD8A, CORO1A, DCLRE1C, FOXP3, IL10RA, IL2RA, IL2RG, IL7R, JAK3, LIG4, NHEJ1, PNP, PRKDC, PTPRC , RAG1, RAG2 , RMRP, ZAP70 *25*
G13154 **PANEL ONCOHEMATOLÓGICO (LINFOMAS Y MIELOMAS) · PANEL · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	15	Rec. 5 mL Médula ósea EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Se informa para cada paciente *165* ABL1, ABL2, AFF1, ALK, ANKRD26, ARID1A, ARID2, ASXL1, ATM, B2M, BCL2, BCL6, BCOR, BCORL1, BCR, BIRC3, BRAF, BTG1, BTG2, BTK, CALR, CARD11, CBFB, CBL, CCND2, CCND3, CD58, CD79A, CD79B, CDKN2A, CDKN2B, CEBPA, CIITA, CREBBP, CRLF2, CSF1R, CSF3R, CSNK1A1, CUX1, CXCR4, DDX3X, DDX41, DEK, DNMT3A, DUSP22, EBF1, EGR2, EP300, EPOR, ERG, ETV6, EZH2, FBXW7, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FIP1L1, FLT3, FOXO1, FOXP1, GATA1, GATA2, GNA13, GNAQ, HLF, HRAS, ID3, IDH1, IDH2, IKZF1, IL3, IRF4, JAK1, JAK2, JAK3, KAT6A, KIT, KLF2, KMT2A, KMT2C, KMT2D, KRAS, LYL1, MALT1, MAP2K1, MECOM, MEF2B, MEF2D, MGA, MLLT3, MPL, MYC, MYD88, MYH11, NF1, NFKBIE, NOTCH1, NOTCH2, NPM1, NRAS, NT5C2, NTRK1, NTRK2, NTRK3, NUP214, PAX5, PBX1, PCM1, PDGFRA, PDGFRB, PHF6, PIK3CA, PIK3CD, PIK3CG, PIM1 , PLCG2, PML, POT1, PPM1D, PRDM1, PSMB5, PTEN, PTPN11, RAD21, RARA, RHOA, RPN1, RPS15, RUNX1, RUNX1T1, SAMD9, SBDS, SESN1, SETBP1, SETD2, SF1, SF3A1, SF3B1, SMC3, SOCS1, SOCS2, SRSF2, STAG2, STAT3, STAT5B, TAL1, TBL1XR1, TCF3, TCL1A, TENT5C, TERT, TET2, TLX1, TLX3, TNFAIP3, TP53, TP63, TRAF2, TRAF3, U2AF1, USP7, WT1, XBP1, XPO1, ZRSR2
G15222 **PANEL ONCOHEMATOLÓGICO PARA PATOLOGÍA LINFOIDE**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	15	Rec. 5 mL Médula ósea EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	
G15223 **PANEL ONCOHEMATOLÓGICO PARA PATOLOGÍA MIELOIDE**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	15	Rec. 5 mL Médula ósea EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G15218 **PANEL TERAPIA. PANEL DE 40 GENES**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	15	Rec. 20 mL Sangre total (2 x Tubo Streck Cell-Free DNA BCT) Alt. 20 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) Mantener y enviar a temperatura ambiente el mismo día de extracción.	
PAPI2 **PAPILOMAVIRUS (HPV) DNA DETECCIÓN/TIPIFICACIÓN (2a muestra), MUESTRA BIOLÓGICA**	Multiplex-fluorescent PCR (MF-PCR)	5	Rec. 1 Muestra/s Exudado cervical (escobillón seco) [Refr.]	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
QPAP **PAPILOMAVIRUS (HPV) DNA DETECCIÓN/TIPIFICACIÓN, MUESTRA BIOLÓGICA**	Multiplex-fluorescent PCR (MF-PCR)	7	Rec. 1 Muestra/s Exudado cervical (escobillón seco) (1 x Escobillón seco.) Rec. 1 Muestra/s Citología líquida (1 x The ThinPrep PAP Test) [Refr.] Recomendaciones para la toma y envio de muestra: Mediante 10ml de suero salino estéril. Recoger en tubo de plástico y enviar refrigerado a 4ºC d) Muestra de exudado uretral: Escobillón recomendado: Dacrón sin medio. No se aceptan con varilla de madera, ni punta de algodón. Para toma uretral en hombres, rotar varias veces el escobillón y realizar un barrido con un segundo escobillón húmedo. Ambas tomas serán procesadas cojuntamente. Enviar los escobillones secos, sin medio. Estabilidad de la muestra: Refrigerada: 7 días. Congelada: 1 mes. e) Secreción de cuello uterino/ vaginal. Recogida en kit GYNOPREP/SUREPATH a) Biopsia incluida en	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
			parafina: Seis secciones de tejido de <10 mm de grosor o bloque de parafina. Envío en portaobjeto o en tubo de plástico. b) Toma citológica: Escobillón en seco o torunda (hisopo o cepillo) Se recomienda recoger varios hisopos de diferentes zonas. Si hay lesiones aparentes, con uno de ellos raspar un poco o tomar la muestra de los bordes, levantando para evitar la capa de la superficie. Envío de escobillon seco refrigerado 4ºC o temperatura ambiente. Nota: No utilizar torundas en medio de cultivo sólido o líquido. c) Lavado cérvicovaginal:	
PAPIG **PAPILOMAVIRUS ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 0,90 Índice Indeterminado: 0,90 - 1,00 Índice Positivo: Sup 1,00 Índice
PAPP **PAPP-A, SUERO**	TRACE	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Mediana: 10 semanas de gestación Mujeres 1,17 mUI/mL Mediana: 11 semanas de gestación Mujeres 2,18 mUI/mL Mediana: 12 semanas de gestación Mujeres 3,17 mUI/mL Mediana: 13 semanas de gestación Mujeres 4,57 mUI/mL Mediana: 14 semanas de gestación Mujeres 6,34 mUI/mL Mediana: 8 semanas de gestación Mujeres 0,33 mUI/mL Mediana: 9 semanas de gestación Mujeres 0,64 mUI/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G02031 **PAQUIOQUINIA CONGÉNITA · KRT6A, KRT6C · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	KRT6A, KRT6C *2*
DNPBMB **PARACOCCIDIOIDES BRASILIENSIS DNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	PCR-Real Time.	6	Rec. 1 mL Líquido biológico (1 x Recipiente estéril) [Refr.] La muestra de elección depende de la localización de la lesión: - Muestras cutáneas o subcutáneas: raspado o biopsia. También se aceptan exudados cutáneos. - Muestras pulmonares: muestras respiratoria profunda. Esputo o aspirado broncoalveolar. - Muestras bucales: mucosa oral-bucal - Muestra otras mucosas - Tejido parafinado Estabilidad 48 Horas refrigerada, 6 meses congelada	No se detecta
PI123G **PARAINFLUENZA (1,2,3) ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/256 Interpretación: Positivo: Inf 1/256
PI123M **PARAINFLUENZA (1,2,3) ANTICUERPOS IgM, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/12 Interpretación: Positivo: Inf 1/12

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G11224 **PARÁLISIS PERIÓDICA · SCN4A · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SCN4A *1*
G3501 **PARÁLISIS PERIÓDICA HIPOCALÉMICA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CACNA1S, KCNJ18, SCN4A *3*
G7464 **PARÁLISIS PERIÓDICA HIPOCALÉMICA TIPO 1 · CACNA1S · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CACNA1S *1*
G7461 **PARÁLISIS PERIÓDICA HIPOCALÉMICA TIPO 2 · SCN4A · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SCN4A *1*
G11214 **PARÁLISIS PERIÓDICA HIPOCALIÉMICA · CACNA1S, SCN4A · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CACNA1S, SCN4A *2*
G7443 **PARÁLISIS SUPRANUCLEAR PROGRESIVA · MAPT · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	MAPT *1*
TIBB **PARAMETROS INDICE DE TIBBLING Y LINK**	Nefelometría - Turbidimetría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 1 mL LCR (1 x Tubo Polipropileno) [Refr.]	Albúmina: 35,00 - 52,00 g/L Albúmina en LCR: Inf 35,00 mg/dL Inmunoglobulina IgG en LCR: Inf 3,40 mg/dL IgG: Ambos 0 - 1 Años 313,00 - 1170,00 mg/dL IgG: Ambos 1 - 4 Años 295,00 - 1156,00 mg/dL IgG: Ambos 4 - 10 Años 386,00 - 1682,00 mg/dL IgG: Ambos 10 - 16 Años 503,00 - 1719,00 mg/dL IgG: Ambos 16 - 18 Años 487,00 - 1327,00 mg/dL IgG: Ambos Sup - 18 Años 767,00 - 1590,00 mg/dL Síntesis local IgG en LCR (Índice de Tibbling): Inf 0,80

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
PAMI **PARAMINOFENOL, ORINA FINAL JORNADA**	Espectrometría.	14	Rec. 1 mL Orina final jornada (1 x Tubo 10 mL.) [Refr.]	VLB®-INSST: (Anilina) Inf 50,00 mg/L Límite de cuantificación: 20,00 mg/L En la determinación de paraminofenol mediante espectrometría, los metabolitos del paracetamol interfieren en su medida.
PMXR **PARAMIXOVIRUS (PAROTIDITIS) (PMV) RNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	PCR-Real Time.	12	Rec. 2 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Rec. 2 mL Orina (1 x Contenedor estéril) [Cong.] Rec. 1 mL Saliva (1 x Tubo estéril) [Cong.] Rec. 1 mL LCR (1 x Tubo estéril) [Cong.] Alt. 1 mL Exudado (1 x Tubo estéril) [Cong.] Resuspender en PBS y congelar inmediatamente.	No se detecta
PNF **PARANITROFENOL, ORINA**	Cromatografía de Gases / Espectrometría Masas.	9	Rec. 1 mL Orina final jornada (1 x Tubo 10 mL.) [Refr.]	p-Nitrofenol: VLB®-INSST: (Nitrobenceno) Inf 5,00 mg/g crea p-Nitrofenol: VLB®-INSST: (Paratión) Inf 0,50 mg/g crea
G11263 **PARAPARESIA ESPÁSTICA TIPO 2 · PLP1 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PLP1 *1*
G11259 **PARAPARESIA ESPÁSTICA 3A · ATL1 · NGS**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ATL1 *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G11254 **PARAPARESIA ESPÁSTICA (AD, AR, LX) · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ALDH18A1, AMPD2, AP4B1, AP4E1, AP4M1, AP4S1, AP5Z1, ARL6IP1, ATL1, ATP13A2, B4GALNT1, BSCL2, C12ORF65, C19orf12, CAPN1, CPT1C, CYP2U1, CYP7B1, DDHD1, DDHD2, DSTYK, ENTPD1, ERLIN1, ERLIN2, FA2H, FARS2, GBA2, GJC2, HSPD1, IBA57, KIF1A, KIF5A, L1CAM, MAG, NIPA1, NT5C2, PLP1, PNPLA6, REEP1, RTN2, SLC16A2, SLC33A1, SLC3A1, SPAST, SPG11, SPG20, SPG21, SPG7, TECPR2, TFG, UCHL1, VPS37A, WASHC5, ZFYVE26, ZFYVE27	*55*
G11150 **PARAPARESIA ESPÁSTICA 4 · SPAST · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SPAST	*1*
G7326 **PARAPARESIA ESPÁSTICA TIPO 11 · SPG11 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SPG11	*1*
G3069 **PARAPARESIA ESPÁSTICA TIPO 4 · SPAST · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SPAST	*1*
G11186 **PARAPARESIA ESPASTICA TIPO 7 (SPG7) · SPG7 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SPG7	*1*
G11112 **PARAPLEJIA ESPÁSTICA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AFG3L2, ALDH18A1, ALS2, AP4B1, AP4E1, AP4M1, AP4S1, AP5Z1, ATL1, ATP13A2, ATP2B4, B4GALNT1, BSCL2, C12ORF65, C19orf12, CCT5, CYP2U1, CYP7B1, DDHD1, DDHD2, ENTPD1, ERLIN2, EXOSC3, FA2H, FARS2, GBA2, GJC2, GRID2, HSPD1, IBA57, KIAA0196, KIF1A, KIF1C, KIF5A, L1CAM, LYST, MAG, MARS2, NIPA1, PLP1, PNPLA6, RAB3GAP2 , REEP1, REEP2, RTN2, SACS, SLC16A2, SLC33A1, SPAST, SPG11, SPG20, SPG21, SPG7, TECPR2, TFG, UCHL1, VAMP1, VPS37A, ZFYVE26, ZFYVE27	*60*
G11113 **PARAPLEJIA ESPÁSTICA AD · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ALDH18A1, ATL1, ATP2B4, BSCL2, GRID2, HSPD1, KIAA0196, KIF5A, NIPA1, REEP1, REEP2, RTN2, SLC33A1, SPAST, SPG7, ZFYVE27	*16*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G11114 **PARAPLEJIA ESPÁSTICA AR · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AFG3L2, ALDH18A1, ALS2, AP4B1, AP4E1, AP4M1, AP4S1, AP5Z1, ATP13A2, B4GALNT1, C12ORF65, C19orf12, CCT5, CYP2U1, CYP7B1, DDHD1, DDHD2, ENTPD1, ERLIN2, EXOSC3, FA2H, FARS2, GBA2, GJC2, IBA57, KIF1C, LYST, MAG, PNPLA6, RAB3GAP2 , REEP2, SACS, SPG11, SPG20, SPG21, SPG7, TECPR2, TFG, UCHL1, VPS37A, ZFYVE26 *41*
G11115 **PARAPLEJIA ESPÁSTICA LX · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	L1CAM, PLP1, SLC16A2 *3*
G11116 **PARAPLEJIA ESPATICA TIPO SILVER, SÍNDROME DE · BSCL2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BSCL2 *1*
PHHP **PARÁSITOS EN HECES POR PCR**	Reacción en cadena de la polimerasa.	10	Rec. 1 g Heces (1 x Kit específico) Kit Ref SAP: 600063505	: No se detecta
VPHP **PARÁSITOS Y VIRUS EN HECES POR PCR**	Reacción en cadena de la polimerasa.	15	Rec. 1 g Heces (1 x Kit específico) Kit Ref SAP: 600063505	: No se detecta
PMB **PARÁSITOS, MUESTRA BIOLÓGICA**	Observación microscópica.	3	Rec. 1 Muestra/s Líquido biológico [Refr.]	
PTHI **PARATHORMONA INTACTA (PTH INTACTA), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	15,10 - 90,90 pg/mL
G11250 **PARKINSON 8 (PARK8) · LRRK2 (31,35,41) · HOT SPOT**	Secuenciación Sanger	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	LRRK2 *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G11272 **PARKINSON 8, ENFERMEDAD DE · LRRK2 · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	LRRK2	*1*
G11117 **PARKINSON AD, ENFERMEDAD DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GIGYF2, HTRA2, LRRK2 , MAPT, SNCA, VPS35	*6*
G11118 **PARKINSON AR, ENFERMEDAD DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ATP13A2, DNAJC6, FBXO7, PARK2, PARK7, PINK1, PLA2G6, SLC6A3 , SYNJ1	*9*
G11231 **PARKINSON DE INICIO JUVENIL · PRKN (PARK2) · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PRKN	*1*
G11251 **PARKINSON DE INICIO TEMPRANO · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	LRRK2 , PARK2, PARK7, PINK1	
G3115 **PARKINSON FAMILIAR, ENFERMEDAD DE · PARK2 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PARK2	*1*
G11119 **PARKINSON LX, ENFERMEDAD DE · ATP6AP2, TAF1 · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ATP6AP2, TAF1	*2*
G11245 **PARKINSON, ENFERMEDAD DE · GBA · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GBA	*1*
G11120 **PARKINSON, ENFERMEDAD DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ATP13A2, ATP6AP2, CHCHD2, DNAJC6, FBXO7, GIGYF2, HTRA2, LRRK2 , MAPT, PARK7, PINK1, PLA2G6, PRKN, SLC6A3 , SNCA, SYNJ1, TAF1, VPS35	*18*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G7339 **PARKINSON, ENFERMEDAD DE · SNCA · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SNCA *1*
PAROGE **PAROTIDITIS ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 0,90 Indice Indeterminado: 0,90 - 1,10 Indice Positivo: Sup 1,10 Indice
PAROME **PAROTIDITIS ANTICUERPOS IgM, SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 0,90 Indice Indeterminado: 0,90 - 1,10 Indice Positivo: Sup 1,10 Indice

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
PAROX **PAROXETINA, SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	7	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis. El contenedor recomendado es el tubo seco (sin gel separador) para evitar procesos de adsorción del fármaco. En caso de no disponer de tubo seco, la extracción se puede realizar en tubo con gel separador, separando el suero dentro de las 2 horas posteriores a la recolección y transfiriéndolo a un tubo de alícuota para su transporte al laboratorio. Rechazo: Muestra hemolizada, lipémica y/o ictérica	I.Terapéutico: 20,00 - 65,00 µg/L Toxicidad: Sup 120,00 µg/L Límite de cuantificación: 5,00 µg/L
DB19 **PARVOVIRUS B19 (PV) DNA CUANTITATIVO, PLASMA**	Reacción en cadena de la polimerasa.	5	Rec. 1 mL Plasma EDTA [Refr.] Rec. 1 mL LCR [Refr.]	Límite de detección: 125 UI/mL. Límite superior de cuantificación: 25.000.000 UI/mL.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
DNPB **PARVOVIRUS B19 (PV) DNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	PCR-Real Time.	5	Rec. 2 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 2 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Rec. 2 mL Médula ósea (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 2 mL LCR (1 x Tubo estéril) [Cong.] Rec. 2 mL Lavado broncoalveolar (1 x Contenedor estéril) [Cong.]	La sensibilidad y la especificidad de la técnica es de un 100%. El límite de detección es 125 UI/mL. DNA de Parvovirus: No se detecta
PARGE **PARVOVIRUS B19 ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Quimioluminiscencia.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 1 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 1 mL Plasma Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) [Refr.]	Negativo: Inf 2,00 UI/mL Indeterminado: 2,00 - 2,49 UI/mL Positivo: Sup= 2,50 UI/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
PARME **PARVOVIRUS B19 ANTICUERPOS IgM, SUERO**	Quimioluminiscencia.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 1 mL Plasma Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 1 mL Plasma Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) [Refr.] Muestra alternativa: plasma EDTA,citratado o heparina.	Negativo: Inf 0,90 Índice Indeterminado: 0,90 - 1,09 Índice Positivo: Sup= 1,10 Índice
DNPAMU **PASTEURELLA MULTOCIDA DNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	Reacción en cadena de la polimerasa.	5	Rec. 2 mL LCR [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Exudado faringeo [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Exudado de herida [Refr.] Rec. 1 mL Líquido sinovial [Refr.]	No se detecta
PATER2 **PATERNIDAD (COMPATIBILIDAD GENÉTICA) SCREENING, SANGRE TOTAL/ESCOBILLÓN SECO**	M-P.C.R.	12	Rec. 5 mL Sangre total EDTA [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Frotis bucal (1 x Escobillón seco.) [Refr.] La muestra de escobillón seco a partir de mucosa bucal.	Se informa para cada paciente

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
PATER1 **PATERNIDAD (VALOR LEGAL) SCREENING, SANGRE TOTAL/ESCOBILLÓN SECO**	M-P.C.R.	12	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Frotis bucal (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] La muestra de escobillón seco a partir de mucosa bucal. Padre, Hijo/a u otros	Se informa para cada paciente	
PATPRENI **PATERNIDAD PRENATAL NO INVASIVA (SIN VALOR JUDICIAL)**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	20	Rec. 10 mL Sangre total EDTA (1 x Kit específico) Rec. 1 Muestra/s Frotis bucal (1 x Kit específico) Al menos 10 semanas de edad gestacional. Contactar con el laboratorio antes de solicitar el estudio. Kit especial de toma de muestras + documentación hisopo bucal (sin medio) paterno + sangre materna en tubo streck	Indicado en informe adjunto	
G09048 **PAX2, SÍNDROMES RELACIONADOS CON · PAX2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Indicado en informe adjunto PAX2	*1*
G12074 **PAX6, SÍNDROMES RELACIONADOS CON · PANEL · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PAX6, SOX2, WT1	*3*
PCA2SU **PCA-2 NEURONAL ANTICUERPOS, SUERO**	Ensayo celular + Inmunohistoquímica	15	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	No se detecta	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
CFOR **PCLOROFENOL, ORINA**	Cromatografía de Gases / Captura Electrónica.	10	Rec. 5 mL Orina final jornada (1 x Contenedor 25 mL.) [Refr.]	Excreción (creatinina): BEIs® (ACGIH®): Final de la jornada laboral (Clorobenceno) Inf 20,00 mg/g crea : Límite de cuantificación: 1,00 mg/L
G11262 **PELIZAEUS-MERZBACHER, ENFERMEDAD DE · PLP1 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PLP1 *1*
G16032 **PENDRED, SÍNDROME DE · SLC26A4 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SLC26A4 *1*
PPENO **PENICILLIUM NOTATUM PRECIPITINAS, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	El resultado hace referencia a la concentración de IgG específica. Negativo: Inf 1,00 U/mL Indeterminado: 1,00 - 2,00 U/mL Positivo: Sup 2,00 U/mL
PCFO **PENTACLOROFENOL TOTAL, ORINA**	Cromatografía de Gases / Captura Electrónica.	15	Rec. 5 mL Orina final semana laboral (1 x Tubo 10 mL.) [Refr.]	Excreción (creatinina): BEIs® (ACGIH®): Final de la jornada laboral Inf 2 mg/g creat Excreción (creatinina): VLB®-INSST: Final de la jornada laboral (Pentaclorofenol) Inf 2,00 mg/g creat Pentaclorofenol total en orina (concentración): Límite de cuantificación: Inf 0,10 mg/L
PCLFE **PENTACLOROFENOL, SUERO**	Cromatografía de Gases / Espectrometría Masas.	16	Rec. 2 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Inf 12,00 µg/L
COPENSAI **PENTOBARBITAL CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SALIVA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	3	Rec. 1 Muestra/s Saliva (1 x Quantisal Oral Fluid) [Refr.]	Incertidumbre de medida 2 ng/mL Límite de cuantificación 25 ng/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
COPENSTI **PENTOBARBITAL CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SANGRE**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	3	Rec. 10 mL Sangre total Oxalato/Fluoruro (1 x Tubo Sangre Total-Oxalato/Fluoruro) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total Heparina litio (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Tubo oxalato potásico/Fluoruro sódico Ref. SAP 600088318	Incertidumbre de medida 2 ng/mL Límite de cuantificación 25 ng/mL
PEPS **PEPSINÓGENO I, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	11	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	25,00 - 200,00 ng/mL
PEPSII **PEPSINÓGENO II, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	17	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	2,30 - 20,00 ng/mL
PEPC3 **PÉPTIDO C (3'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 3 m. [Refr.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
PEPC6 **PÉPTIDO C (6'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 6 m [Refr.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
PEPC10 **PÉPTIDO C (10'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 10 m [Refr.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
PEPC15 **PÉPTIDO C (15'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 15 m. [Refr.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
PEPC30 **PÉPTIDO C (30'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 30 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
PEPC60 **PÉPTIDO C (60'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 60 m. [Refr.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
PEPC90 **PÉPTIDO C (90'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 90 m. [Refr.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
PEPC120 **PÉPTIDO C (120'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 120 m. [Refr.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
PEPC150 **PÉPTIDO C (150'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 150 m. [Refr.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
PEPC180 **PÉPTIDO C (180'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 180 m. [Refr.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
PEPC210 **PÉPTIDO C (210'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 210 m. [Refr.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
PEPC240 **PÉPTIDO C (240'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 240 m. [Refr.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
PEPC270 **PÉPTIDO C (270'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 270 m. [Refr.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
PEPC300 **PÉPTIDO C (300'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 300 m. [Refr.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
PEPC360 **PÉPTIDO C (360'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 360 m. [Refr.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
PEPCL **PÉPTIDO C LIBRE, SUERO**	Radioinmunoanálisis.	12	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	0,40 - 2,64 ng/mL
PCORI **PÉPTIDO C, ORINA 24H**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Orina 24h. (alícuota) (1 x Contenedor 2500 mL.) [Refr.]	Péptido C en orina de 24 horas : 23,70 - 207,00 µg/24h Volumen de orina remitido (diuresis): 600,00 - 1600,00 mL
PEPC **PÉPTIDO C, SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	0,78 - 5,19 ng/mL
ACCPM **PÉPTIDO CÍCLICO CITRULINADO (CCP) ANTICUERPOS, SUERO**	Quimioluminiscencia.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Inf 5,00 U/mL
VIP **PÉPTIDO INTESTINAL VASOACTIVO (VIP), PLASMA**	Radioinmunoanálisis.	12	Rec. 1 mL Plasma EDTA Aprotinina (1 x Tubo Sangre EDTA Aprotinina) [Cong.] Rec. 1 mL Plasma Aprotinina (1 x Tubo Sangre EDTA Aprotinina) [Cong.]	7,30 - 25,40 pmol/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
BNP **PÉPTIDO NATRIURÉTICO CEREBRAL (BNP) C TERMINAL, PLASMA**	Quimioluminiscencia.	3	Rec. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Rechazo: Muestras refrigeradas o a temperatura ambiente más de 24 horas.	Insuficiencia cardíaca Sup 100,00 ng/L
CGRP **PÉPTIDO RELACIONADO CON EL GEN DE CALCITONINA (CRGP), PLASMA**	Enzimoinmunoanálisis	11	Rec. 2 mL Plasma EDTA Aprotinina (1 x Tubo Sangre EDTA Aprotinina) [Cong.] Separar y congelar inmediatamente.	Inf 2,80 ng/mL
PERAMP **PERAMPANEL, SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	8	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	180,00 - 980,00 µg/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
OLIC				
PERFIL CARDIOVASCULAR	No se aplica.	5	Rec. 8.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 8.5 mL Suero (1 x Alicuota) [Cong.] Rec. 3 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Ayuno mínimo de 10 horas Realizar la extracción en horario compatible con el envío de la muestra el mismo día de la extracción. Peticionario general. Adjuntar documentación junto con la muestra El informe de resultados se recogerá físicamente en el centro de extracción, o bien, vía acceso web.	: Indicado en informe adjunto

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
PETS				
PERFIL ETS, DETECCIÓN DNA, MUESTRA BIOLÓGICA	PCR-Real Time.	5	Rec. 1 Muestra/s Orina (primera micción) (1 x Contenedor 25 mL.) [Cong.] Rec. 1 Muestra/s Exudado vaginal (1 x Escobillón seco.) [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Exudado uretral (1 x Escobillón seco.) [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Exudado rectal (1 x Escobillón seco.) [Refr.] Alt. 5 mL Lavado seminal [Cong.] Alt. 2 mL Semen [Cong.] Alt. 2 mL Secreción prostática [Cong.] Alt. 1 Pieza/s Tejido parafinado Alt. 1 mL LCR [Refr.] HOMBRES: Muestra de elección: Orina Recoger los 5-15 primeros ml de la primera micción de la mañana en un contenedor estéril, y desechar el resto para evitar la dilución de la muestra. Si no fuera posible, recoger los 5-15 primeros ml de la orina recogida 1-2h después de la última micción. MUJERES: Muestra de elección: Exudado vaginal Tomar la muestra de exudado vaginal en escobillón SECO (sin	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
			medio AMIES; Ref. 600049229). En caso de autotoma, proporcionar instrucciones a la paciente para la correcta recogida de la muestra (MP_RMP-0071). Alternativamente puede remitirse muestra de orina, según el procedimiento indicado para pacientes hombres.	
PERGEN **PERFIL GENÉTICO, SANGRE TOTAL**	Análisis de Fragmentos	20	Rec. 1 mL Sangre total EDTA [Refr.] Adjuntar documentación junto con la muestra Consentimiento informado, documentos En el caso de menores sin DNI, fotografía del menor y libro de familia. Fotocopia DNI (u otro documento de identidad legal) de los participantes (comprobado con el original).	Indicado en informe adjunto
PGHH **PERFIL HORMONAL AVANZADO HOMBRE**	Inmunoanálisis	1	Rec. 8.5 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.] Rec. 3 mL Suero (1 x Alicuota) [Refr.] Rec. 2 mL Suero (1 x Alicuota) [Cong.] Documentación: Peticionario general.	: Indicado en informe adjunto

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
PGHM **PERFIL HORMONAL AVANZADO MUJER**	Inmunoanálisis	1	Rec. 8.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 3 mL Suero (1 x Alicuota) [Refr.] Rec. 2 mL Suero (1 x Alicuota) [Cong.] Documentación: Peticionario general.	: Indicado en informe adjunto
PHBH **PERFIL HORMONAL BASICO HOMBRE**	Inmunoanálisis	1	Rec. 8.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 3 mL Suero (1 x Alicuota) [Refr.] Rec. 2 mL Suero (1 x Alicuota) [Cong.] Documentación: Peticionario general.	: Indicado en informe adjunto
PHMU **PERFIL HORMONAL BASICO MUJER**	Inmunoanálisis	1	Rec. 8.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 3 mL Suero (1 x Alicuota) [Refr.] Rec. 2 mL Suero (1 x Alicuota) [Cong.] Documentación: Peticionario general.	: Indicado en informe adjunto
PILS **PERFIL INTERLEUCINAS**	Quimioluminiscencia y Enzimoinmunoanálisis	15	Rec. 1 mL Suero (3 x Alicuota) [Cong.] Ayuno mínimo de 6 h Evitar remitir la muestra en fines de semana y vísperas de festivos. No realizar ejercicio intenso antes de la toma.	Interferón gamma: Inf 0,58 UI/mL Interleuquina 10 : Inf= 5,90 pg/mL Interleuquina 2: Inf 9,10 pg/mL Interleuquina 4 : Inf 38,70 pg/mL Interleuquina 6 : Inf 3,40 pg/mL TNF alfa (Factor de necrosis tumoral): Inf 13,7 pg/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
POPR **PERFIL OSTEOPOROSIS**	Cálculo.	7	Rec. 4 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 10 mL Orina (segunda micción) (1 x Contenedor estéril) [Refr.] Documentación: Peticionario general. Ayuno de 4 horas	Indicado en el informe adjunto
PEPR **PERFIL PROTEICO AMPLIADO**	No se aplica.	15	Rec. 5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Ayuno mínimo de 6 h Evitar remitir la muestra en fines de semana y vísperas de festivos. No realizar ejercicio intenso antes de la toma.	Albúmina: 35,00 - 52,00 g/L Alfa 1 Glucoproteína ácida (Orosomucoide): 50,00 - 120,00 mg/dL Complemento C3: 90,00 - 180,00 mg/dL Complemento C4: 10,00 - 40,00 mg/dL Ferritina: Hombres 24,00 - 336,00 ng/mL Ferritina: Mujeres 11,00 - 307,00 ng/mL Haptoglobina: 30,00 - 200,00 mg/dL Haptoglobina: Límite de cuantificación: 7,60 mg/dL IgA: Ambos 0 - 1 Años 36,00 - 79,00 mg/dL IgA: Ambos 1 - 4 Años 27,00 - 246,00 mg/dL IgA: Ambos 4 - 10 Años 34,00 - 274,00 mg/dL IgA: Ambos 10 - 16 Años 52,00 - 319,00 mg/dL IgA: Ambos 16 - 18 Años 60,00 - 337,00 mg/dL IgA: Ambos Sup - 18 Años 61,00 - 356,00 mg/dL IgG: Ambos 0 - 1 Años 313,00 - 1170,00 mg/dL IgG: Ambos 1 - 4 Años 295,00 - 1156,00 mg/dL IgG: Ambos 4 - 10 Años 386,00 - 1682,00 mg/dL IgG: Ambos 10 - 16 Años 503,00 - 1719,00 mg/dL IgG: Ambos 16 - 18 Años 487,00 - 1327,00 mg/dL IgG: Ambos Sup - 18 Años 767,00 - 1590,00 mg/dL IgM: Ambos 0 - 1 Años 46,00 - 152,00 mg/dL IgM: Ambos 1 - 4 Años 37,00 - 184,00 mg/dL IgM: Ambos 4 - 10 Años 37,00 - 251,00 mg/dL IgM: Ambos 10 - 16 Años 41,00 - 244,00 mg/dL IgM: Ambos 16 - 18 Años 49,00 - 201,00 mg/dL IgM: Ambos Sup - 18 Años 37,00 - 286,00 mg/dL Prealbúmina: 20,00 - 40,00 mg/dL Proteína C Reactiva: Inf 5,00 mg/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
PILP **PERFIL PROTEICO BÁSICO**	No se aplica.	15	Rec. 5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Rec. 5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Ayuno mínimo de 6 h Evitar remitir la muestra en fines de semana y vísperas de festivos. No realizar ejercicio intenso antes de la toma.	: Indicado en informe adjunto

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
PESE **PERFIL SEROLÓGICO**	No se aplica.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Ayuno mínimo de 6 h Evitar remitir la muestra en fines de semana y vísperas de festivos. No realizar ejercicio intenso antes de la toma.	Ac IgG Citomegalovirus BARCELONA: Negativo: Inf 12,00 UI/mL Ac IgG Citomegalovirus BARCELONA: Indeterminado: 12,00 - 14,00 UI/mL Ac IgG Citomegalovirus BARCELONA: Positivo: Sup 14,00 UI/mL Ac IgM Citomegalovirus BARCELONA: Negativo: Inf 18,00 UI/mL Ac IgM Citomegalovirus BARCELONA: Indeterminado: 18,00 - 22,00 UI/mL Ac IgM Citomegalovirus BARCELONA: Positivo: Sup 22,00 UI/mL Ac IgG Epstein Barr early antígeno: Interpretación: Negativo: Inf 1/20 Ac IgG Epstein Barr early antígeno: Interpretación: Positivo: Sup= 1/20 Ac Epstein Barr VCA IgG: Negativo: Inf 20,00 U/mL Ac Epstein Barr VCA IgG: Positivo: Sup= 20,00 U/mL Ac Epstein Barr VCA IgM: Negativo: Inf 20,00 U/mL Ac Epstein Barr VCA IgM: Indeterminado: 20,00 - 40,00 U/mL Ac Epstein Barr VCA IgM: Positivo: Sup 40,00 U/mL Ac Epstein Barr ag nuclear IgG (IFI) - BARCELONA: Interpretación: Negativo: Inf 1/20 Ac Epstein Barr ag nuclear IgG (IFI) - BARCELONA: Interpretación: Positivo: Sup= 1/20 Ac Herpes Simplex 1 IgG: Negativo: Inf 0,80 Índice Ac Herpes Simplex 1 IgG: Indeterminado: 0,80 - 1,10 Índice Ac Herpes Simplex 1 IgG: Positivo: Sup= 1,10 Índice Ac Herpes Simplex 2 IgG: Negativo: Inf 0,80 Índice Ac Herpes Simplex 2 IgG: Indeterminado: 0,80 - 1,09 Índice Ac Herpes Simplex 2 IgG: Positivo: Sup= 1,10 Índice Ac Herpes Simplex 2 IgM: Negativo: Inf 1,10 Índice Ac Herpes Simplex 2 IgM: Positivo: Sup= 1,10 Índice Ac Herpes Simplex 1 IgM: Negativo: Inf 1,10 Índice Ac Herpes Simplex 1 IgM: Positivo: Sup= 1,10 Índice Ac Varicela Zoster IgG: No se detecta: Inf 150,00 mUI/mL Ac Varicela Zoster IgG: Positivo: Sup= 150,00 mUI/mL Ac Varicela Zoster IgM: No se detecta: Inf 0,90 Índice Ac Varicela Zoster IgM: Indeterminado: 0,90 - 1,10 Índice Ac Varicela Zoster IgM: Positivo: Sup 1,10 Índice

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
VEGA **PERFIL VEGANO**	No se aplica.	15	Rec. 8.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 3 mL Suero (libre trazas metales) (1 x Tubo Suero metales traza) [Refr.] Rec. 3 mL Sangre total EDTA [Refr.] Rec. 2.5 mL Suero (1 x Alicuota) [Cong.] Rec. 2.5 mL Suero (1 x Alicuota) [Refr.] Rec. 10 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo protegido de la luz) [Refr.] Ayuno mínimo de 8 horas. Peticionario general. Realizar la extracción en horario compatible con el envío de la muestra el mismo día de la extracción.	Indicado en el informe adjunto

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
VEGE **PERFIL VEGETARIANO**	No se aplica.	15	Rec. 8.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 3 mL Suero (libre trazas metales) (1 x Tubo Suero metales traza) [Refr.] Rec. 3 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 2.5 mL Suero (1 x Alicuota) [Cong.] Rec. 2.5 mL Suero (1 x Alicuota) [Refr.] Rec. 10 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo protegido de la luz) [Refr.] Ayuno de 8 horas. Realizar la extracción en horario compatible con el envío de la muestra el mismo día de la extracción. Peticionario general.	Indicado en el informe adjunto

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
VISI **PERFIL VITAL (TNA+TES+TDA)**	No se aplica.	30	Rec. 8.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 5 mL Suero (libre trazas metales) (1 x Tubo Suero metales traza) [Refr.] Rec. 3.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Rec. 3 mL Sangre total EDTA (3 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 3 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo protegido de la luz) [Refr.] Rec. 10 mL Plasma EDTA (1 x Alicuota) [Cong.] Ayuno de 8 horas. Peticionario general. Adjuntar documentación junto con la muestra Realizar la extracción en horario compatible con el envío de la muestra el mismo día de la extracción.	Vitamina D 25OH (calcidiol): Deficiencia Inf 10,00 ng/mL Vitamina D 25OH (calcidiol): Insuficiencia 10,00 - 30,00 ng/mL Vitamina D 25OH (calcidiol): Suficiencia 30,00 - 100,00 ng/mL Vitamina D 25OH (calcidiol): Toxicidad Sup 100,00 ng/mL Negativo: Inf 7,00 U/mL Indeterminado: 7,00 - 10,00 U/mL Positivo: Sup 10,00 U/mL Basófilos: Ambos 0 - 3 Días Inf 0,35 x10³/mm³ Basófilos: Ambos 3 - 14 Días Inf 0,25 x10³/mm³ Basófilos: Ambos 14 - 365 Días Inf 0,20 x10³/mm³ Basófilos: Ambos Sup - 1 Años Inf 0,20 x10³/mm³ Basófilos %: Ambos 0 - 3 Días Inf 2,25 % Basófilos %: Ambos 3 - 14 Días Inf 1,75 % Basófilos %: Ambos 14 - 365 Días Inf 1,50 % Basófilos %: Ambos 1 - 4 Años Inf 1,50 % Basófilos %: Ambos Sup - 4 Años Inf 1,75 % Calcio total: Ambos 0 - 10 Días 7,60 - 10,40 mg/dL Calcio total: Ambos 10 - 365 Días 9,00 - 11,00 mg/dL Calcio total: Ambos 1 - 2 Años 9,00 - 11,00 mg/dL Calcio total: Ambos 2 - 12 Años 8,80 - 10,80 mg/dL Calcio total: Ambos Sup - 12 Años 8,80 - 10,60 mg/dL Colesterol HDL: Hombres Sup 40,00 mg/dL Colesterol HDL: Mujeres Sup 50,00 mg/dL CHCM: Ambos 0 - 14 Días 29,00 - 36,00 g/dL CHCM: Ambos 14 - 30 Días 29,00 - 35,00 g/dL CHCM: Ambos 30 - 365 Días 29,00 - 35,00 g/dL CHCM: Ambos 1 - 12 Años 30,00 - 36,00 g/dL CHCM: Ambos 12 - 65 Años 31,50 - 36,00 g/dL CHCM: Ambos Sup - 65 Años 31,50 - 36,00 g/dL Creatina Quinasa (CK): Hombres Inf 171,00 U/L Creatina Quinasa (CK): Mujeres Inf 145,00 U/L Colesterol total: Inf 200,00 mg/dL Postmenopausia Mujeres 0,18 - 1,02 µg/L Premenopausia Mujeres 0,14 - 0,69 µg/L Hombres 0 - 29 Años 0,24 - 1,02 µg/L Mujeres 0 - 29 Años 0,15 - 0,97 µg/L Mujeres 30 - 39 Años 0,15 - 0,64 µg/L Hombres 30 - 39 Años 0,23 - 0,94 µg/L Hombres 40 - 49 Años 0,18 - 0,80 µg/L Mujeres 40 - 49 Años 0,13 - 0,67 µg/L Mujeres 50 - 59 Años 0,18 - 1,06 µg/L Hombres 50 - 59 Años 0,16 - 0,74 µg/L Hombres 60 - 69 Años 0,13 - 0,75 µg/L Mujeres 60 - 69 Años 0,17 - 0,97 µg/L Mujeres Sup - 70 Años 0,15 - 0,86 µg/L

MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
			Hombres Sup - 70 Años 0,12 - 0,78 µg/L Eosinófilos: Ambos 0 - 14 Días 0,03 - 1,10 x10³/mm³ Eosinófilos: Ambos 14 - 180 Días 0,05 - 0,95 x10³/mm³ Eosinófilos: Ambos 180 - 365 Días 0,05 - 0,85 x10³/mm³ Eosinófilos: Ambos 1 - 6 Años 0,03 - 0,75 x10³/mm³ Eosinófilos: Ambos 6 - 18 Años 0,02 - 0,70 x10³/mm³ Eosinófilos: Ambos Sup - 18 Años 0,02 - 0,50 x10³/mm³ Eosinófilos %: Ambos 0 - 3 Días Inf 5,50 % Eosinófilos %: Ambos 3 - 30 Días 0,50 - 7,00 % Eosinófilos %: Ambos 30 - 365 Días 0,50 - 6,00 % Eosinófilos %: Ambos Sup - 1 Años 0,50 - 5,50 % Colesterol LDL: Valor recomendado: Prevención secundaria y RCV muy alto Inf 55,00 mg/dL Colesterol LDL: Valor recomendado: RCV alto Inf 70,00 mg/dL Colesterol LDL: Valor recomendado: RCV bajo Inf 116,00 mg/dL Colesterol LDL: Valor recomendado: RCV medio Inf 100,00 mg/dL Ferritina: Hombres 24,00 - 336,00 ng/mL Ferritina: Mujeres 11,00 - 307,00 ng/mL Índice aterogénico CT/HDL: Hombres Inf 5,50 Índice aterogénico CT/HDL: Mujeres Inf 4,50 Índice Aterogénico LDL/HDL: Inf 2,50 Ácido Fólico (Vitamina B9): Sup 3,10 ng/mL : Indicado en informe adjunto : Indicado en informe adjunto MOG NUTRICION · GENOTIPADO: Indicado en informe adjunto : 74,00 - 106,00 mg/dL Hemoglobina: Ambos 0 - 14 Días 13,20 - 21,70 g/dL Hemoglobina: Ambos 14 - 30 Días 10,70 - 17,20 g/dL Hemoglobina: Ambos 30 - 365 Días 9,40 - 14,60 g/dL Hemoglobina: Ambos 1 - 12 Años 10,20 - 14,60 g/dL Hemoglobina: Hombres 12 - 65 Años 12,50 - 17,20 g/dL Hemoglobina: Mujeres 12 - 65 Años 12,00 - 15,60 g/dL Hemoglobina: Mujeres Sup - 65 Años 11,80 - 15,80 g/dL Hemoglobina: Hombres Sup - 65 Años 12,50 - 17,20 g/dL HCM: Hombres 0 - 14 Días 32,00 - 39,50 pg HCM: Mujeres 0 - 14 Días 30,00 - 39,50 pg HCM: Ambos 14 - 30 Días 27,50 - 36,50 pg HCM: Mujeres 30 - 365 Días 23,00 - 35,50 pg HCM: Hombres 30 - 365 Días 23,00 - 35,00 pg HCM: Ambos 1 - 12 Años 23,50 - 31,50 pg HCM: Ambos 12 - 65 Años 26,00 - 33,50 pg HCM: Mujeres 12 - 65 Años 26,00 - 33,50 pg HCM: Hombres 12 - 65 Años 26,00 - 33,50 pg HCM: Ambos Sup - 65 Años 27,00 - 34,00 pg

MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
			Hematocrito: Ambos 0 - 14 Días 41,00 - 66,00 % Hematocrito: Ambos 14 - 30 Días 39,00 - 60,00 % Hematocrito: Ambos 30 - 365 Días 31,00 - 54,00 % Hematocrito: Ambos 1 - 12 Años 28,00 - 43,50 % Hematocrito: Hombres 12 - 65 Años 36,50 - 50,50 % Hematocrito: Mujeres 12 - 65 Años 35,50 - 45,50 % Hematocrito: Mujeres Sup - 65 Años 35,00 - 45,50 % Hematocrito: Hombres Sup - 65 Años 37,00 - 49,00 % Hematíes: Ambos 0 - 14 Días 3,90 - 6,25 x10&6/mm³ Hematíes: Ambos 14 - 30 Días 3,50 - 5,50 x10&6/mm³ Hematíes: Ambos 30 - 365 Días 3,10 - 5,15 x10&6/mm³ Hematíes: Ambos 1 - 12 Años 3,70 - 5,25 x10&6/mm³ Hematíes: Hombres 12 - 65 Años 4,10 - 5,75 x10&6/mm³ Hematíes: Mujeres 12 - 65 Años 3,90 - 5,20 x10&6/mm³ Hematíes: Mujeres Sup - 65 Años 3,85 - 5,20 x10&6/mm³ Hematíes: Hombres Sup - 65 Años 4,00 - 5,65 x10&6/mm³ Hemoglobina A1c: Inf 5,70 % Hemoglobina A1c: Inf 39,00 mmol/mol Hombres 5,46 - 16,20 µmol/L Mujeres 4,44 - 13,56 µmol/L IgA: Ambos 0 - 1 Años 36,00 - 79,00 mg/dL IgA: Ambos 1 - 4 Años 27,00 - 246,00 mg/dL IgA: Ambos 4 - 10 Años 34,00 - 274,00 mg/dL IgA: Ambos 10 - 16 Años 52,00 - 319,00 mg/dL IgA: Ambos 16 - 18 Años 60,00 - 337,00 mg/dL IgA: Ambos Sup - 18 Años 61,00 - 356,00 mg/dL Insulina: 2,00 - 25,00 mU/L Lactato deshidrogenasa (LDH): 230,00 - 416,00 U/L Leucocitos: Ambos 0 - 3 Días 9,00 - 28,20 x10³/mm³ Leucocitos: Ambos 3 - 30 Días 7,20 - 21,60 x10³/mm³ Leucocitos: Ambos 30 - 365 Días 6,60 - 16,20 x10³/mm³ Leucocitos: Ambos 1 - 12 Años 4,80 - 15,00 x10³/mm³ Leucocitos: Ambos 12 - 18 Años 4,50 - 11,40 x10³/mm³ Leucocitos: Ambos Sup - 18 Años 3,90 - 10,50 x10³/mm³ Linfocitos: Ambos 0 - 3 Días 1,80 - 11,20 x10³/mm³ Linfocitos: Ambos 3 - 30 Días 2,00 - 13,60 x10³/mm³ Linfocitos: Ambos 30 - 365 Días 2,70 - 12,60 x10³/mm³ Linfocitos: Ambos 1 - 6 Años 1,80 - 10,00 x10³/mm³ Linfocitos: Ambos 6 - 18 Años 1,20 - 6,00 x10³/mm³ Linfocitos: Ambos Sup - 18 Años 1,10 - 4,50 x10³/mm³ Linfocitos %: Ambos 0 - 3 Días 18,00 - 52,00 % Linfocitos %: Ambos 3 - 30 Días 26,00 - 60,00 % Linfocitos %: Ambos 30 - 365 Días 30,00 - 67,00 % Linfocitos %: Ambos 1 - 12 Años 22,00 - 63,00 % Linfocitos %: Ambos 12 - 18 Años 20,00 - 47,00 % Linfocitos %: Ambos Sup - 18 Años 20,00 - 44,00 %

MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
			Magnesio: 1,60 - 2,60 mg/dL Monocitos: Ambos 0 - 14 Días 0,20 - 2,50 x10³/mm³ Monocitos: Ambos 14 - 30 Días 0,20 - 2,30 x10³/mm³ Monocitos: Ambos 30 - 180 Días 0,25 - 1,90 x10³/mm³ Monocitos: Ambos 180 - 365 Días 0,20 - 1,45 x10³/mm³ Monocitos: Hombres 1 - 12 Años 0,15 - 1,20 x10³/mm³ Monocitos: Mujeres 1 - 12 Años 0,10 - 1,20 x10³/mm³ Monocitos: Ambos Sup - 12 Años 0,10 - 0,95 x10³/mm³ Monocitos %: Ambos 0 - 14 Días 3,00 - 17,50 % Monocitos %: Ambos 14 - 30 Días 2,50 - 17,50 % Monocitos %: Ambos 30 - 180 Días 2,00 - 15,00 % Monocitos %: Ambos 180 - 365 Días 2,00 - 12,00 % Monocitos %: Ambos 1 - 12 Años 1,50 - 10,00 % Monocitos %: Ambos Sup - 12 Años 1,50 - 11,60 % Neutrófilos: Ambos 0 - 3 Días 3,30 - 22,30 x10³/mm³ Neutrófilos: Ambos 3 - 30 Días 1,30 - 10,70 x10³/mm³ Neutrófilos: Ambos 30 - 365 Días 1,30 - 8,70 x10³/mm³ Neutrófilos: Ambos 1 - 12 Años 1,50 - 8,70 x10³/mm³ Neutrófilos: Ambos 12 - 18 Años 1,70 - 7,90 x10³/mm³ Neutrófilos: Ambos Sup - 18 Años 1,50 - 7,70 x10³/mm³ Neutrófilos %: Ambos 0 - 3 Días 29,00 - 74,00 % Neutrófilos %: Ambos 3 - 30 Días 17,00 - 62,00 % Neutrófilos %: Ambos 30 - 365 Días 17,00 - 63,00 % Neutrófilos %: Ambos 1 - 12 Años 22,00 - 74,00 % Neutrófilos %: Ambos 12 - 18 Años 36,00 - 77,00 % Neutrófilos %: Ambos Sup - 18 Años 42,00 - 77,00 % Proteína C Reactiva en suero (Ultrasensible): Riesgo Cardiovascular bajo: Inf 1,00 mg/L Proteína C Reactiva en suero (Ultrasensible): Riesgo Cardiovascular alto: Sup 3,00 mg/L Proteína C Reactiva en suero (Ultrasensible): Riesgo Cardiovascular medio: 1,00 - 3,00 mg/L Índice HOMA: Inf 3,80 % Plaquetas: Ambos 0 - 7 Días 220,00 - 490,00 x10³/mm³ Plaquetas: Ambos 7 - 30 Días 230,00 - 520,00 x10³/mm³ Plaquetas: Ambos 30 - 365 Días 240,00 - 550,00 x10³/mm³ Plaquetas: Ambos 1 - 6 Años 200,00 - 490,00 x10³/mm³ Plaquetas: Ambos 6 - 18 Años 160,00 - 415,00 x10³/mm³ Plaquetas: Ambos Sup - 18 Años 150,00 - 370,00 x10³/mm³ RDW: 11,50 - 15,50 % Triglicéridos: Inf 150,00 mg/dL Tioles totales: 204,00 - 309,00 umol/L : Ambos 0 - 30 Días Inf 60,00 µmol/L : Ambos 1 - 24 Meses 23,00 - 71,00 µmol/L : Prematuros 28,00 - 136 µmol/L : Ambos 2 - 18 Años Inf 79,00 µmol/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
				: Ambos Sup - 18 Años 10,00 - 140,00 µmol/L TSH: Ambos 0 - 5 Días 0,70 - 15,20 mU/L TSH: Ambos 5 - 60 Días 0,70 - 11,00 mU/L TSH: Ambos 60 - 365 Días 0,70 - 8,40 mU/L TSH: Gestación 1º trimestre Inf 2,50 mU/L TSH: Gestación 2º trimestre Inf 3,50 mU/L TSH: Gestación 3º trimestre Inf 3,50 mU/L TSH: Ambos 1 - 5 Años 0,70 - 6,00 mU/L TSH: Ambos 5 - 19 Años 0,50 - 4,80 mU/L TSH: Ambos Sup - 19 Años 0,30 - 4,20 mU/L 187,00 - 883,00 pg/mL 16,00 - 64,00 µg/L VCM: Ambos 0 - 14 Días 91,00 - 124,00 fL VCM: Ambos 14 - 30 Días 86,00 - 118,00 fL VCM: Ambos 30 - 365 Días 72,00 - 111,00 fL VCM: Ambos 1 - 12 Años 72,00 - 93,00 fL VCM: Ambos 12 - 65 Años 78,00 - 99,00 fL VCM: Ambos Sup - 65 Años 80,00 - 101,00 fL VPM: 7,00 - 12,00 fL Zinc en suero: 60,00 - 120,00 ug/dL
VITD **PERFIL VITAMINA D**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 3.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Ayuno de 8 horas. Peticionario general. Realizar la extracción en horario compatible con el envío de la muestra el mismo día de la extracción.	.: Indicado en informe adjunto

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
PEIN **PERMEABILIDAD INTESTINAL, ORINA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	15	Rec. 20 mL Orina 6h [Refr.] Kit suministrado por el laboratorio Recoger orina durante las 6 horas posteriores a la administración de lactulosa y manitol. En mujeres, no obtener la muestra durante la menstruación. Conservar y enviar refrigerada. Es necesario estar en ayunas (8h) y no tomar medicación ni hacer ejercicio que requiera esfuerzo. Peticionario general. Adjuntar documentación junto con la muestra Realizar la extracción en horario compatible con el envío de la muestra el mismo día de la extracción.	Perfil evaluación permeabilidad intestinal: Indicado en informe adjunto
MICRAB **PEROXIDASA TIROIDEA (ANTITPO) ANTICUERPOS, SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Inf 5,61 UI/mL
G03064 **PEROXISOMALES, TRASTORNOS · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABCD1, ACOX1, AGPS, AGXT, AMACR, DNM1L, GNPAT, HSD17B4, PEX1, PEX10, PEX11B, PEX12, PEX13, PEX14, PEX16, PEX19, PEX2, PEX26, PEX3, PEX5, PEX6, PEX7, PHYH, SCP2, TRIM37 *25*
POCOFSG **PESTICIDAS ORGANOCLORADOS Y ORGANOFOSFORADOS, SANGRE**	Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectrometría de masas.	11	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L Indicado en informe adjunto

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
POCOFM **PESTICIDAS ORGANOCLORADOS Y ORGANOFOSFORADOS, SUERO**	Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectrometría de masas.	11	Rec. 2 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 2 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mg/L Indicado en informe adjunto
G14065 **PEUTZ-JEGHERS, SÍNDROME DE · STK11 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	STK11 *1*
G14066 **PEUTZ-JEGHERS, SÍNDROME DE · STK11 · SANGER**	Secuenciación Sanger	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	STK11 *1*
G14067 **PEUTZ-JEGHERS, SÍNDROME DE · STK11 · SANGER+MLPA**	Secuenciación Sanger + MLPA	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	STK11 [MLPA] *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
QPFA **PFA 100 CAPACIDAD HEMOSTATICA PLAQUETAR, SANGRE TOTAL**	No se aplica.	1	Rec. 5 mL Sangre total Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) Debido a la elevada labilidad de la muestra, es imprescindible avisar para concertar día con tal de informar al departamento responsable. Es imprescindible envío inmediato de la muestra al laboratorio de tal forma que llegue a nuestras instalaciones antes de 4 horas (es necesario procesar dentro de las 4 horas tras la extracción). Envíar en bolsa especial naranja indicando PFA 100. La muestra debe mantener en todo momento a temperatura ambiente Enviar las muestras de lunes a viernes. Evitar festivos.	Tiempo de obturación colágeno/ADP: 62,00 - 100,00 seg Tiempo de obturación colágeno/epinefrina: 82,00 - 150,00 seg
G08142 **PFEIFFER, SÍNDROME DE · FGFR1 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA (2 tubos)) [Refr.]	FGFR1 *1*
G08106 **PFEIFFER, SÍNDROME DE · FGFR1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FGFR1 *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G11121 **PFEIFFER, SÍNDROME DE · FGFR1(p.Pro252Arg) · HOT SPOT**	Hot Spot	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FGFR1 [p.Pro252Arg]	*1*
G08107 **PFEIFFER, SÍNDROME DE · FGFR2 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FGFR2	*1*
PHOR24 **PH EN ORINA DE 24 HORAS**	Electrodo Selectivo de Iones.	2	Rec. 1 mL Orina 24h. (alícuota) (1 x Alicuota) [Refr.]	Interpretación según criterio clínico	
PHL **pH, LÍQUIDO BIOLÓGICO**	Electrodo Selectivo de Iones.	1	Rec. 1 mL Líquido biológico	Interpretación según criterio clínico	
G11307 **PHELAN-MCDERMID, SINDROME DE · 22q13.3 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]		
G08084 **PICNODISOSTOSIS · CTSK · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CTSK	*1*
G02032 **PIEBALDISMO/SÍNDROME DE WAARDENBURG · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	EDN3, EDNRB, MITF, PAX3, SNAI2, SOX10	*6*
G02033 **PIEL ARRUGADA, SÍNDROME DE · ATP6V0A2 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ATP6V0A2	*1*
G02034 **PIEL RÍGIDA, SÍNDROME DE · FBN1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FBN1	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
PI **PIGMENTOS BILIARES, ORINA**	Espectrometría.	1	Rec. 10 mL Orina [Refr.]	Interpretación según criterio clínico
PIRAZ **PIRAZINAMIDA, SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	9	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] No utilizar tubos con gel separador.	20,00 - 60,00 µg/mL
PIRI **PIRIDINOLINAS - CROSSLINKS, ORINA**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	8	Rec. 2 mL Orina (segunda micción) (1 x Tubo 5 mL.) [Refr.] Se aconseja realizar el análisis con la orina de la segunda orina matinal (entre las 10:00 y las 12:00h, atendiendo al ritmo circadiano de la eliminación de la piridinolina y desoxipiridinolina).	Creatinina en orina : mg/dL Interpretación según criterio clínico Desoxipiridinolinas: Hombres 6,00 - 26 nmol/mmol Cr Desoxipiridinolinas: Mujeres 6,00 - 23 nmol/mmol Cr Piridinolinas: Hombres 23,00 - 65 nmol/mmol Cr Piridinolinas: Mujeres 25,00 - 83 nmol/mmol Cr
G03183 **PIRIDOXAMINA 5'-FOSFATO OXIDASA, DEFICIENCIA DE · PNPO · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PNPO *1*
G03177 **PIRUVATO DESHIDROGENASA E1-ALFA, DEFICIENCIA DE · PDHA1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PDHA1 *1*
PIRLC **PIRUVATO EN LCR**	Espectrometría.	6	Rec. 1 mL LCR [Refr.]	80,00 - 140,00 µmol/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
PKER **PIRUVATO KINASA ERITROCITARIA, SANGRE TOTAL**	Espectrometría.	4	Rec. 1 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Evitar remitir la muestra en fines de semana y vísperas de festivos.	41,00 - 152,00 U/g Hb
PISCI **PISCINA, ANALISIS BASICO AGUA**	No se aplica.	17	Rec. 500 mL Agua (1 x Envase estéril con tiosulfato) [Refr.] Rec. 2000 mL Agua (1 x Envase aséptico) [Refr.] Las muestras deben llegar al laboratorio de lunes a jueves.	Indicado en informe adjunto
G11199 **PITT-HOPKINS, SINDROME DE · TCF4 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TCF4 *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
PLQA **PLAQUETARIOS ANTICUERPOS (CF), SANGRE TOTAL**	Citometría de flujo.	5	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Es necesario contactar previamente con al laboratorio para programar el estudio. No realizar toma de muestras ni viernes ni vísperas de festivo. Mantener las muestras refrigeradas. Remitir dentro de las primeras 4 horas tras la toma de sangre (la muestra debe llegar al Laboratorio central de Barcelona antes de las 12h). Segregar las muestras en una bolsa naranja e indicar explícitamente el tipo de prueba solicitada. Indicar día y hora de extracción de la muestra.	Ac IgG plaquetas (citometria de flujo): Negativo: Inf 20,00 % Ac IgM plaquetas (citometría de flujo): Negativo: Inf 20,00 %
APLAG **PLAQUETARIOS ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Plasma EDTA, plasma citrato y heparina	Interpretación: Negativo: Inf 1/10 Interpretación: Positivo: Sup= 1/10
APLAM **PLAQUETARIOS ANTICUERPOS IgM, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Plasma EDTA, plasma citrato y heparina	Interpretación: Negativo: Inf 1/10 Interpretación: Positivo: Sup= 1/10

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
PLQC **PLAQUETAS**	Microscopia.	2	Rec. 2.7 mL Sangre total Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) [Refr.] No centrifugar.	Ambos 0 - 7 Días 220,00 - 490,00 x10³/mm³ Ambos 7 - 30 Días 230,00 - 520,00 x10³/mm³ Ambos 30 - 365 Días 240,00 - 550,00 x10³/mm³ Ambos 1 - 6 Años 200,00 - 490,00 x10³/mm³ Ambos 6 - 18 Años 160,00 - 415,00 x10³/mm³ Ambos Sup - 18 Años 150,00 - 370,00 x10³/mm³
PLMLGS **PLASMALÓGENOS EN ERITROCITOS, SANGRE TOTAL**	Cromatografía de gases.	20	Rec. 2 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) Ayuno mínimo de 8 horas. Sangre EDTA 2 ml estable máximo 48 h desde la extracción hasta que se inicia el proceso. Coordinar previamente toma y envío de muestras con el laboratorio.	Indicado en informe adjunto
ATP **PLASMINÓGENO ACTIVADOR TISULAR, PLASMA**	Enzimoinmunoanálisis	17	Rec. 1 mL Plasma Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) [Cong.] Extracción con estasis venosa. Separar plasma pobre en plaquetas y congelar inmediatamente.	2,00 - 12,00 ng/mL
PLAS **PLASMINÓGENO ACTIVIDAD, PLASMA**	Técnica Cromogénica.	6	Rec. 1 mL Plasma Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) [Cong.] Separar y congelar inmediatamente.	75,00 - 150,00 %

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
PLASC **PLASMINÓGENO CONCENTRACIÓN, PLASMA**	Nefelometría.	2	Rec. 1 mL Plasma Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) [Cong.]	6,00 - 25,00 mg/dL
PLASPT **PLASMODIUM ANTICUERPOS TOTALES, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 0,90 Índice Indeterminado: 0,90 - 1,00 Índice Positivo: Sup 1,00 Índice
DBPS **PLASMODIUM DNA, SANGRE TOTAL**	PCR-Real Time.	4	Rec. 1 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Consultar con el laboratorio otro tipo de muestra.	No se detecta
AGAG **PLATA AGUA**	Absorción atómica.	15	Rec. 100 mL Agua (1 x Envase aséptico) [Refr.] Alt. 1 mL Agua (1 x Envase aséptico) (<2 Ác.nítrico) Muestra protegida de la luz	Agua de diálisis Inf 0,01 mg/L Agua de red mg/L No consta en las guías.
AGOR **PLATA, ORINA**	Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectrometría de masas.	5	Rec. 10 mL Orina [Refr.] Muestra protegida de la luz	Inf 0,90 µg/L
AGS **PLATA, SUERO**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	4	Rec. 1 mL Suero (libre trazas metales) (1 x Tubo Suero metales traza) [Refr.] Muestra protegida de la luz	No expuestos Inf 1,00 µg/L Límite de cuantificación: 1,00 µg/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
PTOR **PLATINO, ORINA**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	6	Rec. 2 mL Orina [Refr.]	Inf 1,00 µg/L
PTSG **PLATINO, SANGRE TOTAL**	Absorción atómica.	9	Rec. 1 mL Sangre total EDTA Dipotásico (libre trazas metales) (1 x Tubo Sangre EDTA metales traza) [Refr.] Se puede hacer con muestra en tubo libre de metales y anticoagulante Heparina Sódica.	Inf 0,01 µg/L
PTSU **PLATINO, SUERO**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	9	Rec. 1 mL Suero (libre trazas metales) (1 x Tubo Suero metales traza) [Refr.]	Inf 0,20 µg/L
AGPB **PLOMO, AGUA**	Absorción atómica.	15	Rec. 100 mL Agua (1 x Envase aséptico) [Refr.] Alt. 100 mL Agua (1 x Envase aséptico) (<2 Ác.nítrico)	Agua de diálisis Inf 0,01 µg/L Agua de red Inf 0,025 µg/L
PBOC **PLOMO, ORINA**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	4	Rec. 10 mL Orina final jornada [Refr.]	Índice Biológico de Exposición orientativo (BAT) según DFG : Exposición a Plomo tetraetilo y trametilo. Inf 50,00 µg/L Límite de cuantificación: 5,00 µg/L
PB24 **PLOMO, ORINA 24H**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	4	Rec. 10 mL Orina 24h. (alícuota) [Refr.]	Excreción (24h): Inf 80,00 µg/24h : Límite de cuantificación: 5,00 µg/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
PB **PLOMO, SANGRE TOTAL**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	3	Rec. 1 mL Sangre total EDTA Dipotásico (libre trazas metales) (1 x Tubo Sangre EDTA metales traza) [Refr.]	Valor biológico de tolerancia - BAT (MAK&BAT): No expuestos Hombres Inf 4,00 µg/dL Valor biológico de tolerancia - BAT (MAK&BAT): No expuestos Mujeres Inf 3,00 µg/dL VLB®-INSST: Exposición a plomo y sus derivados iónicos. Inf 30,00 µg/dL Límite de cuantificación: 1,00 µg/dL
PMSCL **PM 1 (PM/SCL) ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunoanálisis con detección fluorescente	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 7,00 U/mL Interpretación: Indeterminado: 7,00 - 10,00 U/mL Interpretación: Positivo: Sup 10,00 U/mL
DNAPJ **PNEUMOCYSTIS JIROVECI (CARINII) DNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	PCR-Real Time.	3	Rec. 2 mL Esputo (1 x Contenedor estéril) [Refr.] Rec. 2 mL BAL (1 x Contenedor estéril) [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Tejido pulmonar (1 x Contenedor estéril) [Refr.]	No se detecta
NC **PNEUMOCYSTIS JIROVECII (CARINII), ESPUTO**	Tinción / Observación microscópica.	3	Rec. 1 Muestra/s Esputo (1 x Portaobjetos) [Refr.] Las muestras deben ser fijadas inmediatamente con una solución tipo saccomano o con alcohol al 50% (mezclar bien) para mantener la estabilidad de la muestra.	Se informa para cada paciente

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
PPAT **PODER ANTIOXIDANTE TOTAL, PLASMA**	Espectrometría.	7	Rec. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Separar y congelar inmediatamente.	Perfil poder antioxidante total : 560,00 - 1120,00 µmol/L Indicado en informe adjunto	
G04013 **POLICITEMIA (ERITROCITOSIS FAMILIAR) · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	EGLN1, EPAS1, EPOR, JAK2, SH2B3, VHL	*6*
G13141 **POLICITEMIA VERA/ERITROCITOSIS IDIOPÁTICA · JAK2 (EXÓN 12) · HOT SPOT**	Hot Spot	7	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	JAK2 [12]	*1*
JAK2 **POLICITEMIA VERA/MIELOFIBROSIS IDIOPÁTICA/TROMBOCITEMIA ESENCIAL · JAK2(V617F) · HOT SPOT**	Hot Spot	7	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 4 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	JAK2 [V617F]	*1*
G03073 **POLIENDOCRINOPATÍA AUTOINMUNE 1, SÍNDROME DE · AIRE · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AIRE	*1*
G03200 **POLIMORFISMO DIO2 (Thr92Ala) · HOT SPOT**	Secuenciación Sanger	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Se informa para cada paciente DIO2 [c.274A>G p.(Thr92Ala)]	*1*
G05023 **POLIMORFISMOS FUT2 (A385T, G428A) · HOT SPOT**	Secuenciación Sanger	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Se informa para cada paciente FUT2 [c.418A>T p. p.(Ile140Phe), c.461G>A p.(Trp154Ter)]	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
DBKC **POLIOMAVIRUS BK (PMV) DNA CUANTITATIVO, MUESTRA BIOLÓGICA**	PCR-Real Time.	5	Rec. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Alt. 1 mL Orina (1 x Tubo 5 mL.) [Cong.] Alt. 1 mL LCR (1 x Tubo estéril) [Cong.] Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío.	Límite de detección: 215 UI/mL. Límite superior de cuantificación: 130.000.000 UI/mL.
DNBK **POLIOMAVIRUS BK (PMV) DNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	PCR-Real Time.	5	Rec. 5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Rec. 3 mL LCR (1 x Tubo estéril) [Cong.] Alt. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 5 mL Orina (1 x Contenedor estéril) [Refr.] Volúmen insuficiente (<0,5 mL) ó muestras mal conservadas.	La sensibilidad y la especificidad de la técnica es de un 100%. El límite de detección es 215 UI/mL. DNA Polioma BK: No se detecta
DJCC **POLIOMAVIRUS JC (PMV) DNA CUANTITATIVO, MUESTRA BIOLÓGICA**	PCR-Real Time.	5	Rec. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Alt. 1 mL LCR (1 x Tubo estéril) [Cong.] Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío.	Límite de detección: 275 UI/mL. Límite superior de cuantificación: 3.000.000 UI/mL.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
DNJC **POLIOMAVIRUS JC (PMV) DNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	PCR-Real Time.	5	Rec. 5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Rec. 3 mL LCR (1 x Tubo estéril) [Cong.] Alt. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 5 mL Orina [Refr.]	La sensibilidad y la especificidad de la técnica es de un 100%. El límite de detección es 275 UI/mL. DNA Polioma JC: No se detecta	
POLIO **POLIOVIRUS ANTICUERPOS, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	17	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo	
POP **POLIPÉPTIDO PANCREATICO, SUERO**	Radioinmunoanálisis.	17	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Rechazo: Muestras descongeladas más de 4 horas.	Inf 100,00 pmol/L	
G14117 **POLIPOSIS JUVENIL, SÍNDROME DE · BMPR1A · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 1 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BMPR1A	*1*
G14084 **POLIPOSIS JUVENIL, SÍNDROME DE · BMPR1A, SMAD4 · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	15	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BMPR1A, SMAD4	*2*
G14116 **POLIPOSIS JUVENIL, SÍNDROME DE · SMAD4 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 1 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SMAD4	*1*
G09022 **POLIQUISTOSIS RENAL · PANEL A · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GANAB, PKD1, PKD2 , PKHD1	*4*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G09025 **POLIQUISTOSIS RENAL · PANEL B · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BICC1 , GANAB, HNF1B, NOTCH2, PKD1, PKD2 , PKHD1	*7*
G09021 **POLIQUISTOSIS RENAL · PKD1, PKD2 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PKD1, PKD2	*2*
G09049 **POLIQUISTOSIS RENAL AD · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GANAB, PKD1, PKD2	
G09024 **POLIQUISTOSIS RENAL AD · PKD1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PKD1	*1*
G09039 **POLIQUISTOSIS RENAL AR · PKHD1 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PKHD1	*1*
G09026 **POLIQUISTOSIS RENAL AR · PKHD1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PKHD1	*1*
G7431 **POLIQUISTOSIS RENAL TIPO 2 AD · PKD2 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PKD2	*1*
G11282 **PORENCEFALIA TIPO 2 · COL4A2 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Indicado en informe adjunto COL4A2	*1*
G9599 **PORFIRIA AGUDA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CPOX, HMBS, PPOX	*3*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G9517 **PORFIRIA AGUDA INTERMITENTE · HMBS · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	HMBS *1*
G1545 **PORFIRIA AGUDA INTERMITENTE · PANEL · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ALAD, HMBS, PPOX *3*
G4292 **PORFIRIA CUTÁNEA · UROD · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	UROD *1*
G03163 **PORFIRIA VARIEGATA · PPOX · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PPOX *1*
G03065 **PORFIRIAS · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ALAD, ALAS2, CPOX, FECH, HFE, HMBS, HMBS (otras mut), PPOX, UROD, UROS *10*
QCPH **PORFIRINAS FRACCIONADAS, HECES**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	10	Rec. 5 g Heces (1 x Contenedor estéril protegido de la luz) [Cong.]	Coproporfirinas I en heces: Inf 8,70 µg/g heces Coproporfirinas III en heces: Inf 8,00 µg/g heces Hexacarboxiporfirinas en heces: Inf 0,70 µg/g heces Heptacarboxiporfirinas en heces : Inf 0,80 µg/g heces Pentacarboxiporfirinas en heces: Inf 0,60 µg/g heces Uroporfirinas en heces : Inf 1,20 µg/g heces

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
PFRA **PORFIRINAS FRACCIONADAS, ORINA**	Cromatografía Líquida Alta Resolución / Fluorimetría.	11	Rec. 10 mL Orina 24h. (alícuota) [Refr.] Recoger una muestra de orina de 24 horas en un contenedor limpio según lo descrito en el documento MP_RMP-3. Las muestras se deben refrigerar y proteger de la luz, también durante las 24 horas de recogida y durante el transporte. Para incrementar la fiabilidad del diagnóstico, hay que evitar los factores que conducen a niveles elevados de porfirina, como, por ejemplo, el consumo de alcohol, ingesta de fármacos inductores de enzimas y situaciones de estrés. Preservar la orina con Carbonato sódico pH = 6.0 - 9.0 Muestra protegida de la luz	Coproporfirina I: 2,00 - 24,00 µg/24h Coproporfirina III: 10,00 - 65,00 µg/24h Hexacarboxil porfirinas: Inf 2,00 µg/24h Heptacarboxil porfirinas: Inf 3,00 µg/24h Pentacarboxil porfirinas: Inf 4,00 µg/24h Uroporfirinas: 3,00 - 24,00 µg/24h Volumen de orina remitido (diuresis): 600,00 - 1600,00 mL
PFPL **PORFIRINAS FRACCIONADAS, PLASMA**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	12	Rec. 2 mL Plasma Heparina litio (1 x Tubo sangre heparina litio) [Cong.] Muestra protegida de la luz	Coproporfirina I: Inf 6,40 µg/L Coproporfirina III: Inf 8,00 µg/L Heptacarboxiporfirinas: Inf 3,80 µg/L Hexacarboxiporfirinas: Inf 1,30 µg/L Pentacarboxiporfirinas: Inf 1,20 µg/L Porfirinas totales: Inf 32,50 µg/L Uroporfirinas: Inf 11,80 µg/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
PORDES **PORFOBILINÓGENO DESAMINASA (ERITROCITOS), SANGRE TOTAL**	Análisis por inyección de flujo (FIA)	10	Rec. 5 mL Sangre total Heparina litio (1 x Tubo sangre heparina litio) [Refr.] Enviar inmediatamente después de la extracción	7,30 - 15,80 nmol/s/L
PF24 **PORFOBILINÓGENO EN ORINA (COCIENTE CREATININA)**	Espectrometría.	6	Rec. 10 mL Orina (1 x Tubo protegido de la luz) [Cong.]	Porfobilinógeno en orina (cociente creatinina): 1,80 - 4,70 mg/g crea : Límite de cuantificación: Inf 0,80 mg/L
PBGO **PORFOBILINOGENO, ORINA**	Espectrometría.	6	Rec. 10 mL Orina 24h. (alícuota) (1 x Tubo protegido de la luz) [Cong.]	Excreción (24h): Inf 1,70 mg/24h : Límite de cuantificación: Inf 0,80 mg/L Volumen de orina remitido (diuresis): 600,00 - 1600,00 mL
KOR **POTASIO EN ORINA DE MICCIÓN (CONCENTRACIÓN)**	Electrodo Selectivo de Iones.	1	Rec. 10 mL Orina [Refr.]	mEq/L Interpretación según criterio clínico
AGK **POTASIO, AGUA**	Absorción atómica.	15	Rec. 100 mL Agua (1 x Envase aséptico) [Refr.] Alt. 100 mL Agua (1 x Envase aséptico) (<2 Ác.nítrico)	Agua de diálisis Inf 2,00 mg/L Agua de red mg/L No consta en las guías.
KLB **POTASIO, LÍQUIDO BIOLÓGICO**	Electrodo Selectivo de Iones.	1	Rec. 1 mL Líquido biológico [Refr.]	mEq/L Interpretación según criterio clínico
KO **POTASIO, ORINA 24H**	Electrodo Selectivo de Iones.	1	Rec. 1 mL Orina 24h. (alícuota) (1 x Contenedor 2500 mL.) [Refr.]	Excreción (24h): 25,00 - 125,00 mEq/24h

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
K **POTASIO, SUERO**	Electrodo Selectivo de Iones.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Criterios de rechazo: Muestra hemolizada.	3,50 - 5,10 mEq/L
POZO **POZO, ANALISIS BASICO DE AGUA**	No se aplica.	17	Rec. 500 mL Agua (1 x Envase estéril con tiosulfato) [Refr.] Rec. 2000 mL Agua (1 x Envase aséptico) [Refr.] Las muestras deben llegar al laboratorio de lunes a jueves.	
G1044 **PRADER-WILLI / ANGELMAN, SÍNDROME DE · 15q11-q13 · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	[15q11-q13] *1*
G7266 **PRADER-WILLI, SÍNDROME DE · 15q11-q13 · MS-MLPA**	Metilación específica MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	[15q11-q13] *1*
PAL **PREALBUMINA, SUERO**	Turbidimetría.	2	Rec. 0.4 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rechazo: Muestra lipémica.	20,00 - 40,00 mg/dL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
PECAN **PRECIPITINAS A AVES (EXCREMENTO DE CANARIO), SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	El resultado hace referencia a la concentración de IgG específica. Negativo: Inf 1,00 U/mL Indeterminado: 1,00 - 2,00 U/mL Positivo: Sup 2,00 U/mL
PEXP **PRECIPITINAS A AVES (EXCREMENTO DE PERIQUITO), SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	El resultado hace referencia a la concentración de IgG específica. Negativo: Inf 1,00 U/mL Indeterminado: 1,00 - 2,00 U/mL Positivo: Sup 2,00 U/mL
PEXPA **PRECIPITINAS A AVES (EXCREMENTO PALOMA), SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	El resultado hace referencia a la concentración de IgG específica. Negativo: Inf 1,00 U/mL Indeterminado: 1,00 - 2,00 U/mL Positivo: Sup 2,00 U/mL
PPCAN **PRECIPITINAS A AVES (PLUMAS DE CANARIO), SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	El resultado hace referencia a la concentración de IgG específica. Negativo: Inf 1,00 U/mL Indeterminado: 1,00 - 2,00 U/mL Positivo: Sup 2,00 U/mL
PPPER **PRECIPITINAS A AVES (PLUMAS DE PERIQUITO), SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 1,00 U/mL Indeterminado: 1,00 - 2,00 U/mL Positivo: Sup 2,00 U/mL
PSGA **PRECIPITINAS A AVES (SUERO DE GALLINA), SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	El resultado hace referencia a la concentración de IgG específica. Negativo: Inf 1,00 U/mL Indeterminado: 1,00 - 2,00 U/mL Positivo: Sup 2,00 U/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
PSPA **PRECIPITINAS A AVES (SUERO DE PALOMA), SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	El resultado hace referencia a la concentración de IgG específica. Negativo: Inf 1,00 U/mL Indeterminado: 1,00 - 2,00 U/mL Positivo: Sup 2,00 U/mL
PPER **PRECIPITINAS A AVES (SUERO DE PERIQUITO), SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	El resultado hace referencia a la concentración de IgG específica. Negativo: Inf 1,00 U/mL Indeterminado: 1,00 - 2,00 U/mL Positivo: Sup 2,00 U/mL
G06066 **PRECONCEPTION · MATCHING DE DATOS GENÉTICOS EXTERNOS**	Pipeline bioinformático	20	Rec. 1 Muestra/s Datos	Se informa para cada paciente

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G06056 **PRECONCEPTION FOCUS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	20	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] No es necesario estar en ayunas. Peticionario y consentimiento informado específicos debidamente cumplimentados y firmado por médico y paciente. El informe de resultados será enviado a la atención del médico.	*300* ABCA4, ABCD1, ACAD9, ACADM, ACADS, ACADSB, ACADVL, ACOX1, ADA, ADAMTS13, ADAMTS2, ADGRV1, ADK, AGA, AGPS, AHI1, AIPL1, ALDOB, ALG1, ALG12, ALG2, ALG3, ALG6, ALG8, AMACR, AR, ARG1, ARL13B, ARL6, ARSA, ARSB, ARSE, ARX, ASL, ASPA, ATM, ATP7B, AUH, B4GALT1, BCKDHA, BCKDHB, BCS1L, CAPN3, CASQ2, CBS, CD40LG, CDH23, CDHR1, CEP290, CERKL, CFH, CFTR, CHST6, CLCN1, CLDN14, CLN3, CLN5, CLN6, CLN8, CLRN1, CNGA1, CNGB1, CNGB3, COG7, COG8, COL1A2, COL4A3, COL4A4, COL7A1, COX15, CPS1, CPT1A, CPT2, CRB1, CRTAP, CRX, CTNS, CTSD, CTSK, CYP11B1, CYP17A1, CYP21A2, CYP27A1, D2HGDH, DBT, DCLRE1C, DFNB59, DHCR7, DHDDS, DLD, DMD, ELP1, ESPN, ESRRB, ETFA, ETFB, ETFDH, EYS, F8, F9, FAH, FGD4, FH, FIG4, FKRP, FLVCR1, FMR1, FOXN1, FUCA1, FXN, G6PD, GAA, GALC, GALE, GALK1, GALNS, GALT, GBA, GCDH, GDAP1, GFM1, GJB2, GLA, GLB1, GM2A, GNPTAB, GNRHR, GNS, GPR143, GRXCR1, GUCY2D, GUSB, HADH, HADHA, HADHB, HBA1, HBA2, HBB, HEXA, HGF, HGSNAT, HIBCH, HLCS, HMGCL, HPD, HSD17B3, HSD3B2, HYLS1, IDH3B, IDS, IDUA, IKBKAP, IL2RG, IMPDH1, IMPG2, INPP5E, IVD, JAK3, KCNJ13, KIF7, L1CAM, LHFPL5, LHX3, LIG4, LMNA, LOXHD1, LRAT, LRTOMT, MAK, MAN2B1, MARVELD2, MCCC1, MCCC2, MCEE, MCOLN1, MED25, MEFV, MERTK, MFRP, MFSD8, MGAT2, MLYCD, MMAA, MMAB, MMACHC, MMADHC, MOGS, MPDU1, MPI, MRPS16, MRPS22, MTHFR, MTMR2, MUT, MVK, MYO15A, MYO3A, MYO6, MYO7A, NAGLU, NDRG1, NEB, NEU1, NMNAT1, NPC1, NPC2, NPHP1, OCA2, OPA3, OTC, OTOA, OTOF, OXCT1, P3H1, PAH, PANK2, PCCA, PCCB, PCDH15, PDE6A, PDE6B, PDSS1, PEX7, PKHD1, PLOD1, PLP1, PMM2, POLR1C, POMT1, POMT2, POU3F4, PPT1, PRCD, PROM1, PROP1, PRPS1, PRX, PSAP, RAG1, RAG2, RAX, RDH12, RDX, RFT1, RGR, RHO, RP2, RPE65, RPGR, RPGRIP1L, SAG, SBDS, SBF2, SEMA4A, SERPINA1, SGSH, SH3TC2, SLC22A5, SLC25A13, SLC25A15, SLC25A20, SLC26A2, SLC26A4, SLC26A5, SLC35A1, SLC35C1, SLC45A2, SLC6A19, SMN1, SMPD1, SPG11, SPG7, SRD5A3, STAR, STRC, SUCLA2, SUCLG1, TAT, TECTA, TMC1, TMEM216, TMEM67, TMIE, TMPRSS3, TPP1, TPRN, TRDN, TRIOBP, TSFM, TSHR, TUFM, TULP1, TYR, TYRP1, UGT1A1, USH1C, USH1G, USH2A, WHRN, ZFYVE26

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G06060 **PRECONCEPTION UNIVERSAL**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	20	Rec. 3 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] No es necesario estar en ayunas. Peticionario y consentimiento informado específicos debidamente cumplimentados y firmado por médico y paciente. El informe de resultados será enviado a la atención del médico.	AAAS, AARS1, AARS2, AASS, ABAT, ABCA1, ABCA12, ABCA3, ABCA4, ABCB11, ABCB4, ABCB7, ABCC2, ABCC6, ABCC8, ABCD1, ABCD4, ABCG5, ABCG8, ABHD12, ABHD5, ACAD8, ACAD9, ACADM, ACADS, ACADSB, ACADVL, ACAT1, ACE, ACO2, ACOX1, ACOX2, ACP4, ACP5, ACSF3, ACSL4, ACTA1, ACY1, ADA, ADA2, ADAM9, ADAMTS10, ADAMTS13, ADAMTS17, ADAMTS18, ADAMTS2, ADAMTSL2, ADAMTSL4, ADAR, ADAT3, ADD3, ADGRG1, ADGRG2, ADGRG6, ADGRV1, ADK, ADSL, ADSS1, AFF2, AFG3L2, AFP, AGA, AGBL5, AGK, AGL, AGPAT2, AGPS, AGRN, AGT, AGTR1, AGXT, AHCY, AHI1, AICDA, AIFM1, AIMP1, AIMP2, AIPL1, AIRE, AK1, AK2, AKR1C2, AKR1D1, ALAD, ALAS2, ALB, ALDH18A1, ALDH1A3, ALDH3A2, ALDH4A1, ALDH5A1, ALDH6A1, ALDH7A1, ALDOA, ALDOB, ALG1, ALG11, ALG12, ALG13, ALG2, ALG3, ALG6, ALG8, ALG9, ALMS1, ALOX12B, ALOXE3, ALPK3, ALPL, ALS2, ALX1, ALX3, ALX4, AMACR, AMBN, AMELX, AMER1, AMH, AMHR2, AMMECR1, AMN, AMPD1, AMPD2, AMT, ANGPTL3, ANK1, ANKS6, ANO10, ANO5, ANO6, ANOS1, ANTXR1, ANTXR2, AP1S1, AP1S2, AP3B1, AP3B2, AP3D1, AP4B1, AP4E1, AP4M1, AP4S1, AP5Z1, APOB, APOC2, APOE, APRT, APTX, AQP2, AR, ARFGEF2, ARG1, ARHGDIA, ARHGEF18, ARHGEF9, ARL13B, ARL2BP, ARL6, ARMC4, ARMC9, ARPC1B, ARSA, ARSB, ARSL, ARV1, ARX, ASAH1, ASL, ASNS, ASPA, ASPH, ASPM, ASS1, ATAD1, ATCAY, ATF6, ATIC, ATM, ATOH7, ATP11C, ATP13A2, ATP2A1, ATP2B3, ATP5F1E, ATP6AP1, ATP6AP2, ATP6V0A2, ATP6V0A4, ATP6V1A, ATP6V1B1, ATP6V1E1, ATP7A, ATP7B, ATP8B1, ATR, ATRX, AUH, AURKC, AVIL, AVPR2, B2M, B3GALNT2, B3GALT6, B3GAT3, B3GLCT, B4GALNT1, B4GALT1, B4GALT7, B4GAT1, B9D1, B9D2, BAAT, BANF1, BBS1, BBS10, BBS12, BBS2, BBS4, BBS5, BBS7, BBS9, BCAP31, BCAT2, BCHE, BCKDHA, BCKDHB, BCKDK, BCL10, BCOR, BCS1L, BEST1, BFSP1, BGN, BHLHA9, BIN1, BLM, BLNK, BLOC1S3, BLOC1S6, BLVRA, BMP1, BMP15, BMPER, BMPR1B, BOLA3, BPGM, BPNT2, BRAT1, BRCA2, BRF1, BRIP1, BRWD3, BSCL2, BSND, BTD, BTK, BUB1B, C12orf57, C12ORF65, C15orf41, C19orf12, C1QA, C1QB, C1QBP, C1QC, C1S, C2, C21ORF59, C2CD3, C3, C4A, C5, C6, C7, C8A, C8B, CA12, CA2, CA5A, CA8, CABP2, CABP4, CACNA1D, CACNA1F, CACNA2D4, CAD, CALCRL, CANT1, CAPN1, CAPN3, CARD11, CARD9, CARS2, CASK, CASP14, CASQ2, CASR, CAST, CAT, CATSPER1, CAVIN1, CBS, CC2D1A, CC2D2A, CCBE1, CCDC103, CCDC114, CCDC115, CCDC151, CCDC174, CCDC22, CCDC39, CCDC40, CCDC65, CCDC8, CCDC88C, CCN6, CCNO, CCNQ, CCT5, CD19, CD247, CD27, CD2AP, CD320, CD36, CD3D, CD3E, CD3G, CD40, CD40LG, CD55, CD59, CD79A, CD79B, CD81, CD8A, CDAN1, CDC14A, CDC45, CDCA7, CDH11, CDH23, CDH3, CDHR1,

MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
			CDK10, CDK5RAP2, CDKL5, CDSN, CDT1, CEBPE, CENPF, CENPJ, CEP104, CEP120, CEP135, CEP152, CEP164, CEP19, CEP290, CEP41, CEP55, CEP57, CEP78, CEP83, CERKL, CERS3, CFAP410, CFAP418, CFAP43, CFAP53, CFD, CFH, CFI, CFL2, CFP, CFTR, CHAT, CHKB, CHM, CHMP1A, CHRDL1, CHRNA1, CHRNB1, CHRND, CHRNE, CHRNG, CHST14, CHST3, CHST6, CHSY1, CHUK, CIB2, CIITA, CILK1, CISD2, CIT, CKAP2L, CLCF1, CLCN1, CLCN2, CLCN4, CLCN5, CLCN7, CLCNKA, CLCNKB, CLDN1, CLDN10, CLDN14, CLDN16, CLDN19, CLEC7A, CLMP, CLN3, CLN5, CLN6, CLN8, CLP1, CLPB, CLPP, CLRN1, CNGA1, CNGA3, CNGB1, CNGB3, CNKSR2, CNNM2, CNNM4, CNPY3, CNTNAP1, CNTNAP2, COA6, COA8, COASY, COG1, COG4, COG5, COG6, COG7, COG8, COL11A1, COL11A2, COL13A1, COL17A1, COL18A1, COL1A2, COL25A1, COL27A1, COL3A1, COL4A3, COL4A4, COL4A5, COL4A6, COL6A1, COL6A2, COL6A3, COL7A1, COL9A1, COL9A2, COLEC10, COLEC11, COLQ, COQ2, COQ4, COQ6, COQ8A, COQ8B, COQ9, CORO1A, COX10, COX15, COX20, COX4I2, COX6A1, COX6B1, COX7B, CP, CPA6, CPAMD8, CPLANE1, CPLX1, CPN1, CPS1, CPT1A, CPT2, CR2, CRADD, CRB1, CRB2, CRBN, CRIPT, CRLF1, CRPPA, CRTAP, CRX, CRYAA, CRYAB, CRYBB1, CRYBB3, CSF2RB, CSF3R, CSPP1, CSTA, CSTB, CTC1, CTDP1, CTH, CTNS, CTPS1, CTSA, CTSC, CTSD, CTSF, CTSK, CUBN, CUL4B, CUL7, CWC27, CWF19L1, CYB5A, CYB5R3, CYBA, CYBB, CYC1, CYP11A1, CYP11B1, CYP11B2, CYP17A1, CYP19A1, CYP1B1, CYP21A2, CYP24A1, CYP26B1, CYP26C1, CYP27A1, CYP27B1, CYP2R1, CYP2U1, CYP4F22, CYP4V2, CYP7B1, D2HGDH, DAG1, DARS1, DARS2, DBH, DBT, DCAF17, DCC, DCDC2, DCHS1, DCLRE1C, DCPS, DCX, DDB2, DDC, DDHD1, DDHD2, DDR2, DDRGK1, DDX11, DDX3X, DDX59, DENND5A, DES, DGAT1, DGKE, DGUOK, DHCR24, DHCR7, DHDDS, DHFR, DHH, DHODH, DHPS, DHTKD1, DIAPH1, DIS3L2, DKC1, DLAT, DLD, DLG3, DLL3, DMD, DMGDH, DMP1, DMXL2, DNAAF1, DNAAF2, DNAAF3, DNAAF4, DNAAF5, DNAAF6, DNAH1, DNAH11, DNAH5, DNAH9, DNAI1, DNAI2, DNAJB13, DNAJB2, DNAJC12, DNAJC19, DNAJC21, DNAJC6, DNAL1, DNASE1L3, DNM1L, DNM2, DNMT3B, DOCK2, DOCK6, DOCK7, DOCK8, DOK7, DOLK, DONSON, DPAGT1, DPH1, DPM1, DPM2, DPM3, DPY19L2, DPYD, DPYS, DRAM2, DRC1, DSE, DSG1, DSG4, DSP, DST, DSTYK, DTNBP1, DUOX2, DUOXA2, DYM, DYNC2H1, DYNC2I1, DYNC2I2, DYNC2LI1, DYNLT2B, DYSF, DZIP1L, EARS2, EBP, ECEL1, ECHS1, ECM1, EDA, EDAR, EDARADD, EDN1, EDN3, EDNRB, EFEMP2, EFL1, EFNB1, EGF, EGFR, EGR2, EIF2AK3, EIF2AK4, EIF2B1, EIF2B2, EIF2B3, EIF2B4, EIF2B5, EIF2S3, EIF4A3, ELAC2, ELMO2, ELOVL4, ELP1, ELP2, EMC1, EMD, EMG1, EML1, EMP2, ENAM, ENO3, ENPP1, ENTPD1, EOGT, EPB41, EPB42, EPCAM, EPG5, EPM2A, EPRS1, EPS8L2, ERAL1, ERBB3, ERCC1, ERCC2, ERCC3, ERCC4,

MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
			ERCC5, ERCC6, ERCC6L2, ERCC8, ERLIN1, ERLIN2, ESCO2, ESPN, ESR1, ESRRB, ETFA, ETFB, ETFDH, ETHE1, EVC, EVC2, EXOSC2, EXOSC3, EXOSC8, EXPH5, EXTL3, EYS, F10, F11, F13A1, F13B, F2, F5, F7, F8, F9, FA2H, FADD, FAH, FAM126A, FAM161A, FAM20A, FAM20C, FAN1, FANCA, FANCB, FANCC, FANCD2, FANCE, FANCF, FANCG, FANCI, FANCL, FANCM, FAR1, FARS2, FASTKD2, FAT4, FBLN5, FBP1, FBXL4, FBXO7, FCGR3A, FCN3, FDXR, FECH, FERMT1, FERMT3, FEZF1, FGA, FGB, FGD1, FGD4, FGF16, FGF23, FGF3, FGF5, FGFR3, FGG, FH, FHL1, FIBP, FIG4, FKBP10, FKBP14, FKRP, FKTN, FLAD1, FLG, FLI1, FLNA, FLNB, FLVCR1, FLVCR2, FMN2, FMO3, FMR1, FOLR1, FOXE1, FOXE3, FOXI1, FOXN1, FOXP3, FOXRED1, FRAS1, FREM1, FREM2, FRMD7, FRMPD4, FRRS1L, FSHB, FSHR, FTCD, FTL, FTO, FTSJ1, FUCA1, FUT8, FXN, FYB1, FYCO1, FZD6, G6PC, G6PC3, G6PD, GAA, GALC, GALE, GALK1, GALNS, GALNT3, GALT, GAMT, GAN, GAS8, GATA1, GATM, GBA, GBA2, GBE1, GCDH, GCH1, GCK, GCLC, GCM2, GCNT2, GCSH, GDAP1, GDF1, GDF5, GDF6, GDI1, GEMIN4, GFER, GFM1, GFPT1, GGCX, GGT1, GH1, GHR, GHRHR, GHSR, GINS1, GIPC3, GJA1, GJB1, GJB2, GJB2/GJB3, GJB2/GJB6, GJB3, GJB6, GJC2, GK, GLA, GLB1, GLDC, GLDN, GLE1, GLIS2, GLIS3, GLRA1, GLRB, GLRX5, GLUL, GLYCTK, GM2A, GMPPA, GMPPB, GNAT1, GNAT2, GNB3, GNB5, GNE, GNMT, GNPAT, GNPTAB, GNPTG, GNRHR, GNS, GORAB, GOSR2, GOT2, GP1BA, GP1BB, GP6, GP9, GPAA1, GPC3, GPC6, GPD1, GPHN, GPI, GPIHBP1, GPR143, GPR179, GPR68, GPSM2, GPT2, GPX1, GPX4, GRHL2, GRHPR, GRIA3, GRID2, GRIK2, GRIN1, GRIP1, GRK1, GRM1, GRM6, GRN, GRXCR1, GSC, GSS, GTF2E2, GTF2H5, GTPBP2, GTPBP3, GUCY1A1, GUCY2C, GUCY2D, GUF1, GUSB, GYG1, GYS1, GYS2, GZF1, H6PD, HAAO, HACE1, HADH, HADHA, HADHB, HAL, HAMP, HARS1, HAX1, HBA1, HBA2, HBB, HCCS, HCFC1, HDAC8, HELLS, HEPACAM, HERC1, HERC2, HES7, HESX1, HEXA, HEXB, HFE, HFM1, HGD, HGF, HGSNAT, HIBCH, HIKESHI, HINT1, HJV, HK1, HLCS, HMGCL, HMGCS2, HMOX1, HMX1, HNMT, HNRNPH2, HOGA1, HOXA1, HOXB1, HOXC13, HPCA, HPD, HPGD, HPRT1, HPS1, HPS3, HPS4, HPS5, HPS6, HPSE2, HR, HSD11B2, HSD17B10, HSD17B3, HSD17B4, HSD3B2, HSD3B7, HSPA9, HSPD1, HSPG2, HTRA1, HTRA2, HTT, HUWE1, HYAL1, HYDIN, HYLS1, HYOU1, IARS1, IBA57, ICOS, IDH3B, IDS, IDUA, IER3IP1, IFNGR1, IFNGR2, IFT122, IFT140, IFT172, IFT43, IFT52, IFT80, IFT81, IGBP1, IGF1, IGF1R, IGFALS, IGFBP7, IGHMBP2, IGLL1, IGSF1, IHH, IKBKB, IKBKG, IL10RA, IL10RB, IL11RA, IL12B, IL12RB1, IL17RA, IL17RC, IL1RAPL1, IL1RN, IL21R, IL2RA, IL2RG, IL36RN, IL7R, ILDR1, IMPA1, IMPG2, INPP5E, INPP5K, INPPL1, INS, INSR, INTS1, INVS, IQCB1, IQCE, IQSEC2, IRAK4, IRF8, IRS4, IRX5, ISCA1, ISCA2, ISCU, ISG15, ITCH, ITGA2B, ITGA3, ITGA6, ITGA7, ITGA8, ITGB2, ITGB3,

MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
			ITGB4, ITGB6, ITK, ITPA, ITPR1, IVD, IYD, JAGN1, JAK3, JAM3, JUP, KANK2, KARS1, KATNB1, KATNIP, KCNE1, KCNJ1, KCNJ10, KCNJ11, KCNJ13, KCNQ1, KCNQ4, KCNV2, KCTD7, KDM5C, KDM6A, KDSR, KERA, KHDC3L, KIAA0586, KIAA0753, KIAA1109, KIAA1549, KIF14, KIF1A, KIF1C, KIF7, KIFBP, KISS1R, KIZ, KLC2, KLHL15, KLHL3, KLHL40, KLHL41, KLHL7, KLK4, KLKB1, KNL1, KPTN, KREMEN1, KRT10, KRT14, KRT18, KRT25, KRT5, KRT8, KRT83, KRT85, KY, KYNU, L1CAM, L2HGDH, LAGE3, LAMA1, LAMA2, LAMA3, LAMB1, LAMB2, LAMB3, LAMC2, LAMC3, LAMP2, LAMTOR2, LARGE1, LARP7, LARS1, LARS2, LAS1L, LAT, LBR, LCA5, LCAT, LCK, LCT, LDHA, LDLR, LDLRAP1, LEMD2, LEP, LEPR, LGI4, LHB, LHCGR, LHFPL5, LHX3, LIAS, LIFR, LIG4, LIMS2, LINS1, LIPA, LIPC, LIPE, LIPH, LIPN, LIPT1, LIPT2, LMAN1, LMBR1, LMBRD1, LMF1, LMNA, LMOD3, LONP1, LOXHD1, LPAR6, LPIN1, LPIN2, LPL, LRAT, LRBA, LRIG2, LRIT3, LRMDA, LRP2, LRP4, LRP5, LRPAP1, LRPPRC, LRRC6, LRSAM1, LRTOMT, LSS, LTBP2, LTBP3, LTBP4, LTC4S, LYRM7, LYST, LZTFL1, LZTR1, MAG, MAGED2, MAGI2, MAGT1, MAK, MALT1, MAMLD1, MAN1B1, MAN2B1, MANBA, MAOA, MAP3K20, MAPKBP1, MAPT, MARS1, MARS2, MARVELD2, MASP1, MASP2, MAT1A, MATN3, MBOAT7, MBTPS2, MC2R, MCCC1, MCCC2, MCEE, MCFD2, MCIDAS, MCM3AP, MCM4, MCM9, MCOLN1, MCPH1, MDH2, MECP2, MECR, MED12, MED17, MED23, MED25, MEFV, MEGF10, MEGF8, MEOX1, MERTK, MESP2, METTL23, MFF, MFN2, MFRP, MFSD2A, MFSD8, MGAT2, MGME1, MGP, MICU1, MID1, MIPEP, MITF, MKKS, MKS1, MLC1, MLPH, MLYCD, MMAA, MMAB, MMACHC, MMADHC, MME, MMP1, MMP13, MMP2, MMP20, MMP21, MMP9, MMUT, MOCOS, MOCS1, MOCS2, MOGS, MPC1, MPDU1, MPDZ, MPI, MPIG6B, MPL, MPLKIP, MPO, MPV17, MPZ, MRAP, MRE11, MRPL3, MRPS16, MRPS2, MRPS22, MRPS34, MS4A1, MSH3, MSMO1, MSN, MSRB3, MSTN, MSTO1, MT3, MTFMT, MTHFD1, MTHFR, MTM1, MTMR2, MTO1, MTR, MTRR, MTTP, MUSK, MUTYH, MVK, MYBPC1, MYD88, MYH2, MYMK, MYO15A, MYO18B, MYO1E, MYO3A, MYO5A, MYO5B, MYO6, MYO7A, MYPN, NAA10, NADK2, NAGA, NAGLU, NAGS, NALCN, NANS, NARS2, NAXE, NBAS, NBEAL2, NBN, NCAPD3, NCF1, NCF2, NCF4, NDE1, NDP, NDRG1, NDST1, NDUFA1, NDUFA10, NDUFA11, NDUFA12, NDUFA2, NDUFA9, NDUFAF1, NDUFAF2, NDUFAF3, NDUFAF4, NDUFAF5, NDUFAF6, NDUFB11, NDUFB3, NDUFB9, NDUFS1, NDUFS2, NDUFS3, NDUFS4, NDUFS6, NDUFS7, NDUFS8, NDUFV1, NDUFV2, NEB, NECTIN1, NECTIN4, NEFL, NEK1, NEK8, NEK9, NEU1, NEUROG3, NEXMIF, NFU1, NGF, NGLY1, NHEJ1, NHLRC1, NHP2, NHS, NIN, NIPAL4, NLGN4X, NLRP1, NLRP7, NME8, NMNAT1, NNT, NONO, NOP10, NPC1, NPC2, NPHP1, NPHP3, NPHP4, NPHS1, NPHS2, NPPA, NPR2, NR0B1, NR1H4, NR2E3, NRL, NRXN1, NSDHL, NSMCE2, NSUN2, NT5C2, NT5C3A, NT5E,

MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
			NTHL1, NTRK1, NUBPL, NUP107, NUP62, NUP93, NYX, OAT, OBSL1, OCA2, OCLN, OCRL, ODAPH, OFD1, OGDH, OGT, OPA1, OPA3, OPHN1, OPN1LW, OPN1MW, OPTN, ORAI1, ORC1, ORC4, ORC6, OSGEP, OSTM1, OTC, OTOA, OTOF, OTOG, OTOGL, OTUD6B, OTULIN, OXCT1, P2RY12, P3H1, P3H2, PADI3, PADI6, PAH, PAK3, PALB2, PAM16, PANK2, PAPSS2, PARK7, PARN, PATL2, PAX3, PAX7, PC, PCARE, PCBD1, PCCA, PCCB, PCDH12, PCDH15/CDH23, PCDH19, PCK2, PCNT, PCSK1, PCYT1A, PDE10A, PDE6A, PDE6B, PDE6C, PDE6G, PDE6H, PDHA1, PDHB, PDHX, PDP1, PDSS1, PDSS2, PDX1, PDXK, PDZD7, PEPD, PET100, PEX1, PEX10, PEX11B, PEX12, PEX13, PEX14, PEX16, PEX19, PEX2, PEX26, PEX3, PEX5, PEX6, PEX7, PFKM, PGAM2, PGAP1, PGAP2, PGAP3, PGK1, PGM1, PGM3, PHEX, PHF6, PHF8, PHGDH, PHKA1, PHKA2, PHKB, PHKG2, PHOX2A, PHYH, PI4KA, PIBF1, PIEZO1, PIEZO2, PIGA, PIGC, PIGG, PIGL, PIGM, PIGN, PIGO, PIGT, PIGV, PIGW, PIGY, PIK3CD, PIK3R1, PIK3R5, PINK1, PIP5K1C, PJVK, PKD1L1, PKHD1, PKLR, PKP1, PLA2G6, PLA2G7, PLAA, PLCB1, PLCB4, PLCD1, PLCE1, PLD1, PLEC, PLEKHG2, PLEKHG5, PLG, PLK4, PLOD1, PLOD2, PLOD3, PLP1, PLPBP, PLS3, PMM2, PMP22, PMPCA, PMPCB, PNKP, PNP, PNPLA1, PNPLA2, PNPLA6, PNPO, PNPT1, POC1A, POC1B, POLA1, POLE, POLG, POLH, POLR1C, POLR1D, POLR3A, POLR3B, POMC, POMGNT1, POMGNT2, POMK, POMP, POMT1, POMT2, POP1, POR, PORCN, POU1F1, POU3F4, PPA2, PPIB, PPM1K, PPP1R15B, PPT1, PQBP1, PRCD, PRDM12, PRDM5, PRDX1, PREPL, PRF1, PRG4, PRICKLE1, PRKCD, PRKDC, PRKN, PRKRA, PRMT7, PROC, PRODH, PROM1, PROP1, PROS1, PRPH2, PRPS1, PRRX1, PRSS12, PRSS56, PRUNE1, PRX, PSAP, PSAT1, PSMB8, PSMC3IP, PSPH, PTF1A, PTH, PTH1R, PTPN23, PTPRC, PTPRO, PTPRQ, PTRH2, PTS, PUS1, PXDN, PYCR1, PYCR2, PYGL, PYGM, PYROXD1, QARS1, QDPR, RAB18, RAB23, RAB27A, RAB28, RAB33B, RAB39B, RAB3GAP1, RAB3GAP2, RAD50, RAD51C, RAG1, RAG2, RAPSN, RARB, RARS1, RARS2, RASGRP1, RAX, RBBP8, RBCK1, RBM10, RBM8A, RBP3, RBP4, RCBTB1, RD3, RDH12, RDH5, RDX, RECQL4, REEP6, RELN, REN, RETREG1, RFT1, RFX5, RFX6, RFXANK, RFXAP, RGR, RHO, RIN2, RIPK4, RIPOR2, RLBP1, RLIM, RMND1, RMRP, RNASEH1, RNASEH2A, RNASEH2B, RNASEH2C, RNASET2, RNF168, RNF216, ROBO3, ROGDI, ROM1, ROR2, RORC, RP1, RP2, RPE65, RPGR, RPGRIP1, RPGRIP1L, RPL10, RPS6KA3, RRM2B, RS1, RSPH1, RSPH3, RSPH4A, RSPH9, RSPO1, RSPO4, RSPRY1, RTEL1, RTN4IP1, RTTN, RUSC2, RXYLT1, RYR1, S1PR2, SACS, SAG, SAMD9, SAMHD1, SAR1B, SARDH, SARS2, SBDS, SBF1, SBF2, SC5D, SCARB2, SCARF2, SCN1B, SCN4A, SCN5A, SCN9A, SCNN1A, SCNN1B, SCNN1G, SCO1, SCO2, SCYL1, SDCCAG8, SDHA, SDHAF1, SDHB, SDR9C7, SEC23A, SEC23B, SEC24D, SECISBP2, SELENON, SEMA4A, SEPSECS,

MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
			SERAC1, SERPINA1, SERPINA6, SERPINB7, SERPINB8, SERPINC1, SERPINE1, SERPINF1, SERPINF2, SERPING1, SERPINH1, SETX, SFRP4, SFTPB, SFXN4, SGCA, SGCB, SGCD, SGCG, SGO1, SGPL1, SGSH, SH2D1A, SH3PXD2B, SH3TC2, SHROOM4, SI, SIL1, SIX6, SKIV2L, SLC10A2, SLC11A2, SLC12A1, SLC12A3, SLC12A5, SLC12A6, SLC13A5, SLC16A1, SLC16A2, SLC17A5, SLC18A3, SLC19A2, SLC19A3, SLC1A1, SLC1A4, SLC22A12, SLC22A5, SLC24A1, SLC24A4, SLC24A5, SLC25A1, SLC25A12, SLC25A13, SLC25A15, SLC25A19, SLC25A20, SLC25A22, SLC25A26, SLC25A3, SLC25A38, SLC25A4, SLC25A46, SLC26A2, SLC26A3, SLC26A4, SLC26A5, SLC27A4, SLC29A3, SLC2A1, SLC2A10, SLC2A2, SLC2A9, SLC30A10, SLC33A1, SLC34A1, SLC34A2, SLC34A3, SLC35A1, SLC35A3, SLC35C1, SLC35D1, SLC37A4, SLC38A8, SLC39A13, SLC39A14, SLC39A4, SLC39A8, SLC3A1, SLC45A1, SLC45A2, SLC46A1, SLC4A1, SLC4A11, SLC4A4, SLC52A2, SLC52A3, SLC5A1, SLC5A2, SLC5A5, SLC5A7, SLC6A17, SLC6A19, SLC6A3, SLC6A5, SLC6A8, SLC6A9, SLC7A14, SLC7A7, SLC7A9, SLC9A3, SLC9A6, SLCO2A1, SLITRK6, SLURP1, SLX4, SMARCAL1, SMARCD2, SMC1A, SMG9, SMN1, SMOC1, SMOC2, SMPD1, SMPX, SMS, SNAI2, SNAP29, SNIP1, SNX10, SNX14, SOBP, SOD1, SOHLH1, SOST, SOX18, SOX3, SP110, SP7, SPAG1, SPARC, SPART, SPATA5, SPATA7, SPEG, SPG11, SPG21, SPG7, SPINK1, SPINK5, SPINT2, SPR, SPRTN, SPTA1, SPTBN2, SPTBN4, SQSTM1, SRD5A2, SRD5A3, SRY, SSR4, ST14, ST3GAL3, ST3GAL5, STAC3, STAG3, STAMBP, STAR, STAT1, STAT2, STAT5B, STIL, STIM1, STK4, STN1, STRA6, STRADA, STRC, STS, STUB1, STX11, STXBP2, SUCLA2, SUCLG1, SUFU, SUGCT, SULT2B1, SUMF1, SUN5, SUOX, SURF1, SYN1, SYNE1, SYNE4, SYP, SYT14, SZT2, TAC3, TACO1, TACR3, TACSTD2, TAF1, TAF13, TAF2, TAF6, TALDO1, TANGO2, TAP1, TAP2, TAPBP, TAPT1, TAT, TAZ, TBC1D20, TBC1D23, TBC1D24, TBC1D7, TBCD, TBCE, TBCK, TBL1X, TBX15, TBX19, TBX21, TBX22, TBXAS1, TBXT, TCAP, TCIRG1, TCN2, TCTN1, TCTN2, TCTN3, TDP1, TDP2, TDRD7, TECPR2, TECR, TECRL, TECTA, TELO2, TENM3, TERT, TEX11, TEX15, TF, TFR2, TFRC, TG, TGDS, TGM1, TGM5, TH, THOC2, THOC6, THRB, TIMM50, TIMM8A, TIMMDC1, TJP2, TK2, TKT, TLE6, TMC1, TMC6, TMC8, TMCO1, TMEM107, TMEM126A, TMEM126B, TMEM138, TMEM165, TMEM199, TMEM216, TMEM231, TMEM237, TMEM260, TMEM38B, TMEM67, TMEM70, TMIE, TMPRSS15, TMPRSS3, TMPRSS6, TMTC3, TNFRSF10B, TNFRSF11A, TNFRSF11B, TNFRSF13B, TNFRSF13C, TNFSF11, TNIK, TNNT1, TNXB, TOE1, TOP3A, TP53RK, TPI1, TPK1, TPM3, TPO, TPP1, TPRKB, TPRN, TRAF3IP1, TRAIP, TRAPPC11, TRAPPC12, TRAPPC2, TRAPPC4, TRAPPC6B, TRAPPC9, TRDN, TREH, TREM2, TREX1, TRH, TRHR, TRIM2, TRIM32, TRIM37, TRIOBP, TRIP11, TRIP13, TRIP4,

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
				TRIT1, TRMT10A, TRMT10C, TRMT5, TRMU, TRNT1, TRPM1, TRPM6, TRPV6, TSEN15, TSEN2, TSEN34, TSEN54, TSFM, TSHB, TSHR, TSPAN7, TSPYL1, TTC19, TTC21B, TTC25, TTC37, TTC7A, TTC8, TTI2, TTLL5, TTN, TTPA, TUBA8, TUBGCP4, TUBGCP6, TUFM, TULP1, TUSC3, TWIST2, TWNK, TXNL4A, TYK2, TYMP, TYR, TYROBP, TYRP1, UBA1, UBA5, UBE2A, UBE2T, UBE3B, UBQLN2, UBR1, UCHL1, UFM1, UGT1A1, UMPS, UNC13D, UNC80, UNG, UPB1, UPF3B, UQCRB, UQCRC2, UQCRQ, UROD, UROS, USB1, USH1C, USH1G, USH2A, USP18, USP27X, USP9X, UVSSA, VAC14, VARS1, VARS2, VDR, VIPAS39, VKORC1, VLDLR, VMA21, VPS11, VPS13A, VPS13B, VPS13C, VPS33A, VPS33B, VPS37A, VPS45, VPS53, VRK1, VSX2, VWF, WARS2, WAS, WASHC4, WASHC5, WBP2, WDR19, WDR35, WDR45, WDR45B, WDR62, WDR72, WDR73, WDR81, WEE2, WFS1, WHRN, WIPF1, WNK1, WNT1, WNT10A, WNT10B, WNT3, WNT7A, WRAP53, WRN, WWOX, XDH, XIAP, XK, XPA, XPC, XPNPEP3, XRCC4, XYLT1, XYLT2, YARS2, YY1AP1, ZAP70, ZBTB16, ZBTB24, ZC3H14, ZC4H2, ZDHHC9, ZFYVE26, ZIC3, ZMPSTE24, ZMYND10, ZNF408, ZNF423, ZNF469, ZNF711, ZNHIT3, ZP1
PRME **PREDNISONA Y PREDNISOLONA, SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	9	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Prednisolona en suero: 500,00 - 1000,00 ng/mL No se dispone de intervalo terapéutico para la prednisona. La prednisona actua como un pro-fármaco inactivo que se metaboliza rápidamente a prednisolona que es su metabolito activo. Se detecta una concentración pico entre 750 y 1000 ng/mL tras 1h a 1.5h post ingesta de 80 mg de prednisolona. Esta concentración disminuye lentamente por debajo de 500 ng/mL en las siguientes 6h.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
DTPE **PREECLAMPSIA, DIAGNÓSTICO SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE, SUERO**	TRACE	3	Rec. 2 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] - Indicada para mujeres con embarazo único (un feto) Imprescindible formulario de recogida de datos específico.	10 semanas de gestación Mujeres 16,20 - 55,00 pg/mL 11 semanas de gestación Mujeres 19,00 - 61,00 pg/mL 12 semanas de gestación Mujeres 21,30 - 96,70 pg/mL 13 semanas de gestación Mujeres 25,20 - 100,40 pg/mL 14 semanas de gestación Mujeres 34,30 - 132,00 pg/mL 15-19 semanas gestación Mujeres 43,00 - 348,00 pg/mL 20-24 semanas gestación Mujeres 183,00 - 868,00 pg/mL 25-28 semanas gestación Mujeres 145,00 - 1000,00 pg/mL 29-33 semanas gestación Mujeres 71,00 - 1157,00 pg/mL 34-36 semanas gestación Mujeres 41,00 - 752,00 pg/mL 37 semanas gestación - parto Mujeres 37,00 - 750,00 pg/mL 8 semanas de gestación Mujeres 9,30 - 28,90 pg/mL 9 semanas de gestación Mujeres 11,70 - 37,80 pg/mL sFlt-1 (tirosina quinasa 1 soluble tipo fms): 15-19 semanas gestación 764,00 - 2545,00 pg/mL sFlt-1 (tirosina quinasa 1 soluble tipo fms): 20-24 semanas gestación 626,00 - 4443,00 pg/mL sFlt-1 (tirosina quinasa 1 soluble tipo fms): 25-28 semanas gestación 612,00 - 3958,00 pg/mL sFlt-1 (tirosina quinasa 1 soluble tipo fms): 29-33 semanas gestación 697,00 - 3722,00 pg/mL sFlt-1 (tirosina quinasa 1 soluble tipo fms): 34-36 semanas gestación 1023,00 - 8492,00 pg/mL sFlt-1 (tirosina quinasa 1 soluble tipo fms): 37 semanas gestación - parto 961,00 - 7524,00 pg/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
PCPE **PREECLAMPSIA, SCREENING DE PRIMER TRIMESTRE, SUERO**	TRACE	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] No es necesario estar en ayunas. - Realizar prueba entre la semana 11-13.6 - Indicada para mujeres con embarazo único (un feto) - Indispensable cumplimentar peticionario con todos los datos requeridos Los resultados deben valorarse conjuntamente con el resto de hallazgos ginecológicos.	
PREG **PREGABALINA, SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Cong.] La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis. No utilizar tubos con gel separador.	I.Terapéutico: 2,00 - 8,00 mg/L Toxicidad: Sup 10,00 mg/L Límite de cuantificación: 0,50 mg/L
PREG30 **PREGNENOLONA (30'), SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Suero 30 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
PREG60 **PREGNENOLONA (60'), SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Suero 60 m. [Refr.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
PREGNE				
PREGNENOLONA, SUERO	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Hombres 0,10 - 3,40 ng/mL Mujeres 0,10 - 3,80 ng/mL
FFLET				
PRE-KALICREINA, PLASMA	Técnica coagulométrica.	35	Rec. 1.2 mL Plasma Citrato sódico [Cong.]	50,00 - 200,00 %
PRI				
PRIMIDONA, SUERO	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Cong.] -Dosis administrada, frecuencia y vía de administración La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis. No utilizar tubos con gel separador.	I.Terapéutico: 5,00 - 10,00 mg/L Toxicidad: Sup 25,00 mg/L Límite de cuantificación: 1,00 mg/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
PCAL **PROCALCITONINA, SUERO**	Quimioluminiscencia.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 1 mL Plasma Heparina litio (1 x Tubo sangre heparina litio) [Refr.] Alt. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Ante sospecha de infección/sepsis: - Inferior a 0.5 ng/mL representa un riesgo bajo de sepsis severa y/o shock séptico. - Superior a 2 ng/mL representa un riesgo alto de sepsis severa y/o shock séptico. - Las concentraciones de Procalcitonina (PCT) entre 0.5 y 2.0 ng/mL deben interpretarse teniendo en cuenta la historia del paciente. En esos casos, se recomienda volver a valorar la PCT en el plazo de 6-24 horas. - Debe tenerse en cuenta que concentraciones inferiores a 0.5 ng/mL no permiten descartar una infección, ya que en algunas infecciones localizadas (sin presencia de signos sistémicos) pueden aparecer estas concentraciones bajas. Así mismo, también pueden reflejar una infección generalizada en sus etapas muy iniciales (inferior a 6 horas desde el debut). Por el contrario y aunque poco frecuente, también puede aparecer un aumento de PCT sin que exista ninguna infección. En individuos sanos la PCT no suele ser detectable En neonatos, deben considerarse unos límites de referencia particulares hasta su tercer día de vida (0 - 6 horas: 2.0 ng/mL, 6 - 12 horas: 8.0 ng/mL, 12 - 18 horas: 15.0 ng/mL, 18 - 30 horas: 21 .0 ng/mL, 30 - 36 horas: 15.0 ng/mL, 36 - 42 horas: 8.0 ng/mL, 42 - 48 horas: 2.0 ng/mL).
G02044 **PROGERIA HUTCHINSON-GILFORD · LMNA · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	LMNA *1*
G02035 **PROGERIA/SÍNDROMES PROGEROIDES · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ALDH18A1, B4GALT7, BANF1, BLM, ERCC4, ERCC6, ERCC8, LMNA, PDGFRB, POLD1, PTDSS1, PYCR1, RECQL4, WRN, ZMPSTE24 *15*
PG30 **PROGESTERONA (30'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 30 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
PG60 **PROGESTERONA (60'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 60 m. [Refr.] Rec. 1 mL Suero 60 h [Refr.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
PRGSA **PROGESTERONA, SALIVA**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Saliva (1 x Tubo sin aditivos) [Cong.] No usar Salivetes Rechazo: Muestras contaminadas con sangre. Durante los 30 minutos antes de obtener la muestra de saliva no ingiera alimentos, no beba, no fume ni mastique chicle.	Hombres Inf 58,00 pg/mL Fase Folicular Mujeres 30,30 - 51,30 pg/mL Fase Luteal Mujeres 87,30 - 544,30 pg/mL Postmenopausia Mujeres 21,00 - 69,00 pg/mL Premenarquía Mujeres 7 - 14 Años 12,00 - 52,00 pg/mL Menarquía Mujeres 12 - 19 Años 15,00 - 53,00 pg/mL
PG **PROGESTERONA, SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 1 mL Plasma Heparina litio (1 x Tubo sangre heparina litio) [Refr.] En mujeres, Indicar fase menstrual. Se requiere la semana de gestación.	Hombres Inf 0,50 ug/L Fase Folicular Mujeres Inf 0,50 ug/L Fase Luteal Mujeres 1,20 - 15,90 ug/L Gestación 1º trimestre Mujeres 2,80 - 147,30 ug/L Gestación 2º trimestre Mujeres 22,50 - 95,30 ug/L Gestación 3º trimestre Mujeres 27,90 - 242,50 ug/L Postmenopausia Mujeres Inf 0,50 ug/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
PGRP **PRO-GRP - PEPTIDO ASOCIADO A LA GASTRINA (MARCADOR TUMORAL PULMON), SUERO**	Quimioluminiscencia.	7	Rec. 400 uL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Alt. 400 uL Plasma Heparina sódica (1 x Tubo sangre heparina sódica) [Cong.] Alt. 400 uL Plasma Heparina litio (1 x Tubo sangre heparina litio) [Cong.] Alt. 400 uL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Separar y congelar antes de las 3 horas después de la extracción.	Inf 36,70 pg/mL
PRIN30 **PROINSULINA (30'), PLASMA**	Enzimoinmunoanálisis	8	Rec. 0.5 mL Plasma 30 m. EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.]	pmol/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
PRIN60 **PROINSULINA (60'), PLASMA**	Enzimoinmunoanálisis	8	Rec. 0.5 mL Plasma 60 m. EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.]	pmol/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
PRIN90 **PROINSULINA (90'), PLASMA**	Enzimoinmunoanálisis	8	Rec. 0.5 mL Plasma 90 m. EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.]	pmol/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
PRIN120 **PROINSULINA (120'), PLASMA**	Enzimoinmunoanálisis	8	Rec. 0.5 mL Plasma 120 m. EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.]	pmol/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
PRIN180 **PROINSULINA (180'), PLASMA**	Enzimoinmunoanálisis	8	Rec. 0.5 mL Plasma 180 m. EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.]	pmol/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
PROIN240 **PROINSULINA (240'), PLASMA**	Enzimoinmunoanálisis	8	Rec. 0.5 mL Plasma 240 m. EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.]	pmol/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
PROIN300 **PROINSULINA (300'), PLASMA**	Enzimoinmunoanálisis	8	Rec. 0.5 mL Plasma 300 m. EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.]	pmol/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
PROIN **PROINSULINA INTACTA, PLASMA**	Enzimoinmunoanálisis	8	Rec. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Ayuno mínimo de 12 horas.	Inf 4,21 pmol/L
PRL10 **PROLACTINA (10'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 10 m [Refr.]	µg/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
PRL15 **PROLACTINA (15'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 15 m. [Refr.] Muestras refrigeradas más de 7 días.	µg/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
PRL-15 **PROLACTINA (-15'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero -15 m. [Refr.] Muestras refrigeradas más de 7 días.	µg/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
PRL20 **PROLACTINA (20'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 20 m. [Refr.]	µg/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
PRL30 **PROLACTINA (30'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 30 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	µg/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
PRL40 **PROLACTINA (40'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 40 m [Refr.]	µg/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
PRL60 **PROLACTINA (60'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 60 m. [Refr.]	µg/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
PRL90 **PROLACTINA (90'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 90 m. [Refr.] Muestras refrigeradas más de 7 días.	µg/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
PRL120 **PROLACTINA (120'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 120 m. [Refr.] Muestras refrigeradas más de 7 días.	µg/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
PRL180 **PROLACTINA (180'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	µg/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
PRL45 **PROLACTINA (45'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 45 m. [Refr.]	µg/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
PRL5 **PROLACTINA (5'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 5 m [Refr.] Muestras refrigeradas más de 7 días.	µg/L Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
MACPR **PROLACTINA (ESTUDIO MACROPROLACTINA), SUERO**	Precipitación con polietilenglicol.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Criterios orientativos: se considera presencia de macroprolactina cuando el porcentaje de recuperación de prolactina en el sobrenadante es inferior al 40%

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
POOLPRL **PROLACTINA POOL, SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 40 m (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 1 mL Suero 20 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Realizar toma de muestras en tiempos basal, 20min y 40min.	Hombres 2,10 - 17,70 µg/L Mujeres 2,80 - 29,20 µg/L Postmenopausia Mujeres 1,80 - 20,30 µg/L
PRL **PROLACTINA, SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Hombres 3,46 - 19,40 ug/L Mujeres 5,18 - 26,53 ug/L
G17014 **PROLIDASA, DEFICIENCIA DE · PEPD · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PEPD *1*
PROC3 **PROPÉPTIDO AMINO TERMINAL DEL PROCOLÁGENO TIPO III, SUERO**	Radioinmunoanálisis.	12	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Adultos 0,33 - 0,79 U/mL Ambos 0 - 10 Años 0,34 - 6,10 U/mL Ambos 10 - 15 Años 0,64 - 1,70 U/mL Ambos 15 - 20 Años 0,37 - 1,80 U/mL
PROC **PROPEPTIDO AMINOTERMINAL DEL PROCOLAGENO TIPO I, SUERO**	Quimioluminiscencia.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Hombres 20 - 29 Años 25,60 - 112,40 µg/L Mujeres 20 - 29 Años 24,00 - 77,10 µg/L Mujeres 30 - 39 Años 18,70 - 83,20 µg/L Hombres 30 - 39 Años 26,10 - 79,80 µg/L Hombres 40 - 49 Años 22,50 - 77,70 µg/L Mujeres 40 - 49 Años 18,80 - 70,10 µg/L Mujeres 50 - 59 Años 24,60 - 98,70 µg/L Hombres 50 - 59 Años 21,60 - 77,30 µg/L Mujeres Sup - 59 Años 20,00 - 99,00 µg/L Hombres Sup - 59 Años 17,30 - 88,20 µg/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
PCTPCI **PROPEPTIDO C-TERMINAL DEL PROCOLAGENO TIPO I, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	10	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Hombres 69,00 - 147,00 ng/mL Mujeres 76,00 - 163,00 ng/mL
PROANP **PROPÉPTIDO NATRIURÉTICO ATRIAL DE LA REGIÓN MEDIA (MR-PROANP), PLASMA**	Inmunoanálisis	32	Rec. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.]	Inf 82,50 pmol/L
NTBNP **PROPÉPTIDO NATRIURÉTICO CEREBRAL N-TERMINAL (NT-proBNP), SUERO**	Electroquimioluminiscencia.	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Pacientes con sintomatología aguda Alta probabilidad de excluir insuficiencia cardiaca aguda: Inf 300,00 pg/mL Pacientes con sintomatología aguda Ambos 0 - 50 Años Alta probabilidad de padecer insuficiencia cardiaca: Sup 450,00 pg/mL Pacientes con sintomatología no aguda Ambos 0 - 50 Años Alta probabilidad de excluir insuficiencia cardiaca aguda: Inf 125,00 pg/mL Pacientes con sintomatología no aguda Ambos 0 - 50 Años Alta probabilidad de padecer insuficiencia cardiaca: Sup 600,00 pg/mL Pacientes con sintomatología aguda Ambos 50 - 75 Años Alta probabilidad de padecer insuficiencia cardiaca: Sup 900,00 pg/mL Pacientes con sintomatología aguda Ambos Sup - 75 Años Alta probabilidad de padecer insuficiencia cardiaca: Sup 1800,00 pg/mL
PSPH **PROPSA - PHI (PROSTATE HEALTH INDEX), SUERO**	Quimioluminiscencia.	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] La muestra debe extraerse antes de realizarse manipulaciones prostáticas tales como tacto rectal (DRE) y/o masaje prostático. No es necesario estar en ayunas. Se debe extraer y congelar el suero en menos de tres horas tras la extracción.	proPSA-PHI (PROSTATE HEALTH INDEX): Hombres Riesgo Alto: Sup 40,00 proPSA-PHI (PROSTATE HEALTH INDEX): Hombres Riesgo Bajo: 0,00 - 20,90 proPSA-PHI (PROSTATE HEALTH INDEX): Hombres Riesgo Medio: 21,00 - 40,00

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
PGE2O **PROSTAGLANDINA E2, ORINA**	Enzimoinmunoanálisis	30	Rec. 3 mL Orina 24h. (alícuota) [Cong.] Plazo de entrega aproximado. Consultar con el laboratorio. Volumen indispensable. Restringir en la medida de lo posible el uso de AINES durante las 48 horas previas a la obtención de la muestra.	165,00 - 540,00 pg/min
PGE2 **PROSTAGLANDINA E2, PLASMA**	Radioinmunoanálisis.	32	Rec. 1.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Restringir en la medida de lo posible el uso de AINES durante las 48 horas previas a la obtención de la muestra.	30,00 - 170,00 ng/L
G15165 **PRÓSTATA BÁSICO, NEOPLASIA DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	12	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	ATM, BARD1, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDK12, CHEK1, CHEK2, FANCL, PALB2, RAD51B, RAD51C, RAD51D, RAD54L
G14068 **PRÓSTATA HEREDITARIO, CÁNCER DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	15	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ATM, BRCA1, BRCA2, CHEK2, HOXB13, MLH1, MSH2, MSH6, MSR1, NBN, PALB2, PMS2, RAD51D, TP53 *14*
G15166 **PRÓSTATA, VEJIGA, UROTELIAL, NEOPLASIA DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	12	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	Se informa para cada paciente *31* ATM, BARD1, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDK12, CHEK1, CHEK2, ERBB2, ERG, FANCA, FANCL, FGFR2, FGFR3, MLH1, MSH2, MSH6, MSI, PALB2, PIK3CA, PMS2, PPP2R2A, PTEN, RAD51B, RAD51C, RAD51D, RAD54L, RB1, TMB, TMPRSS2, TP53

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G01139 **PROTECCIÓN FRENTE A INFARTO DE MIOCARDIO Y TROMBOSIS VENOSA FACTOR XIII · F13A1(V34L) · HOT SPOT**	Hot Spot	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	F13A1 [V34L] *1*
PROSTAT **PROTEIN STATUS (PERFIL PROTEICO EN DIAGRAMA DE BARRAS)**	No se aplica.	10	Rec. 2 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Ayuno de 4 horas	Se informa para cada paciente
PCJ **PROTEINA 14.3.3, LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO**	Enzimoinmunoanálisis	16	Rec. 2 mL LCR [Refr.] Es importante centrifugar el LCR y mandar el sobrenadante. Refrigerado es estable 3 días, congelado (-20ºC) es estable 3 meses. No se aceptan muestras hemolizadas.	La positividad de la prueba en un contexto clínico compatible es altamente sugestiva de enfermedad de Creutzfeldt-Jacob. Sin embargo, en otras situaciones de destrucción neuronal severa como ictus, encefalitis o crisis generalizadas repetidas o bien por la presencia de hematíes la prueba puede ser también positiva (falso positivo) por lo que esta positividad se ha de valorar en el contexto del enfermo y resultados de la analítica básica de LCR. Si persisten las dudas diagnósticas recomendamos repetir la determinación en 2 - 3 semanas La negatividad de la prueba no descarta el diagnóstico de la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob, pero lo hace más improbable. Si persisten las dudas diagnósticas recomendamos repetir la determinación en 2 - 3 semanas. Inf 20000,00 AU/mL
A-AM **PROTEINA AMILOIDE A (SAA), SUERO**	Nefelometría.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Inf 6,40 mg/L
PBMI **PROTEINA BASICA DE MIELINA, LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO**	Enzimoinmunoanálisis	21	Rec. 1 mL LCR [Cong.] Se requiere recoger la muestra de LCR en tubo de polipropileno.	Inf 5,5 ng/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
PBAP **PROTEINA BETA AMILOIDE COCIENTE 1-42/1-40,PLASMA**	Enzimoinmunoensayo quimioluminiscente (CLEIA)	22	Rec. 0.4 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Separar el plasma mediante centrifugación antes de 3 h tras extracción. Transferir a tubo de polipropileno. Congelar para su transporte. Remitir congelada. Conservar entre -20 y -80ºC en el laboratorio.	Cociente 1-42/1-40: Sugestivos Enfermedad de Alzheimer: Inf 0,083
BTLB **PROTEINA BETA AMILOIDE/TAU, LCR**	Quimioluminiscencia.	16	Rec. 5 mL LCR (1 x Tubo Polipropileno) [Cong.] Descartar las primeras 20 gotas y recoger aproximadamente 2-5 mL de LCR en un tubo de polipropileno. Congelar inmediatamente. No se aceptan muestras refrigeradas.	Nota: En la enfermedad de la demencia de Alzheimer y en la enfermedad de Alzheimer prodrómica es característico una disminución de la proteína Amiloide b42, una reducción del cociente Ab42/Ab40 y un incremento tanto de la proteína Tau total como de la proteína Tau fosforilada Cociente Prot beta amiloide 1-42/1-40 LCR: Sup 0,069 Proteína beta amiloide 1-42: Sup 599,00 pg/mL Proteína TAU: Inf 404,00 pg/mL Proteína TAU fosforilada: Inf 56,50 pg/mL
EFRPCAGL **PROTEINA C (RESISTENCIA A LA PROTEINA C ACTIVADA), PLASMA**	Técnica coagulométrica.	6	Rec. 1 mL Plasma Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) [Cong.] Rechazo: Muestras a temperatura ambiente más de 2 horas. Separar y congelar inmediatamente.	Se recomienda la determinación de la mutación del factor V Leyden mediante técnica molecular de las muestras con resultados positivos o de valor límite entre 110 y 130 segundos. 120,00 - 300,00 seg

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
PCA **PROTEÍNA C ANTIGÉNICA DE LA COAGULACIÓN, PLASMA**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Plasma Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) [Cong.] Rechazo: Muestras a temperatura ambiente más de 2 horas. Separar y congelar inmediatamente.	70,00 - 140,00 %
PPCC **PROTEINA C FUNCIONAL DE LA COAGULACIÓN, PLASMA**	Técnica coagulométrica.	6	Rec. 1 mL Plasma Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) [Cong.] Rechazo: Muestras a temperatura ambiente más de 2 horas.	70,00 - 140,00 %
PCU **PROTEINA C REACTIVA (ULTRASENSIBLE), SUERO**	Nefelometría.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Congelar la muestra si el tiempo transcurrido desde la extracción es inferior a 24 horas.	Riesgo Cardiovascular bajo: Inf 1,00 mg/L Riesgo Cardiovascular alto: Sup 3,00 mg/L Riesgo Cardiovascular medio: 1,00 - 3,00 mg/L
PCL **PROTEINA C REACTIVA, MUESTRA BIOLOLÓGICA**	Turbidimetría.	1	Rec. 1 mL Líquido biológico [Refr.]	mg/L Interpretación según criterio clínico
PC **PROTEINA C REACTIVA, SUERO**	Turbidimetría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Inf 5,00 mg/L
PCEL **PROTEÍNA CATIÓNICA EOSINÓFILA , LÁGRIMA**	Quimioluminiscencia.	5	Rec. 500 uL Lágrima [Refr.]	µg/L Interpretación según criterio clínico

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
PCEMN **PROTEÍNA CATIÓNICA EOSINÓFILA, MOCO NASAL**	Quimioluminiscencia.	5	Rec. 1 mL Moco nasal [Refr.]	µg/L Interpretación según criterio clínico
PCE **PROTEINA CATIÓNICA EOSINOFILA, SUERO**	Quimioluminiscencia.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Inf 24,00 µg/L
PREOXH **PROTEINA EOSINOFILICA X (EPX), HECES**	Enzimoinmunoanálisis	12	Rec. 5 g Heces (1 x Recipiente estéril) [Cong.]	Inf 1358,00 ng/g heces
POMC **PROTEÍNA OLIGOMÉRICA DE MATRIZ DE CARTÍLAGO (COMP), SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Inf 12,00 U/L
PPRIBS **PROTEÍNA P RIBOSOMAL ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunoblot.	7	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	No se detecta
PROPRI **PROTEÍNA PRIÓNICA PARA DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD DE CREUTZFELDT-JAKOB, LCR**	RT-QuiC	16	Rec. 2 mL LCR [Refr.] Se requiere información clínica.	Indicado en informe adjunto Se informa para cada paciente
G1576 **PROTEINA S (TROMBOFILIA), DÉFICIT DE · PROS1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PROS1 *1*
PPS **PROTEINA S FUNCIONAL DE LA COAGULACION, PLASMA**	Técnica coagulométrica.	6	Rec. 1 mL Plasma Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) [Cong.] Separar y congelar inmediatamente.	Hombres 77,00 - 143,00 % Mujeres 55,00 - 123,00 %

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
PSAGL **PROTEINA S LIBRE ANTIGENICA DE LA COAGULACION, PLASMA**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Plasma Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) [Cong.] Rechazo: Muestras a temperatura ambiente más de 2 horas. Separar y congelar inmediatamente.	Hombres 70,00 - 148,00 % Mujeres 50,00 - 134,00 %
PSAG **PROTEÍNA S TOTAL ANTIGÉNICA DE LA COAGULACIÓN, PLASMA**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Plasma Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) [Cong.] Collection, Transport, and Processing of Blood Specimens for Testing Plasma-Based Coagulation Assays and Molecular Hemostasis Assays; Approved Guideline—Fifth Edition (H21-A5). Rechazo: Muestras a temperatura ambiente más de 2 horas.	Hombres 75,00 - 140,00 % Mujeres 60,00 - 140,00 %
S100 **PROTEINA S100, SUERO**	Quimioluminiscencia.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Inf 0,15 µg/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
TAUP181P **PROTEINA TAU FOSFORILADA 181, PLASMA**	Enzimoinmunoensayo quimioluminiscente (CLEIA)	22	Rec. 0.4 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Separar el plasma mediante centrifugación antes de 3 h tras extracción. Transferir a tubo de polipropileno. Congelar para su transporte. Remitir congelada. Conservar entre -20 y -80ºC en el laboratorio.	Inf 2,00 pg/mL Concentraciones superiores a 2 pg/mL deben ser considerados en el algoritmo diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. Concentraciones inferiores a 2 pg/mL con un cociente Beta amiloide 1-42/1-40 en plasma inferior a 0,083 deben ser considerados en el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer.
PT217 **PROTEINA TAU FOSFORILADA 217, PLASMA**	Enzimoinmunoensayo quimioluminiscente (CLEIA)	15	Rec. 400 uL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Ayuno de 8 horas. Separar el plasma mediante centrifugación antes de 3 h tras extracción. Transferir a tubo de polipropileno. Congelar para su transporte. Remitir congelada. Conservar entre -20 y -80ºC en el laboratorio. Rechazo: Muestras refrigeradas o a temperatura ambiente más de 24 horas.	Nota: Los puntos de corte aplicados están entre 0,18 pg/mL y 0,35 pg/mL para una sensibilidad y especificidad diagnósticas superiores al 95 %. Origen valores de referencia Sarto J, et al. Accuracy and clinical applicability of plasma tau 181 and 217 for Alzheimer's disease diagnosis in a memory clinic cohort. Journal of Neurology (2025) 272:160

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
PME **PROTEÍNAS DE MEMBRANA ERITROCITARIA**	Electroforesis en Agarosa.	180	Rec. 5 mL Sangre total Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Rec. 10 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Las muestras deben ser recibidas en nuestro laboratorio de Lunes a Jueves, nunca los Viernes ni vísperas de festivos. Indicar edad, sexo, motivo de la petición. Sin efectos de transfusión reciente (mínimo 1 mes).	Se informa para cada paciente
PTCR **PROTEINAS TOTALES, LCR**	Turbidimetría.	1	Rec. 1 mL LCR [Refr.]	Ambos 0 - 10 Días 15,00 - 130,00 mg/dL Ambos 10 - 365 Días 15,00 - 45,00 mg/dL Ambos Sup - 1 Años 15,00 - 45,00 mg/dL
PTL **PROTEINAS TOTALES, LÍQUIDO BIOLÓGICO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Líquido biológico [Refr.]	g/L Interpretación según criterio clínico
PTLS **PROTEINAS TOTALES, LÍQUIDO SINOVIAL**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Líquido sinovial [Refr.]	10,00 - 30,00 g/L
POR **PROTEINAS TOTALES, ORINA**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Orina (1 x Tubo 10 mL.) [Refr.]	Inf mg/dL Interpretación según criterio clínico

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
PO24 **PROTEINAS TOTALES, ORINA 24H**	Turbidimetría.	1	Rec. 1 mL Orina 24h. (alícuota) (1 x Contenedor 2500 mL.) [Refr.]	Excreción (24h): Inf 150,00 mg/24h Concentración: mg/dL Volumen de orina remitido (diuresis): 600,00 - 1600,00 mL
PT **PROTEÍNAS TOTALES, SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	64,00 - 83,00 g/L Ambos 0 - 1 Años 64,00 - 83,00 g/L Ambos 1 - 10 Años 64,00 - 83,00 g/L Ambos 10 - 20 Años 64,00 - 83,00 g/L Ambos Sup - 20 Años 64,00 - 83,00 g/L
PCOR **PROTEÍNAS/CREATININA COCIENTE, ORINA**	Turbidimetría.	1	Rec. 2 mL Orina [Refr.]	Creatinina en orina : mg/dL Interpretación según criterio clínico Cociente proteínas / creatinina en orina micción: Inf 150,00 mg/g crea : Inf mg/dL Interpretación según criterio clínico
PR-3 **PROTEINASA 3 (PR3) ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunoanálisis con detección fluorescente	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 2,00 UI/mL Indeterminado: 2,00 - 3,00 UI/mL Positivo: Sup 3,00 UI/mL
PRGL **PROTEINOGRAMA, LCR**	Electroforesis en Agarosa.	3	Rec. 1.2 mL LCR [Refr.] Remitir muestra de suero.	Alfa1 globulina: 2,00 - 7,00 % Proteínas: Ambos 0 - 10 Días 15,00 - 130,00 mg/dL Proteínas: Ambos 10 - 365 Días 15,00 - 45,00 mg/dL Proteínas: Ambos Sup - 1 Años 15,00 - 45,00 mg/dL
PGLB **PROTEINOGRAMA, MUESTRA BIOLOGIA**	Electroforesis en Agarosa.	5	Rec. 1 mL Líquido biológico [Refr.]	Cociente albúmina/globulina: No se dispone de valores de referencia. Valorar a criterio clínico. Se recomienda realizar el estudio simultáneo en suero y en muestra biológica.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
PROR **PROTEINOGRAMA, ORINA 24H**	Electroforesis en Agarosa.	4	Rec. 20 mL Orina 24h. (alícuota) (1 x Contenedor 2500 mL.) [Refr.] No usar conservante que contenga ácido bórico.	Comentario proteinograma en orina: Se informa para cada paciente Excreción (24h): Inf 150,00 mg/24h Concentración: mg/dL Límite de referencia: el 100% de las proteínas totales formadas por albúmina Volumen de orina remitido (diuresis): 600,00 - 1600,00 mL
-32 **PROTEINOGRAMA, SUERO**	Electroforesis Capilar.	2	Rec. 0.8 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Albúmina: 40,20 - 47,60 g/L Albúmina%: 55,80 - 66,10 % Alfa 1 globulina: 2,10 - 3,50 g/L Alfa 1 globulina %: 2,90 - 4,90 % Alfa 2 globulina: 5,10 - 8,50 g/L Alfa 2 globulina %: 7,10 - 11,80 % Beta 1 globulina: 3,40 - 5,20 g/L Beta 1 globulina %: 4,70 - 7,20 % Beta 2 globulina: 2,30 - 4,70 g/L Beta 2 globulina %: 3,20 - 6,50 % Cociente Albúmina/Globulina: 1,20 - 2,10 Gamma globulina: 8,00 - 13,50 g/L Gamma globulina %: 11,10 - 18,80 % Proteínas totales: 64,00 - 83,00 g/L Proteínas totales: Ambos 0 - 1 Años 64,00 - 83,00 g/L Proteínas totales: Ambos 1 - 10 Años 64,00 - 83,00 g/L Proteínas totales: Ambos 10 - 20 Años 64,00 - 83,00 g/L Proteínas totales: Ambos Sup - 20 Años 64,00 - 83,00 g/L
POX19 **PROTEUS 0X19 ANTICUERPOS (WEILFELIX) (RICKETTSIAS)**	Hemaglutinación.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 1/160
PROX **PROTEUS OX19, OX-2,OX-K (WEIL-FELIX) RICKETTSIAS ANTICUERPOS, SUERO**	Aglutinación	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Ac Proteus OX19 en suero: Negativo: Inf 1/160 Ac Proteus OX2 en suero: Interpretación: Negativo: Inf 1/160 Ac Proteus OXK en suero: Interpretación: Negativo: Inf 160,00

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
POX2 **PROTEUS OX2 ANTICUERPOS (WEILFELIX) (RICKETTSIAS)**	Hemaglutinación.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/160
POXK **PROTEUS OXK ANTICUERPOS (WEILFELIX) (RICKETTISIAS)**	Hemaglutinación.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 160,00
G1172 **PROTEUS, SÍNDROME DE · AKT1 (Glu17Lys) · HOT SPOT**	Hot Spot	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AKT1 [Glu17Lys] *1*
G03176 **PROTOPORFIRIA ERITROPOYÉTICA LIGADA AL X · ALAS2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ALAS2 *1*
PPL **PROTOPORFIRINA ERITROCITARIA LIBRE, SANGRE TOTAL**	Fluorimetría.	3	Rec. 3 mL Sangre total Heparina sódica (1 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Rec. 3 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Muestra alternativa: sangre EDTA.	Inf 55,00 µg/dL
PORFI **PROTOPORFIRINA ZINC P.P.Z. (/G HEMOGLOBINA), SANGRE TOTAL**	Fluorimetría.	3	Rec. 3 mL Sangre total Heparina sódica (1 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Rec. 3 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Personal expuesto Nivel de acción: Inf 3,50 µg/g Hb Población no expuesta Inf 3,50 µg/g Hb Inf 20,00 µg/g Hb Límite de exposición: Inf 20,00 µg/g Hb

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
PPZNN **PROTOPORFIRINA ZINC P.P.Z., SANGRE TOTAL (EXCLUSIVO LATAM)**	Fluorimetría.	3	Rec. 1.5 mL Sangre total Heparina sódica (1 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Rec. 1.5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Muestra alternativa: EDTA, heparina o citrato.	BEIs® (ACGIH®): Inf 280,00 µg/dL V. indicativo: Inf 60,00 µg/dL
AFAPG **PROTROMBINA + FOSFATIDILSERINA ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Inf 30,00 U/L
AFAPM **PROTROMBINA + FOSFATIDILSERINA ANTICUERPOS IgM, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Inf 30,00 U/L
ACPRG **PROTROMBINA ANTICUERPOS IGG, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 1.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rechazo: Muestra Hemolizada Rechazo: Muestra ictérica Rechazo: Muestra lipémica.	Negativo: Inf 10,00 U/mL Positivo: Sup= 10,00 U/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ACPRM **PROTROMBINA ANTICUERPOS IGM, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 1.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rechazo: Muestra Hemolizada Rechazo: Muestra ictérica Rechazo: Muestra lipémica.	Negativo: Inf 10,00 U/mL Positivo: Sup= 10,00 U/mL
PATERHJ2 **PRUEBA COMPATIBILIDAD GENÉTICA (PATERNIDAD ANÓNIMA) 2º HIJO**	PCR-Análisis de fragmentos.	12	Rec. 2 Muestra/s Frotis bucal (2 x Escobillón forense (libre de RNAsa, DNAsa y DNA)) Alt. 1 mL Sangre total EDTA Contactar con el laboratorio antes de solicitar el estudio. Sangre en EDTA o 2 hisopos bucales (sin medio) por paciente + Hoja de solicitud de paternidad anónima (sin valor judicial).	Indicado en informe adjunto

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
PATERHJ3 **PRUEBA COMPATIBILIDAD GENÉTICA (PATERNIDAD ANÓNIMA) 3r HIJO**	PCR-Análisis de fragmentos.	12	Rec. 2 Muestra/s Frotis bucal (2 x Escobillón forense (libre de RNAsa, DNAsa y DNA)) Alt. 1 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) Contactar con el laboratorio antes de solicitar el estudio. Sangre en EDTA o 2 hisopos bucales (sin medio) por paciente + Hoja de solicitud de paternidad anónima (sin valor judicial).	Indicado en informe adjunto
EMB **PRUEBA DE EMBARAZO**	Tira reactiva	1	Rec. 10 mL Orina [Refr.]	Se informa para cada paciente
SAICAR **PRUEBA DE SAICAR (METABOLISMO DE PURINAS), ORINA**	Espectrometría de masas de triple cuadrupolo (HPLC-EM/EM)	30	Rec. 20 mL Orina [Cong.] Orina reciente. Sin conservantes y congelación inmediata.	SAICAribósido: Inf 0,1 UA/mol creatinina Succinil-adenosina: Inf ó = 3 años: 0,2 - 2,8 mmol/mol creatinina 4 - 6 años: 0,5 - 1,3 mmol/mol creatinina Sup 7 años: Inf ó = 0,8 mmol/mol creatinina
WRO **PRUEBA DE WAALER ROSE, SUERO**	Hemaglutinación.	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Inf 10,00 UI/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
PARENINF **PRUEBA PARENTESCO ANÓNIMA ENTRE 2 INDIVIDUOS**	PCR-Análisis de fragmentos.	12	Rec. 2 Muestra/s Frotis bucal (2 x Escobillón seco.) Alt. 1 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) Contactar con el laboratorio antes de solicitar el estudio. Sangre en EDTA o 2 hisopos bucales (sin medio) por paciente + Hoja de solicitud de paternidad anónima (sin valor judicial).	Indicado en informe adjunto
PARENTES **PRUEBA PARENTESCO JUDICIAL ENTRE 2 INDIVIDUOS**	PCR-Análisis de fragmentos.	12	Rec. 2 Muestra/s Frotis bucal (1 x Kit específico) Contactar con el laboratorio antes de solicitar el estudio. Kit especial con cadena de custodia + hoja de solicitud de paternidad judicial 2 hisopos bucales (sin medio) por paciente	Indicado en informe adjunto
PSA **PSA ANTÍGENO PROSTATICO ESPECIFICO, SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] No es necesario estar en ayunas.	Inf 4,00 ng/mL
PSAL **PSA LIBRE/PSA TOTAL ÍNDICE, SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Índice PSA libre / PSA total: 0,20 - 1,00 PSA: Inf 4,00 ng/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
PSELES **P-SELECTINA SOLUBLE, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	20	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	36,00 - 140,00 ng/mL	
G08085 **PSEUDOACONDROPLASIA · COMP · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	COMP	*1*
G03138 **PSEUDOHIPOALDOSTERISMO TIPO II · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CUL3, KLHL3, WNK1, WNK4	*4*
G03197 **PSEUDOHIPOPARATIROIDISMO · mUPD20 · A. FRAGMENTOS**	Análisis de Fragmentos	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Es necesario enviar sangre EDTA de ambos padres (4 mL).	Se informa para cada paciente	
G03141 **PSEUDOHIPOPARATIROIDISMO 1A, 1B, 1C · GNAS · MS-MLPA**	MS-MLPA (Metilación específica-MLPA)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GNAS	*1*
G03140 **PSEUDOHIPOPARATIROIDISMO 1A, 1B, 1C · GNAS · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GNAS	*1*
DNPA **PSEUDOMONAS AERUGINOSA DNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	Reacción en cadena de la polimerasa.	4	Rec. 1 mL Líquido biológico (1 x (Ninguno)) [Refr.]		
G05011 **PSEUDOOBSTRUCCIÓN INTESTINAL · FLNA · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FLNA	*1*
G7426 **PSEUDOXANTOMA ELÁSTICO · ABCC6 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABCC6	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G01133 **PSEUDOXANTOMA ELÁSTICO · ABCC6 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABCC6 *1*
G14069 **PTEN, SÍNDROMES RELACIONADOS CON · PTEN · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PTEN *1*
G14070 **PTEN, SÍNDROMES RELACIONADOS CON · PTEN · SANGER**	Secuenciación Sanger	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PTEN *1*
G14071 **PTEN, SÍNDROMES RELACIONADOS CON · PTEN · SANGER+MLPA**	Secuenciación Sanger + MLPA	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PTEN [MLPA] *1*
PTLC **PTERINAS, LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	20	Rec. 1 mL LCR (1 x Tubo estéril) [Cong.] Proteger de la luz. SIEMPRE congeladas (preferiblemente a -80ºC). Enviar con nieve carbónica	Biopterina en LCR: Ambos 0 - 1 Meses 15,00 - 73,00 nmol/L Biopterina en LCR: Ambos 2 - 6 Meses 15,00 - 44,00 nmol/L Biopterina en LCR: Ambos 7 - 24 Meses 11,00 - 39,00 nmol/L Biopterina en LCR: Ambos 3 - 7 Años 10,00 - 52,00 nmol/L Biopterina en LCR: Ambos 8 - 12 Años 10,00 - 36,00 nmol/L Biopterina en LCR: Ambos 13 - 99 Años 10,00 - 36,00 nmol/L Neopterina en LCR: Ambos 0 - 1 Meses 12,00 - 55,00 nmol/L Neopterina en LCR: Ambos 2 - 6 Meses 12,00 - 30,00 nmol/L Neopterina en LCR: Ambos 7 - 24 Meses 8,00 - 43,00 nmol/L Neopterina en LCR: Ambos 3 - 7 Años 9,00 - 55,00 nmol/L Neopterina en LCR: Ambos 8 - 12 Años 11,00 - 45,00 nmol/L Neopterina en LCR: Ambos 13 - 99 Años 10,00 - 24,00 nmol/L
PTER **PTERINAS, ORINA**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	20	Rec. 1 mL Orina (1 x Tubo 5 mL.) [Cong.] Muestra protegida de la luz	Biopterina: 0,30 - 3,00 mmol/mol crea Biopterina %: 18,00 - 80,00 % Creatinina en orina : mg/dL Interpretación según criterio clínico Neopterina: Ambos 0 - 1 Años 0,90 - 3,15 mmol/mol Cre Neopterina: Ambos Sup - 2 Años 0,40 - 2,70 mmol/mol Cre

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G15207 **PULMÓN NO MICROCÍTICO EXTENDIDO (NSCLC), NEOPLASIA DE · PANEL · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	12	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	Se informa para cada paciente *81* AKT1, AKT2, ALK, APC, ARID1A, ATM, BAP1, BRAF, BRCA1, BRCA2, CAMTA1, CDKN2A, CREBBP, CTNNB1, CUL3, DDR2, DICER1, EGFR, EIF1AX, EP300, EPCAM, EPHA7, ERBB2, ERBB4, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FGFR4, HRAS, KEAP1, KIT, KMT2A, KRAS, MAP2K1, MEN1, MET, MLH1, MPRIP, MSH2, MSH6, MSI, MTOR, MYB, MYB1, MYC, MYCL1, MYCN, NF1, NF2, NFE2L2, NFIB, NKX2-1, NOTCH1, NOTCH2, NRAS, NRG1, NTRK1, NTRK2, NTRK3, PARP1, PBRM1, PDGFRA, PIK3CA, PMS2, PTEN, RB1, RET, RHBDF1, RIT1, ROS1, SETD2, SLIT2, SMARCA4, STK11, TMB, TP53, TRAF7, TSC1, TSC2, WWTR1, YAP1-TFE3
G15206 **PULMÓN NO MICROCÍTRICO BÁSICO (NSCLC), NEOPLASIA DE · PANEL · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	12	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	Se informa para cada paciente *7* ALK, BRAF, EGFR, KRAS, MET, RET, ROS1
PUPIO **PURINAS Y PIRIMIDINAS, ORINA**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	12	Rec. 10 mL Orina [Cong.] El paciente debe estar al menos 5 días con dieta exenta de frutas, mermeladas, refrescos, café, chocolate.	Se informa para cada paciente

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G04047 **PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA TROMBÓTICA CONGÉNITA · ADAMTS13 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Plazo de entrega orientativo dependiendo de la complejidad en la secuenciación del Gen estudiado y de las caracteristicas genotípicas inherentes al paciente. - Resumen de la historia clínica del paciente. Se requiere consentimiento informado. - En caso que proceda y si está disponible, copia del informe del caso índice familiar.	ADAMTS13	*1*
G01084 **QT CORTO, SÍNDROME DE · KCNJ2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	KCNJ2	*1*
G01085 **QT CORTO, SÍNDROME DE · KCNQ1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	KCNQ1	*1*
G01083 **QT CORTO, SÍNDROME DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CACNA1C, CACNA2D1, CACNB2, KCNH2, KCNJ2, KCNQ1	*6*
G01086 **QT LARGO TIPO 14, SÍNDROME DE · CALM1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CALM1	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G01087 **QT LARGO TIPO 15, SÍNDROME DE · CALM2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CALM2	*1*
G01088 **QT LARGO TIPO 4, SÍNDROME DE · ANK2 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ANK2	*1*
G01089 **QT LARGO TIPO 9, SÍNDROME DE · CAV3 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CAV3	*1*
G01091 **QT LARGO, SÍNDROME DE · KCNE1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	KCNE1	*1*
G01092 **QT LARGO, SÍNDROME DE · KCNE2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	KCNE2	*1*
G01093 **QT LARGO, SÍNDROME DE · KCNQ1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	KCNQ1	*1*
G01175 **QT LARGO, SÍNDROME DE · PANEL · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	KCNE1, KCNE2, KCNH2, KCNJ2, KCNQ1	*5*
G01090 **QT LARGO, SÍNDROME DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AKAP9, ANK2, CACNA1C, CALM1 , CALM2, CALM3, CAV3, FHL2, HCN4, KCNA5, KCND3, KCNE1, KCNE2, KCNE3, KCNE5, KCNH2, KCNJ2, KCNJ5, KCNQ1, KCNQ2, NOS1AP, PTRF, RYR2, SCN1B, SCN4B, SCN5A, SNTA1, TRDN	*28*
G01166 **QT LARGO, SÍNDROME DE · PANEL A · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CACNA1C, CALM1 , CALM2, CALM3, KCNE1, KCNE2, KCNH2, KCNJ2, KCNQ1, SCN5A	*10*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G01163 **QT LARGO, SÍNDROME DE · SCN5A · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SCN5A *1*
QSOMS **QUERATAN SULFATO, ORINA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	15	Rec. 1 mL Orina (1 x Envase aséptico) [Cong.]	Ambos 0 - 13 Años 0,70 - 6,50 µg/mg creat Ambos Sup - 13 Años 0,30 - 1,70 µg/mg creat
G12034 **QUERATITIS · PAX6 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PAX6 *1*
G02036 **QUERATITIS, ICTIOSIS CON SORDERA · GJB2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GJB2 *1*
G02037 **QUERATODERMA PALMOPLANTAR CON SORDERA · GJB2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GJB2 *1*
G02049 **QUERATODERMIA PALMOPLANTAR EPIDERMOLÍTICA · KRT9 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	KRT9 *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
QUET **QUETIAPINA (SEROQUEL), SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	7	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis. El contenedor recomendado es el tubo seco (sin gel separador) para evitar procesos de adsorción del fármaco. En caso de no disponer de tubo seco, la extracción se puede realizar en tubo con gel separador, separando el suero dentro de las 2 horas posteriores a la recolección y transfiriéndolo a un tubo de alícuota para su transporte al laboratorio. Rechazo: Muestra hemolizada, lipémica y/o ictérica	I.Terapéutico: 100,00 - 500,00 µg/L Toxicidad: Sup 1000,00 µg/L Límite de cuantificación: 10,00 µg/L
QUIMO **QUIMOTRIPSINA, HECES**	Espectrometría.	6	Rec. 5 g Heces [Refr.] Se recomienda suspender toda medicación como mínimo 5 días antes.	Negativo: Sup 6,00 U/g Indeterminado: 3,00 - 6,00 U/g Positivo: Inf 3,00 U/g

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
RQTR **QUINEURINA / TRIPTÓFANO RATIO, SUERO**	Cálculo.	17	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Extracción en condiciones de reposo del paciente y habiendo suspendido la medicación con antidepresivos (mínima una semana, optimo dos semanas)	Quineurina: 1,10 - 3,30 µmol/L Ratio Quineurina/Triptófano: 11,00 - 77,00 Triptófano: 22,00 - 83,00 µmol/L
QUINI **QUINIDINA, SUERO**	Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectrometría de masas.	7	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] -Dosis administrada, frecuencia y vía de administración	I.Terapéutico: 2,00 - 5,00 mg/L Conc.Tóxica: Sup 5,00 mg/L
G05012 **QUISTES HEPÁTICOS · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	LRP5, PKHD1, PRKCSH, SEC63 *4*
G10005 **QUISTES PULMONARES · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	EFEMP2, ELN, FBLN5, FLCN, LTBP4, SERPINA1, TSC1, TSC2 *8*
QTTRSS **QUITOTRIOSIDASA, SANGRE SECA**	Fluorimetría.	15	Rec. 1 Muestra/s Sangre seca en papel de filtro (1 x Papel de filtro Whatman 903) Recoger gotas de sangre sin anticoagulante en papel de filtro Whatman 903. Dejar secar al aire libre durante 1 hora. Guardar en nevera en bolsa de plástico cerrada hasta el envío.	14,00 - 186,00 µmoles/L/h

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
QTSDS **QUITOTRIOSIDASA, SUERO**	Fluorimetría.	30	Rec. 3 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Alt. 3 mL Plasma (1 x Tubo 5 mL.) [Cong.] Ayuno. Evitar hemólisis. Antes de centrifugar esperar a la retracción del coágulo. Recoger el sobrenadante en otro tubo y congelar inmediatamente.	17,00 - 211,00 nmol/h/mL
G14072 **RABDOMIOSARCOMA ALVEOLAR TIPO 2 · PAX3 · SANGER**	Secuenciación Sanger	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PAX3 *1*
RABT **RABIA ANTICUERPOS TOTALES, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	8	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Ausencia de anticuerpos o protección débil: Inf 0,50 UI/mL Inmunidad Adquirida: Sup= 0,50 UI/mL
G08126 **RAQUITISMO HIPOCALCÉMICO DEPENDIENTE DE VITAMINA D · CYP27B1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CYP27B1 *1*
G08141 **RAQUITISMO HIPOCALCÉMICO RESISTENTE A LA VITAMINA D· VDR · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	VDR *1*
G7469 **RAQUITISMO HIPOFOSFATÉMICO · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CLCN5, DMP1, ENPP1, FGF23, PHEX, SLC34A3 *6*
G01134 **RASOPATÍAS · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	A2ML1, BRAF, CBL, HRAS, KAT6B, KRAS, LZTR1, MAP2K1, MAP2K2, NF1, NRAS, NSUN2, PTPN11, RAF1, RASA2, RIT1, RRAS, SHOC2, SOS1, SOS2, SPRED1, SPRY1, SYNGAP1 *23*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G01135 **RASOPATÍAS ASOCIADAS A DESÓRDENES LEUCOPROLIFERITIVOS · KRAS · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	KRAS *1*
REBOXE **REBOXETINA, SUERO**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	16	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.]	I.Terapéutico: 60,00 - 100,00 ng/mL
ACBRACH **RECEPTOR ACETILCOLINA ANTICUERPOS BLOQUEANTES, SUERO**	Radioinmunoanálisis.	15	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 25,00 % inhib Indeterminado: 25,00 - 30,00 % inhib Positivo: Sup 30,00 % inhib
ARFLA2 **RECEPTOR FOSFOLIPASA A2 (PLA2R) ANTICUERPOS IGG, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/10 Interpretación: Positivo: Sup= 1/10
ARA **RECEPTORES ACETILCOLINA ANTICUERPOS, SUERO**	Radioinmunoanálisis.	4	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rehazo: Muestras refrigeradas más de 1 semana.	Positivo (miastenia): Sup 0,40 nmol/L Negativo: Inf 0,25 nmol/L Indeterminado: 0,25 - 0,40 nmol/L
G11122 **REFSUM, SÍNDROME DE · PHYH · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PHYH *1*
REIBER **REIBERGRAMA**	Turbidimetría.	7	Rec. 1.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 1.5 mL LCR (1 x Contenedor estéril) [Refr.] Se precisan ambas muestras.	Indicado en informe adjunto

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G14073 **RENAL HEREDITARIO, CÁNCER DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	15	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BAP1, CDC73, CDKN1C, DICER1, DIS3L2, FH, FLCN, GPC3, HNF1A, HNF1B, MET, MITF, MLH1, MSH2, MSH6, PMS1, PMS2, PTEN, SDHB, SDHC, SDHD, SMARCA4, SMARCB1, TP53, TSC1, TSC2, VHL, WT1 *28*
REN45 **RENINA (ACTIVIDAD PLASMÁTICA) A LOS 45 MIN, PLASMA**	Radioinmunoanálisis.	4	Rec. 1 mL Plasma 45 m. EDTA [Cong.]	
RENI30 **RENINA (ACTIVIDAD) (30'), PLASMA**	Radioinmunoanálisis.	3	Rec. 1 mL Plasma 30 m. EDTA [Cong.]	ng/mL/hora Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
RENI60 **RENINA (ACTIVIDAD) (60'), PLASMA**	Radioinmunoanálisis.	4	Rec. 1 mL Plasma 60 m. EDTA [Cong.]	ng/mL/hora Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
RENI90 **RENINA (ACTIVIDAD) (90'), PLASMA**	Radioinmunoanálisis.	3	Rec. 1 mL Plasma 90 m. EDTA [Cong.]	ng/mL/hora Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
RENI120 **RENINA (ACTIVIDAD) (120'), PLASMA**	Radioinmunoanálisis.	4	Rec. 1 mL Plasma 120 m. EDTA [Cong.]	ng/mL/hora Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
RENI180 **RENINA (ACTIVIDAD) (180'), PLASMA**	Radioinmunoanálisis.	3	Rec. 1 mL Plasma 180 m. EDTA [Cong.]	ng/mL/hora Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
RENI240 **RENINA (ACTIVIDAD) (240'), PLASMA**	Radioinmunoanálisis.	3	Rec. 1 mL Plasma EDTA [Cong.] Rec. 1 mL Plasma 240 m. EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.]	ng/mL/hora Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
RENIOR **RENINA (ACTIVIDAD) POSICIÓN ORTOSTÁTICA, PLASMA**	Radioinmunoanálisis.	4	Rec. 1 mL Plasma posición ortostática EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.]	Posición ortostática 0,60 - 4,18 ng/mL/hora
RENIDS **RENINA (ACTIVIDAD) POSICIÓN SUPINA, PLASMA**	Radioinmunoanálisis.	4	Rec. 1 mL Plasma posición supina EDTA [Cong.]	0,32 - 1,84 ng/mL/hora
RENI **RENINA (ACTIVIDAD), PLASMA**	Radioinmunoanálisis.	4	Rec. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Rechazo: Muestra lipémica. Rechazo: Muestra Hemolizada	Ambos 0 - 2 Años 1,40 - 7,80 ng/mL/hora Ambos 3 - 5 Años 1,50 - 3,50 ng/mL/hora Ambos 6 - 8 Años 0,80 - 2,00 ng/mL/hora Ambos 9 - 11 Años 0,90 - 2,90 ng/mL/hora Ambos 12 - 17 Años 1,20 - 2,40 ng/mL/hora Posición ortostática Ambos Sup - 17 Años 0,60 - 4,18 ng/mL/hora Posición supina Ambos Sup - 17 Años 0,32 - 1,84 ng/mL/hora
RENCOP **RENINA (CONCENTRACIÓN), PLASMA**	Radioinmunoanálisis.	9	Rec. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Hemólisis, Lipemia, Contaminación	Posición ortostática 1,30 - 13,80 pg/mL Posición supina 1,00 - 8,20 pg/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G13033 **REORDENAMIENTO · BCL2/IGH (t(14;18)(q32.3;q21.3)) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	BCL2/IGH [t(14;18)(q32.3;q21.3)] *1*
G7072 **REORDENAMIENTO · BCR/ABL1 (t(9;22)(q34.1;q11.2)) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	BCR/ABL1 [t(9;22)(q34.1;q11.2)] *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G13035 **REORDENAMIENTO · CCND1(BCL1)/IGH (t(11;14)(q13;q32)) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	CCND1(BCL1)/IGH [t(11;14)(q13;q32)] *1*
G13049 **REORDENAMIENTO · C-MYC/IGH (t(8;14)(q24;q32)) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	C-MYC/IGH [t(8;14)(q24;q32)] *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G7071 **REORDENAMIENTO · DEK/CAN (t(6;9)(p22.3;q34)) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	DEK/CAN [t(6;9)(p22.3;q34)] *1*
G13036 **REORDENAMIENTO · ETV6(TEL)/RUNX1(AML1) (t(12;21)(p13.2;q22.1)) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	ETV6(TEL)/RUNX1(AML1) [t(12;21)(p13.2;q22.1)] *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G13037 **REORDENAMIENTO · IGH/FGFR3(t(4;14)(p16,3;q32.3)) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	IGH/FGFR3 [t(4;14)(p16,3;q32.3)]	*1*
G13038 **REORDENAMIENTO · IGH/MAF(t(14;16)(q32.3;q23)) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	IGH/MAF [t(14;16)(q32.3;q23)]	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G13039 **REORDENAMIENTO · PML/RAR (t(15;17)(q24;q21)) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	PML/RAR [t(15;17)(q24;q21)] *1*
G7007 **REORDENAMIENTO · RUNX1(AML1)/RUNX1T1(ETO) (t(8;21)(q21;q22.1)) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	RUNX1(AML1)/RUNX1T1(ETO) [t(8;21)(q21;q22.1)] *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G13041 **REORDENAMIENTO · TCF3(E2A)/PBX1 (t(1;19)(q23;p13.3)) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	TCF3(E2A)/PBX1 [t(1;19)(q23;p13.3)] *1*
G13142 **REORDENAMIENTO CUANTITATIVO · BCR/ABL1(p190,p210) · RT-PCR**	PCR-Real Time.	7	Rec. 9 mL Sangre total (2 x Tubo PAXGENE) Rec. 9 mL Médula ósea (2 x Tubo PAXGENE) Alt. 9 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 9 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BCR/ABL1 *1*
G13087 **REORDENAMIENTO CUANTITATIVO · CBFB/MYH11(inv16) · RT-PCR**	PCR-Real Time.	7	Rec. 9 mL Sangre total (2 x Tubo PAXGENE) Rec. 9 mL Médula ósea (2 x Tubo PAXGENE) Alt. 9 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 9 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CBFB/MYH11 [inv(16)(p13q22)] *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G13085 **REORDENAMIENTO CUANTITATIVO · ETV6(TEL)/RUNX1(AML1) · RT-PCR**	PCR-Real Time.	7	Rec. 9 mL Sangre total (2 x Tubo PAXGENE) Rec. 9 mL Médula ósea (2 x Tubo PAXGENE) Alt. 9 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 9 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ETV6(TEL)/RUNX1(AML1)	*1*
G13086 **REORDENAMIENTO CUANTITATIVO · MLL/AF4 · RT-PCR**	PCR-Real Time.	7	Rec. 9 mL Sangre total (2 x Tubo PAXGENE) Rec. 9 mL Médula ósea (2 x Tubo PAXGENE) Alt. 9 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 9 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	MLL/AF4 [t(4;11)(q21;q23)]	*1*
G13088 **REORDENAMIENTO CUANTITATIVO · PML/RAR · RT-PCR**	PCR-Real Time.	7	Rec. 9 mL Sangre total (2 x Tubo PAXGENE) Rec. 9 mL Médula ósea (2 x Tubo PAXGENE) Alt. 9 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 9 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PML/RAR	*1*
G13081 **REORDENAMIENTO CUANTITATIVO · RUNX1(AML1)/RUNX1T1(ETO) · RT-PCR**	PCR-Real Time.	7	Rec. 9 mL Sangre total (2 x Tubo PAXGENE) Rec. 9 mL Médula ósea (2 x Tubo PAXGENE) Alt. 9 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 9 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	RUNX1(AML1)/RUNX1T1(ETO) [t(8;21)(q21;q22.1)]	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G13090 **REORDENAMIENTO CUANTITATIVO · TCF3(E2A)/PBX1 · RT-PCR**	PCR-Real Time.	7	Rec. 9 mL Sangre total (2 x Tubo PAXGENE) Rec. 9 mL Médula ósea (2 x Tubo PAXGENE) Alt. 9 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 9 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TCF3(E2A)/PBX1 *1*
G04016 **RESISTENCIA A ANTAGONISTAS DE LA VITAMINA K · VKORC1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	VKORC1 *1*
G13091 **RESISTENCIA A INHIBIDORES DE KINASA · cKIT (V560G) · HOT SPOT**	Hot Spot	7	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	KIT [V560G] *1*
RESIS **RESISTINA, PLASMA**	Enzimoinmunoanálisis	14	Rec. 0.5 mL Plasma (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.]	0,90 - 3,00 ng/mL
VRSAG **RESPIRATORIO SINCITIAL VIRUS (VRS), ASPIRADO NASOFARÍNGEO**	Inmunocromatografía.	2	Rec. 1 Muestra/s Aspirado nasofaringeo [Refr.]	Negativo
ARETA **RETICULINA IgA ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/40 Interpretación: Positivo: Sup= 1/40
ARETG **RETICULINA IgG ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/40 Interpretación: Positivo: Sup= 1/40

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
RET **RETICULOCITOS**	Hematimetría	2	Rec. 1 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Ambos 0 - 4 Días 16,00 - 60,00 / 10^3 Hematíes Ambos 4 - 30 Días 6,00 - 32,00 / 10^3 Hematíes Ambos 30 - 365 Días 6,00 - 32,00 / 10^3 Hematíes Ambos 1 - 12 Años 5,00 - 22,00 / 10^3 Hematíes Ambos 12 - 18 Años 5,00 - 21,00 / 10^3 Hematíes Ambos Sup - 18 Años 5,00 - 20,00 / 10^3 Hematíes
G12060 **RETINITIS PIGMENTOSA TIPO 2 · RP2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	RP2 *1*
G12061 **RETINITIS PIGMENTOSA TIPO 4 · RHO · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	RHO *1*
G14074 **RETINOBLASTOMA · RB1 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	RB1 *1*
G14075 **RETINOBLASTOMA · RB1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	15	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	RB1 *1*
G12035 **RETINOCOROIDOPATÍA VÍTREA · BEST1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BEST1 *1*
RBP **RETINOL PROTEINA FIJADORA, SUERO**	Nefelometría.	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	3,00 - 6,00 mg/dL
G12077 **RETINOSIS PIGMENTARIA 12 · CRB1 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA (2 tubos)) [Refr.]	CRB1 *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G12065 **RETINOSIS PIGMENTARIA 3 · RPGR · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	RPGR
G12038 **RETINOSIS PIGMENTARIA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABCA4, ABHD12, AIPL1, ARL2BP, ARL6, BBS2, BEST1, C2orf71, C8ORF37, CA4, CDHR1, CERKL, CLRN1, CNGA1, CNGB1, CRB1, CRX, DHDDS, EYS, FAM161A, FLVCR1, FSCN2, GUCA1B, HGSNAT, IDH3B, IFT172, IMPDH1, IMPG2, KLHL7, LRAT, MAK, MERTK, NEK2, NR2E3, NRL, OFD1, PANK2, PDE6A, PDE6B, PDE6G, PEX7, PHYH, POMGNT1, PRCD, PROM1, PRPF3, PRPF31, PRPF6, PRPF8, PRPH2, RBP3, RDH12, RGR, RHO, RLBP1, ROM1, RP1, RP2, RP9, RPE65, RPGR, RPGRIP1, SAG, SEMA4A, SNRNP200, SPATA7, TOPORS, TTC8, TULP1, USH2A, ZNF513 *71*
G7310 **RETINOSIS PIGMENTARIA · RPGR, RP2, CHM · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CHM, RP2, RPGR *3*
G12039 **RETINOSIS PIGMENTARIA 20 · RPE65 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	RPE65 *1*
G12078 **RETINOSIS PIGMENTARIA 25 · EYS · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Indicado en informe adjunto
G12040 **RETINOSIS PIGMENTARIA 39 · USH2A · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	USH2A *1*
G12041 **RETINOSIS PIGMENTARIA 50 · BEST1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BEST1 *1*
G12042 **RETINOSIS PIGMENTARIA AD · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BEST1, CA4, CRX, FSCN2, GUCA1B, IMPDH1, KLHL7, NR2E3, NRL, PRPF3, PRPF31, PRPF6, PRPF8, PRPH2, RGR, RHO, RLBP1, ROM1, RP1, RP9, SEMA4A, SNRNP200, TOPORS *23*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G12036 **RETINOSIS PIGMENTARIA AR · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABCA4, ABHD12, AIPL1, ARL2BP, ARL6, BBS2, BEST1, C2orf71, C8ORF37, CDHR1, CERKL, CLRN1, CNGA1, CNGB1, CRB1, DHDDS, EYS, FAM161A, FLVCR1, HGSNAT, IDH3B, IFT172, IMPG2, LRAT, MAK, MERTK, NEK2, NR2E3, PANK2, PDE6A, PDE6B, PDE6G, PEX7, PHYH, POMGNT1, PRCD, PROM1, PRPH2, RBP3, RDH12, RGR, RHO, RLBP1, ROM1, RP1, RPE65, SAG, SEMA4A, SPATA7, TTC8, TULP1, USH2A, ZNF513	*53*
G12043 **RETINOSIS PIGMENTARIA CONCÉNTRICA · BEST1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BEST1	*1*
G12037 **RETINOSIS PIGMENTARIA LX · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	OFD1, RP2, RPGR, RPGRIP1	*4*
G7467 **RETINOSIS PIGMENTARIA TIPO 28 · FAM161A · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FAM161A	*1*
G12079 **RETINOSIS PIGMENTARIA, COROIDEREMIA · PANEL · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CHM, RP2, RPGR	
G12075 **RETINOSQUISIS · RS1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	RS1	*1*
G7388 **RETRASO MENTAL LIGADO AL CROMOSOMA X · IL1RAPL1 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	IL1RAPL1 [Xp21.2-p21.3]	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G11123 **RETRASO MENTAL LIGADO AL CROMOSOMA X · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABCD1, ACSL4, AFF2, AGTR2, AP1S2, ARHGEF6, ARHGEF9, ARX, ATP6AP2, ATP7A, ATRX, BCOR, BRWD3, CASK, CDKL5, CLCN4, CNKSR2 , CUL4B, DCX, DKC1, DLG3, ELK1, FANCB, FGD1, FLNA, FMR1, FRMPD4 , FTSJ1, GDI1, GK, GPC3, GRIA3, HCCS, HCFC1 , HNRNPH2, HPRT1, HSD17B10, HUWE1, IDS, IGBP1, IL1RAPL1, IQSEC2, KDM5C, KIAA2022, KLF8, L1CAM, LAMP2, MAGT1, MAOA, MBTPS2, MECP2, MED12, MID1, MTM1, NDP, NDUFA1, NHS, NLGN3, NLGN4X, NSDHL, NXF5, OCRL, OFD1, OPHN1, OTC, PAK3, PCDH19, PDHA1, PGK1, PHF6, PHF8, PLP1, PORCN, PQBP1, PRPS1, PTCHD1 , RAB39B, RLIM , RPL10, RPS6KA3, SHROOM4, SLC16A2, SLC9A6, SMC1A, SMS, SOX3, SRPX2, SYN1, SYP, TIMM8A, TSPAN7, UBE2A, UPF3B, ZCCHC12, ZDHHC15, ZDHHC9, ZNF41, ZNF674, ZNF711, ZNF81	*100*
G11190 **RETT Y OTROS RELACIONADOS, SÍNDROME DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CDKL5, FOXG1 , GRIN2B, IQSEC2, JMJD1C , MBD5, MECP2, MEF2C , SATB2 , TCF4 , WDR45	*11*
G11193 **RETT, SINDROME DE · MECP2 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	MECP2	*1*
G11192 **RETT, SINDROME DE · MECP2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	MECP2	*1*
G3123 **RETT, SÍNDROME DE · MECP2 · SANGER + MLPA**	Secuenciación Sanger + MLPA	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	MECP2	*1*
G03066 **REVERSIÓN SEXUAL 46,XY SENSIBLE A DOSIS · NR0B1 (DAX1) · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	NR0B1	*1*
G06003 **REVERSIÓN SEXUAL 46,XY TIPO 1 · SRY · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SRY	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G02038 **REVESZ, SÍNDROME DE · TINF2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TINF2 *1*
G00099 **REVISIÓN DE CLASIFICACIÓN DE VARIANTE GENÉTICA**	Clasificación de variante genética	10		
RHDVM **RHD ESTUDIO MOLECULAR DE VARIANTES (TIPIFICACIÓN), SANGRE TOTAL**	PCR-SSP.	15	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Indicado en informe adjunto
RHDF **RHD FETAL EN SANGRE MATERNA · RHD(EXONES 5, 7) · RT-PCR**	PCR-Real Time.	4	Rec. 20 mL Sangre total (2 x Tubo Streck Cell-Free DNA BCT) Realizar a partir de la 15ª semana de embarazo (Sensibilidad del 99 %). No es necesario estar en ayunas. Adjuntar peticionario y consentimiento informado (MP_RML-23) Kit Ref SAP: 550000822	Se informa para cada paciente
GFRD **RHD, GENOTIPO, SANGRE TOTAL**	PCR-SSP.	9	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Genotipaje Factor RhD (resultado) BARCELONA: No se detecta
ZIGRHD **RHD, ZIGOSIDAD (RHD) SCREENING, SANGRE TOTAL**	RFLP-PCR.	25	Rec. 3 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Se informa para cada paciente

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
RI **RI ANTICUERPOS [ANNA-2], SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo Tejido: Cerebelo En caso de positividad, el resultado debe ser confirmado con un método alternativo (inmunoblot). En caso de negatividad, no se descarta la existencia de un síndrome neurológico autoinmune
RILC **RI ANTICUERPOS, LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL LCR [Refr.]	Negativo
ACRIANS **RIANODINA RECEPTOR ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunoblot.	9	Rec. 2 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	No se detecta
RIBAV **RIBAVIRINA, PLASMA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	10	Rec. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Extracción de la muestra en pre-dosis, justo antes de la siguiente toma del medicamento. Centrifugar, separar y congelar inmediatamente. Enviar congelado y protegido de la luz.	I.Terapéutico: 2,50 - 3,0 mg/L
ARIB **RIBOSOMALES (RRNA) ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	La inmunofluorescencia no es la técnica de elección para analizar antigenicidades. Se debería solicitar una técnica específica (inmunoblot) para completar el estudio clínico. Interpretación: Negativo: Inf 1/160 Interpretación: Positivo: Sup= 1/160

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
RICKC **RICKETTSIA CONORI (FIEBRE BOTONOSA)** **ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/40 Interpretación: Positivo: Sup= 1/40
RICM **RICKETTSIA CONORI (FIEBRE BOTONOSA)** **ANTICUERPOS IgM, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/12 Interpretación: Positivo: Sup= 1/12
RICA **RICKETTSIA CONORI (FIEBRE BOTONOSA)** **ANTICUERPOS IgA, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/12 Interpretación: Positivo: Sup= 1/12
AGRC **RICKETTSIA CONORII (FIEBRE BOTONOSA)** **ANTICUERPOS IgG, LCR**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL LCR (1 x Tubo Polipropileno) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/2 Interpretación: Positivo: Sup= 1/2
AMRC **RICKETTSIA CONORII (FIEBRE BOTONOSA)** **ANTICUERPOS IgM, LCR**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL LCR (1 x Tubo Polipropileno) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/2 Interpretación: Positivo: Sup= 1/2
DNRM **RICKETTSIA SPP DETECCIÓN, MUESTRA BIOLÓGICA**	Reacción en cadena de la polimerasa.	6	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 1 mL Humor vitreo/acuoso (1 x Tubo estéril) [Refr.] Si la infección cursa con meningoencefalitis es posible la detección en LCR, todo y no ser la muestra recomendada.	DNA de Rickettsia (resultado): No se detecta

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
RICKMB **RICKETTSIA SPP DNA IDENTIFICACIÓN, MUESTRA BIOLÓGICA**	Técnica de secuenciación	4	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Biopsia de piel (1 x Recipiente estéril) [Refr.] Rec. 1 mL LCR (1 x Tubo Polipropileno) [Refr.]	Se informa para cada paciente
G04020 **RIESGO DE TROMBOSIS · PANEL · HOT SPOT**	Hot Spot	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	F2 [G20210A] , F5 [p.Arg306Thr] , MTHFR [C677T, A1298C] , SERPINC1 [p.Ala384Ser]
RIFAM **RIFAMPICINA (RIFALDIN,RIMACTAN), SUERO**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	9	Rec. 2 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] - Los datos de dosis (cantidad administrada, frecuencia, vía de administración)	Tras 2 horas de admistración para dosis única I.Terapéutico: 8,00 - 24,00 mg/L
G09042 **RIÑÓN Y TRACTO URINARIO, ANOMALÍAS CONGÉNITAS DEL (CAKUT) · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ACE, ACTG2, AGT, AGTR1, ANOS1, BNC2, CHD7, DSTYK, EYA1, FRAS1, FREM1, FREM2, GATA3, GLI3, GRIP1, HNF1B, HPSE2, ITGA8, KYNU, LRIG2, NPHP3, PAX2, PBX1, REN, RET, RPGRIP1L, RRM2B, SALL1, SIX5, TBX18, TRAP1, VPS33B

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
RIPR **RISPERIDONA, SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	6	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Muestra extraída en pre dosis. El contenedor recomendado es el tubo seco (sin gel separador) para evitar procesos de adsorción del fármaco. En caso de no disponer de tubo seco, la extracción se puede realizar en tubo con gel separador, separando el suero dentro de las 2 horas posteriores a la recolección y transfiriéndolo a un tubo de alícuota para su transporte al laboratorio. Rechazo: Muestra hemolizada, lipémica y/o ictérica	Intervalo terapéutico: Risperidona + Hidroxi-9-Risperidona*: 20 - 60 µg/L *Margen terapéutico según consenso europeo AGNP-TDMT Toxicidad: Sup 120 µg/L Risperidona: Límite de cuantificación: 1,00 µg/L 9 Hidroxirisperidona: Límite de cuantificación: 5,00 µg/L
QCOR **RITMO CORTISOL**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	: 3,09 - 16,66 µg/dL Cortisol 8 horas: 4,30 - 22,40 µg/dL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
RIVAR **RIVAROXABAN, PLASMA**	Técnica Cromogénica.	5	Rec. 2 mL Plasma Citrato sódico [Cong.] Congelar inmediatamente en menos de 1 hora. Información adicional imprecindible: -Fecha de inicio del tratamiento. -Dosis administrada y frecuencia. -Día y hora de la extracción y última dosis	ng/mL Este resultado debe interpretarse a la luz del contexto clínico y los detalles terapéuticos: régimen de dosificación e intervalo entre la última administración y el muestreo.
RHAN **RNA HANTAVIRUS, SUERO**	PCR-Real Time.	9	Rec. 2 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Cong.] Rec. 2 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Rec. 2 mL LCR (1 x Tubo estéril) [Cong.] Enviar la muestra en un tubo estéril en un embalaje de seguridad biológica	: No se detecta
RNHCTH **RNA VIRAL HEPATITIS C, TEJIDO HEPÁTICO**	PCR-Real Time.	6	Rec. 1 Muestra/s Tejido Hepático [Cong.]	
RNAMARB **RNA VIRUS MARBURG EN SUERO**	RT-PCR	13	Rec. 2 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Separar y congelar inmediatamente.	No se detecta
RNTOSLC **RNA VIRUS TOSCANA, LCR**	RT-PCR	12	Rec. 1 mL LCR (1 x Tubo estéril) [Cong.] Rechazo: Muestra Hemolizada	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ACRNAP3 **RNA-POLIMERASA III, ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Inmunoanálisis con detección fluorescente	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Adjuntar historia clínica resumida, diagnóstico establecido y motivo de la petición. Ayuno de 8 horas. Ayuno mínimo de 8 horas.	Negativo: Inf 7,00 U/mL Indeterminado: 7,00 - 10,00 U/mL Positivo: Sup 10,00 U/mL
ARNP **RNP (ENA I) ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunoanálisis con detección fluorescente	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 7,00 U/mL Interpretación: Indeterminado: 7,00 - 10,00 U/mL Interpretación: Positivo: Sup 10,00 U/mL
RNP68 **RNP68 (RIBONUCLEOPROTEÍNA NUCLEAR) ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunoensayo Fluorimétrico Multiplex	4	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 1 mL Plasma EDTA [Refr.]	Negativo: Inf 1,00 Índice Positivo: Sup= 1,00 Índice
RNPA **RNPa (RIBONUCLEOPROTEÍNA NUCLEAR) ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunoensayo Fluorimétrico Multiplex	4	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 1 mL Plasma EDTA [Refr.]	Negativo: Inf 1,00 Índice Positivo: Sup= 1,00 Índice
G9686 **ROBERTS, SÍNDROME DE · ESCO2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ESCO2 *1*
G08108 **ROBINOW AR, SÍNDROME DE · ROR2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ROR2 *1*
G08109 **ROBINOW-SORAUF, SÍNDROME DE · TWIST1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TWIST1 *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ACVRR **ROSS RIVER VIRUS ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	7	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/20 Interpretación: Positivo: Sup= 1/20
RNRO **ROTAVIRUS (RV) RNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	Nested-PCR.	15	Rec. 10 g Heces (1 x Recipiente estéril) [Cong.] Rec. 1 mL LCR [Cong.]	RNA Rotavirus en muestra biológica (resultado): No se detecta
ROTAG **ROTAVIRUS ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	7	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Muestra alternativa: Plasma 1 ml	Negativo
ROTA **ROTAVIRUS ANTIGENO, HECES**	Inmunocromatografía.	2	Rec. 1 mL Heces [Refr.]	Negativo
RPR **RPR SIFILIS, SUERO**	Aglutinación	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alternativa: plasma	Negativo: Inf 0,90 Indeterminado: 0,90 - 1,10 Positivo: Sup 1,10
AVIR **RUBEOLA ANTICUERPOS IgG (TEST DE AVIDEZ PARA LAS IgG), SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	IAR (I.avidez relativa): Indicativo de anticuerpos de baja avidez : Inf 40,00 % IAR (I.avidez relativa): Indicativo de anticuerpos de alta avidez: Sup 60,00 % IAR (I.avidez relativa): Intervalo dudoso: 40,00 - 60,00 % Una Baja Avidez es compatible con una infección aguda primaria. Una moderada avidez es compatible con una infección en los 6 últimos meses. Una Alta Avidez es compatible con una infección antigua.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
RUBGD **RUBEOLA ANTICUERPOS IGG, SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] No es necesario estar en ayunas.	Negativo: Inf 7,00 UI/mL Indeterminado: 7,00 - 9,99 UI/mL Positivo: Sup= 10,00 UI/mL
RUBMD **RUBEOLA ANTICUERPOS IgM, SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] No es necesario estar en ayunas.	Negativo: Inf 20,00 UA/mL Indeterminado: 20,00 - 24,99 UA/mL Positivo: Sup= 25,00 UA/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
RUBR				
RUBEOLA VIRUS (RUBV) RNA, MUESTRA BIOLÓGICA	RT-PCR	7	Rec. 1 Muestra/s Exudado faringeo (1 x Escobillón con medio de transporte para virus) [Refr.] Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Rec. 1 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Rec. 1 mL Orina (1 x Tubo estéril) [Refr.] Rec. 1 mL Líquido amniótico (1 x Tubo estéril) [Refr.] Rec. 1 mL LCR (1 x Tubo estéril) [Cong.] El tipo de muestra a estudiar estará determinado por la fase evolutiva de la infección y por el contexto clínico en el que se encuentra el paciente. - Primoinfección: Exudado faríngeo o aspirado nasofaríngeo. - Infección exantemática: Plasma-EDTA congelado, Suero congelado, Sangre total-EDTA, Orina (dentro de los 3 días desde su aparición) - Diagnóstico prenatal (infección fetal): Líquido amniótico - Rubeola congénita:	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
			Membranas corioamnióticas - Infección congénita en recién nacido: Orina - Infección del sistema nervioso: LCR	
G4130 **RUBINSTEIN-TAYBI, SÍNDROME DE · CREBBP · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CREBBP *1*
G11151 **RUBISTEIN-TAYBI, SÍNDROME · CREBBP · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CREBBP *1*
G03154 **SACAROSA-ISOMALTASA, DEFICIENCIA CONGÉNITA DE · SI · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SI *1*
SACC **SACCHAROMYCES CEREVISIAE (ASCAIgA) ANTICUERPOS IgA, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 20,00 U/mL Positivo: Sup= 20,00 U/mL
ASCG **SACCHAROMYCES CEREVISIAE (ASCAIgG) ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 20,00 U/mL Positivo: Sup= 20,00 U/mL
ASCAM **SACCHAROMYCES CEREVISIAE (ASCAIgM) ANTICUERPOS IgM, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/100 Interpretación: Positivo: Sup= 1/100
G08087 **SADDAN · FGFR3 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FGFR3 *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G08086 **SADDAN · FGFR3(p.Lys650Met) · HOT SPOT**	Hot Spot	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FGFR3 [p.Lys650Met] *1*
SAMH **S-ADENOSILHOMOCISTEINA Y S-ADENOSILMETIONINA EN ERITROCITOS, SANGRE TOTAL**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	30	Rec. 9 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Realizar la extracción de lunes a miércoles laborables, evitando vísperas de festivos. Instrucciones para la toma de muestra: - Extraer la sangre e invertir el tubo almenos 5 veces. - Centrifugar durante 10 minutos a 3000 r.p.m, - Separar el plasma de los eritrócitos - Congelar inmmediatamente ambas muestras por separado. - Enviar Sangre EDTA y plasma al laboratorio lo antes posible.	S-Adenosilhomocisteina en eritrocitos: 38,00 - 49,00 µmol/dL S-Adenosilmetionina en eritrocitos: 221,00 - 256,00 µmol/dL
G4125 **SAETHRE-CHOTZEN, SÍNDROME DE · FGFR3 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FGFR3 *1*
G08110 **SAETHRE-CHOTZEN, SÍNDROME DE · TWIST1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TWIST1 *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
DNASAL **SALMONELLA DNA, SUERO**	Reacción en cadena de la polimerasa.	15	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	No se detecta
PATA **SALMONELLA PARATYPHI A (ANTIGENO H) ANTICUERPOS, SUERO**	Hemaglutinación.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 1/160 Positivo: Sup= 1/160
PATB **SALMONELLA PARATYPHI B (ANTIGENO H) ANTICUERPOS, SUERO**	Hemaglutinación.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 1/160 Positivo: Sup= 1/160
DNSTH **SALMONELLA TYPHI DNA, HECES**	Nested-PCR.	4	Rec. 5 mL Heces [Refr.]	No se detecta
TYPH **SALMONELLA TYPHI H ANTICUERPOS, SUERO**	Hemaglutinación.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 1/160 Positivo: Sup= 1/160
TYPO **SALMONELLA TYPHI O ANTICUERPOS, SUERO**	Hemaglutinación.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 1/80 Positivo: Sup= 1/80
AGSA **SALMONELLA TYPHI Y PARATYPHI ANTICUERPOS, SUERO**	Aglutinación	3	Rec. 2 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Ac Salmonella Paratyphi A: Negativo: Inf 1/160 Ac Salmonella Paratyphi A: Positivo: Sup= 1/160 Ac Salmonella Paratyphi B: Negativo: Inf 1/160 Ac Salmonella Paratyphi B: Positivo: Sup= 1/160 Negativo: Inf 1/160 Positivo: Sup= 1/160 : Negativo: Inf 1/80 : Positivo: Sup= 1/80

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
HO **SANGRE OCULTA CUALITATIVO, HECES**	Inmunocromatografía cualitativa.	1	Rec. 1 Muestra/s Heces [Refr.]	
HO2 **SANGRE OCULTA x 2 MUESTRAS, HECES**	Inmunoanálisis	1	Rec. 1 Muestra/s Heces (1 x Kit específico) [Refr.]	Sangre oculta en heces: Negativo
HO3 **SANGRE OCULTA x 3 MUESTRAS, HECES**	Inmunoanálisis	1	Rec. 1 Muestra/s Heces (1 x Kit específico) [Refr.]	Sangre oculta en heces: Negativo
SO2 **SANGRE OCULTA CUALITATIVO x 2 MUESTRAS, HECES**	Inmunocromatografía cualitativa.	1	Rec. 2 Muestra/s Heces [Refr.]	Sangre oculta en heces (cualitativo): Negativo
SO3 **SANGRE OCULTA CUALITATIVO x 3 MUESTRAS, HECES**	Inmunocromatografía cualitativa.	1	Rec. 3 Muestra/s Heces [Refr.]	Sangre oculta en heces (cualitativo): Negativo

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
HOG **SANGRE OCULTA, HECES**	Inmunoanálisis	1	Rec. 1 Muestra/s Heces (1 x Kit específico) [Refr.] 1. Recoja las heces de una deposición en un recipiente limpio y seco. - Para la recogida de heces necesitará material específico que le suministrará el laboratorio. - No siga ninguna dieta especial, ni antes ni durante los días de la recogida de la muestra. - Es conveniente no estar en tratamiento con antibióticos. - Debe evitar la contaminación de las heces con orina o papel higiénico. - No realizar el test durante fechas de menstruación o en caso de hemorroides. - Entregar la muestra en el laboratorio el mismo día de la recogida. 2. Gire 180º el tapón verde para abrir el contenedor (código HV9999). 3. Introduzca el bastón aplicador en cuatro o cinco lugares distintos de las heces, realizando movimientos giratorios. 4. Coloque el bastón aplicador dentro del contenedor. Ciérrelo presionando	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
			procurando que quede bien cerrado. 5. Agítelo vigorosamente hacia arriba y abajo varias veces. 6. Guarde la muestra en la nevera. 7. Entregue la muestra en el laboratorio lo antes posible.	
SARAGE **SARAMPIÓN ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Para descartar infección activa hay que valorar IgM o bien seroconversión en IgG a las 3-4 semanas con incremento del índice dos veces superior como minimo. Negativo: Inf 0,90 Indice Indeterminado: 0,90 - 1,10 Indice Positivo: Sup 1,10 Indice Los niveles Indeterminado y Positivo en SARAMPION IgG pueden tambien ser expresion de INMUNIDAD ACTIVA.
SARAME **SARAMPIÓN ANTICUERPOS IgM, SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	La POSITIVIDAD en IgM puede ser compatible con INFECCION RECIENTE. Negativo: Inf 0,90 Indice Indeterminado: 0,90 - 1,10 Indice Positivo: Sup 1,10 Indice

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
SVRN **SARAMPION VIRUS RNA, MUESTRA BIOLOGICA**	RT-PCR	5	Rec. 1 Muestra/s Tejido (1 x Contenedor estéril) [Refr.] Rec. 1 mL Saliva (1 x Tubo estéril) [Cong.] Rec. 1 mL Orina (1 x Contenedor estéril) [Cong.] Rec. 1 mL LCR (1 x Tubo estéril) [Cong.] Rec. 1 mL Aspirado nasofaringeo (1 x Tubo estéril) [Cong.] Alt. 1 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 1 mL Frotis nasofaringeo (1 x Escobillón forense (libre de RNAsa, DNAsa y DNA)) [Refr.]	RNA virus Sarampión en Muestra Biológica (resultado): No se detecta
G4234 **SAVI, SÍNDROME DE · TMEM173 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TMEM173 *1*
SCCLB **SCC (ANTÍGENO DE CÉLULAS ESCAMOSAS), MUESTRA BIOLÓGICA**	Quimioluminiscencia.	7	Rec. 1 mL Líquido pleural [Refr.]	ng/mL No se dispone de valores de referencia. Valorar a criterio clínico.
SCC **SCC ANTÍGENO (CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS), SUERO**	Quimioluminiscencia.	3	Rec. 0.3 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.3 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 1,50 ng/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
SCHI **SCHISTOSOMA SPP ANTICUERPOS IgG (Bilharziosis), SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 0,80 Indeterminado: 0,80 - 1,10 Positivo: Sup 1,10 El procedimiento permite el estudio de diversas especies del género Schistosoma, incluyendo S. mansoni, S. haematobium, S. japonicum, entre otras. El diagnóstico de la infección por Schistosoma mansoni no puede basarse exclusivamente en el resultado de este procedimiento de enzimoinmunoanálisis, sino que debe interpretarse juntamente con el resto de los procedimientos complementarios y de los hallazgos clínicos.
SCHMB **SCHISTOSOMA SPP DNA IDENTIFICACIÓN, MUESTRA BIOLÓGICA**	Técnica de secuenciación	4	Rec. 1 Pieza/s Biopsia vesical (1 x Contenedor estéril) [Cong.] Rec. 1 Pieza/s Biopsia intestinal (1 x Contenedor estéril) [Cong.] Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Rec. 1 mL Orina (1 x Contenedor estéril) [Cong.] Rec. 1 g Heces (1 x Contenedor estéril) [Cong.] Rec. 1 g Esputo (1 x Contenedor estéril) [Cong.] Tubo estéril + recipiente de seguridad biológica	No se detecta

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
DNSCHI **SCHISTOSOMA SPP DNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	PCR-Real Time.	6	Alt. 1 Pieza/s Biopsia vesical (1 x Contenedor estéril) [Cong.] Alt. 1 Pieza/s Biopsia intestinal (1 x Contenedor estéril) [Cong.] Alt. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Alt. 1 mL Orina (1 x Contenedor estéril) [Cong.] Alt. 1 mL Esputo (1 x Contenedor estéril) [Cong.] Alt. 1 g Heces (1 x Contenedor estéril) [Cong.] Tubo estéril + recipiente de seguridad biológica	No se detecta	
G02053 **SCHWANNOMATOSIS 1 Y 2 · SMARCB1, LZTR1 · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	LZTR1, SMARCB1	*2*
G11124 **SCHWANOMATOSIS · NF2 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	NF2	*1*
G14094 **SCHWANOMATOSIS · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	15	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	NF2, PRKAR1A, SMARCB1	*3*
SCCBP **SCREENING CARBAPENEMASAS**	Inmunoensayo	3	Rec. 1 Muestra/s Cepa Bacteriana (1 x Escobillón con medio de transporte.) Rec. 1 Colonia/s Cepa Bacteriana (1 x Placa de cultivo)	Negativo	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
SDPE **SCREENING CUALITATIVO DE DROGAS (LC-MS/MS), CABELLO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	10	Rec. 1000 mg Cabello Procedimiento 1. Seleccionar y sujetar mediante un hilo, un mechón de pelo de grosor similar al diámetro de un lápiz (equivalente a unos 200 mg de pelo). Cuanto mayor sea el número de sustancias que se quieren detectar mayor debe ser la cantidad de pelo a enviar. 2. Cortar el mechón lo más cercano posible a la raíz del pelo de 3 cm de longitud. No se debe incluir la raíz, hay que cortar, no arrancar. La longitud mínima que debe tener el mechón de pelo cortado es de 3 cm, dado que el pelo crece aproximadamente 1 cm al mes. Anotar en la petición la longitud en cm del segmento que queda en la cabeza. 3. Colocar el mechón sobre una cartulina, papel o lámina de aluminio, de manera longitudinal. Para evitar que se deshaga el mechón, es posible sujetar el mismo con 2 horquillas o 2 clips (cada uno en un extremo). Nunca debe sujetarse mediante	

MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
		celo adhesivo. 4. Definir claramente cual es la zona del mechón más próxima a la raíz. Se indica esta zona anotando la letra "R" sobre la cartulina o papel en la parte que corresponda, a fin de facilitar el pre-tratamiento de la muestra en el laboratorio. Identificar la muestra con una etiqueta de código de barras y cumplimentar la solicitud. Introducir la cartulina en un sobre de papel. Remitirlo junto a la solicitud al laboratorio. En el caso de que sea necesaria la aplicación de una cadena de custodia, se requiere obtener una muestra de pelo de mayor cantidad (más de 200 mg) y dividir la misma en presencia del trabajador (con control de firmas en el documento de cadena de custodia) y realizar el mismo proceso de fijar las muestras en las cartulinas e introducir cada una en un sobre precintado que se remitirá al laboratorio, diferenciando claramente en cada	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
			sobre "Muestra problema" y "Custodia".	
SDST **SCREENING CUALITATIVO DE DROGAS (LC-MS/MS), SANGRE TOTAL**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 5 mL Sangre total Oxalato/Fluoruro (1 x Tubo Sangre Total-Oxalato/Fluoruro) [Refr.] Alt. 5 mL Sangre total Heparina sódica o Heparina Litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Alt. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	El screening incluye la detección de: 3,4-MDA, 3,4-MDEA, 3,4-MDMA, 6-monoacetilmorfina, 7-amino-clonazepam, 7-amino-flunitrazepam , Alprazolan, Amitriptilina, Anfetamina, Benzoilecgonina, Buprenorfina, Cannabidiol, Cannabinol, Clonazepam, Cocaetilo, Cocaina, Codeina, THC, Dextropropoxifeno, Diazepam, Difenhidramina, Escopolamina, Fenciclidina, Flunitrazepam, Ketamina, Lorazepam, LSD, Metadona, Metanfetamina, Morfina, Nordiazepam, Oxazepam, Oxicodona, Tramadol, Zolpidem Se informa para cada paciente
PIDOT **SCREENING DE INMUNODEFICIENCIA PRIMARIA**	Citometría de flujo.	7	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA)	Indicado en informe adjunto
G8001 **SCREENING Y CARACTERIZACIÓN DE SÍNDROME MIELODISPLÁSICO / MIELOPROLIFERATIVO**	Citometría de flujo.	7	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) Rec. 5 mL Médula ósea EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) Se requiere: - Se precisa resumen de la historia clínica del paciente. - En caso que proceda y si está disponible, copia del informe del caso índice familiar. Evitar remitir la muestra en fines de semana y vísperas de festivos.	Se informa para cada paciente

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G08111 **SEATHRE-CHOTZEN, SÍNDROME DE · FGFR2 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FGFR2 *1*
G08121 **SECKEL Y DWARFISMO PRIMORDIAL · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ATR, CENPJ, CEP152, CEP63, DNA2, NIN, PCNT, RBBP8, RNU4ATAC *9*
COSECSAI **SECOBARBITAL CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SALIVA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	3	Rec. 1 mL Saliva [Refr.]	Incertidumbre de medida 3 ng/mL Límite de cuantificación 25 ng/mL
COSECSTI **SECOBARBITAL CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SANGRE**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	3	Rec. 10 mL Sangre total Oxalato/Fluoruro Ác. Acético al 50% (1 x Tubo Sangre Total-Oxalato/Fluoruro) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total Heparina litio (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Tubo oxalato potásico/Fluoruro sódico Ref. SAP 600088318	Incertidumbre de medida 3 ng/mL Límite de cuantificación 25 ng/mL
G00130 **SECUENCIACIÓN EXOMA COMPLETO + GENOMA MITOCONDRIAL TRÍO - Sin informe**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	15	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Indicado en informe adjunto
G00011 **SECUENCIACIÓN EXOMA COMPLETO - Sin informe**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	15	Rec. 4 mL Sangre total (1 x Tubo sangre EDTA (2 tubos)) [Refr.]	
G00128 **SECUENCIACION EXOMA COMPLETO + GENOMA MITOCONDRIAL - Sin informe**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	15	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Indicado en informe adjunto

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G00129 **SECUENCIACIÓN EXOMA COMPLETO + GENOMA MITOCONDRIAL DÚO - Sin informe**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	15	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Indicado en informe adjunto
G00126 **SECUENCIACIÓN EXOMA COMPLETO DÚO - Sin informe**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	15	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Indicado en informe adjunto
G00127 **SECUENCIACIÓN EXOMA COMPLETO TRÍO - Sin informe**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	15	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Indicado en informe adjunto
G00078 **SECUENCIACIÓN GENOMA - Sin informe**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	20	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	
G00124 **SECUENCIACIÓN ONCO GERMINAL - Sin informe**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	15	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Indicado en informe adjunto
G00079 **SECUENCIACIÓN SANGER 1 - 3 AMPLICONES · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	
G00137 **SECUENCIACIÓN SANGER 1 AMPLICON · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA (2 tubos)) [Refr.]	
G00146 **SECUENCIACIÓN SANGER 10 AMPLICONES · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA (2 tubos)) [Refr.]	
G00147 **SECUENCIACIÓN SANGER 11 AMPLICONES · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA (2 tubos)) [Refr.]	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G00148 **SECUENCIACIÓN SANGER 12 AMPLICONES · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA (2 tubos)) [Refr.]	
G00111 **SECUENCIACIÓN SANGER 13 - 25 AMPLICONES · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	
G00149 **SECUENCIACIÓN SANGER 13 AMPLICONES · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA (2 tubos)) [Refr.]	
G00150 **SECUENCIACIÓN SANGER 14 AMPLICONES · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA (2 tubos)) [Refr.]	
G00151 **SECUENCIACIÓN SANGER 15 AMPLICONES · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	
G00152 **SECUENCIACIÓN SANGER 18 AMPLICONES · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA (2 tubos)) [Refr.]	
G00138 **SECUENCIACIÓN SANGER 2 AMPLICONES · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA (2 tubos)) [Refr.]	
G00153 **SECUENCIACIÓN SANGER 25 AMPLICONES · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA (2 tubos)) [Refr.]	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G00139 **SECUENCIACIÓN SANGER 3 AMPLICONES · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA (2 tubos)) [Refr.]	
G00154 **SECUENCIACIÓN SANGER 35 AMPLICONES · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	
G00080 **SECUENCIACIÓN SANGER 4 - 8 AMPLICONES · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA (2 tubos)) [Refr.]	
G00140 **SECUENCIACIÓN SANGER 4 AMPLICONES · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA (2 tubos)) [Refr.]	
G00141 **SECUENCIACIÓN SANGER 5 AMPLICONES · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA (2 tubos)) [Refr.]	
G00142 **SECUENCIACIÓN SANGER 6 AMPLICONES · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA (2 tubos)) [Refr.]	
G00143 **SECUENCIACIÓN SANGER 7 AMPLICONES · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA (2 tubos)) [Refr.]	
G00144 **SECUENCIACIÓN SANGER 8 AMPLICONES · SANGER**	Secuenciación NGS + Sanger	25	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA (2 tubos)) [Refr.]	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G00081 **SECUENCIACIÓN SANGER 9 - 12 AMPLICONES · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA (2 tubos)) [Refr.]	
G00145 **SECUENCIACIÓN SANGER 9 AMPLICONES · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA (2 tubos)) [Refr.]	
SOFJ **SELENIO (FINAL JORNADA LABORAL), ORINA**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	5	Rec. 2 mL Orina final jornada [Refr.]	Selenio en orina de final de jornada: Valor biológico de tolerancia - BAT (MAK&BAT): Final de la jornada laboral (Selenio y compuestos inorgánicos) Inf 30,00 µg/g crea
AGSE **SELENIO, AGUA**	Absorción atómica.	15	Rec. 100 mL Agua (1 x Envase aséptico) [Refr.] Alt. 100 mL Agua (1 x Envase aséptico) (<2 Ác.nítrico)	Agua de diálisis Inf 0,09 mg/L Agua de red Inf 0,01 mg/L
SELOR **SELENIO, ORINA**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	5	Rec. 10 mL Orina 24h. (alícuota) [Refr.]	Inf 160,00 µg/24h Toxicidad Sup 400,00 µg/24h
SESG **SELENIO, SANGRE TOTAL**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	4	Rec. 1 mL Sangre total EDTA Dipotásico (libre trazas metales) (1 x Tubo Sangre EDTA metales traza) [Refr.]	100,00 - 340,00 µg/L Límite de cuantificación 2,60 µg/L
SE **SELENIO, SUERO**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	4	Rec. 1 mL Suero (libre trazas metales) (1 x Tubo Suero metales traza) [Refr.]	65,00 - 120,00 ug/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
SEBA **SEMINOGRAMA BÁSICO**	Microscopia.	6	Rec. 3 mL Semen Recogida de esperma: Preparación de la muestra para envío a laboratorio: MATERIAL: - Refrigeratium Medium (Cód.: 007114)- El reactivo se sirve en viales de 5 mL. Una vez abierto, se debe alicuotar en tubos 0,5 mL y congelar las alícuotas a -10ºC de manera inmediata. - Tubos estériles para alícuotas (Cód.: LT0032) tapones (Cód: 014799) - Pipetas (Cód.: LD0089) de 1 mL PROCESADO DE LA MUESTRA: 1. Descongelar una alícuota de Refrigeration Medium a Tª ambiente. 2. Mezclar suavemente la muestra de semen remitida y añadir 0,5 mL al tubo de Refrigeration Medium. 3. Mezclar suavemente para homogenizar. 4. Es imprescindible enviar conjuntamente al laboratorio a Tª ambiente la alícuota preparada y el resto del eyaculado, en el mismo	

MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
		bote donde lo recogió el paciente. La muestra así tratada tiene una estabilidad de 6-8 horas. Si el paciente solicita las determinaciones de Seminograma y Fragmentación espermática, la recolección de las muestras deben ser de dos tomas por separado, respetando las condiciones pre-analíticas entre ambas tomas. No recepcionar muestras los sábados, vísperas de festivo y festivos - La muestra se debe obtener en un contenedor estéril que cierre bien (solicitar al laboratorio/obtener en farmacia) - El paciente debe guardar entre 3-7 días de abstinencia hasta el día de la toma. - Para los análisis postvasectomía, antes de recoger la muestra es necesario haber tenido como mínimo de veinte a treinta eyaculaciones después de la intervención quirúrgica. Pauta para la recogida: 1. Recoger todo el eyaculado por masturbación manual y directamente en el	

MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
		contenedor estéril. 2. No será válida la obtención de la muestra mediante el uso de preservativos, coitus interruptus o cualquier otra forma de estimulación. 3. No conserven el contenedor con la muestra en la nevera. 4. El contenedor se debe mantener tapado y entregar en posición vertical en el laboratorio, dentro de la primera hora después de la obtención de la muestra.	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
SEMA **SEMINOGRAMA COMPLETO (ZINC, FRUCTOSA Y LEUCOCITOS)**	Microscopia.	6	Rec. 3 mL Semen Recogida de esperma: Preparación de la muestra para envío a laboratorio: MATERIAL: - Refrigeratium Medium (Cód.: 007114)- El reactivo se sirve en viales de 5 mL. Una vez abierto, se debe alicuotar en tubos 0,5 mL y congelar las alícuotas a -10ºC de manera inmediata. - Tubos estériles para alícuotas (Cód.: LT0032) tapones (Cód: 014799) - Pipetas (Cód.: LD0089) de 1 mL PROCESADO DE LA MUESTRA: 1. Descongelar una alícuota de Refrigeration Medium a Tª ambiente. 2. Mezclar suavemente la muestra de semen remitida y añadir 0,5 mL al tubo de Refrigeration Medium. 3. Mezclar suavemente para homogenizar. 4. Es imprescindible enviar conjuntamente al laboratorio a Tª ambiente la alícuota preparada y el resto del eyaculado, en el mismo	

MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
		bote donde lo recogió el paciente. La muestra así tratada tiene una estabilidad de 6-8 horas. Si el paciente solicita las determinaciones de Seminograma y Fragmentación espermática, la recolección de las muestras deben ser de dos tomas por separado, respetando las condiciones pre-analíticas entre ambas tomas. No recepcionar muestras los sábados, vísperas de festivo y festivos - La muestra se debe obtener en un contenedor estéril que cierre bien (solicitar al laboratorio/obtener en farmacia) - El paciente debe guardar entre 3-7 días de abstinencia hasta el día de la toma. - Para los análisis postvasectomía, antes de recoger la muestra es necesario haber tenido como mínimo de veinte a treinta eyaculaciones después de la intervención quirúrgica. Pauta para la recogida: 1. Recoger todo el eyaculado por masturbación manual y directamente en el	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
			contenedor estéril. 2. No será válida la obtención de la muestra mediante el uso de preservativos, coitus interruptus o cualquier otra forma de estimulación. 3. No conserven el contenedor con la muestra en la nevera. 4. El contenedor se debe mantener tapado y entregar en posición vertical en el laboratorio, dentro de la primera hora después de la obtención de la muestra.	
SEMR **SEMINOGRAMA REM PRE Y POST**	Microscopia.	1	Rec. 2 mL Semen	
G01164 **SENO ENFERMO, SÍNDROME DE · SCN5A · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SCN5A *1*
MOFLAG **SEROLOGIA MOSAICO FLAVIVIRUS IgG (IFI), SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	17	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Enviar la muestra en un tubo estéril en un embalaje de seguridad biológica	Interpretación: Negativo

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
MOFLAM **SEROLOGIA MOSAICO FLAVIVIRUS IgM, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	17	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Enviar la muestra en un tubo estéril en un embalaje de seguridad biológica	Interpretación: Negativo
SEOR **SEROTONINA (5 HIDROXITRIPTAMINA), ORINA**	Enzimoinmunoanálisis	10	Rec. 5 mL Orina 24h. (alícuota) (1 x Contenedor 2500 mL.) [Refr.] Imprescindible preservar la orina añadiendo 10-15 mL 6 M de HCl (ácido cloríhidrico). Proteger de la luz directa. 3 - 4 días antes de la toma de muestra evitar alimentos que contengan serotonina:ciruelas, piña, plátanos, tomates, nueces, kiwis, uvas, berenjenas y comida vegetal..	Excreción (24h): 9,00 - 193,00 µg/24 h Volumen de orina remitido (diuresis): 600,00 - 1600,00 mL
SERO **SEROTONINA (5 HIDROXITRIPTAMINA), SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	5	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] 3 - 4 días antes de la toma de muestra evitar alimentos que contengan serotonina:ciruelas, piña, plátanos, tomates, nueces, kiwis, uvas, berenjenas y comida vegetal.	20,00 - 206,00 ng/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
SERO17 **SEROTONINA 17 HORAS, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	5	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	
SER **SERTRALINA, SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	7	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis. El contenedor recomendado es el tubo seco (sin gel separador) para evitar procesos de adsorción del fármaco. En caso de no disponer de tubo seco, la extracción se puede realizar en tubo con gel separador, separando el suero dentro de las 2 horas posteriores a la recolección y transfiriéndolo a un tubo de alícuota para su transporte al laboratorio. Congelar antes de 4 horas desde la extracción Rechazo: Muestra hemolizada, lipémica y/o ictérica	I.Terapéutico: 10,00 - 150,00 µg/L Toxicidad: Sup 290,00 µg/L Límite de cuantificación: 3,00 µg/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
SF **SEXO FETAL EN SANGRE MATERNA**	PCR-Real Time.	7	Rec. 20 mL Sangre total (2 x Tubo Streck Cell-Free DNA BCT) Realizar a partir de la 10ª semana de embarazo (Sensibilidad del 99 %). No es necesario estar en ayunas. Adjuntar peticionario y consentimiento informado (MP_RML-23)	Se informa para cada paciente *1* [SRY]
SFLT1 **SFLT-1 (TIROSINA QUINASA 1 SOLUBLE TIPO FMS), SUERO**	TRACE	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Realizar a partir de la 14 semana de embarazo.	15-19 semanas gestación 764,00 - 2545,00 pg/mL 20-24 semanas gestación 626,00 - 4443,00 pg/mL 25-28 semanas gestación 612,00 - 3958,00 pg/mL 29-33 semanas gestación 697,00 - 3722,00 pg/mL 34-36 semanas gestación 1023,00 - 8492,00 pg/mL 37 semanas gestación - parto 961,00 - 7524,00 pg/mL
GOT **SGOT (ASAT), SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Hombres Inf 35,00 U/L Mujeres Inf 31,00 U/L
GPT **SGPT (ALAT), SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Hombres Inf 45,00 U/L Mujeres Inf 34,00 U/L
SHBG **SHBG (GLOBULINA PORTADORA DE HORMONA SEXUAL), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Se requiere la semana de gestación.	Hombres 13,50 - 71,40 nmol/L Mujeres 19,80 - 155,20 nmol/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ACSHIGG **SHIGELLA ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	8	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/320 Interpretación: Positivo: Sup= 1/320
ACSHIGM **SHIGELLA ANTICUERPOS IgM, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	8	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/10 Interpretación: Positivo: Sup= 1/10
G01094 **SHPRITZEN-GOLBERG, SÍNDROME DE · SKI · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SKI *1*
G04059 **SHWACHMAN-DIAMOND, SÍNDROME DE · SBDS · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SBDS *1*
SIALO **SIALOTRANSFERRINAS ISOFORMAS, SUERO**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	30	Rec. 3 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	Indicado en informe adjunto
SIGNFSM **SIGNATERA™. Test de Enfermedad Residual Molecular (ERM)**	Secuenciación NGS + Biopsia líquida	21	Rec. 6 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) Rec. 10 mL Plasma (2 x Tubo Streck Cell-Free DNA BCT) Rec. 1 Muestra/s Tejido parafinado (1 x Portaobjetos) Kit e instrucciones específicos para la toma de muestras que proporciona el laboratorio. Coordinar previamente toma y envío de muestras con el laboratorio.	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
AGSILI **SILICE, AGUA**	Absorción atómica.	5	Rec. 100 mL Agua (1 x Envase aséptico) [Refr.]	mg/L No establecido.	
SISA **SILICIO, SANGRE TOTAL**	Absorción atómica.	7	Rec. 3 mL Sangre total Heparina litio (1 x Tubo sangre heparina) [Refr.] Rec. 3 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	190,00 - 470,00 µg/L	
G03112 **SILVER-RUSSELL POR DISOMÍA UNIPARENTAL MATERNA DEL CROMOSOMA 7, SÍNDROME DE · MS-MLPA**	MS-MLPA (Metilación específica-MLPA)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CLIC5, DMP1, ENPP1, FGF23, PHEX	*5*
G03114 **SILVER-RUSSELL Y DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES, SÍNDROME DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ATR, BLM, BMP2, CCDC8, CDC6, CDT1, CENPJ, CEP152, CEP63, CREBBP, CUL7, DHCR7, DNA2, EP300, FGD1, FGFR3, GHR, GHRHR, GLI2, HESX1, IGF1, IGF1R, INSR, KRAS, LHX3, LHX4, MCM5, NBN, NIN, NIPBL, OBSL1, ORC1, ORC4, ORC6, OTX2, PIK3R1, PITX2, POC1A, POU1F1, PROP1, PTPN11, RAF1, SHH, SMC1A, SOS1, SOX3, SRCAP, STAT5B, TBX19, TBX3, TRIM37, ZIC2	*52*
G03107 **SILVER-RUSSELL, SÍNDROME DE · 11p15 · MS-MLPA**	MS-MLPA (Metilación específica-MLPA)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	[11p15]	*1*
G11247 **SIMPSON-GOLABI-BEHMEL TIPO 1, SÍNDROME DE · GPC3 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GPC3	*1*
G03130 **SIMPSON-GOLABI-BEHMEL, SÍNDROME DE · GPC3, GPC4 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GPC3, GPC4	*2*
G08135 **SINDACTILIA TIPO V · HOXD13 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	HOXD13	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G01148 **SÍNDROME CARDIO-FACIO-CUTÁNEO · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BRAF, KRAS, MAP2K1, MAP2K2	*4*
G09016 **SÍNDROME DE ALPORT - PANEL - NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	40	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	COL4A3, COL4A4, COL4A5	*3*
G09058 **SÍNDROME HEMOLÍTICO URÉMICO · PERFIL · NGS + MLPA + HAPLOTIPOS DE RIESGO**	Secuenciación NGS + MLPA	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ADAMTS13, C3, CD46, CD46 [(rs2796247, rs2796268, rs1962149, rs859705, rs7144)] , CFB, CFH, CFH, CFH [(rs3753394, rs3753396, rs1065489, rs800292, rs1061170)] , CFHR1, CFHR1, CFHR2, CFHR2, CFHR3, CFHR3, CFHR4, CFHR4, CFHR5, CFHR5, CFI, CFP, DGKE, MMACHC, THBD	*23*
G13043 **SÍNDROME MIELODISPLÁSICO (SMD) · PANEL · FISH**	Panel FISH	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	Se informa para cada paciente CUL1 [7q36] , EGR1 [5q31] , KMT2E [7q22] , MLL [11q23] , PTPRT [20q12] , RSP14 [5q33] , RUNX1(AML1)/RUNX1T1(ETO) [t(8;21)(q21;q22.1)] , TP53 [17p13]	*8*
G17019 **SÍNDROME MUCKLE-WELLS · NLRP3 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	NLRP3	*1*
G08124 **SÍNDROME UÑA-RÓTULA · LMX1B · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	LMX1B	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G11170 **SÍNDROMES CON MICROCEFALIA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AKT3, AP4M1, ARFGEF2, ATRX, BUB1B, CASK, CDKL5, CEP57, COX7B, DHCR7, DIAPH1 , DNM1L, DYRK1A , EFTUD2, EIF2S3, FOXG1 , IER3IP1 , KIAA1279, KIF11, LIG4, MBD5, MECP2, MED17, MFF, MIR17HG, MRE11A, MSMO1, MYCN, NBN, NDE1, NHEJ1, NIPBL, OPHN1, PAFAH1B1, PNKP, POMT1, PQBP1, RTTN, SLC25A19, SLC9A6, STAMBP, TCF4 , TRAPPC9, UBE3A , WWOX, XRCC4, ZEB2 *47*
G08088 **SINOSTOSIS ESPONDILOCARPOTARSAL, SÍNDROME DE · FLNB · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FLNB *1*
RAPA **SIROLIMUS - RAPAMICINA, SANGRE TOTAL**	Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectrometría de masas.	4	Rec. 3 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis.	Trasplante corazón-MPA comedicación inh.calcineurina-glucocorticoides: 5,00 - 8,00 ng/mL Trasplante hepático: 3,00 - 6,00 ng/mL Trasplante renal - MPA comedicación con Tacrolimus 12,00 - 20,00 ng/mL Trasplante renal- combinación con esteroides sin micofenolato de mofetilo: 8,00 - 12,00 ng/mL Trasplante renal- combinación con esteroides y micofenolato de mofetilo: 5,00 - 10,00 ng/mL Trasplante renal-MPA comedicación con Ciclosporina A 4,00 - 12,00 ng/mL Límite de cuantificación: 2,00 ng/mL Nota: En fecha 12 de mayo de 2025, el kit comercial utilizado para el análisis de los niveles de inmunosupresores ha sido sustituido. Se recomienda tener en cuenta este cambio en la interpretación de los resultados analíticos, a fin de garantizar un seguimiento clínico adecuado de los pacientes.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G15212 **SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (CNS)-GLIOMA EXTENDIDO, NEOPLASIA DE · PANEL · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	12	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	Se informa para cada paciente *68* ALK, ATF1, ATRX, BCOR, BRAF, C11ORF95, CDKN2A, CDKN2B, CREB1, CTNNB1, DICER1, EGFR, ETV1, EWSR1, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FOXR2, FUBP1, FUS, GNA11, GNAQ, H3F3A, HIST1H3B, HIST1H3C, HIST3H3, IDH1, IDH2, KDM6A, KIAA1549, KLF4, MAML2, MET, MN1, MSI, MYB, MYBL1, MYCN, NAB2, NF1, NF2, NOTCH1, NRAS, NTRK1, NTRK2, NTRK3, PDGFRA, PIK3CA, PTCH1, PTEN, pTERT, RELA, ROS1, SMARCA4, SMARCB1, SMO, STAT6, SUFU, TACC1, TACC2, TACC3, TERT, TMB, TP53, TSC1, TSC2, YAP1, ZFTA
G15217 **SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (CNS)-GLIOMA, NEOPLASIA DE · PERFIL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	7	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	Se informa para cada paciente ATRX, BRAF, CDKN2B, CTNNB1, EGFR, FGFR1, GNA11, H3F3A, HIST1H3B, IDH1, IDH2, MET, MGMT, MYCN, PDGFRA, PTEN, TERT, TP53
G02056 **SJOGREN-LARSSON, SÍNDROME · ALDH3A2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA (2 tubos)) [Refr.]	ALDH3A2 *1*
ASM **SM (ENA I) ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunoanálisis con detección fluorescente	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	El procedimiento detecta anticuerpos contra los péptidos SmD3 Interpretación: Negativo: Inf 7,00 U/mL Interpretación: Indeterminado: 7,00 - 10,00 U/mL Interpretación: Positivo: Sup 10,00 U/mL
G11308 **SMITH-LEMLI OPITZ, SÍNDROME DE · DHCR7 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Se informa para cada paciente *1* DHCR7
G4230 **SMITH-LEMLI OPITZ, SÍNDROME DE · DHCR7 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	DHCR7 *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G1050 **SMITH-MAGENIS, SÍNDROME · 17p11 · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	[17p11] *1*
G11197 **SMITH-MAGENIS, SÍNDROME · 17p11.2 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	[17p11.2] *1*
G03074 **SOBRECRECIMIENTO · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AKT1, AKT3, CDKN1C, CUL4B, DIS3L2, DNMT3A, EZH2, GLI3, GPC3, KPTN, MED12, NFIX, NPR2, NSD1, PDGFRB, PHF6, PIK3R2, PTEN, SETD2 , SPRED1, UPF3B *21*
NAOR **SODIO EN ORINA DE MICCIÓN (CONCENTRACIÓN)**	Electrodo Selectivo de Iones.	1	Rec. 10 mL Orina [Refr.]	mEq/L Interpretación según criterio clínico
AGNA **SODIO, AGUA**	Absorción atómica.	15	Rec. 100 mL Agua (1 x Envase aséptico) [Refr.] Alt. 100 mL Agua (1 x Envase aséptico) (<2 Ác.nítrico)	Agua de diálisis Inf= 50,00 mg/L Agua de red Inf= 200,00 mg/L
NALB **SODIO, LÍQUIDO BIOLÓGICO**	Electrodo Selectivo de Iones.	1	Rec. 1 mL Líquido biológico [Refr.]	mEq/L No se dispone de valores de referencia. Valorar a criterio clínico.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
NAO **SODIO, ORINA 24H**	Electrodo Selectivo de Iones.	1	Rec. 1 mL Orina 24h. (alícuota) (1 x Contenedor 2500 mL.) [Refr.]	Excreción (24h): 40,00 - 220,00 mEq/24h
NA **SODIO, SUERO**	Electrodo Selectivo de Iones.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	136,00 - 146,00 mEq/L
SOMA20 **SOMATOMEDINA C (IGF I) (20'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	3	Rec. 1 mL Suero 20 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
SOMA30 **SOMATOMEDINA C (IGF I) (30'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	3	Rec. 1 mL Suero 30 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
SOMA45 **SOMATOMEDINA C (IGF I) (45'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	3	Rec. 1 mL Suero 45 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
SOMA60 **SOMATOMEDINA C (IGF I) (60'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	3	Rec. 1 mL Suero 60 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
SOMA90 **SOMATOMEDINA C (IGF I) (90'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	3	Rec. 1 mL Suero 90 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
SOMA120 **SOMATOMEDINA C (IGF I) (120'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	3	Rec. 1 mL Suero 120 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
SOMA180 **SOMATOMEDINA C (IGF I) (180'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	3	Rec. 1 mL Suero 180 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	ng/mL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
SOMA **SOMATOMEDINA C (IGF I), SUERO**	Quimioluminiscencia.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	Hombres 0 - 5 Años 11,00 - 233,00 ng/mL Mujeres 0 - 5 Años 8,00 - 251,00 ng/mL Hombres 6 - 8 Años 17,00 - 347,00 ng/mL Mujeres 6 - 8 Años 24,00 - 396,00 ng/mL Mujeres 9 - 11 Años 49,00 - 549,00 ng/mL Hombres 9 - 11 Años 23,00 - 459,00 ng/mL Mujeres 12 - 15 Años 90,00 - 596,00 ng/mL Hombres 12 - 15 Años 49,00 - 520,00 ng/mL Hombres 16 - 20 Años 119,00 - 511,00 ng/mL Mujeres 16 - 20 Años 109,00 - 524,00 ng/mL Mujeres 21 - 24 Años 102,00 - 351,00 ng/mL Hombres 21 - 24 Años 105,00 - 364,00 ng/mL Hombres 25 - 29 Años 84,00 - 283,00 ng/mL Mujeres 25 - 29 Años 91,00 - 311,00 ng/mL Mujeres 30 - 39 Años 78,00 - 290,00 ng/mL Hombres 30 - 39 Años 82,00 - 246,00 ng/mL Hombres 40 - 49 Años 69,00 - 237,00 ng/mL Mujeres 40 - 49 Años 59,00 - 271,00 ng/mL Mujeres 50 - 59 Años 44,00 - 240,00 ng/mL Hombres 50 - 59 Años 55,00 - 225,00 ng/mL Mujeres Sup - 60 Años 17,00 - 241,00 ng/mL Hombres Sup - 60 Años 17,00 - 206,00 ng/mL
SOMATR **SOMATOMEDINA C (IgF-1) TRAS REPOSO, SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero [Cong.]	ng/mL Interpretación según criterio clínico
SOMAT **SOMATOSTATINA, PLASMA**	Radioinmunoanálisis.	16	Rec. 5 mL Plasma EDTA Aprotinina (1 x Tubo Sangre EDTA Aprotinina) [Cong.] Separar y congelar inmediatamente.	Inf 16,00 pmol/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
FFOCUS **SONDA ÚNICA (FISH FOCUSED) · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	20	Rec. 5 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 Muestra/s Material fijado de cultivo celular. [Refr.] 1.- Solicitar informe del caso índice o fórmula de array indicando la plataforma con la que se ha realizado el estudio. En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo. 2.- Contactar con el laboratorio con la información anterior, para poder indicar si existe disponibilidad de sonda para la región de estudio. 3.- En caso que se confirme disponibilidad de sonda y se acceda al estudio por parte del cliente: Es necesaria muestra de sangre total heparina de ambos progenitores y del caso índice (se utilizará como control) identificadas por separado, cada muestra con su referencia. ATENCIÓN: la estabilidad de estas muestras es de 4 días refrigeradas. Si no es posible, se pueden	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
			enviar las muestras fijadas de los cultivos celulares de las sangres. Es indispensable obtener metafases para este tipo de estudio.		
G16040 **SORDERA 16, 22, SÍNDROME SORDERA E INFERTILIDAD · PANEL · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CATSPER1, OTOA, STRC	*3*
G16009 **SORDERA AD 2B · GJB3 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GJB3	*1*
G16010 **SORDERA AD 3A · GJB2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GJB2	*1*
G16011 **SORDERA AD 3B · GJB6 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GJB6	*1*
G16012 **SORDERA AD 6/14/38 · WFS1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	WFS1	*1*
G16013 **SORDERA AD CON NEUROPATÍA · GJB3 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GJB3	*1*
G16014 **SORDERA AR · GJB3 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GJB3	*1*
G16015 **SORDERA AR 1A · GJB2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GJB2	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G16016 **SORDERA AR 1B · GJB6 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GJB6	*1*
G16037 **SORDERA AR 77 · LOXHD1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	LOXHD1	*1*
G16038 **SORDERA DIGÉNICA · GJB2, GJB3, GJB6 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GJB2, GJB3, GJB6	*3*
G16034 **SORDERA DIGÉNICA · PANEL · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GJB2, GJB3, GJB6	*3*
G16033 **SORDERA HEREDITARIA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GJB2, GJB6, OTOF	*3*
G16029 **SORDERA NEUROSENSORIAL NO SINDRÓMICA AUTOSÓMICA RECESIVA · OTOF · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	OTOF	*1*
G16031 **SORDERA NO SINDRÓMICA · PANEL · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GJB2, GJB3, GJB6, POU3F4, WFS1	*5*
G16039 **SORDERAS DE ORIGEN MITOCONDRIAL · mtDNA · HOT SPOT**	Hot Spot	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	mtDNA [1494 C>T; 1555 A>G; 3243 A>G; 3388 C>A; 4295 A>G; 7443 A>G; 7444 G>A (*); 7445 A>G/C/T; 7472 insC; 7510 T>C; 7511 T>C; 8108 A>G; 8296 A>G; 12201 T>C; 12236 G>A; 14340 C>T]	*1*
G16019 **SORDERAS NO SÍNDRÓMICAS AD · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ACTG1, BDP1, CCDC50, CEACAM16, COCH, COL11A2, CRYM, DFNA5, DIABLO, DIAPH1 , DIAPH3, DSPP, ESPN, EYA4, GJB2, GJB3, GJB6, GRHL2, HOMER2, KCNQ4, KITLG, MET, MIR96, MYH14, MYH9, MYO1A, MYO6, MYO7A, P2RX2, POU4F3, SIX1, SLC17A8, TBC1D24, TECTA, TMC1, TNC, WFS1	*37*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G16020 **SORDERAS NO SINDRÓMICAS AMPLIADO · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ACTG1, AIFM1, BDP1, BSND, CABP2, CCDC50, CDH23, CEACAM16, CIB2, CLDN14, COCH, COL11A2, COL4A6, CRYM, DCDC2, DFNA5, DFNB31, DFNB59, DIABLO, DIAPH1 , DIAPH3, DSPP, ESPN, ESRRB, EYA4, FOXI1, GIPC3, GJB2, GJB3, GJB6, GPSM2, GRHL2, GRXCR1, HGF, HOMER2, ILDR1, KARS, KCNJ10, KCNQ4, KITLG, LHFPL5, LOXHD1, LRTOMT, MARVELD2, MET, MIR96, MSRB3, MYH14, MYH9, MYO15A, MYO1A, MYO3A, MYO6, MYO7A, NARS2, OTOA, OTOF, OTOG, OTOGL, P2RX2, PCDH15, PNPT1, POU3F4, POU4F3, PRPS1, PTPRQ, RDX, SERPINB6, SIX1, SLC17A8, SLC26A4, SLC26A5, SMPX, STRC, TBC1D24, TECTA, TJP2, TMC1, TMIE, TMPRSS3, TNC, TPRN, TRIOBP, TSPEAR, USH1C, WFS1	*86*
G16021 **SORDERAS NO SINDRÓMICAS AR · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BDP1, BSND, CABP2, CDH23, CIB2, CLDN14, COL11A2, DCDC2, DFNB31, DFNB59, DIAPH3, ESPN, ESRRB, FOXI1, GIPC3, GJB2, GJB3, GJB6, GPSM2, GRHL2, GRXCR1, HGF, ILDR1, KARS, KCNJ10, LHFPL5, LOXHD1, LRTOMT, MARVELD2, MET, MSRB3, MYO15A, MYO3A, MYO6, MYO7A, NARS2, OTOA, OTOF, OTOG, OTOGL, PCDH15, PNPT1, PTPRQ, RDX, SERPINB6, SLC26A4, SLC26A5, STRC, TBC1D24, TECTA, TJP2, TMC1, TMIE, TMPRSS3, TPRN, TRIOBP, TSPEAR, USH1C, WFS1	*59*
G16022 **SORDERAS NO SINDRÓMICAS LX · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AIFM1, COL4A6, POU3F4, PRPS1, SMPX	*5*
G16023 **SORDERAS SINDRÓMICAS · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABHD12, ALMS1, ANKH, ATP6V1B1, BCS1L, BSND, CACNA1D, CD151, CDH23, CDKN1C, CHD7, CHSY1, CIB2, CLRN1, COL11A1, COL11A2, COL2A1, COL4A3, COL4A4, COL4A5, COL4A6, COL9A1, COL9A2, COL9A3, DFNB31, DLX5, EDN3, EDNRB, EYA1, FGF3, FOXI1, GATA3, GPR98, HARS, HOXB1, KCNE1, KCNJ10, KCNQ1, LRP2, MANBA, MITF, MYH9, MYO7A, NDP, NLRP3, PAX3, PCDH15, PDZD7, POLR1C, POLR1D, PTRH2, SEMA3E, SIX1, SIX5, SLC19A2, SLC26A4, SNAI2, SOX10, TCOF1, TFAP2A, TIMM8A, TYR, USH1C, USH1G, USH2A, VCAN, WFS1	*67*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G16024 **SORDERAS SÍNDROMICAS Y NO SINDRÓMICAS · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABHD12, ACTG1, ADGRV1, AIFM1, ALMS1, ANKH, ATP6V1B1, BCS1L, BDP1, BSND, CABP2, CACNA1D, CCDC50, CD151, CDH23, CDKN1C, CEACAM16, CHD7, CHSY1, CIB2, CLDN14, CLRN1, COCH, COL11A1, COL11A2, COL2A1, COL4A3, COL4A4, COL4A5, COL4A6, COL9A1, COL9A2, COL9A3, CRYM, DCDC2, DFNA5, DFNB59, DIABLO, DIAPH1 , DIAPH3, DLX5, DSPP, EDN3, EDNRB, ESPN, ESRRB, EYA1, EYA4, FGF3, FOXI1, GATA3, GIPC3, GJB2, GJB3, GJB6, GPSM2, GRHL2, GRXCR1, HARS, HGF, HOMER2, HOXB1, ILDR1, KARS, KCNE1, KCNJ10, KCNQ1, KCNQ4, KITLG, LHFPL5, LOXHD1, LRP2, LRTOMT, MANBA, MARVELD2, MET, MIR96, MITF, MSRB3, MYH14, MYH9, MYO15A, MYO1A, MYO3A, MYO6, MYO7A, NARS2, NDP, NLRP3, OTOA, OTOF, OTOG, OTOGL, P2RX2, PAX3, PCDH15, PDZD7, PNPT1, POLR1C, POLR1D, POU3F4, POU4F3, PRPS1, PTPRQ, PTRH2, RDX, SEMA3E, SERPINB6, SIX1, SIX5, SLC17A8, SLC19A2, SLC26A4, SLC26A5, SMPX, SNAI2, SOX10, STRC, TBC1D24, TCOF1, TECTA, TFAP2A, TIMM8A, TJP2, TMC1, TMIE, TMPRSS3, TNC, TPRN, TRIOBP, TSPEAR, TYR, USH1C, USH1G, USH2A, VCAN, WFS1, WHRN	*138*
G03075 **SOTOS 1 Y 2, SÍNDROME DE · NSD1, NFIX · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	NFIX, NSD1	*2*
G03076 **SOTOS 1, SÍNDROME DE · NSD1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	NSD1	*1*
G03077 **SOTOS 2, SÍNDROME DE · NFIX · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	NFIX	*1*
ADNAS **SS/DNA ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunoanálisis con detección fluorescente	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Para el diagnóstico y seguimiento de LES se recomienda solicitar los anticuerpos anti DNA de cadena doble en lugar de los anticuerpos anti DNA de cadena simple. Interpretación: Negativo: Inf 7,00 U/mL Interpretación: Indeterminado: 7,00 - 10,00 U/mL Interpretación: Positivo: Sup 10,00 U/mL	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
SSA **SSA/RO (ENA II) ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunoanálisis con detección fluorescente	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] No es necesario estar en ayunas.	Interpretación: Negativo: Inf 7,00 U/mL Interpretación: Indeterminado: 7,00 - 10,00 U/mL Interpretación: Positivo: Sup 10,00 U/mL
SSB **SSB/LA (ENA II) ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunoanálisis con detección fluorescente	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] No es necesario estar en ayunas.	Interpretación: Negativo: Inf 7,00 U/mL Interpretación: Indeterminado: 7,00 - 10,00 U/mL Interpretación: Positivo: Sup 10,00 U/mL
G11248 **SSIMPSON-GOLABI-BEHMEL TIPO 1, SÍNDROME DE · GPC3 · SANGER + MLPA**	Secuenciación Sanger + MLPA	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GPC3 *1*
STMC **STAMEY COMPLETO (Bacterias, Hongos, Mycoplasma,Chlamydia), SEMEN + ORINA**	Cultivo en medios selectivos y diferenciales	5	Rec. 5 mL Semen postmasaje [Refr.] Rec. 10 mL Orina Premasaje (10 mL siguientes) [Refr.] Rec. 10 mL Orina Premasaje (10 mL iniciales) [Refr.] Rec. 10 mL Orina Postmasaje (10 mL iniciales) [Refr.]	Cultivo de semen: Negativo Stamey Chlamydia 1ª orina: Negativo Stamey Mycoplasma semen: Negativo Stamey Mycoplasma 1ª orina: Negativo Urocultivo (2ª muestra): Negativo Urocultivo (3ª muestra): Negativo Urocultivo: Negativo
ESTNMR **STAPHILOCOCCUS AUREUS MRSA CULTIVO,EXUDADO NASAL**	Cultivo bacteriológico en medios específicos.	3	Rec. 1 Muestra/s Exudado nasal (1 x Escobillón con medio de transporte.) La muestra puede remitirse al laboratorio tanto Refrigerada como a Temperatura ambiente.	
G12044 **STARGARDT (DISTROFIA MACULAR), ENFERMEDAD DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABCA4, BEST1, C1QTNF5, CDH3, CNGB3, DHS6S1, ELOVL4, FSCN2, IMPG1, PROM1, PRPH2, RDH12, RP1L1, RPGR, TIMP3 *15*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G7449 **STARGARDT TIPO 3, ENFERMEDAD DE · ELOVL4 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ELOVL4	*1*
G7397 **STARGARDT TIPO 4, ENFERMEDAD DE · PROM1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PROM1	*1*
G12076 **STARGARDT, ENFERMEDAD DE · ABCA4 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABCA4	*1*
G12057 **STARGARDT, ENFERMEDAD DE · ABCA4 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABCA4	*1*
G12045 **STICKER CON FENOTIPO VÍTREO 1, SÍNDROME DE · COL2A1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	COL2A1	*1*
G12050 **STICKLER TIPO I OCULAR NO SINDRÓMICO, SÍNDROME DE · COL2A1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	COL2A1	*1*
G12051 **STICKLER TIPO I, SÍNDROME DE · COL2A1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	COL2A1	*1*
G12052 **STICKLER TIPO II, SÍNDROME DE · COL11A1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	COL11A1	*1*
G12053 **STICKLER, SÍNDROME · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	COL11A1, COL11A2, COL2A1, COL9A1, COL9A2, COL9A3, VCAN	*7*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
DNBSA **STREPTOCOCCUS AGALACTIAE (GRUPO B) DNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	PCR-Real Time.	4	Rec. 3 mL Esputo (1 x Contenedor estéril) [Refr.] Rec. 1 mL LCR (1 x Tubo estéril) [Cong.] Rec. 1 mL Frotis nasofaringeo (1 x Escobillón seco.) [Refr.] Alt. 1 Muestra/s Exudado vaginal (1 x Escobillón seco.) [Refr.] Alt. 1 Muestra/s Exudado uretral (1 x Escobillón seco.) [Refr.] Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío. 2.- Detectar infección en recién nacido: secreción nasal o exudado (infección respiratoria), sangre total EDTA (bacteriemia) o LCR (infección meníngea).	DNA Streptococcus agalactiae (resultado) : No se detecta
ASA **STREPTOCOCCUS BETA HEMOLITICO GRUPO A, FROTIS AMIGDALAR**	Inmunocromatografía.	3	Rec. 1 Muestra/s Frotis amigdalar [Refr.] Frotis amigdalar en escobillon seco.	Negativo
ASTR **STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	10	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Para evaluar la respuesta a la vacuna se tienen que efectuar dos determinaciones pre y post vacunación. Ausencia de inmunización: Inf 9,70 µg/mL Inmunización óptima: Sup 270,00 µg/mL Inmunización intermedia: 9,70 - 270,00 µg/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ASPM **STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE ANTIGENO, MUESTRA BIOLÓGICA**	Inmunocromatografía.	3	Rec. 100 uL Orina [Refr.] Alt. 100 uL Líquido biológico [Refr.] Alt. 100 uL LCR [Refr.]	Negativo
DNSP **STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE DNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	Nested-PCR.	4	Rec. 1 mL Líquido pleural [Cong.] Rec. 1 mL LCR [Cong.] Rec. 1 mL BAL [Cong.] Rec. 1 mL Aspirado nasofaringeo [Cong.] Rec. 1 mL Aspirado bronquial [Cong.] Alt. 1 mL Sangre total EDTA [Refr.] Alt. 1 mL Orina [Refr.]	: No se detecta
DNSTPY **STREPTOCOCCUS PYOGENES DNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	Reacción en cadena de la polimerasa.	4	Rec. 1 Muestra/s Exudado (1 x Contenedor con solución salina) [Refr.] Previo al envío, consultar con el laboratorio el tipo de muestra aceptada.	No se detecta
STRON **STRONGYLOIDES STERCOLARIS ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	7	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 0.80 Índice Indeterminado: 0,80 - 1,09 Índice Positivo: Sup= 1,10 Índice
PCRSS **STRONGYLOIDES STERCOLARIS PCR, HECES**	RT-PCR	15	Rec. 5 g Heces [Cong.]	No se detecta

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
SIGA **SUBCLASES IGA (IGA1,IGA2), SUERO**	Turbidimetría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	IgA 1 : Ambos 0 - 2 Años 10,00 - 1200,00 mg/L IgA 1 : Ambos 2 - 4 Años 30,00 - 1320,00 mg/L IgA 1 : Ambos 4 - 8 Años 230,00 - 1750,00 mg/L IgA 1 : Ambos 8 - 12 Años 330,00 - 2040,00 mg/L IgA 1 : Ambos 12 - 18 Años 470,00 - 2490,00 mg/L IgA 1 : Ambos Sup - 18 Años 600,00 - 2940,00 mg/L IgA 2: Ambos 0 - 2 Años Inf 230,00 mg/L IgA 2: Ambos 2 - 4 Años 10,00 - 250,00 mg/L IgA 2: Ambos 4 - 8 Años 20,00 - 330,00 mg/L IgA 2: Ambos 8 - 12 Años 20,00 - 370,00 mg/L IgA 2: Ambos 12 - 18 Años 40,00 - 500,00 mg/L IgA 2: Ambos Sup - 18 Años 60,00 - 610,00 mg/L
SFCLDL **SUBFRACCIONAMIENTO COLESTEROL LDL, SUERO**	Electroforesis en gel de poliacrilamida (SDS-PAGE).	9	Rec. 500 uL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Ayuno mínimo de 12 horas.	- VLDL: Inf= 22 mg/dL - MID: Colesterol de banda intermedia: Banda C: Inf= 23 mg/dL Colesterol de banda intermedia: Banda B: Inf= 15 mg/dL Colesterol de banda intermedia: Banda A: Inf= 25 mg/dL -Subfracciones LDL LDL-1: Inf= 57 mg/dL LDL-2: Inf= 30 mg/dL LDL-3: Inf= 6 mg/dL - HDL-C: Sup= 40mg/dL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
SLTH **SUBPOBLACIONES LINFOCITARIAS T HELPER (TH1/TH2/TH17), SANGRE TOTAL**	Citometría de flujo.	5	Rec. 3 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Linfocitos Tfh (CD4+CXCR5+): Ambos 0 - 1 Años 0,12 - 1,16 % LT CD4 Linfocitos Tfh (CD4+CXCR5+): Ambos 1 - 6 Años 1,49 - 5,03 % LT CD4 Linfocitos Tfh (CD4+CXCR5+): Ambos 6 - 19 Años 1,65 - 8,11 % LT CD4 Linfocitos Tfh (CD4+CXCR5+): Ambos Sup - 19 Años 3,59 - 10,45 % LT CD4 Linfocitos Th1 (CD4+CCR6-CXCR3+): Ambos 0 - 2 Años 3,00 - 17,00 % LT CD4 Linfocitos Th1 (CD4+CCR6-CXCR3+): Ambos 2 - 4 Años 6,00 - 17,00 % LT CD4 Linfocitos Th1 (CD4+CCR6-CXCR3+): Ambos 4 - 6 Años 8,00 - 18,00 % LT CD4 Linfocitos Th1 (CD4+CCR6-CXCR3+): Ambos 6 - 8 Años 6,00 - 22,00 % LT CD4 Linfocitos Th1 (CD4+CCR6-CXCR3+): Ambos 8 - 13 Años 9,00 - 21,00 % LT CD4 Linfocitos Th1 (CD4+CCR6-CXCR3+): Ambos Sup - 13 Años 11,00 - 28,00 % LT CD4 Linfocitos Th 1/17 (CD4+CXCR3+CCR6+): Ambos 0 - 2 Años 1,00 - 6,00 % LT CD4 Linfocitos Th 1/17 (CD4+CXCR3+CCR6+): Ambos 2 - 4 Años 2,00 - 7,00 % LT CD4 Linfocitos Th 1/17 (CD4+CXCR3+CCR6+): Ambos 4 - 8 Años 3,00 - 10,00 % LT CD4 Linfocitos Th 1/17 (CD4+CXCR3+CCR6+): Ambos 8 - 13 Años 4,00 - 14,00 % LT CD4 Linfocitos Th 1/17 (CD4+CXCR3+CCR6+): Ambos Sup - 13 Años 7,00 - 19,00 % LT CD4 Linfocitos Th17 (CD4+CCR6+CXCR3-): Ambos 0 - 2 Años 1,00 - 8,00 % LT CD4 Linfocitos Th17 (CD4+CCR6+CXCR3-): Ambos 2 - 4 Años 3,00 - 7,00 % LT CD4 Linfocitos Th17 (CD4+CCR6+CXCR3-): Ambos 4 - 6 Años 4,00 - 11,00 % LT CD4 Linfocitos Th17 (CD4+CCR6+CXCR3-): Ambos 6 - 8 Años 3,00 - 10,00 % LT CD4 Linfocitos Th17 (CD4+CCR6+CXCR3-): Ambos 8 - 13 Años 5,00 - 11,00 % LT CD4 Linfocitos Th17 (CD4+CCR6+CXCR3-): Ambos Sup - 13 Años 6,00 - 14,00 % LT CD4 Linfocitos Th2 (CD4+CXCR3-CCR4+CCR6-): Ambos 0 - 2 Años 5,00 - 14,00 % LT CD4 Linfocitos Th2 (CD4+CXCR3-CCR4+CCR6-): Ambos 2 - 4 Años

MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
			6,00 - 15,00 % LT CD4 Linfocitos Th2 (CD4+CXCR3-CCR4+CCR6-): Ambos 4 - 6 Años 7,00 - 19,00 % LT CD4 Linfocitos Th2 (CD4+CXCR3-CCR4+CCR6-): Ambos 6 - 8 Años 5,00 - 14,00 % LT CD4 Linfocitos Th2 (CD4+CXCR3-CCR4+CCR6-): Ambos 8 - 13 Años 8,00 - 14,00 % LT CD4 Linfocitos Th2 (CD4+CXCR3-CCR4+CCR6-): Ambos Sup - 13 Años 7,00 - 16,00 % LT CD4

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
TBLK **SUBPOBLACIONES LINFOCITARIAS, SANGRE TOTAL**	Citometría de flujo.	7	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA)	Linfocitos NK CD3-/CD16+/CD56+: 5,35 - 30,93 % Linfocitos CD19 (linfocitos B): 4,70 - 19,13 % Linfocitos CD19 (linfocitos B): 72,00 - 460,00 /µL Linfocitos CD3 (linfocitos T): 54,90 - 84,03 % Linfocitos CD3 (linfocitos T): 536,00 - 1787,00 /µL Linfocitos CD4 (linfocitos T4): 32,53 - 62,88 % Cociente CD4 / CD8: 1,00 - 5,00 Linfocitos CD4 (linfocitos T4): 309,00 - 1139,00 /µL Linfocitos CD8 (linfocitos T8): 11,55 - 38,60 % Linfocitos CD8 (linfocitos T8): 137,00 - 823,00 /µL Linfocitos T tipo LGL (NKT CD3+ CD56+): 1,10 - 14,90 % Leucocitos: Ambos 0 - 3 Días 9,00 - 28,20 x10³/mm³ Leucocitos: Ambos 3 - 30 Días 7,20 - 21,60 x10³/mm³ Leucocitos: Ambos 30 - 365 Días 6,60 - 16,20 x10³/mm³ Leucocitos: Ambos 1 - 12 Años 4,80 - 15,00 x10³/mm³ Leucocitos: Ambos 12 - 18 Años 4,50 - 11,40 x10³/mm³ Leucocitos: Ambos Sup - 18 Años 3,90 - 10,50 x10³/mm³ Linfocitos: Ambos 0 - 3 Días 1,80 - 11,20 x10³/mm³ Linfocitos: Ambos 3 - 30 Días 2,00 - 13,60 x10³/mm³ Linfocitos: Ambos 30 - 365 Días 2,70 - 12,60 x10³/mm³ Linfocitos: Ambos 1 - 6 Años 1,80 - 10,00 x10³/mm³ Linfocitos: Ambos 6 - 18 Años 1,20 - 6,00 x10³/mm³ Linfocitos: Ambos Sup - 18 Años 1,10 - 4,50 x10³/mm³ Linfocitos %: Ambos 0 - 3 Días 18,00 - 52,00 % Linfocitos %: Ambos 3 - 30 Días 26,00 - 60,00 % Linfocitos %: Ambos 30 - 365 Días 30,00 - 67,00 % Linfocitos %: Ambos 1 - 12 Años 22,00 - 63,00 % Linfocitos %: Ambos 12 - 18 Años 20,00 - 47,00 % Linfocitos %: Ambos Sup - 18 Años 20,00 - 44,00 % Linfocitos en valor absoluto: Ambos 0 - 3 Días 1800,00 - 11200,00 /µL Linfocitos en valor absoluto: Ambos 0 - 6 Días 900,00 - 5500,00 /µL Linfocitos en valor absoluto: Ambos 4 - 30 Días 2000,00 - 13600,00 /µL Linfocitos en valor absoluto: Ambos 7 - 14 Días 1300,00 - 7500,00 /µL Linfocitos en valor absoluto: Ambos 15 - 29 Días 800,00 - 8300,00 /µL Linfocitos en valor absoluto: Ambos 30 - 729 Días 1100,00 - 6500,00 /µL Linfocitos en valor absoluto: Ambos 31 - 364 Días 2700,00 - 12600,00 /µL Linfocitos en valor absoluto: Ambos 1 - 6 Años 1800,00 - 10000,00 /µL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
				Linfocitos en valor absoluto: Hombres 2 - 12 Años 750,00 - 5000,00 /µL Linfocitos en valor absoluto: Mujeres 2 - 12 Años 7500,00 - 5000,00 /µL Linfocitos en valor absoluto: Ambos 6 - 17 Años 1200,00 - 6000,00 /µL Linfocitos en valor absoluto: Ambos Sup - 12 Años 600,00 - 4100,00 /µL Linfocitos en valor absoluto: Ambos Sup - 18 Años 1100,00 - 4500,00 /µL
SACLAS **SUBUNIDAD ÁCIDA LÁBIL (ALS), SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	30	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Ambos 0 - 2 Años 0,30 - 9,30 µg/mL Ambos 2 - 6 Años 1,90 - 10,50 µg/mL Ambos 6 - 10 Años 2,30 - 13,00 µg/mL Ambos 10 - 14 Años 4,20 - 14,00 µg/mL Ambos 14 - 16 Años 5,60 - 14,50 µg/mL Ambos Sup - 16 Años 7,70 - 20,40 µg/mL
ACSA3G **SUBUNIDAD ALFA 3 GANGLIÓNICO (RECEPTOR ACETILCOLINA) ANTICUERPOS, SUERO**	Radioinmunoprecipitación.	32	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 10,00 pmol/L Indeterminado: 10,00 - 15,00 pmol/L Positivo: Sup 15,00 pmol/L
SAHG **SUBUNIDAD ALFA LIBRE (HCG, FSH, LH, TSH), SUERO**	Radioinmunoanálisis.	15	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	Hombres Inf 0,70 UI/L Postmenopausia Mujeres Inf 1,30 UI/L Premenopausia Mujeres Inf 0,60 UI/L
SUCC **SUCCINILACETONA, ORINA**	Cromatografía de Gases / Espectrometría Masas.	23	Rec. 10 mL Orina (1 x Tubo 10 mL.) [Cong.]	Inf 1,40 mg/g crea
SMTXSU **SULFAMETOXAZOL, SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	50,00 - 150 mg/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
SULFOR **SULFATIDOS, ORINA**	Espectrometría de masas.	16	Rec. 50 mL Orina 24h. (alícuota) [Refr.]	Inf 377,90 nmol/L
SPREG **SULFATO DE PREGNENOLONA, SUERO**	Radioinmunoanálisis.	10	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Ambos 2 - 11 Días 125,00 - 2100,00 ng/mL Ambos 12 - 120 Días 120,00 - 1600,00 ng/mL Ambos 3 - 12 Meses 25,00 - 160,00 ng/mL Ambos 1 - 9 Años 5,00 - 30,00 ng/mL Ambos 9 - 15 Años 10,00 - 60,00 ng/mL Ambos Sup - 16 Años 40,00 - 120,00 ng/mL
SCOR **SULFATOS CONJUGADOS, ORINA**	Cromatografía de gases.	11	Rec. 10 mL Orina final jornada (1 x Contenedor 25 mL.) [Refr.]	Inf 210,00 mg/g crea
AGSU **SULFATOS, AGUA**	Espectrometría.	12	Rec. 100 mL Agua (1 x Envase aséptico) [Refr.]	Agua de diálisis Inf 50,00 mg/L Agua de red Inf 250,00 mg/L
SULFTO **SULFITEST, ORINA**	Tira reactiva	2	Rec. 3 mL Orina (1 x Tubo 5 mL.) [Cong.]	Negativo: Inf 50,00 mg/L SO3
SULFO **SULFONILUREAS, ORINA**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	18	Rec. 10 mL Orina [Refr.]	En caso de resultado positivo se informará de la Sulfonilurea detectada: CLORPROPAMIDA, GLIBENCLAMIDA, TOLBUTAMIDA, ACETOHEXAMIDA, GLIPIZIDA, GLICLAZIDA.
SULF **SULFONILUREAS, SUERO**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	18	Rec. 3 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Muestra alternativa: plasma.	En caso de resultado positivo se informará de la Sulfonilurea detectada: CLORPROPAMIDA, GLIBENCLAMIDA, TOLBUTAMIDA, ACETOHEXAMIDA, GLIPIZIDA, GLICLAZIDA.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
SULPI **SULPIRIDA, SUERO**	Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectrometría de masas.	9	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.] Rechazo: Suero en tubo con gel separador	I.Terapéutico: 50,00 - 750,00 ng/mL Toxicidad: Sup 2000,00 ng/mL
ASNSU **SUPERFICIE NEURONA EXTENDIDO, ANTICUERPOS (NMDAR, AMPAR, GABABR, LGI1, CASPR2, GABAAR, MGLUR1,MGLUR2, MGLUR5, DPPX, IGLON5, NEUREXIN, Gluk2, SEZ6L2), SUERO**	Inmunohistoquímica + Ensayo Celular	16	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	
ASNMB **SUPERFICIE NEURONAL EXTENDIDO, ANTICUERPOS (NMDAR, AMPAR, GABABR, LGI1, CASPR2, GABAAR, MGLUR1, MGLUR2, MGLUR5, DPPX, IGLON5, NEUREXIN, GluK2, SEZ6L2), LCR**	Inmunohistoquímica + Ensayo Celular	16	Rec. 2 mL LCR [Refr.]	Indicado en informe adjunto
ASNEAL **SUPERFICIE NEURONAL, ANTICUERPOS (NMDA, GABAR, AMPAR, LGI1, DDPX, CASPR2), LCR**	Inmunofluorescencia Indirecta.	6	Rec. 3 mL LCR (1 x Tubo 5 mL.) [Refr.]	AMPAr: Negativo GABAr: Negativo CASPR2: Negativo DPPX: Negativo LGI1: Negativo NMDA: Negativo
ASNEAS **SUPERFICIE NEURONAL, ANTICUERPOS (NMDA, GABAR, AMPAR, LGI1, DDPX, CASPR2), SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	6	Rec. 2 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.]	GABAr: Negativo CASPR2: Negativo DPPX: Negativo LGI1: Negativo NMDA: Negativo AMPAr: Negativo
G4044 **SUSCEPTIBILIDAD ESTEATOSIS HEPÁTICA · PNPLA3 (polimorfsmo I148M) · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PNPLA3 [polimorfsmo I148M] *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
SUSP **SUSTANCIA P, PLASMA**	Enzimoinmunoanálisis	18	Rec. 2 mL Plasma EDTA Aprotinina (1 x Tubo Sangre EDTA Aprotinina) [Cong.] Separar y congelar inmediatamente.	799,00 - 4763,00 pg/mL
T3UP **T3 CAPTACION INDICE TBC, SUERO**	Quimioluminiscencia.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Indice TBC (Thyroid Binding Capacity): 0,87 - 1,13 T3 captación (uptake): 24,00 - 35,00 %
T3L **T3 LIBRE, SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	1,58 - 3,91 pg/mL
T3R **T3 REVERSE, SUERO**	Radioinmunoanálisis.	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Niños Ambos 1 Días 0,83 - 1,94 ng/mL Niños Ambos 2 Días 1,07 - 2,09 ng/mL Niños Ambos 3 Días 1,02 - 1,66 ng/mL Niños Ambos 1 - 12 Meses 0,10 - 0,35 ng/mL Adultos 0,17 - 0,44 ng/mL Cordón (Sup 37 semanas) 1,30 - 3,00 ng/mL Niños Ambos 1 - 20 Años 0,10 - 0,35 ng/mL
T3TO **T3 TOTAL TRIYODOTIRONINA, ORINA**	Radioinmunoanálisis.	20	Rec. 10 mL Orina 24h. (alícuota) (1 x Contenedor 2500 mL.) [Refr.]	0,40 - 2,20 µg/24h
T3 **T3 TOTAL TRIYODOTIRONINA, SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Ambos 0 - 20 Años 0,80 - 2,10 µg/L Ambos 20 - 50 Años 0,70 - 2,00 µg/L Ambos Sup - 50 Años 0,40 - 1,80 µg/L
ACT3 **T3 TRIYODOTIRONINA ANTICUERPOS, SUERO**	Radioinmunoanálisis.	23	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Separar y congelar inmediatamente.	Inf 6,00 %

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
AT4 **T4 TIROXINA ANTICUERPOS, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	20	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	100,00 - 1200,00 ng/mL
ITL **T4 TIROXINA LIBRE, SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Embarazadas (Primer trimestre) 0,52 - 1,10 ng/dL Embarazadas (Segundo trimestre) 0,45 - 0,99 ng/dL Embarazadas (Tercer trimestre) 0,48 - 0,95 ng/dL Ambos 0 - 2 Años 0,94 - 1,44 ng/dL Ambos 2 - 12 Años 0,86 - 1,40 ng/dL Ambos 12 - 20 Años 0,83 - 1,43 ng/dL Ambos Sup - 20 Años 0,70 - 1,48 ng/dL
T4TO **T4 TOTAL TIROXINA, ORINA**	Radioinmunoanálisis.	20	Rec. 10 mL Orina 24h. (alícuota) (1 x Tubo 10 mL.) [Refr.] Orina de 24 horas no acidificada.	0,80 - 6,40 µg/24h
T4 **T4 TOTAL TIROXINA, SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Ambos 0 - 15 Años 5,60 - 11,70 µg/dL Hombres Sup - 15 Años 4,60 - 10,50 µg/dL Mujeres Sup - 15 Años 5,50 - 11,00 µg/dL
TACR **TACROLIMUS, SANGRE TOTAL**	Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectrometría de masas.	4	Rec. 3 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis.	Terapia inicial- Trasplante corazón: 9,00 - 15,00 ng/mL Terapia inicial- Trasplante hígado: 9,00 - 13,00 ng/mL Terapia mantenimiento- Trasplante corazón: 7,00 - 13,00 ng/mL Terapia mantenimiento- Trasplante hígado: 4,00 - 9,00 ng/mL Terapia mantenimiento- Trasplante renal: 4,00 - 9,00 ng/mL Trasplante renal: 9,00 - 13,00 ng/mL Límite de cuantificación: 1,00 ng/mL Nota: En fecha 12 de mayo de 2025, el kit comercial utilizado para el análisis de los niveles de inmunosupresores ha sido sustituido. Se recomienda tener en cuenta este cambio en la interpretación de los resultados analíticos, a fin de garantizar un seguimiento clínico adecuado de los pacientes.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
DNTSHE **TAENIA SAGINTA DNA, HECES**	Reacción en cadena de la polimerasa.	6	Rec. 50 g Heces [Refr.]	No se detecta
DTSLCR **TAENIA SOLIUM DNA, LCR**	Reacción en cadena de la polimerasa.	5	Rec. 2 mL LCR (1 x Tubo estéril) [Cong.] Se requiere recoger la muestra de LCR en tubo de polipropileno.	No se detecta
AGTA **TALIO, AGUA**	Absorción atómica.	15	Rec. 100 mL Agua (1 x Envase aséptico) [Refr.] Alt. 100 mL Agua (1 x Envase aséptico) (<2 Ác.nítrico)	Agua de diálisis Inf 0,01 mg/L
TAOR **TALIO, ORINA**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	5	Rec. 10 mL Orina final jornada [Refr.] Final de la jornada laboral.	No expuestos Inf 1,00 µg/L Personal expuesto Inf 5,00 µg/L Límite de cuantificación: 1,00 µg/L
TASA **TALIO, SANGRE TOTAL**	Espectrometría de masas.	4	Rec. 1 mL Sangre total EDTA Dipotásico (libre trazas metales) (1 x Tubo Sangre EDTA metales traza) [Refr.]	Inf 2,00 µg/L
G03180 **TALLA BAJA (NO SNDRÓMICA) · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ACAN, BTK, FBN1, GH1, GHR, GHRHR, GHSR, HESX1, IGF1, IGF1R, IGFALS, LHX3, LHX4, NPPC, NPR2, OTX2, POU1F1, PROP1, STAT5B *19*
G08133 **TALLA BAJA IDIOPÁTICA · SHOX · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SHOX *1*
G08132 **TALLA BAJA IDIOPÁTICA · SHOX · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SHOX *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G08120 **TALLA BAJA PROPORCIONADA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	A2ML1, ANKRD11, ATRX, BLM, BRAF, BTK, CBL, CCDC8, CREBBP, CUL7, DHCR7, EP300, ERCC6, ERCC8, FGD1, FOXC1, GHR, GHRHR, GLI2, HDAC8, HESX1, HRAS, IGF1, IGF1R, INSR, KAT6B, KDM6A, KMT2A, KMT2D, KRAS, LHX3, LHX4, MAP2K1, MAP2K2, NBN, NF1, NIPBL, NRAS, NSUN2, OBSL1, OTX2, PITX2, POC1A, POU1F1, PROP1, PTPN11, RAD21, RAF1, RIT1, ROR2, RPS6KA3, SHOC2, SMARCAL1, SMC1A, SMC3, SOS1, SOX3, SPRED1, SRCAP, STAT5B, SYNGAP1, TBCE, THRB, TRIM37, WNT5A, WRN	*66*
TAPEN **TAPENTADOL, SUERO**	Cromatografía de Gases / Espectrometría Masas.	8	Rec. 2 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Extracción a las 3 horas posteriores a la toma de la medicación.	20,00 - 120,00 µg/L	
G01095 **TAQUICARDIA VENTRICULAR CATECOLAMINÉRGICA POLIMÓRFICA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ANK2, CALM1 , CALM2, CALM3, CASQ2, KCNJ2, RYR2, SCN5A, TRDN	*9*
G01096 **TAQUICARDIA VENTRICULAR CATECOLAMINÉRGICA POLIMÓRFICA · RYR2 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	RYR2	*1*
G01097 **TAQUICARDIA VENTRICULAR POLIMÓRFICA CATECOLAMINÉRGICA TIPO 2 · CASQ2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CASQ2	*1*
G01098 **TAQUICARDIA VENTRICULAR POLIMÓRFICA CATECOLAMINÉRGICA TIPO 4 · CALM1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CALM1	*1*
G7239 **TAR, SÍNDROME DE · RBM8A · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	RBM8A	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G3004 **TAY-SACHS (POBLACIÓN ASHKENAZI), ENFERMEDAD DE · HEXA (+TATC1278, +1IVC12, +1IVS9, G269S, R247W, R249W) · HOT SPOT**	Hot Spot	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	HEXA [+TATC1278, +1IVC12, +1IVS9, G269S, R247W, R249W] *1*
G03134 **TAY-SACHS, ENFERMEDAD DE · HEXA · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	HEXA *1*
TBG **TBG (THYROXINE BINDING GLOBULIN), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	14,00 - 31,00 µg/mL Gestación 27,00 - 66,00 µg/mL
TEOR **TEBAINA CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), ORINA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 5 mL Orina (1 x Tubo 10 mL.) [Refr.]	Oripavina: Negativo: Inf 12,00 ng/mL Oripavina: Incertidumbre de medida: 2,00 ng/mL Oripavina: Límite de cuantificación: 10,00 ng/mL Tebaina: Negativo: Inf 2,40 ng/mL Tebaina: Incertidumbre de medida: 0,40 ng/mL Tebaina: Límite de cuantificación: 2,00 ng/mL Se utiliza como criterio de Positividad que la concentración sea superior o igual al valor del límite de cuantificación más el valor de incertidumbre del ensayo. En caso contrario, el resultado es Negativo.
COTEBST **TEBAÍNA CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SANGRE**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 10 mL Sangre total Oxalato/Fluoruro (1 x Tubo Sangre Total-Oxalato/Fluoruro) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total Heparina litio (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Tubo oxalato potásico/Fluoruro sódico Ref. SAP 600088318	Incertidumbre de medida 2 ng/mL Límite de cuantificación 10 ng/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
TEICO **TEICOPLANINA, SUERO**	Inmunoturbidimetría.	4	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Se recomienda medir concentraciones residuales a las 48 horas y 8 días déspues del inicio del tratamiento.	Mayoría de las infecciones con Gram Positivos: Sup 15,00 mg/L Infecciones en huesos y articulaciones: Sup 20,00 mg/L Endocarditis infecciosa: 30,00 - 40,00 mg/L	
G7439 **TELANGIECTASIA HEMORRÁGICA HEREDITARIA · ACVRL1, ENG · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ACVRL1, ENG	*2*
G01099 **TELANGIECTASIA HEMORRÁGICA HEREDITARIA · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ACVRL1, ENG, RASA1, SMAD4	*4*
G01155 **TELANGIECTASIA HEMORRÁGICA HEREDITARIA · SMAD4 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SMAD4	*1*
G01157 **TELANGIECTASIA HEMORRÁGICA HEREDITARIA TIPO 1 · ENG · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ENG	*1*
G01100 **TELANGIECTASIA HEMORRÁGICA HEREDITARIA TIPO 2 · ACVRL1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ACVRL1	*1*
G7468 **TELANGIECTASIA HEMORRÁGICA HEREDITARIA TIPO 5 · GDF2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GDF2	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
NTXO24 **TELOPÉPTIDOS AMINOTERMINALES (NTX) ORINA 24 HORAS**	Enzimoinmunoanálisis	10	Rec. 10 mL Orina 24h. (alícuota) [Refr.]	Telopéptidos aminoterminales (NTx) orina 24 horas: Hombres 3,00 - 63,00 nmol/mmol cre Telopéptidos aminoterminales (NTx) orina 24 horas: Mujeres 5,00 - 65,00 nmol/mmol cre
G11127 **TEMBLOR ESENCIAL · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ETM2, FUS, TENM4 *3*
G03159 **TEMPLE, SÍNDROME · UPD14 MATERNA · MS-MLPA**	MS-MLPA (Metilación específica-MLPA)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Cromosoma 14 [14q32] *1*
TEOF **TEOFILINA, SUERO**	Inmunoanálisis enzimático	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] -Dosis administrada, frecuencia y vía de administración Obtener la muestra de sangre previamente a la administración del fármaco. Usualmente se determina la concentración en predosis matinal y en ayunas.	Apnea neonatal 5,00 - 10,00 µg/mL I.Terapéutico: 10,00 - 20,00 µg/mL Conc.Tóxica: Sup 20,00 µg/mL
DAOPLUS **TEST ACTIVIDAD DE DAO**	Radioinmunoanálisis.	7	Rec. 3 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Ayuno mínimo de 8 horas. No realizar durante el embarazo ni en caso de shock anafiláctico. Requiere prescripción médica obligatoria.	Alta incidencia de intolerancia a la histamina : Inf 3.74 U/ml (Inf40 HDU) Posible incidencia de intolerancia a la histamina: 3.74-12.54 U/ml (40-80 HDU) Baja incidencia de intolerancia a la histamina : Sup 12.54 U/ml (Sup80 HDU)

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
AROR **TEST ARABINOSA, ORINA**	Cromatografía de Gases / Espectrometría Masas.	25	Rec. 15 mL Orina (primera micción) (1 x Contenedor 25 mL.) [Refr.] Se recomienda no tomar durante los 3 días previos a la obtención de la muestra: legumbres, cerezas, manzana, tomates, cebada y avena. Indicar edad y sexo.	Arabinosa en orina: Inf 25,00 mg/g crea Arabitol en orina: Inf 50,00 mg/g crea NEGATIVO. No se detecta una sobreproducción de metabolitos de Candida.
HPAC **TEST DE ALIENTO - HELICOBACTER PYLORI (UREA C13) - ADULTOS**	Espectrometría de masas.	7	Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 10 min (1 x Kit específico) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado basal (1 x Kit específico)	Diferencia CO2 basal y CO2 tras ingesta: Negativo: Inf= 1,50 Por mil
ALIE2 **TEST DE ALIENTO - HELICOBACTER PYLORI (UREA C13) ADULTOS**	Espectrometría de infrarrojos.	3	Rec. 1 Muestra/s Aire espirado (1 x Kit específico)	Negativo: Inf 2,50 por mil Positivo: Sup= 2,50 por mil
HPEN **TEST DE ALIENTO - HELICOBACTER PYLORI (UREA C13) PEDIÁTRICO**	Cromatografía de Gases / Espectrometría Masas.	5	Rec. 1 Muestra/s Aire espirado (1 x Kit específico) No se debe tomar omeprazol ni otros inhibidores de protones durante tres semanas anteriores a la prueba. Para niños mayores de 5 años Tampoco tomar antibióticos un mes antes.	Negativo: Inf 5,00 Positivo: Sup= 5,00

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
INFS **TEST DE ALIENTO - HIDRÓGENO + METANO ESPIRADO PARA LA DETECCIÓN DE INTOLERANCIA A LA FRUCTOSA Y SORBITOL**	Cromatografía de gases.	5	Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 90 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 60 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 30 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 210 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 180 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 150 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 120 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado basal (1 x Tubo Exetainer®) - En caso que proceda y si está disponible, copia del informe del caso índice familiar. - Se precisa resumen de la historia clínica del paciente. Durante la realización de la prueba el paciente debe permanecer en reposo relativo, sin poder comer, fumar ni dormirse. Agua sí	

MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
		puede tomar. PREANALÍTICA A SEGUIR POR EL PACIENTE: 1.- El día anterior a la prueba no tomar alimentos que contengan fibra (frutas y vegetales), ni fécula (pan, patatas, cereales y leguminosas), así como alimentos de difícil digestión. SOLO PUEDE tomar: carne, pescado, huevos y lácteos. 2.- Ayuno de 12 horas el día de la prueba (no masticar chicle por su alto contenido en Sorbitol). 3.- No tomar antibióticos en los 30 días anteriores a la realización de la prueba. 4.- No ingerir medicamentos laxantes ni antidiarreicos en los 2 días anteriores al estudio. 5.-No tomar antiácido o protector de estómago 3 semanas anteriores 5.- Puede beber toda el agua que desee durante el periodo de ayuno. ATENCIÓN: Para la toma de las muestras utilizar los tubos Exetainer (BASAL-AZUL) -referencia SAP 600051634-- suministrados por el	

MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
		laboratorio. La prueba de sorbitol no se realiza en niños. Los tubos se deben conservar a temperatura ambiente hasta su envío al laboratorio de referencia. Se requiere: 1.- Destapar un tubo rotulado previamente con la palabra BASAL y colocar la pajita hasta el fondo del mismo. El paciente soplará lentamente, a través de la pajita, hasta que aparezca condensación del aliento en las paredes del tubo. Continuar soplando a la vez que se va retirando la pajita del interior del tubo. Tapar rápidamente. 2.- Administrar la solución de 25 gr fructosa + 5gr sorbitol en 250 mL 3.- Esperar 30 minutos y repetir la misma operación en un segundo tubo identificado como muestra 30 min. 4.- Repetir la misma operación a los 60, 90, 120, 150, 180 y 210 min.	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ILMA **TEST DE ALIENTO - HIDRÓGENO + METANO ESPIRADO PARA LA DETECCIÓN DE INTOLERANCIA A LA MALTOSA**	Cromatografía de gases.	5	Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 90 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 60 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 30 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 210 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 180 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 150 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 120 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado basal (1 x Tubo Exetainer®) - En caso que proceda y si está disponible, copia del informe del caso índice familiar. 4.- Repetir la misma operación a los 60, 90, 120, 150, 180 y 210 min. PREANALÍTICA A SEGUIR POR EL PACIENTE: 1.- El día anterior a la prueba no tomar alimentos que	

MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
		contengan fibra (frutas y vegetales), ni fécula (pan, patatas, cereales y leguminosas), así como alimentos de difícil digestión. SOLO PUEDE tomar: carne, pescado, huevos y lácteos. 2.- Ayuno de 12 horas el día de la prueba (no masticar chicle por su alto contenido en Sorbitol). 3.- No tomar antibióticos en los 30 días anteriores a la realización de la prueba. 4.- No ingerir medicamentos laxantes ni antidiarreicos en los 2 días anteriores al estudio. 5.-No tomar antiácido o protector de estómago 3 semanas anteriores 5.- Puede beber toda el agua que desee durante el periodo de ayuno. - Se precisa resumen de la historia clínica del paciente. Durante la realización de la prueba el paciente debe permanecer en reposo relativo, sin poder comer, fumar ni dormirse. Agua sí puede tomar. ATENCIÓN: Para la toma de las muestras utilizar los tubos	

MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
		Exetainer (BASAL-AZUL) -referencia SAP 600051634-- suministrados por el laboratorio. Los tubos se deben conservar a temperatura ambiente hasta su envío al laboratorio de referencia. Se requiere: 1.- Destapar un tubo rotulado previamente con la palabra BASAL y colocar la pajita hasta el fondo del mismo. El paciente soplará lentamente, a través de la pajita, hasta que aparezca condensación del aliento en las paredes del tubo. Continuar soplando a la vez que se va retirando la pajita del interior del tubo. Tapar rápidamente. 2.- Administrar la solución de 25 gr maltosa en 250 mL (25 g de maltosa-dosis para adultos y niños) 3.- Esperar 30 minutos y repetir la misma operación en un segundo tubo identificado como muestra 30 min.	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
INGA **TEST DE ALIENTO - HIDRÓGENO + METANO PARA LA DETECCIÓN DE INTOLERANCIA A GALACTOSA**	Cromatografía de gases.	5	Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 90 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 60 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 30 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 210 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 180 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 150 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 120 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado basal (1 x Tubo Exetainer®) - En caso que proceda y si está disponible, copia del informe del caso índice familiar. - Se precisa resumen de la historia clínica del paciente. * En niños (entre 5-10 años, entre 22-35 Kg de peso aproximadamente) la dosis de galactosa debe ajustarse a su peso, siendo de 2	

MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
		gramo de galactosa por Kg. de peso del paciente, hasta un máximo de 50 gramos de galactosa. A partir de los 11-12 años de edad se puede administrar la dosis para adultos (teniendo en cuenta peso y características del niño/a). 1.- Destapar un tubo rotulado previamente con la palabra BASAL y colocar la pajita hasta el fondo del mismo. El paciente soplará lentamente, a través de la pajita, hasta que aparezca condensación del aliento en las paredes del tubo. Continuar soplando a la vez que se va retirando la pajita del interior del tubo. Tapar rápidamente. 1.- El día anterior a la prueba no tomar alimentos que contengan fibra (frutas y vegetales), ni fécula (pan, patatas, cereales y leguminosas), así como alimentos de difícil digestión. SOLO PUEDE tomar: carne, pescado, huevos y lácteos. 2.- Administrar la solución de galactosa 25 g disueltos en 250 ml (25 g de galactosa-dosis para un adulto*). 3.- Esperar 30 minutos	

MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
		y repetir la misma operación en un segundo tubo identificado como muestra 30 min. 3.- No tomar antibióticos en los 30 días anteriores a la realización de la prueba. 4.- No ingerir medicamentos laxantes ni antidiarreicos en los 2 días anteriores al estudio. 4.- Repetir la misma operación a los 60, 90, 120, 150, 180 y 210 min. 5.- Puede beber toda el agua que desee durante el periodo de ayuno. ATENCIÓN: Para la toma de las muestras utilizar los tubos Exetainer (BASAL-AZUL) -referencia SAP 600051634-- suministrados por el laboratorio. Ayuno mínimo de 12 horas. Durante la realización de la prueba el paciente debe permanecer en reposo relativo, sin poder comer, fumar ni dormirse. Agua sí puede tomar. Los tubos se deben conservar a temperatura ambiente hasta su envío al laboratorio de	

MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
		referencia. Se requiere:	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
INFR **TEST DE ALIENTO - HIDRÓGENO + METANO PARA LA DETECCIÓN DE INTOLERANCIA A LA FRUCTOSA**	Cromatografía de gases.	5	Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 90 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 60 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 30 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 210 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 180 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 150 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 120 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado basal (1 x Tubo Exetainer®) 1.- Destapar un tubo rotulado previamente con la palabra BASAL y colocar la pajita hasta el fondo del mismo. El paciente soplará lentamente, a través de la pajita, hasta que aparezca condensación del aliento en las paredes del tubo. Continuar soplando a la vez que se va retirando la pajita	

MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
		del interior del tubo. Tapar rápidamente. 1.- El día anterior a la prueba no tomar alimentos que contengan fibra (frutas y vegetales), ni fécula (pan, patatas, cereales y leguminosas), así como alimentos de difícil digestión. SOLO PUEDE tomar: carne, pescado, huevos y lácteos. 2.- Administrar la solución de 25 gr fructosa en 200 ml (25 g de fructosa-dosis para adultos y niños). 3.- Esperar 30 minutos y repetir la misma operación en un segundo tubo identificado como muestra 30 min. 3.- No tomar antibióticos en los 30 días anteriores a la realización de la prueba. 4.- No ingerir medicamentos laxantes ni antidiarreicos en los 2 días anteriores al estudio. 4.- Repetir la misma operación a los 60, 90, 120, 150, 180 y 210 min. 5.- Puede beber toda el agua que desee durante el periodo de ayuno. ATENCIÓN: Para la toma de las muestras utilizar los tubos	

MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
		Exetainer (BASAL-AZUL) -referencia SAP 600051634-- suministrados por el laboratorio. Durante la realización de la prueba el paciente debe permanecer en reposo relativo, sin poder comer, fumar ni dormirse. Agua sí puede tomar. Los tubos se deben conservar a temperatura ambiente hasta su envío al laboratorio de referencia. Se requiere: - Se precisa resumen de la historia clínica del paciente. Ayuno mínimo de 12 horas. - En caso que proceda y si está disponible, copia del informe del caso índice familiar.	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
INSA **TEST DE ALIENTO - HIDRÓGENO + METANO PARA LA DETECCIÓN DE INTOLERANCIA A LA SACAROSA**	Cromatografía de gases.	5	Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 90 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 60 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 30 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 210 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 180 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 150 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 120 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado basal (1 x Tubo Exetainer®) - En caso que proceda y si está disponible, copia del informe del caso índice familiar. - Se precisa resumen de la historia clínica del paciente. 1.- Destapar un tubo rotulado previamente con la palabra BASAL y colocar la pajita hasta el fondo del mismo. El paciente soplará lentamente, a través de	

MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
		la pajita, hasta que aparezca condensación del aliento en las paredes del tubo. Continuar soplando a la vez que se va retirando la pajita del interior del tubo. Tapar rápidamente. 1.- El día anterior a la prueba no tomar alimentos que contengan fibra (frutas y vegetales), ni fécula (pan, patatas, cereales y leguminosas), así como alimentos de difícil digestión. SOLO PUEDE tomar: carne, pescado, huevos y lácteos. 2.- Administrar la solución de 50 gr sacarosa en 250 ml (50 g de sacarosa- dosis para adultos y niños). 3.- Esperar 30 minutos y repetir la misma operación en un segundo tubo identificado como muestra 30 min. 3.- No tomar antibióticos en los 30 días anteriores a la realización de la prueba. 4.- No ingerir medicamentos laxantes ni antidiarreicos en los 2 días anteriores al estudio. 4.- Repetir la misma operación a los 60, 90, 120, 150, 180 y 210	

MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
		min. 5.- Puede beber toda el agua que desee durante el periodo de ayuno. 6 - Se recomienda la realización de enjuagues bucales antes de iniciar el estudio para evitar que algunas bacterias orofaríngeas puedan degradar el substrato produciendo H2 y/o CH4. ATENCIÓN: Para la toma de las muestras utilizar los tubos Exetainer (BASAL-AZUL) -referencia SAP 600051634-- suministrados por el laboratorio. Ayuno mínimo de 12 horas. Durante la realización de la prueba el paciente debe permanecer en reposo relativo, sin poder comer, fumar ni dormirse. Agua sí puede tomar. Los tubos se deben conservar a temperatura ambiente hasta su envío al laboratorio de referencia. Se requiere:	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
INLA **TEST DE ALIENTO - HIDRÓGENO + METANO PARA LA DETECCIÓN DE INTOLERANCIA A LACTOSA**	Cromatografía de gases.	5	Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 90 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 60 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 30 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 210 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 180 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 150 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 120 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado basal (1 x Tubo Exetainer®) ATENCIÓN: Para la toma de las muestras utilizar los tubos Exetainer (BASAL-AZUL) -referencia SAP 600051634-- suministrados por el laboratorio. 1.- Destapar un tubo rotulado previamente con la palabra BASAL y colocar la pajita hasta el fondo del mismo. El paciente soplará	

MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
		lentamente, a través de la pajita, hasta que aparezca condensación del aliento en las paredes del tubo. Continuar soplando a la vez que se va retirando la pajita del interior del tubo. Tapar rápidamente. 2.- Administrar la solución de 250 ml de Lactonaranja (25 g de lactosa-dosis para un adulto*). 3.- Esperar 30 minutos y repetir la misma operación en un segundo tubo identificado como muestra 30 min. 4.- Repetir la misma operación a los 60, 90, 120, 150, 180 y 210 min. Durante la realización de la prueba el paciente debe permanecer en reposo relativo, sin poder comer, fumar ni dormirse. Agua sí puede tomar. Los tubos se deben conservar a temperatura ambiente hasta su envío al laboratorio de referencia. * En niños (entre 5-10 años, entre 22-35 kg de peso, aproximadamente) la dosis de lactosa debe ajustarse a su peso, siendo de 1 gramos de	

MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
		lactosa por Kg. de peso del paciente, hasta un máximo de 50 gramos de lactosa. A partir de los 11-12 años de edad se puede administrar la dosis para adultos (teniendo en cuenta peso y características del niño/a). Se requiere: - Resumen de la historia clínica del paciente. - En caso que proceda y si está disponible, copia del informe del caso índice familiar. Dieta: 1.- El día anterior a la prueba no tomar alimentos que contengan fibra (frutas y vegetales), ni fécula (pan, patatas, cereales y leguminosas), así como alimentos de difícil digestión. SOLO PUEDE tomar: carne, pescado, huevos y lácteos. 2.- Ayuno de 12 horas el día de la prueba (no masticar chicle por su alto contenido en Sorbitol). 3.- No tomar antibióticos en los 30 días anteriores a la realización de la prueba. 4.- No ingerir medicamentos laxantes ni antidiarreicos en los 2 días anteriores al	

MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
		estudio. 5.- Puede beber toda el agua que desee durante el periodo de ayuno.	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
INSO **TEST DE ALIENTO - HIDRÓGENO + METANO PARA LA DETECCIÓN DE INTOLERANCIA AL SORBITOL**	Cromatografía de gases.	5	Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 90 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 60 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 30 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 210 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 180 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 150 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 120 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado basal (1 x Tubo Exetainer®) ATENCIÓN: Para la toma de las muestras utilizar los tubos Exetainer (BASAL-AZUL) -referencia SAP 600051634-- suministrados por el laboratorio. Se requiere: - Se precisa resumen de la historia clínica del paciente. - En caso que proceda y si está disponible,	

MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
		copia del informe del caso índice familiar. 1.- Destapar un tubo rotulado previamente con la palabra BASAL y colocar la pajita hasta el fondo del mismo. El paciente soplará lentamente, a través de la pajita, hasta que aparezca condensación del aliento en las paredes del tubo. Continuar soplando a la vez que se va retirando la pajita del interior del tubo. Tapar rápidamente. 2.- Administrar la solución de 5 gr sorbitol en 50 ml (5 g de sorbitol- dosis para adultos y niños). 3.- Esperar 30 minutos y repetir la misma operación en un segundo tubo identificado como muestra 30 min. 4.- Repetir la misma operación a los 60, 90, 120, 150, 180 y 210 min. PREANALÍTICA A SEGUIR POR EL PACIENTE: 1.- El día anterior a la prueba no tomar alimentos que contengan fibra (frutas y vegetales), ni fécula (pan, patatas, cereales y leguminosas), así como alimentos de difícil digestión. SOLO PUEDE tomar: carne,	

MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
		pescado, huevos y lácteos. 2.- Ayuno de 12 horas el día de la prueba (no masticar chicle por su alto contenido en Sorbitol). 3.- No tomar antibióticos en los 30 días anteriores a la realización de la prueba. 4.- No ingerir medicamentos laxantes ni antidiarreicos en los 2 días anteriores al estudio. 5.-No tomar antiácido o protector de estómago 3 semanas anteriores 5.- Puede beber toda el agua que desee durante el periodo de ayuno. Durante la realización de la prueba el paciente debe permanecer en reposo relativo, sin poder comer, fumar ni dormirse. Agua sí puede tomar. La prueba de sorbitol no se realiza en niños. Los tubos se deben conservar a temperatura ambiente hasta su envío al laboratorio de referencia.	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
INXI **TEST DE ALIENTO - HIDRÓGENO + METANO PARA LE DETECCIÓN DE INTOLERANCIA A XILOSA**	Cromatografía de gases.	5	Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 90 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 60 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 30 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 210 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 180 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 150 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 120 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado basal (1 x Tubo Exetainer®) - En caso que proceda y si está disponible, copia del informe del caso índice familiar. - Se precisa resumen de la historia clínica del paciente. * En niños (entre 5-10 años, entre 22-35 Kg de peso aproximadamente) la dosis de xilosa debe ajustarse a su peso, siendo de 2 gramo de	

MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
		xilosa por Kg. de peso del paciente, hasta un máximo de 50 gramos de xilosa. A partir de los 11-12 años de edad se puede administrar la dosis para adultos (teniendo en cuenta peso y características del niño/a). 1.- Destapar un tubo rotulado previamente con la palabra BASAL y colocar la pajita hasta el fondo del mismo. El paciente soplará lentamente, a través de la pajita, hasta que aparezca condensación del aliento en las paredes del tubo. Continuar soplando a la vez que se va retirando la pajita del interior del tubo. Tapar rápidamente. 1.- El día anterior a la prueba no tomar alimentos que contengan fibra (frutas y vegetales), ni fécula (pan, patatas, cereales y leguminosas), así como alimentos de difícil digestión. SOLO PUEDE tomar: carne, pescado, huevos y lácteos. 2.- Administrar la solución de xilosa 25 g disueltos en 250 ml (25 g de xilosa-dosis para un adulto*). 3.- Esperar 30 minutos y repetir la misma operación en un	

MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
		segundo tubo identificado como muestra 30 min. 3.- No tomar antibióticos en los 30 días anteriores a la realización de la prueba. 4.- No ingerir medicamentos laxantes ni antidiarreicos en los 2 días anteriores al estudio. 4.- Repetir la misma operación a los 60, 90, 120, 150, 180 y 210 min. 5.- Puede beber toda el agua que desee durante el periodo de ayuno. ATENCIÓN: Para la toma de las muestras utilizar los tubos Exetainer (BASAL-AZUL) -referencia SAP 600051634-- suministrados por el laboratorio. Ayuno mínimo de 12 horas. Durante la realización de la prueba el paciente debe permanecer en reposo relativo, sin poder comer, fumar ni dormirse. Agua sí puede tomar. Los tubos se deben conservar a temperatura ambiente hasta su envío al laboratorio de referencia. Se requiere:	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
QSOC **TEST DE ALIENTO - SOBRECRECIMIENTO BACTERIANO**	Cromatografía de gases.	5	Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 90 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 60 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 30 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 210 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 180 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 150 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 120 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado basal (1 x Tubo Exetainer®) ATENCIÓN: Para la toma de las muestras utilizar los tubos Exetainer (BASAL-AZUL) -referencia SAP 600051634-- suministrados por el laboratorio. 1.- Destapar un tubo rotulado previamente con la palabra BASAL y colocar la pajita hasta el fondo del mismo. El paciente soplará	

MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
		lentamente, a través de la pajita, hasta que aparezca condensación del aliento en las paredes del tubo. Continuar soplando a la vez que se va retirando la pajita del interior del tubo. Tapar rápidamente. 2.- Administrar la solución de 10 gr lactitol en 200 ml (1 sobre) (10 gr lactitol dosis para un adulto). 3.- Esperar 30 minutos y repetir la misma operación en un segundo tubo identificado como muestra 30 min. 4.- Repetir la misma operación a los 60 min. - Antibióticos: esperar 4 semanas tras la última dosis. - Probióticos/prebióticos: suspender 2 semanas antes. - Colonoscopia o enema: esperar 5 días. - Laxantes, antidiarreicos y procinéticos: suspender 48 h antes. - No fumar, vapear ni realizar ejercicio intenso desde la noche anterior. - Durante la prueba: no comer, fumar, mascar chicle ni dormir; mantener reposo	

MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
		relativo. - Alimentos: Permitidos: carne blanca, pescado blanco, huevos, arroz blanco (moderado), agua, sal y aceite. Prohibidos: frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, lácteos, alcohol y refrescos. - Ayuno de 12 h antes de la prueba (solo agua).	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
SIBO **TEST DE ALIENTO - SOBRECRECIMIENTO BACTERIANO (LACTITOL) + CONSULTA MEDICA**	Cromatografía de gases.	5	Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 90 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 60 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 30 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 210 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 180 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 150 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado postbasal 120 m (1 x Tubo Exetainer®) Rec. 1 Muestra/s Aire espirado basal (1 x Tubo Exetainer®) ATENCIÓN: Para la toma de las muestras utilizar los tubos Exetainer (BASAL-AZUL) -referencia SAP 600051634-- suministrados por el laboratorio. 4.- No ingerir medicamentos laxantes ni antidiarreicos en los 2 días anteriores al estudio. 5.- Puede beber toda	

MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
		el agua que desee durante el periodo de ayuno. 1.- Destapar un tubo rotulado previamente con la palabra BASAL y colocar la pajita hasta el fondo del mismo. El paciente soplará lentamente, a través de la pajita, hasta que aparezca condensación del aliento en las paredes del tubo. Continuar soplando a la vez que se va retirando la pajita del interior del tubo. Tapar rápidamente. 2.- Administrar la solución de 10 gr lactitol en 200 ml (1 sobre) (10 gr lactitol dosis para un adulto). 3.- Esperar 30 minutos y repetir la misma operación en un segundo tubo identificado como muestra 30 min. 4.- Repetir la misma operación a los 60 min. Durante la realización de la prueba el paciente debe permanecer en reposo relativo, sin poder comer, fumar ni dormirse. Agua sí puede tomar. Ayuno mínimo de 12 horas. 1.- El día anterior a la prueba no tomar alimentos que contengan fibra (frutas	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
			y vegetales), ni fécula (pan, patatas, cereales y leguminosas), así como alimentos de difícil digestión. SOLO PUEDE tomar: carne, pescado, huevos y lácteos. 3.- No tomar antibióticos en los 30 días anteriores a la realización de la prueba.	
ACSI **TEST DE ENVEJECIMIENTO SALUDABLE**	Array- SNPs	30	Rec. 8.5 mL Suero (2 x Alicuota) [Refr.] Rec. 8.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 3 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 10 mL Plasma EDTA (2 x Alicuota) [Cong.] Ayuno de 8 horas. Cumplimentar peticionario específico obligatorio. Se requiere consentimiento informado. Realizar la extracción en horario compatible con el envío de la muestra el mismo día de la extracción.	: Indicado en informe adjunto Hombres 5,46 - 16,20 µmol/L Mujeres 4,44 - 13,56 µmol/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
FARMANEU **TEST DE FARMACOGENÉTICA: PANEL DE NEUROPSIQUIATRÍA**	Microarray	25	Rec. 3.5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) Imprescindible peticionario y consentimiento informado específico (*Hoja petición Wellness)	Indicado en informe adjunto
EF75FA **TEST DE FARMACOGENÉTICA: RESPUESTA A 113 FÁRMACOS**	Array- SNPs	25	Rec. 3.5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) Sangre EDTA rotulada con las siglas BM + Hoja de solicitud Wellness	Indicado en informe adjunto
TGR **TEST DE GRAHAM PARA DETECCION DE HUEVOS DE ENTEROBIUS VERMICULARIS**	Observación microscópica.	3	Rec. 1 Muestra/s Frotis (1 x Portaobjetos)	No se detecta
TGR2 **TEST DE GRAHAM PARA DETECCION DE HUEVOS DE ENTEROBIUS VERMICULARIS (2a MUESTRA)**	Observación microscópica.	3	Rec. 1 Muestra/s Frotis (1 x Portaobjetos)	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
CINM **TEST DE REFUERZO INMUNITARIO (VITAMINAS Y MINERALES)**	No se aplica.	4	Rec. 3 mL Suero (libre trazas metales) (1 x Tubo Suero metales traza) [Refr.] Rec. 3 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 2 mL Suero (2 x Tubo protegido de la luz) [Refr.] Rec. 1 mL Plasma Heparina litio (1 x Tubo protegido de la luz) [Cong.] Ayuno de 8 horas. Realizar la extracción en horario compatible con el envío de la muestra el mismo día de la extracción.	
OWL **TEST DE SEVERIDAD DE ESTEATOSIS. OWLiver**	Cromatografía Líquida Alta Resolución / Espectrometria.	21	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Se requiere peticionario específico.	Indicado en informe adjunto
DAOGEN **TEST GENÉTICO DE DAO**	PCR - RT-PCR	11	Rec. 3 mL Sangre total EDTA [Refr.] Se requiere consentimiento informado. Se requiere peticionario específico. Realizar la extracción en horario compatible con el envío de la muestra el mismo día de la extracción. No es necesario estar en ayunas. Requiere prescripción médica obligatoria.	: Indicado en informe adjunto *1* AOC1 [rs1049793, rs1049742, rs2052129, rs10156191]

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
DAOGEAC **TEST GENÉTICO Y DE ACTIVIDAD DAO**	No se aplica.	11	Rec. 3.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Rec. 3 mL Sangre total EDTA [Refr.] Se requiere consentimiento informado. Se requiere peticionario específico. Realizar la extracción en horario compatible con el envío de la muestra el mismo día de la extracción. Ayuno de 8 horas. No realizar durante el embarazo ni en caso de shock anafiláctico. Requiere prescripción médica obligatoria.	: Indicado en informe adjunto *1* Alta incidencia de intolerancia a la histamina : Inf 3.74 U/ml (Inf40 HDU) Posible incidencia de intolerancia a la histamina: 3.74-12.54 U/ml (40-80 HDU) Baja incidencia de intolerancia a la histamina : Sup 12.54 U/ml (Sup80 HDU) Indicado en el informe adjunto AOC1 [rs1049793, rs1049742, rs2052129, rs10156191]
MAPD **TEST MAP-AD**		30		
MICOREAV **TEST MICROBIOTA INTESTINAL AVANZADO (NUEVO)**	No se aplica.	20	Rec. 5 g Heces (1 x Contenedor estéril) [Refr.] Rec. 1 g Heces (1 x Recipiente de plástico) [Refr.] Coordinar previamente toma y envío de muestras con el laboratorio. Las muestras deben llegar al laboratorio de lunes a jueves.	MICROBIOTA INTESTINAL CORE VIVOLABS: Se informa para cada paciente

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
MICOREBA				
TEST MICROBIOTA INTESTINAL BÁSICO (NUEVO)	No se aplica.	20	Rec. 1 Muestra/s Heces (1 x Kit específico) [Refr.] Heces recogidas en kit específico (550000528) facilitado por el laboratorio. Seguir instrucciones facilitadas en el kit. Las muestras deben llegar al laboratorio central de lunes a miércoles, evitando vísperas de festivos. Se requiere peticionario específico cumplimentado. No tomar corticoides, antibióticos ni antihistamínicos durante los 20 días anteriores a la obtención de la muestra. Pacientes que se hayan sometido a tratamientos de radioterapia o quimioterapia deben esperar al menos 4 semanas antes de realizar la toma de muestra. No se recomienda realizar este estudio en niños menores de 5 años. Para niños de 3 a 5 años, el test debe ser prescrito y supervisado por un profesional de la salud.	: Se informa para cada paciente

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
MICORECO				
TEST MICROBIOTA INTESTINAL COMPLETO (NUEVO)	No se aplica.	20	Rec. 5 g Heces (1 x Contenedor estéril) [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Heces (1 x Kit específico) Rec. 1 g Heces (1 x Recipiente de plástico) [Refr.] Coordinar previamente toma y envío de muestras con el laboratorio. Kit específico COPROPACK SF-FIX (ref 600064120) Las muestras deben llegar al laboratorio de lunes a jueves.	MICROBIOTA INTESTINAL CORE VIVOLABS: Se informa para cada paciente
NAGA				
TEST NAGALASA, PLASMA	Espectrometría.	21	Rec. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Se recomienda suspender toda medicación como mínimo 5 días antes.	La actividad de la enzima alfa-N-acetilgalactosaminidasa (nagalasa) puede estar aumentada en pacientes con determinadas infecciones virales (p.e. HIV, Epstein-Barr, Herpes Zóster e Influenza), lupus eritematoso sistémico o determinados tipos de cancer. El análisis de la actividad enzimática se utiliza básicamente para monitorizar el tratamiento, y los resultados debieran interpretarse en este sentido. Los valores pueden verse afectados por la toma de ciertos medicamentos durante los cinco días previos a la obtención de la muestra. 0,32 - 0,95 nmol/min/mg

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
DCSI **TEST NUTRICIONAL AVANZADO**	Array- SNPs	30	Rec. 4 mL Suero (1 x Alicuota) [Cong.] Rec. 4 mL Suero (1 x Alicuota) [Refr.] Rec. 3 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 3 mL Plasma EDTA (2 x Alicuota) [Cong.] Ayuno de 8 horas. Se requiere consentimiento informado. Cumplimentar peticionario específico obligatorio. Realizar la extracción en horario compatible con el envío de la muestra el mismo día de la extracción.	MOG NUTRICION · GENOTIPADO: Indicado en informe adjunto
EVAZ **TEST PRENATAL EVERLI AVANZADO**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	6	Rec. 10 mL Sangre total (1 x Tubo Streck Cell-Free DNA BCT) KIT ESPECIAL + INSTRUCCIONES Se requiere consentimiento informado. Mantener y enviar a temperatura ambiente el mismo día de extracción. - Indicada para mujeres con embarazo único (un feto) Al menos 10 semanas de edad gestacional.	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
EVBA **TEST PRENATAL EVERLI BÁSICO**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	6	Rec. 10 mL Sangre total (1 x Tubo Streck Cell-Free DNA BCT) KIT ESPECIAL + INSTRUCCIONES Se requiere consentimiento informado. Mantener y enviar a temperatura ambiente el mismo día de extracción. No está indicado en mujeres que presenten gestaciones con más de 2 fetos. Al menos 10 semanas de edad gestacional.	
EVCO **TEST PRENATAL EVERLI COMPLETO**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	6	Rec. 10 mL Sangre total (1 x Tubo Streck Cell-Free DNA BCT) KIT ESPECIAL + INSTRUCCIONES Se requiere consentimiento informado. Mantener y enviar a temperatura ambiente el mismo día de extracción. No está indicado en mujeres que presenten gestaciones con más de 2 fetos. Al menos 10 semanas de edad gestacional.	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
EVPL **TEST PRENATAL EVERLI PLUS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	10	Rec. 20 mL Sangre total (2 x Tubo Streck Cell-Free DNA BCT) KIT ESPECIAL + INSTRUCCIONES Se requiere consentimiento informado. Mantener y enviar a temperatura ambiente el mismo día de extracción. - Indicada para mujeres con embarazo único (un feto) Al menos 10 semanas de edad gestacional.	
EV21 **TEST PRENATAL EVERLI TRISOMIA 21**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	6	Rec. 10 mL Sangre total (1 x Tubo Streck Cell-Free DNA BCT) KIT ESPECIAL + INSTRUCCIONES Se requiere consentimiento informado. Mantener y enviar a temperatura ambiente el mismo día de extracción. No está indicado en mujeres que presenten gestaciones con más de 2 fetos. Al menos 10 semanas de edad gestacional.	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
MICOREPL					
TEST SALUD DIGESTIVA PLUS (NUEVO)	No se aplica.	20	Rec. 5 g Heces (1 x Contenedor estéril) [Refr.] Rec. 2 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 1 g Heces (1 x Recipiente de plástico) [Refr.] - Los tratamientos con inmunosupresores y/o corticosteroides interfieren en este estudio. En el caso de tratamiento con antihistamínicos es recomendable no estar bajo este tipo de tratamientos en el momento de la extracción. (se aconseja 15 días sin tomar antihistaminico a criterio médico) - Indicar edad, sexo y motivo de solicitud. - No se recomienda realizar la prueba a pacientes embarazadas, a no se que el médico lo estime oportuno. Coordinar previamente toma y envío de muestras con el laboratorio. Las muestras deben llegar al laboratorio de lunes a jueves.	MICROBIOTA INTESTINAL CORE VIVOLABS: para cada paciente	Se informa

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
TES30 **TESTOSTERONA (30'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 30 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	ng/dL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
TES60 **TESTOSTERONA (60'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 60 m. [Refr.]	ng/dL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
TES180 **TESTOSTERONA (180'), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero 180 m. [Refr.]	ng/dL Interpretar con el conjunto de resultados de la prueba. Consultar anexo pruebas funcionales.
FTESO **TESTOSTERONA EN ORINA DE 24 HORAS**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 10 mL Orina 24h. (alícuota) (1 x Contenedor 2500 mL.) [Refr.]	Hombres 25,00 - 125,00 µg/24h Mujeres 5,00 - 35,00 µg/24h Niños Inf 10,00 µg/24h
TEBD **TESTOSTERONA LIBRE Y BIODISPONIBLE**	Cálculo.	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Testosterona biodisponible: Hombres 0,80 - 4,30 ng/mL Testosterona biodisponible: Mujeres Inf 0,15 ng/mL Testosterona libre estimada: Mujeres 0 - 15 Años Inf 2,70 ng/dL Testosterona libre estimada: Hombres 0 - 15 Años Inf 1,80 ng/dL Testosterona libre estimada: Hombres 15 - 40 Años 8,30 - 40,10 ng/dL Testosterona libre estimada: Mujeres 15 - 40 Años Inf 4,60 ng/dL Testosterona libre estimada: Mujeres 40 - 60 Años Inf 4,00 ng/dL Testosterona libre estimada: Hombres 40 - 60 Años 6,10 - 25,70 ng/dL Testosterona libre estimada: Mujeres Sup - 60 Años Inf 2,10 ng/dL Testosterona libre estimada: Hombres Sup - 60 Años 5,00 - 28,80 ng/dL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
TESTS **TESTOSTERONA LIBRE, SALIVA**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Saliva (1 x Tubo sin aditivos) [Cong.] No usar Salivetes Rechazo: Muestras contaminadas con sangre. Durante los 30 minutos antes de obtener la muestra de saliva no ingiera alimentos, no beba, no fume ni mastique chicle.	Hombres 20 - 29 Años 36,30 - 117,91 pg/mL Mujeres 20 - 29 Años Inf 42,50 pg/mL Mujeres 30 - 39 Años Inf 42,50 pg/mL Hombres 30 - 39 Años 28,57 - 83,93 pg/mL Hombres 40 - 49 Años 27,20 - 81,83 pg/mL Mujeres 40 - 49 Años Inf 42,50 pg/mL Mujeres 50 - 59 Años Inf 42,50 pg/mL Hombres 50 - 59 Años 27,12 - 77,15 pg/mL Hombres 60 - 69 Años 21,63 - 73,04 pg/mL Mujeres 60 - 69 Años Inf 34,20 pg/mL
PTESL **TESTOSTERONA LIBRE, SUERO**	Radioinmunoanálisis.	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Hombres 0 - 15 Años Inf 1,80 pg/mL Mujeres 0 - 15 Años Inf 2,70 pg/mL Mujeres 15 - 40 Años Inf 4,60 pg/mL Hombres 15 - 40 Años 5,40 - 40,00 pg/mL Hombres 40 - 60 Años 3,60 - 25,70 pg/mL Mujeres 40 - 60 Años Inf 4,00 pg/mL Hombres Sup - 60 Años 1,50 - 28,80 pg/mL Mujeres Sup - 60 Años Inf 5,00 pg/mL
CTCS **TESTOSTERONA LIBRE/CORTISOL COCIENTE, SALIVA**	Cálculo.	6	Rec. 1 mL Saliva [Cong.]	
CTBC **TESTOSTERONA TOTAL / TESTOSTERONA LIBRE COCIENTE, SUERO**	Cálculo.	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
CTTC **TESTOSTERONA TOTAL/CORTISOL COCIENTE, SUERO**	Inmunoanálisis quimioluminiscente de micropartículas (CMIA)	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Cortisol: 3,70 - 19,40 µg/dL Cortisol: Despues de las 17:00 2,90 - 17,30 µg/dL Cociente testosterona total / cortisol: Interpretación según criterio clínico Testosterona total: Tanner I Hombres Inf= 0,30 ng/mL Testosterona total: Tanner I Mujeres Inf= 0,32 ng/mL Testosterona total: Tanner II Hombres Inf= 2,78 ng/mL Testosterona total: Tanner II Mujeres Inf= 0,22 ng/mL Testosterona total: Tanner III Hombres 0,09 - 6,55 ng/mL Testosterona total: Tanner III Mujeres 0,07 - 0,41 ng/mL Testosterona total: Tanner IV Hombres 0,20 - 7,54 ng/mL Testosterona total: Tanner IV Mujeres 0,15 - 0,54 ng/mL Testosterona total: Tanner V Hombres 0,17 - 9,02 ng/mL Testosterona total: Tanner V Mujeres 0,17 - 0,99 ng/mL Testosterona total: Hombres 0 - 1 Años 0,09 - 2,99 ng/mL Testosterona total: Mujeres 0 - 1 Años Inf 0,62 ng/mL Testosterona total: Mujeres 1 - 9 Años Inf 0,62 ng/mL Testosterona total: Hombres 1 - 9 Años Inf 0,36 ng/mL Testosterona total: Hombres 9 - 16 Años Inf 6,32 ng/mL Testosterona total: Mujeres 9 - 16 Años Inf 0,44 ng/mL Testosterona total: Mujeres 16 - 21 Años 0,14 - 0,49 ng/mL Testosterona total: Hombres 16 - 21 Años 1,48 - 7,94 ng/mL Testosterona total: Hombres 21 - 50 Años 2,40 - 8,70 ng/mL Testosterona total: Mujeres 21 - 50 Años 0,14 - 0,53 ng/mL Testosterona total: Mujeres Sup - 50 Años 0,12 - 0,36 ng/mL Testosterona total: Hombres Sup - 50 Años 2,21 - 7,16 ng/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
TES **TESTOSTERONA, SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Tanner I Hombres Inf= 0,30 ng/mL Tanner I Mujeres Inf= 0,32 ng/mL Tanner II Hombres Inf= 2,78 ng/mL Tanner II Mujeres Inf= 0,22 ng/mL Tanner III Hombres 0,09 - 6,55 ng/mL Tanner III Mujeres 0,07 - 0,41 ng/mL Tanner IV Hombres 0,20 - 7,54 ng/mL Tanner IV Mujeres 0,15 - 0,54 ng/mL Tanner V Hombres 0,17 - 9,02 ng/mL Tanner V Mujeres 0,17 - 0,99 ng/mL Hombres 0 - 1 Años 0,09 - 2,99 ng/mL Mujeres 0 - 1 Años Inf 0,62 ng/mL Mujeres 1 - 9 Años Inf 0,62 ng/mL Hombres 1 - 9 Años Inf 0,36 ng/mL Hombres 9 - 16 Años Inf 6,32 ng/mL Mujeres 9 - 16 Años Inf 0,44 ng/mL Hombres 16 - 21 Años 1,48 - 7,94 ng/mL Mujeres 16 - 21 Años 0,14 - 0,49 ng/mL Mujeres 21 - 50 Años 0,14 - 0,53 ng/mL Hombres 21 - 50 Años 2,40 - 8,70 ng/mL Hombres Sup - 50 Años 2,21 - 7,16 ng/mL Mujeres Sup - 50 Años 0,12 - 0,36 ng/mL
PCET **TETRACLOROETILENO, SANGRE TOTAL**	Cromatografía de Gases / Captura Electrónica.	11	Rec. 3 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Antes última jornada laboral.	BEIs® (ACGIH®): Principio de la última jornada de la semana laboral (Percloroetileno) 0,00 - 0,50 mg/L VLB®-INSST: Principio de la última jornada de la semana laboral 0,00 - 0,40 mg/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
THC **TETRAHIDROCANNABINOL (CANNABIS), ORINA**	Enzimoinmunoanálisis	1	Rec. 10 mL Orina (1 x Tubo 10 mL.) [Refr.] Detectable en orina hasta 90 días despues del consumo. Permite la detección de: -11-hidroxi-delta-9-tetrahidrocannabinol -11-Nor-carboxi-delta-8-tetrahidrocannabinol -11-Nor-carboxi-delta-9-tetrahidrocannabinol -8-beta-hidroxi-delta-9-tetrahidrocannabinol -8-beta-11-hidroxi-delta-9-tetrahidrocannabinol -delta-9-tetrahidrocannabinol -cannabinol. Se calibra con 11-Nor-carboxi-delta-9-tetrahidrocannabinol.	Negativo El valor discriminante de la técnica es 50 ng/mL
TETR **TETRAHIDROFURANO, ORINA**	Cromatografía de Gases / Ionización de Llama.	5	Rec. 10 mL Orina final jornada [Refr.]	VLB®-INSST: Final de la jornada laboral (Tetrahidrofurano) Inf 2,00 mg/L
G01101 **TETRALOGÍA DE FALLOT · GATA4 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GATA4 *1*
G01102 **TETRALOGÍA DE FALLOT · JAG1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	JAG1 *1*
G01103 **TETRALOGÍA DE FALLOT · TBX1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TBX1 *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
THVUG **THERMOACTINOMYCES VULGARIS ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 1,00 U/mL Indeterminado: 1,00 - 2,00 U/mL Positivo: Sup 2,00 U/mL
PTHVU **THERMOACTINOMYCES VULGARIS PRECIPITINAS, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	El resultado hace referencia a la concentración de IgG específica. Negativo: Inf 1,00 U/mL Indeterminado: 1,00 - 2,00 U/mL Positivo: Sup 2,00 U/mL
THROMBO **THROMBOINCODE EVALUACIÓN GENÉTICA ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA**	RT-PCR	17	Rec. 3 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] No es necesario estar en ayunas ni suspender medicación. Imprescindible formulario de recogida de datos y consentimiento informado específicos	Interpretación: Indicado en informe adjunto
THROMB2 **THROMBOINCODE EVALUACIÓN GENÉTICA SALUD REPRODUCTIVA**	RT-PCR	17	Rec. 3 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] No es necesario estar en ayunas ni suspender medicación. Imprescindible formulario de recogida de datos y consentimiento informado específicos	Indicado en informe adjunto 7 ABO, F12 [C46T] , F13 [V34L] , F2 [G20210A] , F5 [R506Q, R306G, R306T] , SERPINC1 [A384S] , SERPINE10 [R67X]
THSD7AG **THSD7A ANTICUERPOS IGG, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta en células transfectadas	7	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo: Inf 1/10

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
QAPT **TIEMPO DE CEFALINA (TTPA), PLASMA**	Técnica coagulométrica.	1	Rec. 1 mL Plasma Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) [Refr.] Estable refrigerada 4h	Tiempo de tromboplastina parcial (cefalina) (PTT): seg Ratio de PTT: 0,75 - 1,30
TP **TIEMPO DE PROTROMBINA, PLASMA**	Técnica coagulométrica.	1	Rec. 1 mL Plasma Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) [Refr.] -Dosis administrada, frecuencia y vía de administración	Actividad de Protrombina: 78,00 - 121,00 % Tiempo de Protombina: 12,00 - 15,00 seg
TREP **TIEMPO DE REPTILASE, PLASMA**	Técnica coagulométrica.	3	Rec. 1 mL Plasma Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) [Refr.]	12,00 - 22,00 seg
TT **TIEMPO DE TROMBINA**	Técnica coagulométrica.	2	Rec. 1 mL Plasma Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) [Refr.] Estable 24 h entre 2 - 8 ºC	Inf 21,00 seg
TIMI **TIMIDINQUINASA, SUERO**	Quimioluminiscencia.	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	2,00 - 7,50 U/L
ZH2 **TINCION DE ZIEHL-NEELSEN (2a MUESTRA), ESPUTO**	Tinción / Observación microscópica.	3	Rec. 1 mL Esputo [Refr.]	Se informa para cada paciente
ZH **TINCION DE ZIEHL-NEELSEN, ESPUTO**	Tinción / Observación microscópica.	3	Rec. 5 mL Esputo [Refr.] - Contenedor estéril	Se informa para cada paciente

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ZHLC **TINCION DE ZIEHL-NEELSEN, MUESTRA BIOLÓGICA**	Tinción / Observación microscópica.	3	Alt. 5 mL Esputo (1 x Contenedor estéril) [Refr.] Alt. 5 mL BAS (1 x Contenedor estéril) Alt. 5 mL BAL (1 x Contenedor estéril) Alt. 2 g Heces (1 x Contenedor estéril) [Refr.] Alt. 1 Pieza/s Biopsia (1 x Contenedor con solución salina) [Refr.] Alt. 1 Muestra/s Absceso (1 x Escobillón con medio de transporte.) Alt. 1 mL Semen (1 x Contenedor estéril) [Refr.] Alt. 1 mL Líquido biológico (1 x Tubo estéril) [Refr.] Alt. 1 mL Aspirado bronquial (1 x Contenedor estéril) [Refr.] - Contenedor estéril	No se observan bacilos ácido-alcohol resistentes.
TIOOC **TIOCIANATOS, ORINA**	Espectrometría.	10	Rec. 1 mL Orina [Refr.]	Fumadores 7,00 - 17,00 mg/L No Fumadores 1,00 - 4,00 mg/L
TIOS **TIOCIANATOS, SUERO**	Espectrometría.	10	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Fumadores 3,00 - 12,00 mg/L No Fumadores 1,00 - 4,00 mg/L I.Terapéutico: (Nitroprusiato) 5,00 - 30,00 mg/L Toxicidad: (Nitroprusiato) Sup 35,00 mg/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
TIOTOT **TIOLES TOTALES, PLASMA**	Espectrometría.	15	Rec. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Separar y congelar inmediatamente.	204,00 - 309,00 umol/L
TIOP **TIOPURINA METILTRANSFERASA (TPMT), SANGRE TOTAL**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	16	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rechazo: Muestra Hemolizada	Relación de niveles de actividad de Tiopurina Metiltransferasa con las dosis recomendadas de Azatioprina: Actividad de TPMT — Dosis de Azatioprina recomendada Menos de 5,0 — 0,1 mg/Kg por día 5,0 - 13,7 — 0,5 mg/Kg por día 13,8 - 18,0 — 1,5 mg/Kg por día 18,1-26,0 — 2,5 mg/Kg por día Más de 26,0 — 3,0 mg/Kg por día
TIORI **TIORIDAZINA, PLASMA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	7	Rec. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 1 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.] Obtener la muestra de sangre previamente a la administración del fármaco. Usualmente se determina la concentración en predosis matinal y en ayunas.	Intervalo terapéutico 100,00 - 200,00 ug/L Toxicidad Sup 400,00 ug/L
FKC **TIPAJE DEL GRUPO SANGUINEO KELL, SANGRE TOTAL**	Aglutinación	7	Rec. 1 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Se informa para cada paciente
GLUCOT **TIPIFICACION GLUCOSAMINOGLUCANOS-MUCOPOLISACARIDOSIS, ORINA**	Cromatografía en capa fina / espectrometria.	30	Rec. 50 mL Orina 24h. (alícuota) [Cong.]	Se informa para cada paciente

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
TIRAB **TIROGLOBULINA (ANTITIROIDEOS) ANTICUERPOS, SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] No es necesario estar en ayunas.	Inf 4,11 UI/mL
TGBUS **TIROGLOBULINA ULTRASENSIBLE, SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	3,68 - 64,15 ng/mL
TGBLB **TIROGLOBULINA, LIQUIDO BIOLÓGICO**	Quimioluminiscencia.	2	Rec. 2 mL PAAF [Refr.] Alt. 2 mL Líquido biológico [Refr.]	En pacientes tiroidectomizados con antecedentes de carcinoma diferenciado de tiroides, un valor de tiroglobulina en aspirado superior a 1 ng/mL es sugestivo de presencia de metástasis.
G15211 **TIROIDES EXTENDIDO, NEOPLASIA DE · PANEL · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	12	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	Se informa para cada paciente *50* AKT1, AKT3, ALK, APC, ARID1A, ARID2, ATM, ATRX, BRAF, BRD4, CDKN2A, CDKN2B, CHEK2, CRTC1, CTNNB1, EIF1AX, GNAS, HRAS, KIT, KRAS, MAML2, MAPK1, MAPK3, MSI, MTOR, NCOA4, NF1, NRAS, NTRK1, NTRK2, NTRK3, PAX8, PIK3CA, PIK3R1, PIK3R2, PIK3R3, PPARG, PPM1D, PTEN, RB1, RET, RET-PTC1, RET-PTC3, SMARCA4, TERT, TMB, TP53, TSC1, TSC2, TSHR
G14077 **TIROIDES HEREDITARIO, CÁNCER DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	15	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	APC, DICER1, MEN1, PRKAR1A, PTEN, RET, SDHB, SDHD, TP53, WRN *10*
G03078 **TIROSINEMIA TIPO I · FAH · NGS**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FAH *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
TITA **TITANIO, SUERO**	Espectrometría de masas.	8	Rec. 2 mL Suero (libre trazas metales) (1 x Tubo Suero metales traza) [Refr.] Separar el suero lo antes posible. No usar activador de coagulación ni tapones de goma.	Inf 7,70 µg/L
TOBR **TOBRAMICINA, SUERO**	Inmunoanálisis de donante enzimático clonado (CEDIA)	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Recomendacion extracción: PICO (tratamiento IV): Extacción a los 30 minutos.. PICO (tratamiento IM): Extacción a los 60 minutos VALLE (IV IM) : Extacción antes de la siguiente dosis -Dosis administrada, frecuencia y vía de administración	I.Terapéutico: Pico 5,00 - 10,00 mg/L I.Terapéutico: Valle 1,00 - 2,00 mg/L Toxicidad: Pico Sup 10,00 mg/L Toxicidad: Valle Sup 2,00 mg/L
TOLU **TOLUENO, SANGRE TOTAL**	Cromatografía de Gases / Ionización de Llama.	10	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Principio de la última jornada de la semana laboral.	VLB®-INSST: Principio de la última jornada de la semana laboral (Tolueno) Inf 0,05 mg/L
TOLUO **TOLUENO,ORINA FINAL DE JORNADA**	Cromatografía de Gases / Ionización de Llama.	10	Rec. 3 mL Orina final jornada (1 x Tubo 10 mL.) [Refr.]	VLB®-INSST: 0,08 mg/L Límite de cuantificación: 0,01 mg/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
TOPI **TOPIRAMATO, SUERO**	QMS™.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.] Alternativa: plasma	2,00 - 10,00 µg/mL
G16035 **TOWNES-BROCKS, SÍNDROME · SALL1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SALL1
G18005 **TOXICIDAD POR ISONIAZIDA · NAT2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	NAT2 *1*
CDHE **TOXINA A/B Y ANTÍGENO CLOSTRIDIOIDES DIFFICILE, HECES**	Inmunocromatografía.	3	Rec. 1 g Heces [Refr.]	Antígeno Clostridioides difficile: Negativo Toxina A/B Clostridioides difficile: Negativo
TOXOC **TOXOCARA CANNIS ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 1 mL Plasma Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) [Refr.] Muestras refrigeradas más de 5 días.	Negativo: Inf 0,80 Indice Indeterminado: 0,80 - 1,09 Indice Positivo: Sup= 1,10 Indice
TXCM **TOXOCARA CANNIS ANTICUERPOS IGM, SUERO**	Inmunoblot.	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	No se detecta
DNTXCM **TOXOCARA SPP DNA, MUESTRA BIOLOGICA**	Reacción en cadena de la polimerasa.	5	Rec. 1 mL Líquido biológico (1 x Tubo estéril) [Refr.] Alt. 1 Muestra/s Biopsia (1 x Contenedor con solución salina) [Refr.]	No se detecta

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
AVID **TOXOPLASMA GONDII (TEST DE LA AVIDEZ DE LAS IgG), SUERO**	Quimioluminiscencia.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] No es necesario estar en ayunas.	Baja Avidez: Inf 20,00 % Moderada Avidez: 20,00 - 29,99 % Alta Avidez: Sup= 30,00 % Una Alta Avidez es compatible con una infección antigua. Una Baja Avidez es compatible con una infección aguda primaria.
TOXA **TOXOPLASMA GONDII ANTICUERPOS IgA, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 0,80 Indice Indeterminado: 0,80 - 1,09 Indice Positivo: Sup= 1,10 Indice
TOXGIB **TOXOPLASMA GONDII ANTICUERPOS IgG (IMUNOBLOT), SUERO**	Inmunoblot.	12	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	No se detecta
TOXOGCR **TOXOPLASMA GONDII ANTICUERPOS IGG, LCR**	Quimioluminiscencia.	2	Rec. 1 mL LCR [Refr.]	UI/mL Interpretación según criterio clínico
TOXOD **TOXOPLASMA GONDII ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] No es necesario estar en ayunas.	Negativo: Inf 7,20 UI/mL Indeterminado: 7,20 - 8,79 UI/mL Positivo: Sup= 8,80 UI/mL
TOXOMCR **TOXOPLASMA GONDII ANTICUERPOS IGM, LCR**	Quimioluminiscencia.	2	Rec. 1 mL LCR [Refr.]	Interpretación según criterio clínico
TOXMD **TOXOPLASMA GONDII ANTICUERPOS IgM, SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] No es necesario estar en ayunas.	Negativo: Inf 6,00 UA/mL Indeterminado: 6,00 - 7,99 UA/mL Positivo: Sup= 8,00 UA/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
DNTG **TOXOPLASMA GONDII DNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	PCR-Real Time.	4	Rec. 2 mL Sangre total EDTA [Refr.] Rec. 1 mL Líquido amniótico [Cong.] Rec. 1 mL LCR [Cong.] Alt. 200 uL Humor vitreo/acuoso [Cong.] Alt. 1 Muestra/s Biopsia parafinada	DNA de Toxoplasma gondii (resultado): No se detecta
TPA **TPA ANTÍGENO TISULAR POLIPEPTÍDICO (TPA), SUERO**	Quimioluminiscencia.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Inf 75,00 U/L
COTROR **TRAMADOL CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), ORINA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 10 mL Orina [Refr.]	Se utiliza como criterio de Positividad que la concentración sea superior o igual al valor del límite de cuantificación más el valor de incertidumbre del ensayo. En caso contrario, el resultado es Negativo. Incertidumbre de medida 3,6 ng/mL Límite de cuantificación 25 ng/mL
COTRSAI **TRAMADOL CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SALIVA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 1 mL Saliva [Refr.]	Incertidumbre de medida 1,7 ng/mL Límite de cuantificación 10 ng/mL
COTRSTI **TRAMADOL CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SANGRE**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 10 mL Sangre total Oxalato/Fluoruro (1 x Tubo Sangre Total-Oxalato/Fluoruro) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total Heparina litio (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Tubo oxalato potásico/Fluoruro sódico Ref. SAP 600088318	Incertidumbre de medida 2 ng/mL Límite de cuantificación 10 ng/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
TRAM **TRAMADOL, SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	6	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis. El contenedor recomendado es el tubo seco (sin gel separador) para evitar procesos de adsorción del fármaco. En caso de no disponer de tubo seco, la extracción se puede realizar en tubo con gel separador, separando el suero dentro de las 2 horas posteriores a la recolección y transfiriéndolo a un tubo de alícuota para su transporte al laboratorio. Rechazo: Muestra hemolizada, lipémica y/o ictérica	I.Terapéutico: 100,00 - 1000 µg/L Toxicidad: Sup 1000,00 µg/L Límite de cuantificación: 25,00 µg/L
RST **TRANSFERRINA (RECEPTOR SOLUBLE DE LA TRANSFERRINA), SUERO**	Nefelometría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	0,76 - 1,76 mg/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
CDT **TRANSFERRINA DEFICITARIA EN CARBOHIDRATOS (CDT), SUERO**	Nefelometría.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Inf 2,47 %
TRNS **TRANSFERRINA NO SATURADA, SUERO**	Cálculo.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Transferrina no saturada: 130,00 - 380,00 mg/dL
TRF **TRANSFERRINA, SUERO**	Turbidimetría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	200,00 - 360,00 mg/dL
ATRAN **TRANSGLUTAMINASA TISULAR IgA ANTICUERPOS, SUERO**	Fluoroenzimoinmunoanalisis.	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 1 mL Plasma Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) [Refr.]	Los resultados de anticuerpos anti-transglutaminasa IgA deben ser interpretados de forma conjunta con la inmunoglobulina IgA para descartar un posible déficit. Negativo: Inf 7,00 U/mL Indeterminado: 7,00 - 10,00 U/mL Positivo: Sup 10,00 U/mL
ATRG **TRANSGLUTAMINASA TISULAR IgG ANTICUERPOS, SUERO**	Fluoroenzimoinmunoanalisis.	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 1 mL Plasma Citrato sódico (1 x Tubo sangre citrato.) [Refr.] Rechazo: Muestra ictérica Rechazo: Muestra Hemolizada	Negativo: Inf 7,00 U/mL Indeterminado: 7,00 - 10,00 U/mL Positivo: Sup 10,00 U/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
TRSQ **TRANSKETOLASA ERITROCITARIA CON ACTIVACIÓN DE TPP, SANGRE TOTAL**	Espectrometría.	32	Rec. 3 mL Sangre total EDTA [Refr.] Rec. 1 mL Sangre total Heparina sódica [Refr.] Sin efectos de transfusión reciente (1 mes) Envio en 48 horas Indicar edad, sexo y motivo de solicitud. Las muestras deben llegar a nuestro laboratorio de lunes a miércoles,nunca los Viernes ni vísperas de festivos.	ETKac (Coeficiente de actividad): Inf 1,16 Indica actividad de TK adecuada con valores de tiamina en rango. 1,16 - 1,24 Indica riesgo moderado de clínica derivada de la deficiencia de actividad de TK por descenso de tiamina. Sup 1,24 Indica alto riesgo de clínica derivada de la deficiencia de actividad de TK por descenso de tiamina.: Inf 1,16 Actividad Transketolasa: 0,10 - 0,40 UI/g Hb Actividad Transketolasa + Vitamina B1 (TTP) : 0,10 - 0,40 UI/g Hb	
G1123 **TRAPS (FIEBRE PERIÓDICA FAMILIAR), SÍNDROME DE · TNFRSF1A · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TNFRSF1A	*1*
G03139 **TRASTORNO CONGÉNITO DE LA GLICOSILACIÓN TIPO IA · PMM2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PMM2	*1*
G03100 **TRASTORNOS DEL DESARROLLO SEXUAL CON CARIOTIPO 46,XY POR DEFICIENCIA DE 17-BETA-HIDROXIESTEROIDE DESHIDROGENASA · HSD17B3 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	HSD17B3	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
TRAZ **TRAZODONA, SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	6	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis. El contenedor recomendado es el tubo seco (sin gel separador) para evitar procesos de adsorción del fármaco. En caso de no disponer de tubo seco, la extracción se puede realizar en tubo con gel separador, separando el suero dentro de las 2 horas posteriores a la recolección y transfiriéndolo a un tubo de alícuota para su transporte al laboratorio. Rechazo: Muestra hemolizada, lipémica y/o ictérica	I.Terapéutico: 700,00 - 1000 µg/L Toxicidad: Sup 1200,00 µg/L Límite de cuantificación: 60,00 µg/L	
G16006 **TREACHER COLLINS 1, SÍNDROME DE · TCOF1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TCOF1	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G7423 **TREACHER COLLINS, SÍNDROME DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	POLR1C, POLR1D, TCOF1 [POLR1D POLR1C] *3*
AATS **TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS (SCREENING), SUERO**	Quimioluminiscencia.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 1,00 Indice Positivo: Sup= 1,00 Indice
FTAT **TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS IgG (TÍTULO), SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	4	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/10 Interpretación: Positivo: Sup= 1/10
WTPG **TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS IgG CONFIRMATORIO, SUERO**	Western-Blot.	6	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] IMPRESCINDIBLE: Solicitud analítica aportando datos clínicos y resultado de pruebas reagínicas y treponémicas.	Interpretación: Negativo: ninguna banda positiva. Dudoso: sólo se observa una banda positiva. Positivo: se observa más de una banda positiva.
FTACR **TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS IGG, LCR**	Inmunofluorescencia Indirecta.	3	Rec. 1 mL LCR [Refr.]	Negativo
FTA **TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo
WTPM **TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS IgM CONFIRMATORIO, SUERO**	Western-Blot.	6	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] IMPRESCINDIBLE: Solicitud analítica aportando datos clínicos y resultado de pruebas reagínicas y treponémicas.	Interpretación: Negativo: ninguna banda positiva. Dudoso: sólo se observa una banda positiva. Positivo: se observa más de una banda positiva.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
FTAMCR **TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS IGM, LCR**	Inmunofluorescencia Indirecta.	3	Rec. 1 mL LCR [Refr.]	Negativo: Inf 1/2 Positivo: Sup= 1/2
FTAM **TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS IgM, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo
DNTP **TREPONEMA PALLIDUM DNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	PCR-Real Time.	5	Rec. 5 mL Orina (primera micción) (1 x Tubo 10 mL.) [Cong.] Rec. 2 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Exudado genital (1 x Escobillón seco.) [Refr.] Alt. 1 mL LCR (1 x Tubo estéril) [Cong.] Alt. 1 mL Humor vitreo/acuoso (1 x Tubo estéril) [Cong.] Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío.	DNA de Treponema pallidum: No se detecta
ATRI **TRICHINELLA SPIRALIS (TRIQUINOSIS) ANTICUERPOS IGG, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 9,00 NTU Indeterminado: 9,00 - 11,00 NTU Positivo: Sup 11,00 NTU El diagnóstico de la infección por Trichinella spiralis no puede basarse exclusivamente en el resultado de este procedimiento de enzimoinmunoanálisis, sino que debe interpretarse juntamente con el resto de los procedimientos complementarios y de los hallazgos clínicos.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
DNTV **TRICHOMONAS VAGINALES DNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	PCR-Real Time.	5	Rec. 1 Muestra/s Exudado vaginal (1 x Escobillón seco.) [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Exudado uretral (1 x Escobillón seco.) [Refr.] Rec. 1 mL Orina (primera micción) [Cong.] Alt. 1 Pieza/s Tejido parafinado Alt. 1 mL Semen [Cong.] Alt. 1 mL Secreción prostática [Cong.] Alt. 1 mL LCR [Cong.] Alt. 1 mL Lavado seminal [Cong.]	DNA Trichomona vaginales: No se detecta
TRIS **TRICLOROETANOL, SANGRE TOTAL**	Cromatografía de Gases / Captura Electrónica.	10	Rec. 3 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Final de la jornada laboral y final semana.	VLB®-INSST: Final de la semana laboral (Tricloroetileno) Inf 0,50 mg/L
G13108 **TRICOLEUCEMIA · BRAF (V600E) · HOT SPOT**	Hot Spot	7	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BRAF [V600E] *1*
TGL **TRIGLICÉRIDOS, LÍQUIDO BIOLÓGICO**	Enzimático.	1	Rec. 1 mL Líquido biológico [Refr.] Ayuno mínimo de 10 horas	mg/dL Interpretación según criterio clínico
TG **TRIGLICERIDOS, SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Ayuno mínimo de 10 horas	Inf 150,00 mg/dL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G11128 **TRIGONOCEFALIA TIPO 1 · FGFR1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FGFR1 *1*
G03080 **TRIMETILAMINURIA PRIMARIA GRAVE · FMO3 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FMO3 *1*
TRIP **TRIPSINA, SUERO**	Radioinmunoanálisis.	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	153,00 - 738,00 ng/mL
TRILAG **TRIPTASA, LAGRIMA**	Fluoroenzimoinmunoanalisis.	5	Rec. 500 uL Lágrima (1 x Tubo estéril) [Refr.]	µg/L No se dispone de valores de referencia. Valorar a criterio clínico.
TMCN **TRIPTASA, MOCO NASAL**	Fluoroenzimoinmunoanalisis.	5	Rec. 1 mL Moco nasal [Refr.]	µg/L No se dispone de valores de referencia. Valorar a criterio clínico.
TRIPT **TRIPTASA, SUERO**	Fluoroenzimoinmunoanalisis.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 11,00 µg/L
TRTF **TRIPTOFANO, PLASMA**	Cromatografía Líquida Alta Resolución / Fluorimetría.	6	Rec. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Rechazo: Muestra Hemolizada	Ambos 0 - 30 Días Inf 60,00 µmol/L Ambos 1 - 24 Meses 23,00 - 71,00 µmol/L Prematuros 28,00 - 136 µmol/L Ambos 2 - 18 Años Inf 79,00 µmol/L Ambos Sup - 18 Años 10,00 - 140,00 µmol/L
G04028 **TROMBOCITOPENIA (ALTERACIONES DE PLAQUETAS) · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABCG5, ABCG8, ADAMTS13, ANKRD26, CD36, CYCS, ETV6(TEL), FLI1, FLNA, GATA1, GFI1B, GP1BA, GP1BB, GP9, ITGA2, ITGA2B, ITGB3, MASTL, MPL, MYH9, NBEAL2, RBM8A, RUNX1, SRC, WAS *25*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G7323 **TROMBOCITOPENIA · MPL · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	MPL
G13144 **TROMBOCITOSIS ESENCIA/MIELOFIBROSIS PRIMARIA · CALR(9) · A.FRAGMENTOS**	Análisis de Fragmentos	7	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 4 mL Médula ósea EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CALR [9] *1*
G01138 **TROMBOEMBOLISMO VENOSO · PROCR · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PROCR *1*
G04009 **TROMBOFILIA HEREDITARA POR DEFICIENCIA CONGÉNITA DE PROTEÍNA C · PROC · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PROC *1*
G04008 **TROMBOFILIA HEREDITARA POR DEFICIENCIA CONGÉNITA DE PROTEÍNA C · PROC · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PROC *1*
G04017 **TROMBOFILIA HEREDITARIA POR DEFICIENCIA CONGÉNITA DE ANTITROMBINA · SERPINC1(p.Ala384Ser) · HOT SPOT**	Hot Spot	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	SERPINC1 [p.Ala384Ser] *1*
GENTP **TROMBOFILIA POR FACTOR II PROTROMBINA, SUSCEPTIBILIDAD A · F2(G20210A) · HOT SPOT**	Hot Spot	7	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	F2 [G20210A] *1*
G04025 **TROMBOFILIA POR FACTOR V CAMBRIDGE, SUSCEPTIBILIDAD A · F5(Arg306Thr) · HOT SPOT**	Hot Spot	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	F5 [Arg306Thr] *1*
GENFV **TROMBOFILIA POR FACTOR V LEIDEN, SUSCEPTIBILIDAD A · F5(R506Q) · HOT SPOT**	Hot Spot	7	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	F5 [R506Q] *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G04034 **TROMBOFILIA POR FACTOR V, SUSCEPTIBILIDAD A · F5 (His1299Arg (HR2)) · HOT SPOT**	Hot Spot	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	F5 [His1299Arg (HR2)]	*1*
TRFL **TROMBOFILIA: MUTACIONES C677T y A1298C GEN MTHFR, SANGRE TOTAL**	PCR-Real Time.	7	Rec. 4 mL Sangre total (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Se informa para cada paciente MTHFR [A1298C] , MTHFR [C677T]	*2*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ETNA **TROMBOPENIA NEONATAL ALOINMUNE**	No se aplica.	30	Se requieren las muestras siguientes: NEONATO: 1 tubo EDTA (0.5 ml) MADRE: 4 tubos EDTA de 10 ml 1 tubo EDTA 3-5 ml 1 tubo Citrato 3-5 ml 1 tubo sin anticoagulante 10 ml PADRE: 4 tubos EDTA de 10 ml Temperatura ambiente. La muestra debe recepcionarse dentro de las 24 horas posteriores a su obtención. Realizar la extracción de lunes a miércoles laborables, evitando vísperas de festivos. Adjuntar datos de la historia clínica y forma de contacto con el solicitante.	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
DNTW **TROPHERYMA WHIPPELII (ENFERMEDAD WHIPPLE) DNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	PCR-Real Time.	6	Rec. 10 mL Orina (1 x Contenedor 25 mL.) [Refr.] Rec. 1 g Heces (1 x Recipiente estéril) [Refr.] Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío.	No se detecta
HSTNIAB **TROPONINA I ALTA SENSIBILIDAD (HS-CTNI), SUERO**	Quimioluminiscencia.	2	Rec. 5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 5 mL Plasma Heparina litio (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Hombres Inf 34,20 ng/L Mujeres Inf 15,60 ng/L
HSTNT **TROPONINA T ALTA SENSIBILIDAD (HS-CTNT), SUERO**	Electroquimioluminiscencia.	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	Hombres Inf 16,00 ng/L Mujeres Inf 9,00 ng/L Punto de corte utilizado: percentil 99 de población de referencia separado por sexos
G15188 **TRUBLOOD (4 different solid tumors)**	Inmunocitoquímica.	13	Rec. 30 mL Sangre total EDTA (3 x Tubo 10 mL.) [Refr.] Estudio de solicitud restringida. Consultar previamente con el laboratorio	Indicado en informe adjunto
G15187 **TRUBLOOD PROSTATE**	Inmunocitoquímica.	13	Rec. 30 mL Sangre total EDTA (3 x Tubo 10 mL.) [Refr.] Estudio de solicitud restringida. Consultar previamente con el laboratorio	Indicado en informe adjunto

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G19026 **TRUCHECK INTELLI**	Inmunocitoquímica.	13	Rec. 30 mL Sangre total EDTA (3 x Tubo 10 mL.) [Refr.] Estudio de solicitud restringida. Consultar previamente con el laboratorio	Indicado en informe adjunto
DNTB **TRYPANOSOMA BRUCEI DNA, MUESTRA BIOLOGICA**	Reacción en cadena de la polimerasa.	8	Rec. 3 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 3 mL LCR (1 x Tubo Polipropileno) [Refr.] Rec. 3 mL Biopsia / aspirado ganglionar (1 x Tubo estéril) [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Exudado de chancro (1 x Escobillón seco.) [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Biopsia / aspirado ganglionar (1 x Contenedor estéril) [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Biopsia (1 x Contenedor estéril) [Refr.]	No se detecta
TRYCG **TRYPANOSOMA CRUZI (ENFERMEDAD DE CHAGAS) ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/40 Interpretación: Positivo: Sup= 1/40
TRYCM **TRYPANOSOMA CRUZI (ENFERMEDAD DE CHAGAS) ANTICUERPOS IgM, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/12 Interpretación: Positivo: Sup= 1/12

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
DTRC **TRYPANOSOMA CRUZI (ENFERMEDAD CHAGAS) DNA, SANGRE TOTAL**	Reacción en cadena de la polimerasa.	3	Rec. 1 mL Sangre total EDTA [Refr.] Remitir informe clínico	No se detecta
TRYPTEJ **TRYPANOSOMA CRUZI (ENFERMEDAD CHAGAS) DNA, TEJIDO**	PCR-Real Time.	8	Rec. 1 Pieza/s Biopsia parafinada (1 x Contenedor rígido de transporte de muestras) Rec. 1 Pieza/s Biopsia (1 x Contenedor con solución salina) [Refr.]	No se detecta
TRYPLCR **TRYPANOSOMA CRUZI DNA, LCR**	Reacción en cadena de la polimerasa.	8	Rec. 1 mL LCR (1 x Tubo estéril) [Cong.]	No se detecta
MACTSH **TSH (ESTUDIO MACRO TSH), SUERO**	Quimioluminiscencia.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Presencia Macro TSH: Inf 40,00 % recuper Ausencia Macro TSH: 40,00 - 100,00 % recuper
G15216 **TSO500 DNA + RNA AMPLIADO · PANEL · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	12	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	Se informa para cada paciente
G15215 **TSO500 DNA + RNA · PANEL · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	12	Rec. 1 Pieza/s Tejido parafinado	Se informa para cada paciente
G15214 **TSO500 DNA · PANEL · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	12	Rec. 1 mL Tejido parafinado	Se informa para cada paciente
G09011 **TUMOR DE WILMS TIPO 1 · WT1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	WT1 *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G11152 **ULLRICH, DISTROFIA MUSCULAR CONGÉNITA / BETHLEM, MIOPATÍA DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	COL12A1, COL6A1, COL6A2, COL6A3 *4*
PATR2HJ2 **UN INDIVIDUO ADICIONAL LEGAL (PRUEBAS PATERNIDAD/PARENTESCO)**	PCR-Análisis de fragmentos.	12	Rec. 2 Muestra/s Frotis bucal (2 x Kit específico) Contactar con el laboratorio antes de solicitar el estudio. Kit especial con cadena de custodia + hoja de solicitud de paternidad judicial 2 hisopos bucales (sin medio) por paciente	
URASU **URACILO, SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	9	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Sup 150,00 ng/mL 16,00 - 150,00 ng/mL Normalidad: Inf 16,00 ng/mL
URANIOR **URANIO, ORINA**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	10	Rec. 10 mL Orina final jornada [Refr.]	BEIs® (ACGIH®): 200,00 µg/L Concentraciones inferiores a 40 µg/L son indicativos de exposición anterior. Concentraciones superiores a 100 µg/L son indicativos de exposición reciente.
URASG **URANIO, SANGRE TOTAL**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	6	Rec. 1 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 1 mL Sangre total Heparina litio (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Inf 0,04 µg/L
AUOR **URATO EN ORINA DE MICCIÓN (CONCENTRACIÓN)**	Enzimático - colorimétrico.	1	Rec. 10 mL Orina [Refr.]	mg/dL Interpretación según criterio clínico

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
USO **UREA ,ORINA 24H**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Orina 24h. (alícuota) (1 x Contenedor 2500 mL.) [Refr.]	Excreción (24h): 13,00 - 36,00 g/24h Concentración:: mg/dL Volumen de orina remitido (diuresis): 600,00 - 1600,00 mL
UPOS **UREA POST DIÁLISIS, SUERO**	Enzimático.	1	Rec. 1 mL Suero post-diálisis (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	17,00 - 43,00 mg/dL
USL **UREA, LÍQUIDO BIOLÓGICO**	Espectrometría.	2	Rec. 1 mL Líquido biológico [Refr.]	mg/dL Interpretación según criterio clínico
UOR **UREA, ORINA**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Orina [Refr.]	mg/dL Interpretación según criterio clínico
US **UREA, SUERO**	Espectrometría.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	17,00 - 49,00 mg/dL
AURG **UREAPLASMA UREALYTICUM ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/32 Interpretación: Positivo: Sup= 1/32
AURM **UREAPLASMA UREALYTICUM ANTICUERPOS IgM, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/32 Interpretación: Positivo: Sup= 1/32

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
DURL **UREAPLASMA UREALYTICUM/PARVUM DNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	PCR-Real Time.	5	Rec. 4 mL Orina (primera micción) (1 x Tubo 5 mL.) [Cong.] Rec. 1 Muestra/s Exudado vaginal (1 x Escobillón seco.) [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Exudado uretral (1 x Escobillón seco.) [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Exudado cervical (1 x Escobillón seco.) [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Citología líquida [Refr.] Alt. 1 mL Secreción prostática [Cong.] Alt. 1 mL Líquido amniótico [Refr.] Alt. 1 mL LCR (1 x Tubo estéril) [Cong.] Alt. 1 mL LCR [Cong.] Alt. 1 mL Lavado seminal (1 x Tubo estéril) [Cong.] Recoger los 2-3 primeros ml de la primera micción de la mañana en un contenedor estéril, y desechar el resto para evitar la dilución de la muestra.	DNA de Ureaplasma urealyticum/parvum:	No se detecta
G09057 **URÉMICO ATÍPICO, SÍNDROME DE ,HAPLOTIPOS DE RIESGO · CFH, CD46 · HOT SPOT**	Secuenciación Sanger	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CD46 [(rs2796247, rs2796268, rs1962149, rs859705, rs7144)] ,2 CFH [(rs3753394, rs3753396, rs1065489, rs800292, rs1061170)]	
G09054 **URÉMICO ATÍPICO, SÍNDROME · PANEL · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CFH, CFHR1, CFHR2, CFHR3, CFHR4, CFHR5	6

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G09012 **URÉMICO ATÍPICO, SÍNDROME · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ADAMTS13, C3, CD46, CFB, CFH, CFHR1, CFHR2, CFHR3, CFHR4, CFHR5, CFI, CFP, DGKE, MMACHC, THBD *15*
URO **UROCULTIVO (CULTIVO, ORINA)**	Cultivo en medio cromogénico.	3	Rec. 10 mL Orina [Refr.] - Contenedor estéril	Negativo
URO2 **UROCULTIVO (CULTIVO, ORINA) (2a MUESTRA)**	Cultivo en medio cromogénico.	5	Rec. 5 mL Orina (1 x Contenedor estéril) [Refr.]	Urocultivo (2ª muestra): Negativo Urocultivo: Negativo
UPBGDC **UROPORFOBILINOGENO DECARBOXILASA**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	32	Rec. 10 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	45,00 - 90,00 U/L
G12056 **USHER TIPO 1B, SÍNDROME · MYO7A · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	MYO7A *1*
G16036 **USHER TIPO 2A, SÍNDROME DE · USH2A · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	USH2A *1*
G16007 **USHER TIPO 2A, SÍNDROME DE · USH2A · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	USH2A *1*
G16008 **USHER, SÍNDROME DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ABHD12, ARSG, CDH23, CEP78 , CIB2, CLRN1, HARS, MYO7A, PCDH15, PDZD7, USH1C, USH1G, USH2A, WHRN *14*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
USTE **USTEKINUMAB / ANTICUERPOS ANTI-USTEKINUMAB, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	8	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Extracción realizada antes de la siguiente toma. Indicar la primera toma, la frecuencia, la dosis y la fecha de la última dosis. Remitir informe clínico y motivo de solicitud de estudio. Se recomienda la toma de muestra 6 semanas después de la infusión de Stelara®	Ac. Ustekinumab: Inf 3,00 UA/mL Ustekinumab: 0,95 - 1,80 ug/mL
PHH **VALORACION DE PH, HECES**	Colorimétrico.	5	Rec. 1 g Heces [Refr.]	5,00 - 6,00

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
PEEA **VALORACION DEL ESTRES, SALIVA**	Enzimoinmunoanálisis	8	Rec. 1 mL Saliva 8 h (1 x Kit específico) [Cong.] Rec. 1 mL Saliva 24 h (1 x Kit específico) [Cong.] Rec. 1 mL Saliva 16 h (1 x Kit específico) [Cong.] Rec. 1 mL Saliva 13 h (1 x Kit específico) [Cong.] La toma de muestras debe realizarse a las 08:00h, 13:00h, 16:00h y 00:00h. Kit especifico Salivette. No es necesario estar en ayunas. Durante los 60 minutos antes de obtener su muestra de saliva no ingiera alimentos, no beba, no fume ni mastique chicle.	: Indicado en informe adjunto
G01181 **VALVULOPATÍAS · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	AEBP1, B3GAT3, CBL, DCHS1, DDX58, DZIP1, ELN, FBLN5, FBN1, FLNA, FOXC1, G6PC3, GLB1, HAAO, HRAS, IFIH1, KANSL1, KRAS, LZTR1, MYH7, NEK8, NOTCH1, NR2F2, NRAS, PRDM5, PTPN11, ROBO4, SHOC2, SKI, SMAD6, TAB2, TNXB, XYLT1, XYLT2
VAOR **VANADIO, ORINA**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	5	Rec. 1 mL Orina inicio jornada (1 x Tubo 10 mL.) [Refr.]	Excreción (creatinina): VLB®-INSST: Final de la semana laboral (Pentóxido de Vanadio) Inf 50,00 µg/g creat Excreción (creatinina): Límite de cuantificación: Inf 7,00 µg/g creat Vanadio orina: Límite de cuantificación 7,00 µg/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
VASU **VANADIO, SUERO**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	4	Rec. 1 mL Suero (libre trazas metales) (1 x Tubo Suero metales traza) [Refr.]	Valores interpretativos: Prótesis e implantes No existe desgaste: Inf= 5,00 µg/L Valores interpretativos: Prótesis e implantes Riesgo de desgaste:: Sup 5,00 µg/L
VANC **VANCOMICINA, SUERO**	Inmunoanálisis enzimático	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] -Dosis administrada, frecuencia y vía de administración Obtener la muestra de sangre previamente a la administración del fármaco. Usualmente se determina la concentración en predosis matinal y en ayunas.	I.Terapéutico: Perfusión continua 20,00 - 25,00 µg/mL I.Terapéutico: Pico Sup 30,00 µg/mL I.Terapéutico: Valle 10,00 - 20,00 µg/mL Toxicidad: Pico Sup 80,00 µg/mL Toxicidad: Valle Sup 20,00 µg/mL
G1106 **VARIANTE PUNTUAL FAMILIAR · SANGER**	Secuenciación Sanger	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	
G1107 **VARIANTE PUNTUAL FAMILIAR 2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	
G1105 **VARIANTE PUNTUAL FAMILIAR 3 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G00044 **VARIANTE PUNTUAL FAMILIAR COMPLEJA · SANGER**	Secuenciación Sanger	20	Rec. 1 mL Sangre total EDTA [Refr.] Plazo de entrega orientativo dependiendo de la complejidad en la secuenciación del Gen estudiado y de las caracteristicas genotípicas inherentes al paciente.	
AVIV **VARICELA ANTICUERPOS IgG (TEST DE AVIDEZ PARA LAS IgG), SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	7	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Una Baja Avidez es compatible con una infección aguda primaria. Baja Avidez: Inf 40,00 % Moderada Avidez: 40,00 - 60,00 % Alta Avidez: Sup 60,00 % Una Alta Avidez es compatible con una infección antigua.
QDNV **VARICELA ZOSTER (VZV, HHV-3) DNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	PCR-Real Time.	5	Rec. 1 Muestra/s Lesión de piel (1 x Contenedor estéril) [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Frotis (1 x Escobillón seco.) [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Exudado genital (1 x Escobillón seco.) [Refr.] Rec. 1 mL LCR (1 x Tubo estéril) [Cong.] Alt. 2 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 1 mL Humor vitreo/acuoso (1 x Tubo estéril) [Refr.] Alt. 1 mL DNA Extraido (1 x Microtubos DNAse, RNAse Free) [Refr.] Alt. 1 mL BAL (1 x Tubo estéril) [Refr.]	: No se detecta

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
VZA **VARICELA ZOSTER ANTICUERPOS IGA, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/10 Interpretación: Positivo: Sup= 1/10
VZGCR **VARICELA ZOSTER ANTICUERPOS IGG, LCR**	Inmunofluorescencia Indirecta.	3	Rec. 1 mL LCR [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/2 Interpretación: Positivo: Sup= 1/2
VZG **VARICELA ZOSTER ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Quimioluminiscencia.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	No se detecta: Inf 150,00 mUI/mL Positivo: Sup= 150,00 mUI/mL
VZMCR **VARICELA ZOSTER ANTICUERPOS IgM, LCR**	Inmunofluorescencia Indirecta.	3	Rec. 1 mL LCR [Refr.]	Interpretación: Negativo: Inf 1/2 Interpretación: Positivo: Sup= 1/2
VZM **VARICELA ZOSTER ANTICUERPOS IGM, SUERO**	Quimioluminiscencia.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	No se detecta: Inf 0,90 Índice Indeterminado: 0,90 - 1,10 Índice Positivo: Sup 1,10 Índice
G04049 **VASCULITIS POR DEFICIENCIA DE ADA2 · ADA2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ADA2 *1*
VASO **VASOPRESINA HORMONA ANTIDIURETICA (ADH), PLASMA**	Radioinmunoanálisis.	8	Rec. 2.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Ayuno mínimo de 12 horas. Permanecer recostado y sin estrés como mínimo 1h antes de la recogida de muestra.	Inf= 13,00 pmol/l

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
VCAM1S **VCAM-1 SOLUBLE (sCD106), SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	32	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Consultar plazo de entrega con el laboratorio.	162,00 - 492,00 ng/mL
VDBP **VDBP (PROTEÍNA FIJADORA DE VITAMINA D), SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	15	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.]	200,00 - 550,00 mg/L
VDRLLC **VDRL (SIFILIS), LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO**	Aglutinación	3	Rec. 0.5 mL LCR [Refr.]	Interpretación: Negativo
VDRL **VDRL (SYPHILIS), SUERO**	Aglutinación de Partículas.	3	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo
VEDO **VEDOLIZUMAB / ANTICUERPOS ANTI-VEDOLIZUMAB, SUERO**	Quimioluminiscencia.	7	Rec. 2 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Extracción realizada antes de la siguiente toma. Indicar la primera toma, la frecuencia, la dosis y la fecha de la última dosis. Remitir informe clínico y motivo de solicitud de estudio.	Ac. Vedolizumab: Inf 10,00 ng/mL Vedolizumab: µg/mL No se dispone de intervalo terapéutico
G15079 **VEJIGA, SEGUIMIENTO EN CANCER DE (BLADDER EPICHECK) · METILACIÓN**	PCR-Real Time.	15	Rec. 50 mL Orina (1 x Contenedor estéril) [Refr.] Rechazo: Muestra congelada. Descatalogado para envios transoceánicos	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
VS1 **VELOCIDAD DE SEDIMENTACION GLOBULAR, SANGRE TOTAL**	Eritrosedimentación.	1	Rec. 1 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Muestra alternativa: Sangre total citrato	Hombres Inf 15,00 mm Mujeres Inf 20,00 mm

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
VENL **VENLAFAXINA, SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	6	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.] Alt. 0.5 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis. El contenedor recomendado es el tubo seco (sin gel separador) para evitar procesos de adsorción del fármaco. En caso de no disponer de tubo seco, la extracción se puede realizar en tubo con gel separador, separando el suero dentro de las 2 horas posteriores a la recolección y transfiriéndolo a un tubo de alícuota para su transporte al laboratorio. Realizar extracción a las 2 horas tras la toma del fármaco. Rechazo: Muestra hemolizada, lipémica y/o ictérica	Intervalo terapéutico (Venlafaxina + O-desmetilvenlafaxina): 100 – 400 µg/L Toxicidad (Venlafaxina + O-desmetilvenlafaxina): Superior a 800 µg/L Cociente O- desmetilvenlafaxina/Venlafaxina: 2.70 - 7.70 Límite de cuantificación: Venlafaxina 10 µg/L O-desmetilvenlafaxina 10 µg/L
G10006 **VENO-OCLUSIVA PULMONAR TIPO 1, ENFERMEDAD · BMPR2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BMPR2 *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G01187 **VENO-OCLUSIVA PULMONAR, ENFERMEDAD DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BMPR2, EIF2AK4
VIGA **VIGABATRIN (GAMMAVINIL GABA), SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Cong.] -Dosis administrada, frecuencia y vía de administración La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis. No utilizar tubos con gel separador.	I.Terapéutico: 2,00 - 10,00 mg/L Toxicidad: Sup 20,00 mg/L Límite de cuantificación: 1,00 mg/L
ACVCM **VIMENTINA CITRULINADA MUTADA ANTICUERPOS, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	8	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Inf 20,00 U/mL
VHPC **VIRUS EN HECES POR PCR**	Reacción en cadena de la polimerasa.	10	Rec. 1 g Heces (1 x Kit específico) Kit Ref SAP: 600063505	: No se detecta

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
FA **VIRUS FIEBRE AMARILLA ANTICUERPOS IgG, SUERO**	Neutralización viral	12	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Adjuntar historia clínica resumida, incluyendo si el paciente ha visitado otros países recientemente y un resumen de la sintomatología. Enviar la muestra en un tubo estéril en un embalaje de seguridad biológica	Negativo
FAM **VIRUS FIEBRE AMARILLA ANTICUERPOS IgM, SUERO**	Neutralización viral	12	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Adjuntar historia clínica resumida, incluyendo si el paciente ha visitado otros países recientemente y un resumen de la sintomatología. Enviar la muestra en un tubo estéril en un embalaje de seguridad biológica	Negativo
DPH1 **VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPO 1 (HIV-1) DNA PROVIRAL, SANGRE TOTAL**	Nested-PCR.	4	Rec. 3 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No se detecta

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
QHIV **VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPO 1 (HIV-1) RNA CARGA VIRAL, PLASMA**	PCR-Real Time.	6	Rec. 1.5 mL Plasma seminal (1 x Tubo estéril) [Cong.] Rec. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Muestras alternativa: suero congelado, fluido seminal. Plasma seminal: Recoger la muestra de semen en un contenedor estéril. Transferir la muestra a tubos de centrífuga estériles (utilizando pipetas estériles). Centrifugar los tubos a 400 g durante 10 minutos. Traspasar el plasma seminal (sobrenadante) a un tubo estéril y congelar - Enviar congelado Separar el plasma mediante centrifugación entre 800 y 1600 x g durante 20 minutos a temperatura ambiente (entre 15 y 30ºC) antes de que transcurran 24 h tras extracción. Transferir a tubo estéril de polipropileno. Congelar para su transporte y remitir la muestra congelada.	El intervalo analítico está definido entre 20 copias y 10 millones copias (33 UI/mL - 16,7 millones UI/mL)

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
VIHSE **VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPO 1 (HIV-1) RNA VIRAL, SEMEN**	PCR-Real Time.	7	Rec. 1 mL Semen (1 x Contenedor estéril) [Cong.]	RNA viral VIH: No se detecta
DNH2 **VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPO 2 (HIV-2) DNA PROVIRAL, SANGRE TOTAL**	Nested-PCR.	5	Rec. 3 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	: No se detecta
HIV2RG **VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPO 2 (HIV-2) RESISTENCIA GENOTÍPICA: PROTEASA (IP), RETROTRANSCRIPTASA (NNRTI, NRTI), INTEGRASA, PLASMA**	Técnica de secuenciación	12	Rec. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] 2- Centrifugar y congelar plasma antes de los 30 minutos después de la extracción. 4- Asegurar envío plasma EDTA congelado 4- Evitar descongelación pre-analítica Se requiere una carga viral reciente igual o superior a 2000 copias/mL. Indicar valor del resultado de la carga viral.	Se informa para cada paciente

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
RNHIV2C **VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPO 2 (HIV-2) RNA CARGA VIRAL, PLASMA**	PCR-Real Time.	5	Rec. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Rechazo: Muestras refigeradas más de 2 días. Separar el plasma mediante centrifugación refrigerada entre 800 y 1600 x g durante 20 minutos, antes de las 24 horas tras extracción. Transferir a tubo estéril de polipropileno. Congelar para su transporte. Remitir congelada. Conservar entre -20 y -80ºC en el laboratorio.	Límite de cuantificación: 10 copias/mL copias/mL No se detecta
RHI2 **VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPO 2 (HIV-2) RNA, PLASMA**	PCR-Real Time.	4	Rec. 3 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.]	No se detecta. Límite de cuantificación: 100 copias/mL
HTL1 **VIRUS LINFOTRÓPICO HUMANO T TIPO 1 (HTLV-1) RNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	PCR-Real Time.	6	Rec. 5 mL Sangre total EDTA [Refr.] Rec. 2 mL Semen [Refr.] Rec. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Cong.] Rec. 0.5 mL LCR [Cong.]	HTLV-1 RNA en muestra biológica (resultado): No se detecta

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
HT12 **VIRUS LINFOTRÓPICO HUMANO T TIPO 1+TIPO 2 (HTLV-1+HTLV-2) RNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	PCR-Real Time.	6	Rec. 1 mL Semen [Refr.] Rec. 1 mL Plasma EDTA [Cong.] Alt. 5 mL Sangre total EDTA [Refr.] Alt. 0.5 mL LCR [Refr.]	HTLV (1+2) RNA en muestra biológica (resultado): No se detecta
HTL2 **VIRUS LINFOTRÓPICO HUMANO T TIPO 2 (HTLV-2) RNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	PCR-Real Time.	6	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 1 mL Semen [Refr.] Alt. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 0.5 mL LCR [Refr.]	: No se detecta
VRSME **VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL ANTICUERPOS IgM (EIA), SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 0,80 Índice Indeterminado: 0,80 - 1,10 Índice Positivo: Sup= 1,10 Índice
VRSGE **VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL, ANTICUERPOS IgG (EIA), SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	5	Rec. 1 mL Suero [Refr.]	0,80 - 1,10 Índice Negativo: Inf 0,80 Índice Indeterminado: 0,80 - 1,09 Índice Positivo: Sup= 1,10 Índice
PGCO **VIRUS RESPIRATORIOS (Influenza, VRS) + CORONAVIRUS SARS COV-2 RNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	PCR-Real Time.	1	Rec. 1 Muestra/s Exudado nasal (1 x Escobillón con medio de transporte para virus) [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Exudado faringeo (1 x Escobillón con medio de transporte para virus) [Refr.]	RNA Influenza A: No se detecta RNA Influenza B: No se detecta RNA Coronavirus SARS-CoV-2: Negativo RNA Virus respiratorio sincitial (VRS): No se detecta

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
PGRV **VIRUS RESPIRATORIOS (Influenza, VRS) RNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	PCR-Real Time.	4	Rec. 1 Muestra/s Exudado nasal (1 x Escobillón con medio de transporte para virus) [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Exudado faringeo (1 x Escobillón con medio de transporte para virus) [Refr.]	RNA Influenza A: No se detecta RNA Influenza B: No se detecta RNA Virus respiratorio sincitial (VRS): No se detecta

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
QPAV				
VIRUS RESPIRATORIOS RNA/DNA PANEL, MUESTRA BIOLÓGICA	PCR-Real Time.	3	Rec. 1 Muestra/s Lavado broncoalveolar (1 x Contenedor estéril) [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Exudado nasal (1 x Escobillón con medio de transporte para virus) [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Exudado faringeo (1 x Escobillón con medio de transporte para virus) [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Aspirado bronquial (1 x Contenedor estéril) [Refr.] Toma de muestra: La toma de muestras para aislamiento debe ser realizada por personal especializado. Realizar toma de muestras en la fase aguda de la enfermedad. Realizar la toma de muestras siguiendo los procedimiento estandar aceptados. Es de gran importancia recoger células epiteliales de las zonas afectadas, por lo que las muestras deben tomarse mediante escobillonado vigoroso o raspado de dichas zonas. Realizar la toma de muestras con el escobillón estéril. Introducir el escobillón en el tubo que contiene el medio de transporte. Cortar el extremos del escobillón	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
			teniendo la precaución de no rozar con los dedos los bordes del tubo. Cerrar el tubo herméticamente. Rellenar datos del paciente, tipo de muestra, fecha y hora de la toma. Si las muestras no pueden ser procesadas de forma inmediata a su llegada al laboratorio conservar congelada.	
RNTOSS **VIRUS TOSCANA RNA, SUERO**	PCR-Real Time.	12	Rec. 2 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	Sup No se detecta
VISCO **VISCOSIDAD CINEMÁTICA, SUERO**	Viscosimetría.	2	Rec. 3 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	1,40 - 1,80
VITA **VITAMINA A, SUERO**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	4	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Muestra protegida de la luz	Ambos 0 - 12 Años 0,19 - 0,49 mg/L Ambos 13 - 19 Años 0,26 - 0,75 mg/L Ambos Sup - 19 Años 0,29 - 0,80 mg/L
B1 **VITAMINA B1 (TIAMINA), SANGRE TOTAL**	Cromatografía Líquida Alta Resolución / Fluorimetría.	6	Rec. 1 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Muestra protegida de la luz	3,60 - 9,70 µg/dL
VB12 **VITAMINA B12, SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	187,00 - 883,00 pg/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
VB2 **VITAMINA B2 (FORMA ACTIVA FLAVIN ADENINE DINUCLEOTIDE), SANGRE TOTAL**	Cromatografía Líquida Alta Resolución / Fluorimetría.	6	Rec. 2 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Muestra protegida de la luz	137,00 - 370,00 µg/L
VIB3 **VITAMINA B3 (NIACINA), SUERO**	Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectrometría de masas.	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Muestra protegida de la luz Rechazo: Muestra Hemolizada	10,00 - 65,00 µg/L
VIB5 **VITAMINA B5 (ÁCIDO PANTOTENICO), SUERO**	Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectrometría de masas.	6	Rec. 2 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Proteger de la luz. Rechazo: Muestra Hemolizada	23,00 - 125,00 µg/L
VB6LCR **VITAMINA B6 (PIRIDOXAL 5´FOSFATO), LCR**	Cromatografía Líquida Alta Resolución.	32	Rec. 1 mL LCR (1 x Tubo estéril) [Refr.]	Ambos 0 - 30 Días 32,00 - 78,00 nmol/L Ambos 1 - 12 Meses 24,00 - 87,00 nmol/L Ambos 1 - 2 Años 14,00 - 59 nmol/L Ambos Sup - 3 Años 11,00 - 40 nmol/L
VB6 **VITAMINA B6 (PIRIDOXAL 5´FOSFATO), SANGRE TOTAL**	Cromatografía Líquida Alta Resolución / Fluorimetría.	5	Rec. 1 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Muestra protegida de la luz	16,00 - 64,00 µg/L
VDDHQ **VITAMINA D (1.25 DIHIDROXI COLECALCIFEROL), SUERO [QUIMIOLUMINISCENCIA]**	Quimioluminiscencia.	2	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	19,90 - 79,30 pg/mL
VDDH **VITAMINA D (1.25 DIHIDROXI COLECALCIFEROL), SUERO [RIA]**	Radioinmunoanálisis.	4	Rec. 1.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	18,00 - 108,00 pg/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
25OH **VITAMINA D (25 HIDROXI COLECALCIFEROL), SUERO**	Quimioluminiscencia.	1	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Deficiencia Inf 10,00 ng/mL Insuficiencia 10,00 - 30,00 ng/mL Suficiencia 30,00 - 100,00 ng/mL Toxicidad Sup 100,00 ng/mL
VD23 **VITAMINA D2 (25-OH) + VITAMINA D3 (25-OH), SUERO**	Cromatografía líquida de alta eficacia - Espectrometría de masas.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Vitamina D2 (25-OH) por LC/MS: 1,00 - 12,10 µg/L Vitamina D3 (25-OH) por LC/MS: Déficit: Inf 20,00 µg/L Vitamina D3 (25-OH) por LC/MS: Insuficiencia: 20,00 - 29,90 µg/L Vitamina D3 (25-OH) por LC/MS: Óptimo: 30,00 - 60,00 µg/L Vitamina D3 (25-OH) por LC/MS: Toxicidad: Sup 150,00 µg/L
VITE **VITAMINA E (ALFA TOCOFEROL), SUERO**	Cromatografía Líquida Alta Resolución / Espectrometria.	4	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Muestra protegida de la luz	Ambos 1 - 12 Años 3,00 - 9,00 mg/L Ambos 13 - 19 Años 6,00 - 14,20 mg/L Ambos Sup - 19 Años 5,50 - 18,00 mg/L
VITK **VITAMINA K1, SUERO**	Cromatografía Líquida Alta Resolución / Fluorimetría.	5	Rec. 1.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Muestra protegida de la luz Separar y congelar inmediatamente.	0,10 - 1,60 µg/L
VITK2 **VITAMINA K2, SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	10	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Muestra protegida de la luz	0,10 - 0,82 ug/L
G12046 **VITRORETINOPATÍAS · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BEST1, CAPN5, COL11A1, COL11A2, COL18A1, COL2A1, COL9A1, COL9A2, COL9A3, FZD4, KCNJ13, LRP5, NDP, NR2E3, RS1, TSPAN12, VCAN

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G02039 **VOHWINKEL, SÍNDROME DE · GJB2 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	GJB2	*1*
G14078 **VON HIPPEL-LINDAU, SÍNDROME DE · VHL · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	VHL	*1*
G14079 **VON HIPPEL-LINDAU, SÍNDROME DE · VHL · SANGER**	Secuenciación Sanger	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	VHL	*1*
G14080 **VON HIPPEL-LINDAU, SÍNDROME DE · VHL · SANGER+MLPA**	Secuenciación Sanger + MLPA	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	VHL [MLPA]	*1*
G04055 **VON WILLEBRAND TIPO 2A, 2B Y 2M, ENFERMEDAD DE · VWF (Exon 28) · HOT SPOT**	Hot Spot	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	VWF [exón 28]	*1*
G04062 **VON WILLEBRAND, ENFERMEDAD DE · VWF · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 5 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA (2 tubos)) [Refr.]	VWF	*1*
G04005 **VON WILLEBRAND, ENFERMEDAD DE · VWF · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	VWF	*1*
G18025 **VORICONAZOL, RESPUESTA A · CYP2C19 · HOT SPOT**	Secuenciación Sanger	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]		

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
VORIC **VORICONAZOL, SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	6	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.] El contenedor recomendado es el tubo seco (sin gel separador) para evitar procesos de adsorción del fármaco. En caso de no disponer de tubo seco, la extracción se puede realizar en tubo con gel separador, separando el suero dentro de las 2 horas posteriores a la recolección y transfiriéndolo a un tubo de alícuota para su transporte al laboratorio. Obtener la muestra de sangre previamente a la administración del fármaco. Usualmente se determina la concentración en predosis matinal y en ayunas. Rechazo: Muestra hemolizada, lipémica y/o ictérica	1,00 - 6,00 mg/L Toxicidad: Sup 6,00 mg/L
G02045 **WAARDENBURG TIPO 1 Y 3, SÍNDROME DE · PAX3 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PAX3 *1*
G02046 **WAARDENBURG, SÍNDROME · PANEL · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	MITF, PAX3, SOX10 *3*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G02047 **WAARDENBURG, SÍNDROME DE · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	EDN3, EDNRB, MITF, PAX3, SMOC1, SNAI2, SOX10, TYR	*8*
G11236 **WALKER WARBURG, SÍNDROME · PANEL · NGS**	Panel NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	B3GALNT2, B4GAT1, DAG1, FKRP, FKTN, GMPPB, ISPD, LARGE, POMGNT1, POMGNT2, POMK, POMT1, POMT2, RXYLT1	*14*
G02048 **WARDERGURG/ALBINISMO DIGÉNICO, SÍNDROME DE · TYR · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	TYR	*1*
WARSU **WARFARINA, SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Cong.]	0,80 - 3,00 µg/mL	
G12054 **WEILL-MARCHESANI 2, SÍNDROME DE · FBN1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FBN1	*1*
NHBA **WELLNESS CHECK**	Polimorfismos de Longitud de Fragmentos de Restricción (RPLP) – PCR + PCR a Tiempo Rea	15	Rec. 5 mL Sangre total EDTA [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Raspado Bucal (1 x Kit específico) No es necesario estar en ayunas. Se requiere peticionario específico. Se requiere consentimiento informado.	Indicado en informe adjunto	
G12055 **WENER, SÍNDROME DE · WRN · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	WRN	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
G1017 **WILLIAMS, SÍNDROME · 7q11.23 · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	[7q11.23]	*1*
G01156 **WILLIAMS, SÍNDROME DE · 7q11.23 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	[7q11.23]	*1*
G09010 **WILMS, TUMOR DE · WT1 · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	WT1	*1*
G11176 **WILSON, ENFERMEDAD DE · ATP7B · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ATP7B	*1*
G11175 **WILSON, ENFERMEDAD DE · ATP7B(p.His1069Gln) · HOT SPOT**	Hot Spot	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ATP7B [p.His1069Gln]	*1*
G7462 **WILSON, ENFERMEDAD DE · ATP7B · MLPA**	MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	20	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	ATP7B	*1*
G04048 **WISKOTT-ALDRICH, SÍNDROME DE · WAS · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	WAS	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
G11239 **WOLF-HIRSCHHORN, SÍNDROME DE · del4p · FISH**	FISH (Hibridación in situ fluorescente)	7	Rec. 4 mL Sangre total Heparina sódica (2 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Material fijado de cultivo celular. (1 x Tubo Eppendorf) [Refr.] En el caso de envíos transoceánicos que exceden el tiempo máximo de 72 horas tras la extracción, solo se aceptará material fijado de cultivo.	[del4p] *1*
G03079 **WOLFRAM, SÍNDROME DE · WFS1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	WFS1 *1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES	
CXFSBP **X FRÁGIL, SÍNDROME (FMR1) SOUTHERN BLOT, MUESTRA PRENATAL**	Southern-Blot.	15	Rec. 5 mL Líquido amniótico (1 x Tubo estéril) [Refr.] Rec. 10 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Rec. 1 Muestra/s Vellosidad corial (1 x Tubo genética vell.corial (cónico 30 mL).) [Refr.] En caso de estudio Prenatal (contactar previamente con el Laboratorio para volúmen y condiciones de envío de la muestra): - Muestra prenatal (vellosidad corial, líquido amniótico) - Muestra sangre total-EDTA (10mL) progenitor afecto y no afecto En caso de estudio urgente: - Muestra sangre total-EDTA (10mL)		
CXFSB **X FRÁGIL, SÍNDROME (FMR1) SOUTHERN BLOT, SANGRE TOTAL**	Southern-Blot.	45	Rec. 10 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]		
G7473 **XANTOMATOSIS CEREBROTENDINOSA · CYP27A1 · SANGER**	Secuenciación Sanger	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	CYP27A1	*1*
FRAG **X-FRÁGIL, SÍNDROME · FMR1 · A.FRAGMENTOS**	Análisis de Fragmentos	10	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	FMR1	*1*

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
XILEN **XILENO, SANGRE TOTAL**	Cromatografía de Gases / Ionización de Llama.	10	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	BEIs® (ACGIH®): Inf 1,00 mg/L
ABXI **XILOSA (TEST DE XILOSA), SUERO + ORINA**	Espectrometría.	5	Rec. 1 mL Suero 120 m. (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 1 mL Suero 60 h (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 1 mL Orina 5 h (1 x Contenedor estéril) [Refr.] Muestra alternativa: plasma.	Orina 5 h: 3,00 - 9,00 g/5h Suero 120 m: 32,00 - 58,00 mg/dL Suero 60 m: 21,00 - 57,00 mg/dL
XILS60 **XILOSA (TEST DE XILOSA POST 1 HORA), SUERO**	Espectrometría.	5	Rec. 1 mL Suero 60 m. [Refr.] Muestra alternativa: plasma.	21,00 - 57,00 mg/dL
XILS120 **XILOSA (TEST DE XILOSA POST 2 HORAS), SUERO**	Espectrometría.	5	Rec. 1 mL Suero 120 m. [Refr.] Muestra alternativa: plasma.	32,00 - 58,00 mg/dL
XIOR **XILOSA (TEST XILOSA), ORINA**	Espectrometría.	5	Rec. 1 mL Orina 5 h [Refr.]	Orina 5 h: 3,00 - 9,00 g/5h
DNYE **YERSINIA DNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	PCR-Real Time.	4	Rec. 5 mL Heces [Refr.] Alt. 2 mL Sangre total EDTA [Refr.]	Se incluye la detección de Yersinia enterocolítica, Yersinia pestis y Yersinia pseudotuberculosis. DNA Yersinia en muestra biológica (resultado): No se detecta

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
YERENM **YERSINIA ENTEROCOLITICA ANTICUERPOS IgM, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	9	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	Negativo: Inf 24,00 U/mL
DNYPST **YERSINIA PSEUDOTUBERCULOSIS DNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	Reacción en cadena de la polimerasa.	5	Rec. 5 mL Heces [Refr.] Rec. 1 Pieza/s Biopsia intestinal [Refr.]	No se detecta
YERGEI **YERSINIA SP ANTICUERPOS IgG (EIA), SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	9	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo: Inf 10,00 U/mL Indeterminado: 10,00 - 15,00 U/mL Positivo: Sup 15,00 U/mL Se recomienda nueva muestra en 1-2 semanas para ver evolución serológica. Después de una infección por Yersinia los anticuerpos IgG pueden persistir durante años.
YO **YO (PCA-1) ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunofluorescencia Indirecta.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	No se detecta Tejido: Cerebelo En caso de positividad, el resultado debe ser confirmado con un método alternativo (inmunoblot). En caso de negatividad, no se descarta la existencia de un síndrome neurológico autoinmune

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
IOOR **YODUROS, ORINA**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	5	Rec. 2 mL Orina [Refr.]	Ingesta suficiente de yodo: Inf 199,00 µg/L Déficit grave de yodo: Inf 20,00 µg/L Posible riesgo de ingesta de yodo superior a la necesaria.: Inf 299,00 µg/L Déficit moderado de yodo: Inf 49,00 µg/L Déficit leve de yodo: Inf 99,00 µg/L Riesgo de problemas de salud por exceso de yodo.: Sup= 300,00 µg/L Embarazadas, en periodo de lactancia o en planificación de gestación Déficit leve de yodo: Inf 0,00 µg/L Embarazadas, en periodo de lactancia o en planificación de gestación Valor superior a las necesidades de yodo: 250,00 - 499 µg/L Lactantes Déficit leve de yodo: Inf 100,00 µg/L Lactantes Ingesta adecuada de yoduro: Sup= 100,00 µg/L Embarazadas, en periodo de lactancia o en planificación de gestación Ingesta adecuada de yoduro: 150,00 - 249,00 µg/L Embarazadas, en periodo de lactancia o en planificación de gestación Ingesta excesiva de yoduro: Sup 500,00 µg/L
YOOR **YODUROS, ORINA 24H**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	5	Rec. 2 mL Orina 24h. (alícuota) (1 x Contenedor 2500 mL.) [Refr.]	Yodo en orina 24 horas (Iodo) (concentración): Déficit grave de yodo: Inf 20,00 µg /L Yodo en orina 24 horas (Iodo) (concentración): Riesgo de problemas de salud por exceso de yodo.: Sup 300,00 µg /L Yodo en orina 24 horas (Iodo) (concentración): Ingesta suficiente de yodo: 100,00 - 199,00 µg /L Yodo en orina 24 horas (Iodo) (concentración): Déficit moderado de yodo: 20,00 - 49,00 µg /L Yodo en orina 24 horas (Iodo) (concentración): Posible riesgo de ingesta de yodo superior a la necesaria.: 200,00 - 299,00 µg /L Yodo en orina 24 horas (Iodo) (concentración): Déficit leve de yodo: 50,00 - 99,00 µg /L No se dispone de Valores de Referencia para Yodo en Orina de 24H. Valores interpretativos en orina de micción (Valoración del estado nutricional del Yodo) según OMS.

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
IOSU **YODUROS, SUERO**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	5	Rec. 2 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.]	40,00 - 80,00 ug/L
G03067 **ZELLWEGER (DESORDEN DE BIOGÉNESIS PERIXOSOMAL TIPO 1A), SÍNDROME DE · PEX1 · NGS**	Secuenciación NGS (Next Generation Sequencing)	25	Rec. 4 mL Sangre total EDTA (2 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	PEX1 *1*
ZIC4 **ZIC-4 NEURONALES ANTICUERPOS, SUERO**	Inmunoblot.	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	No se detecta
ZHO2 **ZIEHL NEELSEN (2a MUESTRA), ORINA**	Tinción / Observación microscópica.	3	Rec. 1 mL Orina (1 x Vaso de orina y tubo) [Refr.]	
ZHO **ZIEHL NEELSEN, ORINA**	Tinción / Observación microscópica.	3	Rec. 1 mL Orina (1 x Vaso de orina y tubo) [Refr.]	

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
RNZI **ZIKA VIRUS (ZIKV) RNA, MUESTRA BIOLÓGICA**	RT-PCR	6	Rec. 2 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Rec. 1 mL Orina (1 x Contenedor estéril) [Refr.] Alt. 2 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Tubo estéril + recipiente de seguridad biólogica Centrifugar la muestra lo antes posible. Otros tipos de muestra, consultar su idoneidad con el laboratorio antes de su envío.	No se detecta
ZIKG **ZIKA VIRUS ANTICUERPOS IGG, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 1 mL Plasma Heparina sódica (1 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Plasma Heparina litio (1 x Tubo sangre heparina litio) [Refr.] Alt. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo: Inf 0,80 Indice Indeterminado: 0,80 - 1,09 Indice Positivo: Sup= 1,10 Indice

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ZIKM **ZIKA VIRUS ANTICUERPOS IgM, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	5	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Refr.] Alt. 1 mL Plasma Hidróxido sódico (1 x Tubo sangre heparina sódica) [Refr.] Alt. 1 mL Plasma Heparina litio (1 x Tubo sangre heparina litio) [Refr.] Alt. 1 mL Plasma EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.]	Negativo: Inf 0,80 Indice Indeterminado: 0,80 - 1,09 Indice Positivo: Sup= 1,10 Indice
ZN/W **ZINC ERITROCITARIO SANGRE**	Espectrometría Absorción Atómica / Llama.	5	Rec. 1 mL Sangre total EDTA Dipotásico (libre trazas metales) (1 x Tubo Sangre EDTA metales traza) [Refr.] Muestra alternativa: Heparina sódica.	7,80 - 16,30 mg/L
AGZN **ZINC, AGUA**	Absorción atómica.	15	Rec. 100 mL Agua (1 x Envase aséptico) [Refr.] Alt. 100 mL Agua (1 x Envase aséptico) (<2 Ác.nítrico)	Agua de diálisis Inf 0,10 mg/L
ZNOR **ZINC, ORINA 24H**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	4	Rec. 1 mL Orina 24h. (alícuota) (1 x Contenedor 2500 mL.) [Refr.]	Volumen de orina remitido (diuresis): 600,00 - 1600,00 mL Excreción (24h): 150,00 - 1000,00 µg/24h Zinc orina 24 h: Límite de cuantificación: 30,00 µg/L
ZNFJ **ZINC, ORINA FINAL DE JORNADA**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	5	Rec. 10 mL Orina final jornada [Refr.]	Zinc en orina de final de jornada: 89,00 - 910,00 µg/g creat

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ZNSE **ZINC, PLASMA SEMINAL**	Espectrometría.	4	Rec. 1 mL Plasma seminal [Cong.]	764,00 - 7644,00 µmol/L
ZN **ZINC, SUERO**	Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)	3	Rec. 1 mL Suero (libre trazas metales) (1 x Tubo Suero metales traza) [Refr.]	60,00 - 120,00 ug/dL
AZNT8 **ZNT8 ANTICUERPOS, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	10	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.] Rechazo: Muestra Hemolizada Rechazo: Muestra lipémica.	Negativo: Inf 10,00 U/mL
COZOLOR **ZOLPIDEM CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), ORINA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 10 mL Orina [Refr.]	Se utiliza como criterio de Positividad que la concentración sea superior o igual al valor del límite de cuantificación más el valor de incertidumbre del ensayo. En caso contrario, el resultado es Negativo. Incertidumbre de medida 3,4 ng/mL Límite de cuantificación 25 ng/mL
COZOLSAI **ZOLPIDEM CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SALIVA**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 1 mL Saliva [Refr.]	Incertidumbre de medida 3 ng/mL Límite de cuantificación 15 ng/mL

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
COZOLSTI **ZOLPIDEM CONFIRMACIÓN (LC-MS/MS), SANGRE**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	3	Rec. 10 mL Sangre total Oxalato/Fluoruro (1 x Tubo Sangre Total-Oxalato/Fluoruro) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total Heparina litio (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Alt. 10 mL Sangre total EDTA (1 x Tubo sangre EDTA) [Refr.] Tubo oxalato potásico/Fluoruro sódico Ref. SAP 600088318	Incertidumbre de medida 3 ng/mL Límite de cuantificación 15 ng/mL
ZOLPID **ZOLPIDEM, SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	6	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Refr.] La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis. No utilizar tubos con gel separador. Rechazo: Muestra hemolizada, lipémica y/o ictérica	I.Terapéutico: 80,00 - 160,00 µg/L Toxicidad: Sup 320,00 µg/L Límite de cuantificación: 12,00 µg/L

	MÉTODO	P.E.	MUESTRA	V.REFERENCIA / GENES
ZONI **ZONISAMIDA, SUERO**	Cromatografia liquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)	5	Rec. 0.5 mL Suero (1 x Tubo suero sin gel separador) [Cong.] La extracción de muestras para la monitorización de fármacos se recomienda siempre antes de la administración de la dosis. No utilizar tubos con gel separador.	I.Terapéutico: 10,00 - 40,00 mg/L Toxicidad: Sup 40,00 mg/L Límite de cuantificación: 4,00 mg/L
ZONUH **ZONULINA, HECES**	Enzimoinmunoanálisis	6	Rec. 1 g Heces (1 x Contenedor estéril) [Refr.]	14,00 - 108,00 ng/mL
ZONU **ZONULINA, SUERO**	Enzimoinmunoanálisis	10	Rec. 1 mL Suero (1 x Tubo suero con separador.) [Cong.]	Inf 48,00 ng/mL

